

BIURO REDAKCYI  
w Krakowie  
Rynek główny, Nr. 38.

# PRZEGLĄD LEKARSKI

Wychodzi  
co Sobota  
w objętości arkusza.

Rękopisy zwracają się  
tylko w razie wyraźnego  
zastrzeżenia.

Administracja i Ekspedycja  
miejscowa w Krakowie  
Ulica Szewska, Nr. 207.  
Agencja w LWOWIE w księgarni  
polskiej przy ulicy Kopernika.\*

Organ Towarzystwa lekarskiego krakowskiego i Towarzystwa  
lekarzy galicyjskich we Lwowie

wydawany pod redakcją

Dra Stanisława Janikowskiego, Prof. w Uniw. Jag.

Agencje główne:  
w Warszawie w księgarni  
Gebethnera i Wolffa,  
w Poznaniu w księgarni  
Czaplińskiego.

Cena „Przeгляdu lekarskiego“ wynosi:		Cena w Państwie Austriackim z przesyłką pocztową		Ogłoszenia przyjmuje	Cena ogłoszeń:
W Krakowie rocznie	złr. 6 c. — w. a.	rocznie	złr. 6 cent. 60 w. a.	Biuro Administracji, tudzież Agencje A. Piątkowskiego we Lwowie, Z. Kotkow- skiego, Haasensteina i Voglera i R. Mos- sego w Wiedniu, wreszcie Administracja Dziennika Poznańskiego w Poznaniu.	Od wiersza drobnego (petit) lub miejsca tegoż po 5 centów oprócz 30 cent. opłaty stemplowej.
półrocznie	3 „ „ „	półrocznie	3 „ 30 „ „		
kwartalnie	1 „ 50 „ „	kwartalnie	1 „ 80 „ „		Numer pojedynczy kosztuje 15 c.

## Sprawozdanie o ruchu chorych i chorób w oddziale chorób wewnętrznych Szpitala św. Łazarza w Krakowie w roku 1872.

Podał lekarz ordynujący Dr Korczyński.

(Ciąg dalszy. — Zob. Nr. 31.)

### Wyniki leczenia.

Na 1671 chorych, którzy opuścili szpital umarło 162 mężczyzn i 167 kobiet, razem 329, co w liczbach odsetkowych wynosi, jak obliczono powyżej, 20 0% m., 19·3% kob., średnio 19·7% chorych. Jestto śmiertelność bardzo znaczna, mogąca zastanowić nawet nie lekarza, która témbardziej każdego lekarza zagnęła mimowolnie do bliższego rozpatrzenia tego nie zwykłego stosunku.

Nie znając z własnego doświadczenia stosunków innych oddziałów szpitala krakowskiego, a tem mniej szpitalów prowincjonalnych: poprzestać muszę tylko na wyświeceniu stosunków zdrowotnych i warunków, w jakich znajduje się oddział powierzony mojej opiece, a które mogą wpływać na śmiertelność.

Najpierw widzimy, że ogromna śmiertelność w oddziale chorób wewnętrznych jest stałą, przynajmniej w ostatnich 9 latach, z których zebrać mogłem szczegóły dotyczące tej sprawy. Na dowód tego przywiodę następujące zestawienie:

W roku	Umarło			Proc. śmiertelności odnośnie do ubytku.		
	m.	k.	r.	m.	k.	r.
1863	90	103	193	16·6	23·1	19·5,
1864	119	134	253	23·1	24·2	22·7,
1865	101	146	247	21·4	25·9	23·8,
1866	116	110	226	22·2	19·6	20·8,
1867	117	130	247	20·8	21·2	21·0,
1868	135	154	289	18·7	21·3	20·1,
1869	136	145	281	18·5	19·3	19·0,
1870	155	137	292	23·3	20·5	21·9,
1871	142	149	291	21·2	23·6	22·4,
1872	162	167	329	20·0	19·3	19·7.

Stosunek śmiertelności wynosi więc w przecięciu z lat 9  
20·64% u mężczyzn,  
22·07% u kobiet,

21·24% bez rozróżniania płci, od którego oddala się najbardziej rok 1865 okazujący największą, a rok 1869 najmniejszą śmiertelność. Śmiertelność z roku 1872 policzyć zatem należy bez mała do najmniejszych z ubiegłego 9cioletcia: albowiem zbliża się do lat najkorzystniejszych 1869 i 1863, osobliwie jeśli się uwzględni, że w roku ubiegłym, panowała nagminnie ospa i dostarczyła 209 przypadków, z których 57 przypadków zakończyło się śmiercią.

Jednakowoż śmiertelność z lat powyższych zmniejszy się cokolwiek, jeżeli ją się podda ściślejszemu badaniu krytycznemu. W liczbie zmarłych mieszczą się bowiem chorzy konający, których corocznie spora ilość przybywa do szpitala; nie mniej chorzy z chorobami przewłocznymi, którzy, przybywszy do szpitala, umierają tamże w drugim lub trzecim dniu pobytu. Każdy przyzna, że ani jedni, ani drudzy nie mogą wchodzić w rachubę i nie mogą obciążać śmiertelności szpitala. Nie mając odpowiednich wykazów z lat poprzednich, ograniczę się tylko do wzmianki co do roku 1871go, w którym przybyło do oddziału 11 chorych w chwili konania, tj. 6 mężczyzn i 5 kobiet, a 20 chorych tj. 9 mężczyzn i 11cie kobiet z chorobami przewłocznymi umarło po krótszym niż trzechdniowym pobycie w szpitalu. Odjawszy tych chorych tak od ogólnej liczby, jakoteż od liczby zmarłych, stosunek odsetkowy zmarłych w roku 1871 będziemy mieli u mężczyzn 19·47%, u kobiet 21·54%, ogółowo 20·50% (zamiast poprzednio obliczonego 22·4). Skoro zastosuje się to samo do roku ubiegłego i wyłączy się z ogólnej liczby i z liczby zmarłych wszystkich konających, których przywieziono 27 (12 mężczyzn i 15 kobiet), i chorych z chorobami przewłocznymi, którzy zmarli w pierwszych 3 dniach po przybyciu do szpitala, — a jest ich 15 (7 mężczyzn i 8 kobiet): procent śmiertelności zmniejszy się do 18·1% u mężczyzn, 17·3% u kobiet, a ogółowo do 17·6%.

Ponieważ rok 1871 należy co do śmiertelności do najniekorzystniejszych, rok 1872 zaś do najkorzystniejszych: przeto przypuścić można, że śmiertelność rzeczywista w oddziale chorób wewnętrznych waha się między 17·6% a 20·5%.

Przyczyny tego zjawiska są zdaniem mojem następujące:

1. Nizki stopień oświaty naszego ludu. Pospolstwo nasze zanadto mało ceni sobie każdą chorobę mniejszą i weale nie zważa na powolne początki groźnej nieraz w następstwach choroby i dlatego udaje się do szpitala dopiero wtedy, jeżeli leki domowe, gusła i zabobony odmawiają skuteczności, a choroba dosięgnie nieraz stopnia, gdzie nie tylko o ocaleniu ży-

cia, ale nawet o przedłużeniu takowego mowy być nie może. Potwierdzi to zdanie każdy lekarz, który kiedykolwiek udzielał rady lekarskiej niższej warstwie społeczeństwa naszego, a tém bardziej każdy lekarz szpitalny. Chorzy zgłaszają się często z charłactwem zimniczném, gdzie zwyrodnienie skrobiowate trzew nie pozwala pomyślnie rokować; z chorobą Brighta, gdzie obrzymia opuchlina skórna przy braku wszelkiej troskliwości i opieki w wielu miejscach ulega zgorzelinie; a wodnicę (*hydraemia*) z następowym obrzękiem surowiczym odnóg napotyka się bardzo często w chorobie trwającej nieraz lat kilka, którą w początkach można było usunąć za kilka miesięcy.

2. W parze z niskim stopniem oświaty idzie wstręt do szpitala, który, jak każdy przesąd, tylko bardzo powoli ustępuje z biegiem czasu. Pochodzi on jeszcze z téj epoki rozwoju naszych szpitalów, gdy taniłość i oszczędność były wyłączną myślą przewodniczącą zarządu tychże. Niejeden człowiek ubogi woli bez opieki wyczekiwać polepszenia choroby na własném śmieciisku, a udaje się do szpitala dopiero wtedy, gdy go nadzieja ta ominie. Zdarza się również, że chorzy unikają szpitala, obawiając się, ażeby zwłok ich nie otwierano po śmierci. Na odwrót zdarzają się przypadki, gdzie rodzina umieszcza chorego w szpitalu dopiero wtedy, gdy mu grozi blizka śmierć; jednak nie z litości, tylko z wyrachowanej oszczędności, ażeby nie opłacać w domu kosztów pogrzebu, które u nas są dosyć znaczne.

3. Późne udawanie się chorych do szpitala jest również w części wypływem wadliwych urządzeń społecznych, a mianowicie trudności w otrzymywaniu od gmin świadectwa ubóstwa lub przynależności. Znanie mi są aż nadto liczne przypadki, że ubogi włóścianin, należący do klasy tak zwanych „komorników“, dopóty kołacz nadaremnie o świadectwo ubóstwa, dopóki nie opuszcza go ostatnie siły i dopóki na wstawienie się litościwych gospodarzy „rada gminna“ nie nakłoni się ostatecznie do wydania świadectwa ubóstwa.

4. Mimo wszystkich powyższych niekorzystnych warunków zgłasza się w pewnych porach roku osobliwie w zimie tylu chorych, że nie można żadną miarą przyjąć i pomieścić wszystkich w oddziale leczącym tylko 105 łóżek. W takim razie przyjmuje się tylko o przypadki najcięższe, które powiększają znacznie śmiertelność oddziału.

Gdyby z powiększeniem oddziału można było przyjmować wszystkich chorych, którzy proszą o przyjęcie, a niezbędnie wymagają opieki szpitalnej: śmiertelność względna tj. liczba odsetkowa zmarłych zmalałaby znacznie. Ztąd okazuje się także, jak niezbędnym jest wystawienie rychłe większego szpitala w Krakowie.

5. Wiele wpływa także na znaczną śmiertelność brak jakiegokolwiek przytuliska dla chorych nieulecznych. W Krakowie liczącym przeszło 50,000 mieszkańców istnieje bowiem z zakładów dobroczynnych tylko dom Towarzystwa Dobroczynności i dom przytulku i pracy utrzymywany kosztem miasta; ale w obudwu domach świadectwo zdrowia jest warunkiem przyjęcia. Według ustawy gminnej, gmina każda ma obowiązek utrzymywania swych chorych nieulecznych; a mimo to zdarza się często, że lekarze szpitalni wydają kilkakrotnie napróżno chorym nawet z Krakowa pochodzącym świadectwa nieuleczności, bo świadectw tych magistrat nie uwzględnia. W obec tego lekarze szpitalni godzić naraz muszą przepisy szpitalne, zabraniające przyjmowania i pielęgnowania cho-

rych nieulecznych, z względami ludzkości\*), i nasparzają oddziałom szpitalnym chorych, którzy tamże zazwyczaj życie zakończają. Dlatego otworzenie schronienia dla kalek i chorych nieulecznych jest w Krakowie nagłą koniecznością.

6. Nędza proletaryatu miejskiego, który tak często zgłasza się do szpitala, jest również jedną z przyczyn wielkiej śmiertelności. Sąto nasi łazaroni, z tą tylko różnicą, że nie grzeją się na brzegu morskim i nie przemieszkują w ruinach wielkiego cyrku, lecz w lecie mieszkają pod gołém niebem w okolicznych ciegielniach i pod mostami dróg żelaznych, a wygrzewają się po szynkach przedmiejskich. Pisano i mówiono już bardzo wiele o nędzy tych ludzi, dla których gorzałka jest jedynym celem życia i wyłącznym marzeniem; kto chce ich poznać z blizka, niech się uda do szpitala św. Łazarza, a zobaczy ich, osobliwie w porze zimowej, liezbę zastraszającą. Dziwną jest rzeczą, że ludzie ci opierają się nieraz bardzo długo chorobom przewłocznym, ale każda choroba ostra naraża ich ustrój nadwątlony na ciężką walkę o życie, z której najczęściej chory i lekarz wychodzą zwyciężeni.

Łatwo jest chwalić się małą śmiertelnością w obszernych szpitalach pośród społeczeństwa pracowitego, zdrowego, zamożnego; ale niesłuszną jest rzeczą obwiniać pośród wprost przeciwnych stosunków sam tylko szpital i nazywać go dobijałnią chorych, jak to uczynił Dr Łukaszewski. Zresztą śmiertelność oddziału chorób wewnętrznych nie jest jeszcze bynajmniej miarą ogólnej śmiertelności szpitala: gdyż na oddziałach wewnętrznych wszędzie prawie — z wyjątkiem oddziału chorób dziecięcych — śmiertelność jest największa.

7. Nie chcę jednakże uniewinnąć wcale niekorzystnych stosunków higienicznych i leczniczych naszego szpitala, i owszem przyznaję, że warunki te przyczyniają się znamienicie do powiększenia śmiertelności. Najlepszym zresztą tego dowodem jest korzystniejszy wynik leczenia w r. 1872 względnie do roku 1871go, mimo nagminnie panującej złośliwej ospy, co w znacznej części przypisywać należy ulepszeniu zaprowadzonym w służbie wewnętrznej i w stosunkach higienicznych oddziału. Tu zaliczam zaprowadzenie dyżurów lekarskich, przezeo chorzy znajdują się pod ciągłym dozorem lekarskim i otrzymują pomoc natychmiastową w razach nagłych; pomnożenie liczby lekarzy przez dodanie drugiego stałego lekarza pomocniczego, które nastąpiło z końcem 1871 roku; większą nieco oględność ze strony Sióstr Miłosierdzia w doborze posługaczów i posługaczek; a co najważniejsza, odświeżenie całego szpitala dokonane pod koniec 1871 roku. Polegało ono na tém, że do szczętu zdrapano i wybielono wszystkie mury; że dorobiono nowe okna, których górne części, otwierając się ukośnie, ułatwiają przewietrzanie sal; że dano w kilku salach nowe podłogi w miejsce dawnych na wpuł przegniłych i zaprawiono wszystkie podłogi farbą pokostową, przezeo oszczędza się ciągłego mycia i nie naraża się chorych bez potrzeby na wpływ niekorzystny wilgoci. Wszystkie te ulepszenia nie wystarczają jednakowoż: gdyż sam budynek szpitala mimo ciągłych napraw nie odpowiada celowi. Jestto bowiem gmach, w którym poprzednio mieścił się klasztor ks. Karmelitów. Sale przytykają wprost do nieopalaných korytarzów; wychodki źle

\*) Upoważnia ich zresztą do tego rozporządzenie W. Wydz. krajowego.

zbudowane mimo ciągłego odwietrzania zanieczyszczają powietrze sal, które, przy braku wszelkiej wentylacji sztucznej, przewietrzają się tylko otwieraniem okien. Ilość powietrza, którym oddychają chorzy jest bardzo mała: gdyż według pomiaru, który zawdzięczam grzeźności J. Pana Wasiutyńskiego b. inżyniera powiatowego, licząc dziennie 105 chorych i posługaczy śpiących na salach, na jednego chorego w oddziale chorób wewnętrznych, mamy tylko 602 stóp sześciennych powietrza, a ilość ta w niektórych izbach zmniejsza się do 420 stóp sześciennych. Łaźni szpital dotąd nie posiada: dlatego udzielanie kąpeli należy do zdarzeń wyjątkowych, a nawet pierwsze oczyszczenie chorego przy wstępie do szpitala ulega niekiedy trudnościom.

W obec tych niedogodności lekarze szpitalni wyczekują z niecierpliwością tej chwili, gdy urzeczywistni się raz budowa nowego od tak dawna projektowanego szpitala.

### Ruch chorób ogólny.

Choroby pojedynczych narządów, ułożone według częstości przypadków, tworzą następujący szereg:

1. Choroby zakaźne ostre . . .	531	przyp.
2. " narządu oddechowego . . .	443	"
3. " " trawienia . . .	132	"
4. " układu nerwowego . . .	100	"
5. " narządu moczowego . . .	97	"
6. " narządu wzrokowego . . .	87	"
7. " " ruchowego . . .	79	"
8. " części rodnych kobiecych . . .	74	"
9. " skórne . . .	71	"
10. " narządu krążenia . . .	58	"
11. Ogólne zboczenia odżywcze . . .	44	"
12. Otrucia ostre i przewłoczne . . .	33	"
13. Choroby narządu słuchowego . . .	7	"

nielicząc 13 przypadków chorób udanych (*simulatio*) i 3 przypadków przywiezionych w chwili konania, których z powodu niemożności wykonania sekcji nie można zaliczyć do żadnej z powyższych chorób.

Choroby, które stały się przyczyną śmierci, ułożone według częstości wydarzonych przypadków śmierci, są następujące: gruźlica płucowa wraz z suchotami płucowymi, ospa, choroba Brighta przewłoczna, zapalenie płuc, rozedma płucowa, niedomykalność zastawki dwukończystej, — rak żołądka, dur brzuszny, przerost i zwyrodnienie serca, choroba Brighta ostra, — rak macicy, chyra zimnicza (*cachexia malarica*), zapalenie opłucny, — nakoniec uwiąd starczy, rak wątroby, rak gruczołów zaotrzewnowych, zapalenie otrzewny, sprawy położowe, puchlina mózgowa i nieżyt oskrzelowy, nielicząc chorób, które dostarczyły mniej niż trzech przypadków śmierci.

Ułożywszy zaś wszystkie choroby według śmiertelności względnej tj. odnośnie do ubytku przez śmierć lub wyleczenie z pominięciem zupełnem chorych przeniesionych do innych oddziałów i do klinik i chorych przywiezionych w chwili konania, otrzymamy następującą szereg: Śmiertelność 100% okazywały zapalenie śródśierdza, zapalenie jelit mieszkowe (*enteritis follicularis*), niedrożność jelit, zapalenie otrzewny, rak trzustki, rak gruczołów zaotrzewnowych, kamyk nerkowy, rak pęcherza moczowego, sprawy położowe, zapalenie opon mózgowych, puchlina mózgowa i ropnica; śmiertelności między 75% a 50% rak wątroby, rak żołądka, zwyrodnienie serca, i choroba Brighta przewłoczna; między 50% a 40% niedomykalność zastawki dwukończystej, kamyk pęcherzowy, udar mózgowy, próchnie-

nie kręgów, gnilec i gruźlica płucowa; między 40% a 30% otrucia ostre, choroba Brighta ostra i rozedma płucowa; między 30% a 20% czerwonka, ospa, zapalenie płuc, rak macicy, i padaczka; między 20% a 10% płonica, zapalenie opłucny, nieżyt jelitowy, uwiąd starczy i dur brzuszny; między 10% a 5% zapalenie omaciczne, nieżyt oskrzelowy, zakażenie wyskokowe i gościec stawowy; nakoniec róża z śmiertelnością 2·5% i zakażenie zimnicze z śmiertelnością 1%.

Tak w tych, jak i we wszystkich innych wykazach poprawiałem rozpoznania za życia wynikami badań pośmiertnych.

### Wiek chorych

może wydały się na pozór rzeczą obojętną, mającą co najwięcej wartość ściśle statystyczną; jednakowoż objaśnia on wyniki leczenia i stosunki śmiertelności, dla tego przyłączam go w następującem zestawieniu:

do lat 10 . . . .	przyjęto	42 m.	27 k.	= 69,
od lat 10 — 20	"	117 "	90 "	= 207,
20 — 30	"	154 "	219 "	= 373,
30 — 40	"	154 "	156 "	= 310,
40 — 50	"	126 "	126 "	= 252,
50 — 60	"	121 "	114 "	= 235,
60 — 70	"	57 "	73 "	= 130,
70 — 80	"	34 "	42 "	= 76,
80 — 90	"	7 "	12 "	= 19,
90 — 100	"	1 "	2 "	= 03.
				813 m. 861 k. = 1674.

Widzimy ztąd, że największa liczba mężczyzn zgłaszających się do oddziału była między 20 — 40, kobiet zaś między 20 — 30tym rokiem życia: tak, że, nie odróżniając płci, w wieku od 20 — 30 r. mieliśmy największą liczbę chorych. Podobne stosunki co do wieku były też w r. 1871, z tą tylko różnicą, że największość przypadków ogółowo na lata od 20—40.

Wszystkie dzieci niżej lat 10 okazywały osutki ostre, a przeważnie ospę, i z tego powodu pielęgnowane były w oddziale chorób wewnętrznych: gdyż dla reszty dzieci istnieje w szpitalu św. Łazarza osobny oddział, zwany kliniką dzieci, który zostaje pod kierownictwem Prof. Dra Madurowicza.

Starców od 60—100 r. ż. przyjęto w r. 1872gim 228 (99 m. i 129 k.), co stanowi 13·6% ogólnej liczby przyjętych chorych, podczas gdy w r. 1871. przyjęto chorych w tym wieku 225 (104 m. i 121 k.), co stanowi 16%.

Porównyując wiek zmarłych z wiekiem leczonych, otrzymamy następującą tablicę:

	Leczono chorych	Z tych umarło	Co stanowi %
niżej 10 lat	43 m. 27 k. = 70;	26 m. 10 k. = 36.	— 51·4%.
10 — 20 "	119 m. 91 k. = 210;	16 m. 7 k. = 23.	— 10·9%.
20 — 30 "	163 m. 227 k. = 390;	17 m. 28 k. = 45.	— 11·5%.
30 — 40 "	162 m. 166 k. = 328;	29 m. 27 k. = 56.	— 17·1%.
40 — 50 "	141 m. 140 k. = 281;	30 m. 29 k. = 59.	— 20·9%.
50 — 60 "	127 m. 119 k. = 246;	24 m. 19 k. = 53.	— 21·5%.
60 — 70 "	62 m. 77 k. = 139;	13 m. 21 k. = 34.	— 24·4%.
70 — 80 "	36 m. 45 k. = 81;	4 m. 9 k. = 13.	— 16·0%.
80 — 90 "	8 m. 15 k. = 23;	3 m. 7 k. = 10.	— 43·4%.
90 — 100 "	01 m. 03 k. = 04;		0%.

Z niej okazuje się, że, biorąc bezwzględnie, najwięcej zmarłych znajdujemy między 30—40 r. ż., najmniej zaś między 90 — 100 r. ż.: bo też ilość chorych

w tym wieku była w pierwszym razie największą, w drugim najmniejszą. Jednakowoż odnośnie do liczby chorych, w pewnym wieku będących, największą śmiertelność okazują dzieci niżej lat 10 wyłącznie z osutkami ostremi i starcy między 80 — 90 rokiem życia, najmniejszą zaś chorzy między 20 — 40 rokiem życia. Podobne stosunki były także w r. 1871.

#### Trwanie leczenia.

Ilość dni, jaką chorzy pozostawali w oddziale chorób wewnętrznych w roku 1872, czyli ilość tak zwanych „dni szpitalnych“ wynosi 35,495, z czego przypada 16,684 dni na mężczyzn, a 18,811 dni na kobiety. W przecięciu przebywał więc każdy chory w szpitalu dni 20·03, a mianowicie każdy mężczyzna dni 19·35, każda kobieta dni 20·67.

Doświadczenie z ostatnich lat 9 okazuje, że średnie trwanie leczenia waha się między 18·4 a 21·7 dniami, i że kobiety z małymi wyjątkami przebywają dłużej w szpitalu, aniżeli mężczyźni, co stwierdza się także w roku 1872.

Ponieważ oddział posiada 105 łóżek: przeto w przecięciu było na oddziale dziennie 96 chorych, a łóżko każde zajęte było w ciągu roku przez 338 dni. Średnie trwanie pobytu w szpitalu zmniejszy się dopiero wtedy, skoro istnieć będzie osobny dom dla ozdrowieńców i chorych nieulecznych.

#### Ruch chorych miesięczny,

ze względu na liczbę chorych, którzy przybyli, szpital opuścili, lub zmarli, zachowuje się jak następuje:

##### LICZBA CHORYCH.

	Przybyło.	Opuściło szpital.	Umarło.
W Stycz.	57 m. 62 k.=119;	43 m. 44 k.= 87	11 m. 17 k.= 28.
W Lutym	59 m. 70 k.=129;	46 m. 43 k.= 89	11 m. 16 k.= 27.
W Marcu	63 m. 68 k.=131;	50 m. 54 k.=104	21 m. 16 k.= 37.
W Kwiet.	64 m. 68 k.=132;	53 m. 66 k.=119	11 m. 10 k.= 21.
W Maju	67 m. 68 k.=130;	64 m. 60 k.=124	12 m. 10 k.= 22.
W Czerw.	60 m. 73 k.=138;	45 m. 60 k.=105	17 m. 15 k.= 32
W Lipcu	74 m. 87 k.=161;	55 m. 75 k.=130	17 m. 13 k.= 30.
W Sierpn.	76 m. 78 k.=154;	70 m. 73 k.=143	13 m. 12 k.= 25.
W Wrześ.	85 m. 84 k.=169;	62 m. 59 k.=121	6 m. 16 k.= 22.
W Paźdz.	62 m. 77 k.=139;	57 m. 72 k.=129	15 m. 14 k.= 29.
W Listop.	73 m. 60 k.=133;	45 m. 43 k.= 88	13 m. 11 k.= 24.
W Grudn.	73 m. 56 k.=139;	55 m. 48 k.=103	15 m. 17 k.= 32.

Ztąd okazuje się, że chorzy zgłaszali się do szpitala najliczniej w Lipcu, Sierpniu i Wrześniu, najmniej zaś chorych zgłosiło się w Styczniu. W roku 1871ym stosunek ten był całkiem przewrotny: gdyż ruch chorych był największy w miesiącach Październiku, Grudniu i Styczniu; najmniejszy zaś w Lutym i Sierpniu. Okoliczność tę wytłomaczyć można w części lekką zimą roku 1872go, a w części ospą, która panowała namiętnie przeważnie w miesiącach letnich. W każdym razie ruch chorych w oddziale nie może być wcale dokładną miarą ogólnej choroblivości: gdyż przyjmowanie chorych zależy głównie od miejsca, jak to już powyżej wspominałem.

Najwięcej chorych opuściło szpital w miesiącu Sierpniu; zmarło najwięcej chorych w Marcu, najmniej w Kwietniu, Maju i Wrześniu.

#### Ruch chorych dzienny.

Dla okazania, jak znaczny był przyrządek chorych do oddziału, zestawiam największy, najmniejszy i średni stan dzienny w pojedynczych miesiącach.

	było chorych dziennie najwięcej	najmniej	średnio
W Styczniu.	116,	94,	105.
W Lutym . . .	116,	96,	106.
W Marcu . . .	128,	105,	119.
W Kwietniu . . .	128,	98,	110.
W Maju . . .	106,	78,	90.
W Czerwcu . . .	91,	66,	78.
W Lipcu . . .	98,	76,	87.
W Sierpniu . . .	98,	74,	84.
W Wrześniu . . .	101,	70,	89.
W Październiku . . .	103,	80,	94.
W Listopadzie . . .	102,	81,	92.
W Grudniu . . .	115,	99,	105.

Liczba dzienna chorych była więc przez 5 miesięcy większa od liczby łóżek, tak, że chorych na sieniach miesiące musiano; w kilku z pozostałych miesięcy zdarzały się także dni, gdy stan chorych dzienny równał się liczbie łóżek, lubo zawsze starano się usuwać jak najrychlej ozdrowieńców, którzy tylko mieli jakie takie umieszczenie w domu.

#### Pogląd na choroby panujące w pojedynczych miesiącach.

W Grudniu 1871 roku główną chorobą panującą było zapalenie płuc, które dosięgło liczby 17 przypadków; obok niego wszystkie choroby znajdowały się w nader małej liczbie przypadków, jedna tylko zimnica i odra występowały nieco częściej. Zato zgłaszali się częściej, niż w poprzednich 4ch miesiącach, chorzy z gruźlicą płucową. W ogóle liczba chorób zakaźnych była bardzo mała.

W Styczniu r. 1872 przeważały choroby narządu oddechowego, liczba zapaleń płuc dochodziła zawsze jeszcze do znacznej wysokości, nieżyty oskrzelowe były dosyć częste, a chorzy z rozedną płucową zgłaszali się znacznie częściej, aniżeli w późniejszych miesiącach. Chorych z gruźlicą było jeszcze mało. Choroby zakaźne pojawiały się tylko w odosobnionych przypadkach, tak samo jak w poprzednim miesiącu, tylko ospa w postaci złagodzonej dostarczyła pierwszych 4 przypadków.

W Lutym, pośród trwającego usposobienia do chorób narządu oddechowego, i utrzymującego się na równej wysokości zapalenia płuc, częściej zgłaszali się chorzy z gruźlicą płucową i nieżytem oskrzelowym. Cierpienia gościcowe były częstsze, aniżeli w zeszłym miesiącu, a liczba przypadków ospy podwoiła się.

W Marcu zmienił się nieco obraz choroby: zapaleń płuc i nieżyty oskrzelowych było mniej, (tylko chorzy gruźlicy szukali najczęściej ze wszystkich miesięcy schronienia w szpitalu); pierwsze miejsce zaczęła zajmować ospa; dur, ograniczający się w Lutym do 1 przypadku, podniósł się nagle do 8 przypadków; z nim pojawiło się kilka przypadków błonicy, podczas gdy róża i zimnica trzymały się ciągle niżej granic średniej częstości; nieżyty przewodu pokarmowego stały się tylko nieco częstszymi.

Prawie ten sam obraz przedstawia miesiąc Wrzesień, z tą tylko różnicą, że błonicy wcale nie napotkano, a liczba zimnic nieco się zwiększyła. Ospą, lubo

w. równiej liczbie przypadków, miała jednak przebieg złośliwszy.

W Maju podwoiła się prawie liczba ospy i zimnicy, nieżyty przewodu pokarmowego utrzymywały się ciągle w równiej mierze, gościów prawie nie było, a dur brzuszny, zapalenia płuc tudzież nieżyty oskrzelowe zmniejszyły się znakomicie.

W Czerwcu, pośród zwiększającej się ciągle liczby zimnic, ospa dosięgła szczytu częstotliwości (38<sup>8</sup>m przyp.) i zabierała liczne ofiary, lubo jeszcze nie tak była sroga, jak w m. Lipcu. Z chorób narządu oddechowego zapalenie płuc wzmogło się chwilowo do wysokości dosyć znacznej, a razem z niem zwiększyła się nieco liczba przypadków róży i duru.

W Lipcu ospa utrzymująca się prawie na równi z poprzednim miesiącem, jednak daleko złośliwsza, i zimnica stanowiły tło chorobowe, na którym odznaczały tylko nieco częściej dur brzuszny, róża i cierpienia żołądkowe, podczas gdy liczba zapaleń płuc znów zmalała, a nieżyty oskrzelowe prawie się nie zdarzały.

W Sierpniu wzrastająca ciągle zimnica zajęła pierwsze miejsce zamiast ospy, która w tym miesiącu zaczęła się zmniejszać; lubo zawsze stanowiła jeszcze  $\frac{1}{6}$  część wszystkich przypadków chorobowych. Obok zimnicy uwydatniały obraz chorobowości częstsze przypadki róży i duru, który jednakże przez cały rok w żadnym miesiącu nie wychylił się po za granicę średniej częstotliwości, i ostrego nieżyty żołądka i jelit. Czerwonki, która w ogóle przez cały rok pojawiła się 8 razy, przybyły 3 przypadki.

W miesiącu Wrześniu zimnica doszła do szczytu częstotliwości, stanowiąc w liczbie 52 przypadków  $\frac{1}{3}$  część wszystkich przyp. chorobowych; zato ospa zmalała z 24 do 9 przypadków, dur, róża i zapalenie płuc utrzymywały się w równiej mierze, czerwonki nie było wcale, a nieżyty przewodu pokarmowego o połowę się zmniejszyły. — Z powodu znacznego napływu zimnicy liczba chorych przyjętych w tym miesiącu była największa z całego roku.

W Październiku malejąca znów co do liczby zimnica stanowiła zawsze jeszcze prawie  $\frac{1}{4}$  część przypadków przyjętych, róża w ilości 9 przypad. dosięgła szczytu częstotliwości, zapalenia płuc i dur utrzymywały się w niezmienniej ilości, a liczba ospy, która we Wrześniu była znacznie mniejszą, aniżeli w poprzednich 5 miesiącach, zaczęła znów nieco się zwiększać. Chorzy z gruźlicą płucową byli znów z nadechodzącą jesienią nieco częściej przedmiotem leczenia.

W Listopadzie zmalała liczba zimnic i róż, a reszta chorób utrzymywała się niezmiennie, tylko goście stawowe były częstsze, niż poprzednio.

W Grudniu zatarła się w części cecha zakaźna: gdyż ospa nie czyniła większych postępów, zimnica okazała się tylko w 19tu przypadkach, dur w 2ch przyp., róży prawie nie było; — zato zapalenia płuc dosięgły nagle szczytu częstotliwości w tym roku, a niemniej często zdarzały się nieżyty oskrzelów.

Pomijając ospę, której w roku 1871 prawie nie było, widzimy, że powiększenie liczby chorych przyjętych w roku 1872 o 345 przypisać głównie należy ospie, zimnicy, durowi i róży; z czego wynika, że rok 1872 nosił na sobie cechę bardziej zakaźną, aniżeli rok 1871. W narządzie jednak oddechowym zwiększyła się liczba chorób ostrych na korzyść przewłocznych,

których ilość względnie do r. 1871 o  $\frac{1}{3}$  część zmalała. Nieżyty ostre żołądka i jelit, niemniej choroby nerek nie wykazują znaczniejszej różnicy co do częstotliwości, zato obłąd opilczy i zakażenie wyskokowe powiększyły się w r. 1872 do podwójnej ilości, jako najlepsze odzwierciedlenie naszych stosunków społecznych.

### Część szczegółowa.

Na wstępie muszę oświadczyć, że w sprawozdaniu tem uwzględniałem przeważnie część statystyczną i ajtyologiczną: podając przy wielu chorobach stosunki wieku i zatrudnienia, gdzie niegdzie tylko starałem się dorzucić nieco uwag ogólnych, lub przytoczyć w jaknajwiększym streszczeniu przebieg choroby lub przynajmniej najważniejsze objawy takowej i wynik badania pośmiertnego. Nie zaciekałem się bynajmniej w granice naukowości: nie dlatego, bym był przekonania, że ściślejsze naukowe dochodzenie rzeczy mija się z celem szpitala, lub leży po za granicami możności u lekarza szpitalnego; lecz wyłączenie tylko z powodu, że oddział mój dotychczas nie rozporządza w znacznej części środkami niezbędnymi do poszukiwań naukowych; a dla kilku ciekawych historii chorób i opisu kilku bardziej zajmujących przypadków sprawozdanie szpitalne zanadto ograniczone przedstawia miejsce. Wiele niedostatków i braków już usunięto, największy t. j. brak prosektora i chemika patologicznego wkrótce ustanie\*), z czasem można będzie zapewne dorzucić jakie ziarno naukowe zebrane z dosyć licznych materiałów szpitalnego. Po takiem zastrzeżeniu, które osobliwie jest stosownem, jeżeli ogłaszanie sprawozdań szpitalnych nie stało się ogólnym zwyczajem, przystępuję do chorób pojedynczych narządów, które ułożyłem, po największej części podług podziału przeprowadzonego w podręczniku Niemeyera, w 15 oddziałów.

## I.

### Choroby narządu oddechowego

stanowiły dokładnie  $\frac{1}{4}$  część wszystkich przypadków chorobowych; leczono bowiem 443 chorych (244 m. 199 kob.). Z tych 116 (63 m. 53 kob.) wyszło uleczonych; 10 (4 m. 6 kob.) nieuleczonych, gdyż po kilkudniowym pobycie opuścili szpital na własne żądanie; 6 (5 m. 1 kob.) przeniesiono do kliniki lub innych oddziałów; umarło 133 (65 m. 68 k.); pozostało więc w dalszém leczeniu chorych 32 (22 m. 10 k.). Nie licząc wcale ani do przybytku, ani do ubytku, 6 chorych przeniesionych i 12 (7 m. 5 kob.), którzy przybyli w chwili konania, procent śmiertelności znajdziemy = 28.2%.

### Choroby krtani i tchawicy.

1. Nieżyt krtani ostry (*Laryngitis catarrhalis acuta*) uważano u dwóch kobiet lat 25 i 36 leżących. W jednym przypadku był równocześnie nieżyt gardła (*angina catarrhalis*), który był przyczyną, że chora tylko z trudnością dała się zbadać wziernikiem krtaniowym: gdyż natychmiast powstawały odruchowe kureze łuków podniebieniowych i połyku. W drugim

\*) Od Czerwca 1873. szpital poszczycić się może prosekto-rem w osobie Prof. Dra Biesiadeckiego, a chemikiem patologicznym w osobie Prof. Dra Stopczańskiego. (p. a.).

przypadku towarzyszyła chorobie cięża zresztą zupełnie prawidłowa. W obu podawano przeziębienie za przyczynę choroby.

Średnie trwanie leczenia wynosiło dni 11.5.

2. Nieżyt krtani i tchawicy (*Laryngotracheitis catarrh.*) napotymano u 6 chorych, z których 3 było mężczyzn (1 wyrobnik, 1 buchalter przejezdny, 1 bez zajęcia) i 3 kobiety (1 służąca, 1 wyrobnicza, 1 włóczęga); — co do wieku 4 było między 20 — 30 r. życia, 1 miał lat 45, a 1 lat 65.

Jako powikłania i choroby towarzyszące wystąpiły: raz porażenie połowicze po stronie prawej trwające od lat 6ciu, raz zaparcie stolca uporczywe, raz wrzody żylakowe na odnogach dolnych, raz bicie serca, przy którym nie można było wysledzić jakiegokolwiek przedmiotowego zбочenia w układzie naczyniowym.

Średnie trwanie leczenia wynosiło dni 11, i we wszystkich przypadkach odniosło skutek pożądany. Leczenie miejscowe polegało prawie we wszystkich przypadkach na wdmuchywaniu do krtani hałunu z morfiną (*Alum. crudi* dr. 1, *Mur. morphii* gr. 3.) za pomocą rurki szklanej, stosownie zgiętej, przy pomocy wzienika krtaniowego; zewnętrznie stosowano często gorczyzniki (*sinapismata*) na mostek, a wewnętrznie podawano środki alkaliczne bądźto czyste lub w połączeniu z morfiną, jeżeli trzeba było uśmierzać częste drażnienie do kaszlu. W jednym przypadku musiano użyć zadawek morfiny nieco znaczniejszych (3 razy dziennie po  $\frac{1}{6}$  gr.): gdyż przy każdym napadzie kaszlu nastawały wymioty, zanim chora wykrztusić mogła małą bryłkę śluzu szarawego.

3. Zapalenie ochrzęstny krtaniowej kiłowe (*perichondritis laryngis syphilitica*) było dwa razy przedmiotem leczenia.

W. F., lat 38 liczący, st. woln., ofycalista prywatny, przyjęty dnia 24 Maja 1872, okazywać miał w młodości przypadki żołądów. W roku 1857 dostał wiewiora (trypra), który ustąpił po kilkotygodniowym wstrzykiwaniu środków ściągających. W roku 1861 spostrzegł chory obrzmienie gruczołów pachwinowych po stronie prawej; nie przypisywał jednakże temu zjawisku żadnego znaczenia, a to tem bardziej, że na częściach płciowych nie dostrzegł żadnej zmiany, a obrzmienie gruczołów nie sprawiło mu żadnych dolegliwości. W rok później pojawiły się bole w obu odnogach dolnych, które pogarszały się przy zmianie powietrza, a ustępowały czasami na dni kilka lub kilkanaście, jeżeli chory zachowywał się spokojnie i nie narażał się na wpływ zmiennego powietrza. W lecie roku 1862 bole te usadowiły się stale w głębi uda prawego, całe udo obrzmiało mocno, skóra nad niem zaczerwieniła się, chory gorączkował, spadł z ciała, stracił apetyt, a po 6 tygodniach utworzył się w górnej części powierzchni zewnętrznej tegoż uda spory ropień, który przecięto. Z razu wydzielanie ropy było obfite, później sączyła się ropa wodnista; jednakowoż otwór nie chciał się goić, mimo używania rozmaitych środków zewnętrznych i wewnętrznych, między którymi główną odgrywał rolę tran (*Oleum jec. Aselli*), który podawano wytrwale, sądząc że zmiana chorobowa na udzie jest przyrody żołądowej, i zagoił się dopiero po 7 latach. W roku 1870 przebył chory zapalenie płuca prawego, a w wyzdrowinach po takowym powstał w okolicy podpachowej prawej bardzo znaczny ropień, który otworzył się dobrowolnie i zagoił się dopiero po półrocznym trwaniu. Podobne, lubo

nico mniejsze ropnie wrzodziejące tworzyły się na rękoności mostka i w okolicy łopatkowej lewej; mimo to chory czuł się zupełnie dobrze, a odżywienie jego było lepsze, niż kiedykolwiek. — Obecna choroba počęła na wiosnę r. 1871 bolem gardła i utrudnieniem połykania, które polepszyło się chwilowo po przystawieniu kilkunastu pijawek, pogorszyło się jednakże wkrótce; do tego dołączyły się kaszel i chrypka, która w Styczniu 1872 r. przeszła w zupełny bezgłos. Oddychanie chorego stawało się również coraz cięższem, a połykanie tak utrudnionem, że chory mógł się w ostatnich czasach żywić tylko pokarmami płynnymi, które połykał z wielką trudnością.

Przy badaniu dostrzeżono: Budowa silna, odżywienie liche; na zewnętrznej powierzchni uda prawego, jako też w okolicy podpachowej prawej blizny wielkości sporęj dłoni, nieregularnego kształtu, gwiazdkowato w licznych miejscach powiągane, w niektórych miejscach nad powierzchnią wyniosłe; blizny takiego samego wejrzenia, o połowę mniejsze, kształtu więcej okrągłego znajdują się w środku rękoności mostka i w okolicy łopatkowej lewej. Oddech chorego bardzo mozolny odbywa się przy współdziałaniu wszystkich prawie mięśni posiłkowych i pośród zapadania się dołków nadobojczykowych, dołka nadmostkowego i przestworów międzyżebrowych; osobliwie utrudniony jest wdech, który z tego powodu jest dłuższy i szleszczący. Twarz i język sinawe, żyły podskórne na rękach i nogach krwią nabiegłe. Cała okolica krtani obrzmiała jednostajnie, krtani z tego powodu kształtu wałeczkwatego, pojedynczych chrząstek przez obmacanie odróżnić nie można; cała okolica krtani jest twarda, przy ucisku bolesna, skóra nad obrzmieniem przesuwana się bardzo mało, chełbotania nigdzie wysledzić nie można. Chory z trudnością może połykać zaledwo bardzo małe ilości płynów, przyczem doznaje nieznośnego bólu w krtani i połyku. Z powodu zupełnego bezgłosu porozumiewa się na piśmie lub na migi, z powodu duszności zajmuje ciągle położenie siedzące. Podniebienie miękkie i tylna ściana połyku nie okazują zбочenia; badając palcem, napotyka się górną powierzchnię krtani prawidłową, tylko okolica chrząstek nalewkowych jest zgrubiała; w przesmyku gardła (*Isthmus pharyngis*) zaś palec napotyka ściśnienie twarde, obrączkowate, osobliwie w części przodkowej, przez które przeprowadzić można zgłębnik gardzielowy tylko mierniej grubości (N. 16 skali ang.). Badanie wzienikiem krtaniowym wykazuje, że głośnia przedstawia się tylko jako wązka szczelina, która tylko nieznacznie rozszerza się przy wdechu lub usiłowanem wydawaniu głosu. Chrząstki nalewkowe mocno obrzmiałe nie poruszają się prawie wcale, również obrzmiałe i zaczerwienione są więzadła nakrywkowo - nalewkowe (*ligg. ary-epigl.*) i więzadła głosowe wrzokome. Z więzadeł prawdziwych z powodu obrzmienia tego widać tylko skrawki wewnętrzne; na lewem wysledzić można w samej połowie wrzód o brzegach nierównych, dnie brodawkowatę, a wielkości jego nie można oznaczyć, gdyż tylko część wrzodu leży w polu widzenia. Z wyjątkiem głębszego ustawienia przepony i następowego obniżenia serca i wątroby nie można w żadnym z narządów wewnętrznych wykazać nieprawidłowego. Tętno 90, ciepłota niepodniesiona, moc bez białka.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

## Przepuklina przeponowa (hernia diaphragmatica).

Opisał Dr Marcell Wojda.

(Dokończenie — Zob. Nr. 31).

W jaki sposób powstał krwotok żołądka i zmiany chorobowe dalsze w innych narządziach tak jamy brzusznej, jak piersiowej: to, sądzę, nie trudno będzie objaśnić, uwzględnivszy prawidłowe stosunki anatomiczno-fizyologiczne.

Jak to w początku nadmieniałem, w chwili odebranego pełnienia żołądek (podobnie jak jelita) był napełniony, a zatem tak leżał, że zagięcie jego mniejsze obrócone było ku tyłowi, większe ku przodowi, ściana tylna ku dołowi a ściana przodkowa ku górze pod przeponą: wskutek takiego położenia żołądka także siatka większa z okieżnicą poprzeczną podchodzi nieco ku górze.

Narzędzie ostre, przedziurawiając przeponę, dosięgło ją w chwili wydechu, w którym takowa, uniosłszy się do góry, oddaliła się od żołądka, przez co tenże, wskutek niedostatecznej długości narzędzia, nie został skaleczonym. (Ta sama okoliczność uchroniła i płuco od zranienia). Przy następującym wdechu wypełniony żołądek i okieżnica poprzeczna (*colon transv.*) pomimo tłoczni brzusznej (*Bauchpresse*) nie mogły się precisnąć do jamy opłucnej przez otwór przepony stosunkowo mały, lecz ruchoma i sprężysta siatka większa daleko łatwiej. Raz wcisnięta do jamy opłucnej, siatka większa przyrosła do rany ściany klatki, przez co została wyprężoną i uwięzła w otworze przepukliny. Naczynia krwionośne siatki, tak tętnice, jak żyły, jako będące w związku bezpośrednim z naczyniami żołądka, a mianowicie na jego zagięciu większym (*curvatura major*), podlegając uciskowi w połączeniu z uciskiem naczyń zagięcia większego, naczyn wątroby i innych narządzi zespalających się naczyniami z pierwszymi, wynikających z wyparcia tychże narządzi ze swego miejsca, musiały wywołać w danej chwili silne przekrwienie zastoinowe (*Stauungshyperaemie*) żołądka, wątroby i innych narządzi. Ta dana chwila a raczej przyczyną wywołującą był rodzaj zatrudnienia i sposób życia Kaspra Pichlera. Dopóki tenże wystrzegał się wszelkich wybryków, jego narzędzia trawienia pomimo nieprawidłowego stanu (który wreszcie u wielu ludzi z innych przyczyn często się wydarza, jak np. w katarze żołądka, dwunastnicy, kanałów żółciowych itp.) odbywały swą czynność fizyologiczną.

W podróży ostatniej, odbytej na tratwie, Kasper Pichler, stojąc po kilkanaście godzin u steru, wykonywał ruchy ciała gwałtowne znane każdemu, wyginając się mianowicie w tył tułowiem, przyczem wskutek gwałtownych oddechów i tłoczni brzusznej była nader silna. Przy tych gwałtownych ruchach w tył, siatka większa, przyrosnięta do wewnętrznej ściany klatki, musiała uleść targaniu rozciągającemu się stopniowo na żołądek i na inne narządzi, które wskutek tego targania wcisnięte zostały pod przeponę, a naczynia ich uciskane musiały wywołać przekrwienie; prawdopodobną jest rzeczą, że już wówczas próżny żołądek częściowo uwiązał w przepuklinie, przez co przekrwienie tém bardziej się powiększyło. Jeżeli do tego uwzględnimy błąd dyetetyczny, który sam przez się zdolny już był wywołać wymioty, pociągające za sobą pęknięcie naczyń krwią przepelnionych i wyprężonych: natenczas wytfomaczymy sobie, że jeden uapad

wymiotów, stając się powodem następnego, powiększał krwotok, aż nakoniec wskutek wysilnej tłoczni brzusznej żołądek został wepehnięty w jamę klatki piersiowej, wywołując w narządziach tejże znane już zmiany. Taż sama przyczyna mechaniczna, utrudniając, a raczej tamując obieg krwi w organach brzusznych, wywołała przekrwienie, którego ślady okazały się w zwłokach. Znalezione zmiany w klatee piersiowej tłomaczy dostatecznie ucisk lewego płuca i przesunięcie serca.

Prof. Adolf Bardeleben. (Tom 3ci str. 922) opisuje następujących kilka przypadków przepukliny przeponowej.

I. Pewien mężczyzna cierpiął od najmłodszych lat na kureze żołądka, nudności, wymioty bolesne, ciężki oddech z napadami zaduszenia. Wszystkie te cierpienia powtarzały się tylko od czasu do czasu, lecz nigdy wówczas, kiedy żołądek jego był pełnym. Umarł na jakąś inną chorobę. W lewej jamie opłucnej znaleziono zupełnie niepokryte części okieżnicy (*colon*), sieć większą i dno żołądka. Te wnętrzości nie były ani pomiędzy sobą, ani z sąsiednimi zrosnięte. Otwór przepukliny znajdował się na lewej połowie środka ścięgnistego (*Centrum tendineum*), miał gładkie brzegi i był 55 millim. długi, 25 millim. szeroki. —

II. Norris (*Gaz. méd.* 1837. pag. 705) uważał przepuklinę przepony bez worka przepuklinowego, na którą chory umarł. Przepuklina ta była bardzo duża i utworzona przez duży zwój kiszki, całą sieć większą i przez trzustkę (*pancreas*). Otwór w przeponie wynosił więcej niż cal, jelita były przyrosnięte do obwodu tegoż, serce wypchnięte na prawo, gdzie jego bicie łatwo się czuć dawało. Lewe płuco zostało uciśnięte do objętości pięści. Chory dożył do 19 lat, od małego chłopca cierpiął na właściwe w podobnych razach przypadki.

III. Petit, opisując przypadek, w którym worek przepuklinowy składał się z bardzo ścięćczącej części przepony. Chory przez długi czas cierpiął na dychwicę, wypełnianie żołądka sprawiało mu ulgę. Umarł na zapalenie brzuszne. W zwłokach znaleziono w lewej jamie opłucnej obrzmienie przepuklinowe mające około 4 cali wysokości. Trzewa w worku przepuklinowym były zlepione między sobą i z powierzchnią otrzewnową worka świeżemi zrostami, jak również lewe płuco z powierzchnią sąsiednią opłucny.

IV. Robotnik wskutek przewrócenia się uległ złamaniu żebra w prawej stronie, w jego środkowej części. Dostał zaraz ciężkiego oddechu i gwałtownych bólów w prawej stronie opłucny. Odgłos wypukowy był w dolnej części, ku górze postępując, coraz bardziej przytępiony, w górnej zaś połowie bębenkowy. Zamiast szmerów oddechowych znaleziono po pewnym przeciągu czasu na tej stronie odgłos dzbanowy i brzęk metaliczny. Na zasadzie tego rozpoznano odmę i otok piersiowy (*pneumo-hydrothorax*). Śmierć nastąpiła w dni 14 śród objawów duszenia, bez żadnego przypadku, z któregooby można było wnosić o istocie cierpienia trzew brzusznych. W zwłokach nie znaleziono weale wysięku w jamie opłucny. W lewej stronie klatki przepona wypuklona w górę aż do 5 żebra, prawa strona na pierwszy rzut oka zdawała się być co najmniej przez połowę jelit grubych wypełnioną. Po usunięciu jelit, które aż pod kość obojętkową się rozciągały, okazało się płuco aż do objętości pięści ku stosowi pacierzowemu ściśnięte, przez kilka zlepów ku górze przytwierdzone. W przeponie znajdowała się

szczelina, przez którą trzewa brzuszne wystąpiły, około 20tu ctm. długa w kierunku od prawej strony i tyłu ku lewej i ku przodowi; takowa od trzew, które wystąpiły, przybrała postać okrągłą i została rozszerzoną. — Oprócz nadmienionych jelit grubych cały prawy zraz wątroby został również wcisniętym do jamy opłucnej: Przesunięte wnętrzości nie miały nigdzie powłoki; nie były także przez przyczepiny z opłucną ani też z przeponą po zrastane. (*Journ. de med. de Lyon 1844, Juillet*).

V. Dziewieczyna w drugim roku życia otrzymała między 8 i 9 żebrem lewej strony ranę kłóty. Uskarżała się od małego dziecka na bole w lewym boku, połączone częstokroć z nudnościami i wymiotami, przeciwko którymto cierpieniem używała środków przeciwzapalnych i przeczyszczających, zwykle z przedkim skutkiem. Będąc już dorosłą, umarła śród najgwałtowniejszych objawów zapalenia jelit w drugim dniu choroby.

W zwłokach znaleziono części okrężnicy poprzecznej i siatki większej tkwiącą w otworze przepony szerokim na trzy palce. Rana przez pchnięcie otrzymana pozostawiła otwór między 8 i 9 żebrem, który tylko zewnętrznie przez bliznę był zamkniętym. (*Bujalski, w med. Zeitung Russlands, 1852, Nr. 26*).

Dr Dreifuss w rozprawie napisanej pod przewodnictwem Dra Autenrietha zestawił 55 przypadków przepukliny przeponowej, między temi 37 razy był żołądek sam lub też razem z innymi trzewami brzuszniemi przesunięty. — Bohm (1859 *Königsberger med. Jahrbücher*, II) zebrał 80 przypadków tegoż cierpienia: z tych w 14tu był worek przepuklinowy. Wreszcie Lesser uważał przepuklinę przeponową powikłaną z przedziurawieniem żołądka, która śród objawów podobnych do cholery zakończyła się szybką śmiercią. (*Rust. Magazin*, t. 57. str. 75. — Porównaj także: Hager, *Brüche und Vorfälle*, Wien 1850, str. 15—29).

## PRZEGLĄD LITERATURY ZAGRANICZNEJ.

### Chirurgia.

Quincke. Leczenie operacyjne zapalenia opłucny <sup>1)</sup>.

\*) Autor oznacza bliżej wskazania do rękoczy-nów z powodu wysięków w opłucnie na zasadzie 15 przypadków z kliniki Frerichsa. Co do wysięków surowicznych, jeżeli takowe grożą niebezpieczeństwem dla życia, albo ich wessanie się zwleka, aut. zaleca nakłócić z wysysaniem. W tym celu trójgrannie probierczy z kurkiem wbija się w linię pachowej 7—9 odstepu międzyżebrowego, po czym szczelną strzykawką szklaną wydobywa się wysięk. Jestto sposób, którego od lat przeszło 20 używają Bowditch (czyt. Baudiez) w Bostonie i inni lekarze amerykańscy. Gdy jednak Bowditch używa tego sposobu i w wysiękach ropiastych, Q. w tych ostatnich zaleca jak można najwcześniejsze nacięcie, i to według Rosera w 5tym przestworze międzyżebrowym nieco na zewnątrz od linii sutkowej. Dokładne wypłókiwania jamy opłucny, ważne w leczeniu następowém, uskutecznia aut. nowym stosownym sposobem, pole-

gającym głównie na tem, że do tej jamy naprzemiany pompuje się powietrze i płyn. Cewnik (catheter) o dwóch rurkach wprowadza się aż do najgłębszego punktu jamy opłucny i utwierdza szczelnie w ranie. Otwory zewnętrzne tegoż połączone są z cewkami gumowemi, z których jedna wisi wolna, druga zaś przechodzi w rurkę szklaną umocowaną szczelnie w korku zatykającym flaszkę próżną. Do tejże flaszki przechodzi druga dłuższa rurka szklana połączona z napełnionym nawadniaczem (Irrigator). Otóż gdy z tego ostatniego napłynie ciecz do flaszki, część powietrza w niej zawartego zostaje wtłoczoną do jamy opłucny i wstępuje nad wysięk; prężenie tego powietrza wypiera ropę do drugiego ramienia cewnika, skąd wypływa z wolnej cewki gumowej do miski podstawionej. Kiedy następnie przewrócimy flaszkę i wyciągniemy cewnik niemal aż do końca: woda napływa do jamy opłucny i rozcieńcza wysięk, dopóki płyn nie dosięgnie poziomu końca cewki. Kilka razy powtórzywszy kolejno te dwa działania, można ropę wypłókać całkowicie.

Dr Espague: Podwiązanie napletka, przeciw moczeniu mimowolnemu (incontinentia urinae) <sup>1)</sup>.

Moczociek, — nazwany istotnym lub idyopatycznym, — spowodował Dra Espagne do zastosowania podwiązania napletka. Wieczorem przed udaniem się na spoczynek chory sprowadza napletek na przód żołądki i podwiązuje go prostym nicianym paskiem nazwanym chevillière. Umiarkowany ucisk sprawiony opaską o powierzchni dość szerokiej w stosunku do organu, jaki otacza, nie wywołuje ani bólu, ani też kurczów.

Ten sposób podwiązania napletka jest wcale wystarczającym. — Jednak autor używa jeszcze małej pętli ściskającej skórzanę, wyłożonej wewnątrz irchą, mającej 10—18 centymetrów długości, gdy jest rozwiniętą na 6—8 milimetrów szerokości, — stosownie do wieku chorego. Pętla ta daje się zastosować z większą szybkością i łatwością.

Wypadałoby sądzić, że moc przed przebudzeniem się chorego powinienby przebiec cewkę moczową i rozszerzyć jamę napletkową, utworzoną przez podwiązanie. Ale to się rzadko zdarza: przebudzenie się ma miejsce przed rozpoczęciem się zwężenia, wskutek czego pęcherz wzmacnia się i przyrząd wkrótce zdaje zbytym. Zwykle, gdy potrzeba zwężenia nie bywa zbyt nagłą, przyrząd może być założony dopiero o północy; w miarę następującego polepszenia może i to nastąpić, że chory pogrążony w śnie i zapominający oddać mocz, po zdjęciu wężła ścieśniającego zatrzyma mocz w ciągu nocny, będąc zdziwiony przy przebudzeniu się, że nie był zmuszony do moczenia w ciągu 7—8 godzin.

Podwiązanie więc napletka zasługuje na zastosowanie przeciwko moczociekowi; sposób ten, zdaje się tu działać podobnie, jak zamykanie otworu napletkowego za pomocą kleiny (collodium), — z tą tylko różnicą że pierwszy sposób jest prostszym, aniżeli ostatni, wielce zalecany przez Corrigan'a. Działa bowiem podobnie, jak przewięzywanie prącia stosowane dobrowolnie przez chorych, będąc mniej niebezpiecznym. — Nieskończenie jest lepszym od wszystkich

<sup>1)</sup> Berl. klin. Woch., 1872., Nr. 6 i 8.

<sup>1)</sup> Montpellier médical.

sposobów zalecanych w celu uciśnięcia śród-kroczca i części cewki moczowej wewnątrzmiędniczej: wymaga bowiem tylko prostej opaski i pewnej długości napletka.

Dr. W. Jabłonowski.  
(w Hercegowinie).

Desormeaux: Rak pierwotny krtani i jego chirurgiczne leczenie <sup>1)</sup>.

Cierpienie to tak określa Dr Desormeaux:

1) „Gdy obrzmienia rakowe krtani są prawie stale, jeżeli nie zawsze, złożone z tkanki nabłonkowej, skłonniejszej do wyleczenia, niż prawdziwe tkanki rakowe: nie należy więc opóźniać się z operacją każdą razą, gdy ich zupełne wycięcie jest możebnym“.

2) „Przypadki uważane na chorym, przebieg choroby, a głównie badanie krtani, pozwolą rozpoznać cierpienie z wielkim prawdopodobieństwem; — a nawet przypuszczając popełniony błąd co do natury tkanki chorobowej, — od chwili gdy obrzmienie krtani grozi choremu uduszeniem i gdy nie podobna zniwelować nowotworu na drodze naturalnej, — trzeba zastosować operację.“

3) „Operacją tą jest cięcie krtani (laryngotomia), w którym nie należy obawiać się otworzyć ten organ jak można najszerzej, ażeby z większą pewnością działać na obrzęk, — którego zniszczenie najzupełniejsze jest niezmiernie ważnym.“

4) „Obawa zmienienia głosu, — a nawet uczyńnienia chorego niemym, nie powinna powstrzymać lekarza tam, gdzie idzie o działanie przeciwko chorobie, sprowadzającej niechybną śmierć.“

5) „Gdy cierpienie rozpoczęło się w krtani, można przedsięwziąć wycięcie, jeżeli tylko nowotwór nie przechodzi górnej części jamy krtaniowej, — o czem przekonywamy się za pomocą wziernika krtaniowego, — i wtedy gdy cierpienie nie przeszło po za część organu chrząstkowatą, będącą dlań stałą przeszkodą. — Ostatni ten postęp choroby zdradza się powiększeniem objętości organu, nabierającego wkrótce kształtu nieregularnego i nieprawidłowej twardości. Wreszcie to przeciwwskazanie nie może być uwzględnione w chwili, gdy operacja jest przedsiębraną po raz pierwszy, — ponieważ w innych razach, przed dojściem do tego punktu, nowotwór wywołałby uduszenie, w razie gdyby poprzednia operacja nie zapewniła wolności oddychania.“

6) „Gdy przypadki powyżej wymienione pozwalają rozpoznać niemożebność zupełnego wycięcia nowotworu, lub gdy cierpienie wywołało zatkanie poblizkich gruczołów limfatycznych: należy się ograniczyć do przecięcia tchawicy (tracheotomia), dla uniknięcia duszności i przedłużenia życia chorego.“

7) „Po przecięciu krtani i usunięciu nowotworu, należy pozostawić w ranie rurkę na dość długi czas, ażeby zapewnić się, że cierpienie nie powraca. Otwór tak utrzymany pozwala badać organ zdołu ku górze, — wyzegać miejsca wzbudzające obawę, i w końcu gdy nie jest zmuszonym do powtórnego operowania, pozostawiony otwór ułatwia rękoczyn.“

Dr. W. Jabłonowski.  
(w Hercegowinie).

T. Roth: O leczeniu wąglika i czyraka <sup>1)</sup>.

Co dwie godziny wciera się *Ung. ciner* w wielkość ziarenka grochu w otoczeniu czyraka (*furunculus*) lub wąglika (*carbunculus*). Miejsce chore przykrywa się kawałkiem płótna, którego odmieniać się nie powinno, jest ono więc napojone maścią szarą.

Jeżeli leczenie się rozpoczęło bardzo weześnie, ból i zapalenie znikają, a pozostaje tylko obrzmienie skóry twardawe, które również szybko się rozdziela po przyłożeniu *Empl. merc. c. Empl. cicutaе*. W późniejszych okresach, gdy się już okazują pęcherzyki zgorzelinowe, udaje się często wstrzymać sprawę zapalną, tak, że tylko małe ropnie w miejscu pęcherzyków zgorzelinowych się okazują, które po leczeniu ich plastrem rtęciowym szybko się goją.

Jeżeli już jest znaczne ropienie, natenczas należy natychmiast przystąpić do rozległych przecięć.

Dr. Kluczenko.

P. Vogt: Leczenie żyłaków wstrzykiwaniem podskórnym ergotyny <sup>2)</sup>.

\*) Biorąc pochoch z pracy Langenbecka, który zaleca ergotynę do leczenia tętniaków samodzielnych, aut. począł próbować tegoż środka przeciw rozszerzeniom żył goleniowych. A najprzód mężczyźnie 60-letniemu, mającemu już od lat wielu rozległe żyłaki na prawem podudziu, wstrzykiwał podskórnie co 2 dni całą strzykawkę (a przeto 0,12 ergotyny) następującego roztworu: *Extr. Secal. cornut. aquos.* 2,0 (dr.  $\frac{1}{2}$ ), *Spir. Vini, Glycerini* ana 7,5 (dr. 2), a to w okolicy końca ośrodkowego żyłaka mającego 6 cm. długości, a grubość małego palca. Po 8 dniach żyłak zniknął i nie powstał już nanowo przez następne 6 tygodni, w ciągu których chory chodził jak zwykle. — Prócz tego uważał aut. ogromną skuteczność wstrzykiwań podskórnych ergotyny u różnych chorych z żyłakami nawet olbrzymiemi w klinice chirurgicznej stałej i ruchomej.

Za namową autora skuteczniał też doświadczenia na zwierzętach Dr. Potel, któremu udało się wykazać, tak drobnowidem jak sfigmografem, wpływ tego środka na błonę mięsną zarówno tętnie, jak żył.

Aut. wnosi zdąd, że ergotyna w chorobie, o której tu mowa, działa po części bezpośrednio na żyły, po części zaś w ten sposób, że zwęża tętnice, a przez to zmniejsza przyływ krwi do żył. Do wytłomaczenia tego zjawiska nie może posłużyć uciśnięcie żyłaka nieznacznym naciekiem zapalnym, który zwykły powstawać na miejscu zastrzykania: albowiem rozstrzenie (*ectase*) żyłne bardziej obwodowe, które w takim razie musiałyby nabrzmiwać, zmniejszają się w tym samym stopniu, jak część żyłaka, do którego zastrzykano.

W końcu przytacza jeszcze autor kilka doświadczeń, z których wnosi, że ergotyna zastrzykana działa nie tylko miejscowo, ale też za pośrednictwem ośrodko-naczynio-ruchowego na naczynia.

<sup>1)</sup> Séance de l'Acad. de méd. à Paris.

<sup>1)</sup> Deutsche Klinik, 33 — 39, 1872.

<sup>2)</sup> Berl. klin. Woch. 1872, Nr. 10.

Kraków dnia 7go Sierpnia.

\* Cholera w Krakowie w ubiegłym tygodniu wzrastała do dnia 4go b. m., do czego panujące upały nie mało się przyczyniają. — Komisya sanitarna na posiedzeniu, odbytym dnia 5go b. m., między innymi uchwaliła otworzyć pod własnym zarządkiem oddział choleryczny w szpitalu izralickim i mianowała do tegoż oddziału lekarza ordynującego i dwóch pomocniczych, tudzież 4 nowych lekarzy dzielnicowych; uchwaliła też dozwolnić sprzedaż owoców jedynie tylko na Małym Ryuku, pod ścisłą kontrolą Magistratu. — Słyszeliśmy, że „Przestrogi co do zachowania się osobistego“ (przedruk dawniejszej książeczki), rozdawane są gospodarzom domów; pożądaną byłoby rzeczą, żeby te same przestrogi, tylko jeszcze treściwsze, ogłoszone były w postaci plakatów: „przestrogi“ wydane przez komisję sanitarną tarnowską w r. z. (w 16ce, str. 4) mogłyby tu za wzór służyć. Taż komisya w osobnym plakacie bardzo słusznie zwraca uwagę publiczności na niebezpieczeństwo wynikające z picia wody pochodzącej ze studzien podjeźraniej czystości. Gmina izralicka m. Tarnowa daje też przykład, jak w takiej chwili wyzyskać można trwogę jednej części ludności na cel dobroczynny, t. j. na wsparcie ludności ubogiej, potrzebującej w czasie epidemii w dwójnasób pomocy: otóż kahał ściera od tych mieszkańców zamożnych, którzy ze strachu uciekają na wieś, podatek na rzecz ubogich współwyznawców. — W Wieliczce komisya zdrowotna zarządziła rewizje, nawet nocne, domów celem przekonania się, czy mieszkania nie są przeludnione, i dla ograniczenia, ile możności, napływu emigrantów izralickich z Kaźmierza.

W Krakowie kredyt 4 000 złr. udzielony z początku komisji sanit. już jest wyczerpany; dziś odbędzie się posiedzenie Rady miejskiej celem wyjednanania dalszego kredytu w kwocie 8 000 złr. I ta kwota zapewne niebawem się wyczerpie, bo szpitale choleryczne już są pełne, a Delegat Namiestnika odmówił gminie odstąpienia lokali w klinice na czas cholery, a względnie na czas wakacyj: zamierzają więc zbudować drugi szałas (barak) na Skałce na 40 łóżek, który nie mało będzie kosztował. — Zwracamy uwagę szan. komisji, że bardzo pożądanym jest urządzenie lokalu dla odwietrzania (dezynfekcyi) odzieży, bielizny i innych przedmiotów pochodzących od osób zmarłych na cholere. zanim takowe dostaną się w ręce rodziny, na tandetę i t. d. Co do bielizny w szpitalach cholerycznych przypominamy uchwałę Rady zdr. D. Austr. z posiedzenia odbytego dnia 22go Kwietnia r. b., tej treści: 1, żeby ją prać tylko w szpitalu; 2, żeby brudną bieliznę kłaść zaraz do rozcynu kwasu karbolowego, potem parzyć w jak najwyższej ciepłocie w wodzie karbolowej, albo lepij w parze przegrzanej; 3, najlępij palić. Tu nadmieniamy, że w jednym ze szpitali cholerycznych w z. tygodniu przekonaliśmy się, że nie dość obficie używają w nim środków odwietrzających, pomimo wzorowego zresztą porządku. — Szpital Bonifratrów znów jest bez lekarza stale zamianowanego, albowiem Dr Merunowicz, którego nominacya w sposób dość samowolny została zawieszoną, zrzekł się tój posady i przyjął na czas feryj miejsce lekarza szpitalnego w Krzeszowicach.

\* Zwracamy uwagę, czyją należy, na doskonale broszurę Prof. Pettenkofra p. n. „*Was man gegen die Cholera thun kann*“. Ansprache an das Publikum. München 1873. Oldenbourg“. (w 8ce, str. 64.) wydaną z polecenia Rady zdr. m. Mnichowa, która wielce zasługiwałaby na ogłoszenie w języku polskim.

\* Jak rząd cisliawski lekceważy Radę zdrowotną naczelną, tego mamy świeży przykład. Rozchodziło się o obsadzenie urzędu referenta zdrowotnego krajowego krainńskiego: Rada zdrow. nacz., zapytana według przepisów o opinię o kandydatach, jednomyślnie proponowała Dra Gaustera, zaszczytnie znanego z prac o reformie zdrowotnej, od lat 15stu lekarza powiatowego w Krainie; otóż wbrew tój opinii mianowanym został na tę posadę nieznanym z prac sanitarnych lekarz z Lublany, ale za to, jak dodaje *Wien. Med. Pr.*, dobry myśliwy i przyjaciel wielkich panów.

## Instrukcja

dla obywateli miejskich mających nadzór nad zachowaniem porządku pod względem sanitarnym w mieście Warszawie.

1. Celem przyścia w pomoc policji przy czuwaniu nad dokładnem wypełnianiem przepisów policyjno-lekarskich, przez komitet choleryczny wskazanych, wyznacza się do dwóch obywateli miasta w każdymuczastku policyjnym.

2. Po wspólnem porozumieniu się między sobą obaj obywatele obchodzą codziennie w rannych godzinach wszystkie domy swegouczastku dla sprawdzenia, czy właściciele domów lub rządcy wypełniają ustanowione, niżej wyszczególnione przepisy policyjno-lekarskie:

a) Rynsztoki uliczne i w podwórzach powinny być wymiatające i przepłókiwane wodą, najmniżej raz na dzień w dnie niedeszczowe. Przepłókiwanie powinno poprzedzić dezynfekcją tych miejsc.

b) Kloaki, doły do pomyj, śmieci i nawozu, niezależnie od codzienniej ich dezynfekcyi, powinny być o ile tylko można często oczyszczane, aby zapobiedz wydzieleniu się szkodliwych wyziewów.

c) Hotele, domy zajezdne, noclegowe i tym podobne zakłady powinny być utrzymywane w czystości.

d) Zwracać szczególną uwagę na czyste utrzymywanie bazarów, publicznych rynków, zalecając oczyszczanie powietrza w miejscach, wydających szkodliwe wyziewy, przez zastosowanie dezynfekcyi.

e) Zwracać uwagę na dobroć sprzedawanych pokarmów i napojów, baczając szczególnie na dobroć mięsa, ryb i owoców.

3. Obywatele miejscy, dostrzegłszy w czasie wizyt jakiebądź zbroczenia od higienicznych przepisów, albo ich niezachowanie, zobowiązują właścicieli domów i mieszkańców do ścisłego wykonywania policyjno-lekarskich środków, a w razie, gdyby ich usiłowania nie skutkowały, zakomunikują o tём miejscowej policji.

4. Przy codziennym obchodzie domów dowiadywać się, czy nie ma w którym domu chorych z gstrycznymi objawami, i starać się ażeby osobom biedniejszej klasy ludności, które zasłabły na cholere, natychmiast udzieloną była pomoc lekarska.

5. Dopilnować, ażeby dotknięci cholera z biednej klasy ludności byli odsyłani ile możności spiesznie do szpitali cholerycznych, a mianowicie: do Prazkiego i do szpitala Starozakonnych

6. Dopilnować, ażeby ciała zmarłych na cholere nie były trzymane w domu dłużej jak dwanaście godzin.

7. Ciała zmarłych na cholere nie powinny być wystawiane w cerkwiach, kościołach albo kaplicach znajdujących się przy miejskich kościołach.

(Dokończenie nastąpi.)

## DROBIAZGI TERAPEUTYCZNE.

Ciepłe kąpiele w gruźlicy i w innych cierpieniach pierśiowych. Rozmaite doświadczenia poczynił niedawno w szpitalu *de la Pitié* Profesor Lassègue w celu ocenienia skutku ciepłych kąpiel w gruźlicy i w innych cierpieniach pierśiowych, a rezultaty podał Souplet w jednym z ostatnich numerze czasopisa „*Bulletin de thérapeutique*“. Ciepłota kąpeli była zawsze o 3 stopnie, niższą niż ciepłota chorego; wody gorącej dolewano, ile razy było potrzeba dla utrzymania jednostajnej ciepłoty. Kąpiel trwała od 20 do 45 minut, odpowiednio do sił chorego, i powtarzano ją codziennie. Podczas pierwszych dwóch lub trzech kąpiel chorzy zwykle doświadczali pewnego stopnia ucisku, który trwał tylko około 2 minut. Pod wpływem ciepłych kąpiel kaszel ustawał, wykrztuszanie stawało się łatwiejszym, tętno rzadszym, a ciepłota zniżala się stopniowo. W tym samym czasie napady dreszczu stawały się słabszemi, poty nocne zmniejszały się znacznie, albo nawet całkiem ustawały. Po pierwszych trzech lub czterech kąpielach sen się polepszał, rozwolnienie zmniejszało się, lub też ustępowało całkiem. Z trzynastu

przypadków (9 gruźlicy, 2 zapalenia płuc, a 2 opłucnej) nie można było w żadnym jakiej dolegliwości kłaść na karb kąpieli, podczas gdy korzyści z nich wynikające były oczywiste (The Lancet, I, 1873, Nr 24.).

Dr Muskiel.

#### Formulae anticholericæ.

Rp. Extr. nuc. vomic. aether. gr. tria, Tinct. laud. croc. gutt. viginti, Aquæ Naphæ drachm. duas.

Rp. Laudani puri gr. duo Mag. Bismuth. Sacchari aa scrupulum. M. f. pulv. Divid. in. dos octo.

Rp. Laudani puri gr. duo, Camph. gr. tria, Sacchari scrupulum. M. f. pulv. Divid. in. dos octo.

Rp. Olei Cinamom. scrupulum, Aether. sulf. drachm. duas.

#### Wspominki historyczne.

5go Sierpnia 1814 r. według zaprowadzonego przez Dyrektora ks. Warszawskiego: Urządzenia we wn. szkoły gł. krak. §. 13, kurs nauk lekarskich ma trwać lat cztery. (Roczn. Wydz. lek. tom. VI. 1843).

7go Września 1583 r. Stefan Batory król polski wydał dekret nakazujący surowo prezydentowi i radzcom m. Krakowa, aby zatrzymaną sumę na profesora Wydz. lek. przez Macieja z Miechowa ofiarowaną (600 dukatów) wypłacili lub roczny dochód z téjże uiszczali. (R. W. I. III. 26).

Dr Oettinger.

#### WIADOMOŚCI URZĘDOWE.

Sprawy lekarskie w Wydziale krajowym w m. Maju r. b. Wydział krajowy porucił p. Profesorowi Dr Alfredowi Biesiadkiemu pełnienie obowiązku prosektora, zaś p. Prof. Stopczanskiemu pełnienie obowiązku chemika przy szpitalach powszechnych w Krakowie, wyznaczając dla nich wynagrodzenie po 800 zlr. rocznie.

Wydział krajowy uwolnił lekarzy dyżuru w lwowskim szpitalu powszechnym od badania stanu zdrowia żywicieli podrzutek, tudzież od ordynacji lekarskiej dla podrzutek, i przydzielił czynności te każdemu sekundaryuszowi zakładu położniczego za wynagrodzeniem po 10 zlr. miesięcznie.

Wydział krajowy przyjął do wiadomości sprawozdanie inspektora co do lustracyi szpitali w Tarnopolu, Brzeżanach, Brodach i Żółkwi, i delegował zarazem jednego z swoich urzędników do przeprowadzenia likwidacyi funduszu szpitalnego w Tarnopolu.

Wydział krajowy przyjął do wiadomości doniesienie Prezydium c. k. Namiestnictwa, że Najjaśniejszy Pan postanowieniem z d. 10go Maja b. r. ustawie o zniesieniu krajowych zakładów podrzutek we Lwowie i w Krakowie Najwyższej sankcyi udzielił raczyli.

Wydział krajowy zarządził rozpisanie konkursu na opróżnioną posadę prymaryusza oddziału chorób kiłowych przy lwowskim szpitalu powszechnym.

Wydział krajowy przyjął ofertę Markusa Steinig i spółki, na dostawę płyt trembowelskich dla budowy zakładu obłąkanych w Kulparkowie.

W sprawie pretensyi gminy miasta Stanisławowa do funduszu tamtejszego szpitalu powszechnego, delegował Wydział krajowy jednego z swoich sekretarzy do wyjaśnienia sprawy na miejscu przy współdziałaniu delegatów Wydziału powiatowego i zwierzchności gminnej.

Wydział krajowy przyjął do wiadomości sprawozdanie inspektora szpitali co do lustracyi szpitala powszechnego w Stanisławowie, i zatwierdził zarazem budżet tegoż szpitala na rok bieżący.

#### KRONIKA I ROZMAITOŚCI.

Kraków, dnia 6go Sierpnia. W zeszłym tygodniu bawił tu przez dni kilka Dr H. Fudakowski, Docent Chemii lekarskiej w Uniwersyt. warszawskim.

\* Wiedeń. Prof. Rokitański doniósł na piśmie Wydziałowi lek., że w przyszłym półroczu rozpocznie rok 70ty życia, a zatem dojdzie kresu, po którym prawo wymaga ażeby ustąpił ze służby czynnej. — Nowo utworzona druga klinika chirurgiczna powierzoną została Dr Heinemu, profesorowi tegoż przedmiotu w Insbruku. Przybyła też druga klinika położnicza, którą oddano Späthowi dotychczasowemu Dyrektorowi kliniki położn. dla akuserek, a tą ostatnią kierować będzie Dr Gustaw Braun.

\* *Nekrologia.* — Dnia 20go i 21go Lipca r. b. zmarło w W. Ks. Poznańskim dwóch zacnych i wielce szanowanych lekarzy. — W Smiglu zmarł dnia 20go zeszłego miesiąca w 57 roku życia Dr Franciszek Antoniewicz. Jako akademik wrocławski wzięwszy udział w wypadkach r. 1846 w Poznańskim, skazany został na 20letnie więzienie w fortecy Głogowskiej, z kąp atoli w r. 1848 został uwolniony. Osiadłszy w Krobi, a następnie w Smiglu, postępowaniem swém zjednął sobie ogólną miłość rodaków. Padł ofiarą swego powołania, albowiem zmarł wskutek zranienia się przy sekyi.

W dniu zaś 21go z. m. zmarł w Miłosławiu w 44 roku życia Dr Kazimierz Wiśniewski, dawniejszy uczeń gimnazjum w Trzemesznie, gdzie pa złożonym już egzaminie brał w r. 1848 udział w bitwie i został ranionym. — Strata jego boleśnie dotknie zwłaszcza uboższe społeczeństwo, które miało w nim prawdziwego ojca i opiekuna. — Jeden i drugi zostawił żonę z kilkorgiem dzieci. Cześć ich pamięci.

Dnia 1go Sierpnia r. b. zmarł w Krakowie na cholere jeden z rozbitków społeczeństwa litewskiego, Władysław Ulanowski, licząc lat 40 i kilka. Urodzony na Infantach polskich, słuchał nauk prawnych, a potem lekarskich w Dorpacie od r. 1850 do 1858; potem gospodarował na wsi, wykonywając sztukę lekarską między ludem, następnie zamieszkał w Wilnie; w r. 1864 wysłany do gubernij głębokich Rosyi, potem internowany do Pskowa, stracił śród tych wypadków niemal cały swój znaczny majątek, a przed dwoma laty przyjechałszy do Krakowa, począł tu uczęszczać na kliniki, celem zdawania egzaminów na stopień Dra Med. Skołatany moralnie, a po części i fizycznie wśród kolei, które przeszedł, łatwo uledez musiał niszczącej epidemii. Był to człowiek zacnego charakteru i szlachetnych (lubo czasami ekscentrycznych) popędów. Spokój jego popiołom.

*Epidemie.* — Na cholere w Wiedniu od dnia 26 do 30go Lipca zachorowało 151 osób. — W Krakowie w pojedynczych dniach od 30 z. m. do 5go Sierpnia przybywało do szpitali choler.: 23, 33, 36, 34, 32, 48, 34; umierało w tychże szpitalach: 11, 12, 13, 10, 12, 25, 16; umierało na mieście: 16 (z tych 10 na Kaźmierzu i Stradomiu), 22 (6), 17 (12), 19 (12), 23 (18), 26 (18), 18 (11) — W Tarnowie do pozostałych na dniu 26go Lipca 133 chorych przybyło do dnia 2go Sierpnia 332 (w poprz. tyg. 242), wyzdrowiało 137, zmarło 100 (w poprz. tyg. 71), zostaje 228. — W Warszawie w ciągu doby od 30 do 31 Lipca zachorowało na tęż chorobę osób 36, wyzdrowiało 12, umarło 14, pozostało chorych 118. W wojskach garnizonu zachorowało 4, pozostało 43.

*Do dzisiejszego Nru dołącza się Dodatek nadzwyczajny półlarkusowy.*

CD ADMINISTRACJI: Dzieła K. Darwina „Pochodzenie człowieka i obór ptaków” wyszedł zeszły II (81—160). Prenumeratę na całe dzieło składające się z 2ch tomów obejmujących przeszło 50 ark. ozdobyłony 72 drewnorytami, wysyłamy w 10 zeszytach po 5—6, w ilości 12 zhr. 50 c. a dla prenum. „Przeegl. lek.” 10 zhr. w. n. przyjmując wyłączenie Administracja „Przeegl. lek.” — Na składzie znajdują się dzieła: Dra Jordana „Nauka położnictwa dla użytku położnych”, 2 tomy, wydanie ozdobne, z wielu drewnorytami. Cena 4 zhr. w. n. wraz z przesyłką. — Dra Vogla J. „O choroby i środki ich zwalczania, porodułk, cena 20 c. — Dra Maciejowskięgo S. „Prawidła ochrony prywatnej w czasie zblizania i pojawiania się cholery”, cena 20 centów. Ogra krowianka zawsze świeża po cenie 2 zhr. 50 centów i 2 zhr. 50 c. w. n. za fiolę.

## ASTM Y NEWRALGIE

Dusznosć, chrypka, katarz  
zadawione i wszelkie cierpie-  
nia kanałów oddechowych u-  
stępują po użyciu Hurek anti-  
astmatycznych p. Levassera,  
19, rue de la Monnaie w Pa-  
ryżu.

Dostać można w Warszawie w składach materiałów aptecznych PP. Gallego i Spiessa; w Krakowie w aptece p. J. Trauczyńskiego; we Lwowie w aptece p. Mikolasch; w Brodach w aptece p. Kullaka.

## ELIXIR et Vin de J BAIN A LA COCA du PÉROU

scieglu, yęcy, wzmacniający i silnie podniecający.  
Jest to najsilniejszy bodziec odnowy sił wyczerpanych i najskuteczniejszy w najgłę-  
szych cierpieniach nerwowych, w chorobach mleczną purę przewodną, w białaczce,  
moocucie, pęganicy, sił dalekość, w cierpieniach prętkich, żółdka i pęwa, w zadumie  
pochoźdzącej ze złożeń w narządzie płciowym, etc. etc.

### Pastyłki trawiące Coca z Peru J. Bain'a

przeciw najcięższym cierpieniom przewodu pokarmowego.

Uwaga: Te leki ogólnie p. BAIN'A są przysyła sione z Coca, pochodzącego  
z plantacji M. Ballurona pełnomocnika ministerjalnego z Bolarii w Peruu.

Skład: E. Fournier et Cie, 56, rue d'Anjou-Saint-Honoré, Paris.

Dostać można w Warszawie w składach materiałów aptecznych pp Gallego i Spiessa;  
w Kijowie w aptece pp. Marcitczyk Braci; w Krakowie w aptece p. Trauczyńskiego;  
we Lwowie w aptece Mikolascha. 2. (5—24.)

## QUINA LAROCHÉ

cyjący zupeln, a najlepszy Kin

Nycting ten zeznający, odżywczy i przeciwzimmiczny jest  
najdokonalszym i najsiłniejszym przetworzoną kiny; smak na bardzo przyimny sk-  
teczność jego jest sterzoną we wszystkich sepiach, przeciw ogólnemu osłabie-  
niu, braku opływu, niedostateczności, wrodzonemu niedostateczności, w nerwowości,  
we wzniesieniu, w odnowieniu porochem, w gorączkach i ich następstwach, gdzie  
dług używaniu Kina nie skutkuje.

KINA  
LAROCHA ŻELEZISTA w niedokrwistości, białaczce: w cierpieniach  
złożonych.

PARIS, 22 et 16 Rue Drouot.

Dostać można w Krakowie: w aptece P. J. Trauczyńskiego, we Lwowie:  
w aptece P. Mikolasch; w Warszawie: w składach Materiałów aptecznych pp. Ferd.  
Ang. Gallego i Ludw. Spiessa; w Wilnie: w składach materiałów aptecznych p. Gra-  
żewskiego i w aptece J. Chrościckiego; w Kijowie: w aptece pp. Marcitczyk Braci,  
w Poznaniu: w aptece p. Dr. Mandelstama.  
13 (11—24.)

Nakładem W. Tomaszewicza.

## MIGRAINES ET NEURALGIES

### PAULLINIA-FOURNIER

jest od roku 1840 rozpowszechnionym  
lekiem w nerwobólach, w cierpieniach  
nerwowych głowy, żółdka; jeden jej pakiet usuwa w mniej, niż pięciu minutach  
najcięższe przypadki. Jest szczególnym środkiem w chorobach nerwowych i nadw-  
żeniu narządów. Jej ważna skuteczność została stwierdzoną w prywatnej aptece  
i w szpitalach przez PP. Profesorów wydziału lekarskiego: Trousseau, Grisolle, Cru-  
veilher, Huguier, Monod, Berthez etc. etc.

Główny skład w Paryżu przy ulicy d' Anjou-Saint Honoré, 56.

Dostać można w Warszawie w składzie materiałów aptecznych PP. Gallego  
i Spiessa; w Kijowie w aptece PP. Marcitczyk Braci; w Krakowie w aptece P.  
Trauczyńskiego, we Lwowie w aptece P. Mikolascha. 1. (7—24.)

## HÉMATOSINE

15. (5—7)

PP. TABOURIN, kawalera legii honorowej, i LEMAIRE chemików.

Środek żelazisty, fizjologiczny przyswajalny dla organizmu.

Środek ten niezawodny leczy szybko i radykalnie wszelkie choroby z niedokrwisto-  
ści pochodzące.

**Bładczkę, wycieńczenie i utratę sił, skrofoty, młysatyizm dzieci,  
białe upławy, brak miesięcznych odpływów, wychudnienie, osta-  
bienie ogólne, mozolny i długi powrót do zdrowia etc.**

Najdelikatniejsze żłdki wyborne znoszą HEMATOSINE, nie sprawia nigdy za-  
twardzenia, nie utrudza organizmu, nie sprawia obrzydzenia, ani żadnych  
przypadki ści.

Hurtowna sprzedaż u p. DESNOIX et Ce. w Paryżu, 22, rue du Temple, w War-  
szawie w składach materiałów aptecznych PP. Ferd. Aug Gallego i L. Spiessa; we  
Lwowie w aptecę P. Mikolasch; w Krakowie w aptece P. Trauczyńskiego.

W drukarni W. Kordeckiego w Krakowie.