

uzyskało t \acute{e} m potwierdzenie całkowite, że po 10 dniach blisko, po użyciu okładów rozmiękczyających i przetworów makowca ustąpiła twardość i ból w okolicy przerzeczonej, n \acute{e} rka uwięzła stała się znowu ruchomą i łatwo ją było można odprowadzić po pod prawy łuk żebrowy i ku okolicy ł \acute{e} dźwiowej, poc \acute{e} m t \acute{e} ż wszystkie towarzyszące a ciężkie przypadki niebawem i całkowicie ustały. Niewiasta jest teraz zdrową, nosi opaskę i rzadko tylko czuje dawniejsze boleści ciągnące pod prawym łukiem żebrowym.

V. Katarzyna Puchalska, praczka 47letnia, zamężna, nader wynędzniała, dostrzegła na rok przed swoim przyjęciem do kliniki bolesnego obrzmienia pod łukiem żebrowym prawym, do czego przyłączyły się niebawem nudności, wymioty i ciągła niestrawność. Gdy obok tego boleści rozszerzyły się po całym brzuchu, a chora coraz więcej chudła i słabła, udała się do kliniki dnia 7 Stycznia 1859.

Badanie przedsięwzięte po uprzednich środkach czyszczących okazało, że w tym razie obie n \acute{e} rki były opadły, tak dalece, że po obu stronach opuszczały się ku okolicy p \acute{e} pkowej i zbliżyły się do siebie na przestrzeń 3—4 centym. Rozpoznanie ustalono nietylko drogą wykluczenia, lecz także wprost tym sposobem, że obie n \acute{e} rki z łatwością dały się odprowadzić aż do okolic ł \acute{e} dźwiowych, i tamże w położeniu chor \acute{e} j na wznak przez czas niejaki spokojnie zostawały, zwolna jednakże, zwłaszcza jeźli chora siadła lub się obróciła, ukazywały się znowu w okolicy p \acute{e} pkowej. Śledzione można było opukiwaniem wynaleść na swoim miejscu właściw \acute{e} m, dla tego juź z tego powodu nie mogło być mowy o pomienianiu lew \acute{e} j n \acute{e} rki z opadłą może śledzioną, przeciw czemu świadczył zresztą właściwy kształt, równie jak i siedlisko głębsze, zaotrzewnowe wymacalnego ciała. Godn \acute{e} m jest uwagi, że w tym przypadku obie n \acute{e} rki za obmacaniem były niepospolicie twarde, chropawe i guzowate. Czy w skutek zwyrodnienia rakowatego musiało t \acute{e} m bardziej pozostać nierozstrzygni \acute{e} t \acute{e} m, ile że w żadn \acute{e} j inn \acute{e} j cz \acute{e} ści ustroju nie można było wykazać tworów rakowatych, i że mocz weale nie nieprawidłowego nie przedstawiał, jakkolwiek ciągle, gwałtowne bóle, wychudnienie i zehorzałość nie odbierały prawdopodobieństwa takiemu

przypuszczeniu. Po trzech tygodniow \acute{e} m leczeniu m \acute{a} kowcem, środkami gorzkimi i czyszczącymi ukoiliły się bóle, łaknienie się wzmag \acute{a} ło, chora czuła się zdrowszą i opuściła klinikę, prawdopodobnie by ciało swoje uchronić od pośmiertnego rozbioru. We 3 tygodnie po wyjściu umarła w domu śród pojawów ogólnego zapalenia otrzewny.

VI. Agnieszka Mameczyńska, szwaczka 40letnia, nader wyniszczona długotrwałą zimnicą i wybitnie napiętnowaną t \acute{u} szezycą naczyń ze znaczn \acute{e} m rozszerzeniem t \acute{e} tnicy brzusznej i t \acute{e} tniakiem wielkości orzecha laskowego w praw \acute{e} j spólnej t. głow \acute{e} w \acute{e} j, dostała się dnia 10 Kwietnia 1858 do nasz \acute{e} j kliniki. Obie n \acute{e} rki opadły były aż po pod okolicę p \acute{e} pkową i tak obok siebie ułożone, że je tylko wciskającą się ręką od siebie oddalić było można, poc \acute{e} m z łatwością dały się odprowadzić do swych siedzib pierwotnych. Gwałtowne bóle ciągnące ku dołowi jedynemi były zjawiskami zrz \acute{a} dzonemi t \acute{e} m nieprawidłow \acute{e} m siedliskiem. Środkami m \acute{a} kowcemi, gorzkimi i żelazistemi leczona, opuściła chora zakład z ulgą znaczną.

VII. Pani Józefa B..., wieku 27 lat, żona ur \acute{e} d \acute{n} ika, niedokr \acute{e} wna, poprzednią kił \acute{a} wt \acute{o} rorz \acute{e} d \acute{n} ą wycieńczona, uczuła dnia 27 Stycznia 1864 tuż po sut \acute{e} j biesiadzie gwałtowne bóle pod łukiem żebrowym prawym rozpościerające się z jedn \acute{e} j strony ku spojowi łonowemu, z drugiej ku d \acute{o} łkowi podsercowemu, do czego przystąpiły wnet nudności, zrywanie ciągle do wymiotów, wymioty i ciężkie mdłości, tak dalece, że chor \acute{a} cz \acute{e} sto rzeźwić było potrzeba.

Badanie wydało n \acute{e} r \acute{e} kę opadłą aż do okolicy p \acute{e} pkowej, nieruchomą, moeno uwięzłą, na okolo któr \acute{e} j wytworzyły się wypociny otrzewnowe aż ku podż \acute{e} brzu prawemu. Dopiero gdy takowe stosownemi lekami uprz \acute{a} tnięto, zdolano odprowadzić n \acute{e} r \acute{e} kę opadłą. Chora pokrzepiła się dopiero po 2ch miesi \acute{a} cach, nosiła opaskę przepuklinową z poduszeczką przystosowaną do podż \acute{e} brza prawego, a gdy ją w 5 miesi \acute{e} cy po cierpieniu zbadalem, znajdowała się n \acute{e} rka istotnie po za poduszeczką, była atoli bolesną i nieruchomą, co przemawiać się zdaje za powstałemi przyzepinami.

VIII. Pani N. D..., 25 lat wieku, matka dwojga dzieci, w \acute{a} tl \acute{e} j budowy, niedokr \acute{e} wna, obarczona prze-

wlekłym obrzękiem śledziony skutkiem uporeczy-
wój zimnicy doznała już przed rokiem nagłych,
gwałtownych bólów pod łukiem żebrowym, przy-
czém często wymiotowała i czas niejaki gorączko-
wała. Poczytano wówczas chorobę za zapalenie
wątroby i jako takie leczono. W Styczniu r. b.,
pięć tygodni po odbytych porodzie w chwili dzwi-
gnięcia dziecka 2letniego, napadły ją te same do-
legliwości co roku zeszłego.

Przy badaniu napotkano nerkę prawą opadłą
aż do dolka biodrowego, mało tylko ruchomą,
brzech cały nader bolesny. Po odprowadzeniu kil-
ku usiłowaniami nerkę opadłą do okolicy lędźwio-
wój znikły boleści jakby czarem, a chora opa-
trzona w opaskę brzuszną, czuła się całkiem zdrową.

IX. Pani B..., żona dzierzawcy ziemskiego, 32
lat wieku, obarczona znacznym skrzywieniem bo-
cznogrzbietowem stosu pancerzowego, niedokrewna,
przeżyła kilka porodów i przewlekłych zimnic.
Od lat wielu dręczyły ją boleści w obu podże-
brzach, wzmagające się niekiedy tak dalece, że
doznawała przeszkody w chodzeniu i stała się nie-
zdolną do wszelkiej czynności nateżającej.

Badanie wykazało: po stronie lewej opadnięcie
śledziony, po stronie prawej opadnięcie nerk. Chi-
nina i opaska brzuszna zlagodziły prędko dole-
gliwe przypadki. Użycie leków żelazistych wyje-
dnało chorą dotychczas dolą dość znośną tak, iż
bez przeszkody zajmować się może swoim go-
spodarstwem. (D. n.)

Bezwład ogólny postępowy

Dementia paralytica.

Rozprawa czytana na posiedzeniach Towarzystwa Le-
karzy Podolskich 16go Listopada. 1go i 15go Grudnia
1863 roku

przez Dra Medycyny ADOLFA ROTHE.

(Ciąg dalszy — Obacz Nr. 28 b. r.)

III. OKRES.

*Okres dalszego rozwoju bezwładu t. j.: jawnego za-
jąkiwania się i stanu półporażonego czyli niedowładu
kończyn dolnych.*

Chory wyraźnie i jawnie się zająkiwa, często
zupełnie w mowie się zacina; przytém mowa nie-

wyraźna, zacinanie zaś powstaje wskutek tego, że
nie tylko trudność we władaniu językiem przema-
ga, ale i myśli nawet mu brakuje. Już nie tylko
pojedyncze głoski mozolnie się wymawiają, albo
wyrazy, które chory jeszcze się stara określać in-
nemi, lecz w ogóle wszystkie głoski i dźwięki wy-
mawia z trudnością. Mięśnie twarzy w wielu ra-
zach przedstawiają kuczowe drgania lub ściąganie
się przenoszące się nawet i na gałki oczne, wskutek
czego następuje albo ciągle zawracanie i rzucanie
lub też wyteżenie oczu w pewnym kierunku. Jeden
lub drugi z kątów ustnych więcej podniesiony lub
obwisły, lecz to niezawsze; język za to drży kur-
czowo, wysunięty zaś z ust, trudno utrzymuje się
w jednem położeniu, ale wysuwa się lub też wsuwa
nieustannie. Wraz z temi oznakami pojawia się i
stan porażenia kończyn dolnych, nie zupełnie je-
szcze jawny dla chorego, który jest przekonany o
swojej sile i zręczności; lecz zwracającemu uwagę na
ruchy przyspieszone, naprzykład prędkie chodzenie,
skakanie, taniec lub wejście na schody, stan nie-
dowładu (*paresis*) jawnie się okazuje, chód cho-
rego mozolny, nogi podnosi powoli, stąpając robi
kroki krótkie, szeroko nogi rozstawia, powłócząc
to jedną to drugą nogą; chory prędko się utrudza,
w skutek czego rad leży. leżąc zaś ruchy dolnych
kończyn ma nibyto wolniejsze, lecz nacechowane
pewną stężalnością i powolnością powstałą nie tylko
przez stan niedowładu i osłabienia ale i wskutek
skurczenia, naprzykład kolana; skurczenia te zni-
kają niekiedy chwilowo, i dają choremu znów mo-
żność przechadzania się; lecz nie tylko w kończy-
nach dolnych ale i w górnych takiego rodzaju zmia-
ny spostrzedz się dają tak, że chory staje się nie-
zdolnym do jakich bądź robót ręcznych, wyma-
gających większej dokładności. Cały tułów w tym
czasie traci sprężystość, i widocznie siła mięsni-
wa potrzebna do utrzymania jego powoli znika
Stan ten niedowładu odbija się także i we zwie-
rączach n. p. pęcherza moczowego i odbytnicy;
albowiem częste zaparcie stolca i zatrzymanie mo-
czu bynajmniej nie należą do wyjątkowych przy-
padków, dla tego to lekarz zawsze powinien mieć
baczne oko na te czynności, aby w razie potrzeby
zastosować środki należyte t. j. leki rozwalniają-
ce i cewnik. Jeszcze niemal częściej, napotykać
można niepożamowane rozwolnienie wynikające ze

sprawy grzliczej albo nieżytu w mieszkach kiszkowych (*foliculi*) rozszérzającego się na błonę śluzową jelit. Stan taki częstokroć przyspiesza zgon chorego. Łaknienie przytém zwykle nieprawidłowo powiększone tak, że chorzy wszystko co tylko dostać mogą, z prawdziwą pochłaniają żarłocznością. Chorych takich w tym okresie nadzwyczaj trzeba pilnować, albowiem rzadko albo i weale nie mówią o swych cierpieniach cielesnych, dla tego téż lekarz sumienny często zmuszony jest badać narzędzia piersiowe, aby odkryć rozwijające się cierpienia płuc i dróg oddechowych, które w tym okresie częstokroć się znajdują.

To samo t. j. ogólną słabość i stan niedowładu napotykam tak ze strony ciała jak i umysłu.

Wyobraźnia nadzwyczaj tępa, niedokładna i rozerwana w początku tego okresu, znika nakoniec zupełnie, albowiem nadzwyczaj mała część wrażeń zmysłowych dochodzi do świadomości w mózgu, a ztąd i wszystkie uczucia nikną zupełnie. Wraz z uczuciami znikają i obłądne wyobrażenia (*Wahnvorstellung*), albo przemieniają się w częste powtarzanie niektórych słów, bez żadnej myśli i związku. Pamięć znika, tak dla zdarzeń przeszłych jako i dla teraźniejszych do takiego stopnia, że chory nie poznaje najbliższych mu osób lub przedmiotów; nawet przyzwyczajenia, które każdym kierują człowiekiem, dla niego więcéj nie istnieją i ani ochędństwo, ani wstydlivość nie mają dla nich więcéj znaczenia, w skutek czego około takich chorych największa panuje nieczystość, a nawet w obecności obcych osób bezwstydlivo oddają się swym nałogom np. samogwałtowi.

Toż samo bywa i z wolą chorego; własnej woli nie ma on weale, a do wszystkich działań potrzebuje pewnego zewnętrznego popędu, zmuszającego go nawet do przyjęcia pokarmów, albowiem i o nich zapomina. Słowem z tego wszystkiego cośmy dotychczas przytoczyli, widocznie wynika, że wszystkie sprawy umysłowe i rozumowe zupełnie upadają. Złudzenia jednak i teraz jeszcze prześladowają chorych, co ich nieraz doprowadza do uczynków nadzwyczaj śmiesznych i dziecinnych, tak np. chory zbiera kamyczki, różnorodne skorupy i szmaty, które jak najstaranniej chowa, aby je potém mógł pokazać i z dumą mówić o swych bogactwach, wpadając w pewien rodzaj uniesienia umysłowego, które

jak się nagle pojawiło tak i znika prędko, zostawiając po sobie zupełną obojętność i tępotę (*apathia*). Nawet i gniew szalony niekiedy następuje, lecz po większej części w nocy, rzadko we dnie, w którym to wypadku postrzegamy przyspieszony obieg krwi, twarz zaczerwienioną, oczy błyszczące i ciepłotę głowy podwyższoną. W każdym zaś innym czasie otępienie i obojętność jawnie się okazuje w wyrazie twarzy, która znamionuje pewną tępotę umysłu, uśmiech głupowaty a przytém mina zadowolona. W innych zaś wypadkach chory mrukliwy i ponury, unika towarzystwa i siedzi po większej części zupełnie obojętny w jakim bądź kącie, nie troszcząc się o to, co się w około niego dzieje.

IV. OKRES.

Okres zupełnego rozwinięcia bezwładu.

Większa ilość chorych w poprzedzającym okresie kończy życie, albo w skutek niepohamowanego rozwolnienia, albo téż rozwijających się chorób płucnych; ci zaś, którzy do ostatniego okresu wytrzymają, przedstawiają obraz najwyżej rozwiniętego bezwładu i najwyższy stopień tępoty umysłowej. Nie tylko samowiedza i całe życie umysłowe zniszczone, lecz pojawia się tutaj nadto brak zupełny udzielania się i związku ze światem zewnętrznym. Chory leży lub siedzi obojętny i stępiły; nie go nie wzrusza, jeno widok pokarmów, które ze zwierzęcą chwyta żarłocznością. Na pytania po większej części weale nie odpowiada, albo tylko słowem pojedynczym, oderwanym wyraża swoje zadowolenie. Porażenie i osłabienie cielesne do takiego rozwinięte jest stopnia, że chory zupełnie nie jest w stanie chodzić, siedzi zwykle nie dbale nachylony, głowa obwisła na piersi, ręce wątle i bezwładnie zwieszono; często spada z krzesła lub z ławki, co dowodzi, że i ta podpora nie jest w stanie podtrzymać ciała bezsilne, i chorzy zmuszeni są pozostać w łóżku, z którego już więcéj nie wstają. Leżą oni w niem bez ruchu, nie zmieniając nawet raz przyjętego położenia, oczy zapadłe, bez blasku i wyrazu, rysy twarzy zapadłe i tak zmienione, że częstokroć trudno poznać osobę, włos zwykle siwy i rzadki.

Wszystkie pięć zmysłów zupełnie wstrzymane w swęj czynności, chory leży z odemkniętymi oczyma, lecz nie widzi, najmocniejsze uszczypnięcie

skóry nie wywołuje bólu i t. d. Z tego to powodu tak częste bywają nieszczęścia przy niedbałym pilnowaniu chorych, tak np.: chory usiadł przy kominię rozpalonym nie czując gorąca. Także i na mięśnie tułowia porażenie wywiera swój wpływ, wdychanie i wydychanie staje się nadzwyczaj powolnym, klatka piersiowa ledwie się porusza i ciecze nagromadzone w drogach oddechowych nie mogąc być z tamtąd wydalonemi, objawiają obecność swoją przysłuchującemu się najróżnorodniejszymi rzężeniami wilgotnemi, do których często się dołącza zrazikowe zapalenie płuc zakończające życie chorego. (D. c. n.)

WIADOMOŚĆ

Z DZIEDZINY ELEKTROTERAPII

podał Dr. ROSENBERG

lekarz praktyczny w Krakowie.

(Ciąg dalszy. Ob. Nr. 28).

Ostatecznie także w położnictwie próbowano elektryczność zastosować.

BERTHOLON we Francyi, HERDER, STEIN i KILIAN w Niemczech, RADFORD i BARNES w Anglii zalecali ją przy słabych bólach porodowych, krwotoku macieznym i kilku przypadkach łożyska poprzedzającego (*placenta praevia*).

Jeżeli po tym środku rzeczywiście bóle porodowe powstały, lub wzmocnione zostały, podług mniemania SIMPSONA i SCANZONIEGO, stało się to przypadkowo, galwanizm bowiem, jak oni sądzą, w położnictwie zupełnie jest bezużyteczny.

MACKENZIE atoli doświadczeniami potwierdził, że prąd zmienny (indukcyjny) w przypadkach łożyska poprzedzającego (*placenta praevia*), w których krwotok ani tamponowaniem ani innymi środkami nie mógł być zatamowany, jedynie skutek ten sprawił, i że więc w podobnych wypadkach tenże jest niezbędnym.

Przystępując do opisu przypadków, które leczycy zapomocą elektryczności sam miałem sposobność, zaczynam od porażen mięśni ocznych.

Nim jednak przystąpię do ich szczegółowego opisanie, nie będzie może zbyt cennym kilku słów wspomnieć o nerwach ruchomych, w które mięśnie oczne są zaopatrywane.

1. Wspólny nerw mięśni ocznych czyli nerw okoruchowy (*n. oculo-motorius, seu oculo-muscularis communis*) t. j. trzecia para nerwów mózgowych.

Dostawszy się do oczodołu nerw ten dzieli się na dwie gałęzie: górną i dolną. Pierwsza zaopatruje mięsień prosty górny (*rectus superior*) i podnoszący powiekę górną (*levator palpebrae superioris*); druga dzieli się na trzy gałązki:

- a) zewnętrzną czyli długą wstępującą do m. ukośnego dolnego (*obliquus inferior*) i oddającą korzeń krótki zwoju rzęskowego (*radix brevis ganglii ciliaris*).
- b) dolną do mięśnia prostego dolnego (*rectus infer*).
- c) wewnętrzną do m. prostego wewnętrznego (*rect. intr*).

Ztąd wynika że trzecia para oprócz mięśnia prostego zewnętrznego i ukośnego górnego wszystkie mięśnie oczne zaopatruje.

2. Nerw odwodzący (*n. abducens*) t. j. szosta para nerwów mózgowych.

Pod wpływem tego nerwu pozostaje jedynie mięsień prosty zewnętrzny. Kilka włókien łączy go ze spletem tętnicy głowowej (*plexus caroticus internus*) z nerwu zwojowego pochodzącym.

3. Nerw błędkowy (*n. trochlearis seu patheticus*) t. j. czwarta para nerwów mózgowych.

Połączywszy się czasem pierwój włókieńkiem z nerwem ocznym i podoczodołowym (*nervus ophthalmicus, infraorbitalis*) pień tego nerwu wstępuje do mięśnia ukośnego górnego (*obliquus superior*).

Nerwy wyliczone albo każdy z osobna może uleść porażeniu, co najczęściej bywa, albo wszystkie razem, co rzadko ma miejsce; wypadek pierwszy porażeniem częściowem, drugi ogólnem nazywamy.

Z sześciu przypadków porażen mięśni ocznych przezemnie leczonych wszystkie były częściowe.

Pierwszy przypadek.

Porażenie powieki górnej mięśnia prostego górnego i ścięśniającego źrenicę czyli obrączkowego tęczy w prawém oku *).

Pani S. z S, licząca lat 29, budowy silnej, nigdy nie cierpiała choroby będącej w związku lub jakimbądź stosunku z obecną.

*) Pięć przypadków z łaski P. Profesora SŁAWIKOWSKIEGO mi było przysłanych, szósty przypadek zawdzięczam szanownemu koledze Dr. BLUMENSTOCKOWI.

Przed kilką miesiącami kamień z znacznej odległości rzucony uderzył ją w prawą stronę czoła, ponad okiem. Rana powstała wprawdzie mała i nieznaczna, przecież powieki zaraz nabrzękły i silny ból powstał nie tylko w częściach nadwierzchnych, ale i w oku samém. Powiek z przyczyny obrzęknięcia nie można było otworzyć. Używając środków przeciwzapalnych i innych po dłuższym przeciągu czasu o tyle cierpienia się pozbyła, że obrzmienie i ból zupełnie ustąpiły, ale powieki górnej podnieść nie zdołała. Rozmaite wcierania wyskoku i maści całkiem były bezskuteczne. W tej doli chora żgo Lipca przeszłego roku do mnie się udała.

Blżej obejrzawszy okolice czołową, nie znalazłem nigdzie śladu skaleczenia.

Przy prawidłowym układzie głowy powieka górna prawego oka była na dół obwisła, gałkę oka zupełnie zasłaniając. Chora nie mogła jej bynajmniej podnieść i tylko przy przechyleniu głowy i silnem napięciu mięśnia tyłogłowo-czołowego (*occipito-frontalis*) powieka o tyle się podniosła, że twardówka na szerokość tyła noża się ukazała.

Podniesiona palcem powieka, po oddaleniu ręki natychmiast opadała. Gałka oka przy sztuczném otwarciu powieki ku dołowi zwrócona (*buscitas inferior*), jej ruchy w prawo i w lewo prawidłowe, ku górze i na dół jednak niepodobne, również i ruchów obrotowych chora tēm okiem wykonywać nie mogła. Źrenica rozszerzona i nieruchoma. Widzenie nieupośledzone, bólów nie było.

W tym przypadku przerwane było przewodnictwo w pierwszej gałęzi nerwu okoruchowego i korzeniu krótkim zwoju rzęskowego (*gangl. ciliare*). Dla tego po ustaniu czynności tychże nerwów nastąpiło porażenie mięśni w nie zaopatrzonych: t. j. w podnoszącym powiekę górną, w prostym górnym, i w obrączkowym tęczówki.

Zalecono chorąj leczenie zapomocą faradyzacji*), na co też przystała. Spowodowany jej prośbami, że długo w Krakowie bawić nie może, postanowiłem leczenie przyspieszyć i dwa razy na dzień faradyzowałem. Każde posiedzenie trwało pięć minut. Skutek był nader pomyślny, gdyż już po szóstém zastosowaniu chora powiekę znacznie

podnosić mogła, a po dwudziestém czwartém prawidłowa powieki ruchomość powróciła. Zarazem mięsień prosty górny swoją czynność odzyskał, i gałka oka bez napięcia ku górze i dołowi poruszać się mogła.

Źrenica wprawdzie mało jeszcze oddziaływała (co łatwo się daje wytłumaczyć niemożnością stosowania prądu bezpośrednio lub nawet pośrednio do tęczówki, pobudzać ją tylko można drogą odruchów i dla tego dwadzieścia cztery posiedzeń nie wystarcza do zupełnego wyleczenia), chora jednak zupełnie zadowolona z pomyślnego skutku leczenia wyjechała.

Drugi przypadek.

Porażenie górnej powieki lewego oka.

N. z Królestwa mający lat 34, średniego wzrostu i silnej budowy, zawsze bywał zdrowy. Na początku Sierpnia przeszłego roku wystawił się na przeciąg powietrza będąc rozgrzany i spocony, natychmiast doznał gwałtownego strzykania w okolicy czoła po lewej stronie, gdy w tym samym czasie powieka górna opadła, tak, że jej podnosić od tego czasu nie zdołał.

Używane w domu środki nie sprawiły żadnego polepszenia, udał się więc do Krakowa szukając pomocy u P. Prof. SŁAWIKOWSKIEGO. Pobyt jego miał tu być bardzo krótki. Podczas leczenia Prof. SŁAWIKOWSKIEGO w pierwszych pięciu dniach ból czoła zupełnie ustąpił, a porażenie powieki o tyle się polepszyło, że chory wprzód zupełnie opadłą i przykniętą do dwóch linii od dolnej oddalić potrafił. W takiej doli chorego ku dalszemu leczeniu zapomocą elektryczności do mnie posłano. Jak wyżej już wspomniano, chory dłużej nad dwa dni bawić tu nie mógł, użyłem przeto dwa razy dziennie, a trzeciego dnia przed odjazdem ostatni raz faradyzacji, w ogóle więc pięć razy. Z przyczyny wygórowanej drażliwości chorego i nadszłości przy zastosowaniu prądu elektrycznego nawet mierniej siły, posiedzenie każde trwało tylko trzy minuty. Ruchomość porażonej powieki widocznie po każdym posiedzeniu się powiększyła, a po piątej faradyzacji do tego stopnia się posunęła, że chory z zadowoleniem powiekę aż ponad połowę gałki ocznej podnieść był zdolny. Z takim polepszeniem opuścił miasto, zapowiadając, że znów wróci, czego jednak nie dotrzymał. (D. c. u.)

*) MICH. FARADAY słynny wynalazca prądu indukcyjnego w r. 1831, od którego nazwa faradyzacji.

WYCIĄGI Z PISM LEKARSKICH.

JACCOUD: *Komissya stała ustanowiona przy szpitalu wielkim medyolańskim do zbadania wścieklizny.*

W czasopiśmie: *Gazetta medica Italiana Lombardia* 1863. Nr. 49 ogłosiła komissya wyżej wzmiankowana nowe wyjaśnienia o wściekliznie. Od 1854 do 1858 (przez $3\frac{1}{4}$ roku) nie zdarzył się w ogólnym szpitalu medyolańskim żaden przypadek wścieklizny, natomiast w następnym okresie wynoszącym 2 lata i 4 miesiące było przypadków niewątpliwych 6 (4 mężczyźni i 2 kobiety), wiek ważył się między 10 a 65 lat, jednakże czworo nieprzekroczyło lat 35. Pięcioro należało do okolicy Medyolanu, tylko jeden mieszkał w mieście samém. Pora wylęgania (*incubatio*) wynosiła u Arga od 30 do 100 dni, u jednego tylko 26 godzin, u innego nareszcie 141 dni. Przypadki zapowiednie i znamionujące były wszędzie wyraziste. Leczenie zapobiegawcze zastosowano tylko u 2ch chorych saletranem srebrowym, a i u tych nader niedokładnie tylko. Leczenie choroby saméj polegało na użyciu zimnej wody, atropinu, siarkanu chininowego, haczyszu; zakończenie było zwykle. Chory nieleczoney weale żył 189 godzin t. j. tak długo jak wynosi czas najdłuższy postrzegany przy użyciu sposobów leczenia najwięcej rozumowych. Chwila śmierci mieniła się między 55 a 190 godzin od pojawienia się przypadków zwiastunowych, oględziny pośmiertne niczego nowego nie nauczyły, jednakże stwierdziła komissya w 4ch przypadkach własność płynną i czarną krwi w sercu i wielkich naczyniach; dwukrotnie wyraźne nastrzyknięcie osłony (*neurilemii*) nerwu błędnego i wsteczne (*recurrens*).

Zalować należy, że Prof. GIOVANNI POLLI nie badał krwi mikroskopem zwłaszcza w jednym przypadku, miałby był sposobność doświadczenia prawdziwości swojego przypuszczenia co do sposobu działania jadu wścieklizny. Mniema on, że ślina psa pozostawiona w ranie kasanéj zawiera wymoczki, rozwijające się w témże samém miejscu przez czas mniej lub więcej długi: tak tłumaczy porę wylęgania. Kończy się ona zdrażnieniem rany saméj zawisłém od rozmnożenia się (*proliferatio*) tudzież rozwojem kroci tysięcy tychże żyjatek we krwi: natędy wybucha choroba i zabija w kilku dniach. Dla sprawdzenia tego przypuszczenia komissya założyła sobie zbadać 1) ślinę i krew psa wściekłego zaraz po śmierci tegoż, 2) krew pokasanych ludzi przy pojawieniu się pierwszych przypadków w ciągu choroby i 3) nakoniec po śmierci. (*Gaz. hebdom. 1864. 4. Centr. 1864. N. 15*).

CRITCHETT: *O zapaleniach oczu spółczulnych (ophthalmiae sympathicae). Wykład i rozprawa ustna na zjeździe oftalmologicznym w Heildelbergu. Wrzesień 1863.*

(*Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1863. 440 — 450*).

CRITCHETT rozumie pod zapaleniem oczu spółczulnym każde zapalenie wywołujące się skutkiem za-

palenia traumatycznego oka jednego na oku drugim. Zwykle obrażenie tęczówki i okolicy rzęskowej jest przyczyną pierwotną; nader często we wnętrzu ocznym tkwi jeszcze ciało obce. Po upływie niejakiego czasu, po kilku dniach aż do kilku miesięcy, w przecięciu po 6 blisko tygodniach wszczynają się objawy spółczulnego cierpienia na oku nicobrażonym. Następuje lekkie zamglenie wroku, łzawienie, światłowstręt; tworzy się pas różowy otaczający rogówkę, w końcu utrata połysku ocznego, gałka mięknieje, komórka przednia wysunięciem tęczówki bywa zajęta. Zrenica się ścięśnia, na brzegu zrenicznym tworzą się tęgie sklejenia z torebką sozewkową przednią; ostatnia maści się i tężeje, później nakoniec i sozewka sama naruszona zostaje.

Wycięcie pierwiastkowo obrażonego oka dostarcza wtenczas, kiedy zapalenie spółczulne już wybuchło, mało lub nie daje żadnej korzyści. Zachodzi więc pytanie, czy w przypadku obrażenia ocznego z utratą wzroku, i jednoczesnym przewlekłym zdrażnieniem oka drugiego nie byłoby najstosowniej, przedsięwzięść wyluszczenie oka obrażonego, nie czekając jawnego zapalenia lub oznak niewątpliwego zdrażnienia w oku drugim. Przypadków takich w każdym razie potrzeba jak najtroskliwiej doglądać, aby wraz z pierwszym wystąpieniem zjawisk spółczulnych móż natychmiast wzięść się do dzieła. Irydektomią tyle cenną w innych postaciach zapalenia tęczówki wykonywał CRITCHETT dotychczas zawsze w zapaleniu oka spółczulnym, przekonał się jednakże z czasem dostatecznie o jej nieskuteczności w takich razach. Uskutecznienie takowej bywa trudne, czasem niepodobne, tęczówka okazuje się tak tęgą, oporną i przyrosłą, że ją tylko z największą trudnością wyciągnąć można, ba nawet w wielu przypadkach mimo najrzęczniejszych usiłowań jest niepodobnym wyciąć z nięj kawałek; a jeśli się uda utworzyć źrenicę sztuczną, to okazuje takowa nadzwyczajną skłonność do zwarecia się na nowo, a oko miéwa się potem mniej dobrze niż przedtém. CRITCHETT skłania się zatem, aby na przyszłość przypadki takie leczyć poprostu pohytem w miejscach zaciemnionych, użyciem leków kojących i innymi środkami odpowiedniami doli ogólnej chorego. Jak skoro choroba się wyczerpnie a oko stanie się nieczulnym, jeśli pozostanie błona rzekoma zamykająca źrenicę lub gdy sozewka się ściemni, radzi Cr. wydobycie tężce.

W następnej nad tēm rozprawie poczynił uwagę GRÄFE, że CRITCHETT jedną postać spółczulnego zapalenia oka, mianowicie owo złowrogie zapalenie tęczówki i krążka rzęskowego (*Iridocyclitis*) wiernie według przyrody opisał i dodał jako znamię istotne tegoż cierpienia wczesne pojawienie się grubszych naczyń w tęczówce. Oprócz tego jednakże uważać można jeszcze postać drugą mniej smutną w obrazie zapalenia tęczówki zwanego surowiczém (*Iritis serosa*).

Warunki do powstania tak postaci jednej jako i drugiej zapalenia oka spółczulnego są: 1) pozo-

stanie ciał obcych jako trwała przyczyna drażniąca; 2) trwanie przeciągle zapalenia tęczówki i krążka rzęskowego (*Iridocyclitis*) oka obrażonego, objawiające się między innymi także miejscową tkliwością okolicy rzęskowej za dotknięciem tężce listkiem mirtowym; 3) powtarzające się krwotoki śródoczne ze szybko zmiennem naprężeniem; 4) złoży wapienne, zwłaszcza jeżeli takowe podtrzymują tkliwość znaczną. Co do rokowania i wartości irydektomii w spółczulnem zapaleniu tęczówki i krążka tęczowego zgadza się w istocie Gr. z CRITCHETTEM. Przy wywiązaniem już zapaleniu spółczulnem zawsze zalecić należy wyluszczenie, mimo jego niepewności we wstrzymaniu zapalenia krążka rzęskowego. W celu zaś zaradczym przy ciałach obcych śmieliej niż dotąd pokusić się można o ich wydobycie z wnętrza ocznego. Śród innych okoliczności np. przy trwającym zapaleniu tęczówki i krążka rzęskowego lub wynaczynieniach krwawych w oku obrażonem, miasto wyluszczenia wywołać można ku otrzymaniu dobrego trzonu zapalenie naczyńki (*chorioiditis*) ropiaste z pomocą nitki przewlezionej przez ciało szklane, gdyż nigdy nie widać podczas ropiastego rozplywu z zapaleniem oka całkowitem (*Panophthalmitis*) wywęzującego się cierpienia spółczulnego w oku drugiem.

CRITCHETT postrzegał także spółczulne zapalenie tęczówki surowicze (*Iritis serosa*), nie rozciągnął jednak do niego swych uwag, poczytując je również za mniej groźne.

DONDERS wspomina jeszcze o trzeciej postaci spółczulnego cierpienia: oko drugie zapada bez widocznego materialnego uszczerbku na nader silny światłowstręt i zupełną niezdatność. Postrzegał przypadki, w których chorzy mienili się całkiem oczmiiałymi, a tuż po wyluszczeniu galki ocznej (w której tkwiło ciało obce) odzyskali w zupełności wzrok prawidłowy. (*Centralbl. 1864. N. 16*).

Bromek potasu przeciw padaczce.

R. M^r DONELL zaleca na zasadzie kilku opisów chorobowych na nowo Bromek potasu przeciw padaczce, szczególnież wtedy, kiedy liczba napadów jest w pewnym stosunku do miesiączki. Podawał po 10—20 ziarn trzy razy na dzień, podwyższając niekiedy dawkę do 30—40 ziarn.

(*Dubl. Quart. Journ. 73. pag. 43. 50. — Centr. 1864. N. 16*).

ROZMAITOŚCI.

Ruch chorych w szpitalu Starozakonnym krakowskim

w miesiącu Czerwcu r. b.

Pozostało z końcem Maja r. b. chorych	m.	21	k.	14	razem	35
Przybyło w ciągu Czerwca r. b.	n.	15	n.	13	n.	28
Leżono więc ogółem	n.	36	n.	27	n.	63
Z tej liczby: wyzdrowiało	n.	12	n.	7	n.	19
wyszedł nieuleczony	n.	1	n.	—	n.	1
umarło	n.	3	n.	1	n.	4
Pozostało z końcem Czerwca r. b.	n.	20	n.	19	n.	39
Razem jak wyżej	n.	36	n.	27	n.	63

Liczba chorych dzienna najwyższa dnia 24go, 27go, 30go=39, najniższa d. 6 = 34; średnia przeciętna = 36²/₁₅; po potrąceniu więźniów za długi = 33²/₁₅.

Z chorób ostrych najliczniejszym był nieżyt przewodu pokarmowego; zapalenie płuc i durzyca wydarzały się tylko pojedynczo. Pomiędzy niemocami przewlekłemi, jak zawsze rej wodziła gruźlica płucna, do której także wszystkie 4 przypadki śmierci odnieść należy, tężce mianowicie ulegli: chłopczyk 5letni z domu sierot; tandeciarz 28letni, i więzień 70 lat wieku liczący, oraz żebraczka 42 lat majaca. Zimnica dawniej tak częsta i liczna od niejakiego czasu rzadszém jest zjawiskiem.

Poza szpitalem zapalenie płuc nawiedzało nagminnie prawie niemowlęta.

Ruch gości zdrojowych w Iwoniczu.

Piszą z Iwonicza pod d. 6 Lipca: W tej chwili znajduje się w kąpielach Iwoniczkich przeszło 90 rodzin czyli 270 osób, z których tylko 8 z Królestwa, 4 z Podola, reszta zaś z Galicyi. Dopiero od kilku dni mimo zimna i słoty liczba gości zaczyna się wzmacniać, ale jeszcze bardzo daleko do tego co było w latach przeszłych. (*Czas.*)

Ruch tegoroczny w zdrojowiskach czeskich.

W Karolowych Warach (Karlsbad) leżono do 15 Czerwca 2077 stron a 2886 osób, z których 362 stron już było wyjechało. W Cieplicach do dnia 3 Lipca stron 904 a osób 1306, stron 88 już się było wydalilo. U wód Maryańskich (Marienbad) do dnia 3 b. m. stron 458 a osób 644, u wód Franciszka (Franzensbad) do 1go Czerwca stron 213 a osób 323.

WIADOMOŚCI BIBLIOGRAFICZNE.

NAJNOWSZE DZIEŁA LEKARSKIE ZAGRANICZNE.

Vogel, Dr. Alfr. Lehrbuch der Kinderkrankheiten. Mit 6 lithgr. Tafeln. Zweite Auflage. Erlangen 1863.

Oppenheimer, Dr. Z. Lehrbuch der physikalischen Heilmittel für Aerzte und Studierende der Medizin. Zweite (Schluss-) Lieferung. Mit vielen in den Text gedruckten Holzsehnitten. Würzburg, 1862.

Paulicki, Dr. A. allgemeine Pathologie, Erste Abtheilung: die Störungen der Formation, 2te Lieferung. Mit zahlreichen Holzsehnitten. Lissa, 1863.

Reuss, Dr. A. E. geognostische Skizze der Umgebungen von Carlsbad, Marienbad und Franzensbad. Prag 1863.

Neue chemische Analysen einiger Mineralquellen von Carlsbad, Marienbad, Franzensbad und dessen Umgebung. Prag, 1863.

Hlaváček, Dr. E. Abriss einer medizinischen Geschichte von Carlsbad. Prag, 1863.

Cornelius, J. B. Ein Winter- Aufenthalt in Pau, als Heilmittel für Alle, welche an Krankheiten der Hals- und Brustorgane leiden oder sonst von schwacher Gesundheit sind. Nebst einigen Notizen über die wichtigsten Mineralquellen in den Pyrenäen. Hamburg, 1864.

Powyższe dzieła nabyć można w Księgarni **D. E. Friedleina** w Krakowie.