

BIURO REDAKCYI
Ulica Grodzka Nr. 73.
ADMINISTRACYJA
Ulica Szewska Nr. 207.

Ekspedycja miejscowa
w księg. St. Krzyżanowskiego
Rynek główny Nr. 30.

PRZEGLĄD LEKARSKI

Wychodzi
co sobota
w objętości 1—1½ arkusza.

Redakcya zwraca się tylko
w skutek wyraźnego zastrzeżenia

Organ Towarzystwa lekarskiego krakowskiego.

wychodzący pod redakcją

Prof. Dra L. Blumenstoka.

Ajencyje główne:

w Warszawie w księgarni
Gebethnera i Wolffa,
w Poznaniu w księgarni
M. Leitzgebra i Wsp.

Przedpłatę przyjmują:
1) Administracyja; 2) Ajencyje obok wymienione;
3) w Król. Polskiem i w Ces. Rosyjskiem Urzędy poczt.

Cena Przeglądu Lekarskiego wynosi: w Krakowie: rocznie zła 6, półrocznie 3, kwartalnie 1-50 w Ces. Austrijackiem: 6-60, 3-30, 1-80; w Ces. Niemieckiem: 14. 7. 3-50 marek; w Królestwie Pol. i Ces. Rosyjskiem, a mianowicie: w Warszawie: rocznie 5 Rsr. półrocznie 2½ Rsr. na Prowincyi: 6 i 3 Rsr. — Cena ogłoszeń, które przyjmuje Redakcya wynosi: Za wiersz drobny (petit) lub miejsce tegoż po 5 ct. Numer pojedynczy kosztuje 15 ct.

TREŚĆ: I. SZEPAROWICZ. Przyczynki do kazuistyki chirurgicznej. Dodatek do kazuistyki chirurgicznej czaszki i jej treści. — II. Z oddziału chorób skórnych i wenerycznych Dra Zarewicza lek. ord. w szpitalu św. Ducha w Krakowie. SKOBEL. Nowy sposób leczenia kłykcin wilgotnych za pomocą rozciekku azotanu srebrowego i cynku litego. (C. d.) — III. Oceny i wyciągi. PARROT. O zniepokobieniach czaszki; sprawozdanie Dra Kwaśnickiego. AUSPITZ. O wycinaniu wrzodu kilowego; sprawozdanie Dra Obtulowicza. ADAMKIEWICZ. BAER. RADCLIFE. — IV. Posiedzenia towarzystw: Sekcyja Lekarska Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. — V. Wiadomości bieżące.

I. Przyczynki do kazuistyki chirurgicznej.

Napisał Dr. J. Szeparowicz,

prymaryjusz w głównym szpitalu we Lwowie.

Dodatek do kazuistyki chirurgicznej czaszki i jej treści.

(Nr. 24 — 31 Przgl. Lek.)

W numerze 30 Przgl. Lek. podalem jako środek zapobiegający niebezpiecznym powikłaniom ran na głowie, opatrywanie takowych sposobem Listra. Kreśląc naówczas kazuistykę opierałem swe twierdzenie bardziej na analogii doświadczeń, aniżeli na własnych odnośnych doświadczeniach. Od owego czasu atoli zwróciłem szczególną uwagę właśnie na dział ran na głowie, a stósując konsekwentnie w każdym ciężkim przypadku Listrowski sposób opatrywania nagromadziłem tyle korzystnych doświadczeń, że na tój podstawie śmiało, a nawet z większym jeszcze naciskiem, mogę powtórzyć twierdzenie naówczas tylko apryjorystycznie uczynione. Szan. czytelnicy raczą mi więc pozwolić, ażebym ogłosił szczegółowy opis przebiegu gojenia niektórych przypadków ran na głowie przy użyciu Listrowskiego sposobu opatrywania spostrzeganych w ostatnich czasach, a porównanie tego biegu ze znanyim już przebiegiem przy dawniejszym, niestety jednak jeszcze nie zupełnie wyrugowanym, sposobie opatrywania wykaże dobitnie, że tak jak z jednej strony bezsilną jest sztuka lekarska w obec już rozwiniętych powikłań chorobowych, tak z drugiej bardzo wiele może ona uczynić pod względem zapobiegania tym powikłaniom. Wszystkie te przypadki, których opis poniżej umieszczam, leczone były na oddziale chirurgicznym w naszym szpitalu.

Przypadek I. Galar, wyrobnik, 24 lat, pobity 16/8 b. r.; rozpoznanie: 1) *Vulnus contusum in regione temporalis dextra, 3 cm. longum. denudatio ibidem ossis temporalis magnitud. centimi.* 2) *Vulnus contusum frontis 1 cm. l. usque ad periosteum penetrans.*

Iszy opatrunek Listrowski z uciskiem według Volkmana nałożono 17/8 na ranę skroniową po dokładnem wyczyszczeniu rany i przepłókaniu 4% rozczyntem karbolowym; ranę na czole zaopatrzono zwykłym sposobem jutą. Na drugi dzień znaleziono: opatrunek na skroni suchy, natomiast na czole przesiąknięty i cuchnący; znaczny obrzęk sąsiedniej powieki; wyczyszczono więc i tę ranę

5% rozczyntem karbolowym i nałożono Listrowski opatrunek.

2gi opatrunek 21/8; ani kropli ropy; obrzęk ustąpił; na skroni przylega zupełnie dolny płat, który był na 3 cm. podminowany; w dniu 29/8 zdjęto ten opatrunek i stwierdzono zupełne wygojenie; blizna była tak suchą i i tęgą, że niezawodnie już kilka dni przedtém musiała być gotową. A zatem gojenie trwało tylko 12 dni, opatrunków użyto tylko dwa, a ropienia nie było żadnego.

Przypadek II. Michał Gołos, 26 lat; rozpoznanie:

1) *Vulnus caesum occipitis 5 cm. longum, ibidem vulnus caesum ossis occipitis usque in diploen penetrans 3 cm. longum.* 2) *Vulnus caeso-contusum frontis lobatum, ibidem denudatio ossis frontis magnit. centimi.*

Iszy opatrunek: 13/8 po dokładnem wyczyszczeniu ran 4% rozczyntem karbolowym, brzegi ran ściągnięto taśmą gazową powyżej opatrunku nałożoną; w dolny kąt rany czołowej włożono malutki sączek; opatrunek Listrowski połączono z uciskiem według Volkmana.

2gi opatrunek 15/8 nałożono tylko na czole, albowiem opatr. na tyłogłowie był zupełnie suchy; spray 2%.

3ci opatrunek 21/8; zdjęto oba opatrunki; na tyłogłowie jednak stwierdzono zupełne wygojenie i zupełny brak jakiegokolwiek przesączyny na opatrunku; rana na czole zupełnie zgojona z wyjątkiem wązkiej smugi ziarnkowej wzdłuż sączka, z głębi rany jednak nie wychodzi ani jedna kropla ropy, dlatego oddalono sączek.

4ty opatrunek 23/8 nałożono zbyt ciężko, albowiem rana zupełnie już była wygojona z wyjątkiem owęj ziarniny powierzchniowej, którą pomazano lapisem. 5 opatrunek; 29/8 jeszcze raz tuszowano. W dniu 31/8 wypuszczono chorego zupełnie wyleczonego; a zatem gojenie rany na czole trwało 18 dni li skutkiem użycia sączka tak długo, i użyto 5 opatrunków, można było jednak poprzestać na 3; gojenie zaś rany na tyłogłowie trwało tylko 8 dni, sądząc jednak po wejrzaniu blizny po zdjęciu pierwszego opatrunku, musiało zupełne wygojenie już na kilka dni przedtém nastąpić i użyto tylko jednego opatrunku.

Przypadek III. Jurko Czerwiński; rozpoznanie: *Vulnus contusum in regione tempor. dextra 3 cm. long. ibidem denudatio ossis tempor. magn. unguis.*

Iszy opatr. 4/9 po wyczyszczeniu rany 5% rozczyntem karbolowym, ucisk według Volkmana.

2gi opatr. 6/9; kilka kropel ropy bardziej z powierzchni aniżeli z głębi rany.

3ci opatr. 12/9; rana zgojona; tylko malutka powierzchniowa smuga ziarnkowa, którą tuszowano; wtedy już można było usunąć Listrowskie opatrywanie, mimo to jednak nałożono jeszcze jeden 15/9, a w dniu 20/9 chory był zupełnie uleczony; a zatem gojenie trwało 16 dni, a opatrunków użyto czterech; ropy było w ciągu całego gojenia co najwięcej 10 kropel i to widocznie skutkiem użycia 5% roztworu karbolowego.

Przypadek IV. Dmytro Czuchraj, 13 lat; rozpoznanie: *Vulnus contusum capitis lobatum 6 cm. longum, ibidem denudatio ossis parietalis sin. magnitud. thaleri.*

1szy opatrunek 29/8; zrobiłem przeciwotwór u podstawy płata i włożyłem tam mały sączek, brzegi rany zespołem 6 szwami z katgutem, przeczyszcłem ranę 4% roztworem karbolowym, ucisk według Volkmana.

2gi opatr. 30/8. Spray 2%; płat przylega zupełnie do podstawy.

3ci opatr. 31/8; ropienie bardzo nieznaczne w miejscu gdzie sączek.

4ty opatr. 7/9; usunięto sączek.

W dniu 11/9 rana zupełnie wygojona; w ciągu leczenia jednak przyłączyła się bardzo złośliwa błonica gardła, powikłana z dławcem krtani i oskrzeli; wbrew przedstawieniu i odradzaniu zabrali rodzice chorego ze szpitala; gojenie więc rany trwało tylko 13 dni; użyto zaś tylko czterech opatrunków.

Przypadek V. Ignacy Kaleczak; rozpoznanie: 1) *Vulnus contusum capitis lateris sinistri lobatum 5 cm. longum, ibidem denudatio ossis parietalis sin. magnitud. unguis*; 2) *Vulnus contusum occipitis lobatum 6 cm. longum, ibidem denudatio ossis occipitis magnitud. 4 cm.*; 3) *Vulnus contusum occipitis 1 cm. long. usque ad periosteum penetrans.*

1szy opatrunek Listrowski 2/9 po wyczyszczeniu rany 4% roztworem karbolowym; ucisk według Volkmana.

2gi opatr. 3/9. Spray 2%.

3ci opatr. 10/9; wszystkie rany wygojone; tylko na jednej malutka (około 1/2 cm. długa a 2 mm. szeroka) smuga ziarnkowa nie pokryta jeszcze przyskórkiem; tuszowano kamieniem piekielnym.

W dniu 20/9 wypuszczono chorego zupełnie uleczonego; a zatem gojenie tych ran wielkich a nadto stłuczonych i powikłanych z rozległym obnażeniem kości trwało tylko 18 a raczej tylko 8 dni; opatrunków użyto trzech.

Przypadek VI. niewątpliwie najcięższy. Antoni Repeta, młody chłopiec, ugodzony całym stosem cegieł w czoło, które spadły na niego ze znacznej wysokości w dniu 11/9. Rozpoznanie: *Vulnus frontis lacerum 6 cm. longum; conquassatio summa partium mollium, ibidem denudatio ossis frontis magnitud. 4 centimi, impressio et fissura ossis frontis.* Miękkie warstwy podskórne były tak zmiżdżone, że musiałem je nożycami powycinąć, brzegi skóry zbyt stłuczone zrównałem nożycami, i zespołem je 6ciu szwami katgutowymi; w dolny kąt rany włożyłem mały sączek; w miejscu rany więc kość na znacznej przestrzeni po zespojeniu brzegów skóry tylko skórą była przykryta. Po wyczyszczeniu rany 5% roztworem karbolowym nałożyłem Listrowski opatrunek i ucisk według Volkmana.

2gi opatr. 12/9. Spray 2%. Ciepłota 38° C., wieczór 38.5.

3ci opatr. 13/9. Ciepłota 37.8° C., około 5 kropel ropy z sączka; obrzęk powiek obustronny. Wieczór ciep. 38.5.

4ty opatr. 14/9. Ciepłota 37.8, około 10 kropel gęstiej ropy z dolnej części rany, obrzęk mniejszy. Wieczór ciepłota 38.2.

5ty opatr. 15/9. Ciepł. 37°, ropienia niema żadnego. Wśród porostu włosów na wierzchołku głowy odkryto dru-

gą ranę stłuczoną ograniczoną do miękkich powłók; wyczyszczono ją i zaopatrzono jutą. Wieczór ciepł. 37°.

6ty opatrunek 17/9 wyjęto sączek; ropy ani kropli niema.

7my opatr. 20/9; rana na czole zupełnie wygojona; skóra na całej przestrzeni obnażonej kości przyrosnięta do niej. Rana na wierzchołku głowy czystą ziarniną wypełniona, jednak jeszcze nie wygojona.

Oprócz tych przypadków znajduje się jeszcze kilka obecnie w leczeniu z równie pomyślnym przebiegiem. Stanowczo oświadczam, że takich wyników leczenia ran na głowie dotychczas jeszcze nie widziałem przy żadnym innym sposobie opatrywania, muszę jednak zwrócić uwagę, że ucisk według Volkmana w tym sposobie leczenia jest bardzo ważnym, albowiem widziałem, że płaty zlepiają się już pod pierwszym opatrunkiem, przy silnym ucisku, który właśnie na głowie daje się łatwo skutecznie z powodu podstawy kostnej; zresztą przekonałem się o tym w sposób bardzo przekonujący w innym przypadku, który się jeszcze obecnie znajduje w leczeniu na moim oddziale, a mianowicie w przypadku, w którym wykonałem resekcję stawu barkowego z powodu próchnienia główki barkowej. Mimo opatrunku Listrowskiego było w tym przypadku ropienie bardzo znaczne przez pierwszych dziesięć dni; poczem użyłem znacznego ucisku ze wszystkich stron na ropiejącą torbę, co w sposób namacalny już w dwóch dniach ropienie prawie do zera zmniejszyło. Że w tym przypadku było znaczne ropienie, to okoliczność ta nie czyni ujemny sposobowi Listrowskiemu, albowiem powinieniem był według zasady Listra od razu przez ucisk zbliżyć ściany torby wzajemnie do siebie, ażeby nie pozostawiać miejsca krwawieniu, czego niestety zaniedbałem; mimo to nieco później naprawiony błąd powetował stratę, albowiem obecnie, a zatem dopiero w 3 tygodniu po operacji chory jest już blizkim zupełnego wygojenia. Volkmannowski sposób doszczętnego leczenia wodniaka móżdżkowego przez nacięcie guza i założenie Listrowskiej oprawy w połączeniu z silnym uciskiem i wyniki takiego postępowania w literaturze dowodzą najdobitniej ważności ucisku w połączeniu z opatrywaniem przeciwgnilnym. Nadto w tych kilku przypadkach, w których przez kilka dni miało miejsce ropienie, byłoby się bez tego niewątpliwie obszło, gdyby się nie było użyło zbyt silnego roztworu karbolowego (5%); sądzę więc, że wystarczy do odrazenia rany przed nałożeniem pierwszego opatrunku 3% lub co najwięcej 4% roztwór; takowy zupełnie mnie zadowalał. Niemniej muszę zauważyć, że przy takim postępowaniu leczniczym sączki zdają mi się w największej liczbie przypadków ran na głowie być zupełnie zbytecznymi, a nawet o tyle szkodliwymi, że uniemożliwiają rychłyrost w miejscu gdzie się znajdują, przewlekają w wysokim stopniu trwanie gojenia; przeto postanowiłem odtąd dla ubezpieczenia odpływu przesączyny w ranach płatowych używać niteczek katgutowych, a użycie sączków ograniczyć do wielkich ran płatowych ze znacznym stłuczeniem, gdzie na rychłyrost na całej przestrzeni liczyć trudno. Tak więc zgadzam się ze zasadą Bergmanna co do następowych przeciwotworów i następowego przesączania ran na głowie, tylko w razie użycia Listrowsko-Volkmannowskiej oprawy. Że przy takim postępowaniu leczniczym nie jednego chorego zdołamy uratować od strasznych powikłań, można śmiało wygłosić nawet w obec sceptyków! Powyższy mój drugi przypadek, gdzie cięcie pałasza sięgało aż do środkowej kości potylicowej na przestrzeni 3 cm. długości, a osobliwie ostatni przypadek, w którym kość czołowa nie tylko była obnażoną, lecz i wklesłą i pękniętą, usprawiedliwiają powyższe twierdzenie. Można by wprawdzie zarzucić, że powikłanie np. z zapaleniem opony mózgową nie musia-

łoby było w ostatnim przypadku przyplątać się, chociażby nawet wygojenie przez rychłozrost nie było nastąpiło, — i słusznie! lecz z drugiej strony należy przyznać, że wygojenie przez rychłozrost, które zamieniło otwartą szczelinę czaszki na podskórną, usunęło tém samém w wielkiej części niebezpieczeństwo. Podobnego wyniku, jak w powyższych dwóch przypadkach, doświadczyłem niedawno temu wspólnie z kolegą B. w praktyce prywatnej. Pan Z. mężczyzna około 55 lat liczący, odniósł kilka ran ciętych w pojedynku; w jednej około 4 cm. długiej można było wyczuć zupełnie przeciętą główkę kości łokciowej i otwarcie stawu nadgarstkowego. Wszystkie rany goiły się pod opatrunkiem Listrowskim przez rychłozrost; przecięta kość zrosła się w ciągu kilku tygodni. Podobnie i w tym przypadku należy przyznać, że niebezpieczeństwo powikłania z zapaleniem i zropieniem stawu nadgarstkowego było bardzo wielkie, z drugiej zaś strony śmiało można przypisać wygojeniu rany przez rychłozrost, że takowe nie przyłączyło się. Doświadczenie zaś moje przekonywa mnie, że rychle zrosnięcie się było tu wynikiem oprawy Listrowskiej.

II. Z oddziału chorób skórnych i wenerycznych Dra Zarewicza lek. ord. w szpitalu św. Ducha w Krakowie.

Nowy sposób leczenia kłykcin wilgotnych za pomocą
rozcieku azotanu srebrowego i cynku litego.

Skręślił Dr. Stanisław Skobel.

(Ciąg dalszy.)

Spostrzeżenie VII.

Julijanna B., służąca, mająca lat 23, przybyła do szpitala św. Ducha z następującem cierpieniem. Na zewnętrznej powierzchni warg sromnych większych znajdowały się szyszkowiny płaskie o powierzchni suchej; od zewnętrznego brzegu odbytu szerzyły się bujne szyszkowiny płaskie, powierzchownie owrzodzone, zajmując przestrzeń wielkości niemal dłoni dziecięcej. Oprócz powyższych zmian znajdowały się na obydwu pośladkach dwie półkoliste czerwone pęgi, na tle których znaleziono kłykciny różnej wielkości, znacznie naciekle, jak przekonywało dotknięcie, z suchą jednakże powierzchnią. W tym przypadku przyłożono na wszystkie kłykciny plaster rtęciowy, celem przekonania się czy nie będzie jakiej różnicy co do szybkości ustępowania zmian w mowie będących, w porównaniu ze sposobem Chérona.

Wypadek tego doświadczenia był taki, że pomimo dłuższego, bo dwumiesięcznego używania samego tylko przylepca rtęciowego, nacieki, tak w okolicy odbytu, jak i na obydwu pośladkach, ciągle się jeszcze utrzymywały. Ucieczono się zatem do sposobu Chérona, którego czterokrotne użycie, co drugi dzień, wystarczyło do zupełnego usunięcia nacieków w okolicy odbytu, a na obydwu pośladkach pozostała nieznaczna mięsistość.

Na zasadzie tego spostrzeżenia nie mógłbym się zgodzić ze zdaniem sprawozdawcy umieszczonem w *Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis (III. Jahrg. 1876, 1 Heft, str. 133.)*, który wspominając o pracy Chérona, powiada, że za pomocą przylepca rtęciowego równie szybko znikają kłykciny wilgotne, jak za pomocą sposobu podanego przez Chérona.

Spostrzeżenie VIII.

Katarzyna F., służąca, lat 26. Badanie wykazało, że na wewnętrznej powierzchni warg sromnych większych, znajdują się liczne kłykciny wilgotne, do wielkości grochu dochodzące.

Chora podaje, że cierpienie obecne ma trwać od trzech miesięcy, przedtem zaś nie cierpiała na chorobę weneryczną w jakiegokolwiek formie; przed dwoma tygodniami urodziła dziecię niedonoszone, nieżywe. Na kłykciny wspomniane użyto trzy razy sposobu Chérona, co drugi dzień, ze skutkiem zupełnie pomyślnym.

Spostrzeżenie IX.

Agata M., szwaczka, lat 20. Przy badaniu znaleziono szyszkowiny płaskie rozległe, miejscami owrzodzone, osobliwie na zewnętrznej powierzchni wargi sromnej większej prawej, która w całym swym rozmiarze w dwójnasób była powiększoną. Podobne zmiany, jak powyżej opisane, znajdowały się na wardze sromnej większej lewej, a pochodząc od zewnątrz przechodziły na lewy pośladek, tworząc tutaj znaczny naciek, którego powierzchnia była wilgotną. — Między czwartym a piątym palcem u stopy lewej była szyszkowina płaska owrzodzona.

Zmiany te chorobowe mają trwać od dwóch miesięcy.

Do zupełnego wytępienia powyższych szyszkowin, trzeba było dziewięć razy zwilżać je rozcynem azotanu srebrowego w stosunku 1:2, i dziesięć razy pocierać laseczką cynku litego, co drugi dzień; a jako ślad po owem cierpieniu pozostały plamy zabarwione brunatno.

Spostrzeżenie X.

Helena T., wyrobница, lat 19. Na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni wargi sromnej większej prawej, tudzież w okolicy spoidła dolnego, znaleziono kilka kłykcin wilgotnych, z których jedna, usadowiona na zewnętrznej powierzchni wargi sromnej większej prawej, dochodziła wielkości małego orzecha laskowego. Sześciornazowa kauteryzacja sposobem Chérona co drugi dzień usunęła kłykciny zupełnie.

Spostrzeżenie XI.

Wincenty G., wyrobnik, lat 20. Na wolnym brzegu napletka, na przodowej ścianie moszen osobliwie po stronie prawej, dalej w rowku łonowo-udowym prawym (*sulcus genito-cruralis*) na międzykroczu tudzież w okolicy odbytu znaleziono kłykciny wilgotne w części powierzchownie owrzodzone; podobne zmiany napotkano między czwartym a piątym palcem u stopy prawej.

Chory podaje, że cierpienie w miejscach powyżej wspomnianych trwa już od roku.

Wszystkie kłykciny ustąpiły po dwunastokrotném użyciu sposobu Chérona, co drugi dzień, pozostawiając po sobie brunatne plamy barwikowe.

Spostrzeżenie XII.

Leon B., wyrobnik, mający lat 48, był już leczony w szpitalu św. Ducha; ówczesne rozpoznanie brzmiało: „*Condylomata lata ad tonsillas, ad internam faciem praeputii, ad glandem. scrotum et inter omnes digitos pedis sinistri. Adenitis universalis*. Obecnie po siedmiesięcznej pauzie w chorobie, przychodzi tenże z recydywą, w postaci kłykcin wilgotnych. Przy badaniu znalazłem w okolicy odbytu dwa rozrośnięte mięsiste nacieki, powierzchownie owrzodzone, z których jeden szérząc się na pośladek lewy dochodził do wielkości talara; drugi zaś przeciwnie był nieco mniejszy. Do zupełnego zgubienia opisanych kłykcin wilgotnych potrzebowalem użyć

ośm razy sposobu przez Chérona podanego, co drugi dzień.

Spostrzeżenie XIII.

Marjanna O., służąca, mająca lat 17. przybyła dnia 11 lipca r. z. do szpitala św. Ducha z następującem cierpieniem. Prawie cała zewnętrzna jak i wewnętrzna powierzchnia warg sromnych większych i mniejszych zajęta była przez kłykciny wilgotne zlewające się ze sobą, które ztąd przechodząc na międzykrocze, zajmowały wewnętrzną powierzchnią obydwu pośladków sięgając aż po za ujście zewnętrzne odbytu. — Kłykciny te tworzyły tym sposobem wyniosły, niemal jednostajny naciek, którego powierzchnia rozpadająca się gdzieś indziej, pokryta była przeważnie wydzieliną szarą. — W obwodzie tych nacieków, tuż przy ich brzegu zewnętrznym, znajdowały się osobnione kłykciny wilgotne; podobne zmiany znalazłem także w obydwu rowkach łonowo-udowych (*sulcus genito-cruralis*) osobliwie zaś w prawym, gdzie na przestrzeni, której obwód dochodził mniej więcej cztero-centówki, znajdowały się kłykciny wilgotne ze sobą zlane, tworzące naciek wyniosły, pokryty wydzieliną szarą. Zmiany powyżej opisane mają trwać od miesiąca. W tym przypadku potrzeba było czternaście razy użyć sposobu Chérona, co drugi dzień, ażeby chorą uwolnić od tak rozległego cierpienia.

Spostrzeżenie XIV.

Maryja S., wyrobница, lat 40. Na zewnętrznej jak i wewnętrznej powierzchni warg sromnych większych i mniejszych, znaleziono liczne lecz drobne kłykciny wilgotne, powierzchownie owrzodzone. Po trzechkrotnem zastosowaniu sposobu Chérona, co drugi dzień, zakończono leczenie.

Spostrzeżenie XV.

Maryjanna T., służąca, mająca lat 23, przybyła do szpitala św. Ducha z następującem cierpieniem: na wewnętrznej powierzchni warg sromnych większych znaleziono kilka kłykcyn wilgotnych, w kształcie guzów sino-czerwonych, a powierzchnia ich była przeważnie rozpadła. — Cierpienie powyższe miało trwać od dwóch miesięcy. Po sześciokrotnem użyciu sposobu Chérona co drugi dzień, kłykciny zniknęły zupełnie.

Spostrzeżenie XVI.

Maryja K., wyrobница, lat 32. Na zewnętrznej jak i wewnętrznej powierzchni warg sromnych większych, znaleziono ośm szyszkowin płaskich, powierzchownie owrzodzonych, które zaczawszy od wielkości grochu dochodziły do wielkości centa. Do usunięcia tych zmian potrzeba było użyć siedm razy sposobu Chérona, do drugi dzień.

Spostrzeżenie XVII.

Maryjanna P., służąca, lat 28. Przy badaniu znaleziono obydwie wargi sromne większe mocno obrzękłe i zaczerwienione; na zewnętrznej powierzchni wargi sromnej większej prawej znajdowała się kłykcina wilgotna, wielkości fasoli, powierzchownie owrzodzona. Na brzegu wargi sromnej mniejszej lewej, tudzież w okolicy spoidła dolnego znaleźliśmy kłykciny wilgotne różnej wielkości, powierzchownie owrzodzone i zlewające się z sobą. Na pośladku lewym, jak niemniej w okolicy odbytu napotkaliśmy podobne cierpienie, jak powyżej opisano, z tą jednak różnicą, że kłykciny sterczały tutaj więcej nad powierzchnię skóry. Użyto pięć razy sposobu przez Chérona podanego, co drugi dzień, ze skutkiem zupełnie zadowalającym.

Spostrzeżenie XVIII.

Maryja D., wyrobница, lat 24. Obydwie wargi sromne były miernie obrzękłe, a na ich wewnętrznej jak i zewnętrznej powierzchni znaleziono rozrzucone kłykciny wilgotne, okrągłe wielkości różnej, powierzchownie owrzodzone. Po czterokrotnem użyciu azotanu srebrowego i cynku litego w wiadomy sposób, co drugi dzień, cierpienie ustąpiło bez śladu.

Spostrzeżenie XIX.

Regina K., nierządnicą, mająca lat 18, leczona niejednokrotnie w szpitalu św. Ducha, na różne choroby wynikające z jej sposobu życia, obecnie przyjęta została z następującem cierpieniem: na wewnętrznej powierzchni wargi sromnej większej prawej znaleziono jedną szyszkowinę płaską, dochodzącą do wielkości grochu. W pobliżu odbytu jak również na pośladku lewym znajdowały się podobnie szyszkowiny płaskie, atoli znacznie rozrosłe i sterczące nad powierzchnię skóry. Do zniszczenia tych wyrosła użyto pięć razy sposobu Chérona, a mianowicie dwa razy dzień po dniu, a trzy razy co drugi dzień, poczem dostrzeżono, że na wardze sromnej większej prawej, w miejscu dawnego cierpienia skóra była cokolwiek zgrubiała, w okolicy zaś odbytu i na pośladku lewym pozostało miernie zaczerwienienie.

Spostrzeżenie XX.

Marjanna S., wyrobница, lat 20. Chora ta już dawniej na zmiany kitowe w oddziale św. Ducha leczona, przybyła ponownie z kłą odnawiającą się w postaci jednej kłykciny wilgotnej, do wielkości centa dochodzącej, w pobliżu odbytu usadowionej. Kłykcina ta o powierzchni pokrytej przyskórkiem, sterczała znacznie nad powierzchnię skóry. — Gruczoły karkowe, barkowe jak również i pachwinowe były miernie obrzękłe. W tym przypadku zwilżano i pocierano kłykcinę w mowie będącą w sposób wiadomy codziennie, a robiono to dlatego, ponieważ po upływie jednej doby odpadła warstwa przyskórka zniszczonego sposobem Chérona. — Kłykcina ta ustąpiła bez śladu po dziewięciokrotnem zastosowaniu sposobu powyżej wspomnianego.

Spostrzeżenie XXI.

Katarzyna G., żona wyrobnicą, lat 21. Przy badaniu znaleziono na wewnętrznej powierzchni warg sromnych większych i mniejszych kłykciny wilgotne w kształcie dużych sinych guzów nad powierzchnię skóry wystających, które tak z powodu swoich rozmiarów, jak i wzajemnie blizkiego sąsiedztwa zlewały się spólnie, tworząc w ten sposób na każdej z warg jakby jedno owrzodzenie. Chora ta powiada, że w r. 1875, w jesieni została zarażoną; nie lecząc się chodziła z temi wrzodami, jak się sama wyraża, aż do kwietnia r. 1876; dopiero w czerwcu tegoż roku, gdy cierpienie poczęło się wzmagać, zdecydowała się w sierpniu przybyć do szpitala. Do usunięcia tego cierpienia użyto sposobu przez Chérona podanego jednaście razy, jednakże w trzech i czterodniowych odstępach, a robiono to dlatego, ponieważ z początku po użyciu roztworu azotanu srebrowego i cynku litego, powstawało dość silne zaognienie kłykcyn, tak, że trzeba było przerywać leczenie i czekać, dopóki się zapalenie nie zmniejszy; następnie dlatego, że w miarę zmniejszania się kłykcyn, warstwa zniszczonego przyskórka dłużej do takowych przylegała, niż to bywa zazwyczaj.

Spostrzeżenie XXII.

Jadwiga Z., wyrobница, lat 21. Na zewnętrznej powierzchni wargi sromnej większej prawej znajdowała się

jedna szyszkowina płaska, przy dotyku zbita, kształtu okrągłego, o powierzchni suchej, dochodząca do wielkości dużego orzecha laskowego. W celu zniszczenia tej szyszkowiny używano sposobu Chérona co drugi dzień. — Po siedmiokrotnym użyciu pomienionego sposobu szyszkowina płaska znacznie się zmniejszyła, naciek w témże miejscu również zmiekkł, jednak zaczawszy odtąd aż do piętnastej kauteryzacji, która była zarazem ostatnią w tym przypadku, nie można było dostrzedz polepszenia, albowiem ciągle utrzymywała się w wspomnianém miejscu mięsistość. Z tego więc powodu zalecono przyklepieć rtęciowy, który téż zakończył pomyślnie leczenie.

Spostrzeżenie XXIII.

Kasper G., wyrobnik mający lat 26. przyjęty został w czerwcu r. 1876 do szpitala św. Ducha z następującym cierpieniem: na brzegu napletka znajdowało się kilka kłykein wilgotnych różnego kształtu i różnej wielkości, które rozszerzały się tak na zewnętrzną jak i na wewnętrzną powierzchnię tegoż, skutkiem czego nie można było napletka odprowadzić. — Na tylnęj powierzchni prącia znalazłem trzy kłykeiny wilgotne, a odpowiednio do tych ostatnich znajdowały się na przodowej ścianie moszen także zmiany chorobowe jak powyżej opisane. Oprócz tego tylna powierzchnia moszen wyglądała jakby obsiana kłykeinami wilgotnymi, które były tu przeważnie okrągłe dochodzące od wielkości grochu do wielkości centa. Wszystkie kłykeiny na mosznach w ujęciu czuły dawały znaczny naciek bez względu na swe rozmiary. — Podobnie nokoło znajdowały się kłykeiny wilgotne, które ztąd szerzyły się na lewy pośladek. We wszystkich powyżej wymienionych miejscach kłykeiny te pokryte były przeważnie skąpą wydzieliną szarą. Oprócz tego znaleźliśmy na wewnętrznej powierzchni uda lewego dwie do wielkości dużego bobu dochodzące kłykeiny, które blisko siebie leżały. Z powodu tych rozmiarów sterczały one znacznie pod skórą, powierzchnia ich była gładka i sucha, barwa zaś nieco ciemniejsza niż skóry zwykłej. Kłykeiny z podobnymi własnościami jak dwie ostatnie lecz cokolwiek mniejszych rozmiarów napotkałem w rowku łonowo-udowym prawym.

Gruzoły karkowe nie były wcale powiększone, barkowe lekko obrzękłe, pachwinowe zaś po obydwu stronach licznie i bardzo znacznie powiększone. Wywiady dotyczące bliższych szczegółów choroby nie odniosły w ogóle pożądanego skutku; chory bowiem twierdził, że nigdy na żadną chorobę weneryczną nie cierpiał, do chwili obecnej nie leczyl się zupełnie, jak długo może trwać cała choroba tego nie pamięta, jedynie podaje, że cierpienie na mosznach trwa od dwóch miesięcy. I tutaj użyliśmy w celu usunięcia tak rozległych kłykein sposobu przez Chérona podanego. Wypadek tego leczenia był następujący: po szóstej kauteryzacji widziałem już znaczną różnicę, bo w ogóle wszystkie kłykeiny stosunkowo do swęj wielkości zmniejszyły się widocznie, a naciek jaki im zawsze towarzyszył stał się o wiele mniejszy. Po siódmej kauteryzacji kłykeiny okalające niejako brzeg napletka, dalej usadowione na tylnęj powierzchni prącia, jak niemniej w kilku miejscach na mosznach ustąpiły zupełnie. Po użyciu siedemnastej kauteryzacji spostrzegłem, że dwie kłykeiny będące na wewnętrznej powierzchni uda lewego zupełnie ustąpiły, w rowku łonowo-udowym prawym, jak również na mosznach utrzymywały się jeszcze nacieki. W okolicy odbytu i na pośladku lewym pozostała jeszcze w skórze mięsistość. Po dwudziestej drugiej kauteryzacji znalazłem na wewnętrznej powierzchni uda lewego brunatne plamy barwikowe, podobnie w okolicy odbytu i na pośladku lewym, na skórze moszen tu i owdzie nieznaczna mięsistość dała się jeszcze wysledzić, jakoteż w rowku łonowo-udo-

wym prawym. Użyto tedy jeszcze dwa razy sposobu Chérona na pomienione miejsca i na dwudziestej czwartej kauteryzacji zakończono leczenie.

W tym przypadku używano sposobu Chérona w rozmaitych odstępach, i tak z początku kauteryzowano przez trzy lub cztery dni codziennie te kłykeiny, z których zniszczony przyskórek szybko odpadł, inne znowu przytrawiano co drugi lub trzeci dzień, stósownie do tego, jak warstwa czarna pokrywająca kłykeiny odpadła.

Spostrzeżenie XXIV.

Marjanna S., wyrobnica, lat 24. Przy badaniu znalaziono na wewnętrznej powierzchni warg sromnych większych rozrzucone kłykeiny wilgotne, okrągłe, nie przechodzące w swych rozmiarach wielkości zwykłego grochu; naciek w ujęciu nie okazywał się znacznym. W tym przypadku trzechkrotne użycie sposobu przez Chérona podanego, co drugi dzień, wystarczyło do zupełnego usunięcia cierpienia.

Spostrzeżenie XXV.

Bronisława E., służąca, lat 22. Na zewnętrznej powierzchni wargi sromnej większej prawej znajdowała się jedna kłykeina wilgotna, wielkości bobu, znacznie wyniosła ponad skórę prawidłową, a powierzchnia jej pokryta była skąpą wydzieliną szarą. Podobna kłykeina, lecz większych rozmiarów, znajdowała się w okolicy odbytu; w obydwu tych miejscach nacieki były znaczne. Po siedmiokrotnem użyciu sposobu Chérona, co drugi dzień, pozostały jako ślad przebytego cierpienia dwie brunatne plamy.

Spostrzeżenie XXVI.

Agnieszka S., wyrobnica, lat 19. Na wewnętrznej powierzchni wargi sromnej większej lewej znalaziono przy badaniu trzy kłykeiny wilgotne, powierzchownie owrzodzone, leżące symetrycznie jedna po nad drugą, z których najwyżej i najniżej położona dochodziła wielkości półcenta, środkowa zaś do wielkości prawie centa. Naciek tych kłykein był znaczny; obok tego znajdowały się jeszcze dwie kłykeiny wilgotne lecz o wiele mniejsze, jedna z nich była na wewnętrznej powierzchni wargi sromnej większej prawej, w jej górnej części, druga zaś w okolicy spoidła górnego, po tejże samej stronie.

Po sześciokrotnem użyciu sposobu Chérona co drugi dzień, pozostała nieznaczna mięsistość w miejscu dawnych trzech kłykein wilgotnych.

Spostrzeżenie XXVII.

Franciszka M., służąca, lat 22. Obraz cierpienia był następujący: na zewnętrznej jak i wewnętrznej powierzchni warg sromnych większych, tudzież na zewnętrznej powierzchni warg sromnych mniejszych, w okolicy odbytu i na wzgórku łonowym, znaleźliśmy nader licznie rozsiane drobne kłykeiny wilgotne, dochodzące od wielkości soczewicy do wielkości grochu. W środku wargi sromnej większej prawej znajdowała się jedna większa kłykeina wilgotna, dochodząca do wielkości centa, w górnej zaś części wargi sromnej większej lewej napotkano bliżną z wybitnem stwardnieniem. Na wewnętrznej powierzchni ud znajdowały się tu i owdzie guziczki syfilityczne, pokryte cienkimi łuskami, dającymi się łatwo oddzielić. Gruzoły karkowe i barkowe wcale nie były powiększone, pachwinowe zaś obrzękłe znacznie po stronie lewej niż po prawej. Od choroby można się było zaledwie tyle dowiedzieć, że całe cierpienie powyżej opisane ma trwać od miesiąca. W tym przypadku użyto także sposobu Chérona co drugi dzień, a po czterokrotnej kauteryzacji wszystkie kłykeiny drobne ustąpiły zupełnie, jedynie pozostała na wardze sromnej większej prawej, gdzie była największa kłykeina, mięsistość.

na wardze zaś sromnej większej lewej blizna stwardniała, na które to miejsce zalecono plaster rtęciowy.

(Dokończenie nastąpi.)

III. Oceny i wyciągi.

Dr. Parrot: *Déformations crâniennes occasionnées par la syphilis héréditaire.* Rzecz miana na zgromadzeniu francuskiego Stowarzyszenia dla postępu nauk w Hawrze. Sprawozdanie Dra A. Kwaśnickiego.

Tegoroczny Zjazd w Hawrze zwrócił na siebie uwagę całego świata uczonego bogactwem materiału naukowego, doniosłością rozpraw i ważnością wniosków we wszystkich gałęziach wiedzy ludzkiej. Wyjmujemy z posiedzenia z d. 24go sierpnia wykład Dra Parrot „o zniepodobnieniach czaszkowych wywołanych kiłą dziedziczną“, w którym znaleźliśmy niezapisane dotąd spostrzeżenia, i cenne wnioski na ich podstawie poczynione.

Kształt czaszki bywa prawidłowy lub nieprawidłowy: pierwszy jest następstwem przeobrażeń fizjologicznych; drugi, będący już zniepodobnieniem, jest albo następstwem rękoczynów, w celu nadania czaszce noworodka żądanej postaci, albo jest zniepodobnieniem chorobowym. Zniepodobnienia zależne od kiły dziedzicznej, mało do tej pory uwzględniane przez lekarzy, należą do bardzo charakterystycznych i najczęstszych, gdyż na 160 spostrzeżeń Dr. Parrot tylko dwa razy ich nie widział. Zniepodobnienia te tak są wybitne, stałe i jednostajne co do miejsca usadowienia się i ich przyrody, że same jedne wystarczają do zawyrokowania o istniejącej kile dziedzicznej, lub jeśli badamy czaszkę, że jej właściciel ulegał temu zakażeniu. Zniepodobnienia polegają na wybujalności kostnych czaszki, mających właściwe umiejscowienie, wejrzanie i budowę. Postać tych wybujalności jest soczewicowata, rozmaitej szerokości i grubości; znajdują się one na powierzchni czaszki, przy kątach kości czołowej i ciemieniowych, a ztąd czasami szerzą się i na inne okolice sklepienia czaszki, z wyjątkiem jednak guzów czołowych i ciemieniowych. Jeśli to szerzenie się ma miejsce, części pierwotnie zajęte ulegają znacznemu zgrubieniu, i ostatecznie spostrzegamy dwie guzowatości obok szwu wieńcowego i drugie dwie na kościach ciemieniowych wzdłuż szwu strzałkowego. Wybujalności te dzielą wyłobienie głębokie nadające czaszce kształt i wejrzanie rzeczywiście charakterystyczne, które tylko kiła dziedziczna wytworzyć może.

Wybujalności różnią się od kości zdrowej dziurkowatością powierzchni, oraz wyraźnymi kanałami naczyńiowymi, a składają się z beleczek dzielących przestwory szpikowe, ułożone prostopadle do powierzchni kości czaszkowej.

Czasem te guzowatości bujając w kierunku ksobnym przykrywają szwy i przyczyniają się do ich przedwczesnego skostnienia, co pociąga za sobą zmniejszenie objętości jamy czaszkowej i zatrzymanie rozwoju istoty mózgowej. Zmiany czaszkowe, dziedziczną kiłą wywołane, pozostają na zawsze. Czaszka młodego Indyjanina z Pernambuku, który umarł w 18 roku życia z zakażenia zimniczego, posiadała wszystkie wyżej opisane oznaki, a zgrubienia kości ciemieniowych wynosiły 0.02. Zmiany pozostają niezatartymi przez całe wieki, jak to świadczą dwie czaszki dziecięce, ofiarowane Instytutowi antropologicznemu przez P. Destrugés, a wykopane na smętarzysku w Guayaquil, pochodzącem z epoki, która znacznie poprzedziła przybycie Hiszpanów do nowego świata; również wybitnie widać te zmiany na dwóch czaszkach ludzi dorosłych, będących własnością zbioru muzealnego, z których jedna pochodzi

z Aryki, a druga z okolic Limy, obie wykopane na smętarzyskach, które istniały przed Kolumbem. Grubość kości ciemieniowych jednej z tych czaszek wynosi 0.038. Autor dochodzi do następujących wniosków:

a) kiła dziedziczna zniepodobnia czaszkę w sposób typowy i niezatarty,
b) kiła istniała w Peru i Guayaquil przed odkryciem Ameryki.

Dr. Broca popiera spostrzeżenia p. Parrot okazem czaszki, pochodzącej z Aryki (Peru), a znajdującej się w muzeum towarzystwa antropologicznego, która przedstawia wszystkie zmiany, opisane przez prelegenta.

Na uwagę Dra Dallego, że mu nie jest znana żadna kronika, któraby udowadniała istnienia kiły w Ameryce przed przybyciem do niej Europejczyków, odpowiedział p. de Quatrefages, że pp. Jourdanet i Bousens de Beaubourg stwierdzili w Meksyku, iż to zakażenie tam już panowało przed odkryciem Ameryki, co potwierdza również Dr. Bertillon. P. Jourdanet wymienia dwóch autorów, którzy pisali w niejednakich warunkach i okolicznościach, a obaj stwierdzają istnienie odrębne kiły w Ameryce obok samodzielnej kiły w Europie. Tegoż samego zdania jest prof. Broca, który utrzymuje, że posiada dowody, jako kiła panowała w średnich wiekach w Europie, o wiele wcześniej przed odkryciem Ameryki, lecz, że w nowym świecie jednocześnie istnieć mogła, gdyż ludzie posiadając jednaki ustrój, żyjąc w jednakich warunkach pod temi samymi stopniami geograficznymi, niezależnie ulegać mogli zakażeniu kiłowemu na obu półkulach. W ten sposób da się rozstrzygnąć spór stronników importacyi kiły z Ameryki do Europy z jednej i z Europy do Ameryki z drugiej strony.

Ponieważ Dr. Parrot przemawiał w sekcji antropologicznej, czytelnik będzie wyrozumiałym, dlaczego jego wykład nie nosi cechy ściśle lekarskiej; niesądzę jednak, aby te rozprawy były bez zajęcia i dla klinicysty, który dowodów kiły dziedzicznej zwykł szukać tylko w zmianach skórnych i trzewiowych. Dyskusja nad historją kiły była powodem, że uległem pokusie podzielenia się jej zajmującemi wnioskami z czytelnikami „Przeglądu“.

Antropologija z dniem każdym wydłuża promień, którym zakreśla koło swjej działalności, a światłem swem rozjaśniła już nie jedną wątpliwość w rozmaitych gałęziach wiedzy ludzkiej.

Prof. H. Auspitz: O wycianiu wrzodu kiłowego stwardniałego. (*Ueber die Excision der syphilitischen Initial-Sclerose.*) (Osobna odbitka z *Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis. Jahrgang 1877.*)

Sprawozdanie Dra Obtulowicza.

Już od dawna zaprzętała znakomitych syfilidologów myśl, czyby poronne leczenie pierwszych objawów chorób wenerycznych nie wydało zbawiennych owoców. Co do tak zwanych wrzodów miękkich, które w następstwie nie pociągają za sobą objawów zakażenia całego ustroju, to już od lat wielu i powszechnie używa się celem ich leczenia środków żrących, a leczenie to poronne zasługuje w powo-
du pomyślnych wyników na pochwały ze wszech miar usprawiedliwione. Nie tak zgodnemi są jednak zapatrywania na terapiję pierwszorzędných objawów kiłowych w postaci wrzodu stwardniałego. Pierwszy John Hunter zalecał usunięcie wrzodu stwardniałego za pomocą przyżęgań lub wycięcia, później jednak porzucono ten sposób leczenia idąc za przykładem Beaumésa i Vidala, a do ustalenia leczenia wyczekującego przyczyniły się nowsze zapatrywania syfilidologiczne pod względem dwoistości wrzodów wenerycznych, szczególnież zaś ta okoliczność, iż

wrzdół stwardniały poczęto uważać nie za źródło, ale już za wynik ogólnego zakażenia ustroju.

Mimo tych zapatrywań radzi wielu znakomitszych autorów, jak Sigmund, wcześniej przyżęgać podejrzanę rankę i przeczośy, szczególnie w pierwszych dniach po spółkowaniu, wykazując liczbami nader zbawienne skutki tego rodzaju postępowania.

Z nowszych autorów pierwszy Hueter w r. 1867 zachwalał wycinanie wrzodów twardych, zanim nastąpi obrzmienie gruczołów; później kwestyją tą zajmował się dawny asystent jego prof. Vogt, wykazując również pomysłne wyniki leczenia poronnego pierwszorzędných objawów kily. Nie brak atoli i spostrzeżeń wcale niepomysłnych, podanych przez Lewina, Casparego, Mayera, Ulricha, Coulsona i Thiryego.

Celem rozjaśnienia spornej tej kwestyi przedsiębrał prof. Auspitz szereg umiejętne przeprowadzonych doświadczeń, a wyniki w ogóle przemawiające za leczeniem poronnem wrzodów stwardniałych złożył w cennej rozprawce, z której szczegółami pokrótce czytelników obznajmie postanowilem.

W ciągu lat 4 wyciął autor w poliklinice wiedeńskiej wrzody twarde w 33 przypadkach używając przytęm metody operacyjnej podanej przez Huetera. W miarę siedziby i wielkości wrzodu stwardniałego użyto albo pincety anatomicznej, którą podsunęto w kierunku poziomym pod stwardniałość, podniesiono nieco i następnie wycięto za pomocą nożyczek, albo też ujęto wrzdół stwardniały za pomocą pincety haczykowatej lub rodzaju wielkiej *Serrefine*, poczem z łatwością usunięto wrzdół za pomocą nożyczek. Rankę w ogóle tylko miernie brocząca zwilżano tak podczas rękoczynu, jak i po jego dokonaniu pyłem kwasu karbolowego i zbadano należycie, czy jeszcze gdzie w jej obrębie nie ma resztek stwardniałości, które w danym razie należałoby usunąć; w końcu spojono rankę kilku szwami węzłkowemi lub też założono zwykły opatrunek z waty karbolowej i przytwierdzono za pomocą zwyczajnego przylepca. Po 24 godzinach opatrunek zmieniano. Autor nie zauważył w żadnym przypadku w ten sposób operowanym nieprzyjemnych powikłań podczas wykonywania samego rękoczynu. Okoliczności w ogóle przy leczeniu ambulatoryjnym nie sprzyjały szybkiemu miejscowemu zagojeniu się ran powstałych po wycięciu wrzodów; mimo to w kilku tylko przypadkach dołączyła się do ran i utrudniała ich zagojenie wypocina dławcowa lub fagadenizm.

We wszystkich przypadkach stwardniałość wrzodu nie ulegała najmniejszej wątpliwości, w niektórych nawet razach wycięto wrzdół stwardniały mimo niewątpliwych oznak ogólnego już zakażenia. Z pomiędzy 33 przypadków w 6 zagoiła się ranka po wycięciu w zupełności przez rychłozrost, w 5 w przeciągu dni 6 — 14; w 4 trwało leczenie czas dłuższy z powodu powikłań chorobowych. W powyższych 18 przypadkach pozostała blizna linijowa, miękka i nie okazywała później zmian żadnych, a w 14 przypadkach nie nastąpiły później, mimo dłuższej obserwacji, żadne objawy, któreby świadczyły o ogólnem zakażeniu ustroju operowanych. Za to w 9 przypadkach pojawiła się stwardniałość w ranie powstałej po wycięciu wrzodu stwardniałego i w tych też przypadkach wystąpiły później objawy kily ogólnej. Z pozostałych 10 przypadków w 4 wynik był wątpliwy, w 2 dokonano operacji mimo niewątpliwych oznak ogólnego zakażenia, a w 4 obserwacja była z powodu niedbalstwa chorych niedokładną.

Zajmującą tę pracę kończy autor następującemi wnioskami:

1) Przypadki, w których przed wystąpieniem stwardniałości wrzody okazywały cechy wrzodów miękkich (4),

pozostały po wycięciu wolnemi od objawów zakażenia ogólnego.

2) Chociaż niemal we wszystkich przypadkach operowanych gruczoły pachwinowe obrzękły, to jednak inne gruczoły niezawodnie nie okazały się powiększonymi w sposób kile właściwy.

3) Przypadki, w których po wycięciu wrzodu stwardniałego nie pojawiła się wcale nowa stwardniałość, pozostały wolnemi od objawów ogólnego zakażenia kılıowego; za to w 8 przypadkach, w których niewątpliwie pojawiły się objawy kily ogólnej, wystąpiła również stwardniałość w ranie po wycięciu wrzodu powstałej. W jednym tylko przypadku, w którym wrzdół twardy wycięto mimo wybitnych objawów kily wtórnej (*Roscola syphil. Pharyngitis specif.*), pozostała ranka, a następnie i blizna miękka, nienaciekła. Spostrzeżenia tego rodzaju dowodzą, że twierdzenie bardzo znacznej liczby autorów, jakoby po wycięciu wrzodu stwardniałego napowrót stwardniałość wystąpić musiała, nie jest oparte na umiejętnej podstawie, gdyż stwardniałość pojawia się zazwyczaj w tych tylko przypadkach, w których rękoczyn nie osiągnął skutku pożądanego, a nawet wyjątkowo, w przypadkach ogólnego zakażenia jadem kılıowym, może ranka pozostać wolną od ponownej stwardniałości.

4) Fagadenizm występujący po wycięciu wrzodu stwardniałego nie wstrzymuje stanowczo wystąpienia objawów kily ogólnej; jednakowoż mimo tego nieprzyjemnego powikłania mogą objawy kily ogólnej wcale się nie pojawiać (2 przypadki).

5) Okoliczność ta, że w znacznej liczbie przypadków, w których wrzody okazały się niewątpliwie stwardniałemi, później wcale nie wystąpiły objawy kily ogólnej, dowodzi stanowczo, że wrzdół stwardniały nie jest wcale wynikiem zakażenia ogólnego, ale jego źródłem. Również obrzmiale gruczoły pachwinowe uważać należy niejako za pierwszą stację usadowienia się jadu kılıowego w ustroju. Prawie we wszystkich przypadkach, w których po wycięciu wrzodu stwardniałego nie pojawiły się wcale objawy kily wtórnej, były gruczoły pachwinowe obrzmiałe, a później dopiero po dokonaniu rękoczynu zmalały.

6) Pojawienie się ponowne nacieku w ranie powstałej po wycięciu wrzodu stwardniałego uważa autor nie za wynik ogólnego zakażenia ustroju jadem kılıowym, ale za owoc oddziaływania jadu kılıowego złożonego w miejscu stwardniałości, której albo nieudało się w zupełności usunąć nożyczkami, albo wycięcie okazało się niepodobnem z powodu zanadto znacznej już zmiany w naczyniach zapatrujących miejsce wnikięcia jadu do ustroju.

7) Dalsze doświadczenia dopiéro wykażą, jaki wpływ wywiera wycięcie wrzodu stwardniałego na przebieg kily ogólnej w przypadkach, w których wynik rękoczynu zawiódł oczekiwania. Bieg choroby w niektórych przypadkach świadczy o tem, że objawy kily były bardzo łagodnemi.

8) Wycięcie wrzodu stwardniałego należy zalecić jako środek zaradczy przeciw zakażeniu ogólnemu w tych mianowicie przypadkach, w których stwardniałość trwa krótko, gdzie prócz obrzmienia gruczołów pachwinowych (które to obrzmienie uważa autor tylko za bezpośrednie następstwo wrzodu stwardniałego, a nie za wynik zakażenia ogólnego) nie ma innych powikłań, gdzie siedziba wrzodu samego sprzyja wycięciu (np. na napletku, na skórze prącia, nie zaś na żołądździ) i gdzie nakoniec rękoczyn da się wykonać z wszelką należyłą ostrożnością i dokładnością.

Adamkiewicz: O wydzielaniu się jodu przez skórę.

Wiadomo, że po dłuższem zażywaniu jodku potasu występuje rozsiane po różnych miejscach zapalenie skóry

w postaci wągrów. Domysłu, że jodek potasu dostaje się do skóry i wywołuje właśnie przerzeczzone zapalenie, nie można było dawniej udowodnić. Owoż autorowi udało się w jednym przypadku obfitego wystąpienia wągrów jodowych wykazać jod bezpośrednio w krostach w ten sposób, że ropę ile można jak najczystszej, suszył na szkiełkach przedmiotowych od mikroskopu, rozcierał następnie z kleikiem skrobiowym, poczem po dodaniu bardzo roztworzonego kwasu azotowego dymiącego pojawiało się znane niebieskawe zabarwienie od jodku skrobi, dające się dostrzedz nawet bez drobnowida.

Ze przy zażywaniu jodku potasu zapalenie skóry jest rozsiarne a nie rozlane, ma swe źródło w tém, iż tylko gruczoły łojowe ulegają zapaleniu, z kąd téż wągry jodowe nie mogą się pojawiać na tych miejscach skóry, gdzie nie ma gruczołów łojowych, a są jedynie potne. Powodem zaś dla czego jodek potasu wywołuje zapalenie jedynie tych gruczołów lubo dochodzi niewątpliwie i do innych tkanin i narządów, jest prawdopodobnie okoliczność, iż z przyczyny powolnej wymiany materji w tworach rogowatych skóry wydzielenie jodu w gruczołach łojowych odbywa się powoli, jest więc dosyć czasu do wywołania zapalenia, czego nie bywa w innych tkaninach ze szybszą wymianą materji. (*Verhandlungen der physiol. Gesellsch. zu Berlin 1877. 24.*)

D.

Dr Baer (we Wrocławiu): **Obrażenie oka, wynaczynienie po za gałką, nagła ślepotą, wyzdrowienie.**

Śród czyszczenia broni żołnierzowi iglica wleciała w gałkę oczną na $\frac{1}{2}$ cala w głąb; raniony przy użyciu siły sam iglicę wy dobył, jednak natychmiast przyprowadzony w stanie mdłości do kliniki okulist. okazał obrzmienie mocne powiek, rzęsy powieki dolnej na wewnątrz zawinięte, wystawanie znaczne gałki, komórki przodkową i źrenicę prawidłowe, ostatnią jednak na światło wcale nie oddziaływającą, gałkę nieruchomą i ślepotę zupełną. Rany wysłedzić nie zdołano. Badanie wziernikowe nie wykazało żadnych zmian, tylko tarcza n. wzrokowego była bladą, jak w zaniku, i całkiem zakłósną, jak w jaskrze; naczynia środkowe znikają tuż przy granicy tarczy. Zastosowano opaskę uciskową i odesłano chorego do szpitala wojskowego. Po upływie $1\frac{1}{2}$ godziny już tamże nie znaleziono ekskawacyi a wzrok zaczął wracać. W 5 dni potem pomimo częściowego wystawania jeszcze gałki B. przekonał się o prawidłowym stanie tarczy wzrokowej, a bystrość wzroku = $\frac{1}{2}$. W 16 dniu po obrażeniu nie było już śladu obrażenia, a bystrość wzrokowa okazała się prawidłową.

B. oświadcza się za tém, że ekskawacja w danym przypadku nie mogła być wynikiem zwiększonego ucisku śródocznego, lecz była następstwem mechanicznego ciągnięcia i szarpania, któremu uległ n. wzrokowy od tyłu, gdy gałka na 1 cal wypchniętą została naprzód; kładzie nacisk na ciągnięcie nagłe, a przynajmniej szybkie, ponieważ przy ciągnięciu powolnym nie zauważano dotąd zagłębienia tarczy (np. w niemocy Basedowa). Ślepotą przemijająca była następstwem ekskawacyi, ale zdaje się, że włókna nerwowe dopiero przy samym wstępie do gałki doznały bądź szarpania, bądź ucisku, albowiem gdyby szkodliwości te działały były po za gałką na włókna nerwowe, wtedy i naczynia nerwu doznałyby ucisku, i znalezionoby w takim razie za pomocą wziernika zastoinę żylną. (*Deutsche medicin. Wochenschrift 1877, Nr. 39.*) (Przypadek ten i pod względem sądowo-lekarskim jest ciekawy; raz z powodu pomyślnego przebiegu i braku wszelkiego upośledzenia stałego, a powtórę, że obrażenie to, gdyby zadane zostało przez osobę trzecią, wypadaloby uznać za lekkie uszkodzenie cieleśne.) L. B.

Netten Radcliffe: **Systemy wychodków angielskich.**

1. Cechą systemu kloacznego (*Midden System*) jest zbiornik stały albo ruchomy. Rodzaj pierwszy powstał ze starych całkiem niewłaściwych gnojowisk i z pewnemi poprawkami używany jest w Hull i Glasgowie: system ten może się używać pod następującemi warunkami. Dół kloaczny musi być odległy od domu i umieszczony tuż pod wychodkiem, murowany z nieprzepuszczalnego materiału, osłonięty przed deszczem i przewietrzany, nie może być drenowany i powinien być takiej wielkości, aby wystarczał na czas między jednym a drugim wypróżnieniem. Popiół nasypywany musi treść dołu dostatecznie wysuszać; w innym razie nie może być cierpianym. Czyszczenie jego musi być wygodne, przystęp do niego łatwy i wynoszenie treści niemożliwe przez dom. Przedewszystkiem musi być często czyszczony (w Glasgowie co dwa dni, w Hull co tydzień) a jeżeli to nie jest możebnym w całym mieście, wtedy należy dopełnić tego przedewszystkiem w niektórych domach i dzielnicach miasta.

Doly kloaczne z ruchomemi zbiornikami stanowią przejście do systemu kubelkowego i tém się tylko różnią od ostatniego, że w nich się mieszczą oprócz odbycin wszystkie suche odpadki. Łączą one w sobie prostotę systemu dołowego z wygodami systemu kubelkowego.

2. Sytem kubelkowy najdoskonalszy w Rochdale i Manchester. Pod wychodkiem umieszczone są dwa kubelki; jeden dla odbycin a drugi dla śmieci. Kubły oparzone w nakrywki wywozi się raz do 2 razy tygodniowo i zastępuje takowe świeżemi napełnionemi w części środkiem przeciwnym.

3. System waterklosetów powszechnie znany przedstawia szczególne trudności w dzielnicach ubogich, jeżeli zamknięcie wodne nie jest w porządku, gdy za mało się płócze i brudem cuchnie. Temu zapobiega w zupełności Kloset nieckowy a nie „Tumblerkloset“ z przyrządem do spłókiwania samodzielnym, ani „Bristoleject“ z właściwym przyrządem do wydalania ciał obcych: w Bristolu jest on skutecznym, ale tylko dla tego, że go służba gminna zawsze dozoruje.

4. System ziemny ma wielkie zalety na wsi w miejscowościach z rozrzuconemi zabudowaniami, usuwa zupełnie szkodliwości odbycin. Tylko należy używać ziemi gliniastej albo glinkowatej, mało wart margiel, zupełnie nie nie warte żwir i piasek. Ziemię trzeba dobrze wysuszyć, nie brać zanadto mięką i wysypywać jej obficie po każdym stolcu.

5. System węglowy zasługuje na pierwszeństwo przed systemem ziemnym, jeżeli węgiel jest tani. O wiele mniej potrzeba węgla niż ziemi i można wtedy rzadziej wypróżniać treść, chociaż jak na teraz w braku doświadczenia należy przestrzegać tych samych ostrożności, co dla wywózki.

Wnioski ogólne o powyższych systemach:

1. W tém samym mieście można usuwać odbycinę według różnych zasad.

2. Jeżeli system waterklosetowy jest dobrze urządzony i przez miejscową władzę zaprowadzony dostateczny jest spłókiwanie, jak n. p. w Liverpoolu i Bristolu, wtedy w dzielnicach ubogich najnsadniej usuwa odbycinę.

3. Także system ziemny i węglowy spełnić mogą to zadanie, tylko muszą w dzielnicach ubogich mieć wyłączną pieczę nad niemi władze miejscowe.

4. Najmniej odpowiednim jest system dołowy; jeżeli musi być dozwolonym, wtedy potrzeba treść codzien-

nie albo przynajmniej raz w tygodniu wywozić, a wywózką mnsi kierować zarząd miejscowy.

5. System kubelkowy zaleca się pomiekać dla ubogich dzielnie i to więcej niż system dołowy; zresztą obydwie systemy mogą się okazać skutecznymi pod temi samemi warunkami.

6. Chociaż przy systemie kubelkowym i dołowym mogą mieszkańcy utrzymać czysto wychodki, to przecież wywózką musi zarządzać zawsze sama władza gminna.

7. Można przeto za pomocą rozmaitych systemów usunąć szkodliwości wynikające z nieczystości ludzkich. W każdym razie potrzebują kanałów należycie urządzonych nawet te miasta, które wywożą odbyciny ludzkie i to dla wód gospodarczych i spadowych, podobnie jak miasta z waterklosetami i z wywózką jedynie dla śmieci: chociaż w obydwu razach kanały, jak wiadomo, prawie równe szkodliwości przedstawiają z powodu odbycin ludzkich. (Według *Public Health Reports of the Med. Of. of the Priv. Counc. and Loc. Govern. Board. New. Series Nr. I—VII. Vierteljahr. für oeffent. Gesundheitspflege 1877. IX. Bd.*) J. B.

IV. Posiedzenia Towarzystw.

Sekeyja Lekarska Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

Posiedzenie z d. 6go września 1877 r.

1) Protokół z ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto.

2) Dr. Kaczorowski opowiada o dwóch przypadkach cholery swojskiej tak groźnych, że w razie epidemii uważano by je bez wątpienia za prawdziwą cholere. Przedewszystkiem zaś przypadki te odznaczają się tą okolicznością, że przebieg ich był nadzwyczaj długi, bo w obu razach śmierć nastąpiła dopiero po 8 — 10 dniach. Nadto w obu razach mocz zawierał dużo białka.

a) Władysław Neumann, 27 lat, kupczyk, zachorował dnia 30/6 na gwałtowne boleści brzucha, połączone z silnemi wypróżnieniami surowiczemi, szarawemi z strupkami przybłonka zmieszanemi, do których wkrótce i wymioty przystąpiły. Po użyciu garści pieprzu z wódką, boleści i biegunka uśmierzyły się, pozostała tylko skłonność do wymiotów, a odtąd mocz przestał odchodzić. Czasami tylko kilka kropli ciemno-brunatnego płynu dobywało się z cewki moczowej.

2/7 przyjęty do szpitala miejskiego przedstawia wybitną niedokrewność i upadek sił; ciepłota obniżona, tętno słabe, około 90 uderzeń na minutę. Chory narzeka przeważnie na ból w lewem podżebrzu, poniżej fałszywych żeber, zwiększający się pod naciskiem i rozrastający peryjodycznie; nadto skarży się na nudności i wymiotuje płynem zielonawym. Ord. zastrzykiwania podskórne morfiny, lód, zimne okłady.

3/7 mniej więcej ten sam stan; nie masz ani stolca ani moczu. Ord. kamforę.

4/7 ten sam stan; po łyżce oleju rącznikowego odchodzi stolec obrzedni brunatny; wymioty rzadsze.

5/7 stan ten sam; chory oddaje około 10,0 moczu brunatnego, zawierającego krew i dużo białka.

6/7 wymioty częstsze, mocz nie odchodzi wcale; brzuch wzdyma się znacznie, wątroba wystaje pod łukiem żebrwym na 5 cm., trochę bolesna; chory doznaje samo-

dzielnych bólów brzucha leżąc na prawym boku; białkówka oczu zaharwia się żółtawo. Cewnikiem odcoczono około 15,0 brunatnego moczu.

7/7 pęcherz moczowy próżny, wymioty wzmagają się, chory pokaszluje i wypływa nieco krwi od czasu do czasu, oddech trąci wonią moczową, tętno wolniej, 60 uderzeń w minucie; moczu i stolca nie widać. Ord. olej rącznikowy, a gdy ten bez skutku pozostał, lawatywy z oleju terpentynowego, wewnątrz kamforę z kwasem będzwinowym.

Śpiączka, lekkie kurcze odnóg, bezprzytomność, 8/7 rano śmierć.

Ogledziny pośmiertne: Cienkie jelita zewnątrz barwy słabo-fioletkowej, w lewój stronie brzucha trochę krwi wolnej na wpół skrzeplęj, pochodzącej z rozdartego przyniercza lewego. Wątroba zwiększona, twarda na przekroju, nérki powiększone, istota korowa stłuszczona, błona śluzowa żołądka i jelit cienkich mocno nastrzyknięta i spulchniona.

b) Herman S., 22 lat, urzędnik pocztowy, cierpiał od kilku tygodni na wiewiór z zapaleniem gruczołu sterkowego połączonego, w nocy z dnia 4/7 na 5/7 doznał nader gwałtownej biegunki, skutkiem której omdlewał kilkakrotnie i dnia 5/7 w stanie największego osłabienia przywieziony został do szpitala.

W dniu tym stan jego następujący: Chory nie do poznania zmieniony, skóra barwy woskowej, zimna, wargi sinawe, tętno drobne, ledwo namacalne. Chory skarży się tylko na nadzwyczaj bolesne wydzielenie się małej ilości krwawego moczu i na mdłości. Biegunka ustała, śledziona powiększona. Temp. pod wieczór 39,0. Ord. kamforę i chinin.

7/7 żółciowe wymioty, ból w lewym pośladku wychodzący z nerwu kulszowego; ni stolca ni moczu; brzuch zapadły, wątroba zwiększona, lekka żółtaczką. Ord. lód, zimne okłady, morfin podskórnie; pod wieczór wymioty nastają, chory wydziela około 30,0 krwawego moczu, śpi nie źle.

8/7 ni stolca, ni moczu, chociaż podano olej rącznikowy. Zawrót głowy, ogromny upadek sił, drgawki odnóg dolnych. Ord. lawatywę z oleju terpentynowego, wewnątrz kwas będzwinowy. W nocy wolny żółty stolec, mocne parcie na mocz.

9/7 Tętno się podnosi, skóra wilgotna, mocz odchodzi dwa razy, raz około 200,0 a potem około 100,0. Ord. 1/2 łyżki oleju rącznikowego.

10/7 chory wydziela około 25,0 moczu bezkrwistego z osadem ropiastym, doświadcza częstego parcia na mocz; dwa rzadkie stolce, tętno miękkie, pełne, 88 uderzeń w minucie. Pod wieczór czkawka.

11/7 chory nie oddaje moczu; w nocy majaczył lekko, rano przytomny, puls 200. Po południu równocześnie z stolcem oddaje około 500,0 mętnego, żółtego moczu, poczem wielką czuje ulgę. Wieczorem czkawka, zwolnienie oddechów (5—6 w minucie), drgawki.

12/7 wymioty, drgawki, utrata przytomności.

13/7 o godz. 2-giej śmierć.

Przy ogledzinach znaleziono stłuszczenie wątroby i nerek.

Po odczycie tym wywiązała się dość ożywiona dyskusya, w której brali udział: Matecki, Świdorski, Koszutski, Zielewicz, Kapuściński.

3) Załatwiono kilka drobnych spraw bieżących.

4) Do Towarzystwa przyjęto Dra Wicherkiwicza, który przez 4 lata pełniąc urząd asystenta u słynnego okulisty Pagenstechera w Wiesbaden, obecnie osiadł w Poznaniu jako specjalista do chorób ocznych.

Na tém posiedzeniu zakończono.

Dr. St. Jerzykowski, sekretarz.

V. Wiadomości bieżące.

* **Kraków**, dnia 4 października. Zwracamy uwagę na ogłoszenie c. k. Namiestnictwa w numerze niniejszym umieszczone, według którego egzaminy lekarzy i weterynarzy celem uzyskania stałej posady w publicznej służbie zdrowia przy urzędach politycznych odbędą się w miesiącu listopadzie r. b., a mianowicie dla lekarzy w Krakowie, dla weterynarzy zaś we Lwowie.

* Otrzymaliśmy właśnie przyjemną wiadomość, że Komisya balneologiczna Towarzystwa naszego otrzymała dyplom honorowy za urządzenie krajowej wystawy zdrojowej na tegorocznej wystawie rolniczo-przemysłowej we Lwowie. Jestto chlubny nader dowód uznania działalności komisji, która w obecnym swym składzie i pod obecnym swem kierownictwem zaledwie rozpoczęła swój żywot a już umie dawać tak niewątpliwe oznaki życia swego.

* Lekarz praktyczny Maurycy Haya, do niedawna w Jarosławiu zamieszkały, otworzył za pozwoleniem Namiestnictwa dolno-austriackiego zakład szczepienia krowianki we Wiedniu (IV. Schwindgasse 3.). Dobra sława, której używał w kraju zakład p. Haya w Jarosławiu, jest rękojmią, że i zakład jego wiedeński zaskarbi sobie uznanie i zaufanie lekarzy praktycznych.

○ **Statystyka śmiertelności.** W tygodniu 38 (od 16—22 września) zmarło w Krakowie osób 56; 24 mężczyzn i 32 kobiet. Roczna śmiertelność na 1000 mieszkańców obecnej ludności wynosi 53,0 (w 37 tyg. 39,7), bez dzieci do 5 roku życia 22,7 (w 27 tyg. 17,0). W tym samym czasie wynosiła we Lwowie 23,8; we Wiedniu 22,5; w Buda-Peszczie 31,5; w Pradze 28,2; w Tryjeście 44,5; w Genewie 15,4; w Paryżu 20,1; w Londynie 17,4; w Chrystyjani 18,4; w Odessie 31,0; w Wenecji 27,5; w Bukareszcie 33,3; w Barcelonie 25,9; w Królewcu 32,0; we Wrocławiu 28,5; w Poznaniu 37,6; w Monachium 34,1; w Dreźnie 25,1; w Berlinie 25,8. Odra zageęsza się w Krakowie coraz bardziej, tak, że blisko $\frac{1}{3}$ część młodzieży szkolnej szkół niższych dotknięta jest tą chorobą, która przebiega łagodnie. W 38 tygodniu zmarło z odry 5 osób, z dławca 1, z duru osutkowego 2, z gorączki płożowej 1, z róży 1, z chorób przewodu oddechowego 12, z chorób narządu trawienia 8.

* **Lwów** d. 3 października (*Koresp. Oryg.*) wczoraj odbyło się posiedzenie krajowej Rady zdrowia. Przedmiotem obrad był projekt rozporządzenia odnoszącego się do rewizji mięsa podczas życia bydła, cieląt, owiec i świń. W imieniu komisji *ad hoc* wyznaczonej, a składającej się z radcy namiestnictwa Dra Biesiadeckiego, prof. Czyżewicza i weterynarza krajowego Dra Wenera, pierwszy zdawał sprawę z projektu, według którego ustanowionymi być mają po gminach oglądacze bydła, których obowiązkiem będzie asystować biciu bydła i wydawać cer-

tyfikaty i plomby na szczególne ćwiartki. Projekt ten od czytany już poprzednio na posiedzeniu z d. 24 września po szczegółowej dyskusji został przyjętym.

* **Wiedeń.** W Nrze 39 *Wien. med. Woch.* prof. Heschl opisuje uroczystość 400-letniego jubileuszu uniwersytetu szwedzkiego w Upsali. Na tej uroczystości prof. Heschl razem z prof. Klebsem i Petrem z Pragi czeskiej reprezentowali uniwersytety austriackie i wręczyli adresy uniwersytetów: wiedeńskiego, praskiego, gradeckiego i krakowskiego.

— **Kronika wojenna.** Do Warszawy dostawiono w początku b. m. trzema pierwszymi pociągami 600 kilkudziesięciu ranionych; w szpitalach tamtejszych, oprócz tego, ma znaleźć pomieszczenie jeszcze 1,500 ranionych, którzy wkrótce do Warszawy będą przywiezieni. *St. J.*

* **Odnaczenia.** Prof. med. sądowej w Berlinie, Dr. Karol Liman, otrzymał order austriacki korony żelaznej III-jej klasy. — Tajny radca lek. prof. Dr. Goepfert we Wrocławiu przy sposobności ukończenia 50 lat służby w zawodzie nauczycielskim otrzymał uznanie i powinszowanie Cesarza Wilhelma w liście własnoręcznym.

* **Mianowania.** Po zwinieniu szkoły chirurgicznej w Salzburgu i po śmierci prof. med. wewnętrznej a zamianowaniu referentem lekarskim profesora chirurgii mianowani zostali prymaryjuszami: oddziału chorób wewnętrznych Dr. Aug. Göttinger, asystent prof. Bambergera, oddziału zaś chirurgicznego dotychczasowy sekundaryjusz na tymże oddziale Dr. Minnich.

* **Wiadomości osobowe.** N. Pan potwierdził wybór Dra Edwarda Krzyżanowskiego, starszego lekarza w rezerwie i lekarza miejskiego, na zastępcę prezesa Rady powiatowej w Buczaczu.

Towarzystwo lekarskie krakowskie odbędzie wyjątkowo we **Wtorek** dnia 9 Października b. r. o godzinie 5-tjej posiedzenie zwykłe, na którym: 1) Komisya redakcyjna przedłoży ważne wnioski co do Przeglądu Lekarskiego. — 2) Kol. Kwaśnicki poda swoje uwagi nad karmieniem osesków, wreszcie — 3) Kol. prof. Blumenstok zda sprawę z przypadku sądowo-lekarskiego.

Korespondencyja Redakcyi i Administracyi.

Dr. M. we Wiedniu: Prosimy o sprawozdanie z rozprawy Dra L., tylko jak najkrótsze. W ogóle współpracownictwo szan. Kolegi będzie nam pożądanem. — Dr. J. w Hucie węgierskiej: Żądaną ilość cynku litego prześle szan. Koledze jedna z tutejszych aptek.

Redaktor odpowiedzialny: Prof. Dr. L. Blumenstok.

Nakładem Towarzystwa Lekarskiego krakowskiego wyszedł

portret litografowany

Prof. Dra. MAJERA

Prezesa Akad. Umiej.

starannie wykonany w dużym formacie na pięknym papierze in folio.

Nabyć można w Administracyji Przeglądu lekarskiego, jakoteż w księgarni Wgo Krzyżanowskiego po cenie 2 złr. 50 c. w. a., z przesyłką pocztową 2 złr. 80 ct. Dla Członków korespondentów Tow. lek. krak. z przesyłką 2 złr. 30 c.

RUDOLF THÜRRIEGL

Fabrykant chirurgicznych narzędzi

WIEN

Alsersvorstadt am Glacis. Schwarzschanerhaus Nr. 5.

poleca się ze wszystkimi tego rodzaju należąciami artykułami wedle **najnowszej** konstrukcyi.

Dokładne cenniki przesyła na żądanie **darmo.**

W księgarni

S. A. KRZYŻANOWSKIEGO

w Krakowie i we wszystkich większych księgarniach nabyć można:

Dra J. STEINERA

Rys nauki o chorobach dzieci.

Przekład polski dokonany przez grono lekarzy Uniw. Jagiell. pod kierunkiem Prof. Dra M. L. Jakubowskiego i Prof. Dra J. Oettingera, a wydany staraniem i nakładem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich w Krakowie.

Cena 4 złr. w. a. = 2 rs. 70 kop.

Cena oryginału niemieckiego 9 marek.

L. 7.787.

OGŁOSZENIE.

W myśl rozporządzenia c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 18 Września 1875 r. odbędą się egzamina lekarzy i weterynarzy przepisane rozporządzeniem Wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z 21 Marca 1873 r. (dz. u. p. L. 37), w celu uzyskania stałej posady w publicznej służbie zdrowia przy urzędach administracyjnych w Listopadzie b. r. a to dla lekarzy w Krakowie, zaś dla weterynarzy we Lwowie.

Prośby o przypuszczenie do tegoż mają być wniesione najdalej do 15 Października b. r. do ces. król. Namiestnictwa we Lwowie przez dotyczące ces. król. Starostwa i zaopatrzone w dowody wymagane §. 7., względnie 17., powyżej powołanego rozporządzenia.

Z Prezydium ces. król. Namiestnictwa.

Lwów dnia 25 Września 1877.

HOGG, APTEKARZ, 2, RUE DE CASTIGLIONE, PARYŻ. JEDYNY PREPARATOR.

PILULES de PEPSINE de **HOGG**

PIGULEKI Z PEPSINY HOGGA.

Preparatowi temu nadano specjalnie kształt pigulek dla zabezpieczenia go od wpływu powietrza; zachowano tym sposobem wszelkie własności temu nader pożądanemu lekarstwu i uczyniono skuteczność jego niezawodną. — Pigulki Hogga przygotowują się w trójaki sposób:

1° PIGULEKI HOGGA z CZYSTEJ PEPSINY przeciwko upośledzonemu trawieniu, goryczy, wymiotom i innym przypadłościom. specjalnym żołądka.

2° PIGULEKI HOGGA z PEPSINY w połączeniu z żelazem odkwaszonym przez wodoród przeciw słabościom żołądka powikłanym niedokrwistością, niemocą ogólną, etc., bardzo są wzmacniające.

3° PIGULEKI HOGGA z PEPSINY w połączeniu z Iodanem żelaza niepodlegającym rozkładowi, przeciw słabościom skrofulicznym, lymfatycznym, sifilitycznym i pierśowym.

PEPSINA przez połączenie z żelazem i iodanem żelaza łagodzi własności drażniące jakże lodan żelazo wywierają na żołądek osób nerwowych i drażliwych. — Pigulki Hogga sprzedają się jedynie we fiakonach trójkątnych i znajdują się w głównych aptekach.

Dostać można w Warszawie w składach materiałów aptecz. P. Gallego i J. Mrozowskiego; we Lwowie w aptece P. Mikolasch; w Krakowie w aptekach PP. Trauczyńskiego i Redyka.

CAPSULES ET DRAGEES

AU

BROMURE DE CAMPHRE

Du Docteur CLIN

Lauréat de la Faculté de Médecine à Paris

(PRIX MONTHYON)

KAPSULEKI I PIGULEKI Dra CLIN z Bromku kamforowego używają się w słabościach muzgu i nerwów, chorobach serca i kanałów oddechowych, a szczególnie następujących: Astmie, Bezsenności, Biciu serca, Hysteryach, Padaczkę, Zawrotach, Obłądziej, Boleściach głowy, Dolegliwościach narządu moczopłciowego, dla ukojenia wszelkich rozdrażnień nerwowych.

W PARYŻU up. CLIN et C^e, ul. Racine, 14.

Dostać można: w Krakowie, w aptekach pp. Trauczyńskiego i Redyka i we wszystkich znaczniejszych aptekach.

KOWANÓWKO

pod Obornikami w W. Księstwie Poznańskim

ZAKŁAD LÉCZNICZY

dla osób umysłowo chorych i cierpieniami nerwowymi dotkniętych

przyjmuje każdego czasu na kurację chorych płci obojg, ofiarując im obok troskliwej opieki i starannego leczenia, obok wygod wszelkich i przyjemności rozmaitych, możność pożycia familijnego w rodzinach lekarzy.

Blizszych wiadomości udziela na żądanie

Dyrekcja Zakładu

Tajny radzca zdrowia

Dr. Żelasko.

Dr. Karczewski.

FRANCISZKA JÓZEFA**Woda gorzka**

**najskuteczniejsza z wód gorzkich Budy,
jakotóż z pośród krajowych i zagranicznych**

Woda gorzka Franciszka Józefa zawiera najznaczniejszą dotychczas osiągniętą ilość siarkanów a wszystkie inne składniki wód gorzkich w tak zgodnym stosunku, że użycie wody tej dla jej łagodnego smaku, za **najprzyjemniejszą i najskuteczniejszą z wód gorzkich świata** uznanej, coraz więcej się szerzy.

Porównania rozbiórów znanych źródeł gorzkich uwidoczniają korzyści użycia tej wody; prócz tego liczne lekarskie doświadczenia stwierdzają, że do osiągnięcia pożądanego skutku wody gorzkiej Franciszka Józefa potrzeba użyć połowy tylko tych dawek co innych źródeł gorzkich dla tego pozwalamy sobie zalecić najusilniej Wodę gorzką Franciszka Józefa;

Wny Prof. Dr. MAX. LEIDESDORF w Wiedniu tak się wyraża w jednym poświadczeniu:

„Woda gorzka Franciszka Józefa wyróżnia się w swém działaniu przez to korzystnie od innych znanych wód gorzkich, że skutkuje w małych ilościach a przy dłuższem używaniu nie towarzyszą jej żadne złe skutki.“

Wny Dr. MICK prymaryjusz oddziału lekarskiego w szpitalu krajowym w Ofomuńcu.

Woda gorzka Franciszka Józefa ma tę **wielką zaletę** że w żaden sposób nie obciąża narządów trawienia a działa nawet w małej dawce całkiem pewnie w krótkim czasie i bez wszelkich nieprzyjemnych objawów ubocznych.

Prymaryjusz Dr. MICK.

Naturalna woda gorzka Franciszka Józefa znajduje się w zapasie we wszystkich większych składach wód mineralnych i w większej części aptek całego świata; na życzenie urzęda się składają wszędzie pod najprzystępniejszymi warunkami.

Pisma rozseła się gratis.

Dyrekcja rozsełki w Buda-Peszcze.

Filia dyrekcji J. Wentzel w Krakowie.

Mamy zaszczyt i przedkładamy sprawozdanie po ukończonym sezonie kąpielowym w Szwozowicach, a zwłaszcza co do osoby Lekarza zdrojowego należy się powiedzieć, że tenże Pan Maurycy Frey Dr. medycyny pełnił przez siebie zajęte stanowisko, z całym poświęceniem gorliwie i pilnie niósł pomoc cierpiącym, tak za dnia jak i w nocy przestrzegał sumiennie każdego wezwania do słabego, i to potwierdzić by mogła znaczna część gości kąpielowych, że rzeczony Pan Frey niósł pomoc bardzo skuteczną.

**Zarząd kąpeli
w Szwozowicach.**

W administracji Przeglądu lekarskiego jest do nabycia kilkanaście egzemplarzy

Prof. Dra GURLTA

PODRĘCZNIK

**do ćwiczeń operacyjnych na
zwłokach,**

w tłumaczeniu Dra ZIELEWICZA
po cenie 1 złr. w. a. Cena księgarska
wynosi 2 złr.

Również nabyć mogą tamże prenumeratorowie Przeglądu Lekarskiego dzieło
Dra Domańskiego:

Wykład elektroterapii

po cenie 4 złr. 50 c. z przesyłką pocztową.

ASTMY

Duszność, chrypka, katary zardawnione i wszelkie cierpienia kanałów oddechowych ustępują po użyciu Rurek antiastmatycznych p. Levasseura, 23. rue de la Monnaie w Paryżu.

Dostać można w składach materiałów aptecznych P. Gallego i J. Mrozowskiego ulica Miodowa w Warszawie; w Krakowie w aptece p. J. Trauczyńskiego; we Lwowie w aptece p. Mikolascha; w Brodach w aptece p. Kullaka.

NEWRALGIE

wszelkie cierpienia nerwowe każdej chwili ustępują po użyciu pigulek antinewralgicznych Dra CRONIER. Skład w Paryżu w aptece p. Levasseur, rue de la Monnaie 23.

ELIXIR ET DRAGÉES DU D^r RABUTEAU

(Lauréat de l'Institut de France)

ELIXIR I PIGULKI DOKTORA RABUTEAU wypróbowane zostały w szpitalach paryżkich przez profesorów Fakultetu Medycznego, którzy zalecają je jako skuteczniejsze od wszelkich preparatów zalecanych.

Preparata te z CHLORKU ŻELAZA leczą BŁADACZKĘ, WYNEUDNIENIE, NIEDOKRWRISTOŚĆ, regulują ODPEŁWY MIESIĘCZNE, wzmacniają ORGANIZMY WYCZERPAŃE i OSŁABIONE, niesprawiając nigdy ZATWARDZENIA.

Sprzedaż hurtowa w PARYŻU, u p. CLIN et C^e, ulica Racine, 14. Dostać można: w *Warszawie*, w składach materiałów aptecznych pp. Mrozowskiego, Zeuschnera, Szymańskiego et C^e i Lilpopa; we *Lwowie*, w aptece p. Mikolascha; w *Krakowie*, w aptekach pp. Trauczyńskiego i Redyka.

Kozłkan atropinu.

Od 1854 r. Kozłkan atropinu bywa używany z wielkim powodzeniem w postaci ziarenek pół miligramowych według przepisu Dra Michéa potwierdzonego przez Akademię lekarską w Paryżu przy leczeniu padaczki, dychawicy istotnej lub kurczowej bólu głowy połowiczym, kaszlu nerwowym, maciuńcy, bicia serca, drgawek, bólu żołądka i krztusca. Z powodu wielkiej liczby wyleczeń osiągniętych tym środkiem uważam sobie za obowiązek zapoznać ogół z tym środkiem. Dawki, których się używa w ciągu doby są różnej wielkości od pół miligrama, aż do 2 miligrm. (Patrz wskazówkę.)

Apteka Lemaire w Paryżu 14 rue de Grammont.

Dostać można w Warszawie w składach materiałów aptecznych PP. Mrozowskiego, Zeuschnera; Szymańskiego et Comp. i Lilpopa; we Lwowie w aptece P. Mikolascha; w Krakowie w aptekach PP. Trauczyńskiego i Redyka; w Czerniowiecach w aptece P. Golichowackiego.