

BIURO REDAKCYI
Ulica Grodzka Nr. 73.
ADMINISTRACYJA
Ulica Szewska Nr. 207.

Ekspedycja miejscowa
w księg. St. Krzyżanowskiego
Rynek główny Nr. 30.

Przedpłatę przyjmują:

- 1) Administracyja; 2) Agencje obok wymienione;
- 3) w Król. Polskiem i w Ces. Rosyjskiem Urzędy poczt.

PRZEGLĄD LEKARSKI

Organ Towarzystwa lekarskiego krakowskiego.

wychodzący pod redakcją

Prof. Dra L. Blumenstoka.

Wychodzi
co sobota
w objętości 1—1 1/2 arkusza.

Kopisomy zwracają się tylko
w skutek wyraźnego zastrzeżenia

Agencje główne:
w Warszawie w księgarni
Gebethnera i Wolfa,
w Poznaniu w księgarni
M. Leitgebta i Wsp.

Cena Przeglądu Lekarskiego wynosi: w Krakowie: rocznie zła 6, półrocznie 3, kwartalnie 1-50 w Ces. Austriackim: 600, 3-30, 1-80, w Ces. Niemieckim: 14. 7. 3-50 marek; w Królestwie Pol. i Ces. Rosyjskim, a mianowicie: w Warszawie: rocznie 5 Rsr. półrocznie 2 1/2 Rsr. na Prowincyi: 6-13 Rsr. — Cena ogłoszeń, które przyjmuje Redakcyja wynosi: Za wiersz drobny (petit) lub miejsce tegoż po 5 ct. Numer pojedyńczy kosztuje 15 ct.

TREŚĆ: I. Z pracowni prosektoryjum szpitala lwowskiego. FEIGEL. Wystąpienie glist do jamy brzusznej i zapłatanie w sieci wielkiej. — II. Z kliniki chorób wenerycznych i skórnych prof. Dra Rosnera w Krakowie. OBTULOWICZ. Rzadki przypadek ropienia nérki prawej z następstwem przebiegu ropnia w okolicy lędźwiowej prawej i wytworzeniem się przetoki nérkowej. Operacyja. Polepszenie znakomite. (C. d.) — III. BLUMENSTOK. Kazaistyka sądowolekarska. 1. Śmierć prof. Zejsznera. (C. d.) — IV. Oceny i wyciągi. SYDNEYA RINGERA o terapeutyce. Prof. HOPPE-SEYLERA chemii fizyologicznej część I. — RUGE. SKIBINSKI. — V. Posiedzenia towarzystw: Sekeyja Lekarska Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. — VI. Odcinek: O 50tym Zjeździe przyrodników i lekarzy niemieckich w Monachijum. Sprawozdanie Dra J. Warschauera. (C. d.) — VII. Wiadomości bieżące.

I. Z pracowni prosektoryjum szpitala lwowskiego.

Wystąpienie glist (*ascaris lumbricoides*) do jamy brzusznej i zapłatanie w sieci wielkiej.

(Odczyt miany w Tow. Lek. Galicyjskich. *)

Opisał Dr. Longin Feigel.

Prosektor szpitala powszechn. lwowskiego.

Pomimo, że glista znana jest od niepamiętnych czasów, bo od przeszło 2 tysięcy lat, a jak mało który z wewnątrzaków rozpowszechniona, z wyjątkiem bowiem Islandyi znajduje się na całej kuli ziemskiej, była ona w stanie otoczyć tajemnicą życie swoje przed starannem okiem badaczy i nie przestała do dziś dnia być przedmiotem ścisłych badań i ciekawych zagadnień naukowych. I tak obznajomiono się wprawdzie dokładnie z rozwojem jajek glistowych, lecz pytanie, w jaki sposób jajeczka te dostają się do ustroju człowieka, bynajmniej nie zostało rozstrzygniętem, a tylko najwięcej prawdopodobieństwa zyskało zdanie Davaina, iż z nieczystą wodą dostają się do przewodu pokarmowego człowieka. Niemniej i objawy chorobowe, jakie wywołują mają glisty, były do niedawna przedmiotem licznych roztrząsań, gdyż jedni badacze odnosili do ich obecności liczne przypadki chorobowe, których przyczynę inni wywodzili skądinąd; do dziś dnia nie zbywa zaś w piśmiennictwie na przypadkach szczególnie ciekawych objawów chorobowych przez glisty wywołanych.

Od dawna zwrócono też uwagę na szczególniejszą skłonność tych wewnątrzaków do odbywania po jamach ciała wędrówek i przeciskania się przez wąskie otwory i przewody do jam stojących z siedzibą ich, z jelitami, w związku bezpośrednim lub pośrednim. Dostają się one tak do żołądka, gardziela, jam nosowych, woreczka łzowego (2 wątpliwe przypadki u Davaina), trąbki Eustachego (przyp. Bruneaua u Davaina, w którym dziewczynie, która nagle dostała konwulsyj i niezmiernego bólu w uchu, autor wyjął glistę z ucha zewnętrznego, poczem przypadki natychmiast ustąpiły [Heller. *Entoz. Ziemssen* T. 7. str. 625.]) w drogi oddechowe (14 przyp. u Davaina, z których przypadek Aronsohna szczególnie jest ciekawy: dziewczynka 8-letnia zdrowa, napadniętą została nagle silnym

kaszlem i była bliską uduszenia; po 2 godzinach wśród konwulsyj przy silnem natężeniu wyrzuciła nagle żyjącą glistę, poczem przypadki natychmiast ustąpiły. Ziemssen l. c.), w przewod żółciowy aż do naczyń żółciowych wątroby (Davaine 37 przyp.; przyp. Virchowa, który znalazł ropień wygojony w wątrobie, a w treści tegoż licznie utrzymywane jajeczka glistowe), w przewod trzustkowy (wyrób anatom. w muz. patol. w Kiel. Ziemssen l. c.).

W innych przypadkach, które nas tu głównie obchodzą, znaleziono glisty w jamach lub w utkaniach, które bynajmniej nie łączą się z przewodem pokarmowym, jak w jamie otrzewny, opłucny, pęcherzu moczowym, macicy, pochwie, a nareszcie w t. zw. ropniach glistowych (*Wurmabscesse*). Przedewszystkiem pojawiają się w piśmiennictwie od czasu do czasu przypadki, w których glisty miały wolno leżeć w jamie otrzewny, bez przedziurawienia jelita i bez zapalenia otrzewny. Odnośni autorowie przypuścili więc, że glisty mogą przecisnąć się pomiędzy włóknami mięsnymi jelit, które potem napowrót zupełnie się zamykają. Powagi jednak naukowe, jak Rokitansky, Forster, Klebs, Heller itd. uważają przypadki takie za nieprawdopodobne i wątpliwe, jak bowiem Klebs (*Handb. d. path. Anat. II Lieferg. 308.*) słusznie zauważa, niejest dotychczas wytłumaczony mechanizm takiego przedziurawienia jelita, powtóre byłby niewytłumaczony brak wszelkich śladów zadrażnienia otrzewny, a wreszcie nie znaleziono nigdy śladów obumarłych glist w jamie brzusznej, co przy istnieniu takich przypadków musiałoby się było przydarzyć. W jednym przypadku, w którym przez małeńki załedwie odszukać się dający otworek urazowy wystąpiła glista prawie bez kału do jamy otrzewny, powstało przecież bardzo ostre zapalenie otrzewny. Przypadki tego rodzaju należy więc tłumaczyć tak, że otworu w jelicie nie zdołano znaleźć, co jak doświadczenie uczy, bardzo jest możliwem. W innych przypadkach przedziurawienia jelita tłumaczono w ten sposób, że glisty mają władzę przegryzienia ścian jelitowych.

Z obszernej literatury sądzą że nie od rzeczy będzie w piśmie poświęconem praktycznym lekarzom wymienić ciekawsze tego rodzaju przypadki, tém bardziej, że o ile przy tutejszych źródłach przekonać się mogłem, w piśmiennictwie polskiem niemasz podobnych przypadków podanych, a takowe mogą zająć czytelnika. I tak:

Siebenhaar (*Klin. Beobachtungen. Dresden 1824.*) podaje wynik sekcyi 13-letniej dziewczynki, która cierpia

*) Patrz Dwutyg. med. publ. 1877. Nr. 9.

ła na żołądy. Pod zgrubiałą otrzewną liczne guzy białe, słoninowate: w jamie otrzewny nieco płynu surowiczego. W jelicie czczém kilka otworów, z których sterczało 5 do 6 obumarłych, wielkich glist. Wielkość otworów odpowiadała ściśle wymiarom glist; były one okrągłe, a po stronie zewnętrznej zanieczyszczone skąpym śluzem jelitowym, ściany jelit nigdzie nie rozpadły. Autor twierdzi, że otwory te były dziełem samychże glist, które przedziurawiły zdrowe jelito.

Dr. Flögel (*Osterr. med. Jahrb. 1835. IX. 4.*) znalazł u dziecka 2 1/2-letniego, zmarłego na konwulsyje, przy sekcji wykonanej w 26 godzin po śmierci: w jamie brzusznej 3 do 4 łyżek cienkiej żółtej cieczy. Wspólny przewodźnik żółciowy blisko początku swego przedziurawiony przez 2 glisty, które głowami naprzód, więcej niż połową swęj długości wisiały w jamie otrzewny. W jelitach wiele glist. Owe dwie glisty odżyły w letniej wodzie i żyły jeszcze ćwierć godziny. W wątrobie było wiele żółtych, słoninowatych mas wielkości główki szpilki do wielkości orzecha laskowego i większe (?). Pęcherzyk żółciowy zawierał mało ze śluzem zmieszanej żółci. Autor zbija przypadkiem tym zdanie Rudolfigo i Bremsera, którzy twierdzą, że glisty nie są w stanie przedziurawić ściany jelita zdrowego.

Morgan (*Lancet Vol. 1. 1837.*) opisuje przedziurawienie żołądka, działywane przez glisty. W okolicy odźwiernika tuż przy śledzionie otwór obwodu pióra gęsiego, z ostremi brzegami, bez śladu nastrożkania. W żołądka 2 glisty, żadna zaś w jamie otrzewny. Przed śmiercią powstały gwałtowne bóle. (Najprawdopodobniej wrzód okrągły żołądka.)

Becquerel (*Schmidts Jahrb. Suppl. V.*) opisuje u 3-letniego chłopca w wyrostku robaczkowym kątnicy mały otworek, zatkany przez 2 glisty. Pomiędzy blaszkami sieci żołądkowo-okrężnicowej znaleziono 3 glisty, które wlażyły tam otworem Winsłowa. Ani śladu wystąpienia kału do jamy brzusznej, ani śladu zapalenia nie zauważano.

Tenże autor dodaje do tego drugi przypadek, w którym znalazł w sieci większą 4 glisty. W okrężnicy około kątnicy i w samej kątnicy znaleziono 3 przedziurawienia jelita rozległości franka.

Dechambre (*Gaz. med. it. Lomb.*) znalazł u 6-letniej dziewczynki pomiędzy opłucną a żebrami jamę wypełnioną cieczą surowiczo-krwawą, w której napotkano glistę. Połyk był jakby wygryziony, podarty i więcej niż na 1 cal otwarty, obok tej dziury znajdowała się w połyku glista, a druga nieco dalej. Dziura w połyku i zapalenie powstało wedle autora przez glisty.

Luschka (*Virch. Arch. VI. 3. 1854.*) opisuje przypadek u 23-letniego człowieka, który przed 2 laty przebył miernego stopnia zapalenie otrzewny i powtórnie ciężko zapadł na tę chorobę, przyczem żalil się szczególnie na ból w okolicy lędźwiowej lewej. Przy sekcji znaleziono w lewej jamie opłucny otorbieloną jamę wypełnioną brunatną posoką, która zawierała 6 glist; pod przeponą drugą podobną jamę, w której było również kilka glist, a która komunikowała z jedną stroną z otworem w ścianie okrężnicy, z drugiej strony z jamą opisaną w opłucny.

Müller (*Virch. Jahresber. d. ges. Med. 1872*) podaje przypadek u 16-letniej dziewczynki, który zdaniem jego dowodzi, że glisty są w stanie przedziurawić zdrowe ściany jelita. W lewej, zresztą zupełnie próżnej jamie opłucny znaleziono kilka glist, z których 2 w połowie jeszcze w żołądka się znajdowały. Żołądek okazał na tylnej ścianie otwór wielkości centa, podobnie przepona; otrzewna tylna ściana żołądka, obie powierzchnie przepony i dolna powierzchnia płuc przekrwione, wybroczynkami i delikatnymi błonami wyciętinami pokryte. W ścianach żołądka nie było jednak zmian. (Oczywisty wrzód okrągły

żołądka, i za taki uważany też przez Hellera, który przypadek ten przytacza. Ziemssen l. c.)

(Dokończenie nastąpi.)

II. Z kliniki chorób wenerycznych i skórnych prof. Dra Rosnera w Krakowie.

Rzadki przypadek ropienia nérki prawej z następowem przebieciem ropnia w okolicy lędźwiowej prawej i wytworzeniem się przetoki nérkowej. Operacyja. Polepszenie znakomite.

Skręślił Dr. Ferdynand Obtulowicz,

Asystent téjże kliniki.

(Ciąg dalszy.)

Omówiwszy w ten sposób pierwszą część historii choroby tak zajmującego przypadku, nie od rzeczy może będzie pokrótce przynajmniej zestawić przypadki, na których oparliśmy rozpoznanie ropnia nérkowego i na podstawie których uniknęliśmy pomieszania z innymi sprawami chorobowymi, obierającymi również nérkę za swą siedzibę.

Otóż wybadawszy obrzęk dość znacznej wielkości w miejscu odpowiadającym pod względem położenia anatomicznego najzupełniej nérce prawej można było myśleć tylko o sprawach dotyczących się tego narządu, a mianowicie albo o nowotworach, albo też o sprawach natury zapalnej. Stan gorączkowy, ból w miejscu obrzęku, jakoteż szybki wzrost jego wśród objawów ostro-zapalnych pozwalały stanowczo wykluczyć nowotwory usadowiające się w nérce (Ebstein *Krankheiten der Nieren* s. 54 i 127.), a mianowicie tak nowotwory dobrotliwe w pojęciu jak najobszerniejszym, jak puchlinę nérki, pasorzyty, jak wieńcogłówkę itd., jak i nowotwory złośliwe, zwłaszcza zaś raka, który pierwotnie w tym narządzie w ogóle bardzo rzadko występuje a w przypadkach dotąd znanych pojawiał się albo w wieku dziecięcym, albo też w późniejszej starości, omijał zaś wiek mekkiej dojrzałości, zwłaszcza że moczenia krwawego (*Haematuria*) stanowiącego obok bólów przeszywających przypadek niemal stały w powyższych wzmiankowanych przypadkach w niniejszym wcale nie dostrzeżono. Po wykluczeniu zatem nowotworów i pasorzytów należało nam ściślej uwzględnić sprawy chorobowe natury ostrozapalnej, a pod tym względem rozpoznanie było nieco trudniejsze. Wiadomą jest rzeczą, a poprzedzają ją dość liczne przypadki napotykanie w literaturze, że do zapalenia miedniczek nérkowych, czy to na tle wieńców, czy też na tle innego rodzaju nieraz przyplątać się może zapalenie tkanki wiotkiej komórkowatej i tłuszczowej otaczającej nérkę dookoła, jakoteż jej torebki włóknistej, a zapalenie to występuje również wśród objawów gorączkowych i kończy się ropieniem. Z drugiej strony może skutkiem przewlekłego zapalenia miedniczek nérkowych nastąpić nadżeranie ropne samego miąższu nérkowego i ropienie w głębi miąższu (*Pyelonephritis suppurativa*), gdzie nérka wraz z miedniczką nérkową razem tworzą jedną torbę znacznej nieraz wielkości wypełnioną ropą; albo też wreszcie w głębi miąższu nérkowego tworzą się najpierw drobne ropie wielkości prosa (*milhare Abscesse*), które zlewają się razem i tworzą jeden wielki ropień przebijający się zazwyczaj do miedniczki nérkowej, skutkiem czego nagle w moczu pojawia się znaczna ilość ropy, a przypady gorączkowe towarzyszące ropnemu rozpadowi narzą-

du zmniejszają się lub nawet na pewien czas zupełnie ustępują (*Ziemssen IX Band 2 Hälfte Ebstein s. 7.*) Przy rozstrzygnięciu, czy obrzęk w miejscu nérki usadowiony i zwiększający się wśród objawów gorączkowych niemal w oczach naszych przypisać należy zapaleniu kołonérkowemu, a więc zewnątrz torebki nérkowej, czy też zapaleniu śródotrebowemu nérki, względnie należy przedewszystkiem cechującą formę obrzęku obok chemicznego rozbioru moczu.

W przypadkach zapalenia kołonérkowego obrzęk ma postać podobnie okrągłą lub jajowato podługowatą, jak i przy ropieniu w głębi mięszu nérkowego, ale ponieważ zapalenie to ogarnia tkankę łączną, wiotką, pozaotrzewną, przeto granice obrzęku nigdy nie są tak ostro obrysowane, jak wtenczas, kiedy zapalenie ropne rozdyma tylko gładką torebkę nérkową, a i powierzchwnia obrzęku w pierwszym razie jest więcej guzowatą, chropowatą, podobnie jak to wybornie wyczuć można w przypadkach zapalenia kołomacicznego, nigdy zaś tak gładką, prawie elastyczną, jak to własnie wyczuć można było bardzo dokładnie w naszym przypadku. Nadto w zapaleniu kołonérkowym postać obrzęku zmienia się szybko, kiedy już wytworzona ropa toruje sobie drogę w kierunku pasu tkanki komórkowatej, gdzie na najmniejszy opór napotyka, skutkiem czego ropień przybiera postać jamy nieregularnej, zatokowatej.

Wówczas też zazwyczaj okolica lędźwiowa po stronie odpowiedniej zostaje wysadzona, skóra zaczerwienia się różycowato, części miękkie pokrywające ropień obrzmiewają ciastowato, a w głębi wyczuć można chełbotanie. Najczęściej też w tej okolicy ropa toruje sobie drogę na zewnątrz, jeżeli już wprzód nie pomożemy naturze za pomocą odpowiedniego rękoczynu chirurgicznego. W innem miejscu napomknę o innych możliwych zejściach zapalenia kołonérkowego, tu zaś ograniczę się tylko do wspomnienia o przypadku Michaelisa, w którym ropień kołonérkowy przebił się do moczowodu, skutkiem czego nagle podobnie, jak w naszym przypadku, pokazała się w moczu znaczna ilość ropy; zresztą jednak mimo troskliwego przeglądania literatury zagranicznej nie znalazłem ani jednego przypadku zapalenia kołonérkowego, gdzieby ropa przebiła tęgą włóknistą torebkę okalającą nerkę do okola, lub żeby przebiła się do miedniczki nérkowej, chociaż Ebstein (l. c. s. 48) utrzymuje, że może nastąpić nawet oddzielenie się martwinowe kawałka nérki skutkiem zbroczenia w odżywaniu jej mięszu pod wpływem zapalenia ropnego tkanki łącznej otaczającej nerkę. W przypadku naszym pomimo znacznych rozmiarów obrzęku gładkiego, ostro odgraniczonego, okolica lędźwiowa nie przedstawiała żadnego zbroczenia i nie brała żadnego udziału w sprawie zapalnej dotyczącej nérki prawej. Co do własności moczu, to przy zapaleniu kołonérkowym są one takie same, jakie zazwyczaj napotykamy w chorobach gorączkowych tj. moczu jest ilość skąpa, barwa jego ciemniejsza, nieraz ciszoczerwona, mniej lub więcej moczaków. Ciężar gatunkowy 1.015 — 1.020, oddziaływanie kwaśne, białka nie ma, ani waleczków. Oczywiście rozbiór moczu jest nieco odmienny, jeżeli zapalenie kołonérkowe przystępuje do pierwotnego zapalenia miedniczek nérkowych, ale i wtenczas osad jest nieznaczny, nigdy zaś prawie nie wykazuje tak znacznej ilości ropy nagle się pojawiającej w moczu, jak to było w naszym przypadku, gdyż jak to powyżej już wspomniałem, ropa obiera sobie łatwiejsze i dogodniejsze drogi, aby dostać się z ustroju na zewnątrz. Co do objawów gorączkowych, to w obu razach, jak w ogóle przy ropieniu, pojawiają się dreszcze, po których następuje gorączka ciągła dochodząca zazwyczaj przy zapaleniu kołonérkowym wieczorem do 39.5°, obniżająca się zaś z rana zaledwie

o 0.5° C. Gorączce tej towarzyszą zmiany chorobowe w trawieniu, mianowicie brak apetytu, nudności, nawet wymioty i uporczywe zatkanie stolca. W naszym przypadku przebieg gorączki, jak to z powyżej przytoczonych szczegółów przy historii choroby wnioskować można, był odmienny, a mianowicie nigdy gorączka nie była ciągłą, ale różnica między spotęgowaniem się jej wieczornem, a obniżeniem porannem wynosiła zawsze prawie 2 — 3° C., tak, że gdy gorączka wieczorna dochodziła nieraz do 40, a nawet 41° C., to z rana opadała na 38, a nawet na 37° C. Przez kilka dni miała nieraz podobieństwo do gorączki przepuszczającej codziennę z różną wysokością ciepłoty rannęj i wieczornęj, poczem następował na dni kilka znów stan bezgorączkowy. W ogóle jednak gorączka nie miała cech gorączki uremicznej, jak Francuzi nazywają gorączkę z przypadkami nerwowymi występującą nieraz w przypadkach ropnego zapalenia miedniczek i mięszu nérkowego. (Ebstein l. c. s. 30)

U naszego chorego przypadki nerwowe nie były wcale wybitne; podczas dreszczów tylko występowały czasem nudności i ból głowy, wymioty pojawiły się raz tylko; a co do przypadków innych ze strony narządu pokarmowego, to język wyjątkowo tylko był suchy i chropowaty, apetyt przeważnie był nie zły, a stolec zawsze mimo używania w wielkich ilościach kwasu garbnikowego regularny; czasem pojawiała się lekka biegunka, która po użyciu środków leczniczych zaraz ustępowała. Po przebieciu się ropnia nérkowego do miedniczki nérkowej i pojawieniu się znacznej ilości ropy w moczu gorączka ustąpiła, a pojawiała się znów z dreszczem i wyniszczeniem sił w razie zatrzymywania się, przyczem występowały znów bóle w podżebrzu prawem i uczucie napięcia w obrzęku, krótko powiedziawszy przedstawiając obraz powyżej już nakreślony, w zupełności taki sam, jaki Ebstein w zbiorze Ziemssenowskim narysował mówiąc o cechach ropnia nérkowego (str. 14). Na tę też podstawie nagłego pojawienia się znacznej ilości ropy w moczu i cechującej postaci obrzęku mającego zupełnie zarysy powiększonej nérki oparliśmy nasze rozpoznanie i odróżnili od zapalenia kołonérkowego, co też dalszy przebieg choroby, przedewszystkiem zaś wybadanie stosunków patologicznych przy dokonaniu rękoczynu chirurgicznego najzupełniej potwierdziły. Najtrudniwszem wreszcie było rozróżnienie, czy mamy do czynienia z prawidłowym ropniem nérki czy też zapaleniem ropnem miedniczki i mięszu nérkowego, gdyż często zdarzało się, że obie te sprawy chorobowe razem mieszano, a nawet na stole sekcyjnym z trudnością tylko stanowcze rozpoznanie uzasadnić się udawało. Tu już cechy obrzęku samego nie mogą wcale zaważyć na szali rozpoznania, tu tylko przebieg kliniczny potrafi pomódz do stanowczego przechylenia szali na jedną lub drugą stronę. Pod tym względem ośmielam się przytoczyć zdanie Ebsteina, który na str. 7 omawiając anatomiję patologiczną chorób nérkowych powiada „Klinicznie można przynajmniej z wielkiem prawdopodobieństwem oprzeć rozpoznanie, że ropień nérkowy przebił się do miedniczki nérkowej, poczem ropa drogami moczowemi na zewnątrz odpłynęła, na tę zwłaszcza okoliczności, że poprzednio nie znajdowała się w moczu ropa, a potem nagle i w bardzo znacznej ilości ropa w moczu się pojawiła. Wielkie ropnie nérkowe starych autorów zestawione przez Voigta nie są niczem innem, jak tylko ropniami zapaleniami miedniczek i mięszu nérkowego“. Wprawdzie w przypadku naszym punktem wyjścia dla ropnia nérkowego było zapalenie miedniczek nérkowych na tle wiewiórowém, jednakowoż przebieg choroby nas poucza, iż ropa w moczu od chwili przybycia chorego do zakładu klinicznego znajdowała się w nader nieznacznej tylko ilości, tak, że na spodzie nacynia

cieńka tylko warstewka ropy i śluzu się osadzała, a następnie pomimo wzrastania obrzęku ilość ropy się nie mnożyła, jak to dzać się powinno przy zapaleniu ogarniającem od strony miedniczek miąższ nerkowy i stapiającym go niejako na ropę, lecz przeciwnie po poprzedzających dreszczach i dłuższej bardzo wygórowanej gorączce pojawiła się nadzwyczaj wielka ilość ropy w naczyniu (500 grm.) nagle i odtąd z przerwami przez miesiące utrzymywała się w znacznej ilości zajmując nie raz do połowy naczynie litrowe. W obec takich faktów rozpoznanie ropnia nerkowego było najzupełniej usprawiedliwionem, a lubo przyczynę jego przypisywano pierwotnemu zapaleniu miedniczki nerkowej, to jednak tłumaczono sobie sprawę chorobową w nerce zawsze w ten sposób, iż w miąższu nerkowym potworzyły się najpierw ropnie drobniutkie, które zlewając się z sobą utworzyły razem ropień znacznych rozmiarów, a ten przebiwszy się do miedniczki nerkowej objawił się na zewnątrz znaczną ilością ropy, którą i w następnych tygodniach w obfitości wytwarzał.

Na zakończenie moich uwag nad tą pierwszą częścią historii choroby winienem jeszcze uwagę szan. czytelników na jeden zwrócić przypadek nader charakterystyczny dla ropienia w nerce, którego jednak mimo troskliwego badania osadu ropnego w naczyniu moczu zawierającym, tak pod względem makro- jak i mikroskopijnym, w naszym przypadku wysledzić nie zdołałem. Tak Simon, jak i Ebstein w swoich monografiach o ropniach w nerce podają spostrzeżenia niektórych autorów, iż po pęknięciu ropnia nerkowego do miedniczki nerkowej odchodziły czasem wraz z ropą i moczem kawałki nekrotyczne istoty nerkowej, a badanie drobnowidowe wykazało w takich razach niewątpliwie tak kłębki Malpighiego, jak i kanaliki moczowe. Simon (l. c. str. 173) przytacza przypadek Stillinga opisany przez Wiederholda, w którym rozpoznano zapalenie ropne nerki lewej i gdzie po pewnym czasie razem z moczem ropiastym wydostał się na zewnątrz kłębek wielkości jaja gołębiego zawierający wydatne kanaliki moczowe. Chory żył jeszcze 2 lata po tym wypadku. Simon w tym przypadku uważał za wskazany rękoczyn chirurgiczny mający na celu otwarcie nerki samej przez cięcie lędźwiowe, a nawet wyluszczenie nerki zniszczonej, gdyż druga nerka była najprawdopodobniej zdrową.

Drugi przypadek podobny również w dziele Simona opisany zawiązczy baczny spostrzeżeniem Taylora. U 11-letniego chłopca, który przed 1½ rokiem przebył płonicę i od tego czasu podupadł na siłach uskarżając się na bóle w podżebrzu lewem, nastąpiło pewnego dnia zatkanie cewki moczowej a dopiero po dłuższem napieraniu wydalonym zostało jakieś ciało okrągławe do 20 grm. wazące. Badanie mikroskopijne wykryło znów kanaliki moczowe z przyblonkiem dobrze jeszcze utrzymanym i ciała Malpighiego. W 3 miesiące później nastąpiła śmierć chorego a oględziny pośmiertne wykryły w obu nerkach ropnie zatokowate. tu i owdzie oddzielone już kawałki miąższu zupełnie podobne do tego, który przez drogi moczowe wydostał się na zewnątrz, przebicie ropnia nerkowego prawego do okolicy wstępującej, a nadto rozcięcie moczowodów, miedniczek i kielichów nerkowych po obu stronach. Simon w uwagach nad tym przypadkiem wspomina, iż zabieg operacyjny był jedynie usprawiedliwiony zaraz po odejściu kawałka nerki, a cięcie lędźwiowo-nerkowe mogło w razie pomyślnym nawet życie choremu uratować.

Jak już powyżej wspominałem, chory nasz żadną miarą nie chciał się poddać rękoczynowi chirurgicznemu i zwątpiwszy w swe wyzdrowienie pojechał do domu rodzinnego, aby tam życia dokonać. Los jego jednak zbyt nas żywo interesował, abyśmy przynajmniej listownie nie

mieli się wywiadywać o przebiegu jego choroby, a wiadomości z owego okresu są następującej treści:

Chory przybył mocno osłabiony do wioski rodzinnej, dreszcze i wygórowana gorączka powtarzały się codziennie. Bóle w podżebrzu prawem wzmagaly się w miarę, jak wzrastał obrzęk zajmujący nerkę prawą, a nawet chory zauważył, że skutkiem tego cała ta okolica była nieco wypukłą. Mocz mętny z domieszką ropy oddawał chory 2 — 3 r. na godzinę zarówno we dnie, jak i w nocy, doznając przytęm swędzenia na końcu żołądki. Apetyt, za zwyczaj u chorego wyborny, podupadł znacznie. Z końcem lipca począł chory robić okłady z siemienia lnianego na okolicę lędźwiową po stronie prawej, gdyż obrzęk był wyczuwalny pod samą skórą i mocno choremu dokuczał. Kiedy skóra nieco obrzękła i zaczerwieniła się wezwał chory fęlczerą, który w dniu 9 sierpnia przeciął obrzęk w miejscu stosunkowo najmiększem (oddalonym o 11 cm. od kręgosłupa w okolicy lędźwiowej prawej), a po trzechkrotnem zatopieniu lanceta dotarł aż do miejsca podatniejszego, z którego ropa cienkim strumieniem sączył się poczęła. Od téj chwili wypływała ropa ustawicznie, a w pierwszych dniach po rękoczyne ilość jęj była tak znaczną, iż całe łóżko było zanieczyszczone. Przez całe dwa miesiące wydzielala się ropa w znacznej ilości; siły opuśczały chorego tak, że sam z boku na bok przewrócić się nie mógł. Zwolna przyszedłszy nieco do siebie wybrał się na kilkakrotne nasze wezwanie znów do zakładu klinicznego, lecz podróż wózkiem z pod Biecza do Tarnowa osłabiła go znów tak mocno, iż go koniecznie na jakiś czas w szpitalu tarnowskim pozostawić musiano. Od października aż do pierwszych dni lutego pozostawał tamże pod obserwacją kol. Dra Kowalskiego, a uprzejmości jego zawiązczyam następujące szczegóły pokrótce zebrane, które mi posłużyły do uzupełnienia historii choroby.

„Rozpoznanie lekarskie: zwężenie cewki moczowej (?) zapalenie pęcherza, ropień w okolicy lędźwiowej prawej. Gorączka znaczna, wyniszczenie sił wielkie, przytęm zatrzymanie moczu od paru tygodni, który tylko kroplami odchodził. Z ropnia na prawej stronie lędźwiu dobrowolnie przed miesiącem pękniętego (?) wypływała dość znaczna ilość ropy czystej. Zwężenie cewki moczowej, do której nawet najcieniszy cewnik metalowy wejść nie chciał, dało się usunąć dopiero po upływie pięciu tygodni za pomocą cewników odpowiednich. Mocz z początku brudno-żółty, alkalicznie oddziaływający, zawierał ropę, nieco białka, pod drobnowidem widać było tylko przyblonek, kryształki fosforanów, szczawianów lub moczanów, wreszcie ciałek krwi nie zauważano; użycie wody sodowej sine natro przez ośm tygodni wpłynęło nader korzystnie na zapalenie pęcherza, oczywiście obok ułatwionego odpływu moczu przez zniesienie zwężenia cewki, mocz bowiem chorego badany po dziesięciotygodniowym pobycie w szpitalu oddziaływał kwaśno i zawierał tylko ślady ropy i białka, wałeczków włóknikowych nie było tak samo, jak przy pierwszym badaniu. Co do owego ropnia, to został on zaraz z początku rozszerzony, a wsunięty zgłębnik dochodził do okolicy nerki prawej. Dnia 15 stycznia 1877 stan zdrowia Potyrały był zadowalający; chory nie gorączkował wcale, miał dobry apetyt, użył nieco; mocz oddaje prawidłowo, lecz nieco częścięj, z otworu na prawej stronie lędźwiu sączy się jeszcze nieco płynu ropiastego, założony jednak zgłębnik nie dochodzi już do okolicy nerki“.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

III. Kazuistyka sądowo-lekarska.

Sprawozdanie z ważniejszych przypadków

napisał Prof. Dr. Blumenstok.

I. Śmierć profesora Ludwika Zejsznera.

(Ciąg dalszy.)

Jest rzeczą jasną, że do zduszenia człowieka silnego i przytomnego potrzeba więcej niż jednego człowieka, aczkolwiek nie można wcale wykluczyć możebności, że wystarczy i jedna osoba, jeżeli ona jest zręczną i z postronkiem niejako obchodzić się umie.

Poniżej wykazemy, że wszystko za tём przemawia, iż morderstwo popełnionóm zostało w nocy lub nadedniem, i że L. Z. najprawdopodobniej napadniętym został we śnie, że jednakowoż musiał się wnet przebudzić i bronić. Do takiej napaści na człowieka starego, schorzałego, we śnie pogrążonego, a w każdym razie w łóżku leżącego, całkiem wystarczającą była jedna osoba, zwłaszcza mężczyzna silny. Wprawdzie walka była krótką, a obrona słabą, — to jednak nie przemawia jeszcze za udziałem więcej osób, a może raczej przemawia przeciw takowemu, bo przypuściwszy, że jeden człowiek zarzucił denatowi postronek na szyję, a drugi trzymał kadłub, to przecież niepodobnem by było, aby człowiek stary tak napadnięty mógł się zerwać, i aby celem dobicia go trzeba było przewrócić go na przeciwną stronę łóżka. Jeżeli zaś przypuścimy, że napadnięty został przez jedną tylko osobę, o wiele łatwiej wytłumaczymy sobie możebność zerwania się napadniętego i stawienie oporu, choć krótkiego i słabego.

Z tego powodu prawdopodobniejszém nam się zdaje, że L. Z. zamordowany został przez jedną osobę, jeżeli osobą tą był mężczyzna dość silny.

Co do IV-go.

Przy pierwszych oględzinach skuteczniejszych d. 3 stycznia o godzinie wpół do 5-tój po południu znaleźliśmy odnogi tak górne jako i dolne w stanie stężenia pośmiertnego, a na pośladkach i wzdłuż stosu pacierzowego dokładnie widoczne plamy pośmiertne jasnobrunatne.

Doświadczenie uczy, że stężenie zwykle występuje na trupie w 8 godzin po śmierci, a czasem dopiero w 10—12 godzin; rozpoczyna się od szczęki dolnej i karku, przechodzi następnie na mięśnie klatki piersiowej, odnóg górnych, a w końcu na mięśnie odnóg dolnych. Ponieważ na zwłokach znaleziono o godzinie wspomnionój stężenie w całym ciele, a więc i w odnogach dolnych, przypuścić można, że od chwili śmierci upłynęło przynajmniej 10 godzin, czyli, że L. Z. zmarł najpóźniej koło 6-jej godziny zrana. Do tego samego wniosku uprawnia nas obecność plam pośmiertnych.

Oznaczywszy z największém prawdopodobieństwem kres najbliższy, niemożemy atoli na podstawie stężenia trupiego z równą pewnością oznaczyć kresu najdalszego, a to z powodu, że opierając się na stężeniu trupiém, jakoteż na plamach pośmiertnych, moglibyśmy zarówno przypuścić, że L. Z. zmarł na 10, jak na 20 godzin przed pierwszemi oględzinami; dalej już granic rozszerzyć nie możemy, bo w razie gdyby był umarł przed dołą całą, plamy pośmiertne byłyby już obfitszemi, zwłaszcza z powodu płynności krwi. Na mocy więc dwóch ważnych zmian, o których dotąd była mowa, mielibyśmy prawo przypuścić, że L. Z. zmarł między godziną 9 wieczór a 6 zrana.

Jednak wynik oględzin wewnętrznych pozwala nam skrócić znacznie przeciąg ten czasu 9-cio godzinny. Zna-

leźliśmy żołądek całkiem próżny (24), co dowodzi, że w każdym razie upłynęło kilka godzin przynajmniej od ostatniego przyjęcia pokarmu. Gdybyśmy wiedzieli, o której godzinie denat jadł po raz ostatni i jakiego użył pokarmu, moglibyśmy dokładniej oznaczyć godzinę śmierci. Ponieważ atoli tego nie wiemy, próżność żołądka tym razem nie ma wielkiego znaczenia. — Ważniejszą nierównie jest okoliczność, że znaleźliśmy pęcherz moczowy pełny, przeszło 1 funt płynu zawierający, z czego wynika, że od ostatniego oddania moczu musiało upłynąć kilka godzin przynajmniej. Gdy z całego położenia rzeczy, jak to później zobaczymy, wypływa, że zmarły napadnięty został we śnie, a w każdym razie, gdy leżał w łóżku rozebrany, a trudno przypuścić, aby człowiek stary i schorzały miał udać się na spoczynek nie oddawszy poprzednio moczu, przypuścić zarazem potrzeba, że L. Z. spał lub przynajmniej leżał w łóżku przez kilka — i to 5—6 godzin — zanim został napadniętym. Gdy następnie świadkowie podają, że L. Z. zwykł był kłaść się koło północy, to przypuściwszy, że i ostatniej nocy położył się między 10—i2 godziną, musiały spać do godziny 4 lub 5 ej aby pęcherz moczowy jego tak się napełnił. Gdyby zaś ostatniej nocy wcześniej niż zwyczajnie był się położył, to również dopiero po północy mogło się tyle moczu nagromadzić. Widzimy więc, że na podstawie oględzin wewnętrznych kresu najdalszy śmierci L. Z. zbliża się prawie zupełnie do kresu najbliższego, tak że usprawiedliwionóm nam się wydaje orzeczenie nasze, że L. Z. zmarł koło godziny 5-jej z rana, a w każdym razie w kilka godzin po północy.

Uzasadnwszy tym sposobem orzeczenie tymczasowe z d. 4 bm. podajemy w ustępie ostatnim zdanie nasze o sposobie, w jaki czyn popełnionój został, o walce i obronie. Zdania tego nie wypowiadamy wprawdzie z bezwzględną pewnością, jednak nie opieramy go też na prostych domysłach, lecz na spostrzeżeniach czynionych na trupie i jego ułożeniu oraz na kombinacji sądowo-lekarskiej. Zestawiany zaś obraz ten w mniemaniu, że szczegóły mogą być Sądowni potrzebni.

Świadkowie podają, że L. Z. zwykł był sypiać z głową od okna odwróconą. Istotnie przy pierwszych oględzinach znaleziono łóżko tak usłane, że na materacach leżało prześcieradło, a nad niem w końcu łóżka bliższém okna leżała poduszka materacowa trójkątna, z podstawą ku oknu zwróconą; brakowało tylko poduszki wierzchniej, która jak wyżej powiedziano, znajdowała się po stronie przeciwniej łóżka nad kołdrą i szlafrokami zwłoki pokrywającymi. Nie ulega więc wątpliwości, że nieboszczyk i ostatniej nocy leżał lub spał jak zwykle. Tymczasem znaleziono trupa z głową na drugim końcu łóżka, a z nogami spoczywającymi na poduszce materacowej pod głowę przeznaczonój. Z tego położenia wynika, że L. Z. został przewróconym. Dalej wynika z nienaturalnego ułożenia ciała, że przewrócenie było gwałtowném. Zapewne przewrócenie to nie było pierwszym aktem morderstwa, bobyśmy w takim razie nie mogli wytłumaczyć powstania sińca i otarcia na grzbiecie ręki lewej, nie przypartej do brzegu łóżka (12), która po przewróceniu już musiała być nieczynną. Najprawdopodobniej więc rzecz miała się tak, że napastnik przystąpił do L. Z. śpiącego i usiłował położyć mu na szyję postronek z pętlą już gotową, że napadnięty przy tej manipulacji się zerwał i chciał się bronić, a prawdopodobnie bronił się istotnie obiema rękami, jak tego dowodzą sińce i otarcia na grzbiecie obydwóch rąk. Wówczas napastnik pasując się z ofiarą swoją przerzucił ją na drugi koniec łóżka, przyczém ubezwładnił jej rękę lewą przynięcioną ciężarem własnego ciała i ściągnął pętlę. Gdy w ten sposób napadnięty stał się całkiem bezbron-

nym, napastnik dla tém pewniejszego dobiecia go, stojąc przed łóżkiem i ciągnąc koniec postronka jedną ręką, i to najprawdopodobniej lewą, ku sobie, (w skutek czego powstała brózda idąca od karku ku obojczykowi lewemu), wywierał ręką drugą, prawą, ucisk na okolicę oka lewego w kierunku od ściany ku sobie, jak tego dowodzi spłaszczenie powiek oka lewego, wylanie krwi podskórne i podspojówkowe w zewnętrznym kącie oka lewego, oraz skręcenie nosa ku stronie prawej. Najprawdopodobniej podczas tego podwójnego i silnego ugniecenia raz szyi za pomocą postronka a powtóre twarzy za pomocą pięści i skierowania całej głowy na prawo, złamała się kość gnykowa, a właśnie przełamanie się jęj rogu większego prawego za tém najbardziej przemawia. Następnie przekonawszy się zapewne, że napadnięty już nie żyje, zaniechał morderca dalszego ściągania postronka i ugniatacia twarzy, a musiał zaniechać nagle, bo głowa zwróciła się znów na lewo ku ścianie, podczas gdy koniec postronka pozostał zapewne w pierwotnym swém położeniu, to jest po stronie lewej szyi ku obojczykowi. Głowa trupa po oddaleniu się od niego mordercy leżała przez czas dłuższy zwrócona na lewo, a zatem w położeniu przeciwnym pierwotnemu: dowodem tego obfita ilość krwi znaleziona na lewo od głowy, a która to krew przez materac i siennik dostała się na podłogę pod łóżkiem, tworząc tam kałużę. Gdyby bowiem głowa od chwili śmierci znajdowała się w położeniu takim, w jakim ją znaleziono, to jest zwrócona na prawo i zewnątrz oraz nieco ku górze, natenczas krew musiałaby powalać lice prawe i znajdować się na prawo od głowy, a na podłodze przed łóżkiem. Obecność jęj atoli, i w takiej obfitości, na lewo od głowy, przemawia za tém, że głowa musiała leżeć nisko i przez czas dość długi być zwróconą ku ścianie. Później dopiero morderca znów za pomocą końca postronka zwrócił głowę na prawo i nieco w górę przymocowując zarazem postronk do gałki od łóżka, może w zamiarze wzbudzenia podejrzenia, jako L. Z. dopuścił się samobójstwa, a wskutek przeciągnięcia postronka przez kąt lewy szczęki dolnej na dolną część lica lewego powstała brózda na lieu lewem. Co skuteczniwszy przykrył zwłoki.

Wszystkie akty morderstwa razem wzięte trwały bardzo krótko, co najwięcej parę minut, ponieważ L. Z. napadnięty został we śnie, a przynajmniej w łóżku, a śmierć jego musiała nastąpić szybko, jak w ogóle przy uduszeniu.

Wreszcie wyjaśniamy jeszcze następujące szczegóły:

1) Czy morderca podczas walki z ofiarą swą został cielesnie obrażonym?

Powiedzieliśmy wyżej, że napadnięty zerwał się i bronił, choć słabo i krótko, sądząc po nieznacznych obrażeniach znalezionych na jego rękach. Z uwagi atoli, że pazońce u rąk nieboszczyka były dość długimi, a u ręki prawej, którą przeważnie mógł się bronić, ostre i odgryzionemi, przypuścić wypada, że morderca mógł być zadraśniętym w ręce lub w ogóle w okolicę dla palców przystępną, a ślady krwi nieznaczne znalezione na obydwóch rękach zamordowanego przemawiałyby za tém, że zadraśnięcie to połączone było z lekkim krwawieniem.

2) Czy morderca musiał być krwią powalany?

Ponieważ na zwłokach nie spostrzeżono żadnych ran, a krew z nosa mogła puścić się dopiero po śmierci, morderca niekoniecznie musiał być krwią powalany. Jednakowoż zdaje się, że przynajmniej później, gdy przed oddaleniem się głowę trupa za pomocą postronka skierował ku izbie, powalał się krwią w skutek dotknięcia się przesiadką lub postronka pokrwawionego, gdyż plamy znalezione na chustce od nosa, która leżała w szlafroka, mogą

pochoździć ztąd, że morderca skrwawionemi palcami szukał w kieszeni szlafroka. Plamy zaś te, a zwłaszcza jedna szkląca się, były za nadto świeże, a chustka sama była złożona, nieużywana, tak, że trudno przypuścić, aby L. Z. dawniej sam przy jakiejś sposobności chustkę był pokrwawiał.

Gdyby się zaś pokazało, że morderca lub suknie jego mocno były krwią zbroczone, pochodziłoby to mogło tylko ztąd, że krew z nosa L. Z. puściła się szybko jeszcze podczas duszenia go, a więc jeszcze za życia, co nawet jest prawdopodobnem.

Albowiem na poszwie poduszki, którą znaleziono nad koldrą i szlafrokami głowę trupa pokrywającami, zauważano kilka plam krwawych, a w jednym rogu poszwy kilkadziesiąt drobnych kropek krwawych, tak obok siebie ugrupowanych, że czyniły wrażenie, jakoby pochodziły od tryknięcia drobnego naczynia krwionosnego. Kropki te pochodzić mogą ztąd, że poduszka ta pierwotnie znajdowała się blisko samej głowy i że krew z nosa puściła się jeszcze za życia duszonego, albowiem w przeciwnym razie krew mogłaby sączyć się, a nie tryskać.

Wyczerpnawszy tym sposobem wszystkie szczegóły, które zdaniem naszym wyjaśnienia sądowno-lekarskiego wymagały, podajemy orzeczenie niniejsze do wiadomości Sądu.

Dwa dni po złożeniu powyższego orzeczenia (d. 13 stycznia) wezwani zostaliśmy do Sądu celem zbadania dwóch więźniów. Jeden z nich był to ostatni służący nieboszczyka, który wyszedłszy zrana dnia 3 stycznia z pomieszkania już więcej nie powrócił; pokazało się, że koło godziny 7-jej zrana udał się wprost na kolęj a przybywszy po odejściu pociągu powrócił na rynek, gdzie dopadł doróżki i pojechał do Chrzanowa; tam przebrał się i ogolił, a pozostawiając suknie swoje u znajomego, przejechał granicę pruską. Urzędnik tutejszej policji dogonił go w Pleszowie w W. X. Poznańskim, znalazł przy nim rzeczy własnością nieboszczyka będące i przywiózł go do Krakowa. Zrazu podawał, że się nazywa Józef Bachowski i że pochodzi z Król. Polskiego; później twierdził, że zowie się Jan Zdziarski; jednak nie zdołano sprawdzić, jakie jest prawdziwe jego nazwisko i z kąd pochodzi. Przyznał on się odrazu do winy, jako pobudkę podając chęć pomszczenia się na prof. Z. za to, że nieboszczyk podczas ostatniego powstania nie sprzyjał stronnictwu narodowemu, i że z tego powodu wstąpił do służby z zamiarem zgladzenia prof. Z.; później znów tłumaczył się, że plan zamordowania prof. Z. wyszedł od przyjaciela, którego był zaprosił na wieczór do siebie, i że ten przyjaciel czynu dokonał. Przyjacielem tym był drugi więzień Jan Lempicki, wyrobnik tutejszy, którego ujęto w Krakowie, a przy którym również znaleziono przedmioty własnością prof. Z. będące. Ostatni podał, że istotnie zaproszony przez Zdziarskiego był w nocy z 2 na 3 stycznia w pokojach tylnych pomieszkania prof. Z., że Zdziarski namawiał go, aby prof. Z. zamordował, albo przynajmniej brał udział w morderstwie, że jednak zachowywał się całkiem biernie, podczas gdy Zdziarski ofiarę swoją dusił, i że za obietnicę zachowania tajemnicy otrzymał od Zdziarskiego kilka przedmiotów zabranych z pomieszkania.

Obaj uwięzieni jednozgodnie zeznali, że prof. L. Z. napadnięty został we śnie koło godziny 4-jej zrana; wtedy bowiem służący wedle polecenia wieczorem otrzymanego miał zapalić w piecu sypialni nie zamykanęj; napadnięty przebudził się mając już stryczek na szyi, bronił się, i wśród tęj obrony z łatwością przerzucony został na drugą stronę łóżka i tam uduszony. Po przeszukaniu pomieszkania morderca przymocował postronk do gałki łóżkowej i przy-

krył trupa koldrą, szlafrokami i poduszką. Nie zgadzali się zaś pomiędzy sobą, w kwestyi głównej, o ile jeden drugiego nawzajem obwinał o popełnienie morderstwa.

Jakkolwiek zgodne opisanie całego przebiegu przez obydwóch obwinionych zasługiwało na tém większą wiarę, o ile było niezależnem od siebie, jakkolwiek więc odrzuca doznaliśmy zadowolenia, że opis na podstawie spostrzeżeń i kombinacji zestawiony zgadzał się w zupełności z prawdą, to przecież zadanie nasze jeszcze nie było skończonem; gdy bowiem Sądowi wielce na tém zależeć musiało, aby rozstrzygnąć wątpliwość, kto był sprawcą zbrodni, a mianowicie, czy nim był jeden tylko z obwinionych i który, albo też obaj razem, otrzymaliśmy polecenie zbadania obydwóch oraz sukni, które mieli na sobie w nocy z 2-go na 3 stycznia, celem przekonania się czy niema jakichś śladów na ciele lub sukniach, któreby przemawiały za udziałem w morderstwie.

(Dokończenie nastąpi.)

IV. Oceny i wyciągi.

Sydney Ringer: *Handbuch der Therapeutik. Nach der fünften Auflage frei übersetzt von Oskar Thamhayn.* Stuttgart F. Enke. 8. str. 672. 1877.

Wszystkie w ogóle angielskie podręczniki lekarskie odznaczają się wielką praktycznością a zarazem ścisłością, różniąc się tém mianowicie od niemieckich, że lubo nie wyczerpują teorii i piśmiennictwa pewnej gałęzi umiejętności lekarskiej, to jednak obok umiejętnego traktowania przedmiotu obejmują mnóstwo cennych dla lekarza praktycznego wiadomości. Takim wyłącznie praktycznym jest podręcznik Ringera, który w ciągu kilku miesięcy doczekał się aż 6ciu wydań w Anglii.

Dzieło to wcale jest odmienne od używanych w Niemczech a powszechnie znanych podręczników farmakologii. Autor nie trzymając się właściwie żadnego z dotychczasowych układów farmakologicznych przechodzi działacze fizyczne (zimno, ciepło), ciała nieorganiczne, dalej organiczne, wreszcie kończy na podaniu sposobów przyrządzania potraw dla chorych.

W dziele roztrząsaném czytelnik bynajmniej nie znajdzie obszernych traktatów o fizjologicznem działaniu leków, (najczęściej zbiór doświadczeń fizjologicznych na zwierzętach czynionych o sprzecznych wynikach, w odmgocie których gubi się myśl czytającego bez wyraźnej korzyści), lecz przy każdym leku ma podane jedynie i wyłącznie użycie tegoż w rozmaitych chorobach, przyczem znajdzie mnóstwo praktycznych szczegółów, dla lekarzy nadzwyczaj pożądaných, co do sposobu użycia pewnego leku, przeciwwskazań dla tegoż, sposobu zadawania leków, dyjety przy zadawaniu tychże przestrzegać się mającej itp.

W ten sposób R. roztrząsa użycie lecznicze najgłówniejszych leków, niezapominając o najnowszych jak krotonchloralu, amylnitrycie i gelsemium semper virens, rzecz zaś przedstawia umiejętnie zwięzłe i jasno, jak każdy anglik, nie męcząc przytém uwagi szczegółami nie mającemi praktycznej wartości. Obszerny zresztą spis rzeczy w abecadlowym porządku niezmiernie ułatwia użycie tego dzieła w codziennęj praktyce.

W obec mnóstwa „kieszonkowych podręczników terapeutycznych“, „skarbców lekowniczych“, „lekwzorów klinicznych“ i tym podobnych dziełek (Kraus, Roth, Knauth, Müller, Ziemssen itd.), jakie pojawiły się w ostatnich dwóch latach, dzieło Ringera chlubnie się odznacza, a w porównaniu z najnowszym tego rodzaju

dziełem H. Köhlera „*Grundriss der physiologischen Therapeutik*“, które niemal w tej chwili ukazało się w handlu księgarskim, bynajmniej nie traci na wartości.

Polecam więc czytelnikom dzieło o którym mowa, tém więcej, że tłumacz zastosował go do potrzeb lekarzy niemieckich, będąc przekonany, że każdy z lekarzy znajdzie w niem cenne wiadomości, choćby nawet nie był zwolennikiem angielskiej terapii.

L — ski.

Prof. Dr. Felix Hoppe-Seyler: *Physiologische Chemie, I Theil, Allgemeine Biologie.* Berlin A. Hirschwald. 1877
8 maj. str. 174.

Wraz z Beneckem i Lebertem przyznać trzeba, że dzisiejsi lekarze w mnóstwie szczegółowych studyjów tracą pogląd na całość przyrody, na stosunek człowieka do teje, co stanowi ważny niedostatek tegoczesnych szkół lekarskich, które kształcąc lekarzy specjalnych, uzbrojonych ogromnym zapasem drobiazgowych wiadomości i technizmów, nie dają im ogólnej podstawy myślenia i działania, wynikającej z dokładnej znajomości ogólnej biologii, że tak powiemy przyrodniczej filozofii.

W dziele Hoppe-Seylera znajdzie właśnie lekarz te wiadomości treściwie zebrane i uporządkowane z ogromnego obszaru nauk o życiu świata nieorganicznego i organicznego, w ogóle o życiu na powierzchni ziemi. Autor roztrząsa najprzód ogólne warunki życia fizyczne i chemiczne, następnie przechodzi do skręślenia chemicznej budowy ustrojów, objawów życiowych i spraw żywotnych, zastanawia się obszerniej nad rozlewaniem się cieczy i kończy rzecz swoją wykładem o sprawach komórki żyjącej.

Dzieło, o którym podajemy tu wiadomość, tém odznacza się od wielu prac w przedmiocie ogólnej biologii ogłoszonych, że jest ostatnim wyrazem społecznej wiedzy. Nie wyczerpuje ono trudnego do objęcia piśmiennictwa oraz licznych hipotez w tej dziedzinie panujących, ale namiast podaje czytelnikowi to tylko, co jest niewątpliwie doświadczeniem stwierdzone.

L — ski.

C. Ruge: O oddychaniu płodu i noworodka.

Na posiedzeniu Towarzystwa położniczo-ginekologicznego w Berlinie z dnia 24 kwietnia r. b. R. wspomniawszy o 2 przypadkach ogłoszonych niedawno przez prof. Hofmanna we Wiedniu przytacza 4 przypadki, w których spostrzegł u płodów oddychanie powietrzem przed porodem i dochodzi do następujących wniosków: 1) Powietrze znachodzić się może w płucach dzieci martwo urodzonych, pomimo, że wśród porodu nie było pomocy sztucznej, ani sztucznego oddychania po porodzie. Sprzyjają dostaniu się powietrza do dróg oddechowych płodu w macicy: wczesne odejście potoku, długie trwanie porodu, rzucanie się rodzącej, a może przedewszystkiem okoliczność, że kobieta poprzednio już rodziła. 2) Jeżeli poród trwa długo a potok odszedł wczesnie, wtedy powietrze często znachodzi się w jamie jajowej i czyni możebnem oddychanie. 3) Z tego powodu tylko z wielką ostrożnością uważać można próbę hydrostatyczną jako dowód oddychania pozamacicznego. 4) Porody potajemnie odbyte nie zajmują w tym względzie stanowiska wyjątkowego.

W rozprawie nad tym przedmiotem zgadza się prof. Schröder z wykładającym, że w istocie często powietrze znachodzi się w płucach dzieci, które z pewnością nie oddychały po porodzie; może ono się dostać do płuc dzieci martwo urodzonych przez wywołanie sztucznego oddychania lub wdmuchiwanie, albo też może dostać się śród porodu do części płciowych rodzącej a stamtąd do

dróg oddechowych płodu, i to nietylko wśród uskutecznienia rękoczynów, ale i wśród badania zwłaszcza skombinowanego. Faktu tego nie radzi jednak stósować do praktyki sądowolekarskiej, bo próba hydrostatyczna nie byłaby się tak długo utrzymała, gdyby nie miała znacznej wartości praktycznej. Przy tej sposobności prof. Schröder przypomina, że spostrzegł przypadki, w których na odwrót płuca dzieci, które niewątpliwie oddychały i krzyczały, okazały się płodowemi. Martin powątpiewa, ażali powietrze, które raz do płuc się dostało, może znów wyjść w zupełności i woli przypuścić, że w takich razach wdychania były powierzchownemi i że powietrze wcale do pęcherzyków płucowych się nie dostało; tłumaczeniu temu atoli sprzeciwia się Schröder na podstawie spostrzeżeń własnych i Thomasa. (*Berl. klin. Woch.* 1877. Nr. 43.)

Uwaga sprawozdawcy: Jeszcze w r. 1869 ogłosił prof. Schröder (w *Deutsches Archiv. f. klin. Medicin* VI. p. 398 — 420.) rozprawę p. t. „*Kann aus der Lunge Neugeborner, die geathmet haben, die Luft wieder vollständig entweichen?*“, w której opierając się na przypadkach Thomasa i na 4 własnych przypadkach na pytanie to odpowiada twierdząco. O ile nam wiadomo Liman (*Pract. Handb. d. gerichtl. Medicin*, VI Aufl. II, str. 899.) był pierwszym, który twierdzenie Schrödera nazwał hipotezą sprzeciwiającą się wszystkim doświadczeniom dotychczasowym a mybyśmy dodali, że ona się tak dalece sprzeciwia wszelkim zasadom fizjologicznym o oddychaniu, że trudno pojąć, jakim sposobem znakomity profesor berliński przy tém twierdzeniu się upiera; nam przeciwnie tłumaczenie powyższe Martina o wiele więcej przemawia do przekonania. Natomiast słusznie Schröder nie radzi faktu podanego przez Rugego odnosić do praktyki sądowolekarskiej, jakkolwiek powód przez niego przytoczony, że próba płucowa musi być dobrą, skoro tak długo się utrzymuje, wcale nie wystarcza. O wiele ważniejszym jest powód inny, którego nie przytoczył. We wszystkich przypadkach, w których dotąd spostrzeżono oddychanie płodu w macicy, powietrze dostało się do macicy, że tak powiemy, w ślad za narzędziem lub przynajmniej palcami wprowadzonymi przez akuszerza. W dochodzeniach zaś dzieciobójstwa, a więc tam, gdzie próbę płucową stósujemy, mamy zwykle do czynienia z kobietami tajemnie rodzącemi, w których więc o rękoczynie lub badaniu skombinowanym mowy nie ma. Dopóki się więc nie wykaże, że powietrze może się dostać do macicy podczas porodu niezależnie od manipulacji akuszerza, dopóty możebność „oddychania płodu w macicy“ nie zdoła osłabić próby płucowej w dochodzeniu dzieciobójstwa, dokonanego przez kobiety tajemnie rodzące.

L. B.

Prof. Dr. Skibiński (w Czerniowcach): **Szczególne zwężenie miednicy. Cięcie cesarskie wykonane z pomyslnym wynikiem dla matki i dziecka.**

Rakocze Iftma, 34-letnia pierwiastka, opowiada, że w wieku dziecięcym w brutalny sposób bita łopata po plecach i krzyżach chorowała przez rok cały, przyczem potworzyły się liczne ropnie na nogach, kości krzyżowej i prawej pachwinie, z których obficie odchodziła ropa i kawałki kości. Przywieziona po 48 godzinnej pracy porodowej do zakładu położniczego, okazuje zwężenie poprzecznych wymiarów miednicy najwyższego stopnia, bo na 3 cm., przez zropienie połączeń krzyżowo-biodrowych i zbliżenie się przez to kości bezimiennych ku sobie, jako też przez nagromadzone nieregularne guzy kostne.

S. wykonał cięcie cesarskie, wydobyl dziecko om-dlałe, które docucil, następnie po wydobyciu części dodatkowych powstrzymał krwotok z cięcia macicznego lodową wodą, i spoił ranę (powłok brzusznych, czy maciczną?) 6ma szwami, które otworzył znów, aby wyjąć duży skrzep z macicy znacznie się powiększającój, a po założeniu jednego drenu w dolny kąt rany, a drugiego w średni do jamy brzusznej, szwy (jakie?) napowrót nawiązał. Następnie opatrzone sposobem Listra. W czasie operacji kiszki w znacznej ilości wypadły z rany i takowe odprowadzono.

Pacjentka opuściła wraz z zdrowym dzieckiem zakład w 34 dni. Podczas leczenia ciepłota dochodziła 40° C., tętno raz do 108 uderzeń, w pierwszych dniach wymioty, potem odpływ ropiasty przez dreny, z których górny wyjęto w 14 dni po operacji, a dolny w 17 dni. Rana brzuszna zupełnie zagojona w dni 25. (*W. med. Presse.* 1877, Nr. 41.)
Wł. B.

V. Posiedzenia Towarzystw.

Sekeyja Lekarska Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

Posiedzenie z d. 4go października 1877 r.

W nieobecności prezesa przewodniczy Dr. Świdorski.

1) Protokół z ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto.

2) Dr. Jarnatowski przedstawia nowy przyrząd pneumatyczny i objaśnia go następującemi słowy: Chcę szan. kolegom objaśnić nowy przyrząd pneumatyczny przez prof. Geigla i Dra Mayera w Würzburgu wynaleziony. Jest on wielu a może wszystkim Panom dlatego nie znanym, gdyż ten, który w moim się znajduje rękę, jest dopiero 12ty, który zrobiono. Zasada się on na obracającym się kole o wymborkach, jakie już znamy w podobieństwie u mlyna wodnego. Koło to posiada 12 lub 15 tuż przy sobie leżących wymborków, które tworzą jego obwód a których otwory ku osi koła są zwrócone; otwory wymborków mających kształt skośnych sześciątów są mniejsze o wiele, niż ściana ku osi łącząca i znajdują się w tej części ściany, która wskazuje kierunek obrotu koła.

Koło to zakryte jest szczerlnie blaszanym płaszczem, tak, że się w nim swobodnie obracać może, i że rękojeść do kręcenia koła po za płaszczem zewnątrz się znajduje. Płaszcz do połowy jest wodą zapełniony, tak, że koło obracając się to zanurza wymborki kolejno w nią, to znów wynosi z wody. Gdy wymborek się w wodzie zanurza, zatrzymuje on w sobie powietrze, aż do chwili, kiedy otwór wymborka znajdzie się na spodzie koła, aby je wtenczas bąbelkami wypuścić w górę.

Wewnątrz płaszczka i śród koła umocowany jest dzwon blaszany zanurzony otworem pod powierzchnią wody w płaszczu a sięgający szczytem do płaszczka, gdzie ma otwór mogący być zatkanym. Do tego dzwonu zbierają się bąbelki powietrza z wymborków wzbijające się w górę. Koło obracając się zabiera więc na przemian powietrze z nad powierzchni wody płaszczowej i oddaje je przezplókawszy wodą do dzwonu, tak, że powietrze płaszczowe się rozrzedza a dzwonowe coraz więcej się zgęszcza. Tak rozrzedzone powietrze płaszczka, jak zgęszczone powietrze dzwonu, za pomocą cewek gunowych służą ostatnie do wdychania, pierwsze do wydychania.

Dwa manometry nad przyrządem umocowane wskazują jeden parcie powietrza zgęszczonego, a drugi stopień rzadkości powietrza rozrzedzonego.

Skutecznym okazał się przyrząd ten w tych samych chorobach, przeciw którym używano dotąd wszelakich przyrządów pneumatycznych. Przedewszystkiem wymieniam rozzednięcie płuc i zapalenie oskrzeli przewłoczne, dalej gruźlicę w jej początkach, niezbyt szczytów płucnych a szczątki po wysiękach w opłucnej. Niektórzy lekarze chwalą skutki pneumatycznego przyrządu także w dychawiczności z wad serca pochodzącej, również w razach ścieśnienia dróg oddechowych, ale tu pozwałam sobie położyć znak zapytania. Przy używaniu przyrządu jako poboczny skutek spostrzegano obfitsze oddawanie moczu i zaostrenie łaknienia w dowód, że on także zmianę materji przyspieszał.

W rozprawie, jaka się nad tym przedmiotem wywiązała, biorąc udział Drowie Świdzki, Osowicki, Zielewicz, Kaczorowski; ostatni, który z przyrządem pneumatycznym liczne robił doświadczenia w tutejszym szpitalu Sióstr Miłosierdzia, doszedł do tego przekonania, że wdychanie rozzedzonego powietrza przynosi korzyści przy rozednięciu płucnej i to niezłudne, bo spirometrem można było wykazać, jak znacznie wzrosła po kilku tygodniach żywotna pojemność płuc. Stosowanie zaś zgęszczonego powietrza nie wykazało uderzających korzyści; przeciwnie łatwo było można zaszkodzić, bo do płuc dostaje się powietrze zimniejsze i z silnym prądem; przynajmniej chorzy gruźlicy narzekali zawsze po użyciu przyrządu pneumatycznego.

3) Dr. Kaczorowski opowiada o nieużywanym dotąd sposobie rozszerzania szyjki macicznej za pomocą coraz to grubszych świeczek elastycznych, które on szybko jedną po drugiej wprowadza w kanał zwężony. Autor wykazując pokrótce niejedne niedogodności, jakie zachodzą przy stosowaniu tak gąbki prasowanej, jak blaszka, zaleca bardzo ten nowy środek, którego w kilku przypadkach z dobrym używał skutkiem; mianowicie zaś pomyślnie rezultaty spostrzegł przy miesiączce bolesnej spowodowanej przez zwężenie szyjki macicznej.

4) W sprawie zapisania dzienników lekarskich na rok 1878 oraz dla obmyślenia planu, według którego by się dogodniej urządzić dało czytelną lekarską, wybrano komisję, składającą się z Drów Jarnatowskiego, Zielewicza i Sekretarza.

Na tém posiedzeniu zamknięto.

Dr. St. Jerzykowski, sekretarz.

VI. O 50tym Zjeździe lekarzy i przyrodników niemieckich w Monachijum.

Sprawozdanie Dra J. Warschauera.

(Ciąg dalszy.)

Prof. Biermer mówił także o *Diabetes insipidus*. Choroba przerzeczona wydarza się rzadziej, aniżeli cukrzyca (*diabetes mellitus*) bo kiedy pierwszej 6 przypadków, to drugiej 80 przypadków w równym przeciągu czasu obserwowano; powstaje po zaziębieniu, lub przez ucisk mózgu; czem jest choroba, czy ona jest chorobą pragnienia, czy jest chorobą moczenia? Pragnienie sprawia obfite moczenie, ale przeciwnie obfite moczenie nie wywołuje pragnienia; moczenie obfite wydarza się przy zбочzeniach ośrodków nerwowych, mózgu i rdzenia pacierzowego; przy oględzinach pośmiertnych nérki nie były powiększone, a jeżeli choroba długo trwała to nérki były nawet zanikłe; jeżeli choroba zawisła od cierpienia mózgowego, to towarzyszy jej ból głowy, wymioty, czasem i udar, śpiączka, szaleństwo i głupota, w takim razie rozmięczenie mózgu i opuchlinę mózgową na zwłokach wykazano; taki przypadek uważał B. na byłym nauczycielu. Drugi przypadek spostrzegł u kobiety 40-letniej cierpiącej na przypadki mó-

zowe, która nadużywała napojów wysokokowych, miała napady udarowe, afazyję i cierpienie naczyń mózgowych (*embolia*). Trzeci przypadek był bardzo ciekawy; chory leżał 15 miesięcy w klinice, oddawał w jednej godzinie 16000 cm. sześciennych moczu, nie chudł, miał się dobrze, pragnienie wielkie, moczenie obfite. B. rozmaitych używał leków do poskromienia nadmiernego moczenia: naparstnicę, kwas karbolowy; naparstnicę podawał zaś dla tego, bo wiadomo że po przecięciu nerwów nérkowych i wstrzyknięciu rozczywnu naparstnicy wydzielanie moczu ustaje; chory użył 22 gram. naparstnicy, poczem nastąpiło zatrucie, lecz choroba w niczem się nie poprawiła. Atoli użycie kwasu karbolowego w dawkach dziecięcych po 0,20 w krótkim czasie chorobę usunęło. Dodaje przytęm B., że nie chwytą się nowych leków z wielką ufnością, że wiadomo, że kwas karbolowy przed niedawnym czasem zachwalony w cukrzycy nie odpowiedział oczekiwaniom, że jednak w tej chorobie okazał się bardzo skutecznym, wykazuje to tablicą graficzną, gdzie ilość oddanego moczu po użyciu kwasu karbolowego z dnia na dzień się zmniejszała.

W rozprawie nad tym przedmiotem tajny radca Rühle z Bonnu opowiada, że w jednym przypadku widział chorobę wzmiankowaną na tle kiłowém, jakoż po użyciu przetworów rtęciowych choroba ustąpiła.

Sprawozdawca przy tej sposobności opowiadał przypadek, którego spostrzegł u kobiety podeszłego wieku; niemoc ta pojawiła się okresowo, chociaż kolejność nie była regularną i tak co 14 dni lub co trzy tygodnie następowało obfite moczenie moczu lekkiego bezbarwnego, obok pragnienia niepohamowanego; moczenie było tak obfite, że kilka kwart w przeciągu kilku godzin odchodziło, łaknienie dobre, pociąg do piwa wina, — idąc za radą prof. Niemeyera podawano tanię lecz bez skutku, ponieważ zaś nie wykryto żadnych zбочzeń chorobowych. przeto sądzono, że w tym razie choroba na maciennictwie polega, i dawano z dobrym skutkiem napar kozłku lekarskiego (*infusum Valerianae officinalis*).

Następnie prof. Biermer mówił o szczególnego rodzaju nerwicy, którą nazwał chorobą Basedowa żywota czyli brzusznej. Znamiona jej są: niedokrewność, drgawki sercowe i tętnienie tętnicy głównej brzusznej, (w blednicy bywa tętnienie tętnicy głównej brzusznej, pochodzące z wiotkości tętnicy). Jeden z lekarzy sądził, że ma do czynienia z tętniakami tętnicy tej; Biermer sądzi, że to jest zбочzenie innerwacji nerwu współczulnego (*Innervationsstörung des Sympathicus*); przez dłuższy czas podawany chinin z żelazem usunął tę dolegliwość. Przypadek pierwszy odznaczał się następującymi objawami: Brak apetytu, wychudnienie, tętno dochodzi do 50-ciu uderzeń na minutę, ciepłota ciała 36° do 36,2° C., niekowate zagłębienie żywota jak w zapaleniu opon mózgowia, atoli nie było bólu głowy. Drugi przypadek odznaczał się zupełnym brakiem apetytu i osłabieniem odnóg dolnych podczas chodzenia, tętno wolne jak w pierwszym przypadku; uważał on to za cierpienie nerwu błędnego; w tym przypadku żelazo i arsen uleczenie sprawiły.

Prof. Basch z Wiednia lekarz zdrojowy w Maryjebadzie sądził, że należało siarkan atropinu wstrzykać podskórną. Prof. Biermer odpowiadając sądzi, że użyto wstrzyknięć podskórnych, ale nie wie z pewnością, czy atropinu czy morfinu — gdyż przypadki te zna tylko z konsyliarnej swój praktyki.

Mówił również o zatruciu gazem kloacznym, którego widział dwa przypadki ciężkie; za najlepszy sposób leczenia uważa stosowanie ciepłych kąpielii wannowych, i oblewania głowy wodą zimną. Jeden z byłych asystentów prof. Frerichsa w Berlinie w rozprawie nad tym przedmiotem podaje, że na klinice prof. Frerichsa również ten sposób

leczenia okazał się bardzo skutecznym, nazwiska zaś jego sobie nie przypominam.

W sekcji pedyjatrycznej mówił radca nadworny prof. Rineker o kile szczepieniem przeniesionej. Często dzieci kiłą dotknięte używane bywają do przeszczepienia krowianki humanizowanej; limfa krowiankowa nie zawiera w sobie jadu kiłowego, limfą przeto nie może być przeniesiona kiła na szczepieńca; kiły nie należy szukać w pęcherzyku szczepiankowym, lecz we krwi. Jeśli dziecię szczepione krowianką ma kiłę ukrytą a jeśli się szczepianką w 4tym lub 12 dniu po zaszczeniu onego przeszczepia innemu dziecięciu, to u niego może kiła powstać, sądzi przeto, że należy przeszczepienie przedsięwziąć najpóźniej w ósmym dniu, nim się wrzód kiłowy dotąd utajony rozwija, a wtedy szczepienie nie ulegnie kile.

Nad tym przedmiotem była żywa rozprawa, w której brali udział Dr. Lederer i Werthheimer z Wiednia i sprawozdawca. Zarzuty czynione wykładającemu były, że owrządzenie z brzegami twardymi po odpadnięciu strupa szczepianki, dno słoninowate i gruczoły podpachowe nabrzękle, nie są pewnym dowodem wrzodu pierwotnego twardego; dopiero jeśli się rozwinię kiła ogólna, można z pewnością orzec, że to był wrzód pierwotny twardy; zdarza się bowiem często, że pod strupem jest wrzód w tkance podskórnej o brzegach twardej, nawet gruczoły pod pachą są nabrzękle, a jednak po okładach wodą ołowiową i po zastosowaniu maści rozmiękczej, wrzód w kilka tygodni się zabliznia, i że się nie objawia kiła ogólna.

Dr. Seeligmüller mówił o kurczowo-rdzeniowych porażeniach dziecięcego wieku. Pierwsza postać: porażenie dolnych odnóg bez zaniku. Dzieci nie mogą chodzić, jest skurczenie z prostowaniem, jak się dzieci bierze pod pachy, to one chodzą z wyprostowanymi nogami, i nogi na krzyż kładą; to jest pierwsza postać kurczowego porażenia przez Erba opisanego. Drugą postać zauważył u czterech dzieci jednej rodziny, chorobową tę postać zowie Charcot amyotroficznym bocznym twarziem. Charcot nie zauważał tej choroby nigdy u dzieci ale tylko u osób między 26 a 50 rokiem życia. Zwykle osoby takie zmiarają po trzech latach cierpienia. S. zauważał, że dzieci chorobą tą dotknięte z początku dobrze siedziały, później zaś przy siedzeniu obalały się, osłabienie ruchowe było znaczne, przystąpił później do tego zanik mięśni ogólny, atoli zanik nie był pierwotnym cierpieniem, gdyż dopiero później kiedy porażenie już istniało nastąpił, były skurczenia teżcowe stawów nawet stawu szczykowego, ciśnienie na mięśnie wywarło sprawia ból; dzieci takie tylko mogły chodzić nogami na krzyż założonemi, porażenie ruchowe szerzy się i postępuje aż na opuszkę i powstaje porażenie opuszkowe (*Bulbaerparalyse*), przedstawiające się jako porażenie nerwu językowo-ruchowego. Powodem do tej choroby dziecięcej bywa małżeństwo między blizkimi krewnymi zawarte.

Trzecia postać: choroba spostrzegana przez Thomsona i S., odznacza się stałemi kurczami w mięśniach dowolnych, stężenie pewnych gromad mięśni z przerwami objawia się; przypadłości powyższe uważano u chorego, który nieudawał; obserwował też S. śpiewaczkę 22-letnią, która od dziecięctwa miała stężenie stawów, mięśnie jednak były bardzo rozwinięte; kiedy występowała publicznie i miała wrócić na swoje miejsce, niepodobna jej było ruszyć się z miejsca, jakby była przykutą. Thomson obserwował chorobę przerzeczoną w swojej rodzinie, w której była dziedziczna. W przypadkach przez S. obserwowanych jak np. w rodzinie śpiewaczki wspomnianej, również choroba była dziedziczną.

S. opisuje więc trzy postacie choroby: pierwsza kurczowo-rdzeniowe porażenie bez zaniku mięśni, druga rdzeniowe porażenie z zanikiem mięśni, trzecia porażenie z przerostem mięśni, podobna do wrzekomego przerostu mięśni. Wszystkie te postacie chorobowe zasadzają się na zajęciu bocznych powrózków rdzenia pacierzowego. Leczenie zasadzało się na stósowaniu alternatywnych przez Rittera używanych.

(Dalszy ciąg nastąpi.)

VII. Wiadomości bieżące.

* **Kraków**, dn. 25 października. Tutejsza czytelnia akademicka urzędują jutro wieczór literacko-muzykalny na cześć opuszczającego uniwersytet profesora Majera. Dowiadujemy się, że przy tej sposobności młodzież akademicka wręczy powszechnie szanowanemu profesorowi ozdobne album.

○ Pod przewodnictwem Dra Warschauera odbyło się d. 23 b. m. posiedzenie komisji sanitarniej z powodu coraz bardziej zagęszczającej się odry. Z wyjaśnień fizyka i lekarzów miejskich okazało się, że odra jest wprawdzie bardzo rozszerszoną, lecz dotąd miała przebieg łagodny i kończyła się śmiercią tylko u dzieci co najwyżej kilkoletnich, wyniszczonych i chowanych w przeludnionych pomieszkaniach. Dotąd umarło razem 62 dzieci z odry, najwięcej w obw. III, bo 37 dzieci. O ilości zaś osób nawiedzonych tą chorobą nie można mieć wyobrażenia, ponieważ zaledwie tylko kilku lekarzów zawiadania Magistrat o przypadkach przez siebie leczonych. Dlatego komisja sanitarna nie mając należytej podstawy do oceniania, o ile choroba wymaga użycia środków przeciwko dalszemu zarażaniu się w szkołach, uznała potrzebę wezwania lekarzów praktykujących pod zagrożeniem ustanowionej kary do donoszenia o każdym przypadku choroby zakaźnej i jak na teraz nie widzi potrzeby stosowania energiczniejszych środków przeciwko panującej epidemii.

○ **Statystyka śmiertelności.** W tygodniu 41 (od 7 — 13 października) zmarło w Krakowie osób 61; 36 mężczyzn i 25 kobiet. Roczna śmiertelność na 1000 mieszkańców obecnej ludności wynosi 57·7 (w 40 tygodniu 53·0); bez dzieci do 5 roku życia 19·8 (w 40 tygodniu 23·6). W tym samym czasie śmiertelność wynosiła we Lwowie 32·8; w Warszawie 29·2; w Poznaniu 32·7; w Wiedniu 23·8; w Pradze 35·5; w Tryjeście 39·6; w Bazylei 19·1; w Londynie 19·5; w Chrystyjani 19·7; w Odessie 30·4; w Wenecyi 30·9; w Bukareszcie 30·7; w Barcelonie 23·3; w Gdańsku 24·6; w Monachium 27·6; w Berlinie 26·3; w Dreźnie 22·1. W 41 tygodniu zmarło w Krakowie z chorób zaraźliwych osób 29 (w 40 tyg. osób 22), a mianowicie: z ospy 2 osoby, z odry 16, z płonicy 3, z dławca 4, z duru brzuszego 1, z czerwonki 3. Odra utrzymuje się dotąd w równym stopniu i wikła się częściej z zapaleniem płuc, kończąc się zazwyczaj śmiercią.

* **Warszawa.** Na posiedzeniu towarzystwa lekarskiego z d. 16 b. m. Dr. Lubelski oświadczył, że z inicjatywy sekretarza stałego towarzystwa, Dra Szokalskiego, zajmuje się zebraniem prac lekarzy Polaków, ogłoszonych drukiem z granicami kraju; prosi więc kolegów o pomoc w tém przedsięwzięciu, a mianowicie o nadesłanie sobie wszelkich tego rodzaju materyjałów.

Dr. Henryk Stankiewicz, odczytał wspomnienie pośmiertne o doktorze Filipie Czajewiczu, ordynatorze szpitala św. Rocha w Warszawie i członku Tow. lek. warsz. Dr. Czajewicz, urodził się w Warszawie r. 1841; tu po zaszczytnem ukończeniu b. gimnazjum gubernialnego,

wstąpił do b. akademii medyko-chirurgicznej. W roku 1863 uzyskał stopień lekarza a w r. 1868 po złożeniu odpowiednich egzaminów i obronieniu rozprawy p. t. „O tkance tłuszczowej“, otrzymał stopień Dra medycyny i chirurgii. Praca ta ukazała się także w tłumaczeniu niemieckim. W roku 1872 wysłany był za granicę celem zwiedzenia większych i wzorowo urządzonych szpitali i zbadania używanych tam sposobów wentylacji. Z zadania tego wywiązał się znakomicie, jak to ze sprawozdania z swęj wędrówki ogłoszonego w *Gazecie Lekarskiej* się przekonywamy. Napisana przez niego i drukiem ogłoszona historia szpitala św. Rocha dowodzi, jak wszechstronną była jego działalność.

Dr. Kosmowski następnie odczytał ciekawą a wyzerpującą pracę o konwulsjach, które się u dzieci w czasie zębowania zdarzają.

Wreszcie wybrano jednomyślnie na członka czynnego Towarzystwa Dra Franciszka Orłowskiego, a na członka koresp. Dra Martego polaka, mieszkającego i praktykującego w Algierze. (*Kur. Warsz.*)

* **Wrocław.** Znany z prac swoich prof. syfilidologii i dermatologii Dr. Köbner rzekł się profesury swojej i przeniósł się do Berlina. Na miejsce jego powołany został Dr. Oskar Simon.

* **Berlin.** Temi dniami pojawił się pierwszy numer dwutygodnika „*Centralzeitung f. Kinderheilkunde*“, który wychodzić będzie pod redakcją Drów A. Bagińskiego w Berlinie i docenta Montego we Wiedniu.

* **Koblencyja.** Ponieważ zdarzył się przypadek, że lekarz wezwany do człowieka cieleśnie obrażonego pomocy swęj odmówił, i że chory najprawdopodobniej dla braku pomocy lekarskiej umarł, rząd prowincjonalny polecił urzędowi policyjnym, aby na podstawie §. 360 ustawy karnej niemieckiej w przypadkach, w których uznają pomoc lekarską za nieodzownie potrzebną dla ratowania człowieka, wzywały urzędowo lekarza najbliższego, i aby w razie, jeżeli lekarz ten wezwaniu nie uczyni zadość, choć „bez znacznego niebezpieczeństwa dla własnej osoby“ z pomocą mógł pośpieszyć, donosiły sądowi, który winnego ukarze. Ponieważ jednak artykuł namieniony wspomina tylko „o przypadkach nieszcześćia, lub ogólnego niebezpieczeństwa i potrzeby, według powszechnego zrozumienia“, Towarzystwo lekarskie prowincji koblenckiej wychodząc z zapatrywania, że zdania urzędnika policyjnego nie można identyfikować z ogólnem pojęciem i stając w obronie stanowiska prawnego lekarzy wystósowało zażalenie do władzy zastrzegając się przed wszelkiem mieszaniem się policyi do stosunków prywatnych lekarzy do pacjentów. (*D. med. Woch.* 1877, Nr. 42.)

* **Paryż.** W wykonaniu dekretu Prezydenta rzeczypospolitej z d. 20 sierpnia r. b. następujący docenci i lekarze szpitalni mają poruczone sobie na lat 10 wykłady kliniczne z gałęzi szczegółowych: Besnier (choroby skórne), Archambault (choroby dzieci), Panas (choroby oczne), Tillaux (choroby przyrzędu moczopłciowego), Fournier (choroby kilowe), Mauriac (choroby syfilityczne i weneryczne), Voisin (choroby umysłowe).

* **Mianowania i odznaczenia.** Jeneralny lekarz sztabowy i naczelnik 14go oddziału w ministerstwie wojny Dr. Antoni Frisch mianowany został naczelnikiem korpusu oficerskiego lekarzy wojskowych a zarazem otrzymał order korony żelaznej 3ciej klasy za usługi znakomite dotychczasowe; miejsce jego jako naczelnika oddziału 14go w min. wojny zajął starszy lekarz sztabowy 2giej klasy Dr. Józef Leiden. (Po raz pierwszy stanowisko tak wysokie powierzono lekarzowi, stósunkowo niski stopień w hierarhii wojskowej mającemu).—Prof. nadzw. we Wie-

dnau Dr. Karol Schroff (mlodszy) mianowany został prof. zw. farmakologii w Gracu.

* **Wiadomości osobowe.** Dr. Wład. Mieczysł. Gedl osiadł w Wadowicach, a Dr. Fr. Wyszatycki w Dynowie.

* **Nekrologia.** Dn. 22 b. m. † w Würzburgu po długiej chorobie radzca nadworny Dr. Linhardt, profesor chirurgii. — Dn. 7 b. m. † w Janowie Bielskim Dr. Józef Maleszewski (urodzony w r. 1835 w Rasztowcu gub. Grodzieńskiej, ukończył gimnazyjum w Grodnie, nauki lekarskie w Kijowie, był lekarzem miejskim w Troicku gub. orenburskiej).

Piśmiennictwo lekarskie: Dr. Stan. MIERZIŃSKI: Die Desinfectionsmittel; Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin 1878. J. Springer, in 8vo, str. 92. Cena 2 marki.

(Znane dotąd środki odwietrzające zestawione są i opisane co do sposobu działania i użycia, i ocenione pod względem ich skuteczności. Praca ta poleca się każdemu, kto by się chciał obeznać dokładnie z dotychczasowymi środkami odwietrzającymi.) *J. B.*

Dr. E. MICHAELIS. Albrecht v. (Graefe. Sein Leben u. Wirken. Mit A. v. Graefes Bildniss. Berlin 1877. G. Reimer; cena 3 mk.

Dr. P. BAUMGARTEN. Die sogenannte Organisation des Thrombus. Eine Experimentaluntersuchung Mit 2 in den Text gedruckten u 8 litogr. Abbild. Leipzig 1877. O. Wigand, cena 2 mk.

CHARLES S. TOMES. Die Anatomie der Zähne der Menschen und der Wirbelthiere, sowie deren Histologie und Entwicklung. Deutsch von L. Holländer. Mit 180 in den Text gedruckten Holzschnitten Berlin 1877. A. Hirschwald. Duża 5 ka str. VIII. 320. cena 8 marek.

SYDNEY RINGERS Handbuch der Therapeutik. Nach der fünften englischen Auflage mit Bewilligung des Verfassers übersetzt von O. Thambhayn. Stuttgart 1877. Enke 8-ka str. IX. 672. 12 mk.

Z ważnej téj pracy powyżej zdajemy sprawę.

MEYER, ALFR. Untersuchungen über acute Nierentzündung. Mit 2 (lith.) Taf. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.“] Lex.-S. Gerold's Sohn. Wien. M. 1. 20.

COHNHEIM Jul. Vorlesungen über allgemeine Pathologie. Ein Handbuch für Studierende und Aerzte. I. Band. gr. 8. Berlin. A. Hirschwald. 17 mk.

ROKITANSKY Frhr. v. Der heutige Standpunkt der klinischen Medicin u. der ärztliche Beruf. Antrittsrede. gr. 8. str. 15. Innsbruck, Wagner. 60 fen.

(Syn wielkiego anatoma powołany na katedrę kliniki wewnątrznej w Insbruku zagał wykłady swoje mową o stanowisku obecnem medycyny klinicznej i o zawodzie lekarskim; mowa ta jednak nie tylko nie zawiera żadnego nowego poglądu, ale co gorsza poglądy znane wygłasza w sposób nie koniecznie jasny, a zrozumienie rzeczy znakomicie jest utrudnionem przez styl ciężki, obfitujący w okresy tak długie, że czytający zanim dochodzi do końca okresu już dawno zapomnił, co początek w sobie mieścił. Prawdziwym wzorem, jak pisać nie należy, jest okres zajmujący całą prawie stronę 10, bo aż 29 wierszy. Mowa ta że rokuje o uzdolnieniu prof. R. młodszego do zawodu nauczycielskiego.) *L. B.*

BAUME Rob. Lehrbuch der Zahnheilkunde. Mit 122 in den Text gedr. Holzschn. gr. 8. Leipzig, Felix. 20 mk.

LITTRE E. et Ch. ROBIN. Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l'art vétérinaire et de sciences, qui s'y rapportent. 14 éd. 2 partie, illustrée de fig. inter. dans le texte. gr. 8. Paris, J. B. Bailliére et fils. Ouvrage complet 20 fr.

PETER M. Leçons de clinique médicale. 2 éd. Tome I. Av. fig. 8. Paris. Asselin. 15 fr.

Jahresbericht über die Fortschritte der Anatomie u. Physiologie. Herausg. von Prof. Dr. HOFMANN u. Prof. Dr. SCHWALBE. V. Bd. Literatur 1876. Leipzig 1877, F. C. W. Vogel.

J. KÖRÖSI: Die Sterblichkeit der Stadt Budapest in den J. 1874 u. 1875 u. deren Ursachen. Berlin 1877. Stuhr.

Dzieł powyższych nabyć można w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie, przy Rynku głównym, Nr. 30.

Korespondencyja Redakcyi i Administracyi.

Dr. Ż. K. we Lwowie: Serdecznie dziękujemy. — Dr. G. w Warszawie: Rzeczownik „zapasć“ nie jest u nas używanym; znanym jest wyraz „zapad“ (*collapsus*). Niemowłeta przy piersi pozostające nazywamy oseskami.

Vin de Bugeaud

Toni-Nutritif

Au Quinquina et au Cacao combinés

Trudność, z jaką żołądek znosi przetwory chin, i w ogóle substancje gorzkie, nieraz wprowadzała w kłopot lekarzy praktycznych. Lecz od czasu wprowadzenia między środki lecznicze połączenia zwanego :

WINEM ŚCIAGAJĄCO-ODŻYWCZEM BUGEAUD'A,

w którym Kakao połączone z chiną dla złagodzenia własności ściągających, — trudność ta już więc nie istnieje.

Zwracamy szczególnie uwagę ciał lekarskich na ten szacowny środek leczniczy, który od 20 dopiero lat zalecany z wybornym skutkiem przez najznakomitszych lekarzy, sprowadza najlepsze skutki we wszystkich przypadkach, w których wskazane są środki ściągające i wzmacniające razem, — a szczególnie w następnych chorobach: *w niedokrewności, w cierpieniach nerwowych, upławach, w przewrotnej biegunce, w osłabieniu płciowem, w przekrwieniach biernych, w gnile, w zółtach* etc. Przetwór tego wina na podstawie wina hiszpańskiego, wymaga dla rozczynu Kakao, istot szczególnych, jakie się nie znajdują w lekowniach; potrzeba zatem dla zapewnienia się o pochodzeniu tego leku, zapisywać go pod nazwą :

« WINA ŚCIAGAJĄCO-ODŻYWCZEGO BUGEAUD'A ».

Wyjątkowa wziętość, jakiej nabyło wino ściągająco-odżywcze Bugeaud'a u lekarzy wszystkich krajów, obudziło chęć niektórych przemysłowców. Wypada zatem wystrzegać się podrobienia i naśladownictwa od niektórych niesumiennej pośredników.

SKŁAD GŁÓWNY : w *Krakowie*, w aptekach PP. J. Trauczyńskiego i Redyka; w *Lwowie*, w aptece P. Mikolascha; w *Warszawie*, w składach materiałów aptecznych PP. Ferd. Aug. Gallego i Lud. Spiessa i w aptece P. Lilpopy; w *Wilnie*, w aptece P. Chrościckiego; w *Kijowie*, w aptece PP. Marciniaczyk braci; w *Poznaniu*, w aptece P. doktora Mankiewicza.

ASTMY

Duszność, chrypka, katary zardawnione i wszelkie cierpienia kanałów oddechowych ustępują po użyciu Rurek antiastmatycznych p. Levassera. 23. rue de la Monnaie w Paryżu.

Dostać można w składach materiałów aptecznych P. Gallego i J. Mrozowskiego ulica Miodowa w Warszawie; w Krakowie w aptece p. J. Trauczyńskiego; w Lwowie w aptece p. Mikolascha; w Brodach w aptece p. Kullaka.

NEWRALGIE

wszelkie cierpienia nerwowe każdej chwili ustępują po użyciu pigulek antinewralgijnych Dra CRONIER. Skład w Paryżu w aptece p. Levasseur, rue de la Monnaie 23.

ELIXIR ET DRAGÉES DU D^r RABUTEAU

(Lauréat de l'Institut de France)

ELIXIR I PIGULKI DOKTORA RABUTEAU wypróbowane zostały w szpitalach paryżkich przez profesorów Fakultetu Medycznego, którzy zalecają je jako skuteczniejsze od wszelkich preparatów zalecanych.

Preparata te z CHLORKU ŻELAZA leczą BŁADACZKĘ, WYNĘDZNIENIE, NIEDOKREWISTOŚĆ, regulują ODPEŁYWY MIESIĘCZNE, wzmacniają ORGANIZMY WYCZERPAŃ I OSŁABIONE, niesprawiając nigdy ZATWARDZENIA.

Sprzedaż hurtowa w PARYŻU, u p. CLIN et C^e, ulica Racine, 14. Dostać można: w *Warszawie*, w składach materiałów aptecznych pp. Mrozowskiego, Zeuschnera, Szymańskiego et C^e i Lilpopy; w *Lwowie*, w aptece p. Mikolascha; w *Krakowie*, w aptekach pp. Trauczyńskiego i Redyka.

Nakładem Towarzystwa Lekarskiego krakowskiego wyszedł

portret litografowany

Prof. Dra. MAJERA

Przesa Akad. Umiej.

starannie wykonany w dużym formacie na pięknym papierze in folio.

Nabyć można w Administracji Przeglądu lekarskiego, jakoteż w księgarni Wgo Krzyżanowskiego po cenie 2 zhr. 50 c. w. a., z przesyłką pocztową 2 zhr. 80 ct.

Dla Prenumeratorów Przegl. Lek. i Członków korespondentów Tow. lek. krak. z przesyłką 2 zhr. 30 c.

Kozłkan atropinu.

Od 1854 r. Kozłkan atropinu bywa używany z wielkim powodzeniem w postaci ziarenek pół miligramowych według przepisu Dra Michéa potwierdzonego przez Akademię lekarską w Paryżu przy leczeniu padaczki, dychawicy istotnej lub kurczowej bólu głowy połowiczym, kaszlu nerwowym, macinnicy, bicia serca, drgawek, bólu żołądka i krztuśca. Z powodu wielkiej liczby wyleczeń osiągniętych tym środkiem uważam sobie za obowiązek zapoznać ogół z tym środkiem. Dawki, których się używa w ciągu doby są różnej wielkości od pół miligrama, aż do 2 miligrm. (Parz wskazówkę.)

Aptea Lemaire w Paryżu 14 rue de Grammont.

Dostać można w Warszawie w składach materiałów aptecznych PP. Mrozowskiego, Zeuschnera; Szymańskiego et Comp. i Lilpopy; w Lwowie w aptece P. Mikolascha; w Krakowie w aptekach PP. Trauczyńskiego i Redyka; w Czerniowiecach w aptece P. Golichowskiego.

CAPSULES ET DRAGÉES
AU
BROMURE DE CAMPHRE

Du Docteur CLIN

Lauréat de la Faculté de Médecine à Paris
(PRIX MONTHYON)

KAPSULEKI I PIGULKI Dra CLIN z Bromku kamforowego używają się w słabościach muzgu i nerwów, chorobach serca i kanałów oddechowych, a szczególniej następujących: Astmie, Bezsenności, Biciu serca, Hysteryach, Padaczce, Zawrotach, Obłądnie, Boleściach głowy, Dolegliwościach narządu moczopłciowego, dla ukojenia wszelkich rozdrażnień nerwowych.

W PARYŻU u p. CLIN et C^e, ul. Racine, 14.

Dostać można: w *Krakowie*, w aptekach pp. Trauczyńskiego i Redyka i we wszystkich znaczniejszych aptekach.