

PRZEGLĄD LEKARSKI

ORGAN URZĘDOWY TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO KRAKOWSKIEGO I TOWARZYSTWA LEKARZY GALICYJSKICH, ORGAN ZWIĄZKU POLSKIEGO LEKARZY I PRZYRODNIKÓW W PETERSBURGU, TOWARZYSTW LEK. POLSKICH W KIJOWIE, CHICAGO I DETROIT, ORAZ

CZASOPISMO LEKARSKIE

ORGAN TOWARZYSTW LEKARSKICH PROWINCYONALNYCH KRÓLESTWA POLSKIEGO.

Redaktor główny: Prof. Dr Stanisław Ciechanowski.

Współczesne poglądy na etiologię i patogenę paratyfusu (duru wrzekomego) i duru mandżurskiego,

przez

H. Fidlera (Radom).

(Ciąg dalszy).

Pomimo, iż prątek paratyfusu B jest bardzo rozpowszechniony, zachorowania zdarzają się względnie rzadko. Zależy to od zmiennej chorobotwórczości drobnoustroju. Wogóle prątek paratyfusu B jest mniej jadowity od durowego. Doświadczenie wskazuje, iż te szczepy prątka paratyfusowego są chorobotwórcze dla ludzi, które u wyższych zwierząt, szczególnie krów lub cieląt, wywołały ciężkie schorzenia. Z drugiej strony mięso nie wszystkich zwierząt, przeznaczonych na rzeź, które pierwotnie lub wtórnie były zakażone przez prątki paratyfusu B bez względu na to, czy miały objawy chorobowe, czy też nie, jest dla ludzi niebezpieczne. Ponieważ poszczególne narządy zwierząt zawierają niejednakową ilość drobnoustrojów i ich jądów, przeto różnopostaciowem będzie cierpienie, przez nie wywołane, zależnie od ilości wprowadzonych do ustroju pierwiastków chorobotwórczych. Spożywanie mięsa surowego bądź co bądź jest szkodliwsze od spożywania mięsa gotowanego lub smażonego. Długie przechowywanie mięsa zwiększa jego jadowitość. Lecz należy pamiętać, że i inne produkty spożywcze mogą być przenośnikami zarazy. Należałoby raczej zakażenie paratyfusowe zaliczyć do gatunku zatruc pokarmowych, a nie wyłącznie mięsnych.

Chory człowiek rzadko bywa źródłem zarazy. Wprawdzie zdarzają się przypadki przeniesienia zarazy z chorych na zdrowych, lecz daleko częściej źródłem zakażenia jest chore zwierzę lub zakażone przez nie produkty spożywcze.

Prątki paratyfusu opuszczają chory ustrój ludzki z kałem, moczem, a niekiedy z wymiocinami. Szczególniej uporczywie trzymają się prątki w moczu, w drogach moczowych, i nie ma sposobu, by je stamtąd usunąć. Przenośnikami zarazy mogą być także i zdrowi ludzie: 1) t. zw. roznosiciele prątków (Bacillen-Träger), którzy wydzielają je po przebytem cierpieniu, 2) t. zw. wieczyści gospodarze (Bacillen-Wirthe), którzy całe życie je wydzielają, sami zaś nie

podlegają zachorowaniu albo wskutek przebytej w dzieciństwie choroby albo wskutek wrodzonej odporności. W kale chorych przy cierpieniu jelit prątki bawia krótko a tem dłużej, im łagodniejsze były objawy. W ostrych przypadkach znikają po 3—4 tygodniach, w przewlekłych zaś trzymają się długo. Pęcherzyk żółciowy, o ile się zdaje, rzadziej, niż w durze, jest stałem siedliskiem zarazka. Kayser u ozdowieńców po paratyfusie w 6—7 tygodni po wyzdrowieniu znajdował prątki zarówno w kale, jak i w moczu. Schottmuller obserwował kobietę, która po przebytem ostrym paratyfusowym niezycie żołądkowo-jelitowym przez 3 lata wydzielala mnóstwo prątków paratyfusowych, a pomimo tego w domu tym nie było więcej przypadków zachorowania. Również w oddziałach szpitalnych spotykał Schottmüller »gospodarzy« paratyfusowych, którzy jednak nie wywoływali epidemii szpitalnej.

Od chwili wykrycia prątka paratyfusu B. opisano wielokrotnie epidemie paratyfusową B. Spotykano ją we Freiburgu (Schottelius), w Holandyi (de Feyfe), w Jassach (Lion i Nege), w Saarbrücken (Conradi—Drigalski), w szpitalu Virchowa w Berlinie wśród personalu Iekarskiego po spożyciu surowego befsztyku tatarskiego (v. Vagedes), w oddziale dziecięcym kliniki chirurgicznej w Jenie (Konrich), w Neunkirchen (Rommeler) po spożyciu transportu morskich ryb, w Warszawie (Jakowski), w Tarnobrzegu (Kučera), w Ameryce (Gwyn) w Artryck, Poznaniu, Düsselдорfie, Greifswaldzie i innych.

W Radomiu w lipcu 1912 r. w sobotę po kilkudniowych silnych upałach wśród ubogiej ludności żydowskiej po spożyciu potraw, przyrządzonych dnia poprzedniego i źle przechowywanych, wynikło gromadne zachorowanie wśród objawów cholery swojskiej. Z pośród 40 przypadków — 2 zakończyły się śmiercią. Z zawartości jelit, przesłanych do zbadania, kol. Wojczyński wyhodował typowego prątka paratyfusu B.

Poszczególne postacie paratyfusu B.

1) Ostry niezbyt żołądkowo-jelitowy, czyli cholera swojska paratyfusowa.

Zależnie od ilości wprowadzonych jądów (toksyn) i prątków oraz od stanu przewodu pokarmowego ustrój albo nie ulega schorzeniu, albo też występują objawy rozmaitego natężenia. Lekkie przypadki mogą przejść w cięższe, gdy

obok wprowadzonych jądów prątki, rozmnażając się w przewodzie pokarmowym, zatruwają ustrój w dalszym ciągu. Trudno strawne pokarmy, drażniąc jelita, wywołują chwilowe usposobienie do zachorowania; przeciwnie zaś pewna odporność narządów lub też błony śluzowej jelit, może nabyta w dzieciństwie wskutek przebytego cierpienia, stwarza niepomysłne warunki dla wtargnięcia do ustroju jadu, chroni od zachorowania lub łagodzi je. Bardzo wielka ilość jadu lub znaczna jadowitość prątków przełamuje odporność ustroju, w następstwie czego występuje zachorowanie. Wreszcie prątek przy pomocy swoich aggressyn niszczy odporność komórek, wskutek czego prątki nawet w przebiegu ostrego paratyfusowego nieżyty jelit mogą się przedostać do obiegu krwi za życia. To samo może się zdarzyć, gdy odporność ustroju jest zachwiana wskutek jakichkolwiek innych przyczyn. To wszystko tłómaczy dostatecznie, czemu ta sama ilość jadu i ta sama drobnoustroje mogą wywołać całą skalę zachorowań, poczynając od lekkich biegunek, a kończąc na śmiertelnych przypadkach cholery swojskiej.

Objawy występują nagle; bóle w brzuchu, częste wypróżnienia barwy żółtej, mniej lub więcej rzadkie, z przy mieszką śluzu. Biegunka trwa 1—2 dni, poczem następuje zaparcie. W pierwszych dniach brak łaknienia i nudności. Ciepłota rzadko bywa podwyższona.

(C. d. n.).

Nowotwory łagodne w górnych drogach oddechowych, oraz w uszach.

Studjum kliniczne

Napisał

Dr Jan Sędziak (Warszawa).

(Dokończenie).

Co się tyczy siedziby tych t. zw. guzów krwawiących nosa, to zdania są podzielone; jedni, jak n. p. Schwager z kliniki Prof. Seiferta w Würzburgu — widywali je tylko na małżowinach nosowych (6 przyp.), inni (Cebb, Strazza) na przegrodzie nosa.

Ja również spostrzegałem włókniaki unaczynione wyłącznie na przegrodzie nosa, i to w przedniej części jego chrząstkowej na granicy błoniastej, (część dolno-przednia t. zw. locus Kiesselbachi). Wogóle występują one z upodobaniem wszędzie tam, gdzie znajduje się tkanka jamista (corpora cavernosa). W wielu przypadkach jednocześnie były zwykle polipy śluzowe w górnej części nosa (okolice średniej małżowiny), lub w jamie nosowo-gardłowej. Rozmiary tych guzów bywają różne, od wielkości grochu aż do orzecha laskowego. Są to guzy miękkie, mniej lub więcej czerwone. Guzy te należy zawsze badać pod drobnowidem, gdyż względnie dość często udaje się wtedy wykryć w nich charakter złośliwy (mięsak), jak tego dowodzi ogłoszony przezemnie przypadek (angioma cavernosum sarcomatodes), jakoteż 2 przypadki Gouguenheima i Helaryego¹⁷⁾ (sarcoma te-

langiectodes septi narium — angiosarcoma endotheliale septi nasi).

Natomiast do bardzo rzadkich nowotworów w jamach nosowych, należą chrząstniaki i kostniaki. Tak n. p. P. Heyman nie spostrzegał ich ani razu w swojej praktyce — ja również nie miałem takiej sposobności, naturalnie jeśli nie będę brać w rachubę niezmiernie za to częstych ograniczonych zgrubień chrząstkowych i kostnych (enchondroses et exostoses) pod postacią ości i listew. Przypadki chrząstniaków nosa opisali Morgan, Keath, M. Mackenzie etc., zaś kostniaków Spillman, Habermaas, Helferich, M. Mackenzie etc. Mogą one brać początek ze wszystkich prawie punktów jam nosowych, oraz bocznych zatok i dochodzić do znacznych rozmiarów (Spillman np. wspomina o kostniaku wielkości pięści, wagi 120 gramów).

Chłoniaki (lymphomata) nosa również należą do wielkich rzadkości (przyp. M. Schmidta, oraz u nas Szmurło, który zebrał z literatury wszystkiego 9 przypadków), Wreszcie istnieje w literaturze jeden przypadek (Gompersa) tłuszczaka nosa; ja zaś spostrzegałem przypadek niezmiernie rzadki kaszaka u wejścia do nosa u 12-letniego ucznia, oraz względnie często (12 przyp.) zewnętrznie na skrzydłach nosa i u wejścia do nosa włókniaki, bądź twarde, bądź miękkie, wiszące.

Objawy w przypadkach guzów łagodnych wzgl. polipów nosowych, zwłaszcza w początkach, mogą być nieznaczne, a nawet może ich nie być wcale. Świadczy o tem spostrzeżenie P. Heymanna, w którym tylko przypadkowo (z okazji ciała obcego w krtani) stwierdził on obecność drobnych polipów w obu jamach nosowych; po latach 10 pozostały one bez zmiany, nie wywołując w dalszym ciągu żadnych objawów. Jurasz na 228 przypadków guzów wzgl. polipów nosa w 10 nie widział żadnych objawów. Ja również widywałem tego rodzaju przypadki, gdzie tylko przypadkowo znajdowałem polipy w nosie.

W każdym razie należy to do wyjątków, w większości bowiem przypadków obecność polipów w jamach nosowych wywołuje przedewszystkiem przez drażnienie stałe objawy nieżytowe, objawiające się wydzieliną śluzową lub śluzoworopną, z domieszką niekiedy czystej ropy w razie zajęcia ropnego zatok bocznych nosa, często krwawą, zwłaszcza w razie t. zw. guzów krwawiących, wyjątkowo cuchnącą, również ropną w przypadkach zajęcia ropnego zatok bocznych nosa.

Jednocześnie dołączają się objawy zatkania, t. j. mniej lub więcej wyrażona niedrożność nosa, bądź jednostronna, bądź z obu stron, mowa przybiera charakter nosowy; wszystko to naturalnie zależy od siedziby (rozszerzenie się sprawy nowotworowej ku tyłowi wzgl. jamie nosowo-gardłowej) i rozmiarów guza, przyczem w początkach guzy (polipy), zwłaszcza szypułkowe, podczas oddychania, zwłaszcza wydechu, oraz wycierania nosa wydają znamieny odgłos (bruit du drapeau francuskich autorów, — Fahnenflattern — niemieckich). Również w razie większej ilości polipów — zwłaszcza w jednej jamie nosowej — bywa, choć nie tak często i wybitnie, jak w przypadkach guzów złośliwych nosa, zniekształcenie zewnętrznego kształtu nosa.

Wogóle wobec tego, że polipy, jak to obecnie wiadomo, są wytworem zapalenia, same zaś również wywołują sprawy zapalne na błonie śluzowej nosa, przeto jest tu coś

¹⁷⁾ Tumeurs cartilagineuses des fosses nasales. Thèse, Paris 1897.

w rodzaju »circulus vitiosus«; toż samo tyczy się i ropienia w jamach bocznych nosa, które może być zarówno przyczyną, jakoteż i następstwem polipów nosa.

Częściowy lub całkowity brak węchu, oraz smaku, bywa też dość częstym objawem polipów nosowych, zwłaszcza w razie zajęcia ropnego zatok bocznych nosa. Przynajmniej ja na 1143 przypadków stwierdziłem objaw ten w mniejszym lub większym stopniu 90 razy. Jurasz na 228 przypadków 9 razy stwierdził bezwęch zupełny, raz zaś tylko w połączeniu z zupełnym brakiem smaku.

Niezmiernie częstym objawem w razie obecności polipów w jamach nosowych są różnego rodzaju i natężenia bóle głowy wzgl. nerwobóle (n. supra- et intra orbitalis) bądź zwykłe, zależne najczęściej od jednoczesnego zajęcia zatok bocznych nosa (n. p. czołowe w razie zajęcia zatoki czołowej, potyliczne przy współdziałaniu zatoki klinowej), bądź jako nerwice zwrotne pochodzenia nosowego (migreny). Na 1143 przypadków guzów łagodnych wzgl. polipów w jamach nosowych spostrzegałem objaw ten aż 180 razy, t. j. prawie 16%. Jurasz również często spostrzegał ten objaw (na 228 przypadków 51 razy, t. j. około 14%).

Również częste bywają w przypadkach polipów nosowych zaburzenia oczne (blepharitis et conjunctivitis, dacryocystitis et blenorhoea sacci lacrymalis, diplopia, osłabienie wzroku aż do zupełnej utraty — amaurosis): przypadków tego rodzaju spostrzegałem w mojej praktyce 157, t. j. około 14%.

W jednym przypadku, dotyczącym 70-letniej wdowy, dotkniętej licznymi polipami nosa obu stronami, spotkałem zupełną ślepotę, głuchotę, oraz dychawicę.

Jeszcze częstsze są zaburzenia ze strony narządu słuchowego, począwszy od nagromadzenia się woskowiny w zewnętrznym przewodzie oraz nieżyty trąbki, a skończywszy na nieżytywym, oraz ropnem zajęciu ucha środkowego, wyjątkowo wewnętrznego z większymi lub mniejszymi zaburzeniami słuchu, szumem i zawrotami. Przypadków tego rodzaju spostrzegałem 264, t. j. przeszło 23%.

Objawy nieżytowe, zależne od obecności polipów nosowych, zwiększają się podczas pory wilgotnej i przeciwnie, na co już zwracano uwagę w starożytności (Celsus), a więc na wiosnę, zwłaszcza zaś jesienią i zimą.

Niezmiernie też częste są zaburzenia w dolnych drogach oddechowych pod postacią nieżyty przewlekłego gardła, krtani, tchawicy, oraz oskrzeli, dalej rozedmy płuc, oraz t. zw. dychawicy oskrzelowej (nerwowej). Dychawicy spostrzegałem przypadków 102 (w tem 6 t. zw. gorączki siennej), co stanowi około 9%. Jurasz również względnie często spotykał to cierpienie w przypadkach polipów nosowych (na 228—15, t. j. 7.6%).

Jak wiadomo, w sprawie związku przyczynowego między tem cierpieniem a polipami wzgl. przerostem małżowin nosa, na co pierwsi zwrócili uwagę B. Fraenkel (1881), a zwłaszcza Hack z Freiburga (1882), nastąpiła duża zmiana w naszych pojęciach. Obecnie chyba nikt z lekarzy nie będzie utrzymywać za Hackiem, że każdy przypadek dychawicy wzgl. bólu głowy bezwarunkowo wyleczony być może przez usunięcie zmian miejscowych w nosie, a więc przede wszystkim polipów. Z drugiej jednakże strony nie można zupełnie odrzucać tego związku, o czem przekonywa nas codzienna nieomal praktyka. Ja przynajmniej w 56 przypadkach, t. j. 1/4, otrzymałem mniej lub więcej trwałe, gdyż

niekiedy trwające lata całe wyleczenia dychawicy po operacjach polipów nosowych, między innymi n. p. u 43-letniego inżyniera lat 12, 46-letniego dyrektora lat 5, u 60-letniej wdowy lat 4, u 64-letniej mężatki lat 3, i t. p. Jurasz również na 15 przypadków w 5, t. j. 1/3 części, widział wyleczenie dychawicy po operacji polipów nosowych.

Oprócz bardzo częstych przypadków bólu głowy (migreny i t. p.), wyleczonych również po usunięciu polipów nosowych, spostrzegałem jeszcze (rzadko) nerwice odruchowe, w związku będące z tem cierpieniem, jak tego dowodzi skutek leczenia miejscowego resp. operacji polipów nosowych. Są to mianowicie przypadki padaczki w liczbie 6 (z tych w 2 nastąpiło wyleczenie), mimowolne moczenie nocne przyp. 3 (1 wyleczony) i t. p. Ze zmian miejscowych w jamach nosowych, będących bądź następstwem polipów nosa, bądź tylko towarzyszących temu cierpieniu, wymienić przede wszystkim należy mniej lub więcej znaczny przerost rozlany, bądź ograniczony do przednich i tylnych odcinków małżowin nosowych przeważnie dolnych (przyp. 108), następnie skrzywienia (deviationes arcuatae et angulares) przegrody nosa różnego natężenia oraz ograniczone zgrubienia chrząstki i kości na przegrodzie listwy, ości, — przyp. 93, wreszcie 72 razy istniały t. zw. wyrosłe gruczołowate, t. j. przerost mniej lub więcej znaczny migdałka gardłowego (Luschka). Z innych zmian, spotykanych przezemnie jednocześnie z polipami nosa, wspomnę tu tylko: rhinopharyngitis chr. wzgl. atrophicans s. sicca (90 przyp.), pharyngitis granulosa (30 razy), elongatio uvulae (6 razy), perforatio septi (12 razy), t. zw. nos siodełkowaty (Sattelnase, nez de mouton) (12 razy), zrosty przegrody z małżowinami (dolnymi) nosa 6 razy i t. p.

Bardzo interesujące są te przypadki, w których obok guzów wzgl. polipów nosowych istniały jednocześnie guzy łagodne lub złośliwe w górnych drogach oddechowych, pokarmowych, oraz uszach, mianowicie najczęściej w jamie nosowogardłowej (polipy 34 przyp.), 25 razy w uszach (polipy), 18 w gardle wzgl. jamie ustnej (guzy łagodne na języczku, łukach etc.), 11 w krtani (8 polipy, 3 raki). wreszcie w przełyku 2 razy (rak).

Dowodziłoby to specjalnego usposobienia wogóle do spraw zapalnych przerostowych w różnych narządach u jednego i tego samego osobnika. W jednym przypadku, dotyczącym 20-kilkoletniej mężatki, której przed kilku miesiącami, jeszcze pannie, zoperowałem polipy nosa, w 5. miesiącu ciąży dokonano operacji wycięcia guzów łagodnych (włókniaki, mięśniaki) macicy obok sztucznego poronienia.

Wreszcie z innych, ogólnych spraw chorobowych, wikłających w moich przypadkach polipy nosowe, wymienię tu tylko: wadę serca wzgl. tętniak aorty (paralysis re-currentis sin.) — 9 razy, przerost gruczołu tarczowego, czyli t. zw. wole — 12 razy, moczówka cukrowa — 6 razy itp.

Przebieg w przypadkach polipów nosowych bywa po większej części powolny, długotrwały, średnio 1/2 roku, do 37 (Jurasz) i więcej lat. Ja spostrzegałem niejednokrotnie dziesiątki lat trwające polipy nosa, między innymi u 40-letniego weterynarza obu stronnie polipy od lat 20.

Rozpoznanie guzów łagodnych wzgl. polipów nosa nie jest trudne. Już samo badanie nosa od przodu (rhinoscopia anterior), zwłaszcza połączone z badaniem za pomocą zgłębnika nosowego, oraz częściowo z kokainowa-

niem, wykazujące ruchomość oraz miękkość w przeciwstawieniu z twardością małżowin przy przeroście lub przegrrody nosa przy ropniu przewlekłym, dają wskazówki mniej lub więcej pewne. Co się tyczy odróżnienia od guzów gruczolanych, kilaków, wreszcie od nowotworów złośliwych (mięsaki, raki), jakoteż rozróżnienia oddzielnych odmian guzów łagodnych nosa (adenofibroma, papilloma, fibroma angiomatodes), to jest to ostatecznie możliwe (choć i tu bywają pomyłki) jedynie pod drobnowidłem.

Rokowanie w przypadkach guzów łagodnych, wzgl. polipów nosa co do zupełnego wyleczenia jest niepomyślne. Nawroty cierpienia, zwłaszcza w przypadkach licznych drobnych polipków, są na porządku dziennym. Mam w leczeniu takich chorych, którzy od lat wielu parę razy do roku zmuszeni są poddawać się operacyom wycięcia polipów nosowych pomimo najdokładniej za każdym razem dokonywanego wycięcia z następnem wypaleniem galwanokautycznym. Są to właściwie jednak nie prawdziwe nawroty, lecz poprostu przeoczone z powodu swoich małych rozmiarów polipki, które, rosnąc w dalszym ciągu, dają obrazy rzekomych nawrotów.

Natomiast pojedyncze, dużych rozmiarów polipy, których miejsce przyczepu z łatwością daje się odszukać i co za tem idzie, wypalić, stosunkowo rzadko dają powód do nawrotów.

Niewątpliwie musi w tych razach odgrywać też pełną rolę i usposobienie, bądź wrodzone, bądź nabyte, zwłaszcza drażnienie spływającą stale ropą w przypadkach zajęcia ropnego zatok bocznych nosa, co w wysokim stopniu sprzyja też nawrotom polipów nosowych. I dlatego oprócz leczenia operacyjnego samych polipów, należy w wielu razach zastosować i leczenie ogólne, oraz leczenie spraw towarzyszących, a zwłaszcza usuwać doszczętnie cierpienie zatok bocznych nosa (Highmore, czołowych).

Co do życia rokowanie w polipach nosowych jest pomyślne. Wyjątkowo chyba tylko guzy łagodne nosa przy sprzyjających warunkach, a jako takie niektórzy przyjmują drażnienie wskutek częstych zabiegów operacyjnych, mogą przejść w złośliwe (przypadki Hellmanna, Bayera etc.).

Czy wyleczenie samoistne guzów łagodnych resp polipów nosa jest możliwe? Na pytanie to można odpowiedzieć twierdząco, lecz tylko w tem znaczeniu, że guz wzgl. polip, osadzony na szypułce, może podczas silnego wytarcia nosa, lub kichnięcia, oderwać się i wypaść na zewnątrz. Przypadki takie spostrzegali P. Heymann (polip), Dunn (papilloma). Ja również miałem możność spostrzegać jeden tego rodzaju przypadek. Dotyczył on 9-letniej dziewczynki z prawostronnym szypułkowym polipem nosa, oraz wyrostkami gruczołowatymi w jamie nosowogardłowej. W parę godzin po badaniu matka przyniosła polipek śluzowy wielkości migdała na szypułce cienkiej, który wypadł podczas silnego wytarcia nosa.

Leczenie guzów łagodnych wzgl. polipów nosa jedynie racjonalne — jest operacyjne. Inne metody (wypalania itd.) należą do historii. Dawnymi czasy (jeszcze w starożytności Wilhelm z Saliceto etc., a tu i owdzie i dziś jeszcze, przeważnie przez chirurgów) bywał stosowany prawdziwie barbarzyński sposób wyrywania polipów nosowych kleszczami na ślepo, t. j. bez użycia wziernika nosowego, bez znieczulania miejscowego zapomocą kokainy. Dopiero w r. 1866

pierwszy Voltolini z Wrocławia zwrócił uwagę na niewłaściwość, a co ważniejsze, szkodliwość takiego postępowania, Bardzo często mianowicie podczas takiej operacyi wyrwano jednocześnie z polipami i całe małżowiny. Pominiawszy szalony ból przy takiej operacyi, zdarzać się mogą groźne niekiedy następstwa (krwotoki, zniekształcenie nosa itp.). Jakkolwiek Pirogow jeszcze w r. 1864 wyraził pogląd, że nos należy do mało »vulnerabiles« narządów, tak, że bezkarnie można wyrywać polipy nosa wraz z małżowinami, to jednakże były notowane przypadki śmierci po takiej operacyi, t. j. wyrywaniu kleszczami polipów z nosa (3 przypadki P. Heymanna z meningitis). Gdybyż przynajmniej owa rzekomo »doszczętna« operacya rzeczywiście okazała się się w następstwie doszczętną, t. j. zapobiegła nawrotowi. Niestety i tego powiedzieć nie można, jak to ilustruje następujący przypadek:

Przed laty kilkunastu miałem sposobność operować 74-letniego chorego, przybyłego z Kijowa. Chory opowiada, że przed 7 laty operowany był przez jednego z chirurgów w sposób powyżej opisany. Do lewej połowy nosa bez uprzedniego znieczulenia, na ślepo wprowadzono mocne kleszcze i z siłą należyłą (przyczem chory doznał szalonego bólu), wyrwano dość dużych rozmiarów polip wraz z kawałkiem kości, przyczem wystąpił tak silny krwotok nosowy, że choremu poprostu groziła śmierć z ostrej niedokrwistości. Dopiero wlewianie soli kuchennej do żył — z trudnością chorego uratowało od niechybnej śmierci. Jednocześnie zauważył chory z lewej strony nosa dość znaczne zagłębienie, które dotąd istnieje. Podczas badania okazało się, że ze strony lewej brak większej (przedniej) części małżowiny średniej — z wyrostka zaś haczykowatego zwiesza się na dość grubej szypule polip wielkości orzecha włoskiego.

Początkowo chory nie chciał się zgodzić na operację, zrażony poprzednim niefortunnym rękoczynem, w końcu jednakże, zniewolony prośbami obecnego syna, przystał na zabieg. Polipa, po uprzednim zakokainowaniu, wyjąłem pętlą gorącą bez bólu i bez kropli krwi.

Obecnie na szczęście sposób ten, rzeczywiście barbarzyński, został na zawsze zarzucony. Kleszczy jeszcze używają tu i owdzie (np. w Anglii), lecz tylko pod kontrolą lusterka.

Jedynem jednak racjonalnem i słusznie najwięcej też rozpowszechnionem narzędziem przy operacyach polipów nosowych jest pętla. Niektórzy autorowie (Zarniko, Hartmann, P. Heymann) najchętniej używają pętli zimnej. (P. Heymann widywał jakoby często, mianowicie 5 razy, różę po (?) użyciu galwanokaustyki), większość jednak rynologów, do których i ja się zaliczam, przekładają nad nią pętlę gorącą, t. j. galwanokaustyczną, gdyż unika się przez to krwawienia sam rękoczyn przytem jest mniej bolesny (nie trzeba wykonywać szarpań, pociągań, jak przy pętli zimnej, co dla chorych jest wysoce nieprzyjemne), wreszcie do pewnego stopnia, być może, zabezpiecza od nawrotów. Wprawdzie i po użyciu pętli zimnej zwykle stosuje się też następnie przypalanie pozostałych resztek polipa (korzenia), lecz bardziej to w teoryi, aniżeli w praktyce jest możliwe do wykonania, gdyż nie zawsze udaje się odszukać miejsce przyczepu po wycięciu polipa.

Co się tyczy pętli galwanokaustycznej, to składa się na nią przedewszystkiem 1) rączka uniwersalna (gdyż słu-

żąca jednocześnie i do kauterów) Kuttnera¹⁸⁾, 2) rurka podwójna, w którą się wkłada zwykły drut stalowy (forte-pianowy); platynowych drutów nie używamy, są bowiem niepraktyczne: gną się, co przy operacji np. polipów nosowych stanowi wielką przeszkodę.

Z zimnych pętli najbardziej w użyciu są pętla Hartmana, służące jednocześnie do nosa, jamy nosowogardłowej, krtani i uszu, oraz Krausego, służące jednocześnie do krtani i krtaniowych — z gotowymi pętelkami z drutu¹⁹⁾, co jest bardzo wygodne, gdyż nieużyteczną pętelkę łatwo można zdjąć i zastąpić inną.

Natomiast pętla M. Mackenziego, a właściwie odgniatacz (écraseur) (używane w Anglii, zwłaszcza w specjalnym szpitalu otolaryngologicznym na Golden Square w Londynie), jest niepraktyczna, przytem droga. Wreszcie podano całe szeregi innych jeszcze pętli (Jarvisa etc.) do operacji polipów nosa.

Pętlę, czy to zimną, czy gorącą, zakłada się na polipa naturalnie pod kontrolą wczucnika nosowego, co przy pewnej wprawie łatwo wykonać. Pewne trudności przedstawiają polipy ku tyłowi położone.

Rzecz prosta, że należy uprzednio dobrze zakokainować, zwłaszcza miejsce przyczepu polipów nosowych (same polipy są niebolesne). W tym celu ja używam do pędzłowań nosowych rozczyńców (20—25%) kokainy i to z fabryki Mercka z Darmstadt, jako najpewniejszej, przyczem tylko w 4 przypadkach zdarzyło mi się zatrucie kokainą, raz jeden tylko w wysokim stopniu u 40-kilkoletniej mężatki, histeryczki typowej (objawy ostrego obłądka). P. Heymann natomiast używa o wiele słabszych rozczyńców (5—10%); zdaniem mojem mogą takie rozczyńcy być dostateczne jedynie zapomocą spreju. Zwykle operuję obie naraz jamy nosowe w razie obustronnych polipów, Semon natomiast radzi zawsze poprzestawać na jednej. Jakkolwiek operowanie polipów nosowych, zwłaszcza zapomocą pętli galwanokaustycznej, zwykle bywa bez złych następstw, to jednakże niekiedy mogą się zdarzać powikłania, przede wszystkim pod postacią mniejszych lub większych krwawień z nosa. Przypadków takich spostrzegałem w swojej praktyce 8, z tych najgroźniejszy dotyczył 46-letniego urzędnika, któremu wyjątkowo usunąłem polipy z prawej strony pętlą zimną.

Z innych powikłań na zaznaczenie zasługują zaburzenia ze strony narządu słuchowego. Spostrzegałem je jednakże bardzo rzadko, gdyż tylko w 3 przypadkach, przyczem raz jeden było ostre zapalenie błony bębenkowej, raz zajęcie ostre ucha środkowego bez ropienia u 30-letniej panny w parę dni po operacji prawostronnej polipów nosa, wreszcie raz jeden ropne zapalenie ucha środkowego prawego u 13-letniej dziewczynki bezpośrednio po wystrzykaniu jamy nosowej prawej, z której usunąłem operacyjnie liczne polipy. Od tego czasu zaprzestałem zupełnie pooperacyjnych przestrykiwań nosa, ograniczając się jedynie do zasypywania ortoformu, oraz do stosowania maści mentolowo-dermatolowej.

Piśmiennictwo polskie¹⁾. 1) Koehler (L.): Operacja polipa, zajmującego całą jamę otchłani i obiedwie jamy nosowe. P. t. L. W. 1837. I. 197. — 2) Le Brun: Odjęcie wielkiego polipa nosa, głęboko zapuszczającego się do gardła zapomocą galwanokaustyki. Ibidem 1858. XI. 253. — 3) Tenże: Operacja polipa w jamie Highmora i lewem nozdrzu, dokonane w szpitalu Dzieciątka Jezus przez Langenbecka. Ibidem 1860. XLIII. 260. — 4) Minkiewicz: Kilkakrotne wrywanie polipów nosowych. Tyg. lek. 1864. XVIII. 82. — 5) Tenże: Choroby dróg oddechowych. Gaz. lek. 1885. p. 233. — 6) Radziszewski: Wypadnięcie polipa znacznych rozmiarów z tylnej części przewodów nosowych do przetyku, chwilowy napad zaduszenia, wycięcie od strony gardła, wyzdrowienie. Med. 1895, Nr 60. — 7) Kohn: Dwa przypadki krwawiących polipów przegrody nosowej. Gaz. lek. 1895, p. 1365. — 8) Lubliner: O polipie krwawiącym przegrody nosowej. Med. 1895, Nr 3. — 9) Baurowicz: O t. zw. polipie krwawiącym przegrody nosa. Przegl. lek. 1897, Nr 8 i 9. — 10) Tenże: Ważniejsze przypadki z oddziału Prof. Pieniążka dla chorób krtani, gardła i nosa w szpitalu św. Łazarza. Ibidem 1898, Nr 18, 19, 20. — 11) Erbrich: Przedstawienie guza jamy nosowej. Med. 1904, Nr 39, p. 828. — 12) Wróblewski: Przypadek krwawiącego polipa przegrody nosa. Ibidem 1904, Nr 38, p. 811. — 13) Łogucki: Przedstawienie włókniaka jamy nosowej. Med. 1904, Nr 39, p. 828. — 14) Majewski: Przedstawienie choroby po usunięciu polipów nosa. Kron. lek. 1904, Nr 17, p. 705. — 15) Pieniążek: Przedstawienie chorej z wielką ilością polipów w nosie. Czasop. lek. 1904, p. 349. — 16) Szmurło: Przypadek chłoniaka przegrody nosowej. Gaz. lek. 1912, Nr 35.

Piśmiennictwo bieżące.

Medycyna wewnętrzna.

K. Trunecek. **Tętnienie tętnic podobojczykowych jako ważny objaw stwardnienia aorty piersiowej.** (Casopis lékařův českých, 1913, Nr 9). W dołku nadobojczykowym prawidłowo nie można ani wzrokiem, ani dotykiem stwierdzić żadnego tętnienia. Tętnienie to zjawia się przy niedomykalności aorty, a czasem przy chorobie Basedowa. W obu tych razach przyczyna tego zjawiska jest znana. Tensam objaw spotyka się jednak także u ludzi, dotkniętych miażdżycą aorty piersiowej, równocześnie z powiększeniem słumienia aorty nad podstawą serca i z charakterystycznym dźwięcznym II tonem nad aortą, zamiast zaś I tonu stwierdza się nieraz ostry szmer. Zbiór tych objawów stanowi kliniczny obraz miażdżycy aorty piersiowej. Objaw przez autora zauważony pochodzi od tętnienia tętnicy podobojczykowej, które możemy śledzić w kierunku obwodowym. Autor nazwał je tętnieniem miażdżycowym. Ma ono charakter tętnienia tętniczego, jest równoczesne z uderzeniem lewej komory, niezawisłe od ruchów oddechowych, pod uciskiem palca nie ustępuje; jest ono widoczne pomimo, że tętnica podobojczykowa leży głęboko, głębiej niż np. tętnice szyjne, w tych przypadkach nie okazujące żadnego nieprawidłowego tętnienia. Siła tego tętnienia zależy od rozległości zmian w aorcie i od wydajności pojedynczych skurczów serca; zjawia się ono jednak i przy słabej czynności serca, a wtedy środki sercowe mogą ten objaw wzmocnić. T. tłómaczy ten objaw zmianą budowy histologicznej aorty przy miażdżycy i niezwykłym anatomicznym położeniem tętnic podobojczykowych wobec aorty. Odchodzą one prawie pod kątem prostym od tętnicy głównej, a wskutek tego krew, wpływająca z aorty, uderza głównie na wypukłą stronę tt. podobojczykowych, podnosząc tętnicę ku górze. M.

Doc. I. Waledinsky. **Wpływ kąpieli kwasowej**

¹⁾ Z powodów, wyłuszczonej we wstępie monografii mojej, p. t. »O ciałach obcych w górnych drogach oddechowych, pokarmowych oraz w uszach«, której druk rozpoczął się w Nr 1 (jubileuszowym) Nowin lekarskich, podaję tu tylko spis prac polskich w porządku chronologicznym.

¹⁸⁾ Rysunki tych pętli podane są w moim podręczniku chorób nosa (1897).

¹⁹⁾ l. c.

głowych na elektrokardjogram. (Zeitsch. f. phys. u. diät. Ther. 1913, 1). Pierwsza kąpiel kwasowęglowa obniża wszystkie wzniesienia na krzywej kardjogramu, następnie kąpiele mniejszy w tym kierunku wpływ wywierają. Stąd więc wynika, że kąpiel kwasowęglowa wpływa na czynność serca. Weissglas.

A. Obradovic. **Doświadczenia nad skutecznością Arsen-Liquo-Fersan.** (Österr. Arzte-Ztg. Nr 13. 1912). Skład przetworu: Sol. arsen. Fowleri, extr. condurango, calc. glyc. phosph. Przetwór jest smaczny, aromatyczny, pobudza łaknienie, ulega łatwo wessaniu. W przypadkach gruźlicy, blednicy i ogólnych chorób konstytucyjnych spostrzegł autor działanie wzmacniające i pobudzenie łaknienia, co odbijało się korzystnie na ilości hemoglobiny i ciałek czerwonych. Podaje się 3 razy dziennie po 1 łyżce stołowej. Ms. W.

Wegerer. **Studia nad skórny odczynem tuberkulinowym.** (Medic. Klinik, 1913, Nr 15). W. opisuje sposób, stosowany przez Schmidta w klinice lekarskiej w Insbruku, bardzo prosty i dostępny dla lekarza praktyka każdej chwili. Na klatce piersiowej wciera się palcem kroplę starej tuberkuliny (Alt tuberculin) i celem poważniejszego wystąpienia próby nalepia na to kawałek leukoplastu. Po 24 godzinach zdejmuje się plaster i jeśli niema odczynu, nalepia się nowy i bada w drugie 24 godzin. Gdy i wtedy odczynu niema, zwykle już nie wystąpi, choć trzeba odczekać 4 dni. Stopnie odczynu: 1) guzki pojedyncze, 2) liczne a zliczalne, 3) tak gęste, że granic oddzielić nie można. Po tygodniu ślady odczynu znikają, co najwyżej pozostaje plama barwikowa. Swędzenie dowodzi, że odczyn będzie dodatni. Objawy ogólne nie występują. Poprzednie drażnienie skóry osłabia odczyn (np. jodyna, gorczyca i t. p.). Przy pewnych chorobach występuje odczyn bardzo często, a należą tu ostry gościec stawowy, zapalenie płuc i dur brzuszny. Natomiast przy gruźlicy prosówkowej odczynu niema, tak że może to służyć za sposób wyłączenia tejże choroby, względnie odróżnienia od duru. Gdy przy gruźlicy wybitnej odczyn jest ujemny, rokowanie się pogarsza. W odróżnieniu od próby Moro nie poleca Schmidt żadnej maści, lecz wciera samą starą tuberkulinę. A.

Saxl. **O leczeniu wapniem.** (Medic. Klinik. 1913, Nr 15). Wapń odgrywa w ustroju wielką rolę. Podług Jaquesa Loeba jest on niejako odtrutką na sole sodowe w ustroju, bo gdy tamte działają podniecająco, wapń działa porażająco. Podobnie zobojętnia on trujące działanie kwasów, zwłaszcza, że kwasy podnoszą pobudliwość układu nerwowego na adrenalinę. Podobnie sole wapniowe zobojętniają działanie pilokarpiny i fizostygminy. Sole wapniowe działają też skutecznie (a brak ich wywołuje właśnie chorobę) przy nadmiernej działalności tarczycy i ciałek przytarczycznych, a w końcu przy schorzeniach kości i skłonności do krwawień. Wskazaniami do stosowania soli wapniowych są: tężyczka, padaczka, choroba Basedowa, płasawica, hipertyreoidyzm, krwawiączka, plamica, gnilec i długotrwałe krwawienia. Wapń posiada też własność wstrzymywania tworzenia się wysięków i dlatego polecają go po ich wypuszczeniu jako środek zapobiegawczy. W końcu stosuje się wapń przy krzywicy i zmięknieniu kości, względnie celem pobudzenia kości do lepszego zrastania się po złamaniach. Stosowanie przez usta jest znacznie mniej skuteczne, niż wstrzykiwania. Kayser poleca: »Rp. Calcii chlorati 20,0, syrup. simpl. 40,0, aq. dest. ad 400,0, S. Co 2 godziny łyżkę«. Najlepiej skutkują jednak wstrzykiwania śródmięśniowe t. zw. »Kalcine« Mercka (5 cm na raz), t. j. 5% chlorek wapnia z żelatyną; skutek dodatku żelatyny nie tworzą się ropnie i nie są te wstrzykiwania bardzo bolesne. Polecają też mleczan wapnia 3 razy dnia po 1,0 wewnątrz. A.

Neurologia.

Prof. Eulenburg: **Postępy w dyetetyczno-farmaceutycznym leczeniu padaczki.** (Med. Klinik 1913, Nr 5).

Już Rochet i Toulouse wskazali na dobre wyniki leczenia padaczki przez usunięcie soli kuchennej z pożywienia i zastąpienie jej bromem. Leczenie, podane przez Balinta, t. zw. leczenie bromopanem, było znacznym postępem w tym kierunku. Balint zalecał podawać epileptykom chleb (bromopan), na 100 gr. zawierający 1 gr. NaBr; Schnitzel znów podał podobne suchary, (zwane przezeń »spasmosit«), które miały tę zaletę, że dawały się dłużej przechowywać niż chleb. Jednakże cała przez Balinta w padaczce zalecana dyeta, złożona z chleba pszennego, mleka, masła, jaj surowych i gotowanych owoców z jednej strony za mało zawiera kaloryi, z drugiej jest za monotonna, łatwo wywołuje u chorych przesyć i zniechęcenie. Ogromny postęp i ulepszenie stanowi wedle autora niedawno przez fabrykę F. Hoffman-La Roche wytworzony przetwór »sedobrol«, wypróbowany przez Ulricha w Zurychu z najlepszym skutkiem. Są to kostki na kształt kostek bulionu, wagi 2 gr., zawierające każda 1,1 gr. NaBr, 0,1 NaCl, jakoteż substancję wyciągową, jak kreatynę, kreatyninę w małej nieszkodliwej ilości, a działającą bardzo podniecająco na apetyt. Dyeta niesłona, a więc bez smaku i nie podniecająca apetytu, a nawet przeciwnie budząca z czasem wstręt do jadła, przemieniona została przez »sedobrol« na smaczną i podniecającą apetyt. By sporządzić bulion, daje się jedną taką kostkę na 100—200 cm³ gorącej wody, do płynów przeznaczonych na sos do mięsa 1—3 kostek na 100 cm³. W ten sposób można podać choremu przez dzień wielkie ilości bromu bez ujemny dla apetytu chorego i smaku potraw. Ulrich podaje w świeżych przypadkach jedną kostkę dziennie do obiadu; co tydzień podając o jedną więcej, aż do 5—6 kostek dziennie, osiągnął bardzo dobre wyniki. Cena niska (100 kostek 7,60 M.) umożliwia stosowanie sedobrolu w szerszej praktyce. Mondschein.

Higier: **Operacye Foerstera, Spitziego, Stoffela. w przypadku porażenia skurczowego po ostrem zapaleniu mózgu.** (Gaz. lek. 1913, Nr 5). U chorej H. w 3 lata po przebyciu ostrego zapalenia mózgu pozostało porażenie skurczowe jednej ręki. Palce lekko zgięte we wszystkich stawach, ręka skurczona w stawie napiętkowym; brak zaburzeń czucia, odruchy ścięgniste i okostne żywe. Po bezskutecznym leczeniu farmaceutycznym i mechanicznym poddano chorą operacyi przecięcia tylnych korzeni rdzenia metodą Foerstera, aby tą drogą usunąć zależną od przykurczeń spastycznych nieomogę ruchową. Przecięto część C₅, cały C₇, C₈ Dr. Wynik operacyjny był ujemny, zupełne porażenie rozginaczy palców. Po miesiącu poddano chorą drugiej dodatkowej operacyi metodą Spitziego: odpreparowany pęczek nerwu pośrodkowego ramienia wszczepiono w nerw promieniowy. Ale i teraz wynik był minimalny pomimo długotrwałego następowego leczenia zapomocą kąpiele, miesienia, elektryzacyi i gimnastyki.

Po pierwszej operacyi metodą Foerstera pozostało stałe znieczulenie w obrębie 2 ostatnich korzeni szyjnych i 2 górnych grzbietowych, co się sprzeciwia twierdzeniu Foerstera, że nigdy zaburzeń czucia po operacyi nie zauważył; H. przypuszcza, że przyczyna tych zaburzeń leży w przecięciu tętnicy, towarzyszącej danemu korzonkowi, stąd zmienione zostaje i upośledzone podłoże anatomiczne przewodnictwa czucia i odruchów w znacznie większym stopniu, aniżeli to topograficznie odpowiada wyciętym korzeniom. Chora ta poddana w końcu została ponownej operacyi metodą Stoffela. Metoda ta polega na osłabieniu przykurczeń przez wyłączenie i przecięcie gałązek ruchowych odpowiednich mięśni skurczowych i to w miejscu wnikięcia nerwu do mięśnia, lub też w samym pniu nerwowym, jednocześnie zaś wzmacnia muskulaturę antagonystyczną drogą gimnastyczno-ortopedyczną. Rozszczepiając nerw w jego otoczce na oddzielne pęczki i poddając je badaniu elektrycznemu prądem stałym przy pomocy elektrody cienko zaostrojonej, można wyodrębnić poszczególne tory dla oddzielnych grup mięśniowych. U danej chorej

przecięto: z trzech pęczków zginacza palców powierzchownego dwa, z 3 pęczków zginacza palców głębokiego również dwa, a z 5 pęczków zginacza promieniowego nadgarstka — trzy. Skurcz po operacji zmniejszył się znacznie w ostatnich trzech palcach, a częściowo i w stawie napiętkowym. Ruchy czynne ręki i palców nie uległy żadnemu polepszeniu. Hs.

Sprawy Towarzystw naukowych.

Akademia Umiejętności w Krakowie.

Wydział matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie z dnia 7. kwietnia 1911 r.

1) Czł. A. Prażmowski przedstawia pracę: **O jądrach komórkowych bakteryi.** Stwierdziwszy w r. 1911, że azotobakter posiada prawdziwe jądra komórkowe, które odżywiają się, wzrastają, dzielą i we wszystkich procesach życiowych komórki, zwłaszcza w wegetatywnym i fruktyfikatywnym rozmnażaniu komórek rozstrzygający biorą udział, autor starał się w dalszym ciągu zbadać, czy i inne bakterye mają takie same jądra komórkowe, jak one zachowują się i jaką rolę w życiu tych bakteryi odgrywają. Pobudką do podjęcia tych badań były studia morfologiczne i fizyologiczne nad szeregiem bardzo rozpowszechnionych, ale mimo to morfologicznie mało znanych i niedostatecznie zbadanych bakteryi. W pracy niniejszej zdaje autor sprawę tylko z kilku zbadanych morfologicznie i cytologicznie gatunków, w szczególności: »bacterium fluorescens, nitrobacter, nitrosomonas, streptococcus acidi lactici«, poprzedzając treściwy ich opis uzupełniającymi badaniami nad jądrami komórkowymi, »bacillus amylobacter, b. tumescens« i częściowo nad azotobakterem. Autor udowadnia, że wszystkie badane bakterye mają jądra komórkowe takie same, jak azotobakter, które w okresie wegetatywnego rozmnażania się komórek tak samo się zachowują, a tylko w okresie owocowania okazują pewne nie zasadnicze różnice, zależnie od tego, czy dana bakteria tworzy zarodniki wewnętrzne, czy inne formy spoczynkowe. W stanie zarodników jądra komórkowe bakteryi znajdują się w stanie rozpuszczenia i zmieszania z treścią plazmatyczną zarodka, a wyosabiają się jako jądra indywidualne w okresie kiełkowania i utrzymują w tym stanie przez cały okres życia wegetatywnego.

2) Czł. Nap. Cybulski przedstawia pracę p. Fr. Czubalskiego: **Wpływ adrenaliny na charakter prądów czynnościowych w mięśniach.** Prace Abelous i Langlois, Albanese i Radwańskiej stwierdziły zależność pomiędzy zdolnością do pracy mięśniowej a obecnością w ustroju nadnerczy, względnie adrenaliny. Autor, chcąc bliżej wejrzeć w istotę tego zjawiska, zastosował do badań galwanometr strunowy Einthovena. Badania autor prowadził na żabach. Robił początkowo zdjęcia prądów czynnościowych z jednego mięśnia łydkowego żaby normalnej, następnie wypalał tej żaby nadnercza i po kilkunastu lub kilkudziesięciu godzinach robił zdjęcie z mięśnia łydkowego drugiej żabki. W ten sposób wykonane doświadczenia doprowadziły do następujących wniosków. Po usunięciu nadnerczy zmniejsza się nadzwyczajnie pobudliwość nerwów ruchowych, aparat nerwowo-mięśniowy bardzo szybko wyczerpuje się; co najciekawsze, znika zupełnie II faza prądów czynnościowych. Autor przekonał się dalej, że wśród żylne wprowadzanie roztworu adrenaliny żabom pozbawionym nadnerczy, znosi wszystkie te charakterystyczne zmiany; wyprowadza stąd wniosek, że zaburzenia w ustroju pozbawionym nadnerczy są następstwem braku adrenaliny w organizmie. Opierając się na teorii prądów elektrycznych

w tkankach, wypowiedzianej przez Cybulskiego, autor formułuje swój pogląd na rolę adrenaliny w pracy mięśniowej ustroju w sposób następujący. Rola adrenaliny w ustroju między innymi polega na tem, że działa ona prawdopodobnie przez nerwy ruchowe na mięśnie prążkowane, regulując w tych mięśniach procesy dysymilacji i asymilacji w okresie ich czynności, przez co umożliwia dokładniejszą i wydatniejszą pracę mięśniową

3) Sekretarz zawiadamia, że dnia 14 marca b. r. odbyło się posiedzenie Komisji historii nauk matematycznych i przyrodniczych, na którym m. i. Prof. Adam Wrzosek przedstawił rękopis pracy botanicznej Tytusa Chałubińskiego (1820—1889) p. n. »Zur Entwickelungsgeschichte der Spaltöffnungen«, napisanej w 1845 roku na podstawie badań drobnowidowych, wykonanych w pracowni Prof. Schenka w Würzburgu. Pracę tę, nieznaną biografom Chałubińskiego, znalazł sprawozdawca w Zakopanem w domu Chałubińskiego wśród wielu jego rękopisów, zawierających przeważnie streszczenia różnych dzieł naukowych. Niewiadomo, czy praca, o której mowa, była drukowana. Zasługuje ona na uwagę, ponieważ zajmuje się zagadnieniem, mało wówczas opracowanym, stanowiąc przyczynek do historii rozwoju roślin, nauki która zaledwie zaczynała się rozwijać w czasach, w których Chałubiński rozprawę napisał.

Następnie podał prof. Wrzosek kilka wiadomości, zaczerpniętych w aktach archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, o ogrodzie i folwarku w Łobzowie, które Szkoła Główna Koronna przeznaczyła w r. 1789 na urządzenie w nich, między innymi, pola doświadczalnego, na którym uczniowie szkół średnich mogliby poznawać praktycznie rolnictwo i rzeczy, ścisły z niem związek mające. Sekretarzem komisji na następne trzecie wybrano prof. Wrzoska.

(Na temże posiedzeniu Wydziału przedstawiono jeszcze 6 prac, których przedmiot przekracza ramy »Przeгляdu lek.«).

Towarzystwo lekarskie częstochowskie.

Posiedzenie z dnia 19. stycznia 1913 r.

I. Kol. Biegański poświęcił kilka słów pamięci zmarłego w Częstochowie kol. Bellona. Gnębiony od dawna chorobą piersiową, w ostatnim czasie nie brał kol. Bellon żywszego udziału w pracy Towarzystwa, ani na chwilę jednak nie przestawał interesować się postępani wiedzy lekarskiej i ogólnoludzkiej. Jego działalność lekarską cechowała głęboka znajomość przedmiotu i krytycyzm w leczeniu. Zaczny i niezwykle prawy charakter jednał mu ogólny szacunek i sympatyę. Pamięć kol. Bellona uczczono przez powstanie z miejsc.

II. Kol. Waclaw Kohn przedstawił chorego l. 43 **z napadami żołądkowymi na tle władu rdzenia.** Od sześciu lat występują co kilka tygodni bardzo silne bóle w okolicy żołądka i wymioty, które trwają około 8 dni z rzędu. Przez długi czas cierpienie to było rozpoznawane i leczone, jako wrzód żołądka. Przy pierwszym badaniu w czerwcu 1912 r. kol. Kohn stwierdził, że czynność wydzielnicza żołądka jest zupełnie prawidłowa. Wobec zniesienia odruchów kolanowych i dodatniego odczynu Wassermana, skierował chorego do Buska. Poprawa trwała krótko. W ostatnich czasach zauważono bezład, nierównomierność żrenic, brak oddziaływania na światło, bardzo słabe oddziaływanie na przystosowanie.

W dyskusji a) kol. Biegański podnosi, że napady żołądkowe stanowią nieraz najwcześniejszy objaw władu rdzenia. Okresowy charakter bólów w postaci charakterystycznych napadów i niezależność od rodzaju pożywienia odróżnia tę chorobę od wrzodu żołądka. Napady bólu występują często pod wpływem wzruszeń. Podczas napadu stwierdzano nadmierne wydzielanie soku żołądkowego,

w okresach wolnych — czynność wydzielnicza żołądka prawidłowa. Napady żołądkowe łączą się często z zaburzeniami w zakresie nerwów czaszkowych, kol. Biegański spotrzągał u 38-letniego mężczyzny połączenie z dusznicą bolesną. W leczeniu pierwsze miejsce zajmuje morfina. b) Kol. Rozenfeld zaleca ostrożność w stosowaniu morfiny z powodu szybko rozwijającej się u tych chorych morfinomanii. Odróżnienie napadów żołądkowych od wrzodu czasami połączone bywa z wielkimi trudnościami. Oprócz napadów, występujących okresowo i niezależnie od rodzaju pożywienia, Dejerine opisuje jeszcze drugą postać tej choroby, w której każde przeciążenie żołądka lub wykroczenie w odżywianiu wywołuje charakterystyczny napad. c) Kol. Stefan Kohn nadmieniam, że w uśmierzeniu bólów pewne usługi może oddać galvanizowanie żołądka.

III. Kol. Rozenfeld. **Dychawica oskrzelowa i gruźlica płuc.** (Będzie drukowane w »Przeglądzie lekarskim«).

IV. Kol. Rozenfeld przeczytał sprawozdanie roczne z działalności naukowej Towarzystwa za rok 1912. Towarzystwo liczyło 30 członków rzeczywistych, jednego członka korespondenta, jednego ofiarodawcę i 3 członków honorowych. Posiedzeń było 12, z których jedno nadzwyczajne. W posiedzeniach brało udział od 16 do 23 członków. Pokazy i odczyty były następujące:

1) Pokazy preparatów: 1) kol. Waclaw Kohn — Hodowle bakterii świecących i szereg preparatów pod drobnowidem i na ekranie; 2) kol. Stefan Kohn — pokaz racjonalnej opaski brzusznej.

2) Pokazy chorych: 1) kol. Biegański — przypadek wzrostu olbrzymiego, przypadek porażenia opuszkowego, przypadek kurczowego kręcenia głową; 2) kol. Wasilewski — 2 przypadki płasawicy; 3) kol. Stefan Kohn — dwie chore, z których jedna była operowana z powodu torbieli jajnika, a druga z powodu wypadnięcia macicy i pochwy; 4) kol. Perłowski — przypadek kilaka mózgu; 5) kol. Rozenfeld — przypadek porażenia kurczowego kończyn dolnych, przypadek płasawicy i atetozu wrodzonej, zagadkowy przypadek cierpienia mózgu (guz gruźliczy?).

3) Medycyna teoretyczna: kol. Biegański. Teoria hormonów i organoterapia. Nowsze badania nad unerwieniem i ruchem jelit.

4) Medycyna praktyczna: 1) kol. Stefan Kohn: O krwotokach macicznych, o rozpoznawaniu i leczeniu wiewióra u kobiet; 2) kol. Markowski: O wstrzykiwaniach jodku potasu przy rozpoczynającej się zaćmie; 3) kol. Rozenfeld: Rozpoznawanie i leczenie gruźlicy gruczołów tchawiczooskrzelowych, nowe prądy w badaniu i leczeniu chorób nerkowych, o niektórych własnościach surowicy końskiej prawidłowej, badanie ciśnienia krwi z pokazem sfigmomanometru Riva-Rocci i oscylometru Pachona; 4) kol. Kaniawski: O cholerynie dziecięcej.

5) Kazuistyka: 1) kol. Brzeziński i Perłowski: Przypadek białaczki ostrej; 2) kol. Waclaw Kohn: Przypadek moczenia mleczystego; 3) kol. Łokczewski: Rzadki przypadek padaczki; 4) kol. Rozenfeld: 2 przypadki ostrej gruźlicy płuc, leczonej surowicą przeciwgruźliczą Marmorka; 5) kol. Szaniawski: Przypadek krwotoku macicznego, leczonego surowicą przeciwbłoniczą.

6) Różne: 1) kol. Biegański: Działalność naukowo-społeczna Dra Markiewicza, krótki rys działalności naukowej Dra E. Biernackiego, wzmianka o Listerze, wspomnienie pośmiertne o kol. Sękowskim; 2) Apt. Nowak: Sprawozdanie z I. zjazdu aptekarzy w Łodzi d. 25 maja 1912 r.

V. Skarbnik kol. Rejman przedstawił sprawozdanie kasowe. Dochód wynosił 494 rs. 79 kop., rozchód 318 rs. 03 kop., pozostałość na rok 1913 — 176 rs. 76 kop. Zaległe wkładki wynoszą 352 rs. 50 kop.

VI. Kol. Biegański przedłożył wniosek treści następującej: Towarzystwo lekarskie, jako instytucja wyłącznie naukowa, nie może rozpatrywać na swych posiedzeniach spraw osobistych między kolegami, tembardziej, że wchodzi to

w zakres działalności istniejącego w Częstochowie »Stowarzyszenia lekarzy polskich«.

W dłuższej dyskusji zabierali głos kol. Stefan Kohn, Edward Kohn, Łokczewski, Rozenfeld, Biegański. Uchwalono, że sprawy osobiste mają być bezwzględnie wyłączone z posiedzeń ogólnych, odczytywanie zaś korespondencji w tych sprawach zależy od uznania zarządu Tow. lekarskiego.

VII. Wybory: Prezesem został wybrany kol. Biegański, wiceprezesem kol. Brzeziński, sekretarzem kol. Rozenfeld, skarbnikiem kol. Rejman, bibliotekarzem kol. Waclaw Kohn, członkami zarządu kol. Łokczewski i Edward Kohn, członkami komisji rewizyjnej — kol. Markowski i Wasilewski.

Sekretarz: Karol Rozenfeld.

Towarzystwo lekarzy Ziemi radomskiej.

90. Ogólne Zebranie dnia 21 grudnia 1912.

Obecnych dwunastu członków. Na przewodniczącego Zebrania wybrany został kol. Henryk Fidler.

1) Kol. Kossak odczytuje swoją pracę: **Wyniki badania uczniów szkoły handlowej w Radomiu za lata 1910, 1911 i 1912.** (Rzecz przeznaczona do druku).

Po dyskusji nad pracą kol. Kossaka, w której brali udział koledzy Fidler, Idzikowski, Przyłęcki i inni, kol. przewodniczący zawiadamia zebranych o ustąpieniu członków Zarządu kolegów Pełczyńskiego i Szczepaniaka, oraz członka komisji rewizyjnej kol. Kasprzykowskiego, a także o mającym się odbyć na następnym Zebraniu ogólnym wyborze trzech członków Sądu koleżeńckiego i dwóch zastępców.

Na tem posiedzenie z powodu spóźnionej pory zamknięto.

91. Ogólne Zebranie dnia 28. stycznia 1913.

Obecnych piętnastu członków. Na przewodniczącego Zebrania wybrany został kol. Stanisław Petrall.

1) Sprawozdanie kol. sekretarza z działalności Towarzystwa za rok 1912:

»Na początku roku 1912 (a jedenastego swego istnienia) Towarzystwo liczyło 50 członków, w tem 4 honorowych; 2 korespondentów i 44 rzeczywistych, że zaś w ciągu roku ubyło wskutek śmierci 1, z własnej woli 2, więc z dniem 1 stycznia 1913 Towarzystwo liczy 47 członków, w tem 4 honorowych, 2 korespondentów i 41 rzeczywistych.

W roku sprawozdawczym odbyło się 12 zebrań ogólnych na zebraniach tych bywało średnio 18 członków, co stanowi 40,7% w stosunku do ogólnej liczby członków rzeczywistych; nadto wprowadzono 25 gości.

Odczytów i pokazów w roku sprawozdawczym było: z medycyny sądowej 3, z dziedziny chorób wewnętrznych 3, z dziedziny chorób kobiecych 7, z chirurgii 1, z medycyny szkolnej 1, z dyagnostyki 1 — Trzy Zebrania ogólne poświęcone były mającemu powstać szpitalowi dla dzieci, z zapisu ś. p. hrabiny Adeli z Mattiesenów Ożarówskiej, przyczem 27. stycznia odbyło się zebranie wspólne z przedstawicielami magistratu m. Radomia, inżynierami-architektem i redaktorem »Gazety radomskiej«, na Zebraniu zaś ogólnym dnia 18. maja jako pierwszego kandydata na lekarza naczelnego tego szpitala Towarzystwo przedstawiło kol. Trenknera z Łodzi, na drugiego zaś kol. Krysińskiego z Warszawy. W lecie ubiegłego roku Towarzystwo wzięło udział w Zjeździe higienicznym we Włocławku, na który pojechali kol. Pełczyński i Szczepaniak.

Wobec panującej epidemii płonicy w mieście na Zebraniu 87. dnia 28. września 1912 r. uchwalono rozesłać do wszystkich kolegów, praktykujących w Radomiu, odezwę, by o każdym przypadku zakaźnej choroby niezwłocznie zawiadamiali lekarza sanitarnego m. Radomia, oraz

odpowiedniego lekarza szkolnego, jeżeli rzecz się tyczyć będzie którejkolwiek ze szkół radomskich. Wobec powtarzających się zamachów samobójczych w Radomiu zapomocą trucizn na zebraniu 88. dnia 26. października uchwalono prosić pp. właścicieli aptek i składów aptecznych w Ziemi radomskiej, by środki trujące, jakkolwiek do sprzedaży odręcznej dozwolone, sprzedawali tylko za przepisem lekarskim.

W ciągu r. 1912 została ostatecznie uchwalona »Ustawa Organizacji zawodowej lekarzy Ziemi radomskiej«.

Ruch korespondencyjny Towarzystwa był następujący: otrzymano odezw 36, wysłano 62. Między innymi wysłano Towarzystwu lekarskiemu w Tule życzenia z powodu jubileuszu 50-lecia, a Wszechnicy lwowskiej z powodu 250-lecia istnienia.

Kol. Fidler otrzymał na konkursie »Przeglądu lekarskiego« nagrodę za pracę: »Współczesne poglądy na etyologię i patogenezę duru brzuszno« przeznaczył na zasiłki dla niezamożnych słuchaczy medycyny w Krakowie i Lwowie.

Zarząd zbierał się 12 razy. Na zebraniach tych oprócz spraw administracyjnych rozpatrywano wszystkie sprawy, wnoszone następnie pod obrady zebrań ogólnych. Zebrania Zarządu odbywały się w lokalu Towarzystwa przy placu Sobornym l. 1, zebranie zaś ogólne w lokalu »Kasy przemysłowców« i jedno wspólne z prawnikami w gmachu Szkoły handlowej męskiej przy ul. Długiej, za udzielenie których odpowiednim zarządom Towarzystwo składa serdeczne podziękowanie.

W ciągu roku ubiegłego Towarzystwo utraciło swego długoletniego członka rzeczywistego ś. p. Korneliusza Ungra, właściciela apteki w Radomiu, którego pamięć na jednym z zebrań ogólnych na wezwanie kol. prezesa uczczono przez powstanie, zamiast zaś wieńca na trumnę złożono rubli 20 na rzecz kasy wdów i sierót.

2) Sprawozdanie kasowe: Dochody 616 rubli 16 kop., rozchody 593 rb. 47 kop., kasa wsparć przy Towarzystwie ma 441 rb. 11 kop.

3) Sprawozdanie bibliotekarza: Biblioteka w ciągu roku powiększyła się o paręset tomów z daru kol. Juliana Majkowskiego. Są to dzieła wielkiej wartości, przeważnie o chorobach skórnych, wenerycznych, encyklopedia lekarska, słowniki, atlasy do chorób skórnych i wenerycznych. W dniu 1. stycznia 1912 r. biblioteka posiadała dzieł 1082 w 1260 tomach wartości 1150 rubli. W dniu 1. stycznia 1913 r. biblioteka posiada 1253 dzieł w 1466 tomach wartości 1588 rb., czyli w ciągu roku ubiegłego przybyło dzieł 171 w 208 tomach wartości 338 rubli. Roczników czasopism przybyło 38, wraz z istniejącymi jest ich obecnie 290 tomów. Czasopism peryodycznych lekarskich prenumerowano 19, na prenumeratę wydano 139 rb. 87 kop. Na oprawę książek wydano 15 rb. 86 kop.

4) Sprawozdanie Komisji rewizyjnej potwierdza sprawozdania powyższe i zaznacza, że wszystko znalezione w należyłym porządku.

5) Po wysłuchaniu sprawozdań powyższych przystąpiono do wyborów w miejsce ustępujących kolegów z zarządu kol. Kossaka i Pełczyńskiego, z komisji rewizyjnej kol. Kasprzykowskiego. Po obliczeniu głosów okazało się, że wszyscy zostali wybrani ponownie i wybór swój przyjęli.

6) Przystąpiono po stosownem przemówieniu kol. Fidlera do wyborów członków i zastępców Sądu koleżeńskiego. Po obliczeniu głosów okazało się, że na członków Sądu koleżeńskiego zostali wybrani koledzy Józefat Kondratowicz, Antoni Szczepaniak i Władysław Finkelstein; na zastępców koledzy Stanisław Idzikowski i Julian Kasprzykowski, właściciel miejscowej apteki.

Członek Zarządu sekretarz Dr T. Rakowski.

Towarzystwo lekarskie łódzkie.

Posiedzenie z d. 5 lutego 1913 roku.

Przewodniczący: kol. Krusche. Sekretarz: Sonenberg.

1) Kol. Trenkner pokazał dziewczynkę, mającą 3 1/2 roku, dotkniętą **chorobą Littlego**.

2) Kol. Schoenaich: **O śmiertelności dzieci i płodności proletariatu w Łodzi**. Autor na zasadzie materiału, obejmującego 11324 rodziny chrześcijańskie i 33833 rodziny żydowskie, dochodzi do wniosku, że płodność wśród naszego proletariatu jest dużą (matki w wieku od lat 45—50 mają średnio po 9 dzieci) i nie stwierdza wybitniejszej różnicy między płodnością matek chrześcijańskich i żydowskich. Co do śmiertelności, to zależy ona od ilości dzieci w rodzinie: im więcej dzieci, tem większa śmiertelność. Gdzie dwoje dzieci w rodzinie, śmiertelność wynosi 10·5% u żydów, a 18·5% u chrześcijan; u rodzin, mających 13 lub więcej dzieci, śmiertelność dochodzi do 53·8% (u chrześcijan) i 50·8% (u żydów). Średnia śmiertelność u chrześcijan 35·4%, u żydów 24·7%, a więc na ogół śmiertelność u żydów jest znacznie mniejsza, niż u chrześcijan. Prelegent poparł swe wywody dwiema tablicami graficznymi, na których ułożył zebrany materiał.

W dyskusyi wzięli udział koledzy: Trenkner, Sonenberg, Skalski, Tenenbaum i Mogilnicki. Sonenberg.

Towarzystwo lekarskie w Kielcach.

Sprawozdania z posiedzeń w r. 1912.

I. Ogólne roczne posiedzenie z d. 20 stycznia 1912.

Obecnych 10 członków. Przewodniczący kol. Czaplicki. Sekretarz kol. Kopczyński.

1) Po odczytaniu protokołu ostatniego posiedzenia, kol. sekretarz odczytał sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1911 roku.

2) Kol. skarbnik odczytał sprawozdanie o stanie kasy.

3) Kol. bibliotekarz odczytał sprawozdanie o stanie biblioteki.

4) Odbyły się wybory wiceprezesa i jednego członka Zarządu. Na wiceprezesa wybrany został kol. Daszewski (ponownie), na członka Zarządu kol. Kosieradzki.

II. Ogólne posiedzenie z d. 17 lutego 1912. Obecnych 15 członków. Przewodniczący kol. Czaplicki. Sekretarz kol. Kopczyński.

1) Po przeczytaniu i podpisaniu protokołu, odczytano nadesłaną korespondencję.

2) Kol. Lewinson przedstawił chorą z długotrwałą żółtaczką; ścisłego rozpoznania nie określono.

3) Kol. Rytel przedstawił chorego, któremu usunął **łuszczyk moszny**.

4) Kol. Piotr Jankowski przedstawił chorego z **guzem mózgu**; chory, lat około 50, cierpi trzy lata silne bóle głowy; lewy fałd nosowowargowy wygładzony; źrenice równe, rozszerzone, oddziałują; chory ma silne zawroty głowy, na nogach utrzymać się nie może; chód bezładny (ataktyczny); odruchy ścięgniste wzmożone; czucie wszelkie zachowane; wyraz twarzy nieruchomy; napięcie prawej gałki ocznej wzmożone; tętno przyspieszone, arytmiczne. Tarcza zastoinowa na dnie prawego oka.

W dyskusyi kol. Kosieradzki różniczkował siedząc guza.

5) Kol. Kosieradzki odczytał rzecz pod tytułem: **Ból głowy w chorobach nerwowych i wewnętrznych**.

III. Ogólne posiedzenie z d. 16 marca 1912. Obecnych 10 członków. Przewodniczący kol. Czaplicki. Sekretarz kol. Kopczyński.

1) Po przeczytaniu i podpisaniu ostatniego protokołu, odczytano nadesłaną korespondencję.

2) Kol. Czaplicki przedstawił **potworka** z trzecią dodatkową nóżką w okolicy kości krzyżowej, oraz chorą

z bardzo silnymi napadowymi bólami głowy, zależnymi od przewlekłego ropnego zapalenia zatok nosowych.

3) Kol. Kosieradzki wygłosił drugą część referatu: **Ból głowy w chorobach nerwowych i wewnętrznych.**

IV. Ogólne posiedzenie z d. 20 kwietnia 1912. Obecnych 11 członków. Przewodniczący kol. Daszewski. Sekretarz kol. Kopczyński.

Omawiano bieżące nagłe sprawy Towarzystwa.

V. Ogólne posiedzenie z d. 18 maja 1912. Obecnych 11 członków. Przewodniczący kol. Kopczyński.

1) Po przeczytaniu i podpisaniu protokołu ostatniego posiedzenia odczytano nadesłaną korespondencję.

2) Kol. Daszewski odczytał rzecz pod tytułem: **Ból głowy w cierpieniach ocznych.**

Dyskusji nie było.

VI. Ogólne posiedzenie z d. 22 czerwca 1912. Obecnych 7 członków. Przewodniczący kol. Czaplicki. Sekretarz kol. Kopczyński.

Omawiano objaw Rajchmana w chorobach żołądkowych.

VII. Ogólne posiedzenie z d. 21 września 1912. Z powodu niedostatecznej liczby członków (6) nie odbyło się.

VIII. Ogólne posiedzenie z d. 19 października 1912. Obecnych 9 członków. Przewodniczący kol. Czaplicki. Sekretarz A. Kopczyński.

1) Po przeczytaniu i podpisaniu protokołu ostatniego posiedzenia odczytano nadesłaną korespondencję.

2) Kol. Lewinson odczytał rzecz pod tytułem: **Ciąża pozamaciczna.**

IX. Ogólne posiedzenie z d. 16 listopada 1912. Obecnych 13 członków. Przewodniczący kol. Kopczyński.

1) Po przeczytaniu i podpisaniu ostatniego protokołu, kol. Szenk przedstawił chorego z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego. Chory, mężczyzna 26 lat, żadnych chorób, prócz odry, nie miał; rodzeństwo zdrowe; chory jest kilka miesięcy; w początkach choroby zauważył, że nogi stają się ciężkie, że mu coraz trudniej chodzić. Przy badaniu: czucie bólowe, dotykowe, ciepła, zachowane; wzmożenie odruchów kolanowych, szczególnie po stronie lewej, jak również wzmożenie odruchu n. trójgłowego na lewej ręce. Zaburzeń w oddawaniu kału i moczu niema. Mięśnie kłębów (thenar et hypothenar) lewej ręki słabiej rozwinięte. Chód porażny; przy chodzeniu chory drży całym ciałem: drżą nogi, tułów i głowa, w spokoju zaś drżenie ustaje; w pierwszych tygodniach pobytu chorego w szpitalu drżenie było tylko w nogach, obecnie zaś chory przy chodzeniu drży cały.

W dyskusji zabiera głos kol. Jankowski, kładąc główny nacisk na zanik mięśni lewej ręki i jest zdania, iż w danym razie mamy początek postępującego zaniku mięśni. Oświadczą się za stwardnieniem rozsianem. Chory pozostawiony w szpitalu dla obserwacji.

X. Ogólne posiedzenie d. 22 grudnia 1912. Z powodu niedostatecznej liczby członków (6) nie odbyło się.
Sekretarz: A. Kopczyński.

Higiena, epidemiologia, statystyka.

Ospa w Łodzi w r. 1912.

(Rzecz wygłoszona na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego łódzkiego w d. 5 marca r. 1913).

napisał

Dr Stanisław Skalski

Gdy rok temu omawiałem w Towarzystwie lekarskiem łódzkim przebieg epidemii ospy w Łodzi w r. 1911, która zabrała 1308 ofiar, wypowiedziałem zdanie, że »materiału palnego w postaci osób dorosłych lub dzieci nieszczepionych niebrak u nas, więc tylko patrzeć, jak przygasające ognisko na nowo rozgorzeje

i znów staniemy bezradni, niemając dokąd skierować nieszczęśliwego, którego własna lub cudza nieogłędność przyprawiła o chorobę«.

Dziś zdanie to powtórzyć muszę, a fakty i cyfry potwierdzają je, jak sądzę, w całej rozciągłości.

Materiały cyfrowe, zebrane przezemnie obecnie, lubo szczegółowsze niż za rok 1911, nie różnią się co do zasadniczego swego źródła — ksiąg urzędników stanu cywilnego wszystkich wyznań, na terytorium Łodzi mieszkających. Wzorem roku ubiegłego nie zostały uwzględnione nikle grupki wyznaniowe¹⁾ w rodzaju Maryawitów (2808 osób), Nowochrześciców (1273), Braci Morawczyków (81), Mahometan (333), i t. p. w ogólnej sumie niespełna 5½ tysiąca, co wobec 512.612 mieszkańców Łodzi stanowi mało co więcej nad 1%. Dane te uzupełniłem materiałem cyfrowym z różnych źródeł, na które się powołuję we właściwych miejscach. W roku zeszłym kol. Trenkner zwrócił uwagę na możliwość nieściśłych rozpoznawień ze strony otoczenia chorego nawet gdy chodzi o ospę, i kwestyjonował ścisłość naszych wykazów, jak sądzimy niesłusznie, gdyż ospa tak wybitnie różni się od innych chorób, że każdy laik ją rozpoznać potrafi, tem bardziej, gdy u nas jest tak częsta. Potwierdzenie naszego, zdania znaleźliśmy świeżo w pracy Dra Huberta, który pisze: »Wobec niezadawalniającego sposobu prowadzenia rejestracji przyczyn zgonów w Rosyi, zapiski duchowieństwa w księgach parafialnych są i obecnie głównym źródłem danych statystycznych o śmiertelności nawet w guberniach, gdzie wprowadzono samorząd. Gdy chodzi o ospę, zapiski owe zasługują na najbaczniejszą uwagę, gdyż ospę wskutek obrzydliwej wysypki na całym ciele może rozpoznać każdy«²⁾.

Jak widzimy z tablicy na str. 277, przedstawiającej w świetle cyfr śmiertelność w poszczególnych parafiach względnie gminach wyznaniowych łódzkich, w r. 1912 ogólna liczba zgonów uległa pewnemu zmniejszeniu: zamiast 13.681 osób zmarłych w r. 1911, naliczyliśmy w siedmiu parafiach katolickich, dwu ewangelickich, jednej prawosławnej, oraz w gminie żydowskiej w ubiegłym roku 1912 — 12.814 zgonów. Różnica wynosi 867 i cała niemal przypada na zmniejszoną śmiertelność z ospy, która w roku ubiegłym wyraża się cyfrą 587, zamiast 1308 w r. 1911. Innemi słowy rok 1912 pod względem zdrowotnym, jeśli wyłączymy ospę, nie był wcale lepszy od r. 1911 wskutek panującej w czasie miesięcy letnich epidemii czerwonki.

Rzecz naturalna, że i stosunek procentowy zgonów z ospy do ogólnej ilości zgonów uległ znacznej zmianie, gdy bowiem w r. 1911 sięgał on 9.55%, to w roku 1912 spadł do 4.58%.

Mało natomiast zmian zaszło w podziale między grupy wyznaniowe względnie narodowościowe zmarłych na ospę. Po dawnemu ospa najszerszej rozpostarła swe skrzydła nad ludnością katolicką, względnie polską. W ogólnej liczbie zmarłych na ospę 587 osób było katolików 491, co odpowiada 6.08% ogółu zgonów u katolików, gdy w r. 1911 procent ten wynosił 12.86%. Kolejna cyfra zgonów na ospę 85 — przypada na ludność ewangelicką względnie niemiecką naszego miasta i, choć zredukowana znacznie ze 117 zgonów ospowych w r. 1911, daje jednak 5.2% ogółu zgonów. U prawosławnych procent ten wynosi 2.63% przy 4 zgonach wskutek ospy wobec 150 zgonów wogóle. Najlepiej stoi sprawa ospy wśród ludności żydowskiej miasta naszego, gdyż choroba ta była przyczyną zgonu zaledwie 7 osób z pośród 2952 zmarłych w r. 1912; w odsetkach wynosi to 0.27.

Obliczając stosunek zgonów z ospy wśród katolików do ilości mieszkańców Łodzi tego wyznania przekonamy się, że powinniśmy mieć 304 zgony wskutek ospy, a nie 491. U ewangelików powinno być 80 (było 85), u żydów zaś powinno być 192, było zaś tylko 7.

Rozpatrując poszczególne parafie (patrz tabl. I.), dostrzegamy, że ospa najbardziej zęcała się nad ludnością tych z pośród nich, które leżą na kresach Łodzi. Na kresach skupia się mniej zamożna ludność naszego miasta, która nie ma czasu, ani środków na wyszukiwanie miejsc szczepienia ospy lub czekanie w cyrkule policyjnym, do którego wogóle idzie niechętnie, — na przybycie felczera, szczepiącego ospę. Do ludności tej trzeba przyjsć ze szczepieniem ospy do mieszkania, inaczej nadal będziemy spozstrzegać tak ogromną ilość zgonów wskutek ospy (129), jak w parafii N. Maryi Panny (Bałuty), będzie ta ilość zgonów na ospę sięgać 10.7% ogółu zgonów, jak to było w parafii św. Wojciecha (Chojny).

¹⁾ Dane co do liczby ludności pochodzą z ostatnich miesięcy r. 1911.

²⁾ Ospa i ospopriwanie u różnych narodów i projekt organizacji ospopriwania w Rosji, W. O. Huberta.

TABLICA I.

Śmiertelność ogólna i wskutek ospy w r. 1912 w Łodzi na podstawie zapisków urzędników stanu cywilnego.

	Parafia lub gmina wyznaniowa	Zmarło w roku 1912		Stosunek procentowy śmiertelności ospowej do ogólnej	Na 10 tysięcy ludności przy- pada zgonów na ospę	Zmarło w roku 1912				Stosunek procentowy śmiertelności ospowej do ogólnej u osób poniżej lat 14
		ogółem	na ospę			powyżej lat 14		poniżej lat 14		
						ogółem	na ospę	ogółem	na ospę	
Kato- licy	N. Maryi Panny (Bałuty)	2731	129	4.72		778	3	1953	126	6.45
	Ś. Krzyża	1309	64	4.89		626	7	683	57	8.34
	Ś. Stanisława Kostki	1067	56	5.25		436	0	631	56	8.87
	Ś. Anny (Zarzew)	856	69	8.06		266	1	590	68	11.52
	Ś. Wojciecha (Chojny)	903	97	10.71		216	2	687	95	13.83
	Ś. Józefa	799	38	4.76		298	1	501	37	7.38
	Ś. Kazimierza (Widzew)	410	38	9.27		121	3	289	35	12.11
	Ogółem u katolików	8075	491	6.08	18.58	2741	17	5334	474	8.89
Ewangelicy	Jana Ewangelisty	904	54	5.97		439	0	465	54	11.61
	Trójcy Św.	731	31	4.24		335	1	396	30	7.57
	Ogółem u ewangelików	1635	85	5.20	12.19	774	1	861	84	9.76
	Par. prawosławna	152	4	2.63	6.58	52	2	100	2	2.00
	Gmina żydowska	2952	7	0.23	0.42	977	2	1975	5	0.25
	Ogółem	12814	587	4.58	11.45	4544	22	8270	565	6.83

(C. d. n.).

Wiadomości bieżące.

Kraków. Towarzystwo lekarskie krakowskie odbyło dnia 30. IV. b. r. posiedzenie, na którym kol. Pisarski przedstawił chorego z oddziału prof. Rutkowskiego, kol. Rosenhauch chorych z kliniki R. dw. prof. Wicherkiewicza, a kol. Skórczewski wygłosił odczyt: »O wpływie leczenia rozdem na przemianę materii«. W dyskusji zabierał głos prof. Klecki.

— Prof. Dr Kostanecki w Krakowie odznaczony został orderem żelaznej korony III. kl., a prof. Dr A. Gluziński we Lwowie tytułem i charakterem radcy dworu.

— Otrzymujemy następujące pismo: »Z powodu przesilenia politycznego i finansowego I. Zjazd higienistów polskich, który miał się odbyć od 20—24 lipca 1913 r. we Lwowie, został odroczony i odbędzie się w tychże samych dniach w lipcu r. 1914 z niezmiennym programem. Mimo odroczenia prace przygotowawcze Komitetu zjazdowego nie ustają. Osoby, które biorą czynny udział w Zjeździe, zechcą streszczenia swoich odczytów lub referatów nadesłać najpóźniej do końca stycznia 1914 roku na ręce sekretarza Zjazdu Dr Bronisława Kaczorowskiego — Lwów, Chorążczyzna 22. — Za komitet gospodarczy: Prof. Dr K. Panek, przewodniczący, Dr B. Kaczorowski, sekretarz«.

— Na posiedzeniu komisji sanitarnej w d. 28 IV. b. r. naczelny lekarz miejski przedstawił sprawozdanie o przebiegu chorób zakaźnych w mieście. Ilość przypadków płonicy w mieście nie jest znaczną i nie przekracza zwykłej liczby. Ilość przypadków wszystkich innych chorób zakaźnych jest znacznie mniejszą, niż w ubiegłym roku. Następnie przedstawił lekarz naczelny sprawozdanie z działalności miejskich lekarzy szkolnych za rok 1911/12. Po wysłuchaniu sprawozdania komisja sanitarna wyraziła jednomyślną opinię, że działalność lekarzy szkolnych jest wielce pożyteczna i już obecnie wydała bardzo obfite i pożądane owoce. W końcu komisja sanitarna powzięła jednomyślną uchwałę, domagającą się natychmiastowego rozpoczęcia budowy na razie przynajmniej tych budynków zakładów sanitarnych miejskich, które w granicach posiadanych przez gminę na ten cel pieniędzy (400.000 K.) wybudowane być mogą. Dr Schneider podniósł

konieczność obznajomienia lekarzy z nowo sankcjonowaną ustawą o chorobach zakaźnych.

Warszawa. Na zasadzie niedawno wydanej w Rosji ustawy powstały w tych dniach w Warszawie pierwsze kasy chorych.

Wilno. Zarząd miejski wydelegował za granicę na studia Dr J. Boguszewskiego, mającego objąć kierownictwo miejskiego biura sanitarno-statystycznego i zakładu odkażania. (Lekarz wileński 4).

— Księżna Michałowa Ogińska ma zamiar ufundować w Wilnie szpital dziecięcy na 30 łóżek. (Lekarz wil. 4).

Choroby zakaźne w Łodzi. Do miejskiego szpitala zakaźnego przybyło od 21. IV. do 28. IV. 1913 przypadków: ospy — † —, płonicy 2 † —, duru wysypkowego 2, róży —.

Dr Trenkner.

Z różnych stron. Obchód jubileuszowy 50-lecia pracy zawodowej Dr Eugeniusza Marcinkiewicza, prezesa komitetu budowy szpitala polskiego w Petersburgu, odbędzie się 21. IV. (4. V.) w lokalu »Ogniska polskiego« (Troickaja 13).

— Na ostatnim ogólnym posiedzeniu »Związku polskiego lekarzy i przyrodników« w Petersburgu 18. IV. b. r. odbył się wykład prof. Dr Leona Kryńskiego z Warszawy.

— W Hamburgu otwarto Zakład badań doświadczalnych nad rakiem. Dyrektorem mianowano prof. Dungerna z Heidelbergu.

— V. międzynarodowy Zjazd Związku prasy lekarskiej (Association internationale de la Presse médicale) odbędzie się w Londynie 5 sierpnia 1913, w przeddzień międzynarodowego Zjazdu lekarskiego w »Imperial Institute« (w pobliżu South Kensington). Sekretaryat generalny (Dr Blondel, Paris, 103 Boulevard Haussmann) zaprasza na Zjazd wszystkich członków międzynarodowego Związku prasy lekarskiej, (wśród nich członków Związku polskiej prasy lekarskiej). Przedmiotem obrad będą: 1) Międzynarodowa reforma słownictwa lekarskiego. 2) Sprawa wydawania rocznika Związku międzynarodowego prasy lekarskiej. Wnioski i referaty w innych sprawach należy zgłaszać do generalnego sekretarza Związku prasy lekarskiej. Członkowie Związku otrzymują bezpłatnie karty uczestnictwa w Zjeździe lekarskim.

W czasie tego Zjazdu oddana będzie do rozporządzenia Związku prasy obszerna sala w gmachu obrad Zjazdu, w której znajdować się będą sprawozdania Zjazdu i t. p. W każdej z Sekcji Zjazdu lekarskiego jeden z sekretarzy będzie miał wyłącznie za zadanie informowanie prasy lekarskiej.

— W »Bad Elster« ordynować będzie w r. b. Dr Alfred Kolszewski (Villa Apollo).

— Instytut higieniczny w Rzymie badał monety co do znajdowania się na nich złośliwych drobnoustrojów, a to ze względu na skargi publiczności, że kelnerzy w restauracjach podają resztę pieniędzy na talerzach. Z badań tych wynika, że monety złote, srebrne i miedziane są prawie zawsze jałowe, a jedynie na niklowych znajdują się często złośliwe drobnoustroje. X.

— Liczba partaczy w Niemczech wynosi około 4630. W niektórych miastach, jak np. we Frankfurcie n. M., na 100 lekarzy wypada przeszło 60 partaczy! X.

— Dollinger z Budapesztu używa w swej klinice do wykonywania miesienia ślepych (za wzorem Japończyków) i rzeczywiście jest z nich bardzo zadowolony. X.

— Na odbytej niedawno ankiecie w sprawie lekarzy szkolnych w Wiedniu zgodzono się na to, że lekarzem szkolnym powinien być lekarz praktyczny, który zajęcie to traktuje jako uboczne (Nebenamt), a nie należy tworzyć osobnych lekarzy szkolnych (Hauptamt). Wynagrodzenie powinno wynosić najmniej koronę od dziecka. Najwyżej może lekarz nadzorować 3.000 dzieci. Do lekarzy szkolnych nie może należeć leczenie dzieci szkolnych, a nawet ambulatoria szkolne nie są odpowiednie. Przed mianowaniem odbyć powinien lekarz konieczny kurs przynajmniej trzech tygodniowy z zakresu higieny szkolnej. Klęsk.

Mianowani: nadetatowymi ordynatorami w Warszawie Dr Aleksander Karoli (szpital św. Ducha), Dr Aleksander Kopyński (szpital św. Rocha).

Zmarli:

Dr Juliusz Robert Diehl, wychowawca Szkoły głównej, b. ordynator szpitala św. Łazarza (przez lat 35), b. prezes konsystorza ewangelickiego, w Warszawie w 69 r. ż.

Dr Roman Nowak, wychowawca uniwersytetu dorpackiego, lekarz okręgowy w Tuapse w gub. czarnomorskiej na Kaukazie, z duru płamistego w 54 r. ż.; Dr Jadwiga Białobłocka w Petersburgu.

Doc. Peron, urolog, w Lozannie, higienista Doc. Ali Cohen w Groningen.

Artykuły oryginalne w czasopismach lekarskich polskich w kwietniu 1913.

Gazeta lek. Nr 13—17.: Higier: Obecny stan nauki o stosunku układu nerwowego do narządów trawiennych. (13—14). — Klejn (dok. 13). — Schusterówna: Rak w ścianie torbieli skórzastej śródpiersia przedniego (14—15). — Rzętkowski: Obecny stan sprawy nieoperacyjnego leczenia nowotworów złośliwych (15—16). — Erlichówna: Badania bakteriologiczne w różnych odczynach skóry na światło, w wypryskach, owrzodzeniach i t. p. (16—17). — Hewelke: Sposób określenia objętości żołądka (17).

Medycyna i Kronika lek. Nr 13—17.: Radziwiłłowicz: Projekt nowego szpitala miejskiego dla umysłowo chorych pod Warszawą (13—14). — Kuligowski (dok. 13). — Krassowski: Uraz jamy brzusznej (14). — Urstein: Przyczyny i istota katatonii (15). — Tokarski: Z kazuistyki skazy krwotocznej (15). — Abramski: O wczesnym leczeniu przymiotu i przypadku, zakończonym śmiercią po wśródzłym zastosowaniu salwarsanu (16). — Dzierzyński: Przypadek syringomyelii z zanikami mięśniowymi różnego pochodzenia (16). — Bychowski: Przyczynki do rozpoznawania i leczenia chirurgicznego chorób mózgu (17—18). — Nisenson: Kilka uwag z powodu ostatniej epidemii płonicy u nas (17).

Tygodnik lek. Nr 13—17.: Wiczkowski: Prof. Grzegorz Ziembicki (życiorys) (13). — Begleiter: Przypadek Spondylose rhizomelique (13). — Gabryszewski: Tętniak wiciowaty ramienia i przedramienia, wyleczony wielokrotnymi podwiązkami i przycięganiem termokauterem. (13). — Glücker: Przypadek ropniaka i odmy osierdziowej. (13). — Grossek: Pierwsze pojawienie się syfilisu w Europie i w Polsce w świetle piśmiennictwa polskiego XVI w. (13). — Hinze: Przyczynek do chemoterapii gruźlicy płuc. (13). — Z. Leńko: Rany postrzałowe pęcherza. (13). — Orzechowski i Walichiewicz: Przypadek operowanej torbieli śród-pajęcznej mózdzku. (13). — Praschil: Truskawiecka »Naftusia« a »Stefan« szczawnicki. (13). — Sabat: O rentgenowskim badaniu narządu moczowego. (13). — Wolf: Ubytek wrodzony krezki jako przyczyna niedrożności jelit. (13). — W. Ziembicki: Rola chirurgii w nauce o przysadce mózgowej. (13). — J. Wiczkowski: Z badań nad etiologią białaczki. (14). — Dr Zdzisław Tomaszewski: Bąblowiec płuca (echinococcus pulmonum). (14). — I. Sohn: O wpływie benzolu na przemianę materii wraz z uwagami nad podawaniem go w białacze (15—17). — Wolf: Kilka uwag o niebezpieczeństwie przy wstrzykiwaniu płynu Calota. (15). — Mazanek: O zastosowaniu radu w lecznictwie (15—17). — Tomaszewski i Wilenko: W sprawie działania adrenaliny u zwierząt pozbawionych tarczycy (16). — Zagórski: W sprawie rządowego projektu ustawy o odjęciu własnowolności. (16—17). — Sochański: Analiza kapillarna soku żołądkowego i jej praktyczne znaczenie oraz kilka uwag dotyczących innych metod miareczkowania treści żołądkowej. (17).

Nowiny lek. Nr 4.: Krokiewicz: Przyczynek do wielorakości nowotworów złośliwych. — Piotrowski: Nowy odruh antagonistyczny. — St. Serkowski: Opsoniny i bakterytropiny w świetle doświadczeń własnych i krytyka teorii Wrighta. — Pomorski: Embryoma-teratoma u 7-letniej dziewczynki. — Trzebiński: Choroba i wyzdrowienie Tadeusza Kościuszki.

Lekarz wileński Nr 3—4. Majewski i Zielińska (c. d.). (3). — Praschil: Uwagi o działaniu Truskawieckiej Naftusi. (3). — Druszejko: Znaczenie ciał acetanowych w cukrzycy. (3). — Sy-cianko: Chirurgiczna profilaktyka zwyrodnienia. (3). — K. Zaleski: Emanacja radu w lecznictwie, zwłaszcza w balneoterapii. (4). — Hanusowicz-Hertz: O działalności przychodni miejskiej dla chorych wenerycznych i skórnych za r. 1912. (4). — K. Zaleska: Przebieg epidemii płonicy w 1912 r. w Wilnie. (4). — Spis lekarzy wileńskich XVII. w., rajców i burmistrzów (4).

Odczyty kliniczne. Serya XX. Z. 1—3. Seweryn Sterling: Postaci kliniczne suchot płucnych.

Postępy okulisty. Nr 3. Rumszewicz: Pęknięcie pośrednie twardówki ze zwichnięciem soczewki pod spojówkę. — Wicherkiewicz: 1) Niezwykły przypadek otrucia atropiną. 2) Słów kilka w sprawie niedostatecznego działania mydriatyków w zapaleniach rozlanych rogówki.

Przegląd higieniczny Nr 4. Reiss: Znaczenie społeczne higieny oka. — Mołczański (dok.).

Kronika dentyst. Nr 4.: Wilga: Ropociek zębodołowy i jego leczenie.

Słowo lekarskie Nr 6—7. Mazurkiewicz: W sprawie projektu ustawy o pozbawianiu własnowolności. — Ważne orzeczenie Najw. Trybunału kasacyjnego w sprawie partactwa. — Klauber: Położenie lekarzy więziennych. — Klęsk: Nie szkodzić sami sobie! — Ubezpieczenie społeczne w Rosji. — »Drohowyże«. — Zaremba: Kasa pogrzebowa. — Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo ratunkowe. — W sprawie ulg w miejscach kąpielowych dla rodzin po zmarłych lekarzach. — Ruch w lipskiej organizacji lekarzy niemieckich w r. 1911—1912.

Głos lekarzy Nr 7—8.: Prebendowski: W sprawie znaczków receptowych. — Szkoły pielęgniarek. — Legeżyński: Budowę zakładu dla użytkowania padliny i rakarni miejskiej. — Mikołajski: Zorganizowanie akcji samarytańskiej w kraju. —

SANATORYUM WIENERWALD DLA PIERSIOWO CHORYCH I W CHOROBACH KRTANI.

PERNITZ, AUSTRIA-POŁUD. — z GODZINY DROGI KOLEJĄ OD WIEDNIA.

METODA BREHMER-DETTWEILERA.
ZAKŁAD OTWARTY PRZEZ CAŁY ROK. KLIMAT PODAL-
PEJSKI. 80 POKOI DLA CHORYCH. ŚWIATŁO ELEKTRY-
CZNE, WINDA, GABINET ROENTGENA. LEŻALNIE. LE-
CZENIE ŚWIATŁEM. KĄPIEL SŁONECZNA I POWIETRZNA.
PROSPEKT NA ŻYCZENIE.

Sprawy sanitarne w Sejmie. — Fels: Program kursu samarytańskiego lwowskiej Stacji ratunkowej. — Ebel: W sprawie znaczków receptowych. — Lekarze rządowi a Kasy chorych.

Nasze Zroje. Nr 7—8. Galicyjskie zdrojowiska, sanatoria, uzdrowiska i przemysł domowy na Wystawie kijowskiej. — Nasze kłopoty ekonomiczne. — Opolski: Teorya jonów i ciśnienia

osmotycznego w zastosowaniu do wód mineralnych. — Które wody mineralne obce zastąpić można galicyjskimi? — Westreich: Aresztowania w zdrojowiskach. — Ponikło: Uwagi do wydawnictwa »Reise und Sport«, poświęconego Galicyi. — Westreich: Banki akcyjne (akcyjny bank zdrojowisk) a stowarzyszenia zarobkowo-gospodarcze. — Zdrojowisko w stanie »ex lex«.

JODTRANOL (Matula)

Likier **jod-**peptonowy składu 0.60% **jodu**, dobrego i przy żelazisto Fe, 0.10 Mn i 0.03% **jodu**, jennego smaku, w działaniu w **zupelności Tran. (Ol. Jecoris)** zastępuje

Sposób użycia: jak Liq. Mangano ferri peptonati. Cena 2 K 60.

Polecane przez Światne Tow. lekarskie krakowskie

z pomiędzy dziś znanych przetworów żelazistych jest najłatwiej strawnym i nie psującym zęby środkiem

LIQUOR MANGANO FERRI PEPTONATI

składu 0.60% Fe i 0.10 Mn wyrobu

aptekarza **D. MATULI** w Podgórzu (Kraków).

Polecany jako środek lekko strawny, pobudzający apetyt, w blednicy, niedokrwistości, zimnicy, w żołączach, kobiecych i nerwowych cierpieniach. 206

Sposób użycia: Dzieciom do lat 12 daje się 2 razy dziennie po łyżeczce od kawy z mlekiem; osoby dorosłe używają 2—3 razy dziennie po łyżce stołowej.

Na składzie w każdej większej aptece. Cena 2 Korony 40 halerzy.

Dwie flaszki posyłam franco.

Semmering Sanatorium

Radca ces. Vécsei

2 g. od Wiednia, 900 m nad poz. morza. Dla nerwowo chorych i z wadliwą przemianą materii, szczególnie

cukrzycą. 273

Telefonu Nr 1066.

ŻĘTYCĘ

owczą, czystą, mrożoną wprowadzimy do sprzedaży w maju, o ile zgłosi się ostateczna ilość odbiorców t. j. najmniej na 10 l. dziennie.

YOGHURT 220

mleko kwaśne przegotowane, zawierające bakterye bułgarskie, około 5% tłuszczu, we flaszkach à 1/4 l. Działa idendycznie z laktobacyliną (laktolem)

„Laktol“

Zakład dla przetworów dyetet. z mleka pod kontrolą Komisji przem. krak. Tow. lek. Kraków, ul. Karmelicka 15.

W Krynicy

Dr **ZYGMUNT WĄSOWICZ**
ord. od 15 maja do końca września
(choroby wewnętrzne i kobiece)



GRIES b. BOZEN




SANATORYUM

ZAKŁAD LECZNICZY
DLA CHORYCH NA PŁUCA

(założony w r. 1901).

Prospekty! 265

Lekarz kierujący:
Dr V. Malfer.



SPERMINUM-POEHL

Essentia Spermini-Poehl

30 kropli 3 razy dnia na 1/2 g. przed jedzeniem w wodzie alkalicznej lub mleku

Sperminum-Poehl pro injectione. 349

Sperminum-Poehl sicc. pro clysm.

przeciw neurastenii, wadliwej starczemu, histeryi, cierpieniom serca (zwyrodnienie i otłuszczenie), miażdżycy tętnic, kile, gruźlicy, durowi, cierpieniom rdzenia, impotencji, neurast., porażeniu post., przewl. gośćcowi, krzywicy, dnie, blednicy itd., itd., przy wyczerpaniach i dla ozdowienia.

CEREBRIN-POEHL (Synergo Cerebrin) przeciw padaczce, alkoholizmowi, cierpieniom nerwowym.

MAMMIN-POEHL (Synergo-Mammin) przeciw włókninom macicy, krwotokom miesięczkowym i macicznym, zapaleniu macicy i jajników itd.

BIOVAR-POEHL (Synergo-Biovar) przy objawach braku czynności w okresie przekwitania, po wycięciu jajników, przy histeryi, blednicy.

RENIIN-POEHL (Synergo-Reniin) przeciw miąższowemu zapaleniu i niedomodze nerek, mocznicy.

THYREOIDIN-POEHL (Synergo-Thyreoidin) przeciw obrzękowi śluzowatemu, otyłości, chorobom skóry, cierpieniom nerwowym itd.

ADRENAL-POEHL. Skuteczny składnik nadnerczy. Lek zwężający naczynia przeciw zapaleniom błon śluzowych, krwotokom itp. — Tubki à 0.002; rozczyzn 1:1000, 10.0 i 30.0.

Do nabycia we wszystkich większych aptekach.

Piśmiennictwo darmo i opłatnie przesyła

Organoterapeutyczny Instytut

Prof. Dr v. **POEHL & Synowie**
PETERSBURG, ROSYA.

Główne składy w Austro-Węgrzech: G. i R. Fritz-Pezoldt & Süss, Wiedeń I.

Ostrzega się usilnie przed naśladownictwami i fałszerstwami.

Na zamówienie posyłam bezpłatnie nasze kompendium orwanote... w którym podane są wszystkie sposoby użycia i inne ważnych przetworów. 1. Tabletki do użytku wewnętrznego. 2. Ampułki do wstrzykiwania.

Dawkowanie i wskazania mineralnych wód galicyjskich. — Kolej do Kut. — Pawilon Związku zdrojowisk na wystawie kijowskiej.

Przeгляд zdrojowo-kąpielowy Nr 1: Zanietowski: Kilka uwag o systemizacji naszych zdrojowisk i uzdrowisk oraz o analizie naszych wód. — Ankieta Polskiego Towarzystwa balneologicznego w sprawie wydzierżawienia Krynicy.

Kredaktor odpowiedzialny:

Prof. Dr Stanisław Ciechanowski.

Posiedzenie Towarzystwa lekarskiego krakowskiego odbędzie się we środę d. 7. maja 1913 o godz. 6 wieczór

w domu Towarzystwa (Radziwiłłowska 4). Na porządku dziennym: 1) Dr Z. Steuermark: O leczeniu gruźlicy chirurgicznej promieniami Röntgena. 2) Dr M. Godlewski: O samozatruciu.

Posiedzenie Oddziału jarosławskiego Towarzystwa lekarzy galicyjskich odbędzie się w sobotę dnia 10-go maja 1913 o godz. 6 wieczorem w Jarosławiu w szpitalu powszechnym z następującym porządkiem dziennym: 1) Demonstracja chorych, kol. Dr Fechter. 2) Szerzenie się chorób wenerycznych w Jarosławiu i sposoby możliwego zapobiegania tym chorobom, referat kol. Rossbergera. 3) Obecna epidemia szkarlatyny w Jarosławiu, kol. Dr Czyżewicz. 4) Wnioski członków.

Biurowy Oddziału jarosławskiego Tow. lek. gal.
Sekretarz: Dr W. Orłowski. Przewodniczący: Dr W. Czyżewicz.

Zapiski przemysłowo-lekarskie.

Nadestane.

Digistrophan. Prof. Dr Adnan. (Z I. klin. med. uniw. w Konstantynopolu. Allg. Mediz. Central-Ztg Nr 14. 1913). Autor donosi o dalszych wynikach z digistrofanem, kombinacją digitalis ze strofantusem, którą poznał podczas czynności w dużym zakładzie leczniczym w Berlinie. Szczególną wartość praktyczną posiada okoliczność, że przetwór ten poddawany zostaje stałej kontroli na zwierzęciu co do jednostajności działania na serce, tak iż zawsze jest zapewnione równe działanie także po dłuższym przechowywaniu przetworu. Wskutek tego jest działanie digistrofanu zawsze bardzo pewne i silne, tak iż często wystarczają stosunkowo małe dawki. Ta stałość i pewność działania na serce wyróżnia digistrofan wobec zmiennie działającego naparu i innych przetworów, zawierających tylko niektóre składniki działające naparstnicy. Dodać należy drugi, niemniej wagi czynnik, że połączenie digitalis ze strophantus, jakie ma miejsce w digistrofanie, według spostrzeżeń Bölkesa obniża bardzo znacznie zgubne działanie zbiorowe, które przy zwykłym leczeniu naparstnicą przeszkadza niejednokrotnie; działania zbiorowego tu prawie wcale się nie spostrzeżę. Najlepszą postacią zażywania digistroanu (Goedecke & Co. Berlin) są kapsułki. Nadto wyrabia się Pigistrophann w kołaczykach do zażywania per os, nadto do wstrzykiwań podskórnych. Prof. Adnan tak się wyraża wogóle o działaniu:

„Od 3 lat stosowałem częściej digistrofan i nie widziałem ani jednego złego wyniku. Działanie serca wracało szybko do normy i trwało to długo; ilość moczu wzrastała a działania zbiorowego nie spotrzegano. Jestto szczególna zaleta digistrofanu, że reguluje ciśnienie krwi t. j. podnosi ciśnienie nieprawidłowo niskie a obniża zastój przy wysokim ciśnieniu. Kapsułki digistrofanu mają tę dobrą stronę, że przechodzą przez żołądek i dopiero w jelicie ulegają wessaniu. To jest szczególnie ważne dla takich chorych, których żołądek zresztą żadnych przetworów nie znosi. Przytoczone przypadki chorobowe dowodzą wielkiej skuteczności stosowania tego przetworu, gdzie inne przetwory naparstnicy działają niedostatecznie i nie pozwalają na dopatrzenie się jakiegokolwiek działania zbiorowego». Prof. Adnan może zatem chyba słusznie digistrofan uważać za środek sercowy, który wskutek pewności działania nie sprawia lekarzowi podobno nigdy zawodu.
Hr. W.



Najlepsze skutki w niezżytach żołądka i pęcherza, jakoteż dróg oddechowych. 205

Prospekty roszyla na żądanie Brunnen-Unternehmung Krondorf bei Karlsbad lub też Generalna reprezentacja dla Galicji i Bukowiny, Kraków, Grodzka 48. Lwów, Sykstuska 31.

Karlsbad Dr med. **ADAM MACIĄG**
b. asystent c. k. kliniki chorób wewn. Uniw. Jagiell ordynuje, jak lat ubiegłych od 20-go kwietnia dom „KRONENAPOTHEKE“ (przy Mühlbrunn'ie)

Maryenbad Dr **Władysław Kluger**
b. I. Asystent kliniki chorób wewnętrznych Uniwersytetu Jagiell. ordynuje, jak dawniej, od 15 maja Dom „Stadt Hannover“ Kirchenplatz. 128

Krynica NAŁĘCZÓWKA
Pensjonat Drowej A. Wąsowiczowej
Elektryczność, wodociągi, kanalizacja, kuchnia znakomita z uwzględnieniem diety przepisanej. — Ceny przystępne.

Diabetes mellitus

Do racjonalnego leczenia diety ze strony lekarskiej ocenione środki spożywcze i przetwory pod nadzorem lekarskim jak mąki, różne pieczywa, napoje etc. tylko z pierwszego austr. specjalnego zakładu

„Sanity“

212

Praga, ul. Pańska Nr 7. — „Karlsbad: Haus Wiesbaden“ Sprudelstrasse 52.
Brozury „Jak mamy żyć“ obok przepisów gotowania dla dyabetyków bezpłatnie i opłatnie.

Dostawca wszystkich klinik i sanatoryj!
Żądajcie cenników!

INDOFORM

Patent (Octan metylenowy kw. salicyl.) Patent
Nazwa chroniona. Nazwa chroniona.

Nowy środek przeciwościcy i znieczulający.

Z najlepszym skutkiem przy gościcy, ischias, dnie stosowany. także przeciw influency, nerwobólom i w praktyce denty-stycznej z dobrym wynikiem używany.
Szybkie działanie bez niemiłych objawów ubocznych.

ANTITUSSIN.

Przez pp. lekarzy polecany jako jeden z najlepszych środków przeciw krztuścowi i wszystkim chorobom gardła.
Zewnętrznie używany do wcierań. 88

Wyrób en gros dla Austro-Wegier

chem.-diät. Laboratorium Mr. Camillo Raupenstrauch, Wiedeń II.
Prospekty, piśmiennictwo i próbki bezpłatnie do rozporządzenia.



KNOLL & CO.
LUDWIGSHAFEN^{a/Rh.}

Digipuratum

Jednorodny i równowartościowy przetwór digitannoidowy.

Zalety wobec liści naparstnicy:

Krótki czas pozostawania w żołądku, szybkie wessanie przy najsilniejszym działaniu. Dobry smak.

12

Kołaczyki

Rp Digipuratum-Tabl. po 0,1 g
1 rurka oryg. Nr. XII.
4 kołaczyki dziennie
w dawkach spadających.
Cena K 180.

Rozczyn

do zażywania

Rp. 1 szklanezka rozczynu digipuratum
do zażywania po 10 cm³.
4 krople odpowiadają
0,01 g fol. digit.
Cena K 180.

Ampułki

Rp. Ampułki digipuratum
1 pudełko oryg. Nr. VI.
1 ampulka 1—2 razy dziennie
do wstrzykiwań śródżylnych lub
śródmięśniowych.
Cena K 320.

Dr Zygmunt Dymiński

ordynuje przez cały rok

214

w Wiesbaden

naprzeciw Kochbrunnen

Taunusstrasse 9.

Dr med. Alfred Kolszewski

ordynuje

219

w Bad Elster

w Królestwie saskiem

willa „APOLLO“ przy Kurhauzie.

SZCZAWNICA

SZCZAWY ALKALICZNO-SŁONE (7 ZDROJ)
NAJSILNIEJSZE W EUROPIE.

Wskazania: choroby dróg oddechowych, narządu trawienia, dróg moczowych, przemiany materji, krwi i choroby nerwowe.

Sezon od 20 maja do 30 września.

121

Zakład inhalacyjny odnowiony, zakłady wodolecznicze, łaźienki mineralne, kąpiele słoneczne. Mieszkania tanie od 1-60 K począwszy i z komfortem urządzone. Wykwintna restauracja i liczne pensjonaty. W I i w III sezonie mieszkania 20—30% tańsze. Lekarz zakładowy Dr K. Włyński, 8 lekarzy praktykujących. Zwolnienia od taks tylko wyjątkowo; w II sezonie wykluczone. Mieszkania po każdym gościu przymusowo formaliną desyntyfikowane. Smieci i płwociny spalane w specjalnym piecu.

Stacya kolei: Stary Sącz lub Nowy Targ. Zgłaszać się o mieszkania i po fiakrów do Zarządu lub zajeżdzać po informacye mieszkaniowe wprost do Zarządu. Unikać faktorów.

Najsilniejsze wody lecznicze na całą Europę.

Lecznicze: Józefina, Magdalena, Wanda i Stefan i alkaliczno-stołowe najsmaczniejsze: Stefan i Jan — wysyła w czasie bezmroźnym Zarząd w skrzyniach po 25, 30 i 50 butelek. Są one do nabycia we wszystkich aptekach, składach wód mineralnych i składach aptecznych

EMANATORYUM RADOWE a la JOACHIMSTHAL w Lubieniu koło Lwowa

Najsilniejsze wody siarczane w Europie, leczą znakomicie nawet zupełnie zastarzałe reumatyzmy, artretyzmy, ischiasy, porażenia, nerwobóle, zgrubienia po złamaniach i zwichnięciach, gruźlicze zapalenia stawów i okostnej i wszelkie choroby skórne.

Inhalacyami systemu Dr. Bulinga leczą się wszelkie choroby nosa, gardła, krtani i płuc. 321

Aparatami gimnastycznymi »Zandera« usuwa się wszelkie zeszczywnienia pozapalne i z powodu artretyzmu, otyłość i niedomogi serca.

Röntgenoterapia specjalnie w chorobach skórnych i kobiecych.

Łazienki centralnie ogrzane, mieszkania z piecami. Zakład elektrycznie oświetlony. Czas kąpielowy trwa od 10 maja do 1 października, podzielony na trzy sezony. W I i III sezonie dla biednych znaczne opusty. Stacja kolejowa, poczta, telegraf, telefon międzymiastowy, apteka publiczna w miejscu.


Dwóch lekarzy: zakładowy dr. Ignacy Mazanek i wolnopracujący dr. Roman Klęsk.

— Wszelkich objaśnień udziela Zarząd kąpielowy. —

BROMONE ROBIN

FIZYOLOGICZNE, ROZPUSZCZALNE I PRYSWAJALNE
POŁĄCZENIE BROMU.

Pierwsze bezpośrednie i zupełnie stałe połączenie bromu z peptonem.



Leczenie bezsenności nerwowej.

Jest to jedyny rozczyń mianowany, wypróbowany po raz pierwszy w Salpetriere (Rozprawa Dra Mathieu 1906). Sprawozdanie profesora Blache'a w Paryskiej Akademii lekarskiej (25 marca 1907 r.). 103

Z powodzeniem zastępuje sole bromowe, nie wywołując objawów bromizmu.

Jest znakomicie znoszony. Nie ma przykrego smaku.

Działanie silniejsze niż wszystkich znanych podobnych środków.

40 kropli równa się pod względem działania leczniczego 1 gr. bromku potasu.

M. Robin, 13 rue de Poissy, Paris i we wszystkich aptekach.

Dra Emmerich'a Sanatorium Baden-Baden. — Założ. 1890 odnowione 1910/11 dla nerwowo-chorych

Morfina-Alkohol

Leczenie odzwyczajające w łagodn. formie, bez przymusu. Prospekty. Właśc. i kierown. Dr Arthur Mayer. 49

IODONE ROBIN

PEPTOMAT JODU ZUPEŁNIE PRYSWAJALNY.



Preparat ten różni się zupełnie i znacznie przewyższa inne podobne preparaty, nazywane organicznymi połączeniami jodu, które są nierozpuszczalne lub nie stałe. Dał on przy stosowaniu w szpitalach wyniki znakomite. Sprawozdanie Berthelot'a w Akademii Nauk w 1885 r. o peptonach Jodon był poddany badaniom porównawczym w rozprawie Dra Boulaire'a w r. 1906. O związkach jodowych, zakomunikowanej Paryskiej Akademii lekarskiej (Posiedzenie 26 marca 1907).

Stosowany w szpitalach w Paryżu i zagranicą. 102

Racyonalne leczenie rozedmy płuc.

Jodon Robin'a czyli organiczne, przyswajalne połączenie jodu jest znakomitym środkiem przeciw: Dnie, Miażdżycy tętnic, Astmie, Przymiotowi, Reumatyzmowi.

Nie daje niebieskiego zabarwienia z kłajstrem krochmalowym, co dowodzi, że nie zawiera jodu w stanie wolnym. Roztwór jest ściśle mianowany i zawiera 1 centygram metalicznego jodu w 5 kroplach.

Dawkowanie: Można go brać w mleku na czczo lub podczas jedzenia w winie, w wodzie najlepiej podczas głównych posiłków w ilości od 10 do 100 kropli bez obawy o wywołanie jodyzmu. 20 kropli odpowiada 1 gr. jodku potasu. Dawka dzienna wynosi od 20 do 200 kropli.

Sprzedaż: 13 Rue de Poissy, Paris i we wszystkich aptekach.



Polecam mój

Chloroethyl

Dr Thilo

z zamknięciami automatycznymi i spiralnemi, odpowiednio do farmakopei austr. VIII., jak najgoręcej.

Flaszki automatyczne napełnia się na nowo.

Prospekty do rozporządzenia. 89

Mr. C. RAUPENSTRAUCH,
em. aptekarz, WIEDEŃ II., Castellez. 25

Laboratoires P. FAMEL — 20 --22, Rue des Orteaux, PARIS.

SIROP FAMEL

A BASE DE LACTO-CRÉOSOTE SOLUBLE

Stanowi najlepszy specyfik przeciw kaszlowi, nieżyłtowi przewlekłemu oskrzeli, kaszlowi napadowemu gruźliczych i schorzeniom nieżyłtowym. W nowej kombinacji z prawdziwym kreozotem bukowym zażywany i znoszony przez najwrażliwsze osoby.

Zawiera w łyżce stołowej		Kreosotum lactis. solub. 0 g. 20
		Calcium phosphoricum 0 g. 40
		Codeinum 5 miligramów
		Tinct. alcoh. aconiti . . . 2 krople
		etc. etc.

Sposób użycia:

Dorosłym 2 lub 3 łyżki stołowe dziennie (rano i wieczorem)

Dzieciom 2 lub 3 łyżeczki kawowe lub deserowe

Czysty lub w gorącej herbacie.

123

Cena K. 4.— za flakon.

Sprzedaż we wszystkich aptekach.

Próbki bezpłatne i piśmiennictwo: JULIEN MEYER, Wiedeń XVIII, Gersthofstrasse 79.