

PRZEGLĄD

ROLNICZY, HANDLOWY I PRZEMYSŁOWY

Pismo bezpłatne, wychodzące dwa razy na tydzień

przy

DZIENNIKU WARSZAWSKIM.

N^o 3.

WARSZAWA—ŚRODA.

Dnia 28 Grudnia (9 Stycznia) 1855/6 roku

NOWSZE DOŚWIADCZENIA.

tyczące się

uprawy i pożytku łubinu.

Bardzo słusznie zwrócili gospodarze w ostatnich latach swoją uwagę na sprawę łubinu, jako płodu polnego, a żywy interes, który wprowadzenie tego ważnego ziarna w coraz większym zakresie znajduje, zapewnia mu znaczenie na przyszłość. Dla tego, jeżeli mianowicie większe towarzystwa agronomiczne podają swym członkom sposobność do wymiany własnych swych doświadczeń względem uprawiania i używania łubinu, postępowanie takie zasługuje na chlubną wzmiankę.

Dyrekcja agronomicznego towarzystwa centralnego dla obwodu regencyjnego poczdamskiego, podała między innymi na walnem zebraniu dnia 7 grudnia r. b. następujące pytanie do dyskusji: „Jaki wypadek, pokazał się z uprawy żółtego i niebieskiego łubinu, ze względu na jego użytek jako zielonej paszy. siana, ziarna i zielonej mierzwy i jaki sposób zbierania jego najbardziej się zaleca?„ Roztrząsanie tego przedmiotu spowodowało dwóch sławnych agronomów Marchii; radcę ekonomicznego p. Fleck z Beerbaumu i radcę krajowego kolegium ekonomicznego Thaer z Möglina, do zakomunikowania swych doświadczeń co do uprawy łubinu, które i w dalszych kołach interes obudzić mogą.

Radca ekonomiczny Fleck uprawiał łubin żółty (*Lupinus luteus*) na większy rozmiar na gruncie lekkim, który oczekiwanie jego pszewyższyl. Wystąpił on przeciwko dawnemu mniemaniu, że łubin ułatwia rozrastanie się perzu i że się na marglowanej roli nie udaje; na miejscach przed 5 laty marglowanych i nie mierzwionych zbierał około 50 centnarów wartości siana z morgi. Sprzęt był z wielkimi trudnościami łączony, kośba odbywała się krótkimi tak nazwanymi kosami od grochu; ale tak zgrabianie dwa dni po koszeniu, jak układanie łubinu w mędele, przyniosło stratę. Przeciwnie układanie jego na zielono w mogiły i prześcielenie od 3 do 3 stóp warstwą słomy, ażeby tym sposobem do dojrzałości doszedł, udało się zupełnie. Co się tyczy użycia go na paszę, powiada p. radca ekonomiczny Fleck,

że owce, skoro się już przyzwyczają do niej, wszystkie części rośliny bardzo chętnie jedzą. Paść zaś koni ziarnem niebyło inaczej podobno, jak tylko pośrótowanym, z którym mieszano $\frac{2}{3}$ śrótu zbożowego. Do siewu wystarczyło 12 mec na morgę; mniej jednak nie. Osobliwie wynosił p. Fleck dobroczynny wpływ, który łubin na powierzchni roli wywiera. którą opadłe listki i cień zupełnie szlamem używającym powłoczyły.

Pan radca Thaer oświadczył, że od roku 1847; kiedy s. p. Wulffen-Pietzpuhl biały łubin z południowej Franeji wprowadził, tą rośliną bardzo się zajmował. Jako zielona mierzwa wydawała bardzo znaczne plony, np. 7 wespli kartofli z morgi.

Zachowywanie nasienia było tylko trudne, które trzeba było suszyć. — Teraz uprawiają w Möglinie niebieski łubin (*Lupinus angustifolius*). Ten daje najlepszą zieloną paszę dla owiec; które go aż do ziemi zjadają; wpływ tej paszy na owce jest ten sam jak Esparcety, w krótkim czasie pokazują większą żywość w wzroku i postawie. Dla innych zwierząt, np. dla koni, jest łubin nadto pożywny, i lepiej jest zmieniać go z inną paszą. Nadzwyczajna pożywność paszy łubinowej spowodowała pana Thaer do rozciąglejszego jej uprawiania w roku następnym i do powiększenia płaszczyzny w tym roku zasianej od 800 aż do 2000 mórg. Trudności w sprzątaniu usunięto przeto, że ruszając każdą tam, gdzie się gałęzie rozchodzą, ułamano i na kupę dla wysuszenia złożono. Jako zielona mierzwa wydał łubin w Meglinie bardzo znaczne rezultaty, i więcej i cięższego żyta po nim zebrano, aniżeli po czystym ugerze z mierzwą owczą i po hurtowaniu. Pan Thaer uważa łubin za najtańszą mierzwę, która w wielu przypadkach przewyższa guano, albowiem jej wytrwałość jest niewątpliwa. Nakoniec oświadczył p. Thaer, że pan dr. Eichhorn właśnie jest zajęty w Meglinie utworzeniem z łubinu bardzo ważnego może dla medycyny produktu, tj. gorzkorodu. (?)

Dodajemy tutaj jeszcze szczegóły tyczące się nowszych badań całej rośliny, jakoteż strąków modrego i żółtego łubinu, ze względu na jego ilość azotu i innych żywiolów. Podług badań dra Eichhorna pokazało się azotu

w 100 częściach świeżego, suchego na wolnem powietrzu,	
modrego łubinu . . .	0,293, 1,683,
żółtego łubinu . . .	0,460, 3,013.

Dr. Eichhorn uważa stosunek azotu do węgliku (rachując węglík stałych substancji po 45 — 50 na sto), w modrym łubinie jak 1 : 23, w żółtym jak 4 : 14, w gnoju stajunym (podług Boussignaulta)

jak 1 : 23,5; z kąd wypada; że lubin w tym względzie jeszcze pomyślniejszy stosunek wykaże aniżeli gnój.

Co do wartości paszy z lubinu strączkowego wykazuje nam analiza dra Eichhorna następujące szczegóły:

	w modr. l.	w żółt. l.
W stu częściach suchych na powietrzu wolnem lubinu było		
azotu) części poży-	2,70,	2,38,
bez azotu) wnych	46,61.	45,10,
materji komorkowej	31,42.	34,96,
tłustości	1,61,	0,91,
soli	2,85,	2,77,
wody	14,81,	13,88,

100,00, 100,00.

Ponieważ jednak strączki nie mogą się zupełnie czysto wymłócić, ale w nich 14% ziarna zostaje, przeto byłoby w tym razie w 100 częściach takiej paszy:

	dobrego siana: z łąki podług E. Wolffa
części azotu pożywnych	5,94 8,44,
bez azotu	46,72 43,63,
materji komorkowej	31,67 27,16.

Podług tego możnaby więc wartość paszy na 150—200 przyjąć, rachując siano z łąki = 100; z tej wartości powinno się zwyczajnie w praktyce korzystać. (Ziemiannin).

O MIERZWIE STAJENNEJ,

JEJ PRZECHOWYWANIU I MIERZWIENIU PO WIERZCHU.

(Rzecz wyjęta z pisma Steckhardta „Der chemische Ackermann“).

Pomimo że przedmiot nasz, mierzwa stajenna, od dość dawnego czasu zajmuje nader licznych i znamienitych agronomów, wiele jeszcze a to najważniejszych szczegółów, nie jest dotąd wyjaśnionych i wygląda ostatecznego rozstrzygnięcia. Ostatecznym zaś wyrokiem może nam być tylko ten, co nie będzie się opierał, jak wszystkie dotychczasowe zdania, na samych jedno chemicznych domysłach i osobnionych spostrzeżeniach praktycznych, ale który będzie wynikiem dowodnych a zgodnych doświadczeń tak chemicznych jak praktycznych. Pewników tego rodzaju mało dotąd mamy, a w tej gałęzi wiedzy gospodarskiej najgwałtowniejsza ich właśnie zachodzi potrzeba, bo mierzwa jest najszacowniejszym kapitałem obrotowym gospodarza, kapitałem którego wielkość i wysokie lub niskie procentowanie zawisły jedynie od znajomości rzeczy i pilności, z jaką go tenże zbierze umieści i będzie umiał dyskutować. Jak ogromna strata może być skutkiem złego tego kapitału zbierania, wykazano świeżo przez obliczenia, z których się pokazuje, że sama tylko gnojówka giąca bezużytecznie w Austrii, reprezentuje wartość dostateczną na opłacenie prowizji od całego długu państwa, zaiste nie małego; strata zaś,

jaką ponosi Anglja w ubiegających do morza obchodach ludzkich i zwierzęcych, wyrównywa zupełnie zyskowi tego państwa z jego przemożnego handlu. Nie wiele wprśwrdzie polegać można na wszalkich tego rodzaju porównaniach, tyle jednakże z nich się pokazuje, że masy mierzwy ginące bez pożytku dla roli gospodarza, skutkiem niedbalstwa, zasługują na daleko skwapliwszą i oględniejszą około ich zachowania staranność.

Drugim ujściem, którem kapitał ten wycieka, jest jak wiadomo fermentacja, większa lub mniejsza, wedle metody przechowywania. Jaki w tem pływ wywiera wolny przystęp powietrza i deszczu, pokazuje się z następujących w Anglii dokonanych doświadczeń.

W październiku r. 1850 kazał lord Kinnaird umieścić pewną liczbę młodych tuczonych wołów w pokrytem ogrodzeniu, — takąż samo ich liczbę zas postawić w oborze na uwięzi, Obadwa te oddziały miały przez zimę zupełnie równą i tę samą paszę i ściokę; ale gnój pierwszych pozostał pod niemi; kiedy gnój drugich, jak zwyczajnie, był wyrzucany na gnojowisko urządzone pod gołem niebem. Dla krótkości będę ostatni nazywał podwórnikiem, pierwszy obornikiem. Wcześniej na wiosnę wywieziono obadwa na pola, jednostojne co do gatunku ziemi, lekko gliniaste, i umierzwiono każdym osobny oddział biorąc po dwadzieścia wozów na angielski akr *). W kwietniu zasadzono pole ziemniakami. I na jednym i na drugim oddziale zeszyły równie dobrze; do końca czerwca nie było między obudwoma widocznej różnicy. Od tej chwili dopiero ziemniaki zasadzone na oborniku wzięły przód przed drugimi, i nać ich utrzymała się w pełnej świeżości i zieloności, kiedy u zasadzanych na podwórniku już w początku sierpnia wędnąć zaczęła. W pierwszych dniach października przystąpiono do sprzętu:

1 akr pola nawiezonego podwórnikiem	wydał ziemniaków	152 1/2 cent.
1 akr pola nawiezonego obornikiem		235 „

Na oborniku było zatem więcej 82 1/2 cent.

Po ziemniakach zasiano pszenicę, którą na wiosnę zasilono rozsypaniem po wierzchu 16 ff, guana na akr. Przez zimę nie było w oddziałach różnicy, ale wkrótce po rozsianiu guana, siew stojący na oborniku wyprzedził znacznie drugi oddział i celował przed nim aż do sprzętu, który nastąpił w końcu sierpnia. Plon był następujący:

	ziarna	śłomy
1 akr nawieziony podwórnikiem wydał	2580 ff. —	3430 ff.
1 „ „ „ obornikiem „ „ „ „	3320 ff. —	4730 ff.

Na oborniku było zatem więcej 540 ff. — 1300 ff.

Doświadczenie to stwierdza w sposób niezbity i wynosi do pewności axiomatu dawne twierdzenie, że gnój w oborze pod bydłem pozostawiony daleko silniej i trwalej działa od gnoju wyrzuconego pod gołe niebo, a to do tyła że skutek pierwszego w roku pierwszym o pszeszło 33%, w roku drugim o 25% przewyższa drugi.

Czy przy doświadczeniu powyższem postępowano z gnojem na

*) 100 akrów angielskich = 7013 m. austr. = 72,25 m. upols. 300 prętowych.
(P. R.)

gnojowisku z należytą troskliwością, o tem zamilcza sprawozdanie; być więc może, że inne z nim obejście się zdołałoby nieco zmniejszyć cyfry straty. Zawsze jednakże wypada zdać, że gospodarze górnej luzacji mądrze czynią, pozostawiając, za przykładem swych ojców, gnoj pod bydłem; — że przyklasnąć należy tym gospodarzom saskim którzy jak np. dziedzice majątności Schenfeld, Oberreinsberg, Belgershain i innych, nowe stawiając obory, urządzają takowe na pozostawianie w nich gnoju.

I w Czechach prawda ta ma już swych zwolenników, jakem się o tem w Liebiegitz przekonałem; tu jeszcze rzecz udoskonalono i rozszerzono w ten sposób, że bydła w oborach nie wiążą, ale je po 6 iu 8 sztuk w osobnych ogrodzeniach wolno puszcza, jak to czynią Anglicy w swych klatkach (boxes). W majątności Nettolitz, należącej do ks. Schwarzenberga, zaprowadził to urządzenie dyrektor Kutsche r a dla bydła młodocianego, w Liebiegitz zaś p. radca gospodarczy Hor-ski **) dla krów. Tylko stadniki, złośliwe bydło i woły pociągowe pozostają jak dotąd na uwięzi; — ostatnie z powodu niejednakiego czasu zakładania paszy, niejednostajnej siły i zmęczenia, — pierwsz e dla zapobieżenia przypadkom. Ale i pod nimi zostawia się gnoj, póki można. Płonną okazała się obawa, że pozostawienie zwierzę - tom wolności nie dozwoli równego rozdziału paszy; konsekwentne postępowanie i bicz w porę użyty w nader krótkim czasie doskonała karność i porządek zaprowadził.

Przechowywanie obornika w wielkich kupach na polu.

W Wittingau, majątności uależącej do ks. Schwarzenberga, za - stałem w miesiącu września r. b. robotników w polu zajętych rozrzu - caniem gnoju, który stósownie do przepisu rządy pana Hanusza, w ten sposób był w kupy układany, iż na każdą 12-calową warstwę gnoju rozpościerano 3-calową warstwę ziemi, dopóki się nie utworzył stos dość wysoki, a i ten jeszcze był okryty zaacnym ziemi pokładem. Kupy te wzniesiono w styczniu; leżały zatem przez 8 do 9 miesięcy w gołym polu, często przez ten czas zlewane gnojówką. Przy roz - rzucaniu ich tak mało gnoj raził powonienie, a wyglądał tak świeżo i tłusto, iż go należało koniecznie już z pozoru za wyborny uznać: Dla zbadania jego istoty wzięto próbę i poddaną ją chemicznemu rozbioro - wi. Okazało się, iż gnoj ten w stanie zupełnie suchym zawierał.

Saletrorodu (azotu) w rozpuszczalnym stanie	0,25%
„ „ w nierozpuszczalnym „	1,27 „

razem	1,52 „
-----------------	--------

Cząstek mineralnych	15,4 „
-------------------------------	--------

Organicznych materji	84,6 „
--------------------------------	--------

	100,0 „
--	---------

Gnoj ten był więc nieomal równie bogatym w połączenia azo - awie jak zwyczajny obornik (w średnim przecięciu), a różnił się od niego na swą zaletę tem, że zawierał wiele więcej połączeń azotowych rozpuszczalnych.

Skład powyż wyszczególniony nie daje wprawdzie prawa do wniosku, jakim odmianom uległ gnoj przez swój długi pobyt pod gołym niebem i czy w tym czasie utracił co przez ulotnienie, bo nie wiadomo nam, ile zawierał saletrorodu w chwili układania w kupy, tudzież ile go mógł oddać warstwom przekładanej i wierzchniej ziemi Wolno atoli przypuszczać, z jego obecnego składu, że strata ta mo - gła być tylko mało znaczącą, a doświadczenia, jakie przytoczymy na - stępnie, utwierdzają nas w mniemaniu, że gnoj ten w kupach nie u - tracił nic przez ulotnienie. Zważywszy zaś, że przez takie postępo - wanie doznał bardzo dobroczynnego i pożądanego rozkładu i roztwo - rzenia, gdy $\frac{1}{6}$ jego połączeń azotowych (a nawet więcej pewnie, je - żeli do rachunku włączymy wciągnięte przez ziemię) stała się rozpu - szczalną, skłonić się musimy do uznania tego sposobu przechowywa - nia gnoju za nader stósowny i korzystny. Wiem bardzo dobrze, iż mnóstwo postrzeżeń zaprzecza prawdę tego twierdzenia, — ale wła - śnie dla tego koniecznie potrzeba dochodzić przyczyn, z których w tym tu przypadku dobry, w innych zły wyniknął skutek; spodziewam się, że praktyczni gospodarze chętnie podejmą się zrobienia w tej mierze dokładnych doświadczeń porównawczych.

O rozesłaniu mierzwy po wierzchu.

Jestże rozrzucenie i przydłuższe gnoju pozostawienie na wierz - chu roli i ugoru tak stanowczo nagannem, jak to większość gospoda - rzy utrzymuje?—Przed kilku laty byłbym bez namysłu odpowiedział: Tak jest!—ale dziś odpowiadam: „to jeszcze bynajmniej nie dowie - dzionou“. Na pierwsze spojrzenie wprawdzie tak chemik jak praktyk znajdzie do przygany pochop w następczącej się uwadze, że słońce, wiatr i deszcz, mogąc bez przeszkody działać na mierzwę, ulotnią, u - prowadzą lub wymyją pewną część najszacowniejszych, bo azotowych jej części, wywięzujących się przy gniciu i roztwarzaniu. Dojrzały jednak namysł nadrowadzi go na następujące uwagi, które wyrok po - tępiający osłabia i wszelką ma stanowczość odbiorą:

1: Ilekróć powietrze atmosferyczne wolny ma przystęp do ciał gnijących, tylekróć proces ich rozkładowy przybiera znamiona pru - chnienia, a przy tem ostatniem powstają z saletrorodu nie ulotne po - łączenia amoniaku, aie raczej saletrzane, które mogą być wymyte, ale jako nieulotne nie mogą zniknąć przez wyparowanie lub ulotnienie.

2. Stare przysłowie: bis dat, qui cito dat—i tu jest prawdziwem, Funt pożywności azotowej, wyplatny za okazaniem, tj; w stanie takim że go rośliny natychmiast spożyć mogą, większą ma wartość nieraz od 2 lub 3 funtów takiej pożywności, jeżeli ją sobie też rośliny dopie - ro wtenczas będą mogły przyswoić, kiedy już minie pora najprzyja - źniejsza. Jeden centnar guana zawiera tylko około 12 i pół ff. salet - rorodu, a przecież w ogólnem swem działaniu równa się przynajmniej 75 centnarom obornika, zawierającego 30 do 36 ff. saletrorodu; kija - ca ta różnica właśnie tę ma przyczynę: Kiedy więc, jeżeli już nie część słomiana, to z pewnością właściwa część gnojowa i urynowa obornika, przez rozesłanie go na roli przechodzi w połączenia i for - mę, w których i pod którą rośliny prędzej ją sobie przyswoją, alto - zdarzyć się może, że zysk agronomiczny, jaki z tego przeobrażenia

wyciągnie gospodarz, większym będzie od połączonej z niemi straty chemicznej.

3. Wielu doświadczonych i myślących gospodarzy bierze w obronę to postępowanie. Thaer, Szwerc, Blok i inni nie naganiają go bynajmniej. W Meklenburgji, w majątku niedawno zmarłego Pogge-Roggowa, którego całe Niemcy zaliczają do rzędu praktyków najznamienszych, jest ono prawidłem; zacięci jego synowie upewniali mnie że ojciec ich dopiero po wielu własnych próbach, stwierdzających domyślną korzyść tego postępowania, zaprowadził je u siebie: obiaśnili mnie, że szczegółą w tem zaletą jest, iż ugor koniczynny, przez rozesłanie po nim mierzwy przed podoraniem, jeszcze raz pobudzonym zostaje do nadar silnego porostu i nie tylko bardzo znaczną ilość wydadaje koniczyny, ale nadto wybornie zostaje usposobionym do plonu następnego, gdyż rola przedziwnie kruszeje, a soczyste koniczysko i korzonki silnych roślin koniczynowych i trawnych zaraz po podorze bardzo łatwo gniją. Zgodnie z tem pisze mi jeden z mych przyjaciół rolników z pod Lipska: „Od lat czterech przekonałem się o prawdziwofaktu, od dawna w Niemczech północnych uznanego, iż rozesłany i na powierzchni leżący gnoj bardziej działa, aniżeli takąż sama ilość przyoranego. Ośmnaście wozów mierzwy, która leżała na wierzchu rozesłana od listopada aż do maja, wydały mi plon o wiele lepszy od 24 wozów w jesieni natychmiast przyoranych. Jakże wytłómaczyć to z wszelką teorią sprzeczne zjawisko? Jedni utrzymują, że mierzwa w ten sposób użyta, nie działa równie wytrwale—ale tego dotąd nie uważałem; tylko na gruncie bardzo ciężkim, mokrym, nie zdaje się być dobrą tą metoda. Grunt pod rozesłanym gnojem nabywa takiej, że tak powiem, dojrzałości, jakiej mu nie nadasz najtroskliwszem mechanicznem wyrobieniem. Wiadomo zresztą każdemu gospodarzowi praktycznemu, że i rolę owcami znartowaną lepiej jest nie przorywać zaraz, ale ją zostawić, aż się trochę zazieleni, chociaż ją powtetrze i słońce często zupełnie przesuszy. Podobne, nader korzystne doświadczenie, zrobiłem także z grubą mąką kościową, którą rozsypanwszy na wiosnę po koniczynie, dopiero w jesieni przyorałem.“

(Dokończenie nastąpi.)

H A N D E L.

W upłynionym tygodniu sprowadzono do Warszawy (prócz tego co w spichrzach znajduje się): żyta czwartki 1560, Pszenicy czet. 3,296, Jęczmienia czet. 864, Owsa czet. 2,067, Grochu czet. 238, Gryki czet. 147, Kaszy jęczmienniej czet. 97, kartofli 259, Siana pudów 24,925, Słomy pudów 9660.

Srednie ceny żywności na targach Warszawy i Pragi.

Od Dnia 28 Grudnia do 4 Stycznia 1855 roku.

	Od	Do		Od	Do
	rs. kop.	rs. kop.		rs. kop.	rs. kop.
Żyta czwart.	12 42		Siana fura 1-konna . . .	2 0	4 50
Pszenicy „	15 87		„ „ 2-konna	5 24 1/2	6 —
Grochu	12 91		Słomy pud	— 21	— —
„ „ cukrowego	— —		„ fura zwyczaj.	2 25	3 45
Fasoli	12 79		Drzewa sosn. sażeń . . .	7 44	— —
Gryki	8 36		Wół dobry	40 —	70 —
Jęczmienia	9 10		„ średni	35 —	38 —
Owsa	5 74 1/2		„ lichy	24 —	33 —
Maki pszen. przedniej . .	16 73		Ciele	4 55	— —
„ ordynarnej	15 93		Baran	— —	— —
„ żytniej pyłowej	12 65		Wieprz dobry	18 —	22 —
„ gyczanej	12 79 1/2		„ średni	15 —	17 —
Kaszy jaglanej	18 45		„ lichy	10 —	12 —
„ gyczanej zw.	15 59		Masła pud	8 70	— —
„ drobnej	25 49		Słoniny „	5 80	— —
„ jęczm. perf.	28 47		Kartofli czwart	4 6	— —
„ „ ordyn.	13 77		Okowity wiadro	4 97	— —
Siana pud	— 29		Szumówki wiadro	1 98	— —

Sprowadzono w dniu 4 Stycznia r. b. 1856 z Cesarstwa Rossyjskiego przez tutejszych kupców: wołów sztuk 485, z różnych miejsc Królestwa 266 ogółem wołów sztuk 751, wieprzy 925, cieląt 258 z tych zakupili rzeźnicy tutejsi wołów sztuk 631, wieprzy 738.

KURS GIELDY WARSZAWSKIEJ.

Dnia 27 Grudnia (8 Stycznia) 1855/6 roku

	ŻADAJĄ		DAJĄ	
	Rs.	kop.	Rs.	kop.
M O N E T Y.				
Pół-Imperyaly	5	47	5	46
Hollenderskie dukaty nowe	—	—	—	—
P A P I E R Y.				
Obligaskarbowe 4-proc. za 100 rs. oprócz kuponu	78	91	—	—
Listy zast. białe II okresu (opócz kuponu) za 100 zł.	—	—	—	—
„ „ III „ „ za 15 rs.	15	18	—	—
„ „ Serye wylosowane	—	—	—	—
Obligacye cząstkowe na 500 zł. oprócz kuponu	—	—	—	—
Certyfikaty Banku lit. B. na 200 zł. bez procentu	—	—	—	—
Dowody Kom. Centr. Likwid. za 100 zł.	—	—	—	—
Nowa rosyjska pożyczka z r. 1854 oprócz kuponu	92	29	—	—
W E X L E.				
Berlin 100 talarów	2 m.	99	90	— —
Gdańsk 100 tal.	2 m.	—	—	— —
Hamburg 300 BMk.	2 m.	151	80	— —
Londyn 1 funt sterl.	3 m.	6	67	— —
Petersburg 100 rs.	1 m.	99	50	— —
Paryż 300 franków	2 m.	80	40	— —
Wiedeń 150 zfr.	1 m.	92	40	— —
Wrocław 100 tal.	2 m.	—	—	— —

V. część kuponu bieżącego od Obligów skarbowych rs. 1 kop 4

od Listów zastawnych kop. 2.

Nowa rosyjska pożyczka rs. 1 kop. 05/6