

TYGODNIK ROLNICZO-TECHNOLOGICZNY.

Ora et Labora

Vires uilvae agunt

Prenumerata: w *Warszawie*
półrocznie zł. 12; rocznie
zł. 24. — Na *Prowincyi*
półrocznie zł. 15; rocznie
zł. 30



W *Warszawie* przyjmuje się prenu-
merata w Głównym Kantorze Re-
dakcyi w Starém Mieście Nro 61.
Na *prowincyi* po wszystkich U-
rzędach i Stacyach Pocztowych.

N^o 28.

ROK PIĄTY.

Dnia 6. Listopada 1839. r.

Spis rzeczy: Opis gospodarstwa w Ost-Lothian w Szkocyi (dokończenie). — Biegunka pszczół w roku 1834 i 1835. —
Robota syropu z krochmalu. — Ceny produktów.

Gospodarstwo Wiejskie.

Opis gospodarstwa w Ost-Lothian, w Szkocyi.

(Dokończenie).

Uprawa turnepsu znacznie odróżnia Lothian-
czyków od południowych Anglików. W tej tylko
okolicy uprawiają ten produkt z największą tro-
skliwością. Lubo rzędowa uprawa turnepsu i oko-
pywanie go siłą koni dosyć są znane, nie od rze-
czy tu jednak będzie przytoczyć w tym względzie
niektóre uwagi.

Pomimo wszelkie usiłowania, nieudała się upra-
wa turnepsu na wilgotnym, gliniastym gruncie,
wolano raczej, w miejscu jego, prócz zwyczajnej
rotacyi, zaprowadzić uprawę bobu i kartofli, która
z tych przyczyn korzystniejszą się okazała. Na
dobrze tylko uprawionej roli można z pomyslnym
skutkiem zasiewać turneps; dobre bowiem spul-

chnienie i wyczyszczenie roli z chwastu niezbe-
dnie do wzrostu tego ziemniopłodu jest potrzebne.
Do orania podoń gruntu, najbieglejszych dobierają
oraczy; orka bowiem najregularniej wykonana,
a skiby prosto krajane być powinny; w tym celu
wytykają je wprzód laskami. Robią zagonki na
27. cali angielskich szerokie, jeżeli te mają być
ugnojone, potrzásają je kobiety, za pomocą wideł,
gnojem i ten ziemią przysypują. Jeżeli ma być
użyty za nawóz proch kościany, rozsypują go za
pomocą machyny, która robi środkiem zagona ro-
wek i w tym proch rozsypuje. Za tą machyną idzie
druga, która sieje nasienie turnepsu. Wynalezio-
no teraz inną machynę, która od razu rozsypuje
proch kościany i sieje nasienie, dla tego użycie jej
przekładają nad poprzedzający sposób. Do do-
brego obsiania jednego akra gruntu, używają od
2—4. funtów nasienia stosownie do jego gatunku.

Do dalszych robot około uprawy turnepsu używają pługa i pewnego małego skaryfikatora, którym wolne między rzędami ustępy z chwastu oczyszczają. Urządzenie skaryfikatora jest różne w różnych okolicach i zależy od upodobania używającego go rolnika. Po wykonaniu tej roboty przekopują grzędy turnepsu motykami, przerzedzają tenże gdzie zbyt gęsto wyrasta, tak iżby żdźbła jego na 9. cali jedno od drugiego stały.

Między różnemi gatunkami turnepsu uprawianemi w Szkocyi, pierwsze ma miejsce gatunek szwedzki. Można go przesadzać w potrzebie, a co nie da się wykonać na innych gatunkach. Nie uważają turnepsu za płód podziemny, zawsze bowiem ziemię z niego odgarniają, tak iż, czy to prowadząc między nim pług, czy to przekopując grzędy, strzegą się przysypywania go ziemią. Na gruncie nieco wilgotnym, po przekopaniu grzęd, używają małego płuszka, którym przeganiają małe brzoźdy dla ścieku wody.

W uprawie kartofli wcale przeciwnie postępują przy każdej bowiem robocie starają się coraz bardziej obsypywać je ziemią.

Od uprawy to turnepsu czynią tam zawistym rzeczywisty zysk w gospodarstwie, większą bowiem jego część obracają na tuczenie bydła. Pospolicie $\frac{2}{3}$ części całego plonu turnepsu zwozi się i spasa w oborze tuczającym się bydlęm, resztę pozostałą w miejscu na polu owce zjadają.

Plon turnepsu powyższym sposobem uprawionego, jest nader wielki, nadzwyczajna jego ilość, przeszło 700. centnarów na jednym akrze, ani jest rzadką ani osobliwą rzeczą. Stąd się to wyświeca, dla czego na tamtejszych dzierzawach tak wielką ilość bydła wyżywić i utuczyć można. Jak wiele zakładają tam sobie na uprawie turnepsu, poznać można i stąd, że plon turnepsu z $\frac{1}{2}$ akra wystarcza do utuczenia w przeciągu 3. miesięcy wołu ważącego 1200. funtów. Taką samą rachują ilość

do utuczenia wielkich 10. owiec. Gdyby chciano tuczyć zieloną paszą, wypadłoby użyć 1. akr gruntu dla utuczenia 1. wołu lub 5. owiec. Skąd pochodzi tak wielka różnica w tuczeniu zieloną paszą, dotąd jeszcze dostatecznie nie wyjaśniono.

Bób, *końskim* zwany, w znacznej ilości uprawiany, sięją rzędowo za pomocą machyny a okopują go i oczyszczają z chwastu z wielką troskliwością, używają do tego pługa i małego skaryfikatora, tak samo jak przy uprawie turnepsu. Doświadczone że korzystnie mieszać można groch z bobem, pierwszy bowiem przygłusza i rość niedozwala zielsku w tych między bobem miejscach, których pług nie dosięga.

Co do kartofli, tych nie tyle się uprawia w Ost-Lothian co w innych okolicach Szkocyi i Anglii, gdzie je sadzą na sprzedaż. Uważają tu kartofle jako ziemioplód z korzyścią poprzedzający siew pszenicy; oczyszczają one grunt równie dobrze jak turneps i zastępują częstokroć w tej mierze ugor.

Ponieważ przekonano się że kartofle z korzyścią użyć się mogą na zimową paszę dla koni, i że bydło także zjada je bez szkody, przeto w niektórych folwarkach wchodzi one w kolój innych uprawianych ziemioplodów, mianowicie tam gdzie nie dość pomyślnie wiedzie się uprawa turnepsu. Niektórzy gospodarze obrywają kwiat z łodyg kartofli w mniemaniu że to ich plon o 15. procent powiększy. Potwierdzenie tego mniemania upatrują w tem, że jeden gospodarz nazbierał na jednym akrze kartofli, 12. worków nasiennych jałóg kartoflanych.

Sprzęt zboża, licząc w to groch i bób, z tak wielką wykonywają troskliwością, iż rozumiałby kto że im się nie będą mogły wrócić podejmowane w tej mierze koszta. Żniwiarzy dostają z Irlandyi i z gór szkockich; są to dobrzy i pilni robotnicy, bez których nie podobna byłoby zebrać wszystkiego zboża. Nie lubią najmować robotni

ków pojedynczo, najawczy ich potrzebną liczbę stawiają do roboty tak, iżby na nich choć lekką baczność dawać mogli. Sześć osób (mężczyzn i kobiet) w jednym dniu zezną, zwiążą i zestawią jeden akr oziminy. Dawniej, kiedy mniej tro-skliwiete robotę wykonywano, trzech ludzi tylko na jeden akr stawiano. Widać częstokroć 100. robotników razem na jednym polu pracujących. Na jednym zagonie do 9. łokci szerokim, stawiają po 4. żniwiarzy, którzy równo zawsze postępować winni.

Wydatki na żniwiarzy ponoszone, składają się z 2. kwart zupy z owsianej mąki na śniadanie i wieczere, z chleba i piwa na obiad; między temi porami piwa nie dają. Pieniężna także płaca wyższa jest teraz niż dawniej; dawniej płacono mężczyźnie 9. penc ($1\frac{1}{2}$ złp.), teraz dwa razy tyle płać. Przed niedawnym czasem kontenci byli robotnicy gdy dostali roboty za 3. pence (15 gr. p.) dziennie. Czas roboczy zaczyna się o 5 godzinie rano, a kończy o 7. po południu; ale dają robotnikom wolnego czasu 1. godzinę do śniadania, 1. do obiadu, tudzież po 20. minut o 11. i o 5. godzinie; niewolno im przecież oddalać się z pola. Zboże w snopach zwożą do stodół jednym koniem do lekkich kar zaprzężonym; przekonano się że tym sposob m jeden koń więcej zrobi, niż gdyby był do parokonnego woza jako trzeci na przodzie przyprzężony; wreszcie przy takim sposobie nie rznie się pole głębokimi kolejami.

Roku 1832 doświadczano w *Fifeshire* machyny do żęcia zboża, opatrzonej wielu szeregami narzędzi strzygących, do nożyc podobnych, i przekonane się miano, że dobrze zamiarowi odpowiadało !!

Używane do robót gospodarskich narzędzia i maszyny bywają zawsze w Ost-Lothian najlepszej i najnowszej konstrukcyi. Gospodarze tamtejsi zawsze i we wszystkim naprzód postępują. Ich plugi lepsze są niż we wszystkich innych o-

kolicach; są one lekkie, prostego kształtu i prawie całe żelazne; łatwo je ciągnie sprzężaj i kierują ludzie. Używają wszystkich korzyści jakie im nastręczy natura, nie zaniedbują użytku nieznanymi dawniej sił, kiedy im go wskaże doświadczenie. Nie tylko używają konnych i wodą poruszanych młocarni, ale nadto od kilku lat z wielką korzyścią używać zaczęli siły pary; zastosowania ostatniej do robót gospodarskich bardzo często napotkać można. Używają machyn parowych do mielenia zboża, do jego srotowania, do rznienia sieczki, do mielenia kości i t. p. Używają także machyn parnych do poruszania młocarni, i twierdzą że przez nie taniej mają siłę, niż gdyby parę, końmi zastąpić chcieli. Mają blisko kopalnie kamiennych węgla, pospolitego ich materiału opałowego, i małym kosztem sprowadzać je mogą. Jednokonna fura węgla 7—8. szylingów (14—15. złp.) kosztująca, wystarcza im do poruszania przez dobę maszyny o sile 6. koni.

Ciekawą byłoby rzeczą obliczyć i przekonać się czy byłoby korzystnie używać machin parnych w tych okolicach, gdzie droższe są węgle. Wreszcie użycie machyn, czy to parą, czy innym sposobem poruszanych, do robót gospodarskich, wielu jeszcze znajduje przeciwników w Anglii, ale ich zdania na przesądach się opierają. W Szkocyi skwapliwsi są ludzie do nowości i nie z takim sądzą o nich uprzedzeniem.

Niejaki P Todds w pięknej wsi *Dinleton*, niedaleko od morza położonej, a do P. Ferguson należącej, ma piękną, o wysokim ciśnieniu maszynę parną, która nadzwyczaj mało zajmując miejsca, i tylko 4 oksefty wody, a za 5 szyl. (10 złp.) potrzebując węgla, w 10. godzinach wymłaca 35. kwarterów (koło 80 korcy pols.) owsa, i należyte go czyści, z pomocą 1. konia z wozem i 2. ludzi do zwożenia zboża z niedaleko stojącej sterty, tudzież 8. ludzi (?) do posługi około

machyny. Do opalania kotła i doglądania wentylów może być użyty roztropny człowiek z pomiędzy prostych robotników, kiedy mu się da stosowną instrukcją.

Ponieważ mało jest stałych łąk w dzierżawach, a potrzebne siano z samych tylko sprząta się sztucznych pastwisk, przeto tyle tylko chowają krów mlecznych, ile niezbędnie potrzeba dla domowego gospodarstwa. Nadewszystko troskliwie się tu zajmują tuczeniem bydła; w tym celu zakupują corocznie, pod czas wrześniowego jarmarku w *Falkirk*, czarne, małe, górne krowy, które szczególniejszodatkne są do tuczy. Z resztą używają także durhamskiej (z krótkimi rogami) i ayrshirskiej rassy, z których pierwsza bardzo się dobrze tuczy, a druga obficie mleka daje. Starają się utuczyć krowy i woły w przeciągu 3 miesięcy, po czem je sprzedają i zakupują inne, jeżeli paszy mają podostatkiem.

W tej części Szkocyi nie masz zwyczaju tak regularnie tuczyć owce, jak w Anglii; na S. Michał tylko zakupują do tuczenia szkopy. Czasami także zakupują kotne owce. Po ich okoceniu się, które zwykle przypada w styczniu, sprzedają jagnięta, gdy podrosną, do jatek, owce zaś podpaszone na wiosennych pastwiskach sprzedają przy końcu maja. Najwięcej biorą do tego górną rasę dużych owiec z czarną głową, podobną do rassy południowo-dewonschirskiej, tylko większą i rogiatą. Rassa leicesterska coraz bardziej się upowszechnia i wielce jest szacowna. Dziwić się trzeba dzierżawcom angielskim, że mało dbają o chów tych zwierząt, które oprócz owiej niezwykłej wielkości, zalecają się lepszą jak szkockie owce wełną i osobliwszą do utuczenia zdolnością.

Konie w Ost Lothian do robót w polu używane są rosłe, silne; wielce też użyteczne są swą siłą, gdyż wielkie ciągną ciężary, i w plugu chodzić muszą. Kary najpospolicij bywają jednokonne; do dwóch koni jednego tylko utrzymują

parobka, dla tego drugiego, kary ciągnącego konia, przywiązują do kar przodkowych, aby jednemu człowiekowi snadniej było kierować dwoma zaprzęgami.

Mało jest pewno posiadłości angielskich w którychby robotnicy lepiej byli żywieni i przyodziewani, gdzieby tak czerstwo i silnie wyglądali, a przy tem tak byli pracowici i pilni jak w Ost-Lothian. Przyczyny tego już są w dobrej ich płacy już w ich wychowaniu, pokazują bowiem swemi postępkami, że ich ożywia szlachetne uczucie. Nie wchodzą wczesnie w związki małżeńskie, a tym bardziej bez funduszu i sposobu do życia; przeszkadza to wprawdzie pomnażaniu się ludności, ale za to lud jest silniejszy, zdrowszy, czynniejszy i zamożniejszy. Używani do robót około gruntów i innych gospodarskich ludzie, placeni są zwykle w pewnej części owsem, jęczmieniem, bobem, grochem i kartoflami; dostają co potrzeba do utrzymania sobie krowy, tak iż mąż wraz z żoną miewają rocznie do 25. f. s. (do 1,000 złp.); za to muszą w czasie żniw pomiścić bezpłatnie jednego żniwaka.

Taki rodzaj i sposób zapłaty przekładają dzierżawcy w Ost-Lothian nad płacę pieniężną, przyzwyczajają bowiem przez to ludzi do lepszego zajmowania się dobrem swego pana. Na wszelki też wypadek robotnicy zabezpieczeni są przeciwko potrzebie troszczenia się o żywność, mogą zawsze część pobieranego w zapłacie zboża dostać od panów w pieniądzech, gdy tego według swój woli zażądadają, aby mieli za co kupić sobie najpotrzebniejsze rzeczy.

Biegunka pszczoł w roku 18⁵⁴/₃

Biegunka pszczoł należy do mniej pospolitych ale zgubnych chorób tego pożytecznego owadu. Kto sobie położy za zasadę chowu pszczoł same tylko gromadne osadzać i zimować pszczoły; kto

je na zimę dobrze ubezpieczy a wcześniej na wiosnę nie da im cierpieć głodu, ten prawie pewno uniknie poznania między niemi choroby. Najlepiej z chowem pszczół obeznani, zgadzają się na to, że przyczyną biegunki bywa złe obchodzenie się z niemi pszczolarza lub jego o nie niedbałość; przyczyni się on do złego, już to zostawiając na zimę ule mało mające pszczół i roboty; albo gdy ich należyce przeciw mrozom nie zabezpieczy; albo, gdy je za pierwszym wyleceniem z ula, wcześniej na wiosnę niezdrwym miodem karmi, lub wreszcie gdy, zobaczywszy ślady choroby w ulu, bynajmniej się o to nie troszczy. Jeżeli zechce zaradzić złemu, powinien spostrzegłszy jego początek, otulić ciepło ul zimny, ogrzać go nawet jeżeli można, a gdy to się zdarzy w porze cieplejszej, gdy już pszczoły wylatują, niech im w leje kilkanaście kropli dobrego czerwonego wina do danego im na pożywienie miodu, a złe mniej im szkodzić będzie. O inne zdrowe ule można być spokojnym, bo ta choroba nie jest zaraźliwą.

W roku 1834 choroba ta, w wielu okolicach mocno grassowała, okazując się ze wszystkimi znamionami biegunki; już we wrześniu upadały tu i owdzie pszczoły, a w późnej jesieni stała się zabójczą dla słabych, czy to młodych czy starych rojów; wreszcie nie mogły jęj się oprzeć i silne roje, albo całkiem upadały albo ich znaczna część ginęła. W niektórych pszczolnikach trzecia część, w innych nawet więcej wymarło. Były i takie co ich połowę na wiosnę postradały.

Tak zjadliwa choroba, której przyczyny są tylko domysłowe, zasługuje na szczegółowe opisanie. Następujące były jęj znamiona; pszczoły w ulach tą chorobą dotkniętych, niespokojnie tam i sam około wylotu kręciły się i kalały go brunatnym o drażliwie woniejącym wyrzutem. To wlatywały do ula, to z niego wylatywały; chciały odlecieć w pole i upadały, jakby były bezskrzydłe; łaziły chwilę po ziemi, przewracały się na grzbiet

i w pośród drzenia umierały. Przypatrzwszy się im dobrze w ulu, przykro było widzieć tysiące nieżywych, umierających i chorych. Na próżno usiłowano dać im pomoc, nic nie skutkowało. W kilku dniach całe roje wymierały. Niektórzy właściciele pszczelników, widząc tak nagły ich pszczoł upadek, sądzili że zli ludzie zadali tymże truciznę, to jest miód z mąką i drożdżami, przekonali się potem że inna musiała być przyczyna choroby. W jednym pszczelniku upadł już rój w pierwszych dniach września, wkrótce potem drugi, dalej trzeci, tak iż z jedenastu ulów. w miesiącu lutym jeden już tylko pozostał. Cała wewnętrzna strona upadłego ula skalana była rzadkimi wyrzutami, plastry wosku brunatno poplamione; prawie wszystkie komórki miodne zamknięte; miód był gęsto mażący się, odrażliwej woni, kwaśny. Własności tych ani ogrzewaniem ani przetapianiem odjąć mu nie można było. Oczyszcivszy należyście jeden ul w którym pszczoły upadły, zostały do 20. funtów miodu, osadzono w nim inny, młody, zdrowy rój, ten wszedł wesoło, zajął gotową robotę, ale po kilku już dniach nie okazywał zwykłej takim pszczołom wesołości, żył przez lato, jak się zdawało dopóty dopóki znaleźć mógł dla siebie pożywienie na kwiatkach; gdy tych zabrakło, upadł na biegunkę jak poprzedzający. Gdy miód zrewidowano, część jego skrupiała czyli skryształizowała się, reszta zaś, wcale nie była klejka, ale rzadka i ciekła jak woda.

Przyczyną choroby, jak dowiodły doświadczenia i tak powszechny pszczoł upadek, był niezdrowy zepsuty miód w lecie 1834. r. a to, albo stąd że sok miodny w czasie zbierania go przez pszczoły niedosć był wyczyszczony i od części szkodliwych oswobodzony, a w czém Ehrenfels naznacza przyczynę biegunki, albo sprawić ją także mógł brak pyłku kwiatowego, jak to już dawniej Knauff utrzymywał. Zdaje się podobnym do prawdy że ostatnia przyczyna była rzeczywistą

w 1834 r., w ówczas bowiem zbiór miodu trwał bardzo długo. W miesiącu nawet sierpniu kilkakrotnie jeszcze zdarzały się rosy miodowe, i we wrześniu jeszcze widziano je na młodych liściach wiązby, z których słodki, klejki sok zbierały pszczoły od rana do wieczora. Atoli nie mogły przymieszać pyłku kwiatowego do miodu, gdyż albo trudno im go było dostać w tak późnej porze roku, albo, że dla własności owego lata mało go było w kwiatkach. Opowiadali wszyscy, z uwagą pszczoły w ówczas podbierający, że bardzo mało znajdowało się w plastrach pyłku kwiatowego. Małą jego ilość użyły pszczoły na pożywienie dla czerwia a same miód jedynie jeść musiały. D a

tego więc wymarły, naprzód młode roje, bo te najmniej pyłku miały, potem te, które albo mniej były gromadne, albo sam tylko miód do ulów zносиły, i te tylko pozostały, które dosyć miały pyłku do pomieszania go z miodem. Prawdopodobieństwo tego mniemania potwierdza i ta okoliczność że u wszystkich zmarłych rojów nie widać było zalążków. Między innymi zapewnia Magerstedt że pilnie przeglądał robotę wszystkich u niego upadłych pszczół, a nigdzie ani w jesieni ani w zimie nie znalazł śladu czerwia. Uważać to można za konieczny skutek braku pyłku, którego pszczoły na pokarm dla czerwia niezbędnie potrzebują.

Cechułka.

Robota syropu z krochmalu.

Na początku bieżącego wieku odkrył Kirchoff w Petersburgu, że krochmal gotowany z wodą, do której przydano kwasu siarczanego, na cukier zamienić się może. Ważne to odkrycie, w czasie lądowego systematu Napoleona, powszechną ściągnęło na siebie uwagę, i tym sposobem znaczną ilość cukru wyrabiać zaczęto.

W ostatnich czasach zaniechano powszechnie przerabiania krochmalu na cukier za pomocą siarczanego kwasu, w miejsce bowiem jego wynaleziono inną istotę która ten sam czyni skutek a tę ma po sobie zaletę, że przez jej użycie robota staje się prostszą i tańszą. Powszechnie już dziś wiadomo, że w czasie kiełkowania zboża a mianowicie jęczmienia, tworzy się pewna istota *dyastazem* zwana, że ta, w pewnej temperaturze, krochmal ziarna w cukier zamienia, i że na tém polega cała piwowarów i gorzelników robota, za-

cierania zboża i t. p. istot krochmal w sobie zawierających. Dla tego często teraz używają dyastazu czyli raczej zawierającego tenże, sfermentacyjny do roboty krochmalowego syropu.

Naprzód więc mówić będziemy o sposobie wyrabiania syropu z krochmalu za pomocą kwasu siarczanego, a potem o użyciu w tymże celu dyastazu.

Zrobić tu wypada uwagę, dla czego dość mało wyrabiają tego gatunku cukru (a), czyli dla czego mało go dotąd używają, pomimo że cena tego cukru o wiele jest niższa od ceny cukru trzcinowego?

Łatwa jest odpowiedź na to pytanie. Którymkolwiek z tych sposobów wyrobią cukier, nie

(a) Syrop jest cukrem w wodzie rozpuszczonym, dla tego tu wyrazy cukier i syrop za jedno uważać będziemy. Red.

daje się tak krystalizować jak cukier ze trzciny, buraków lub kłonu; jest on oddzielnym gatunkiem, nie w kryształach, ale w krupiąstą zawsze otrzymującym się *massie*. Stąd też nazywają go cukrem *krachmalowym*, *krupiąstym*, *winnym* i t. d. z przyczyny że znaczna jego znajduje się ilość w dojrzałych jagodach winnych. Cukier krachmalowy trudno rozpuszcza się w wodzie i mniej jest słodki od cukru trzcinowego, a przytem ma właściwy sobie smak ziemny. Półtrzecia funta tego cukru tyle tylko słodzą co jeden funt cukru trzcinowego.

Oprócz dwóch wymienionych gatunków cukru, znany jest jeszcze trzeci, który się nigdy nie otrzymuje w stanie stałym, tylko w stanie syropu i jest klejki; zowią go *melassem*, znany on jest powszechnie pod nazwą *brunatnego syropu*. Jest nierównie słodszy od cukru krachmalowego, a ponieważ powstaje z dłuższego niż potrzeba gotowania rozpuszczonego w wodzie cukru tak trzcinowego jako też krachmalowego, przeto uczynić można cukier krachmalowy słodszy przez to, gdy należyście zgęszczony jego roztwór w wodzie dłużej się gotuje; w tedy jako syrop w handel puszczony być może. Tak też najczęściej robią; używają krachmalowego syropu w miejsce lub do fałszowania zwyczajnego, cukrowego syropu, gdyż taniiej go od ostatniego mieć można. Nazywam to użycie fałszowaniem, gdyż, jak powiedziałem, zawsze ten syrop mniej jest słodki i dla pewnej ilości zawartej w nim gummy krachmalnej, mniej smaczny. I tak 12. funtami tego syropu (za pomocą dyastazu wyrobionego) tyle się tylko słodzi co 5. funtami syropu holenderskiego lub 3. funtami czystego, głowiastego cukru.

Najgłówniejszém jego użyciem byłoby przerobienie go na bardzo czysty spirytus, przez fermentację bowiem mało co mniej wydaje alkoholu jak cukier trzcinowy. Potrzeba tylko aby do tego użycia doskonale był wyrobiony, to jest żehy wszystkich

krachmal dobrze był w cukier zamieniony, co przecież dotąd nie zawsze się udawało.

A. Robota krachmalowego syropu za pomocą kwasu siarczanego.

Robota ta z następujących składa się działań:

1. Z gotowania krachmalu z wodą i kwasem siarczanym.
2. Z oswobodzenia cieczy z kwasu siarczanego.
3. Z odparowania i wyczyszczenia cieczy cukier w sobie zawierającej.

1. Gotowanie krachmalu w wodzie z kwasem siarczanym.

Ogrzewa się do zawrzenia wodę w obszernym kotle miedzianym, i wlewa się do niej po trosze, potrzebną ilość czystego kwasu siarczanego. Do tak zakwaszonej wrzącej wody kładzie się częściami krachmal nieco wodą rozczyniony, a to tak iżby nie prędzej włożona była druga część, aż pierwsza całkiem się w przezroczystą ciecz zamieni. Tak wszystek krachmal włożywszy, gotuje się go, ciągle dolewając wyparowaną ilość wody, dopóty, aż się wszystek zupełnie w cukier czyli w syrop zamieni.

Punktu zupełnej przemiany w cukier krachmalu, nie można poznać po powierzchownych znakach cieczy, ale po jej chemicznych własnościach. Gotowany krachmal w kwaśnej wodzie nie od razu i nie bezpośrednio zamienia się w cukier, ale najprzód w gumę krachmalną, a z tej dopiero, ciągłym gotowaniem, obraca się w cukier; stądto w pierwszej chwili po włożeniu do wody krachmalu, prędko się ten wprawdzie rozpuływa, ale później dopiero w słodycz się zamienia.

Ponieważ zaś cukier w miernie tegim spirytusie łatwo się rozpuszcza, a gumma nie rozpuszcza się, spirytus przeto podaje dobry sposób poznania zamiany krachmalu. To jest dopóki w gotującej się cieczy cokolwiek jest gummy, dopóty tworzy

się gęsty, zawieszisty osad w spirytusie gdy się do niego w leje równa mu ilość nieco przestudzonego syropu. Przeciwnie, gdy nie ma gumy, nie okazuje się żaden osad, nieco tylko staje się mieszanina mętna dla innych istot.

Drugi sposób poznania przemiany krochmalu w cukier, podaje rozczyń *jodu*. Do charakterystycznych własności krochmalu należy między innymi i to że w połączeniu z jodem przybiera kolor ciemno-indygowo-błękitny. Na początku gotowania utworzona gumma krochmalowa, wlana do rozczyń *jodu*, przybiera kolor winno-czerwony, kiedy się zaś doskonale zamieni w cukier, wcale się nie zafarbuje. Dostyc więc będzie wziąć tylko małą ilość cieczy z kotła na próbę, ostudzić ją i wlać do rozczyń *jodu*, a z więcej lub mniej mocnego koloru poznać będzie można jak dalece postąpiła zamiana krochmalu w cukier; jeżeli nie okazuje się żaden kolor w mieszaninie, znakiem to będzie że wszystek krochmal w cukier się zamienił.

Ilość kwasu siarczanego do zamienienia krochmalu w cukier użyć się mająca, może być bardzo różna. W ogólności im więcej użyje się kwasu, tym prędzej zamieni się krochmal w cukier.

Gdzie więc tani jest kwas a drogi opał, powiększy się ilość pierwszego; gdzie przeciwnie tani jest opał, tam najlepiej będzie użyć mniej kwasu, a dłużej gotować, mianowicie gdy się odbywa robota na dużej ilości krochmalu.

Kirchhoff, wynalazca tego sposobu roboty cukru, podaje następujące wypadki co do długości czasu téj zamiany w różnych stosunkach krochmalu, kwasu i wody.

100. funtów krochmalu, $\frac{1}{2}$ funta kwasu siarczanego, 300. f. wody. Czas gotowania trwa kilka dni.

100. f. krochmalu, 1. f. kwasu, 400. f. wody. Czas gotowania 30—40. godzin.

100. f. krochmalu, $2\frac{1}{2}$ f. kwasu, 400. f. wody. Gotowanie ciągnie się 20. godzin.

100. f. krochmalu, 10. f. kwasu; 600. f. wody. Czas gotowania 7—8. godzin.

Najlepiej więc byłoby obrać średni stosunek, to jest 100. funtów krochmalu, 4—5. kwasu i 400 f. wody; ale jak się już powiedziało, wybór ten zależeć będzie od miejscowych okoliczności. A że wielka ilość wody naturalnie osłabia działanie kwasu, lepiej przeto mniej używać wody. Można więc na 1,000. f. wody wziąć około 15. f. kwasu i 450—500 f. krochmalu.

Zamiast gotowania w miedzianym kotle, na gołym ogniu, wykonać to można w drewnianych kadziach, ogrzewanych parą, mianowicie w gorzelniach stosownie urządzonych. Jeżeli kocioł parny nie jest za mały, można go razem użyć do destylowania zacieru i do gotowania krochmalowego syropu. Uważać tu trzeba na to, aby nie lać do naczynia, w którym się ma gotować krochmal, od razu całej ilości wody, ale tylko blisko $\frac{2}{3}$ jęj części, gdyż skraplająca się w niej z początku para z kotła idąca, prędko naczynia dopełni.

Wypadałoby doświadczyć azali gotowaniem w wyższej temperaturze, to jest w bardzo natężonej parze, nie ułatwiłaby się zamiana krochmalu w cukier.

Do roboty krochmalowego syropu i cukru, używa się zwykle krochmal kartoflany, gdyż ten jest tańszy. Ktoby chciał korzystniej prowadzić tę fabrykacyą, powinien sam wyrabiać u siebie krochmal, bo inaczej znacznej części zysku innym ustąpićby musiał, Krochmal przeznaczony na cukier nie potrzebuje być zupełnie czysty, ani zupełnie suchy. Można go bardzo długo przechować bez zepsucia, w stanie surowym, mokrym, w beczkach po wydobyciu z kartofli. Chcąc się przekonać ile zawiera w sobie suchego krochmalu, pewna ilość mokrej jego massy, odważyć trzeba pewną téj ilość, wysuszyć ją i znowu odważyć.

Gospodarz wiejski mający własną fabrykę pszennego krochmalu lub w bliskości jego się znajdującą, korzystnie użyć może do roboty syropu i cukru nieoczyszczonej, dopiero z łusk; oswobodzonej masy krochmalowej.

Zamiast wyrobionego z kartofli czystego krochmalu, użyć można ich miazgi mialko roztartej, oswobodzonej od rozpuszczalnych części przez płókanie jej zimną wodą, jak również użyć można ususzonych i na mąkę zmielonych kartofli.

2. *Oswobodzenie cieczy od kwasu siarczanego.*

Dotąd jeszcze niezdolala chemia wytłumaczyć jakim sposobem kwas siarczany zamienia krochmal w cukier. Krochmal, jak również cukier z niego powstały składają się z węgla, wodoru i kwasorodu. Ten sam w obudwu jest stosunek wodoru i kwasorodu, to jest taki jakiego potrzeba do utworzenia wody. Dla tego 100. funtów krochmalu wystawić sobie można jako składające się:

ze 44,90 funtów węgla i
z 55,10 — wody (czyli jej pierwiastków).

100,00 funtów krochmalu.

100 funtów zaś cukru krochmalowego składa się:

ze 45,4 funtów węgla i
z 59,64 — wody (czyli jej pierwiastków).

100,00 funtów cukru krochmalowego.

Podług tego więc w 100. funtach krochmalu zawarte 44,9 funtów węgla i 66,1 funtów wody (czyli jej pierwiastków) tworzą krochmalowy cukier, to jest: 100. funtów suchego krochmalu zabrawszy w siebie 11. funtów wody, dają 111. funtów suchego cukru krochmalowego.

Że tyle zabrał w siebie wody krochmal, przyczyną tego była obecność kwasu siarczanego, tego kwasu który pospolicie w innych razach odznacza się tym, że wodę z innymi ciał do siebie przyciąga, niepodlegając przy tym żadnej zmianie.

To cośmy dopiero uważali, jest pewnie i przyda się dla naszej wiadomości tém, że nam wskaże sposób oddalenia kwasu siarczanego z cukrowej cieczy. Wiele jest takich ciał, które lubo same przez się rozpuszczające się, łącząc się z innymi, nawet łatwo się rozpuszczającymi, tworzą związki wcale nierozpuszczalne; stąd widzimy, że można zabrać ciało z jakiej cieczy, dodając do tej inne ciało, któreby zabrać się mającém utworzyło związek nierozpuszczalny.

Wiadomo że niedokwas ołowiu, jakoteż baryta i wapno tworzą z kwasem siarczanym związki już nierozpuszczalne, już bardzo trudno się rozpuszczające, a stąd łatwo przewidzieć można, że wszystkie te istoty posłużyć także mogą do oddalenia kwasu siarczanego. Fabrykant wybiera z nich tę, której użycie jest najtańsze i najskuteczniejsze; takim działaczem jest wapno, tę jeszcze prócz innych mające zaletę, że do otrzymania skutku mała jego ilość wystarczy.

Jeżeli do zabrania kwasu używamy ciała rozpuszczalnego, strzedz się naturalnie trzeba użyć go nad miarę, to jest tyle go tylko użyć należy, ile ściśle potrzeba do zabrania kwasu; dla tego w podobnych okolicznościach zawsze używać się zwykło takiego, które się nierozpuszcza w cieczy oczyścić się z kwasu mającej tak, iż choćby dodane było w zbytnej ilości, to przecież jej nie zaszkodzi.

Do zabrania więc kwasu siarczanego z cukrowego rozcieku nie używa się palonego czyli kaustycznego wapna, którego mała część w niej się rozpuszcza, ale węglanu wapna, czyli kredy, która przed użyciem tłucze się na mialką mąkę i przesiewa.

Użycie to wykona się w następujący sposób: Gdy środkami wyżej opisanymi przekona się, że wszystek krochmal w cukier się zamienił, spuszcza się słodka, wrzuci ciec z naczynia w któ-

rém się gotowała, w inne wysokie, drewniane, mające otwory czopkiem zatykać się mogące i dodaje się kredę po trosze, dopóty aż omoczony w cieczy papier lakmusem niebiesko zafarbowany czerwieni się przestanie.

Kreda dla tego w małych na raz sypie się ilościach, że prędko wydobywający się z niej gaz kwasu węglowego sprawia gwałtowne w cieczy wzburzenie, dla którego taż wylaćby się mogła z naczynia. Dla tej samej przyczyny nie wypada nalewać pełno naczynia.

Aby ułatwić działanie na kwas kredy i wydobywanie się gazu kwasu węglowego, mieszać trzeba ciecz drewnianém wiosłem, a ponieważ wysoka temperatura również ułatwia wydobywanie się tego gazu, trzeba więc sypać kredę do cieczy, dopóki ostatnia jest gorąca, uczynić to nawet można w naczyniu, w którym się krochmal gotował, jeżeli jego budowa i materiał dozwolą.

Łatwo można za pomocą wzmiankowanego lakmusem zafarbowanego papieru dojść ilości kredy użyć się mającej do wybrania kwasu siarczanego, i oznaczyć ją przynajmniej sposobem przybliżonym. Jeden funt kwasu siarczanego wymaga blisko jednego funta kredy, a że ta miewa zwykle w sobie pewną część glinki, przeto cokolwiek więcej użyć jej trzeba.

Z przydanój kredy (nasylenia czyli zobojętnienia kwasu siarczanego) pozostaje nierozpuszczalny związek kwasu siarczanego z kredą, który się nazywa *siarczanem wapna* czyli *gipsem*; zostawić trzeba ciecz spokojnie aby ten na dno jej opadł.

Gdy to nastąpi spuszcza się ciecz żółtawoprzeczystą, wyjmując czopki z naczynia w różnej jego wysokości jeden nad drugim będące, to jest w miarę jak się ciecz od góry ustawa, wyjmuje się naprzód czopek najwyżej położony, potem drugi niższy i t. d.

Stoczywszy syrop aż do osadu gipsowego na dnie kadzi, użyć trzeba ługowania do wyciągni-

nia jego części w tymże osadzie pozostałej: w tym celu weźmie się małą kadkę, nad jej właściwém dnem, na 1—2. cali wysoko, ustawi się dno dziurkowane, na to położy się płótno pojedynczo lub we dwoje złożone, posypie się je sieczką na cal grubo, i wreszcie przyłoży także na 1. cal słomą. Na to wszystko przeloży się osad gipsowy, z którego ściekać będzie powoli syrop czysty na dno prawdziwe, skąd się go kruczkiem spuści. Gdy syrop ciec przestanie, nieporuszając osadu, naleje się nań powoli, ostrożnie, tyle czystej wody, iżby go ta pokryła; ta przeciekając przez osad zabierze z niego resztę pozostałej w nim słodyczy. To co przecieknie wyleje się do syropu, a gipsu za nawóz użyje.

Jeżeliby przez dodanie kredy do syropu w celu zabrania kwasu siarczanego, tenże syrop zbyt zgęstniał, tak iżby z trudnością wydobywać się mógł z niego gaz kwasu węglowego, wtedy przylać do niego można gorącej wody i z tą go dobrze wymieszać.

W miejsce sieczki do cedzenia syropu użyć można czystego piasku rzecznoego.

3. *Parowanie i czyszczenie cieczy słodkiej.*

W opisanym wyżej stanie otrzymana ciecz jest wprawdzie słodka, ale za nadto jeszcze wodnista iżby ją za syrop uważać można było, nie jest przytém zupełnie czysta, czemu także zaradzić trzeba. W tym celu paruje się ją w płytkich kottach miedzianych z przydatkiem ciała któreby ją wyciszcilo. Gdy się zbytnia ilość wody wyparuje, opada na dno kotła kreda, której się była pewna ilość w wodzie rozpuściła, a inne nieczystości w pianie na wierzch się wznoszą. Oddalić trzeba z cieczy jedno i drugie.

Podgotowawszy więc ciecz do stanu obrzedniego syropu zostawi się ją przez jakiś czas spokojnie, aby kreda na dno opadła, po czém zleje się czystą z wierzchu, a resztę mętną i z kredą precedzi wolno przez sukno lub flane-

ię. Albo lepiej jeszcze gdy taż ciecz w kotle zagrzewć się nieco zacznie, przyda się do niej, licząc na 100. funtów krochmalu, 2-6. funtów na proch utluczonych węgli z kości i z temi się ją gotuje dopóty aż dojdzie do stanu obrzedniego syropu; wtedy przelewa się syrop do miedzianego kotła aby ostygł blisko do 50° R. Gdy do tego stopnia ciepło się jego zniży, wleje się do niego na każde 100. kwart syropu 2 kwarty wolowej krwi lub mleka; do tego krew rozlewa się wprzód drugą taką ilością wody, mleko zaś używa się samo przez się. Następnie ogrzewa się syrop zwolna aż do zawrzenia, przez co utworzą się na wierzchu szumowiny, które warzęchą zebrać należy.

Niezupełnie jeszcze czysty będzie syrop, pływać w nim jeszcze będą grube męty; chcąc go i z tych oswobodzić, przeleje się go do naczyń drewnianych, troche u dołu węższych i w tych zostawi spokojnie, w cieplej izbie, a męty na dno opadną. We 12. godzin można spuścić z wierzchu syrop ustały, resztę zaś od dna, mętnego, precedzić przez worek kończaty flanelowy.

Możnaby tu do cedzenia użyć wspomnianej wyżej kadki z dnem podwójnym; ale na jej drugie dziurkowane dno, zamiast sieczki, wypadałoby nasypać grubego rzecznoego piasku i na ten dopiero wolno ciecz lać.

Którymkolwiek z pomieszonych sposobów wyklarowany, obrzedni syrop przelewa się na płytką panew i w tej się wolnym gotowaniem zgęszcza do takiego stopnia jak widzimy syrop w handlu; powiedzieliśmy już bowiem że się syrop krochmalowy nie da przywieść do doskonałego stanu krystalicznego. Parowanie czyli gotowanie syropu nie wymaga innej przezorności nad tę, aby się tenże zbyt mocno i kłębamami nie gotował, bo przez to łatwoby się przypalił, co by zaszkodziło jego smakowi i kolorowi. Kiedy się krochmal zupełnie przemieni w syrop za przydaniem siarczanego

kwasu i kiedy się do jego oczyszczenia dosyć użyje kościanego węgla, wtedy otrzyma się syrop, który osadzać będzie krupiasty cukier, co nie każdemu się podoba. Dla tego to częstokroć umyślnie skracają gotowanie krochmalu z kwasem siarczanym, aby się nie wszystek w cukier zamienił, i aby się cokolwiek pozostało w nim gummy któraby niedozwalała krupić się cukrowi. Można także zapobiedz temu osadzaniu się, mocnym zagotowaniem syropu w panwi, po jego zgęszczeniu, przez co on nabierze ciemniejszego koloru (który dla wielu kupujących jest pożądanym) i w części przynajmniej zamieni się w cukier klejki, niekrystalizujący się. Payen twierdzi, że robiąc na wielką skalę; 100. funtów krochmalu dać powinny 150. funtów syropu, inni fabrykanci utrzymują, że go mniej od tej ilości będzie.

B. Robota krochmalowego syropu za pomocą dyastazu.

Postępowanie wprzerabianiu krochmalu na cukier za pomocą dyastazu jest bardzo proste i łatwe i dla tego pewno weźmie pierwszeństwo przed używaniem do tego celu kwasu siarczanego.

Według Lüdersdorfa tak się robotę wykoną.

Nalewa się na krochmal kartoflany tyle chłodnej wody iżby się stąd utworzyła gęstawa polewka, a potem ciągle mieszając przylewa się tyle wrzącej wody aż się utworzy zsiadły kłajster, Ten studzi się do 50° R. następnie sypie się do niego potrzebną ilość mialkiego słodowego jęczmiennego szrotu i wszystko się dobrze wymiesza. Już na początku mieszania zaczyna rzednąć kłajster a w kilku minutach zamieni się wszystek w ciecz rzadką, wodnistą. Ciecz ta będzie miała smak obrazgowaty, nie wiele zawierać będzie w sobie cukru, a wiele gummy krochmalowej; podobniez bowiem jak przy użyciu kwasu siarczanego, naprzód utworzy się ta gumma. Ażeby zatem więcej utworzyło się cukru, trzeba utrzymać tęż ciecz przez kilka godzin w równym 40-50° R. wynosząc ciepło. Po 8-10. godzinach będzie ona mocno słodka; nie przybędzie słodczy, choćby się ciecz dłużej w takimże ciepłe trzymała, co będzie dowodem że się już przemiana krochmalu w cukier ukończyła.

Najlepszy stosunek okazał się następujący: 80. funtów krochmalu, 10. funtów szrotu słodu jęczmiennego i 450-500. funtów wody. Szrot słodowy powinien być bardzo mialki i zrobiony z wcale świeżego słodu. Dla odjęcia łuski słodowej

z cieczy słodkiej nieco kleistej, przecedzi się ją przez sito; nie będzie ona jeszcze przezroczysta, ani nawet opadną w niej kleiste męty, choćby najdłużej spokojnie stała.

Chcąc ją więc wyklarować wsypać trzeba do niej grubiej mąki z utartej cegły, gotować z nią, a we 12. godzin wszystkie nieczystości z mąką ceglana na dno opadną, poczem czystą cieczą sciągnąć ostrożnie lub nadto jeszcze przefiltrować można. Zdaje się że gruby, rzeczny piasek ten sam zrobiłby skutek. Potém już tylko zgęścić trzeba syrop parowaniem.

Nawet wyklarowana ciecz słodka będzie jeszcze miała smak słodowy; aby jej tenże odjąć trzeba ją za pomocą wyżej opisanéj kadki, cedzić przez świeżo wypalone, na gruby proch utarte i wodą odwilżone węgle drzewne, albo lepiej jeszcze przez węgle z kości.

Bley i Otto podają następujący sposób tejże roboty.

Rozczynia się chłodną wodą na rzadką polewkę 56. funtów suchego lub 100. funtów mokrego krochmalu kartoflanego, a potém zarabia tenże na kłajster 150. kwartami wody wrzącej. Gdy ten ostygnie do 40—45° R. przydaje się do niego 12—14 funtów wilgotno pogniecionego siodu jęczmiennego i z tym dobrze miesza.

Po 5—10. minutach staje się masa obrzednia, ciekła a temperatura jej podniesie się o 10—15° R. dla tego przestrzegać trzeba aby się zbyt nie zagrzała. Utrzymać ją trzeba spokojnie 8—10. godzin w cieple 45—55° R., przecedzić potém przez sito lub przez płótno, osadzić męty sposobem wyżej podanym i do należytéj gęstości parować. Z 50. funtów suchego krochmalu otrzyma się 70. funtów przyzwoicie gęstego, czystego syropu.

Można także wykonać robotę takim sposobem.

W sypawszy do kociołka 10. funtów wilgotno pogniecionego między walcami siodu, poleje się tenże 45. kwartami na 30° R. ciepłej wody i po niej jakim czasie ogrzeje się do 47° R. Potém wsypie się, po trosze, 50. funtów krochmalu. Skoro temperatura podniesie się do 56° R. steżeje najprzód masa, ałe po kilku minutach znowu się przerzedzi. Wtedy zostawia się ją spokojnie przez 3. godziny w cieple 50—60° R. wynoszącém; potém doda $\frac{5}{8}$ funta na proch utartych węgli kościanych i nareszcie po niej jakim czasie przecedzi. Ciecz słodka płynąc będzie powoli ale czysta. Po odparowaniu i wyklarowaniu białkami otrzyma się 45. funtów bardzo słodkiego syropu podobnego ko-

lorem do węgierskiego wina; a więc daleko mniej jak sposobami poprzednio podanemi; ale za to syrop ten nie będzie miał smaku słodowego, jaki się okazuje w syropie innemi sposobami wyrobionym.

Spostrzegamy że wyrobiony z krochmalu syrop za pomocą siodu zawsze mniej więcej trudny jest do wyklarowania. Ostatnia robota najlepiej udać się może, jak się powiedziało wyżej, za pomocą kościanego węgla i krwi lu białka. Moznaby także robiąc na znaczną skalę, sposobem fabrycznym, użyć filtry Dumonta, której używają w fabrykach burakowego cukru do czyszczenia syropu. Ale wypadaloby do krochmalowego syropu mniej użyć węgla, a w miejsce tego piasku, bo tu idzie więcej o oczyszczenie syropu z mętów, niż o odjęcie mu brunatnego koloru.

Aby uniknąć mieszania siodzin z syropem, możnaby zamiast szrotowego siodu, użyć ekstraktu z tegoż za pomocą wody na 40—50° zrobionego, który tak samo działalby na tworzenie się cukru z krochmalu, jak siod; dyastaz bowiem bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie.

Otrzymana z krochmalu, za pomocą siodu czyli dyastazu ciecz słodka, zawsze jest mniej więcej zaklejona, co dowodzi że w niej się zawsze znajduje pewna ilość gumy krochmalnej; nie udało się dotąd tak zupełnie zamienić w cukier krochmalu za pomocą dyastazu, jak się to dokonywa za pomocą kwasu siarczanego; nie można więc myśleć o krystalizowaniu syropu za pomocą siodu wyrabianego.

**ŚREDNIE CENY ZYWNOŚCI
NA TARGACH WARSZAWSKICH I PRAGSKICH
od dnia 27. Października do 4. Listopada.**

	zł	gr		zł	gr
Żyta . korzec	10	23	Siana cietnar 100-funt:	3	25
Pszonicy —	27	2	Słomy ditto ditto	1	22
Jęczmienia —	13	14	Siana fura jednokonna	18	—
Owsa	7	10	ditto parokonna	27	—
Gryki	—	—	Słomy fura zwyczajna	16	—
Grochu polnego korzec	11	—	Szańc drzew sosnowych	43	—
— cukrowego —	15	25	Okowity 10 pr. garniec	4	10
— fasoli	32	5	Szumówki 6 pr. —	2	15
Mąki pszennej przedn:	38	13	Masła funt	—	28
— ordynaryjnej	39	2	Słoniny —	—	23
— żytniej pyłkowej	18	8	Baran	11	—
— razowej	—	—	Ciele	—	—
— gryczanej	15	5	Wieprz dobry	90	—
Kaszy jaglanej korzec	30	—	— średni	72	—
— gryczan: zwyczaj:	22	2	— lichej	54	—
— — drobnej	38	16			
— jęczmieni: perłow:	34	16	Wół dobry dukatów	16	
— — ordynar:	11	14	— średni —	13	
Kartofli korzec	3	10	— lichej —	9	