


TYGODNIK

ROLNICZO-TECHNOLOGICZNY.

Ora et Labora

Prenumerata:
W Warszawie półrocznie zł. 12 ro-
cznie zł. 24.; na Prowincyi półro-
cznie zł. 15, rocznie 30.



Vires unitae agunt

Prenumerować można po wszystkich
Urzędach i Stacjach Pocztowych,
a w Warszawie w Kantorzce Głównym
i po księgarniach.

N^o 47.

ROK SZOSTY

Dnia 22. Listopada 1840. r.

Spis rzeczy: — Rolnictwo: Niekóre uwagi nad urządzeniem gospodarstw (dokończenie). — Gospodarstwo domowe: Aparat do prania bielizny za pomocą pary wodnej. — O myciu warzywa. — Ogrodnictwo: Rabarbar używany w Anglii jako warzywo. — Zakładanie szparagów. — Rozmaitości: Nowy aparat gorzel.

Rolnictwo.

2524
II

Niekóre uwagi nad urządzeniem gospodarstw.

(Dokończenie.)

Zastanowiemy się tu jeszcze nad dwiema ważniejszymi punktami, oile zakres pisma tego dozwala.

1. Nad wynalezieniem potrzebnej ilości nawozu, dla danego gatunku i przestrzeni ziemi.
2. Nad potrzebnym kapitałem obiegowym do prowadzenia gospodarstwa.

Ziemia, tylko w ten czas wydaje plon, jaki wydać jest zdolną, gdy otrzyma ilość nawozu, jaki jej natura wymaga.

Jeżeli go bowiem otrzyma mniej, niżli go znieść może, w ówczas, jak się rozumie, nie wyda tych korzyści jakieby wydać mogła.

Jeżeli go zaś więcej jej damy, niżli go, że ak powiem, przyzwolicie strawić potrafi, wte-

dy, rola się rozrzedza, rozpulchnia, i przybiera wszelkie złe własności gruntu np. humusowego lub torfowego. W takiej ziemi, rośliny najprzód mocno vegetują, wkrótce zaś polegają, lub też różnym ulegają chorobom.

Ten przypadek często ma miejsce w bliskości miast wielkich, gdzie obfitość i taniaość nawozu, dozwala rolę corocznie gnoić; a rolnicy, zamiast uprawiania w niej tych roślin, którym zbytek nawozu mało, lub wcale nie szkodzi, corocznie zbożem ją obsiewają. — Rzadko się zaś to zdarza tam, gdzie nawóz tworzy się z produktów własnej ziemi.

Wynalezienie zatem dla każdego gatunku ziemi, właściwej mu ilości nawozu, jest jednym z najtrudniejszych w rolnictwie zadań; albowiem ilość ta, nie tylko stosować się winna do rodzaju i stosunku składowych części ziemi, ale bardzo wiele potocznych okoliczności wpływa na możność zniesienia większej lub mniejszej ilości nawozu.



Jednakże, ze wszystkich, największy nadto ma wpływ głębokość warstwy rodzajnej.

Weźmy np. że powierzchnia rodzajna jest 4 cale głęboka; że ziemia jest tego rodzaju, iż wymaga tylko 40. fur parokonných nawozu i w tym razie wydaje 9. ziarn nad siew; będąc zaś nawiezioną np. 60 furami, w ówczas zboże polega, lub przez choroby niszczyje; co dla tego ma miejsce, iż ta ilość nawozu, zbyt nie rolę rozpułchnia.

Jeżeli zaś tę ziemię zorzemy na 8 cali głęboko, rzecz jasna, iż wspomniane 60 fur nawozu, nie tylko jęj zbyt nie rozpułchnią, ale owszem, nieużyznją jęj do tego stopnia, gdzie najwyższą wydaje produkcją; nawet, chcąc ją do niego doprowadzić, wypadaloby ją nawieźć nie już 60 ale 80 furami nawozu.

A że ziemia w stosunku nawozu daje plony, przeto, rzecz naturalna, iż jeżeli ją nawieziemy np. 80 furami, raz jeszcze tyle otrzymamy z nięj produktu, co przy 40 furach.

Podług przyjętych obecnie przez agronomów zasad, należy zwrócić ziemi przez nawóz, tyle odżywnęj materyi, ile przez produkcją wydała. — Objaśnijmy bliżej tę zasadę, jedną, mogą mówić, z najważniejszych w rolnictwie.

Ile rola w pewnym lat okresie, przy przyzwotém zglębieniu i do tego stopnia użyznienia, jaki jęj natura znieść jest w stanie, wyda produktu, tyle jęj przez nawóz zwrócić należy; bez względu na to:

1o Czyli go w ostatnich latach po gnojeniu wydała lub nie;

2re Czyli w ciągu lat ostatnich, więcej wydała produktu, aniżeli go wydać była winna, albowiem;

Co do 1. Rola, nawet i podczas nieurodzaju utracza tyle, a może i więcej części odżywnych, co przy dobrém obrodzeniu.

Co do 2. Ponieważ nadzwyczajny urodzaj, bywa zwykle skutkiem wegetacyi nader sprzyjającej porze czasu.

Podług licznych doświadczeń, praktyka zgadza się zupełnie z powyższą zasadą. Lecz jak wykryć ilość nawozu, jakiej rola wymaga, do wydania największego plonu? Podług zdania naszego, rzecz tę, jedynie tylko praktyka, że tak powiem miejscowa, wyjaśnić potrafi. Takby więc postąpić należało, chcąc wykryć:

1. Ile rola znieść może nawozu;
2. Jak głęboko uprawiana być winna;
3. Jaka nastąpi różnica co do plonu, gdy zostanie bardziej zagłębioną i użyzniejszą.

Pewna przestrzeń ziemi, pod doświadczenie mającej służyć, np. $1\frac{1}{4}$ morg. dzieli się na 5 równych części:

$\frac{1}{5}$ część orze się jak zwyczajnie, i także zwyczajną ilością nawozu ugnaja. (np. w stosunku 40 fur na morg gruntu pszennego, a 30 fur na grunt żytni).

$\frac{1}{4}$ część podobnie się orze, lecz się ugnaja 15 fur, czyli w stosunku 60 fur na morg.

$\frac{1}{3}$ część orze się o 2 cale głębiej, np. na 6 cali, i ugnaja się podobnie jak poprzednia 15tu fur.

$\frac{1}{2}$ część, zorana na 6 cali głęboko, ugnaja się 20 fur, czyli w stosunku 80 fur na morg. Nakoniec.

$\frac{3}{4}$ część, orze się 8 cali głęboko i pognaja również 20 fur nawozu.

Ma się rozumieć, iż w tém porównawczém doświadczeniu;

- a. Uprawa ziemi;
- b. Czas nawożenia,
- c. Gatunek nawozu,
- d. Czas siewu, ten sam być winien. Z tą

atoli różnicą, że zagłębienie warstwy rodzajnej, skuteczniczyby należało podług zasad ku temu służących.

Jest to pewnie najłatwiejszy i najpewniejszy sposób wykrycia, ile dany gatunek ziemi potrzebuje nawozu do wydania najwyższego plonu.

Każdy kawał ziemi powinien tu wydać 4 plony w ciągu 6 lat, gdyż po ich wydaniu, po 1. nawozie, ziemia zwykle wraca do tego stanu żyzności, w jakim się poprzednio znajdowała. — Jednakże, możnaby tu różne zaprowadzić zmianowania, dla przekonania się zarazem, jaka się przez to okaże różnica co do dochodu w ziarnie i paszy.

Np.

Pierwszy i drugi oddział niechby przeszedł tę kolej:

1. Ugor nawieziony; 2. Pszenica; 3. Jęczmień; 4. Ugor czysty; 5. Żyto; 6. Owies.

Trzeci oddział:

1. Wyka na paszę w świeżym gnoju. Następnie jak poprzedni.

Czwarty i piąty.

1. Wyka na paszę na świeżym gnoju.
2. Pszenica.
3. Jęczmień z koniczyną czerwoną.
4. Koniczyna 2 razy koszona.
5. Koniczyna na pastwisko do 20 Czerwca.
6. Żyto.
7. Owies.

Pewna, iż próba takowa wymaga wiele czasu; ale też z większą pewnością można podług otrzymanych wypadków gospodarstwo urządzić. Zresztą, wszakże już pierwsze 3 lata mogą tu być dość pewną postępowania skazówką, jeżeli tylko nieprzyjemna pora czasu, nie zniweczy otrzymać się mogących rezultatów.

Wszakże nie należy się tu ślepo trzymać otrzymanego wypadku, ale raczej rozważyć gruntownie, towarzyszące mu okoliczności. Są bowiem lata tak żyzne, iż mniejsza ilość nawozu wyda bardzo wielkie plony; a na większej nieco, zboże polega, i odwrotnie. A więc, ani pierwszego, ni też drugiego przypadku nie

można uważać za zasadę, jeżeli rok był nadzwyczaj żyzny, lub też wegetacyi bardzo przeciwny.

Zresztą, w jednym czasie, powyższym sposobem można wypróbować wszelkie gatunki roli.

Jak się rozumie, do takiego porównania bierze się rola, która po ostatnim nawozie wydała już plony, jakie zwykle wydawała.

Szczególniej nowo urządzającemu gospodarstwo, radzilibyśmy powyższym sposobem przekonać się: *ile ziemia wymaga nawozu, do wydania najwyższego plonu.*

Teraz kilka słów o kapitale obiegowym.

Do prowadzenia gospodarstwa, potrzebny jest kapitał *gruntowy* i kapitał *obiegowy*. *Kapitał gruntowy* mieści się w inwentarzach, narzędziach i sprzętach rolniczych, do prowadzenia gospodarstwa potrzebnych. Stosuje się on do *obszerności* i *natury gruntu*. Wynalezienie go, wymaga pewnego stopnia znajomości rolniczych. Nie można tu na oślep powiedzieć: np. *tę sumnę przeznaczę na kapitał gruntowy; ale raczej, przed oznaczeniem go, tak rzecz rozebrać potrzeba:*

1. Rola zawiera morg. N. Do przyzwoitego jej uprawienia potrzebuję siły pociągowej N., a do utrzymania jej koni i wołów N.

2. Do użyznienia roli, potrzebuję nawozu N. Tę ilość może mi wydać liczba N. bydła rogatego i owiec. Tutaj zastanowić się wypada nad stosunkiem co do liczby i rasy jednego i drugiego rodzaju zwierząt.

Procent od kapitału gruntowego, z powodu niebezpieczeństwa jakiemu ulega, jeszcze raz tak wysoki się przyjmuje, jak od kapitału w ziemni będącego.

Kapitał obiegowy obejmuje wydatki do prowadzenia gospodarstwa potrzebne; a mianowicie: myto czeladzi, płacę najemnikom, wydatki domowe, na reperacją i t. p. Zkom-

pletowanie inwentarzy i narzędzi, wraze ich ubytku, do kapitału gruntowego należy.

Pomyślność gospodarstwa, powiększej części zawisła od wysokości kapitału obiegowego; jeżeli jest za mały, gospodarstwo nie może wydać korzyści, jakiego wydać mogło; będzie ono co chwila paraliżowane, ponieważ mu zbywać będzie na środkach, do uskutecznienia każdej rzeczy w właściwym jej czasie.

Ze znacznej liczby, w różnych czasach upadłych gospodarzy, najwięcej się znajduje takich, którzy, albo nie posiadali potrzebnych do tego *znajomości*, lub *kapitału obiegowego*. Niedostatek bowiem onegoż, najgorsze za sobą pociąga skutki; a mianowicie: nieuskutecznienie prac rolniczych w swoim czasie. — I tak np.:

Kto nie ma kapitału na najemnika do żniw, utracą znaczną część plonów przez przejrzenie

i okruszenie się najlepszego ziarna; prócz tego opóźnia się w uprawie roli i w siewie, a ztąd w następnym roku straty częstokroć znaczne.

Kto nie ma gotówki, musi w razie potrzeby sprzedawać za bezcen produkta; a natomiast wysoko kupować potrzebne do gospodarstwa przedmioty.

Podług Sturma, kapitał obiegowy powinien być tak wysoki, aby na cały rok pokrył wszelkie wydatki gospodarskie, tak, by sprzedaż żadnego produktu nie miała miejsca z potrzeby, ale następowała w ten czas, gdy do prawdopodobieństwa, do najwyższego doszła stopnia.

Wysokość tego kapitału łatwo się da ustawić, skoro plan gospodarstwa, obejmujący wszelkie prace i wydatki, sporządzony zostanie. Wszakże i on stosuje się do obszerności i dobroci roli.

Gospodarstwo domowe.

Aparat do prania bielizny, za pomocą pary wodnej.

Baron Layer, wydał w języku francuzkim dziełko, pod tytułem: *»O praniu parą wodną«* z dołączeniem opisu, potrzebnego do tego aparatu.

Aparat ten — mówi pewien gospodarz — jest tak prosty, iż go domowemu bednarzowi zrobić kazałem, celem wypróbowania wynalazku; w mniemaniu, iż gdyby zastąpił zwyczajne pranie, stałby się rzeczywiście nader użytecznym. Próba przeszła wszelkie moje oczekiwania.

Aparat ten składa się z kociołka dowolnej objętości, i naczynia okrągłego drewnianego, bednarzkiej roboty, które wstawia się wręczony kociołek. — W spodzie naczynia są 4 otwory na cal w średnicy, przez które przechodzi do niego para z kociołka; wierzch, szczelnie wiekiem zamknięty.

Pierwszy aparat obejmował tylko 20 funt. bielizny; ale przekonawszy się o jego istotnych zaletach, tak pod względem taniości prania, wygody, a mianowicie szklniącej białości wypranych przedmiotów, kazałem go zrobić do 80 funtów bielizny. Naczynie drewniane, dostawił mi bednarz tutejszy za złotych 12.

Postępowanie jest takowe:— Do 80 funt. brudnej bielizny, rozpuszcza się 4 funty węgla sody krystalizowanego (a) (natrum subcarbonicum crystallisatum) w 100 funt. zimnej rzecznej (lub innej miękkiej) wody, w naczyniu drewnianem, wyżej opisanem; (po należytem zatkaniu czopikami wspomnianych 4 otworów). Po rozpuszczeniu się sody, zamoczywa się w tejże wodzie każda sztuka oddzielnie, i po należytem przesiąknięciu, składa się na kupę. Wymieniona ilość wody starczy zwykle do zamoczenia powyższym sposobem, 80 funt. brudów.

Zamoczona bielizna składa się napowrot do wspomnianego naczynia, przykrywa się jak poprzednio drewnianem wiekiem, i takowe obciąża się kamieniami, aby będąca w bieliznie wilgoć, tém zupełniej wszystkie jej części przesiąknęła; w tym stanie zostaje przez noc.

Na drugi dzień, nalęwa się do kociołka 36 do 40 kwart wody zimnej, stawia się na niego opisane wyżej naczynie, szpara pomiędzy tymże a kociołkiem oblepia się ciastem kwaśnem, które, dla tém więkšej nieprzenikliwości pary, oblepia się jeszcze paskami papierowemi, a te zwyczajną gliną.

W rzezone 4 otwory wtykają się 4 stosownej grubości pręty, do wierzchu naczynia sięgające; tworzą one jak gdyby 4 oddziały w naczyniu; w te oddziały kładzie się bielizna poprzednio zamoczona, sztuka po sztuce; gdy już wszystka się w niem znajduje, wyjmują się rzeczonne pręty, naczynie nakrywa się wiekiem najszczelniej przyrządzonem, i podobnie jak spód onegóż, oblepia się ciastem, papierem i gliną.

Miejsca nieco próżne, po wyjęciu prętów pozostale, służą do ułatwienia obiegu parze. Namienić należy, iż pomiędzy bielizną a wiekiem, należy zostawić miejsce próżne na 4 — 5 cali wysokie.

Gdy aparat tym sposobem został przyrządzony, podnieca się pod kociołkiem mocny płomienisty ogień i bielizna przez 1½ godz. gotuje się w parze. — Poczem, ogień się gasi, i aparat zostawia w spokojności przez kilka godzin. — Po upływie których, bielizna wyjmuje się z aparatu i dwa razy się płóczy, jeżeli można w wodzie rzecznej; jeżeli nie, w czystej bieżącej, lub nakoniec w studziennej.

Zdarza się czasami, iż niektóre sztuki mocniej zbrudzone, zatrzymały jeszcze tu i ówdzie jaką cząstkę brudu; one więc należy nieco rękoma przetrzcć, i tém staranniej przepłukać.

Dodać tu jeszcze wypada, iż: bynajmniej bielizny nieuszkadza, i że bielizna jak śnieg jest biała. Słowem, korzyści tego sposobu prania są tak wielkie i widoczne, iż życzyć należy aby wszędzie upowszechniony został, nie tylko bowiem oszczędza się tu czas i mydło, ale nadto, bielizna tym sposobem myta, zapewne z 10 lat dłużej potrwa, aniżeli zwyczajnym sposobem prania. Zresztą przy ogniu do rozgrzania wody potrzebnym, można zarazem i obiad ugotować

G. H.

O myciu warzywa.

z Przew. rol. przem.)

Dotychczas używany sposób mycia warzywa, za pomocą bębenka kraciastego, który wraz z nasypaniem warzywem kładł się na naczynie napełnione wodą, obracał i po wymyciu znowu zdejmował, aby oczyszczone wysypać i świeżemu miejsce zrobić, jest utrudzający, jak każdemu wiadomo. Pan Chapenois, Francuz, złożył bardziej odpowiadającą celowi machinę, do tego samego użytku. Składa ona się z skrzynki czyli fassy, w którą się leje

(a) w Warszawie kosztuje funt zł. 1. gr. 8.

woda; na niej obraca się bęben z łaat, który mieć musi obwód większy od strony korby, takiż od obwodu przy stronie kosza, i do tego w środku, przegrodę z łaat do wpołowy. Gdy się wsypie warzywo do kosza, samo przepada do środka bębna, gdzie się myje przez obrót korby, a posuwając się ku stronie korby, wypada już wymyte w podstawiony kosz, lub inne naczynie. Gdyby zaś niedosyć czy-

ste wypadało, obróci się tylko w tył parę razy korbę, a przez dłuższe zatrzymanie w wodzie, zupełnie czysto wymyte, wypadać będzie. To postępowanie ma tę dogodność; iż bez przerwy sypie się warzywo w jeden koniec bębna, które samo bez pomocy ludzkiej wychodzi drugim. Ten wynalazek już jest po większej części znany w wielkiem księstwie poznańskim.

Ogrodnictwo

Rabarbar, używany w Anglii jako warzywo.

Długi czas używano w Anglii soku, wyciśnionego z zielonych liści rabarbaru, do wypiekania pewnego gatunku ciast, które ulubionym jest przysmaczkiem wszystkich klas mieszkańców tego kraju. Obecnie zaś, liście rabarbarowe, stały się najpiérwszym warzywem, nie tylko już w Anglii, ale także i w Szkocyi północnej. — Furami wożą je na wszystkie targi miast cokolwiek ludnych. — Żeglarze ubiegają się o nie, albowiem przekonano się, iż gotowane i zakiszone, są dzielnym środkiem przeciwko skorbutowi. — Dla tego to, uprawa téj rośliny w Wielkiej Brytanii, a nawet i w Ameryce północnej, olbrzymim szerzy się krokiem.

Nasienie rabarbaru jest trójgraniaste. Roślina ta, mianowicie w gruncie żyznym, daje nader wiele liści, które po zebraniu szybko odrastają.

Do użytku kuchennego uprawiają obecnie następujące cztery gatunki:

1 *Rheum rhaponticum*; pochodzi on z Azji, lecz od r. 1573 w Europie jest już znany. — Liście ma gładkie, nieco bręgowane, trzonek liścia czerwony. — Do soku na pieczywo bierze

się tylko trzonki listków; liście zaś same zakwasza się na zimę, lub się na okręta sprzedaje.

2. *Rheum undulatum*; sprowadzony z Chin w roku 1734.

3. *Rheum hybridum*. Pochodzi z Azji od r. 1788; ma liście wielkie, kształcie serca; trzonki ich są długie 4 — 5 stóp. — Jest on soczystszy od Nr. 1.

4. *Rheum undulatumma*. Różni się od Nr. 2. przez to, że nader wczesnie na wiosnę vegetuje, a nawet można go hodować i w piwnicy, w której ogrodowi uprawiają szampiniony; lub też nakoniec i na otwartém powietrzu (w Anglii), podobnie jak kapustę morską. Ten gatunek, nawet w piwnicach wyhodowany, zatrzymuje właściwy mu czerwony kolor trzoneków.

Do aptek używa się 5ty gatunek téj rośliny, *Rheum palmatum*, z Tataryi sprowadzony. Liście ma kształtu ręki; korzenie suszone, używany jest czasami w medycynie w miejsce rabarbaru rosyjskiego.

Wszystkie te gatunki rozmnażają się w części przez nasienie, w części przez korzenie.

Nasienie sadi się na wiosnę rzędami dość gęsto, w ziemię lekką lecz dobrze użyzniąną; skoro zaś roślina może być flancowaną, przesadza się na rolę dobrze uprawioną, na stopę

dena od drugiej. — Przed zimą można ją raz jeszcze przesadzić. — Zwykle obsadzają się nią chodniki w ogrodach.

Nie tylko w Anglii, ale już i w Niemczech uprawiają tę roślinę na warzywo. Według p. Geitnera, Rabarbar zaprzestaje na gruncie lekkim, znosi bardzo dobrze naszą zimę; owszem pewniej rośnie w zimnym, niż w ciepłym klimacie; nadto nie wymaga bynajmniej wiele zachodów.

Zresztą jest to roślina tak piękna, iż w wielu ogrodach uprawiają ją dla ozdoby, w oddzielnych kłębach na trawnikach. Odznacza się bowiem szczególniej przez wysokie i szerokie liście koloru ciemno zielonego, nadktóremi wznoszą się bujne kiście, szklniąco białym kwiatem okryte; nakoniec, czerwone trzonki liści i tegoż koloru łodyżki kwiatowe, przedstawiają zdala jakby czerwone naczynie, ukoronowane kwiatami zielonemi i białemi.

Roślina ta jest wieloletnia. — Dla miłośników szparagów ztąd jest ważną, iż trzonki jej liścia mają smak do tychże nader podobny. Można je zas posiadać bardzo wczesnie na wiosnę, tym sposobem: Skoro roślinność poczyna się ożywiać, wtedy 4 — 5 letnie kierzki rabarbaru nakrywają się beczułkami, na które sypie się nieco ziemi, lub co lepiej, okrywają się one grubym końskim nawozem. Wkrótce roślina poczyna mocno wegetować i puszcza tyle liści, iż z jednego już tylko kierzka można zebrać zdatnych do użycia łodyżek, czyli trzonków, przeszło funt I. — Dodać tu wypada, iż w ten czas dopiero się one zrzynają, gdy sam trzonek 5 do 6 cali jest wysoki, a na końcu onegoż utworzony kłęb liściowy, poczyna się rozwijać. Kłęb te odrzynają się, a tylko same trzonki służą do użycia. Dostyć jest sparzyć je wodą wrzącą i zaprawić podobnie jak szparagi.

Byle tylko nie były one zbierane z kierzków zbyt młodych, bynajmniej to roślinie nie

szkodzi; jednakowo, należy zawsze zostawić pewną liczbę rzeczonych pędów, a mianowicie środkowych.

Nasiona tej rośliny dostać można w *Planitz* pod *Zwischau* w Saksonii, pod adresem tamiecznego *Towarzystwa ogrodowego* (An. dem Gartenverein zu *Planitz* bei *Zwischau* in *Sachsen*). Cena nie podana.

Zakładanie szparagów.

Szparagi (*asparagus officinalis*), roślina wytrzymała na nasz klimat, przy starannem pielęgnowaniu, utrzymuje się do lat 12; a po tych upływie, mimo usilnych zabiegów gospodarza, maleje. Wiele jest wyborowych gatunków szparagów, które wszystkie prawie zależą po większej części od własności ziemi, w której sadzonymi bywają.

Nie można jednak być obojętnym w wyborze gatunku. Ażeby z wyborowego gatunku przesadzone flance, zatrzymały swą dobroć, trzeba im dać podobny skład i położenie ziemi, na jakiej pierwotnie wzrastały. Za najlepszy pod szparagi nawóz uznano popiół, w małej ilości wapno, odchody zabitych lub upadłych zwierząt, a nadewszystko urynę.

Łatwo, i bardzo prędko przyjść można do dobrych szparagów, jeżeli się już ma zakład, który przez starość zaczyna niszczyć. Odkopują się kierzki, i ostrożnie odłączają wyrostki, bez uszkodzenia korzonków, razem powikłanych, i pojedynczo na nowo w inne miejsce przesadzają. Tym sposobem założone szparagi, po 2ch a najdalej 3ch latach, mogą być wyrzynane, kiedy z nasienia, ledwie za lat 5 mogą być użyte.

Wykopując stare krze szparagów, spostrzegamy, jak wszystkie korzonki rosną ku wierzchołowi, co nas oczywiście przekonać powinno,

że ciągną pożywność z nawozu, który 15 cali głęboko w dole utopiony. Szparagi płytko sadzone, corocznie małą tylko posypane ilością ziemi zmieszanej z tłustym nawozem zwierzęcym, rosną sporzej i grubiej, aniżeli te, które były głęboko założone.

Na nowo założyc się mające szparagi, wybiera się ziemia lekka piaszczysta, dobrze namierzwiona, wilgotna, ale nie mokra; ta się rydlem skopie głęboko, i czysto obierze z wszelkich chwastów, korzonków, jako też i pέρzu; potem w odległości półtory stopy na wszystkie strony, robią się dołki głębokości rydla, wsadzają flance od starych krzew odjęte, 3 cale nad oczko przysypują się ziemią, i nakoniec całe zagonki grabiami równają.

Na zimę, przykrywają się słomiałą mierzwą, lub też samą słomą, aby tym wcześniej na wiosnę wzbudzić vegetacją. Każdej wiosny następnej, wyjąwszy pierwszej, sypie się na każdy zagon od 1 do 2 cali grubości ziemi, zmieszanej z przegniłą mierzwą zwierzęcą.

Po trzech dopiero latach od sadzenia, można grubsze szparagi, bez uszkodzenia, wyrzynać.

Każdej jesieni wykarczują się łodogi, a nie obrzynają, a to aby ściernie niezostało w ziemi.

Stolarz w pewnym francuzkiem miasteczku,

ma podobno największe produkować szparagi, i chociaż odległy od Paryża o 70 godzin, sprowadza je jednak do tej stolicy i płacą mu za sztukę 1 sou (4 $\frac{7}{8}$ fenig). Sposób jego pielęgnowania szparagów jest następujący: Sieje nasienie (pospolicie) holenderskie, na początku wiosny, na zagonie spalchnionym, dobrze wymierzonym mieszaniną, złożoną z ziemi i mierzwy.

Po trzech latach, w miesiącu Wrześniu, wyjmuje flance i w wykopane rowki, 1 stopę głębokie, 1 stopę szerokie i 3 stopy odległe, napelnione mieszaniną z mierzwy i ziemi do wysokości 3ch cali od powierzchni, sadi w prostej linii na 1 stopę odlegle jedna od drugiej, i przysypuje tąż mieszaniną. Nie wyrzyna przedziej młodych szparagów, dopóki nie dojdą grubości przynajmniej pół cala w średnicy, co się zwykle zdarza drugiego roku po zasadzeniu; łodogi z wypuszczonych szparagów wykrcą dopiero w Marcu, to jest, w czasie, gdy zagonki szparagowe kopie na pół rydla głębokości. Co dwa lata mierzwi swoje szparagi dobrze przegniłym zwierzęcym nawozem, i piele je przez całe lato, wyrwijac wyrostki szparagów, które się między rządka mi pokazują. Jego szparagi są koloru zielono-fioletowego.

Rozumności.

Nowy aparat gorzelany.

P. Siemens, professor przy instytucie gospodarstwa wiejs. w Hohenheimie, przed niedawnym czasem zbudował aparat gorzelany, który nawet z gęstego kartoflanego zacieru, *ciągle*, czyli *bezustannie*, wódkę, lub okowitę, podług upodobania, destyluje.

Jest on tak prosty, iż kosztuje za ledwie połowę tego, co inne aparaty; a około $\frac{1}{3}$ części aparatu pistoryusza, równych wymiarów.— Główna onegoż korzyść polega na największej oszczędności opału.— (Bliższy opis tego aparatu może później nastąpi, gdyż obecnie p. Siemens stara się o patent wynalazku. Red.)