

TYGODNIK ROLNICZO-TECHNOLOGICZNY.

Ora et Labora

Prenumerata:
W Warszawie półrocznie zł. 12 ro-
cznie zł. 24.; na Prowincyi półro-
cznie zł. 15, rocznie 30.



Vires unitae aquum

Prenumerować można po wszystkich
Urzędach i Stacjach Pocztowych,
a w Warszawie w Kantorze Głównym
i po księgarniach.

N^o 49.

ROK SZOSTY

Dnia 6. Grudnia 1840. r.

Spis rzeczy: — Rolnictwo: O nawożeniu roli prochnicą łąkową. — Gospodarstwo domowe: O użyciu pary do gaszenia pożaru w miejscach zamkniętych. — Budownictwo: Nowy sposób powiększania siły belek. — Ogrodnictwo: Sposób powiększania rodzajności sliw. — Rozmaitości: Jeszcze słowo o przemiańnię owsa w żyto. — Nowy i olbrzymi rodzaj jedwabników. — Koniczyna olbrzymia.

Rolnictwo.

O nawożeniu roli prochnicą łąkową.

Znany jest czytelnikom pisma tego Dr. Szprengiel jako biegły chemik, praktyczny agronom i wydawca nader ważnego ekonomicznego pisma. — Temuż agronomowi podano do rozwiązania pytanie, dotyczące używania roli prochnicą łąkową (moder) czyli czarnoziemem torfowym, z torfem pomieszczanym, którego próbkę do rozbioru nadesłano. Pytania te, wraz z odpowiedzią Dr. Szprengla, są następujące:

1. Jak mocno rolę lekką należy nawozić prochnicą, czyli czarnoziemem, którego próba się dołącza? Czyli na roli słabej, świeżo tymże nawiezionej, można uprawiać rzepak zimowy, groch i kartofle; lub też do nawozu tego dodać jeszcze wypada inne ciało, by otrzymać wymienione płody; w razie ostatnim, jakiego rodzaju ciała te być winny?
2. Celem poprawienia fizycznie roli, czyli powiększenia jej własności wilgoci zatrzymującej, za pomocą tejże prochnicy, ileż jej dać należy np. na mórę ziemi, bez uszkodzenia rodzajności gruntu?
3. W jakim czasie okresie, przedsiębrać należy powtórne nawiezienie ziemi prochnicą; oraz czyli pomiędzy jednym a drugim nawiezieniem, należy rolę marglować; a mianowicie, gdy po ostatnim jej nawiezieniu rzezoną prochnicą, warstwa rodzajna zagłębiona została?
4. Po nawiezieniu nią roli, możnaż wozic na nią gnój koński, bydelny i owczy, poprzednio z prochnicą umieszczony?; nie zostanież przez to osłabioną własność nawozów zwierzęcych, przeistaczania prochnicy kwaśnej, na łagodną?
5. Nie byłobyż stosowniej i taniej, gdyby się takowa przed wywiezieniem na rolę, przeistoczyła w łagodną, przez umieszczanie jej

z nawozami, lub wapnem gryzącém? i ileżby w tym razie należało użyć jednego lub drugiego?

Na poprzednie pytania, Dr. Szprengiel w ten sposób odpowiedział:

Co do 1. Chcąc na roli słabej i suchej, prochnicą łąkową nawiezioną, uprawiać rzep, groch i kartofle, tedy poniekąd przesadzić tu nią nie można; albowiem, niechby tym sposobem udzieliło się roli 6 i więcej proc. kwasu humusowego, nie tylko nie stałby się on wymienionym roślinom szkodliwym, ale owszem naderby im służył. — A nawet, gdyby wiele zawierała *nadkwasu żelaza*, nieszkodziłby on wspomnianym roślinom, ponieważ w gruncie suchym, nawet i w ten czas, gdyby prochnica została przyorana na 5 do 6 cali głęboko, rzeczoną *nadkwas żelaza*, szybko by się zamienił na *niedokwas żelaza*.

Co do 2. Celem powiększenia siły ziemi zatrzymywania przy sobie wody, rolę słabą można nawieść i 300 furami prochnicy po 44 stóp kub. (około 2,600 funt, czyli dobra parokonna fara) na morg mag. Jednakowoż, nie radzę tego czynić od razu, ponieważ tym sposobem prochnica nie dałaby się dobrze z ziemią umieszczać. Na raz można jej dać 100 do 120 fur wspomnianej objętości na morg magd. (wypada około 220 do 270 fur. parokon. na morgpol.)

Co do 3. Bez wątpienia byłoby bardzo dobrze gdyby rola po nawiezieniu prochnicą, marglowaną została; gdyż w tym razie, otrzymałaby wiele ziemi wapiennej, zapobiegającej ulotniania się części, z rozkładu zawartych w niej ciał organicznych pochodzących. W tym przypadku, drugie nawiezienie nastąpićby winno po marglowaniu.

Co do 4. Skoro nawóz zwierzęcy umieszczany z prochnicą, wozu się na rolę, tymże ciałem (prochnicą) świeżo nawiezioną, wtedy części gnojowe nie działają już na rozkład prochnicy na roli będącej, ponieważ wywiązany z nich

ammoniak, połączył się już z kwasem humusowym, znajdującym się w tej prochnicy, z którą gnoj umieszczany był; a innego ciała, któreby rozkładało szczątki istot organicznych, w prochnicy zawarte, nawóz zwierzęcy nie posiada.

Co do 5. Nie podpada wątpiwości, iż prochnica, pomieszana z wapnem i nawozem zwierzęcym, leżąc czas niejaki w kupach, lepiej się przygotowuje na pokarm roślinny, aniżeli gdy te ciała oddzielnie na pole są wywiezione. W kupach bowiem, mianowicie wilgnych, powstaje ciepło, które wiele się przyczynia do rozłożenia szczątków organicznych w prochnicy zawartych; prócz tego, ciała te, będąc z sobą umieszczone, dokładniej niżli w roli, wchodzą z sobą w styczność, i mocniej wzajemnie na siebie działają.

Wprawdzie, zwożenie na kupę prochnicy, wapna i gnoju, ich przerabianie i zlewanie, pociąga za sobą niejaki koszt, lecz lepszosc otrzymanego tym sposobem gnoju, sownie je zwraca. — Nawozu zwierzęcego, nie można do tej mieszanki za nadto dodać; ale częstokroć stosunki gospodarskie radzą tu ostrożnie z nim postępować. — Dodanie zaś wapna stosuje się do natury prochnicy; więcej się go daje gdy zawiera wiele ciał organicznych, nie zupełnie rozłożonych, niżli w przeciwnym razie.

W ogólności, dodanie nawozu i wapna, powinno się tu stosować do ilości *żywicy woskowej*, (wachsharz) jaka się w prochnicy mieści; ponieważ ciało to, najmocniej rozkład jej wstrzymuje. — Jednakowoż, w każdym razie, można tu dodać tyle wapna, aby po należytem nawiezieniu roli tą mieszaniną, wypadło na morg mag. 20—25 cent. wapna czystego.

Dodać tu należy, iż skutek wapna zawisł jedynie od mniejszej lub większej obecności szczątków ciał organicznych; tudzież od ciał mineralnych, jakie prochnica zawiera. — Tak np. przysłana mi do rozbioru, mieściła w sobie, w stanie dobrze

wysuszonym, w 100,000 funt. następujące ciała:

Krzemionki i ziarenek piasku kwarcowego	funt. 1,860.
Węglań wapna	— 5,908.
Węglań magnezyi	— 226.
Glinki	— 9.
Fosforanu wapna	— 8.
Węglań potażu	— 33.
Gypsu	— 1,640.
Niedokwasu I. i II. żelaza	— 1,736.
— manganu	— 136.
Kwasu humusowego	— 17,700.
Humusu zwęglonego i szczątek roślinnych	— 65,550.
Wosku i żywicy	— 2,660.
Ciał organicznych, gaz saletrorodny zawierających	— 2,000.
Razem funt. 100,000.	

W końcu dodać tu wypada, iż następująca mieszanina daje nader żyzny kompost dla wszystkich roślin służący:

1. fura parokonna dobrego (niesłomiastego) końskiego gnoju;

25. fur prochnicy łąkowej;
1. beczka wapna gryzącego.

Najprzód rozpościęra się warstwa prochnicy na stopę wysoko, na nią rozścięla się gnój również na 1. stopę wysoko; znowu warstwa prochnicy podobnięż jak pięrwsza; winna ona pokrywać brzegi gnoju; pęcżem posypuje się kupa wapnem, małą ilością wody zwilżonęm; na które, znowu się kładzie na przemian prochnica i wapno; a całą kupę zamyka prochnica. — Wszystko utrzymuje się w stanie średnio wilgotnym, najlępięż za pomocą gnojówki.

Po 4—6 miesiącach, kompost ten o wiele jest skutecznięszym od samęj prochnicy.

Wprawdzie możnaby użyć do tego, kompostu gnoju owczego; jednakże koński dla tego jest tu skutecznięszym, iż więćej zawiera amoniaku.

Gospodarstwo domowe.

O użyciu pary do gaszenia pożaru w miejscach zamkniętych.

W roku 1838. p. Picard podał Akademii paryżkięj rozprawę o użyciu pary do gaszenia pożarów. Projekt ten nie znalazł aprobacyi, wyznaczonych do rozpoznania go Inżenierów; być może dla tego, że znając, iż w niektórych zakładach parowych, używają strumienia pary do wzmożenia ognia, mniemali że takowa nie może w jednych przypadkach ognia gasić, a w drugich go wzmacać; zatęm, że musi wywrzęć na pożar wpływ całkiem inny, jakby się

spodzięwać należało podług zdania p. Picarda.

Tym czasem, zdaje się, iż w pewnych okolicznościach, z korzyścią można użyć pary, do celu w mowie będućego; jak się to okazuje z następującego pisma, które p. Collandon w Genewie przesłał p. Arago.

»Wspólnie z p. Duchesne — mówi p. Collandon — wystawiłem w Awinionie fabrykę marzanny — krapu, — w której, wiele nowych odkryć doświadczaemy. Siłę dostarczają dwa parniki, każdy o sile 18 koni, które pęcżas biegu fabryki, dzień i noc są w czynności.

Bliskie położenie tychże parników przy suszarni marzanny, nasunęła nam myśl użycia pary

do gaszenia na przypadek pożaru. — Tym końcem wyprowadziliśmy z jednego kotła do téjże suszarni rury, któremi w razie potrzeby, para mogłaby być do niéj wprowadzoną.

Suszarnia w mowie będąca, zawiera 117 metrów kubicznych przestrzeni; jest sklepiona, w suficie ma dymnik, 40. centimów, w średnicy; powietrze napływa do niéj tylko otworami dolnemi.

Dla doświadczenia czyli para wodna rzeczywiście zdoła przycisnąć wścieżyły pożar, zawiesiliśmy tu rusztowanie z lasami, mające powierzchnię 8 metrów kwadr. na 2 łokcie od spodu; na którym rozpostarto przeszło 40 funt. dobrze wysuszonych wiórków sosnowych. Zostały one zapalone jednocześnie w kilku miejscach od spodu. Zaledwie drzwi suszarni zostały zamknięte, płomień wzniósł się aż do sklepienia, i wybiegał będącym w niém dymnikiem. — Teraz puściliśmy parę do suszarni; natychmiast płomień widocznie się zmniejszył, a w mniej niż dwóch minutach, zdawał się być zupełnie przygaszonym.

Tymczasem, dłużej nie mogliśmy już pary puszczać, ponieważ rury oneż prowadzące, przypadkowo uszkodzone zostały. Wtym, kiedyśmy się tego najmniej spodziewali, przytłumiony płomień począł się wzmagać i szybko po całym rusztowaniu szerzyć. Teraz obawa była nie mała; ale szczęściem rury zostały sporządzone i puszczone para, w przeciągu 10. minut całkiem płomień zgasła.

Przy tém doświadczeniu przekonaliśmy się, iż para mocny nawet płomień, nader szybko gasi; ale, że do zgaszenia zarzających się węgla, stosunkowo znacznie więcej czasu wymaga. Ujście kurka, któremu puszczonej była para, miało 0,03 cent. średnicy.

Przy drugim doświadczeniu, gdzie para wybiegała 0,01 cent. ujściem, w prawdzie równie szybko stłumiła płomień, lecz do zupełnego

zagaszenia zarzającego się drzewa, potrzeba było 20 minut czasu.

Przekonaliśmy się także, że para prędzej gasi gorejące ciała wegetalne, aniżeli palące się tłuszcze. Tak naprzykład, zapalone na próbę w suszarni świece, bardzo dobrze paliły się jeszcze w ten czas, gdy gorejące wióry i łaty, zupełnie przygaszone zostały.

Skoro fabrykę naszą zupełnie urządzimy, będziemy jeszcze w niéj czynili podobne doświadczenia i o skutku nieomieszkamy Pana zawiadomić. — W fabrykach marzanny, dosyć często zdarzają się pożary, albowiem skoro korney téj rośliny mocno wyschnie, tak łatwo wówczas się zapala, iż nawet w suszarniach, najlepiej urządzonych, nie zawsze można zapobiedz pożarowi. — Zwyczajnie przytłumia się wkrótce ogień, przez zamknięcie przystępu świeżemu powietrzu, czyli przez zatkanie otworów, któremi napływa; lecz przez to marzanna wiele traci na dobroci. — Gdyby zatem para okazała się stosowną do gaszenia podobnych pożarów, przekładałoby ją tu należało nad wszystkie inne środki; najprzód, ponieważ marzannie nie szkodzi, powtóre, ponieważ w sposób nader łatwy, gdyż tylko przez otwórczenie kurka, płomień gasi.

Para potrójnym sposobem gasi ogień:

1. Wypędzając powietrze z miejsca, gdzie się pali.
2. Tamując napływ świeżemu powietrzu.
3. Zgęszczając się na ciałach, płomieniem nie zajętych, utrudza ich zapalenie.

Szkoda iż dotąd poniekąd wcale nie używano tego środka do gaszenia pożarów tam, gdzie w pewnych okolicznościach, z korzyścią mógłby być użytym. Tak możnaby go użyć w niektórych częściach przędzarni, szczególniej w miejscach do trzepania lnu przeznaczonych, gdzie tak łatwo ogień powstaje, a które zwykle się

znajdują w bliskości parowników; również z korzyścią użyćby jej można i na okrętach parowych i wszędzie, gdzie tylko parniki się znaj-

dują, i gdzie pożar może wybuchnąć w miejscu, do którego przystęp łatwo być może zamknięty.

Budownictwo.

Nowy sposób powiększania siły belek.

Wynalazek Nadradcy budowniczego Laves w Hanowerskiem, nadawania belkom większej trwałości i siły do zniesienia większych ciężarów, przez rozłupywanie i rozsadzanie klinami, (w sposób niżej opisany), zastosowany został w zeszłym roku przy budowie gmachu dla Instytutu głuchoniemych w Lipsku. — Pismo w Dreźnie wychodzące, tak się w tej mierze wyraża:

»Wspomniona budowla zawiera w parterze 3 wielkie salony po 22 stóp szerokie, nad którymi znajdują się dość obszerne sale, przeznaczone do nauki i sypiania. Chcąc zapobiedz szkodliwemu uginaniu się belek, wypadało dać na rzeczonej parter belki dubeltowe, połączone żelaznemi szrubami. W miejsce tychże, więcej niż o połowę od zwyczajnych droższych, użyto belek podług wynalazku Lavesa; przez co nie tylko osiągnęła się potrzebna niegiętkość, lecz nadto, znacznie się kosztów oszczędziło.

»Takich belek jest tu 24; każda 24. stóp długa, 12. cali wysoka, 10. — 11. cali szeroka. — Belka podług wynalazku Lavesa, tym sposobem się przyrządza, czyli mówiąc właściwie, mniej uginalną czyni. Przerzyna się ona podłużnie na 2 nierówne części, to jest, jedna połowa, na spód przypadająca 5. cali, a druga, wierzchnia 7. cali jest wysoka; nie rozryna się przecież aż do samych końców, ale raczej po 2. stopy od każdego z nich, zostaje w całości.

»Na każdy koniec belki, w miejscu gdzie się rozerznięcie kończy, daje się obręcz żelazna, około 2. cali szeroka, a $\frac{1}{2}$ cala gruba; a to, celem zapobieżenia rozłupaniam się belki podczas rozsadzenia jej klinami. — Po założeniu obręczy, rozsadza się belka klinami aż do 9 cali w świetle; tworzy więc dwa obłęki, których wysokość od spodniego brzegu do wierzchniego, wynosi 21. cali. Prócz średniego klina, każda belka otrzymała jeszcze po 4, w równej od siebie odległości; nie zostały one tu niczem przytwierdzone, gdyż przez samo ciśnienie rozprężonego drzewa, dostatecznie się w miejscu umocowały.

»Zanim też belki na miejsce ich przeznaczenia zaciągniono, porównano jedną z nich ze zwyczajną belką tychże samych rozmiarów, i ile sądzić było można, równie mocnego drzewa. Wypadek był takowy: belka podług nowego wynalazku przyrządzona, pod ciężarem 21. cent. na przestrzeni 3 — 4 stóp kw. rozłożonych, ugięła się na 3 linie; kiedy zwyczajna belka, pod tymże ciężarem, przeszła na cal (12 linii) się wyprężyła. Po zdjęciu ciężaru, obie belki wróciły do właściwego położenia.

»Przyrządzenie belki podług Lavesa nie jest bynajmniej trudne, ani kosztowne. — Koszta, jakie się okazały przy budowie w mowie będącej, są następujące:

1. Belka czterokantowa sosnowa 24 stóp długa 12. cali wysoka i 11. cali szeroka zł. 30.
5. Klinów pomiędzy obłękami — 1. gr. 6.

2. Obręcze żelazne po 6. zł. — zł. 12.
 2. Ludzi dziennie do przerznięcia belki i do założenia obręczy i rozsadzenia klinami . zł. 6. gr. 24.

Razem zł. 50.

»Gdyby zaś w miejsce tychże belek zostały użyte tak nazwane składane, jedna belka ko-

sztowałaby, jak następuje :

2. Belki podług powyższej ceny zł. 60.11
 3. żelazne bolce ze szrubami zł. 18.
 2½ dnia roboty po 3 zł. gr. 2, — 8. gr. 6.

Razem zł. 86. gr. 6.

A zatem, pierwsza belka przychodzi taniej o 36. zł. gr. 6.«

Ogrodnictwo

Sposób powiększenia rodzajności śliw.

Znając, jak mocno odchody ludzkie na roślinność działają, chciałem się przekonać, czyli używanie niemi drzew owocowych, nie wywrze na ich rodzajność podobnego wpływu.

Tym końcem, odkopałem darń z pod dwóch tak już starych śliw, iż niemal wcale nie rozdziły; i pod każdą dałem pewną ilość odchodów ludzkich, rozdzielwszy je równo do koła pnia. — Skutek był zadziwiający. Owe drzewa, które, bez tegoż użyzienia, w lat parę byłyby zapewne uschły, dziś, po upływie lat 18. nie tylko żyją, ale corocznie obficie rodzą.

Zaraz następnego roku po opisanej próbie, poczynały puszczać nowe pędy; liście nabyły koloru ciemniejszego, i cała postawa drzewa inną przybrała postać; słowem, owe dwa starce, tak widocznie odmłodnieli, iż w następnym roku, zrównali się o lat kilkanaście młodszym od siebie.

W następnym roku w jesieni, powtórzyłem toż doświadczenie z 12. innymi starymi śliwami; skutek był taki, iż wszystkie gałęzie musiałem podeprzeć, inaczey; z obfitości owocu, niezawodnie byłyby się połamały.

Przekonanie więc co do drzew starych było dostateczne. Teraz chciałem się dowiedzieć czyli

nawóz ten dla młodych drzewek nie będzie za nadto silny. Wybrałem więc 15 młodych śliw, które najnudziej stały, i tym sposobem użyzniełem: i one w prawdzie bardzo wybujały, przecieź nie tyle, by to im zaszkodzić mogło.

Odtąd z 200 śliw, które posiadam, ⅓ część corocznie tym sposobem użyznieam i corocznie najobfitszy zbieram plon tego owocu, kiedy sąsiedzi moi, mniej więcej na nieobrodzenie się skarżą, a dla wcale niewłaściwego wstrętu, nie idą jednak za moim przykładem.

Mówię niewłaściwego wstrętu; albowiem, mimo najwidoczniejszych dowodów, że śliwki moje równie są smaczne jak inne; że ani śladu nie posiadają woni nawozu w mowie będącego, — nie mogą się przekonać, iżby to tak być mogło. — Napróżno im przytaczam: że we wszystkich wielkich miastach robią z odchodów ludzkich tak zwany *podret*, czyli bardzo żyzny nawóz, w postaci miłkiego proszku; że we Włoszech, ogrodowi inaczey ziemi nie użyzniają, jak tylko: przez *polewianie warzyw w czasie wegetacji, surowemi odchodami ludzkimi z wodą na płyn rzadkawy rozpuszczonemi*; a przecieź, wszyscy się na to zgadzają, iż *nigdzie nie masz równie smacznych warzyw jak tamże.*

Ciało, które sprawia przykrą woń odchodów ludzkich, jest lotne; w krótkce więc tak

dalece zniknie z obrębu w którym odchody rozpoczątkowały, iż nawet śladu onegoż nie pozostaje. Mam tego przekonywający dowód w ogrodzie moim. Już nawet w kilka dni po użyciu drzew rzeczonym sposobem, powietrze w ogrodzie jest czyste; przez zimę zaś, wszystko się tak dalece strawi, iż na wiosnę, nawet śladu nie ma, iżby odchody, o których mowa, w ogrodzie się znajdowały. A cóż dopiero w jesieni, gdy owoc dojrzewa.

Z resztą, mało jest obeznany z fizyologią roślin, kto mniema, iż one podług woli naszej mogą żywić się temi lub owemi pokarmami. Ani jednego atomka nie przyjmą one do siebie, który z natury w skład ich nie wchodzi. Jeżeli na jednych nawozach bujniej niżli na drugich rosną, pochodzi to z tąd, iż pierwsze więcej niż drugie zawierają właściwych onym pokarmów. — *Że ze wszystkich odchodów zwierząt, ludzkie najwięcej zawierają części dla roślin odżywnych, powszechnie jest znanem.*

O rozmnażaniu dobrych gatunków drzew owocowych.

P. Bosch, Dyrektor ogrodów rządowych w Stutgardzie, zapewnia, iż podług jego wielokrotnie powtarzanego doświadczenia, każdy nowy gatunek owocu, nie tylko może być utrzymywany w swjej naturalnej czystości, ale nadto, podobnie jak dąb, buczyna, sosna, może być niezmiennie rozmnażanym z nasienia, byle tylko z żadnym innym gatunkiem przez szczepienie, okulizowanie i t. p. mieszany nie był; że przyczyną wyradzania się dobrych, czyli że tak mówić można, samoistnych owoców, nie jest co innego; jak mieszanie ich z różnorodnymi gatunkami przez wyżej wymienione środki.

»Posiadając — mówi p. Bosch — z nasienia, młode drzewka, zdadne do szczepienia, kopulizowania i t. p. potrzeba je pomiędzy sobą rozmnażać, przez szczepienie, kopulizowanie, oczkowanie i t. p.; zawsze powtarzam między sobą, bez mieszania z innymi; wówczas, zachowa się najniezawodniej ich czystość gatunkowa; inaczej niechybnie się wyrodzą.

Rozumności.

Jeszcze słowo o przemianie owsa w żyto.

Przedmiot ten ciągle jeszcze zajmuje niemieckich rolników. — W szacownym piśmie *Ökonomische Neuigkeiten* z r. 1839., zamieszczone jest 4 roczne sprawozdanie Towarzystwa rolniczo-ogrodowego w Koburgu, gdzie, imiennie wymienione zostały osoby wiarogodne, potwierdzające: *rzeczywiste przemienianie się pod pewnymi warunkami, owsa w żyto.*

Gdyby ta wiadomość udzieloną została przez osobę mało znaną, zaiste nie dalibyśmy jej wia-

ry, i uważali ją raczej za omyłność, lub za najgrawanie się z łatwowiernych; ale kiedy, nie pojedyncza nieznana osoba, lecz raczej całe towarzystwo, z osób znanych z rzetelności i światła złożone, zaręcza za pewność w mowie będącego zjawiska, gruntującego się nie na prostym doświadczeniu, które łatwo może w błąd wprowadzić; lecz na doświadczeniu, naumyślnie czynionem, wielokrotnie z równym skutkiem powtarzanem; kiedy rzecz ta nie jest w tajemnicy trzymaną, celem korzystania z łatwowierności, lecz raczej z największą otwartością, z największemi szczegółami do pism pu-

blicznych podawaną, z najuroczystszym zapewnieniem, iż skoro przepisane warunki dopełnione zostaną, skutek, to jest *przemiana owsa w żyto*, najniezawodniej nastąpi; — w takim razie, niepodobna jakos wiary temu odmówić, bez wyraźnego uchybienia całemu, wyżej wspomnianemu Towarzystwu.

Warunki zaś są te:

1. Potrzeba siać owies w drugiej połowie czerwca.
2. Gdyby było tak dalece sucho, iżby owies nie mógł powschodzić, potrzeba go parę razy podlać.
3. Potrzeba go 2 razy przed jesienią zżąć, za każdą razą w ten czas, gdy jest bliskim kłosowania.

Tym sposobem postępując, na drugi rok, kierzki, które się utrzymają, (gdyż wiele z nich przez zimę ginie) najniezawodniej w żyto się przeistoczą.

Zresztą wyznać należy, iż rzecz ta więcej jest zajmująca pod względem fizjologii roślin, aniżeli widoków ekonomicznych; niechby bowiem rzeczywiście owies przemienił się w żyto, jakąż ztąd korzyść, kiedy znaczna część kierzków przez zimę ginie?

Nowy i olbrzymi rodzaj jedwabników.

Na posiedzeniu Akademii paryzkiej w d. 20 lipca r. b. p. Andouin okazał żywe exemplarze pewnego rodzaju nader wielkich jedwabników, których hodowanie staćby się mogło pod względem przemysłowym nader ważnym, gdyby się potwierdziła użyteczność oprzędów tychże jedwabników, również przez p. Andouin Akademii przedstawionych.

Ojezyzną tego rodzaju owadów jest Luizana. Są to jedwabniki, prawdziwe olbrzymy; al-

bowiem przeszło 5. cali są długie; koloru żółtego. P. Andouin otrzymał w r. z. od p. Lavallée, z nowego Orleanu, kilkanaście oprzędów tego rodzaju jedwabników, będące w niektórych poczwarki, przebyły szczęśliwie tak daleką podróż; w krótko po przybyciu do Europy, wykłuły się motyle, sparzyły, i samice zniosły jajka, z których to otrzymane jedwabniki p. Andouin Akademii okazał.

P. Lavallée, przedstawiając w mowie będące owady, zapomniał donieść, jakimi liśćmi się żywią. W niemałym przeto kłopotcie znajdował się p. Andouin, gdy mu przyszło karmić nowych tych cudzoziemców. Szczęściem, przypadkiem trafił na właściwe im drzewo; to jest *na amerykańską śliwę* (Prunus), która w ogrodzie botanicznym w Paryżu bujnie rośnie. Młode gąsieniczki tak chciwie spożywały jej liście, że nawet i szypułki zjadały. A więc, zdaje się, iż byle tylko ten rodzaj jedwabników okazał się użytecznym, nie już nie byłoby na przeszkodzie do aklimatyzowania go w Europie.

Koniczyna olbrzymia.

Do tej chwili, tak różne czytamy zdania o koniczynie olbrzymiej, tak różne doniesienia o otrzymanych wypadkach, iż ani jej zupełnie potępić, ni też polecać nie możemy. — Ostatnie o niej doniesienie z meklemburskiego, brzmi jak następuje:

» Otrzymaliśmy także nasienie, tyle okrzyczanej koniczyny olbrzymiej; od razu atoli poznaliśmy, iż to jest tak zwana *konopna koniczyna* (Hanfkleé), którą, wraz z innymi gospodarzami, przed wielu już laty uprawialiśmy, ale przekonawszy się o jej nieużyteczności, zarzuciliśmy; a zatem, przestrzegamy mających chęć czynienia z nią doświadczeń, by daremnie ani czasu, ani pieniędzy, nie tworili.

W ogólności, to tylko o tej roślinie dziś powiedzieć możemy, iż więcej znajduje nagany, aniżeli pochwały.

DODATEK NADZWYCZAJNY

DO TYGODNIKA ROLNICZO-TECHNOLOGICZNEGO.

O szkodliwym owadzie zbożowym i sposobie jego wyniszczenia.

Owad niszczący ziarno zbożowe, w trojakim gatunku bywa odróżniany:

1. W kolorze białym: mól żytnik (*Tinea Granella*, v. *Alucita Granella*).
2. Wołek czarny: (*Curculis Granarius* v. *Calandria Granaria*) koloru czarnego.
3. Podryjek: (*Attelabus Frumentarius*) koloru czerwonego.

Pierwszy z tych owadów, rządzący w tych czasach szkody w składach zboża i mąki, należy do motyli nocnych, czyli *ćmów*, w stanie dojrzałym długi jest na $\frac{3}{4}$ cala, ma skrzydła *zwierzchnie* szaro-brunatno- i żółtawo marmurkowate, w tyle do góry zakrzywione, *dolne* czarniawe; głowę żółtawą, okrytą długimi włoskami, różki miernie rozłożyste. — W stanie lizki, kiedy najwięcej swoją żarłocznością szkodliwy, dorasta niekiedy 1 calowej długości, cały brunatno-biały, tylko głowę ma ciemno-kasztanową — ma 16 nóg: 2 umieszczone na tyle ciała, 8 pod środkiem, a 6 pod przodem.

Środki jego wygubiania podają następujące:

»Zboże często przerabiać i przewiewać.

»Podłogę w szpichrze czysto utrzymywać, a ściany i rusztowanie świeżem wapnem pobielać.

»Poustawiać w zbożu w niewielkich odległościach garnki, pokryte pęcherzem przedziurawionym, napełnione mieszaniną wapna i salmiaku (*Chloroku amonii*).

»Rozwieszać na sznurach przy pułapie szpichrza, bibułę, lub gałgany, napojone smołą, albo li też olejem.

»Do zboża wkładać czosnek, cebulę, świeży kwiat bzu, lub młode pędy jodłowe.

»Kopce zbożowe otoczyć tamą na $2\frac{1}{2}$ cala szeroką, ile można wysoką, z popiołu drzewnego lub torfowego; wtedy owady starać się będą przebyć tę tamę, a tak mogą być w wielkiej ilości wygubione.

»Przerabiając zboże łopatomi skropionemi olejkim anyżowym lub terpentynowym.

»Ponieważ mrówki leśne (*Formica rufa*) wyniszczają ten owad, a zatem wpuszczając je do szpichrów, można owady tym sposobem niszczyć.

»Na około zboża, a nawet i w kopce zbożowe, kłaść szałwię, liście tytoniu i t. p. narkotyczne rośliny.

»Chętnie wołek ten osiada na konopiach, gałganach napojonych konopnym olejem, a wtedy łatwo go wygubić. — także:

»Za pomocą mocnego suszenia zboża, w dość znacznem cieple, np. w 60° R. przez 5 minut i to w całej massie, aby się nieskrył w miejsce zimniejsze; ginie on także od dymu siarkowego.

»Zboże świeże ten owad przekłada nad dawne, można więc rozsypać na stronie cokolwiek zboża świeżego, a gdy się wołek tam przeniesie, można go wygubić w wielkiej ilości, polewając wrzącą wodą.

»Zdaje się, iż robactwo to ma wielką skłonność do tłustości wełny owczej, zbiera się bowiem w wielkiej ilości na skórkach owczych nie ostrzyżonych; rozłożywszy więc skóry na zbożu, można je tym sposobem wywabić i wyniszczyć, albo:

»Rozpościierać płachty rzadko tkane, (radowiny) suche lub wilgotne na zbożu, na które również ten owad wylata; potrzeba tylko wprzód zboże dobrze przesuszować, aby robactwo niepokoić.

»Ściany i podłogi szpichrza, smarować wodą *dziegciową*; kłaść także istoty organiczne gnijące, a mianowicie zdechłe raki, zgniły sztokfisz i t. p.

»Kopce zbożowe obsypywać wysuszonym *liściem leszczyny*.

»Ponieważ owad ten niewchodzi głębiej w kopce zbożowe nad 3 do 4 cali, radzą więc niektórzy, aby zboża wcale nie poruszać, jednakże środek ten sprowadza tu dość znaczną stratę, bo gdybyśmy np. przyjęli wysokość kopca zbożowego na 20 cali, tedy $\frac{1}{3}$ część zboża będzie zniszczoną, co jest rzeczą niemałej wagi.

Warstwę górną, w której się robactwo na parę cali zagnieżdżyło, zebrać i zniszczyć; pozostałą zaś ilość zboża, środkami wyżej wskazanymi od dalszego zniszczenia ochraniać

Środki zaradcze są:

Zboże należy dojrzałe i suche, do szpichrza zwozić, w początkach mienasypywać w wielkie kupy i często przerabiać, a potem dopiero po oschnięciu zsypywać na większe kupy.

Ten szkodliwy owad objawia się najczęściej w czasie wilgotnych pór roku, a i wtedy potrzeba zboże, przeznaczone na dłuższe przechowanie, dobrze wysuszać.

Ułatwić w szpichrzach przystęp powietrza i światła, albowiem tak przewiew jako też i światło zabijają ten szkodliwy owad.

W czasie zimy raz na tydzień, a w porze cieplej dwa razy przerabiając zboże, przekładać deszczułkami na 2 stopy długimi i tyleż szerokiemi, spojenými między sobą, a wtedy robactwo to niepokojone, zbierze się na deskach, z których łatwo obmieciono być może.

W grudniu, aż do ostatniego dnia stycznia, zboże często przepędzać przez arfę, w tym bowiem czasie liszka przekształca się w pupkę i tak najpewniejszym sposobem ziarno zdrowe od zarażonego oddzielone zostanie.

»Owsa, grochu, soczewicy i wyki robak ten nie lubi.

»Najszkodliwszemi są składy nad stajniami lub oborami.

»Im zboże jest cieniżej rozestłane, tém mniej należy się obawiać tego owadu.

»Worki, beczki lub ziarna zbożowe, któreby najmniejszy ślad zarodku tego owadu wskazywały, nigdy do wyczyszczonego szpichrza czyli stodoły już wnoszone być niepowinny, nawet chociażby tylko podejrzenie być mogło, iż zboże lub naczynia były tym owadom zarażone.

»Jak tylko podłoga ze zboża będzie ogołocona, należy ją mocno wyszorować wilgotnym piaskiem.

CIECHANOWICZ,

Kontroler Instytutu w Marymoncie.