

GAZETA WIEYSKA.

Praca wszystko zwycięża.

w Warszawie dnia 15. Maia Roku 1818.

Zatrudnienia gospodarskie na
miesiąc

L i p i e c .

(Dalszy ciąg.)

O gosp. iarstwie rolném.

Znam gospodarzy, których parobcy podczas żniwa częstokroć do północy zwożąc zboże do stodół, przecież i bydło dobrze nakarmią i wcześniej nim rosa zeydzie, w polu inną pełnią robotę; bo dopóki rosa nieoschnie, dopóty, zboża ani wiązać ani zwozić nie można. Znałem także i takich rolników, którzy z iakiegoś przywidzenia całe obszary żyta żąć i na pomiot kłaść zwykli byli, pewnego lata nastąpiła ciąga ślota, i wkrótce widać było tysiące kóp żyta, które na pomiotach zieloność okryła. Podczas żniwa należy oszczędzać gotowizny, grosz bowiem na nie wydany, z lichwą powróci się.

Zasieki w stodółach należało już w przeszłym miesiącu należyte wy-

czyścić i poprzewietrzać, na sam spód kładzie się w zasiekach jedna warsta gałęzi olszowych albo lepięz jeszcze kruszynowych, co myszy i inne ro-bactwo odpędzać ma, druga zaś sychta powinna być z świeżey słomy. Snopy należy układać w porządku aby ie do młocki wygodnie i bez zmierzwienia brać można.

W latach urodzaynych bywają za ciasne stodóły; w takich razach robi się w bliskości stodół tyle stogów ile ich potrzeba wymagać będzie; ale tylko z żyta i owsa; bo przenica i ię-czmień zawieleby w stogach ucierpiały: skoro iednak który z zasieków wyprużnionym zostanie, należy natychmiast, upatrzwszy dzień pogodny, zboże ze stogu pod dach przenieść; bo chociażby stogi od wierzchu słomą pokrzte były, tedy iednak z boków wystawione są na ślota, przez co słoma butwiejąc staie się niezdatną na pokarm dla bydła, a ptastwo przy tém tak wiele psuie ziarna, iż śmiało $\frac{1}{3}$ szkody onegoż liczyć można.

Mieysca na których stogi stawiają

się, powinny być albo z natury wznioślejsze, albo przez nawieżioną ziemię podniesione, na spód kładzie się dobra sychta słomy a w środku zabija się mocny pal w około którego snopy układają się powinny. Lepiej jest układać stogi obszerniejsze niżeli zbyt wysokie; bo do niższych mniej rąk potrzebuje się. Po ułożeniu stogu, należy go obkopać rowem, przez któryby woda z deszczów łatwo odchodzić mogła, i ogrodzić go dobrze, aby go było niepsuło.

Zgromadzając do stodół rozmaite gatunki zboża należy takie uczynić rozporządzenie, iżby ile możności jeden gatunek z drugim nie mieszał się; osobliwie zaś przestrzegać wypada, aby ozimina z oziminą, a iaryzna z iaryzną nigdy razem nie leżała; bo ten tylko jest środek przeszkodzenia krzewieniu się mieszaniny zbóż. Jare zbora w potrzebie można kłaść obok oziminy albo na nią; bo chociażby ziarno pomieszało się jedno z drugim; przecież w takim razie złych skutków obawiać się nie ma przyczyny, gdyż zboże jare z ozimnem zasiane nie zniwdzie. Kupujący zboża, chcą je mieć czyste; a zmieszane z innym gatunkiem daleko niższą płacą ceną.

Porządne rejestra zbioru zboża koniecznie utrzymywać należy, aby wiedzieć można, ile go się ujęło, i wiele onegoż po omłóconej probie po odrąceniu nasienia i potrzeb domowych, do sprzedaży pozostać może? Takie rejestra, chociaż niezupeł-

nie, posłużyć jednak mogą do kontroli officialistów ekonomicznych.

Zniwo zaczyna się powszechnie od zimowego ięczmienia, który jednak rzadko gdzie sieją, wyjąwszy małe gospodarstwa, a to z tego powodu; że ięczmień ozimy bardzo wyborny wymaga roli. Po tym następuje żyto, ięczmień i owies rychlik, dalej pszenica, groch hreczka, owies pospolity i t. d. Czasem zdarza się, iż kilka gatunków zboża razem dojrzeje, w takim razie powinien rolnik przedniejsze gatunki w przód chwycić, późniejsze zaś na później odłożyć. Pszenica jest przedniejszą od żyta, żyto od ięczmienia, a ięczmień od owsa; żyto jednak najdłużej na pniu wytrzymać może. Groch w czasie zbioru rozmaite sprawia trudności; skoro bowiem deszcz spadnie, zaraz pęcznieje w strączkach, które pękają a groch wysypuje się na zagony; kiedy więc cokolwiek tylko podeśnie, należy go zaraz zwieźć do stodoły i tak rozłożyć aby przez przeciąg wiatru do reszty wysechł i niepopleśniał. W snopy nie należy go wiązać i tylko widłami na wóz nakładać i zkładać zwolna aby przez ściskanie niewyluszczał się. Co do ięczmienia, wielu gospodarzy mniema być nieodzowną potrzebą, aby go wprzód deszcz zmoczył nim go do stodoły zwozić się zaczęło; lecz zdanie ich w tym względzie jest mylnem; bo tym postępując sposobem, nietylko wiele kłosów odpada ale nadto znaczna ilość ziarna odkrusza się, osobliwie kiedy go pod

czas upału zgrabię się wiąże. Chcąc tego uniknąć potrzeba go z rosą grabić i wiązać, a słońce i w snopach wysuszy go do reszty tak dobrze, iż go tegoż samego dnia po południu bezpiecznie zwozić można. Jęczmień kiedy jest paszysty i powietrze suche, niepowinien dłużej nad dwa dni leżeć. Zdarza się; iż jęczmień dojrzewa razem z żytem i pszenicą, w takim razie wypada go pierw od żyta zebrać, które bez wielkiego niebezpieczeństwa dłużej postać może. Owies pospolicie dojrzewa późniéj (wyjąwszy rychlik) od wyżéj wymienionych gatunków zboża, a iak jest rzeczą stosowną aby do należytej doszedł dojrzałości, tak też dopuścić nie należy aby prześcigł; bo w takim zdarzeniu niezawodnie opadać będzie: jeżeli jest paszystym nie powinien dłużej nad 3. do 4. dni leżeć, po czém go śmiało zwozić można. Z szocowicą i wyką tak obeysć należy się iak z grochem. O postępowaniu względem prosa mówilo się już w miesiącu Maju. Hreczkę kosić potrzeba skoro ziarno czernieć i brunatnieć dobrze zacznie; nienależy ją, atoli zostawiać na pokosach lecz zazaz w kuczki stawić: to jest w garści wierzchołki lekko wiążąc, rozstawić ją po polu dopóki nie wyschnie, i w ten czas ją zwozić: Hreczka z trudnością wysycha i pod czas pory mokréj wilgoć w siebie wciąga; potrzeba ją więc w stodolach złożyć w miejscach na przeciąg wiatru wystawionych, aby niepleśniała i niezbutwiała; gdyż przeciwnie, ziarno ztęchnie a hreczka zbu-

twiawszy i tém samém stawszy się niezdatną na paszę nie mogłaby być iak tylko na gnóy użyta.

O łąkach.

Sianożęcie powinno przed żniwem już być ukończone jeżeli pora czasu zprzyiała: zbiory zboża przecież nad sianożęciem powinny mieć pierwszeństwo: bo nikczemne na bagnach i oparzeliskach zbierane częstokroć siano, nie może iść w porównanie ze słomą dobrą, tém mniéj zaś, kiedy jest paszystą. Narzekania na złe łąki są próżne; bo ugor koniczną zasiany, więcéj przyniesie korzyści, od łęgów pod wodą stojących. Jeżeli łęgi wcale, albo bez zbyt wielkich nakładów obsuszyć się nie dadzą, lepiéj jest opuścić je całkiem i prace na zbiory nikczemnego sianałożyć, na uprawę traw paszystych w ugorach użyć. O zkrapianiu łąk, o urządzaniu siana, i w ogólności o sianożęciu mówiło się już w miesiącu Czerwcu.

O ogrodach.

Niszczenie chwastów przez plewienie i obkopywanie, tudzież obsypywanie ziemią rozmaitych roślin, i polewanie onychże, są nayglówniejszym ogrodników w tym miesiącu zatrudnieniem. Nasiona które dojrzały zbierają się, suszą, czyszeją, i w płóciennych woreczkach chowają.

Groch cukrowy i bób zielony właśnie w tym miesiącu jest bardzo przyjemną potrawą; lecz iak jest sma-

cznym, tak przecież, chcąc mieć do-
rodne nasienie, nie należy wszystkie
pierworodne z nich strączki obry-
wać; bo z tych tylko właściwie nay-
doskonalszego spodziewać można na-
sienia. Wczesne kartofle można już
około S. Jakuba zbierać; bo je w tym
czasie w najlepszej cenie zprzeda-
wać można, osobliwie w bliskości
znacznego miasta.

W sadach żadnych teraz nie ma
zatrudnień; bo w porze gorący cza-
su, obcinanie drzew dorosłych nie-
byłoby pożyteczne. Opadający owoc
należy zbierać i świniom dawać.
Drzewa słabe owocem zbyt obciążo-
ne, podpierać potrzeba. Szkółka
drzewek opiela się motyką a młode
szczepione pieńki oczyszczają się ze
zbytecznych latorośli, i wilków tu-
dzież przywiązanie się je aby prosto
rosły. Młode drzewka, obcinając
im latorośle ostreimi kleszczami w Li-
pcu i Sierpniu na cal 1. długości,
przyprowadziłem do wczesnego wy-
dawania owocu.

O hodowaniu bydła.

Hodowanie i pielęgnowanie owiec
jest takie, jak w miesiącach Maiu i
Czerwcu; pasza na ścierniskach za-
czynd się teraz i bardzo jest dla owiec
korzystną. W dobrych owczarniach
zaczyna się teraz puszczac owce do
barana. O spuszczeniu owiec i o
ulepszaniu plemienia ich, z zastoso-
waniem środków naszemu klima od-
powiadających, zkreśliłem przepisy,
które jako na doświadczeniu oparte;
dla pożytku gospodarzy umieszczam.

Kto chce ze spuszczenia owiec,
dobrego dochować się rodu, niepo-
winien wcześniej tryków pomiędzy
owce puszczać, aż w czasie do spół-
kowania właściwym, to jest: który
najlepiej odpowiada porze roku pie-
lęgowaniu iagniat naydogodniejszy;
przy tém należy także takie tryki i
z takimi zpuszczać owcami, które
do ulepszenia rodu, z względu na
ich postać i doskonałość wełny są
nayzdatniejsze. Stare i młode tryki
zawsze pomiędzy owcami trzymając,
chociażby przez podwiązywanie im
przyrodzenia, współkowaniu ich za-
pobiedz można; przecież, gdy ciągły
razem pobyt do współkowania po-
budza, należyte iednak zaspokoienie
chuci z powodu podwiązania nastą-
pic nie może; przeto ten sposób, lu-
bo upłodnieniu owiec zapobiega,
iednakże tak owcom, których chuc
nie zaspokaja się, jak i trykom jest
szkodliwy, którzy na próżno dra-
żnieni w ten czas dopiero usilowań
swoich zaprzestają, kiedy z sil opadł-
szy dla tego tylko spoczywają, aby
usilowania swoje na nowo zacząć
mogli: ztąd iasny wypływa wnio-
sek; iż nieodzowną jest potrzebą
owce oddzielnie od tryków trzymać
wyiawszy czas, w którym je dla upłod-
nienia zpuszczać należy. Młode
tryki mogą się paść ze skopami ra-
zem.

Im twardsza jest gdzie zima, i im
dłużey trwać zwykła, tém w późniey-
szą iesień zpuszczenie tryków z owca-
mi odkładać potrzeba: wcześniej bo-
wiem zpuszczone owce kocilyby się
właśnie pod czas najeższych mro-

zów, a co jest jeszcze gorszem: w ten czas, kiedy w polu zasoby dobrej i pożywny paszy już wyczerpane bywają w owczarniach dobrze zaopatrzonych, można wprowadzić iagnięta od srogości mrozów zasłonić, niedostatek atoli pożywny dla owiec paszy, nieodzwrotnie znikczemnienie iagnięt za sobą pociągnaćby musiał. Tam więc, gdzie taki jest dostatek dobrej paszy; iż owce całą zimę wygodnie i na wiosnę aż do końca kwietnia, a czasem i Maią, w stajniach utrzymywać można, tam wczesne iagnięta uaylepsze obiecują korzyści; są silniejsze od późnych, wydają więcej wewny, i prędzę rosną.

Owca nosi iagnię przez 20. tygodni, a naywięcej 5. miesięcy zupełna; w mocy jest przeto każdego owcarza czas spuszczenia owiec z trykami tak obrachować, iżby kocenie owiec w ten czas nastąpiło, kiedy ie z względu na ilość paszy, i inne okoliczności za naydogodniejsze uzna.

Tryksy bez rogów mają pierwszeństwo nad rogatymi z tego powodu; ponieważ u drabek mnię zabierają miejsca niżeli rogate, i białąc się z sobą ani siebie ani owce, osobliwie kotne, nie mając rogów razić nie mogą; nadto iagnięta po rogatych baranach mając w polu większe głowy, trudniejszy matkom sprawiają poród.

Tryk od $1\frac{1}{2}$ do 7. a naydalej do 8. roku wieku swego jest zdającym do płodzenia dobrych iagnięt, jeżeli zimą i latem dobrze jest utrzymywany; naysilniejszym i nayżywszym zaś jest w roku trzecim. Młodsze

tryki do owiec puszczone, i słabe płodzą iagnięta i sami nikczemnieją; starsze nad lat 8. stają się do upłodnienia owiec niezdatnymi. W dobrych owczarniach nie używają tryka do owiec do póki lat 2. z pełna nie ukończy, a w roku 5. naypóźniej zaś w 6. uważają go już za mnię zdanego: i dla tego też w takich owczarniach rasa jest zawsze dorodną i piękną. Ponieważ zaś iagnięta złe i dobre przymioty oyców dziedziczyć zwykły; przeto zawsze takich należy odbierać tryków; którzy czystością zdrowia, piękną postacią, wielkością budowy i obfitością wewny celując, ród podobny sobie rozplodzić są zdolni.

Owce podobnie od 2. do 7. roku wieku swego, są do rodzenia nayzdadniejsze: po młodszych lub starszych dobrego przyplodku obiecywać sobie nie można. W 4. i 5. roku owce rodzą naydorodniejsze iagnięta, z których tryki dobierać należy. Po między owcami bywają takie, które chcąc zawsze z trykami współkować, nigdy iednak kotnemi nie zostają; takowe więc wybrakować, zpaść, i sprzedać wypada.

Po maciorach dziedziczą iagnięta wzrost mały, złą wewnę, i wszelkie choroby, którym ich matki podlegać zwykły, a w ogólności wszystkie złe przymioty oycy i matki z których zplodzone zostały: chcą przeto dobrego dochować się rodu, należy równie doskonałe tryki iak i dobre dobierać maciory. Doskonałe tryki, niepowinni mieć ani w pysku, ani

na podniebieniu, ani na języku, ani pod językiem, czarnych, czerwonych lub brązowych centek, inaczej bowiem iagnięta przez nich zplodzone będą srokatę. Chcąc dochować się rasy wielkiej, potrzeba największe z owczarni wybrać maciory, i z większemi jeszcze od nich zpuszczać tryksami. Skutek z tego będzie następujący, iż zaraz w pierwszym pokoleniu iagnięta większe będą od matek, a czasem i oyców przerosną. Są bowiem dość liczne przykłady; że tryki 28. a maciory 20. cali wysokie z sobą zpuszczone, zplodzili iagnięta, które do 27. cali wysokości dorosły. Podobnie wełna, tak z względu na jej długość iak i delikatność ulepszoną być może. W tym celu należy wybrać z gromady owce najdłuższą i najdelikatniejszą mające wełnę i one z tryksami zpuścić, którzy dłuższą jeszcze i doskonalszą od nich wełnę mają, a iagnięta z nich zplodzone wydadzą wełnę równą długości i dobroci iak tryki a czasem i dłuższą i lepszą. Samo przez się rozumie się iż chcąc zamierzonego dopiąć celu, zawsze dostatek dobrej paszy mieć potrzeba. W Anglii przez ciągłą pilność i troskliwe owiec pielęgnowanie, przywiedziono wełnę do 22. cali długości, iedynie tym sposobem; że z owcami zpuszczano zawsze tryków dłuższą od nich mających wełnę.

Powszechne u nas pannie mniemanie; że utrzymanie ulepszanego rodu owiec daleko więcej wymaga nakładów, niżeli utrzymywanie owiec pospolitych i ztąd wnoszą; że spo-

dziewane korzyści z ulepszonych gromad na samém tylko czczem zaszczepiają się wyobrażeniu. Niewątpliwą jest w prawdzie rzeczą, iż lepiej pielęgnowane owce więcej kosztują lecz i to także niezawodna, że zły gatunek owiec i do tego jeszcze ule pielęgnowanych, tém mniej przyniesie pożytku. Przykłady niektórych zamożnych gospodarzy; którzy upopobanie swoje w hodowaniu owiec do tego posuwają stopnia; że korzyści ztąd odnoszone nieodpowiadają zupełnie czynionym przez nich w tym względzie nakładom, nie powinny zrażać nikogo; lecz owszem każdy z winną dla doświadczenia wdzięcznością znajdzie w postępowaniu ich wzory, iedne, które zdrowy rozsądek wprost chwycić, drugie, które do miejscowości stosować może. Nie od owczarni kosztownie zbudowanych, nie od doboru wykwiśniętej paszy, nie od sprowadzania licznych z zagranicy gromad; lecz od zastosowania do miejscowości dobrych wzorów wszystko zależy: wygodą, dobrą żywności dostatek i wybór plemienia wszystko stanowi: bez wygod i dostatku żywności, najlepsze nikiemnie plemie i mizerną lub żadną nie przyniesie korzyść, obok tych, i nikiemne z czasem do lepszego może być przywiedzione bytu; a tém samém stać się użyteczniejszym. Powszechną przyczyną nikiemności gromad naszych są, niedbalstwo, zły wybór owczarzy i przesady względem zabudowań dla owiec. Niedbalstwa skutkiem jest niedozór, nieochędnostwo, nikiemna

albo niedostateczna żywność, a ztąd choroby, zarazy i znikczemnienie rodu i wełny. Zły owczarz i chciwy albo nieumiejętny, niedołężny, i do tego jeszcze pełen przesądów, jest zgubą całych gromad, takiemu powierzać owce, lepiej jest nie trzymać je wcale, w jego ręku i naydoskonalsza nawet zniszcze rasa: żaden z gospodarzy o gromadę swoją troskliwy niepowinien żalować kosztów, na opłacanie dobrego owczarniowców, troskliwość jego o poruczone mu gromady wynagrodzi je sowicie. Owczarnie w zimny porze roku ze wszystkich stron zamknięte i przystępu wolnemu powietrzu broniące, nie mało przyczyniają się także do zguby gromad naszych, są one raczy podobne do suchych łąk, aniżeli do wygodnego dla owiec zabudowania. Zchronienie dla nich powinno je wprowadzić w zimie od mrozów zastaniać, lecz niepowinno być gorące; w owczarniach powinny być przeto otwory i wiatrociągi w kształcie kominów, przez które gorąco i wyziewami zarażone powietrze łatwo wychodzić mogło. Im muię świeżego powietrza owce używają, im dłużej w owych łąkach parnych dręczyć się muszą, tem bardziej osłabione i spragnione wodę piąc, narażone są na rozmaite choroby, którym bez usunięcia zabójczy przyczyny zapobiedz niepodobna.

Ulepszenie rodu owiec szybkim postąpi krokiem jeżeli właściciele gromad pilną uwagę zwrócic zechcą na dotknięte wyżej prawidła z sa-

méy natury rzeczy czerpane, i nie będą żalować wydatku na wprowadzenie tryków do poprawy plemienia zdalnych: których w Szląsku, w owczarniach Hrabiego Magnis w Hrabstwie Glatz, w dobrach Wedell, Hrabiego Henneberg w Minkowskie, Hrabiego Kalkreuth w Kozminie i Radlinie, tudzież w dobrach P. Tresków w Owińsku dostać można. *)

Dobre tryki do ulepszenia i udoskonalenia owczarni są daleko potrzebniejszymi niżeli maciory; bo ieden tryk każdego roku przynajmniej 15. do 20. iagniąt zplodzi, maciora zaś iedna, iedno tylko urodzi iagnię; a zatem 15. do 20. razy tyle więcéy potrzebaby macior, ile potrzeba tryków do polepszenia rodu w iedny owczarni. Jagnięta z tryków zagranicznych z kraiolemi maciorami zplodzone, nie wszystkie wprawdzie iednakowo udają się; lecz ta różnica ma swoje inne właściwe przyczyny, które powszechnie od stanu zdrowia tryków, macior, samych iagniąt, od ilości i dobroci paszy, od mnię lub bardzię gorący, albo zimny, mokry i dżdzystry por, tudzież z innych okoliczności,

*) W naszym Królestwie Polskim, ile mi jest wiadomo, tryki udoskonalonego rodu znajdują się: w Łomży u W. Trębickiego w Województwie Mazowieckim, w Sulisławicach u W. Biernackiego w Województwie Kaliskim, w Polichny u W. Boguckiego w Województwie Sandomińskim i w Kielcach w témże Województwie w dobrach narodowych.

swój biorąc początek, sprawia, iż w niektórych iagniętach gospodarz nadzieje swoje zawiedzione spostrzega. Te iednak szczegółowe zdarzenia bynajmniéj go w zawodzie iego zrażać niepowinny: bo wypadki z obocznych wyplywające przyczyn, iak w ogóle biorąc nie są stanowcze i za prawidło służyć nie mogą; tak będąc rzadkimi, nikomu znaczny nie przyniosą straty.

Zprowadzając tryków zagranicznych iedną ieszcze potrzeba zachować otróżność; to iest, przekonać się, czyli nie mają parchów? w przeciwnym bowiem razie, zamiast ulepszenia gromady, zaraziłby ją można parchami. W Szląsku, gdzie otróżność do należytego posunięta iest stopnia, nie zna ją już parchów.

Bywa czasem, iż owce zdrowe i do rodzenia zdadne tryków dopuszczają nie chcą; takim więc potrzeba dawać czasami owies z konopnym siemieniem, lub też dać się im strawę z posiekaną cębulą lub czosnkiem parą garści otrąb i łutem soli przyrządzoną. Taka strawa, skuteczną iest także dla tryków potrzebnego niemających ognia.

W tym miesiącu robi się brak

z owiec starych, słabowitych lub nie płodnych, wybrakowane łączą się ze skopami.

Hodowanie i pasza bydła rogatego, są zupełnie te same iak i w zeszłym miesiącu. Gdzie utrzymywanie całoroczne bydła na stajniach, nie iest ieszcze zaprowadzone, tam wypędza się oneż na ściern; konie i woły robocze mają w téj mierze pierwszeństwo, potem dopiero bydło z obory następować powinno, a nakoniec owce, świnié i gęsi. Dopóki zboże w mędlach lub w półkopakach ieszcze w polu stoi, dopóty żadnego bydła na ściern puszcząć nienależy; bo trudno iest pastuchowi takiéj dołożyć pilność, aby w snopach bez szkody obeysć się można.

W tym i następnych miesiącach zwykły najczęściej zarazy bydła panować; agdy pomimo najgorliwszych i rządów w tym względzie usiłowań i troskliwości lekarzy, dotąd ieszcze niezgłębiono istotnie przyczyn zarazy bydła tak często w kraiu naszym okropne zrzadzającey nieszczęścia; przeto pilne zachowanie przepisów policyjnych w téj mierze wydanych iest iedynym środkiem zapobieżenia tym smutnym nader wypadkom. *(Dalszy ciąg w następującym Nrze.)*

Sprostowanie pomyłek w Nrze 19. zaszłych.

Na karcie 145. kolumnie 1. wierszu 5. *kremortari* czytaj *kremortartari-Weinsteinu*, winnego kamienia.