

ROLNICZY, HANDLOWY I PRZEMYSŁOWY.

N^o 12.

Dnia 24 Marca 1875 roku.

12 (24) Marca 1875 r.

Strzyżenie dobytku.

Rolnicy zabiegli i przewidujący zajmują się bardzo ważną kwestyą tyczącą się higieny zwierząt domowych, gdyż z żalem przyznać wypada, że gospodarze nie zawsze postępują jak należy w utrzymaniu dobytku.

W niektórych miejscowościach, biedne zwierzęta, rzeczywiście są traktowane w sposób opłakany, dla tego też rezultaty jakie się otrzymują, wiele bardzo zostawiają do życzenia; dobytek marnieje i nie przynosi pożądaných korzyści.

Wówczas dają się słyszeć skargi, zdania, że dobytek jest złem koniecznym, kiedy właśnie powinien przynosić zamożność w gospodarstwie rolném.

Zwierzęta, tak samo jak i ludzie, potrzebują osobliwszego starania; nie tylko należy im dawać karm obfitą, ale oprócz tego trzeba dobrze utrzymywać miejsce, w którym przebywają, w najlepszym stanie porządku, i nie obawiać się obmywania, a chcąc je ułatwić, należy je strzyż, kiedy sierć staje się zbyt długą.

Wiemy o tém dobrze, że specjaliści krytykują ten systemat, ale zdaje się, że summa korzyści przewyższa sumę strat przypuszczalnych.

W tym celu p. Viseur uczynił ważne bardzo przedstawienie Centralnemu Towarzystwu Rolniczemu, które dosłownie przytaczamy.

Wiadomém jest, że w czasie zimy zwierzęta pokrywają się futrem tém grubszym im klimat jest zimniejszy i pokarmy mniej pożywne. Futro to jest suchém, jest złym przewodnikiem ciepłoty na zwierzętach, które wykonywają tylko ruchy dowolne, umiarkowane i używają swobody, która jest pierwszym warunkiem życia wolnego od niedogodności w istotach organicznych. Ale skoro zwierzęta udomowione są zmuszane do pracy, częstokroć nieumiarkowanej, do szybkiego biegu w zimie, i kiedy się je pozostawia w bezczynności na zimnie, przez całe godziny, często nie wiedząc dla czego, futro nasiąknięte potem staje się bardziej szkodliwém, aniżeli pożytecznym, marznie niejako, i tworzy aokoło zwierzęcia pewien rodzaj płaszczu lodowego.

Krew, która w początku przytępnęła do skóry, w skutek wysilenia, skutkiem zimna zostaje odpartą ku organom wewnętrznym, gdzie jęj nagromadzenie wywołuje ważne, a często bardzo śmiertelne nieporządki.

Ostrzyżenie zwierzęcia we właściwym czasie może zapobiedz wielkiej części tych niedogodności, pochodzących z sierści, a szczególnie z zaniedbania, a nawet możemy powiedzieć ze złego serca właściciela, który bydle swoje naraża na straszne choroby, kiedyby tak łatwém było ochronić je przed niemi. W krajach południowych strzyżenie odbywa się od bardzo dawnego czasu na mułach, które tym sposobem wytrzymałszemi są na zmiany powietrza i na pracę. W stronach północnych Francyi czynność ta z wielką trudnością przyjętą była w początkach, ale z wolna się przyjęła, weszła niejako w użycie, tém słuszniej, że transporta przy szybkiej jeździe tego wymagają, a staranne czyszczenie koni nie jest ogólną zaletą. Należy jednak wypełnić niektóre przepisy, ponieważ strzyżenie nie powinno się wykonywać na wszystkich bez wyjątku zwierzętach, i nie we wszystkich okolicznościach. Nie służy ono do niczego, a nawet powiedzieć możemy, że jest bezpożyteczne dla koni zbytko-

wych. powozowych, wierzch wych i pociagowych, których sierść jest delikatna, i która w skutek tego szybko wysycha po wprowadzeniu do stajni; konie te są wreszcie starannie zawsze pielęgnowane; niepotrzebne ono jest dla koni od pluga, które od grudnia do kwietnia bardzo mało pracują, i których skóra znajduje się w dobrym stanie porządku; konie, które chodzą stępo i nie dźwigają zbyt wielkich ciężarów, mogą nie być strzyżonemi. Czynność ta jest zbawienną szczególnie dla koni z długą sierścią, które łatwo się pocią; w takim stanie jedzą z większym apetytem, są wesejsze, bystrzejsze, członki ich są bardziej sprężyste. Tak samo dzieje się z końmi o niedźwiedziej sierści, do jakiegokolwiek roboty będą używane, które w chwili lenienia są cierpiące i wystawione na puchnięcie tkanki komórkowej. Toż samo powiemy o koniach z krótkim oddechem, dychawicznych, i t. d.

Jeżeli konie mają robactwo, albo uległy chorobie skórnej, strzyżenie dopomaga do ich oswobodzenia i przywrócenia zdrowia, a nawet dodaje im tuszy bez potrzeby zwiększania ilości pokarmu.

Nie w zupełności podzielamy zdanie p. Viseur, ponieważ z doświadczenia nabraliśmy pewności, że strzyżenie korzystnym jest dla wszystkich koni, do jakiegokolwiek pracy użytemi będą. Konie cugowe odbywają często pracę bardzo wielką, często bardzo bywają pokryte potem i czekają na swoich panów przez godziny całe przed bramą pałacu, sali teatralnej lub koncertu; ale nie należy mniemać, żeby te konie zbytkowne były tak doskonale czyszczone jakby to przypuszczać należało; stangreci bywają czasami wielkimi próżniakami; otóż, sierść długa utrudnia bardzo chędożenie koni. Konie rolnicze nie zawsze również mają skórę w pożądanym stanie czystości; często nawet ma się zupełnie inaczej. O ile nam się wydaje, możemy przyjąć za ogólną zasadę, że strzyżenie koni jest korzystnym dla wszystkich koni, pod warunkiem jednak zachowania pewnych ostrożności higienicznych.

W chwili strzyżenia, które zazwyczaj odbywa się w ciągu miesiąca listopada, pozbawione kłaków, które je pokrywały, należy nakrywać derkami i mieścić w stajniach o łagodnej temperaturze; ktoby nie postępował w ten sposób, naraziłby je na chorobę piersi lub brzucha.

Strzyżenie nie tylko jest użytecznym dla koni, ale wydaje jak najlepsze rezultaty u bydła rogatego; wielu wykarmiaczy każe strzyż woły, ażeby ułatwić mycie, i tym sposobem zachować funkcje żywotne skóry, co się okazuje przez bezustanne pochłanianie i wydzielanie. Bydło niestrzyżone często doznaje świerzbienia, wyciera się wówczas o wszystko co może napotkać, nie doznaje spokoju potrzebnego do należytego tuczenia, pokarmy przyswajają się powolniej; potrzeba ich znacznie się zwiększa. Gruba pokrywa włochata zatrzymuje wszystkie wydzieliny naskórka, których wiatr albo deszcz nie może zabrać, i w końcu nie dozwala czynności fizjologicznych tak ważnych dla skóry, i w skutek tego dla zdrowia zwierzęcia. Wydzieliny naskórkowe pomieszane z kurzem z wewnątrz przychodzącym tworzą bardzo prędko powłokę nieprzenikalną, która zatrzymuje transpirację i jest nasycona materjami stałemi, solami, i tém wszystkiém co z tego powstaje, a czego się wcale nie postrzega; można je oznaczyć na 15 do 17 funtów w ciągu 24 godzin na sztuce dobrze utrzymanej.

Uczeni wykazali, że zwierzęta, którymby zatrzymano za pomocą nieprzemakalnej powłoki normalne wydzielanie wyziewów, padłyby w ciągu dni kilku, i że zawieszenie stopniowe, częściowe tych wyziewów, co może się zdarzyć u zwierząt z gestemi kłakami,

spowodowałoby ważne uszkodzenie żywienia się, i nagłe ochudzenie. Praktyczne postrzeganie jest tu w zupełnej zgodzie z nauką; wszystkim jest wiadomym, że dobre utrzymanie łącznie z czyszczeniem i stryżeniem przyspiesza tuczenie i zmniejsza ilość wody w mięsie zawartą.

P. Richard (du Cantal), w dykcjonarzu rolniczym wyraża się w następujący sposób:

Stryżenie wywołuje najlepsze rezultaty w zwierzętach używanych do pracy, co łatwem jest do zrozumienia z dwóch przyczyn, które zaznaczyć wypada. Działanie skóry odgrywa w życiu zwierząt w ogólności większą rolę, aniżeli przypuszczają powszechnie. Na każdym kroku jesteśmy tego świadkami: najłżejsze zaziębienie, zatrzymanie transpiracji, staje się przyczyną kaszlu, zapalenia płucnej, płuc, choroby piersiowej, często ważnej, a nawet śmiertelnej. Skoro zwierzęta zaopatrzone są całą swoją sierścią, a szczególnie zimową, i kiedy się pocią, dostają na całym ciele pokrywy wilgotnej, która stygnąc, nagle zatrzymuje transpirację skóry, której działanie zatrzymuje się na kilka godzin. Widzimy rzeczywiście zwierzęta, których gęste futro pozostaje przez długi czas mokrą, nie mogąc wyschnąć; niepodobieństwem jest, żeby z tego nie wynikał w stanie zwierzęcia tak przemokniętego niepokój mniej lub więcej ważny, a zwłaszcza jeżeli temperatura powietrza jest niską jak w jesieni, w zimie lub na początku wiosny: dla tego też choroby piersiowe w owym czasie często się przytrafiają. Stryżenie przedstawia podwójną korzyść: nie dozwala zwierzętom łatwego zagrzenia się i obfitego pocenia się, kiedy mają na sobie futro, z jednej strony; z drugiej zaś, nie dozwala im łatwo wysychać, kiedy są mokre. Z drugiej strony, chędożenie zwierząt domowych, zawsze tak ważne, zwłaszcza też w warunkach kiedy się znajdują w robocie, jest zawsze łatwiejszem i skuteczniejszym, kiedy skóra jest krótka i rzadka, aniżeli kiedy jest długa i gęsta. Następnym tego faktu jest, że zdrowie zwierząt strzyżonych mniej jest narażonem na uszkodzenie, pod wpływem należytego działania skóry, i że zwierzęta do roboty używane i na sprzedaż przeznaczone znajdują się w lepszych warunkach produkcji.

Doświadczenia przekonywające wykonane zostały przez pana Cheval. Rolnik ten wziął 12 wołów jednakowej rasy i budowy; 6 ostrzyżono, 6 pozostało nieostrzyżonych i wszystkie otrzymywały tę samą karmę: 6 wołów ostrzyżonych ważyło 6500 funtów, a nieostrzyżonych 7020.

Racja dzienna na każdą sztukę składała się: z 22 funtów wytlóków buraczanych, mięszaniny: koniczyny, słomy bobikowej i słomy, każdy po 12 fun.; kuchów lnianych połączonych 6 funtów, soli 8 funtów.

Przez dwa pierwsze miesiące próby przekonano się, że dział strzyżonych jadał z większą chciwością, do tego stopnia, że się zdawało, że racja nie była wystarczająca, kiedy woły niestrzyżony zaledwie mógł ją wyjeść. Po 6 miesiącach, sześć wołów strzyżonych ważyło 8145 f., sześć wołów niestrzyżonych 7670 f.; pierwsze więc skorzystały 345 f., drugie 150 f., czyli na sztukę strzyżonych po 58 fun. Po tym pierwszym peryodzie, ilość kuchu została powiększoną o 2 f. dziennie na sztukę; po upływie dwóch miesięcy waga wykazała 9285 f. na wołach strzyżonych, 8875 na wołach niestrzyżonych: pierwsze zyskały 190 f., drugie zaś 155 fun.: różnica na korzyść pierwszych 35 na sztuce. W miesiąc później trzeci ważenie; rezultat: woły strzyżone 9750 f., niestrzyżone 9390; pierwsze zyskały 465 f., drugie zaś 315; na każdej sztuce strzyżonych przybyło 102 f., na niestrzyżonych 90 f., korzyść więc na każdym strzyżonym 12 f.

Powtarzamy, że w pierwszym peryodzie 60 dni, woły strzyżone skorzystały 58 f. na każdej sztuce więcej aniżeli niestrzyżone, w drugim peryodzie 60 dni, strzyżone skorzystały 35 fun. więcej na sztuce; nakoniec w trzecim peryodzie 30 dni, strzyżone skorzystały 12 f. na sztuce; w peryodzie więc 150 dni, nabrały przyrostu 130 fun. więcej aniżeli każdy wół niestrzyżony, co jest rezultatem bardzo ważnym, i jasno wykazuje, że ten sposób postępowania potrójnie jest korzystnym pod względem higieny, pracy i tuczenia.

Objawy te mogą być usprawiedliwione jedynie tylko dobrimi

warunkami wszystkich funkcji dobrej i regularnej transpiracji skóry i jej czystości, która funkcjom dopomaga.

Inny użyteczny rezultat, który wypływa z tego doświadczenia jest, że w ciągu 150 dni, przy zadawaniu bardzo skromnych racyj, sześć wołów strzyżonych doszło do przyrostu wagi 5600 f. Czynność ta dała korzyść zadowalającą, nie licząc nawozu, który przedstawia ogromną wartość.

Zachęcamy przeto rolników do stryżenia zwierząt domowych na początku zimy, ponieważ z tego względu znaczne mogą otrzymać korzyści, pod warunkiem ma się rozumieć, że zachowają odpowiednio po temu przepisy.

Może kto zarzucić, że stryżenie zwierząt pociąga za sobą znaczne koszty. Zarzut ten mógł kiedyś być uzasadnionym, ale nie jest takim obecnie, ponieważ są nożyce mechaniczne, za pomocą których robotnik najmniej wprawny może łatwo wykonać tę operację; wreszcie parobcy i pasterze powinni umieć wykonać tę robotę tak samo jak umieją kosić, orać, siać i t. d.

O pomocy przy porodach.

(Ciąg dalszy).

Inna jest sprawa, gdy prócz tego, że płód tyłem wychodzi zamierza, położony jest przytęm na boku lub grzbiecie; w takim razie pomagać należy jak sub B. a) wskazano, inaczej bowiem poród jest niemożliwym.

Również niemożliwym jest poród, gdy płód zwrócony jest tyłem do wyjścia, ale zgięte ma nogi tylne albo w przegubach, albo co gorzej, w stawach biodrowych.

Podczas zgięcia jednej lub obu nóg tylnych w przegubach, łatwo przez pochwę dosięgnąć je można, a po przekonaniu się, że położenie jest tyłem, wyprostować nogi tylne tak, jak przednie w kolanach pozginane. Nadto należy zwrócić jeszcze uwagę na ogon, i ten na nogach tylnych podtrzymywać, by przy wyciąganiu nie skręcił się w bok lub w inną stronę.

Mając do czynienia ze zgięciem nóg tylnych w stawach biodrowych, wówczas należy posuwać ręką od tyłu stawów po udzie i goleni, a ujawszy przegub, dźwignąć go w górę, i zgiąć w nim nogę, zachowując jednakowoż też same przezorości, jakie przy prostowaniu nóg przednich wymieniliśmy. Następnie z tego zgięcia dopiero starać się nogę wyprostować i do pochwy wprowadzić.

W końcu zasługuje poniekąd na uwagę także i położenie ogona, już to nie dla tego, aby wadliwość ułożenia tej części zawadzać miała porodowi, ale że posiadając w sobie kości, obrażenie drogi porodowej spowodować może. Ogon zwróconym bywa niejednokrotnie w stronę prawą lub lewą, zawinięty do góry na grzbiet, lub opuszczony na dół między tylne nogi.

Z położen bocznych i dolnego łatwo go wyprostować, jeżeli tylko dla zyskania wolnego miejsca, płód choć cokolwiek w macicy popchnięty zostanie. Położony zaś ogon na grzbiecie, trzeba najprzód zgiąć w bok, a następnie starać się wyprostować. W każdym jednak razie wyprostowany ogon ułożyć należy na nogach tylnych i podtrzymywać przy wyciąganiu, by znów nie zboczył i pracy nie pomnażał.

W ogóle porody niemożliwe jak i ciężki osłabiają zwierzęta, użycie więc środków wzmacniających i tu wskazanem będzie.

4. *Przypadłość i chorobowe matek po porodzie.* Do najczęstszych takich przypadłości zalicza się przedewszystkiem:

A. Zatrzymanie miejsca czyli nieoczyszczenie się. Pod tą nazwą rozumiemy opóźnienie albo nawet i niemożliwość wydalenia z macicy błon płodowych. Podobny wypadek rzadko trafia się u kłaczy, częściej ma miejsce między przeżuwaczami, a szczególnie między krowami; u kłaczy bowiem połączenie błon płodowych z macicą jest węższe, zatem łatwiej się oddzielające, aniżeli u tych ostatnich, u których błony płodowe, czyli tak zwane miejsce albo

łożysko, ściślej do brodawek macicznych przylega. W stanie prawidłowym pozbywają się krowy miejsca zwykle w przeciągu 6—12 godzin po odbytych porodzie; dłuższe tedy nad powyższy okres zatrzymanie się miejsca w macicy uważać należy za pewne zбочzenie, które same sobie zostawione do niekorzystnych doprowadza następstw.

Niemocności rychłego oczyszczenia się krowy lekko traktować nie można, albowiem miejsce ulega powolnemu gniciu, a to dokonywając się w macicy, naraża ją na rozmaitego stopnia drażnienia; ztąd powstaje ostre lub przewlekłe zapalenie tego organu, wrzody, nadymanie się krowy, a ztąd i opadnięcie macicy, zmiany w mleku tak pod względem jakości, jako i ilości i t. d.

Przyczyny zatrzymania miejsca bywają następujące:

a) Za silny związek błon płodowych z macicą, a to z powodu niedojrzaenia tegoż przez przyspieszony czas porodu, naczynia więc miejsca i macicy nie łatwo się w brodawkach macicznych od siebie odzielają.

b) Kurcz w szyi macicznej, w skutek czego choćby było dążenie do pozbycia się łożyska, to te ściśnięte w szyi macicznej, na zewnątrz wydostać się nie może. Powodem powstania znów kurczu bywają najczęściej dozorczy krów, którzy w przesądnem mniemaniu, jakoby krowie po porodzie coś niewytłómaczenie dobrego zdziałać chcieli, polewają ją na krzyż zimną wodą, lub dają takową zaraz do picia, lub wreszcie nie czekając, podsadzają młode cielę do ssania; rychłe podrażnienie wymienia spowodowya opóźnienie czynności macicy ku wydaleniu miejsca.

c) Brak bólów porodowych, bądź to w skutek niemocy, podeszłego wieku matki, ciężkiego porodu, bądź wreszcie w skutek wycieńczenia.

Oznaki łatwe są do spostrzeżenia. Po dokonany peryodzie krowa nie czyni żadnego przygotowania do pozbycia się miejsca, czyli nie sili się wcale. Z rodnicy występuje miejsce, które jako grubsze lub cieńsze czerwone pasmo niekiedy aż poniżej przegubów się zwiesza; i jeżeli nieoczyszczenie się trwa czas dłuższy, np. dwie doby albo i więcej, natenczas miejsce wydaje nieprzyjemną woń, gnicie zapowiadającą.

Pomoc. Gdy krowa 24 godzin po porodzie oczyścić się nie mogła, wątpić wypada, czy ona sama przez się czynności tej dokona, i należy przystąpić do ułatwienia, a to polega albo na podaniu środków wewnątrznych, kurczenie macicy wywołujących, albo na pomocy sztucznej.

Jako środka czyszczenia przyspieszającego używa się liści sawinowych czyli sabinowych (*herbae sabinae*) w formie następującej: weź liści sawiny i siemienia lnianego po dwa luty, nalej wrzącą wodą w ilości 3 kwaterki, przykryj w naczyniu na kwadrans, poczem precedź, ostudź i zadaj krowie wewnątrz na raz. Taką dawkę powtórz rano i wieczór. Siemię lniane nie wywiera wprawdzie żadnego wpływu na macicę, wszelako służy tutaj do złagodzenia silnego działania sawiny na błony śluzowe przyządu trawienia; można użyć w tymże celu sporycz (*secale cornutum*) sproszkowany w ilości 1 luta z ciepłym piwem lub naparem rumiankowym (pół kwarty).

Najpewniejszym i zarazem najbezpieczniejszym środkiem jest pomoc sztuczna, polegająca na oddzieleniu ręką miejsca i wyjęciu z macicy. Przed przystąpieniem do tej operacji należy poobcinać i porównać u ręki paznogie, ogrzać ją przez zanurzenie w ciepłej wodzie, przygotowanym odwarem z siemienia lnianego posmarować, a następnie do pochwy i macicy wprowadzić (patrz pomoc przy porodach ciężkich w zeszłym numerze).

Wprowadzoną ręką, a mianowicie poduszczkami palców starać się trzeba oddzielić powoli miejsce od brodawek macicznych, ręką zaś drugą ujmując się wiszącą na zewnątrz część miejsca, i lekko za nie pociąga, aby tym sposobem oddzielenie ułatwić.

Mocnego pociągania należy unikać, a to z powodu obawy przedarcia się miejsca, co w następstwie utrudnia oddzielenie, — wreszcie z powodu silnego drażnienia macicy, która wraz z miejscem wśród nadymania się krowy, częściowo lub całkowicie na zewnątrz wyciągniętą być może.

Gdyby połączenie łożyska z brodawkami było jeszcze silnym, nie można gwałtownie go odrywać, bo z porozrywanych naczyń krwotok nastąpi, lecz dalszą sprawę pozostawić do dnia następnego.

Przez taką bowiem pauzę więcej dojrzeje, będzie więc łatwiejszym zwalczenie go; a powtórę manipulując ręką w macicy, pobudza się ją do kurczenia, co także oddalenie miejsca znacznie w dniu następnym ułatwić może. Gdyby i po zrobionej pauzie jeszcze trudno było odłączyć miejsce od wielu brodawek, wówczas jeszcze wstrzymać się jedną dobę z zupełnym wyjęciem, by niecierpliwością więcej z niego nie spowodować.

Po dokonanej operacji nagromadzone płyny z macicy ręką wygarnąć, a gdyby odznaczały się odrażającą wonią, natenczas wstrzyknąć do macicy lekkiego naparu rumiankowego kwaterkę do pół kwarty, w celu przepłukania tegoż organu.

Troskliwie przestrzegać należy dozorców bydła, aby zaniechali nagannego zwyczaju przywiązywania ciężarów do wiszącego miejsca, jak np. kawałów drzewa lub kamieni; tego rodzaju przesądna pomoc pobudza krowę do nadymania się, częstokroć nawet silnego, a gdy związek łożyska z macicą jest jeszcze silny, można łatwo spowodować wydęcie krowy, czyli wywiniecie macicy.

B. Krwotok maciczny. Już sama nazwa określa istotę cierpienia, któremu ulegają wszystkie gatunki zwierząt domowych.

Przyczyny. Krwotok maciczny trafia się najczęściej po porodzie lub poronieniu, gdy w skutek słabego kurczenia się macicy naczynia żyłne tego organu dłuższy czas są otwarte; ale co częściej się zdarza, krwotok spowodowany bywa nieostrozną pomocą przy porodzie lub nieodehodzeniu miejsca, przez gwałtowne pociąganie płodu lub błon jego, wreszcie przez zadarcie ściany macicznej paznogciami lub raciami noworodka.

Oznaki. Z pochwy macicznej wyszła się w mniejszej lub większej ilości krew, bądź to płynna jeszcze, albo już skrzepnięta. Krowa przytém okazuje niepokój, nadyma się i gdy krwotok trwa czas dłuższy, to w skutek utraty krwi powstaje osłabienie choréj.

Aby uniknąć pomyłki w dyagnozie krwotoku macicznego i moczeniu krwią, zapamiętać wypada, iż przy pierwszym krew wychodzi bezprzestannie, podczas zaś ostatniego li w wydzielonej urynie spostrzegać się daje.

Zadaniem pomocy w podobnych wypadkach jest wywołanie kurczenia się macicy, ażeby tym sposobem pozamykały się naczynia krwionośne, i krew z nich wylewać się przestała. W tym celu używa się szprycowań do macicy z zimną wodą (kwaterkę do półtory), albo z lekkiego odwaru kory dębowej w takiejże ilości w stanie oziębionym. Podobne szprycowania powtórzć można trzy do czterech razy dziennie; przed użyciem jednak tego lub owego środka trzeba wprowadzić ręką do macicy i krew tam nagromadzoną na zewnątrz wydostać. W razie nieustawiania cierpienia poprzednie środki wesprzeć sawiną lub sporyszem wewnątrz zadany, jak sub 4. A. wskazano.

C. Wywiniecie czyli opadnięcie macicy, w języku pospolitym tak zwane wydęcie się, jest to wystąpienie macicy ze swego położenia na zewnątrz. I tę przypadłość najczęściej u krów wkrótce po porodzie lub odejściu miejsca spotykamy.

Przyczyną opadnięcia macicy bywa nagłe powstanie silnych bólów porodowych, zatem gwałtowne nadymanie się krowy, w skutek czego osłabiają się więzy maciczne, i ta wkrótce po pozbyciu płodu na zewnątrz wychodzi; następnie nieumiejętna pomoc przy porodzie lub nieoczyszczeniu się, polegająca na gwałtownym wyciąganiu płodu lub błon jego; wreszcie drażnienie macicy ze strony wybroczonej do jęj wnętrza krwi lub części pozostałego łożyska.

Oznaki Opadnięcie macicy może być częściowe lub całkowite. Częściowe ma miejsce, gdy macica wejdzie tylko w pochwę, i z rodnicy mało albo i zupełnie nie jest widzialną. Badanie ręką o stanie rzeczy przekonywa dokładnie; krowa w tym wypadku niepokoi się i nadyma, i gdy objaw ten ostatni nie ustępuje, ale przeciwnie wzmagać się będzie, natenczas opadnięcie częściowe przechodzi w całkowite. Jeżeli zaś nadymanie krowy nie dochodzi wysokiego stopnia, a przytém ustępuje powoli, natenczas macica wraca do pierwotnego swego położenia.

Wywiniecie jest zupełnym, gdy macica w całości na zewnątrz się wydostanie; wisi ona natenczas jakby worek aż do przegubów się zwieszający, powierzchnia jęj wewnętrzna będzie teraz zewnętrzna, na której widoczne są brodawki rozmaitej wielkości, niekótóre rozmiarów pięści dochodzące. Z powodu upośledzonego obiegu

krwi, macica przedstawia się mocno zaczerwienioną, niekiedy aż fioletową, brodawki sine (lud niezający brodawek macicznych zwie je kretowinami, żabkami, i to jedynie uważa za przyczynę wydeścia się).

Wpływ opadnięcia macicy jest groźny, albowiem zatamowaniem częstokroć bywa wydzielanie moczu z pęcherza, a powtórne zastój krążenia krwi w macicy doprowadza do jej oziębienia i zgorzeli. Niekiedy znów drażnienie bywa tak mocne, że wśród nadymania się, i kiszki cienkie wraz z macicą opuszczają prawidłowe swe miejsce, a wówczas prawie bez ratunku śmierć następuje. — Częściowo opadnięcie wprawdzie mniej jest niebezpieczne, to jednakże ze względów, że przez powtarzanie się przejść może w całkowite, powinno pilną zwracać na siebie uwagę.

Pomoc w tym wypadku zasadza się na zwróceniu macicy do jamy brzusznej i obrząszeniu środków tamujących powtórne jej opadnięcie. Ażeby wypełnić wskazanie pierwsze, należy naoliwić lub odwarem lnianym nasmarowaną rękę wprowadzić do pochwy i opierając się dłonią całą na macicy, wpychać ją powoli do właściwego miejsca, i to w chwilach wolnych od silenia się chorój, albowiem gdyby ta okoliczność nie była uwzględniona, lub gdyby operacją powyższą wyprostowanymi palcami wykonywano, skaleczenie macicy byłoby prawie nieuniknionem. Przeciw ciągnięciu sileniu się krwi, co by powrót macicy uniemożliwiało, użyć naciskania na grzbiet ręką lub kijem, mocnego związania sznurem klatki piersiowej (po za łopatkami), by krowa wiele powietrza wciągnąć w siebie, a tém samém i nadymać się nie mogła. Niekiedy pożądaną skutek przynosi naszczekiwanie psa znajdującego się przed krową, która zwraca wówczas nań swą uwagę, a lękając się szczekania, pozwala operację dokonać w zupełności. Gdyby i ten środek okazał się bezowocnym, użyć cieplej wódki pół kwarty w celu spojenia krwi; gdyby ta ilość była niedostateczną, w kwadrans powtórzyć taką dawkę. Narkotyzowanie zwierzęcia ze względu na niebezpieczeństwo pozostawić należy weterynarzowi.

Częściowe opadnięcie macicy przy postępowaniu w sposób powyższy może być najdokładniej usuniętem.

(d. c. n.)

ROZMAITOŚCI.

Poprawne żłoby. Niejeden z gospodarzy zauważał zapewne, że konie dany im obrok w zwykłym żłobie pyskiem zesuują a nawet ze żłobu wyrzucają. Aby więc temu zapobiedz, radzą hodowcy koni następujące urządzenie: w poprzek żłobu przybija się łąty w takich odstępach, aby między nie zmieściła się tylko dolna połowa głowy konia, dno zaś żłobu pod otworami listew powinno być jajowato wyżłobione, aby zwierzętom branie obroku ułatwić.

Maszyna do szycia mat, wynalazku Goodey Stanstead'a, która znajdowała się pomiędzy innymi na tegorocznej wystawie w Bremie, szyje za pomocą dwóch rzędów nici maty, jakich powszechnie używają ogrodnicy do pokrywania inspektów. Uwzględniając szybkość pracy tej maszyny, przyznać jej trzeba użyteczność wielkiej doniosłości dla tych gospodarstw, w których większą część zbiorów zboża i siana przechowują w stertach. Spóźnione pokrywanie stert, a to głównie z powodu braku robotnika, naraża często na znaczne straty, których użyciem mat łatwo uniknąćby można, a kosztowna maszyna o której mowa, mogłaby się w większym gospodarstwie nawet w jednym roku wypłacić (kosztuje bowiem 30 ft. szt.) Mniejsi gospodarze posługiwaliby się nią mogli na koszt wspólny, a trudno zaprzeczyć, że drogą przedsiębiorstwa dałyby się podobnie jak przy użyciu innych wypożyczanych na pewien czas maszyn — znaczne korzyści z pożytkiem dla rolników wyciągnąć.

Petroleum jako materiał opałowy. Amerykanin Merg proponuje, ażeby używając petroleum jako materiału opałowego, postawić na miejscu rusztów wanieńkę z wodą, do której wprowadza się patroleum, rurką przechodzącą przez dwa wanieńki. ze zbiornika jak najdalej umieszczonego. Petroleum w skutek mniejszej ciężkości gatunkowej wypływa na powierzchnię, i po zapaleniu można wzmocnić płomień przez wdmuchiwanie powietrza. Merg oświadcza, że sposób ten od roku już jest w użyciu w jego fabryce, i daje mu 50% oszczędności na materyale opałowym.

Ułatwiony sposób ratowania koni w czasie pożaru, polegać ma na włożeniu uprzęży na konie pociągowe, a siodła na wierzchowe, poczem dają się wedle podania pism francuzkich, z łatwością ze stajni wyprowadzić.

SPRAWOZDANIE TARGOWE.

Gdańsk 17 marca. (Zboże). Od wczoraj mróz. Wiatr północny, ostry.

Pszonica w miejscu; dowóz nie był dziś znaczny, chęć zaś do kupna była ożywiona, ceny mocne. Obrót 250 ton. Płacono za jarą 129 fun. 174 m., 133 f. 175½ m., czerwoną 130, 132 f. 178, 180 mk., czerwoną 130, 132 f. 178, 180 m., murzącą lecz jasną 125/6 fun. 174 m., 128, 133/4 f. 183 m., pstrą 128 fun. 182 m., jasnopstrą 132 f. 185, 186, 187 m., bardzo pstrą i szklistą 132 f. 195, 196, 198 m. za tonnę. Usposobienie do interesów na dostawę młodsze. Kwiecień-maj żądano 187 m., czerwiec-lipień żąd. 192 m. Cena regul. 183 m.

Żyto w miejscu, prawie bez zmiany; wilgotne 122/3 f. 141½ mk., 125 f. 145 m., 129 f. 148 m., za tonnę. Obrót 50 ton. Interes terminowy bez podaży. Cena regul. 140 m.

Jęczmień w miejscu, większy z wonią 117 fun. płac. 148 m. za tonnę.

Groch w miejscu, cukrowy pł. 53 m.

(G. H.)

CENY St. PETERSBURGSKIE Z DNIA 6 (18) MARCA.

		Najniższe		Najwyższe	
		Rs.	kop.	Rs.	kop.
Żyto (waga 8 pudów 30 funt.)	czwert	6	60	6	70
Pszonica z dostawą na Maj	czwert	9	50	10	50
Owies (6 pudów) z dostawą na maj	czwert	4	70	4	85
Jęczmień (8 pudów)	czwert	—	—	—	—
Siemie lniane	czwert	12	85	13	—
Łój	berkowiec	49	—	50	—
Olej lniany	pud	—	—	3	50
Olej konopny	pud	3	60	3	70
Cukier I gatunek (König)	pud	—	—	—	—
Cukier I gatunek (Szuchów)	pud	—	—	—	—
Mączka cukrowa	pud	—	—	—	—
Spirytus	—	—	—	—	—
Potaż	berkowiec	—	—	—	—
Konopie z dostawą na maj	berkowiec	34	—	35	50
Wetna rossyjska biała	—	—	—	—	—
Wetna rossyjska czarna	—	—	—	—	—
Kartofle (worek równy 2 czwterykom)	—	—	—	—	—
Wolowina	pud	3	40	5	25
Cielęcina	pud	4	20	8	—
Mąka kartoflana	pud	—	—	—	—

NB. Te ceny są nadesłane przez agencję: Hannemann et Com. Agenten Landwirtschaftlichen Gesellschaften. Telegram Adresse Hannemann. Petersburg.