

Rośliny okopowe.

(Ciąg dalszy. — Patrz Nr. 38).

Zbadajmy teraz bardziej szczegółowo ten wpływ nawozu na plony roślin okopowych i sposób w jaki one zmieniają ilość i jakość ze stanowiska ich wartości pożywniej.

Ziemia dostatecznie nawieziona dobrym i obfitym nawozem stajennym, pochodzącym zwłaszcza od bydła tuczonego, wydaje zawsze plon bujny i obfity roślin okopowych, z wiloczną dążnością rozwijania się liści i łodyg, i to w stopniu nadzwyczajnym. Skutek ten szczególnie jest widocznym przy użyciu nawozu, kiedy zwierzęta są żywione makuchami i mąką jęczmienną i innymi pokarmami obfitującymi w pierwiastki azotowe.

Jeżeli jesień jest sucha i ciepła, rośliny okopowe, uprawiane w ziemi obficie nawożonej, ciągle rosną i w końcu wydają bardzo dobrze plony tak co do ilości jak i jakości, a zwłaszcza jeżeli czas jest sprzyjający aż do końca października. Wtedy to otrzymuje się najlepsze rezultaty z nawozu: którym się bogaci ziemia. Ale, jeżeli przeciwnie, późna jesień jest za bardzo zimna i dżdżysta, to silne i obfite nawiezenie służy tylko do podtrzymywania bujnego wzrostu łodyg i liści kosztem kłębów, które w tej właśnie porze dojrzewać powinny. W tych niekorzystnych warunkach, ten bogaty nawóz daje rezultat oplakany, albowiem soki podniecane w liściach i w łodygach pod wpływem wilgoci i bogactwa nawozu zawartego w ziemi, nie nagromadza się w kłębach, i te ostatnie pozostają wątłymi i nie dochodzą do dojrzałości. Ztąd wynika naturalnie w tych roślinach okopowych znaczne ubóstwo wartości pożywniej.

Jakkolwiek rośliny okopowe mogą być duże, są jednak wodniste i gąbczate, niespoiste i nietrwałe, jeżeli ulegają tym rozmaitym wpływom. Szczególniej ubogie są one w cukier i w ogóle mniejszą mają wartość pożywną, aniżeli wtenczas, gdyby były wyprodukowane, przy jednakowych okolicznościach temperatury, w ziemi nie tak silnie nawiezionej.

Główną przyczyną tego braku dojrzałości i ubóstwa pierwiastków pożywnych w burakach uprawianych na ziemi nadwyzczaj silnie nawiezionej, jest zbyt duża ilość pierwiastków amoniakalnych i azotowych, jakie zawierają nawozy bogate i dobrze przegniłe. Rzeczywiście liczne doświadczenia wykazały, że skutki soli amoniakalnych i azotowych, łatwo przyswajalnych, mają dążność szczególną do rozwijania wzrostu liści i przeciągania peryodu tego wzrostu kosztem kłębów, a zwłaszcza dojrzałości tych ostatnich. Dla tej to przyczyny w klimacie tak niepewnym i tak wilgotnym jaki jest w Anglii, rośliny okopowe rzadko kiedy dochodzą do dojrzałości zupełnej, z powodu samego bogactwa ziemi.

Można przeto utrzymywać, że jest pewne niebezpieczeństwo w silnym nawożeniu pod uprawę roślin pastewnych, a chęć otrzymywania wielkich plonów buraków często prowadzi najlepszych gospodarzy do tego, że nie oceniają jak się należy tego niebezpieczeństwa.

Prawdą jest, że buraki są bardzo wymagające; są grunta, które ogromną ilość nawozu pochłaniają. Ale należy skonstatować różnicę jaka istnieje pod tym względem pomiędzy rozmaitymi warun-

kami ziemi i klimatu. Znajdują się naprzykład, grunta gliniaste, bogate z natury i zawierające ogromne zapasy pierwiastków pożywnych, jakie sobie rośliny okopowe bardzo łatwo przyswajają. Grunta tego gatunku nie potrzebują dobrej uprawy głębokiej i roboty, która rozpułchnia należycie warstwę wierzchnią, ażeby te wszystkie bogactwa natury poddać na użytek bezpośredni plonów na niej uprawianych. Dawać zbyt dużą ilość nawozu takiej ziemi, byłoby widocznym błędem, nawet wtenczas kiedy rzecz idzie o buraki. W wielu razach otrzyma się lepszy plon, dając tylko w jesieni półnawóz stajenny, i rozsiewając na wiosnę razem z nasieniem, 440 do 625 funtów nadfosforanu wapna na morg. Nadfosforan, jakżeśmy to już wykazali, przyspiesza dojrzewanie kłębów.

Rolnicy skarżą się często, że buraki wywierają skutek rozwalniający na zwierzęta, i że się nie przechowują. Skargi te są tylko sposobem wyrażania się, że plon niedoszedł do zupełnej dojrzałości, i w wielu razach przyczyna tego niedojrzewania w kłębach wynika wprost z nadmiernej ilości pierwiastków azotowych i amoniakalnych, które dodano gruntowi ziemi pod postacią nawozu zbyt bogatego w te pierwiastki.

Te same niekorzystne rezultaty wynikają ze zbyt wielkiego zastosowania guana albo siarczanu amoniaku, i w ogóle wszystkich nawozów silnie azotowych.

Nie można zanadto powtarzać, że te nawozy azotowe przyspieszają bujność wzrostu łodyg i liści kosztem korzeni, które w takich warunkach, nigdy nie dochodzą do zupełnej dojrzałości.

Rośliny okopowe dobrze rozrośnięte, silnie wzrastające, zawsze zawierają znakomicie więcej wody i więcej pierwiastków mineralnych stanowiących popioły, aniżeli rośliny mniej silne i w tym samym wieku, i z tych spostrzeżeń można wyprowadzić wniosek, oparty na doświadczeniach wykonanych z największą naukową ścisłością, że wielkie kłębki, w ogóle znakomicie mniej są pożywnymi, aniżeli średnie i nie dochodzą do zupełnej dojrzałości.

Buraki zwyczajne podobne są bardzo do buraków cukrowych ze swego składu chemicznego, pokazuje się jednak, że buraki wielkie cukrowe zaledwie tyle są warte co buraki zwyczajne. Co się zaś tyczy buraków potwornych, takich jakie widzimy na wystawach płodów rolniczych, ozdobionych nagrodami honorowymi, są one zawsze wodniste, ubogie w cukier, i że się tak wyrazimy, nie mają żadnej wartości pożywniej.

Ten wielki stosunek wody w roślinach okopowych połączony jest z wielką ilością składników białkowatych i substancji mineralnych, których nienapotykamy w roślinach okopowych zawierających większą ilość materij pożywnych. Jak to już było powiedzianem, wielka ilość substancji białkowatych i popiołów wskazuje w roślinach okopowych brak dojrzałości i niewielki stosunek cukru, i warunki te są zawsze rezultatem zbyt wielkości korzeni i nadmiarem nawozu azotowego.

Kiedy mówimy o wpływie, jaki wywiera na rośliny okopowe ich objętość, niech nam wolno będzie zamieścić kilka uwag o nieodporczym zwyczaju dawania na konkursach nagród roślinom okopowym jak największym, wystawianym jako objawy dobrego gospodarstwa, a tém samem zasługującym na nagrodę i zachętę.

Z pewnością nie jest trudną rzeczą wyprodukowanie roślin okopowych potwornych. Przy obfitym nawożeniu i w dostatecznych odstępach, nie łatwiejszego jak otrzymać te produkty fenomenalne, które na wystawach w osłupienie wprawiają tylko ludzi nieświadomych i lubiących się przyglądać rzeczom nadzwyczajnym. Ale do

czego to ma służyć i do czego tu zachęcać, kiedy okazy takie zawierają niekiedy aż do 94 na 100 wody i nieznaczoną ilość cukru.

Wpływ ogólny nawozów na wagę plonu i na wartość roślin okopowych, dobrze jest znanym przez rolników praktycznych. Następujące doświadczenia dadzą dokładne wyobrażenie o tym znakomitym wpływie i posłużą do oznaczenia działania we wszystkich szczegółach.

Trzy gromady buraków cukrowych, każdy złożony z czterech kłębów, dały przy rozbiórce następujący rezultat:

	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.
Wody	85.60	85.59	89.09
Białka	1.47	1.66	1.27
Cukru krystalicznego	8.56	7.87	6.73
Pektyny	0.54	0.75	0.45
Włókna nierozpuszczalnego	2.87	3.06	2.48
Materyi mineraln.	0.96	1.67	0.98

100,00 100,00 100,00

Buraki gromady Nr. 1 były siane siewnikiem, od 13 do 15 maja, w odległości pomiędzy rzędami, po 14 cali i w odległości rośliny od rośliny cali 5. Pod tę gromadę nie mierzwiono wcale. Zbór poprzedni, który stanowiły buraki pastewne, otrzymał nawóz stajenny w stosunku około 63 tonn na hektar, sprzęt zaś był 410 centnarów z morga.

Buraki Nr. 2 siane 11 i 12 maja w odległości 22 cali pomiędzy rzędami i 5 cali roślina od rośliny, otrzymał nawóz stajenny. Sprzęt poprzedzający stanowiła rzepa szwedzka i wydała 620 centnarów z morga.

Buraki Nr. 3 były siane 16 maja na płask w odstępach 13 cali pomiędzy rzędami. Przestrzeń ta była nawieziona. Przed burakami był owies, a po nim rzepak jako uprawa ukrańska. Zbiór tych dwóch plonów wynosił 320 centnarów z morga.

Rezultaty tego doświadczenia są ważne z tego powodu, że wykazują niebezpieczny wpływ bezpośredniego nawożenia obornikiem pod buraki cukrowe, a zwłaszcza jeżeli buraki były późno zasiane.

Widzimy rzeczywiście, że buraki Nr. 1 siane bez nawozu, dały 8.56 na 100 cukru; siane na średnim umiarkowaniu dały 7.87, a na całym nawozie zaledwie 0.73 na 100 cukru.

Należy również unikać dawania pod buraki cukrowe, w znacznej ilości guano peruwiańskiego, siarczanu amoniaku, krwi wysuszonej i w ogóle wszystkich nawozów silnie azotowych, zwłaszcza kiedy działamy na gruntach silnych zawierających wiele gliny i które z natury są zimne i niezdolne do szybkiej roślinności plodów na nich zasiewanych.

Z innej strony, guano czyste, albo lepiej jeszcze guano rozpuszczone, jest wyborym nawozem pod rośliny okopowe na gruntach lekkich, które tak samo jak grunta piaszczyste, w dobrym gatunku, są właściwymi do szybkiego wzrastania i do wczesnej dojrzałości uprawianych na nich plodów. Na tych gatunkach gruntów, znanych powszechnie pod nazwą gruntów ciepłych, zastosowanie nawozów amoniakalnych i azotowych taki sprawia skutek, że się przeciąga wzrost roślin okopowych, a tym samym, przyswajanie przez te ostatnie pożywienia, jakie czerpią z atmosfery, i z tej przyczyny guano peruwiańskie i nawóz stajenny dobrze przegniły są tak wysoko szacowane przez rolników szkockich, którzy na lekkich gruntach swoich otrzymują znakomite plony.

Jako regułą główną należy używać nawóz stajenny w jesieni; rzecz ta jest dowiedziona najdawniejszymi doświadczeniami. Nawozy amoniakalne, jak guano i siarczan amoniaku, mogą być rozsiewane rzutem w jesieni, albo bardzo wcześnie na wiosnę, ale nie zasiewane siewnikiem razem z ziarnem, ponieważ wszystkie nawozy amoniakalne, wbrew zdaniu powszechnie przyjętemu, przyczyniają się do opóźnienia wzrostu roślin. Dla tego też nawozy te powinny być rozdzielone równo i lekko i dobrze umieszane z wielką ilością ziemi, i tak, żeby nie znajdowały się w bezpośrednim zbliżeniu do młodych roślin turnepsu i buraków.

Wykonano wiele doświadczeń w tym przedmiocie, i zawsze znajdowane, że na gruntach umiarkowanie silnych, guano peruwiańskie, siarczan amoniaku i nawóz bardzo przegniły, jednym wyrazem wszystkie nawozy bardzo w azot obfite, które ku końco-

wi pory podtrzymują roślinność bujną i długotrwałą, opóźniają działalność roślinności w początku rozwoju. Nie na gruntach to silnie rozwożonych, ale na gruntach lekkich i z natury ubogich, rośliny okopowe dochodzą prędzej do okresu obsypywania i przerywania.

Zwracano również bardzo często uwagę, że na gruntach świeżo nawiezionych, owady napastują z większą zaciętością młode rośliny w początku wzrostu, aniżeli na gruntach w jesieni nawiezionych. Sądzę, że wyjaśnienie tego faktu, dobrze doświadczonym rolnikom znanego jest to, że na gruntach nawiezionych w jesieni, pierwiastki azotowe nawozu są zupełniej pochłonięte i rozdzielone w masie ziemi, aniżeli w gruntach nawiezionych w chwili zasiewu. W tym ostatnim razie, młoda roślina znajduje się w zetknięciu bezpośrednim z nawozem nie zupełnie jeszcze rozłożonym czyli przetworzonym przez działanie chemiczne ziemi, i ponieważ rozwój młodej rośliny się opóźnia, przedstawia ona mniej siły, a tym samym mniej stawia oporu napastowaniu owadów, które owładnąwszy ją, łatwiej niszczą.

(d. n.)

Przyswajanie roślin.

Proste porównanie ilości materji organicznej czyli spalnej w mierzwie stajennej wywiezionej na daną przestrzeń roli, ze stosunkowo bardzo wielką ilością tejże materji sprzątanęj z tej samej przestrzeni w rozmaitych plonach w ciągu rotacyi, wyrabia w nas przekonanie, że materje organiczne w roślinach się wytwarzają. I ściśle przeprowadzonym doświadczeniem stwierdzić to można, albowiem zasadzone w wypalonym piasku ziarno pszenicy, grochu, hreczki lub innej jakiegokolwiek rośliny zielonej, wystawione w odpowiedniej temperaturze na wpływ światła i polewane od czasu do czasu wodnym roztworem różnych soli, rozwija się w roślinę wydającą niekiedy stokrotny owoc, a waga materji organicznych w ten sposób wyrosłej rośliny, jest niekiedy kilkaset razy większą, niż waga tychże materji w nasieniu, z którego powstała. W roślinie tej wytworzyła się więc wielka ilość substancji organicznych z nieorganicznego materiału; odcieśliśmy jej bowiem sposobność pobierania już gotowej substancji organicznej.

Materje organiczne czyli spalne tworzą się w roślinach pod wpływem światła z wody i kwasu węglowego. Cały ten proces wytwarzania materji organicznej z materiału nieorganicznego, jakim jest kwas węglowy i woda, nazwany „przyswajaniem“ (assimilatio) jest pierwszorzędного znaczenia tak dla życia roślinnego, jak pośrednio i dla zwierzęcego.

Materje organiczne złożone bowiem jedynie z węgla, wodoru i tlenu, a powstałe drogą przyswajania, rozmaicie przemienione, a w części przez przyjęcie azotu na białkowe ciała przerobione, zużywa roślina do wzrostu swoich organów. Gotowe ciało roślinne zaś jest głównym zwierzęt pokarmem.

Rośliny zielone przygotowują sobie pożywienie z materji nieorganicznych; stąd cały proces przyswajania możnaby porównać z pobieraniem pokarmów przez zwierzęta, które nie mogą go sobie same wytwarzać, pobierają go już gotowym w formie materji roślinnej lub zwierzęcej z roślinnej utworzonej.

Przyswajanie pociąga za sobą pomnożenie materji organicznej w roślinie; inny, wyższemu wprost przeciwny proces, a mianowicie oddychanie, które u roślin w zasadzie jest takie same jak u zwierząt, przyczynia się do ciągłego ubytku rzeczonych materji. Ponieważ jednak ilość materji organicznej drogą przyswajania w przeciągu sześciu godzin wytworzona, wystarcza do podtrzymywania oddychania przez 24 godzin, stąd tlomaczy się w ogółu przyrost ciała roślinnego w długich dniach wiosny i lata, gdy rośliny przez 12 do 16 godzin na wpływ światła są wystawione.

Przyswajanie, t. j. wytwarzanie bezazotowej materji organicznej z nieorganicznej materji, a mianowicie z kwasu węglowego i wody, odbywać się może jedynie w komórce zieleń (chlorophyll)

zawierającej pod wpływem światła i ciepła, przy obecności pewnych soli mineralnych.

Liście, łodygi, źdźbła i gałązki naszych roślin uprawianych składają się przeważnie z komórek, których wnętrze w znaczącej części wypełnia ciało białkowe zwane pierwoszczem (zarodź) (protoplasma). Przeważna masa pierwoszczu przyjmuje formę kuleczek zielonym barwnikiem zafarbowanych. W tych to gałeczkach zieleni, jak je powszechnie nazywają, tworzą się pod wpływem światła drobne ziarenka skrobi czyli mączki, rosnące i wypełniające przy sprzyjających warunkach znaczną część rzeczonych gałeczek. W ciemności rozpuszczają się ziarenka skrobi i znikają przez to z gałeczki, a pod wpływem światła na nowo się tworzą. U niektórych roślin można w ciągu dnia przez powtarzane naprzemian wystawienie ich na wpływ światła i następne przeniesienie w miejsce ciemne spowodować dwa, trzy i więcej razy takie pojawienie się i znikanie ziarenek skrobi, dające się pod dobrym mikroskopem z łatwością zaobserwować.

Otóż owe ziarenka skrobi uznał najprzód Sachs za pierwszy dostrzegalny utwor przyswajania, a niemal wszyscy badacze, którzy następnie przedmiot ten doświadczeniami obrabiali, stwierdzili to zdanie. Mączka, krochmal czyli skrobia (amylum) stanowi węglowodan, powstający z kwasu węglowego i wody, przyczem wolny tlen uchodzi.

Objętość tlenu wydzielonego przy przyswajaniu równa się objętości i zużytego przy tym kwasu węglowego, oprócz tego ilość tlenu wydzielonego przez daną roślinę lub część roślinną, jest miarą szybkości przyswajania w niej się odbywającego.

Ze mączka jest pierwotnym utworem dostrzegalnym przyswajania, a nie tworzy się pod wpływem światła z innych organicznych zawartości komórkowych, np. z cukru, jak to Boehm¹⁾ w najnowszym czasie udowodnić usiłował, dowodzi cenna praca naszego fizyologa Godlewskiego²⁾. Wykazał on, że roślina umieszczona w atmosferze pozbawionej kwasu węglowego, pod wpływem światła w gałeczkach zieleni mączki nie tworzy, a utworzona już mączka znika podobnie jak w ciemności.

Lubo u bardzo wielkiej liczby roślin mączka występuje jako pierwszy dostrzegalny utwor przyswajania, to są jednak pewne rośliny, których gałeczki zieleni nigdy mączki nie zawierają; w tych cukier gronowy, jak np. u cebuli, lub też kropelki tłuszczu, jak u kaktowatych, stanowi pierwszy utwor dostrzegalny przyswajania.

Potrzebny do przyswajania kwas węglowy pobiera roślina tak z atmosfery jak i z roli; pierwsze źródło jednak jest dla niej o wiele ważniejsze, niż drugie.

Pewną, bo drogą doświadczeń stwierdzoną jest rzeczą, że utwory przyswajania z kwasu węglowego i wody działaniem promieni słonecznych w gałeczkach zieleni powstają; do orzeczenia bliższego, w jaki sposób gałeczki zieleni współdziałają przy rzeczonym procesie, brak nam jednak wszelkich podstaw; tyle jedynie wiemy, że nie sam zielony barwnik tych gałeczek, ale substancja pierwoszczu główną masę gałeczek tworząca wraz z barwnikiem przy przyswajaniu jest czynną. Między drobinami substancji pierwoszczu, przenikniętej zielonym barwnikiem, odbywają się owe przemiany, których rezultatem jest wytwarzanie się materii organicznej.

Z wytwarzaniem się materii organicznej z kwasu węglowego i wody połączone jest, jak to już powyżej wspomnieliśmy, wydzielanie wolnego tlenu z rośliny, mniej więcej tej objętości, co kwasu węglowego zużytem zostało. Wydzielanie to wolnego tlenu z części roślinnej przyswajającej z łatwością skonstatować można; jeśli bowiem żywe liście jakiegokolwiek rośliny lądowej, np. grochu lub żyta, umieścimy pod wodą nasyconą kwasem węglowym w naczyniu szklanym, i wystawimy przy odpowiedniej temperaturze na wpływ światła, spostrzeżemy po krótkim już czasie bańki gazowe, powstające na powierzchni liścia, które, doszedłszy do pewnej wielkości,

1) Sitzungsberichte der Wiener Akademie 6 März 1873, str. 20 osobnej odbitki.

2) Flora 1873 str. 378 i „O powstaniu i znikaniu mączki w zieleni. Odbitka z II tomu sprawozdań Wydziału mat. przyr. Akademii Umiejętności w Krakowie 1875 870, 54 str. z I tablicą. Także Kosmos Zeszyt I. 1876.

od niej się odrywają. Z zachowaniem odpowiednich ostrożności zebrany ten gaz jest bardzo w tlen bogaty, jak to po silnym paleniu się w niem różnych ciał z łatwością poznać można. Czystym tlenem gaz ów nigdy nie jest, zanieczyszcza go głównie azot powietrza przenikający wnętrza rośliny,

(d. n.)

Sprawozdania tygodniowe:

Gdańsk dnia 16 września 1876 r.

Powietrze było i podczas tego tygodnia suche i gorące, mianowicie w początku; zresztą było zmienne i pochmurne, a w końcu znacznie się temperatura oziębiła, mimo to jednakże można chwilowy stan powietrza za bardzo sprzyjający uważać.

W Anglii nie tak korzystne było powietrze; przeważnie panowała tam ponura i dżdżysta temperatura, która niezbyt pomyślnie na niedokończony jeszcze żniwa wpłynęła, a gatunek zboża przez to niewątpliwie ucierpi. Co do rezultatu tegorocznego zbioru pszenicy dają się w Anglii słyszeć narzekania na małą ilość, lecz ubytek ten wynagradza dobry gatunek, i kondycja, chociaż teraz słuszne powstają obawy, że przez ostatnie deszcze i ta strona ucierpieć może. Sprzęt owsa wypadł nader niekorzystnie, lecz za to groch obfity daje plon.

Na targach angielskich panowało w tym tygodniu usposobienie stałe, a pszenica miała większy popyt. W roku zeszłym były wprawdzie z powodu lichego sprzętu wyższe ceny pszenicy, lecz dowozy obecnej pszenicy potrzeby Anglii zupełnie zaspokoić mogą, dla tego też daje się popyt na ten artykuł tym wytłómaczyć, że ceny chwilowo są dość niskie i równocześnie zapasy śpicchrzowe nie są w tym roku tak duże jak w zeszłym. Obawy co do zniżki cen przez duże dowozy obecnej pszenicy, jak to w roku zeszłym miało miejsce nikną, gdyż eksport z portów atlantyckich Ameryki do Anglii znacznie się przybiera rozmiary, podczas gdy z drugiej strony dowozy z Indji i Kalifornii potrzeby Anglii dostatecznie będą mogły pokryć. Młynarze angielscy zdają się chcieć sobie duże zapasy pszenicy nagromadzić i w skutek tego jest usposobienie tamtejszych targów stałe i popyt na pszenicę obcą, chociaż i krajowa więcej była w ostatnim tygodniu dowieziona. Jednakowoż są ceny tamtejsze na obcą pszenicę jeszcze za niskie stosunkowo do naszych, by eksport tam dotąd korzystnie wypadł, dla tego ogranicza się nasz eksport tylko na Belgi i Niemcech południowych. Z nadeszłych ładunków pozostało do 13 b. m. 21 niesprzedanych, a popyt na nie, również i na płynące ładunki był widoczny nawet przy wyższej cen.

London miał w poniedziałek i w środę usposobienie stałe; sprzedaż naszej pszenicy z nad Bałtyku nie przychodzi jednakoż tamże do skutku dla zbyt niskich cen stosunkowo do naszych. W Liwerpolu notowano wyżkę o 1 p. W Hull panowało usposobienie stałe przy znacznym dowozie. W Leith były targi stałe przy tendencji zwykłej. Nowy-York notował na pszenicy i mące wyżkę. Targi francuzkie miały tendencję zwykłą, również i Paryż; mianowicie uwydatniała się ta tendencja we Francji północnej, podczas gdy południowa była w dowozy zaopatrzona. Belgia okazuje potrzebę importu, lecz ceny nie doznały wyżki. W Niemcech południowych targi stałe. W Austro-Węgrzech również; Berlin miał usposobienie chwiejne, w końcu notował wyżkę.

Na naszym targu zbożowym był podczas tego tygodnia nieco większy pokup, mianowicie na świeży towar; również i na starą pszenicę w lepszych i średnich gatunkach był popyt. W skutek tego osiągnęła pszenica wyżkę o 2—3 mr. Wyżka ta jednakże wcale przez Anglię spowodowaną nie była, tylko przez Belgi i Niemcy północne, które naszą pszenicę po cenach obecnych kupują. Obrot tygodniowy pszenicy wynosił w tym tygodniu 2800 ton; w tych 1000 ton starą. Tygodniowy obrot żyta wynosił 300 ton; dowóz tego artykułu był nader ograniczony. Jęczmień w lepszym

gatunku znalazł dość dobry popyt. Rzepik, rzepak i groch bez większego obrotu przy wyższej pierwszej.

Płacono za 1000 kilogr.	wagi hol. fun.	marek
Pszonicy świeżej jaréj	132—133	200
„ jasnej	122—130	200—205
„ jasno pstréj	132	206—208
„ szklistéj	133	206
„ białéj	132/3	210
„ wysoko pstréj szklistéj	136	215
„ staréj pstréj	126—129	200—203
„ jasno-pstréj	130	206
„ wysoko pstréj	129/0	210
Żyta świeżego	124/5	161½
„ starego polskiego	124—125/6	156—159½
Rzepiku		306—315
Rzepak		305

Aleksander Makowski i Sp.

Informacya. Panowie komitenci wysyłający zboże dla domu komissowego Banku Galicyjskiego w Królewcu, zechcą adresować „Commissionshaus der Galizischen Bank in Königsberg.“

Panowie W. Kamieński i Sp. w Berdyczowie, i ich agenci przyjmują dla nas zboże w komissową sprzedaż w gubernii Kijowskiej, na Wołyniu i Podolu, i udzielają w każdym czasie zaliczki na towar wysłany.

Sprawozdanie tygodniowe M. Baranowski et Comp. w Gdańsku.

Sobota 23 września 1876 r.

Powietrze mieliśny w bieżącym tygodniu ciepłe, lecz noc zimne i częste deszcze.

Anglia również była nawiedzona deszczami. Żniwo pszenicy prawie ukończone, owsa zaś jeszcze wiele na pniu. Szkocya sprzętu pszenicy dla zbyt częstych deszczów ukończyć nie mogła. Targi w Anglii utrzymały się przy cokolwiek lepszych cenach i były dość ożywione. Dowozy obcej pszenicy pokrywają potrzeby tego kraju; krajowej nie wiele na targi dowieziono. Londyn miał w poniedziałek i środę stałe targi na dobrą krajową jako i zagraniczną pszenicę; ostatniej dowieziono w przeszłym tygodniu a mianowicie z Indyi i Australii 43,268 kw. Pszenica z nad Bałtyku jeszcze za droga, dla tego jej nie targowano. W Liverpool, Hull i Leith targi utrzymały się przy lepszych cenach. W Irlandyi przeszkodził deszcz żniwu pszenicy, dla tego i targi w Dublinie i Cork były ożywione. We Francyi, Belgii, Hollandyi, Austro-Węgrzech i Berlinie były targi stałe. Dowozy pszenicy na naszym targu były w tym tygodniu obfite, pokup jednak nie był tak chętny jak w tygodniu poprzednim; poprawił się dopiero, gdy ceny nawet za najpiękniejsze gatunki o 3—4 mr. na tonnie się obniżyły. Sprzedano w tym tygodniu w ogóle 2500 ton, które po największej części Belgia i Niemcy północne zabrały. Żyto słabo tylko było dowiezione, wskutek czego przy ożywionym popycie ceny stopniowo o 8—10 mr. na tonnie się podniosły. Ceny w końcu:

Tonna z 2000 f. celn. = 2442 f. pudowych	Marek	waga hollen.	korzec polski
Pszonicy świeża jara	195—200	126—136	242 f. pudow. ra. i k. 7.20—7.39
obciagnięta	197—200	129/0—130	7.28—7.29
jasno-kolorowa szkl.	200—204	130—133	7.39—7.53
jasno-pstra	207—209	130—133	7.64—7.68
wysoko pstra szklis.	205—212	130—136	7.57—7.78
biała	209—210	128—130	7.68—7.70
Żyto			korz. pol. = 232 f. pud. 5.92—6.14
świeże	167—173½	122—128	korz. pol. = 202 f. pud. 4.60—5.06
Jęczmień			4.29—4.41
dwurzędny	150—164	105/6—114/5	korz. pol. = 262 f. pud. 6.00—6.22
czterorzędny	139—143	106—111	5.56
Groch			korz. pol. = 142 f. pud. 3.05—3.14
kuchenny	150—155		9.62—9.88
szary	140		10.10
Owies	141—145		10.19—10.26
Rzepik latowy	300—307		41.06
średni	315		
Rzepak	318—320		
Koniczyna 100 kilogr.	108		

Domu Komissowego Banku Galicyjskiego w Królewcu.

Królewiec dnia 17 września 1876 r.

W ubiegłym tygodniu było powietrze mniej wilgotne i tylko z zachodniej Europy donoszą o silnych deszczach, przeszkadzających ukończeniu ostatecznych zbiorów. Temperatura w ogóle a szczególnie w Niemczech znacznie się ochłodziła. W naszej prowincyi mieliśmy mimo niskiego stanu barometru, dość suchą i zimną pogodę, w skutek czego ukończenie robót w polu postępuje bardzo szybko, mianowicie na wyżej położonych miejscach. Nowe oziminy wyglądają już dość zielono i pięknie i roją przy normalnym przebiegu powietrza, nie gorsze rezultata jak w roku ubiegłym. Barometr wskazywał 27⁵, 27⁸, 27¹⁰, 27¹¹, 28 i 27¹⁰. Termometr 14—18⁰ ciepła dniami a 5—9⁰ ciepła w nocy.

Mniemawie dotychczasowe co do rezultatu zboża w niczym się nie zmieniło, tylko wiadomości z Ameryki brzmią więcej optymistycznie, jak niedawnymi czasy. Dają się słyszeć jednak często skargi o stanie kartofli tak tutaj jak i w Anglii, których potwierdzenia jeszcze oczekiwać potrzeba. Tendencya targów zachodniej Europy była przeważnie stała, chociaż ceny wszędzie nie wykazują zwyżki. W Anglii utrzymało się wprawdzie zeszytygodniowe polepszenie cen pszenicy, silne jednak dowozy zmusiły sprzedających w końcu tygodnia do małych ustępstw. Inne gatunki zboża, mianowicie owoce, więcej były pozukiwane i osiągały stałe ceny.

We Francyi pod wpływem targu paryzkiego ustaliła się tendencya na wszystkich targach prowincjonalnych. W Niemczech pod naciskiem znacznych zapasów z zeszłego roku, nagromadzonych w Berlinie i Szczecinie, które nie znajdują dotąd korzystnego umieszczenia, obrot jest bardzo ograniczony i tendencya słaba. Berlin miał usposobienie chwiejne, w końcu tygodnia notuje wyżej, jak przed 8 dniami.

Dowóz zboża krajowego był na naszym placu dość znaczny; natomiast dowóz z Rossyi jest nadspodziewanie stosunkowo jeszcze bardzo mierny. Eksport z tego powodu był ograniczony, i dowiezione partje znajdowały z łatwością nabywców.

Pszenica w wyborowym gatunku miała usposobienie spokojne przy cenach zeszytygodniowych, podczas gdy liche, ciemne gatunki przy małym obniżeniu miały kupujących.

Żyto sprzedawano z początku tygodnia po cenach niezmiennych. Z powodu małego dowozu podniosło się w końcu tygodnia o 1½—2 mr. Inne produkta niezmiennie.

Notowano:

Pszonicy wybor. białą	123—129 f.	196—206 m.	118—125 kop. pud
„ białą	122—129/0	193—202 m.	116—122 „
„ czerwoną	122/3—127 f.	188—194 m.	114—117 „
Żyto	115—124/5	159—146 m.	84—88 „
Siemię lniane		234—249 m.	141—151 „
Rzepak (raps)		264—286 m.	160—173 „