

WYCHODZI
JAKO PISMO
DODATKOWE.

KORRESPONDENT

PRZY
GAZECIE
WARSZAWSKIEJ.

ROLNICZY, HANDLOWY I PRZEMYSŁOWY.

Dnia 30 Czerwca 1886 roku.

N^o 26

18 (30) Czerwca 1886 r.

Kronika rolnicza.

przez Z. Gawareckiego.

(Dalszy ciąg. — Patrz Nr. 25).

Zadołowywanie zielonej paszy bez dołów. — Postępowanie p. Juliusza Cormouls-Houles. — Zdanie p. Rouvière o tym sposobie. — Podsiewanie za rzadkiej koniczyny.

Zadołowywanie paszy zielonej jest jednym z najważniejszych sposobów w naszym klimacie, gdzie wrzesień zwykle słotny, przytém słońce mało już dogrzewa w tym miesiącu, a ztąd suszenie potrawów, a tém bardziej kukurydzy na paszę jest trudne, kosztowne, nieraz wprost niepodobne do skuteczenia. Z powodu właśnie ważności tego sposobu w całej północnej i środkowej Europie tylu gospodarzy stara się, aby ulepszyć go, to jest dojść do zmniejszenia kosztów wykonania. Wszystkie te usiłowania są bardzo chwalebne, ponieważ mają na celu dążenie podniesienia gospodarstwa przez zabezpieczenie mu dużej ilości paszy, tanim kosztem przechowanej. Co się tyczy nowego sposobu, czyli zadołowywania paszy bez dołu, to podamy tu parę przykładów jego w roku zaprzestanych dokonanych szczęśliwie. Oto co p. Juliusz Cormouls-Houles podaje o swoim postępowaniu: "W lecie 1883 r. kazałem ułożyć kilka dużych fur świeżo ściętej trawy w szopie bez ścian, a tylko dachem pokrytej, co przykryto się deskami i te obciążyło kamieniami, biorąc ich 1000 do 1200 kilogramów (24 do 30 centnarów naszych stofuntowych) na każdy metr kwadratowy, czyli na każdy kwadrat powierzchni mającej wzdłuż i wszerz po 42 naszych cali, czyli $1\frac{3}{4}$ łokcia polskiego. Taki sam ciężar używam do przyciskania paszy zielonej złożonej w dołach murowanych, których ziemią nieprzykrywam. Pod koniec sierpnia rozpocząłem użycie z tego nowego rodzaju przechowania zielonej paszy, którą znalazłem jak najlepiej przechowaną, tak dobrze, jak paszę zadołowaną wedle zwyczajnej metody. Doświadczenie to ogłosiłem w pismach francuzkich, co przyjęto wtedy jak najpochlebniej. Wielu gospodarzy poczęło iść za moim przykładem, między innymi i mój krewny p. Rouvière, który się ośmielił pójść jeszcze dalej, ponieważ swój stos paszy umieścił nie pod dachem szopy, ale wprost wśród podwórza pod gołym niebem, i zupełne powodzenie tego usiłowania jeszcze raz potwierdziło dobroć mego pomysłu. W ogóle cały ten sposób nieróżni się wcale od zwyczajnego postępowania przy dołowaniu zielonej paszy, a zmiana na tém się zasadza, że nie odbywa się ono w ziemi w dołach, lecz wprost na wierzchu jęj bez innego przygotowania, prócz zmiecenia do czysta śmieci i t. p. Następnie stos ten ułożonej paszy nie przysypuje się ziemią jak przy zadołowaniu paszy, ale się tylko okrywa deskami szczelnie, które się przyciskają kamieniami i tak pozostawia aż do chwili użycia. Jednakże doświadczenie pokazało konieczność zachowania tutaj kilku ostrożności, które tak streścimy: Na miejsce dla stosu obrane zwozić paszę natychmiast po jęj skoszeniu, nieczekając aż pocznie podsychać, wilgoć jęj bowiem nietylko nie jest tu

przeszkodą, ale owszem potrzebą. Nawet deszcz nie przynosi tu innej szkody, prócz tęj, że skoro jest za silny, przerywa pracę robotników. (Szczegół to ważny, a dla nas pożyteczny ze względu na częste we wrzesniu słoty, gnojące drugie pokosy koniczyny, siana, nawet zbóż późniejszych). Układać paszę jednostajnie równemi warstwami i po ukończeniu zaraz ją stopniowo przyciskać, żeby uniknąć niejednostajnej powierzchni, co by spowodowało zwalenie się kamieni i popsucie wszystkiego. Przyciśnięcie to, czyli obciążenie kamieniami robić nie od razu, ale stopniowo, zwolna przez dodawanie coraz większego ciężaru, iżby przez to pozostawić czas do rozpoczęcia się fermentacji objawiającej się przez zagrzanie, gdyż ona bez przystępu powietrza polepsza przechowywaną prszę, rozmiękcza ją, a jednocześnie sprzyja równemu jęj uleganiu się. Przykryć cały stos paszy deskami o ile można jak najszczelniej do siebie przystającymi, aby one z dwóch boków przeciwległych na kilka cali po nad stos występowały, stanowiąc przeto jakby okap dla paszy. Wybierać do tego przykrycia deski sosnowe (z drzewa iglastego) 35 do 40 centymetrów (15 do 17 cali polskich) szerokie, dwócalówki, bo takie są i dość sztywne i dość jeszcze elastyczne, aby mogły jednocześnie znieść duży ciężar i równo jego gnecenie czyli nacisk wywrzeć na całą masę przechowywanej paszy. W braku kamieni, które tu zawsze są najodpowiedniejsze, pokryć te deski ziemią, cegłą, albo kawałkami opalowego drzewa i t. d., ale zawsze tak, żeby ciężar na każdy metr kwadratowy (42 cale polskie w kwadrat) wynosił około 1200 kilogramów (czyli 3000 funtów polskich). Należyte przyciśnięcie ciężarem przechowywanej paszy, stanowi jeden z najkonieczniejszych warunków dobrego powodzenia. Dla ułatwienia sobie później wybierania przechowywanej paszy na potrzebę inwentarza, należy okrywające deski kolejno i równo obciążać kamieniami, tak, aby one potem nieutrudniały wybierania. Jeżeli zaś są równo jakby murki ułożone wzdłuż desek, to potem łatwo je zdejmując nieodślania się na raz znacznej części stosu bezpotrzebnie a szkodliwie, a tylko tę część, jaka nam potrzebna do użytku. Koszta przykrycia stosu zawsze będą jedne i te same bez względu na jego wysokość; zatem przechowywanie paszy tutaj tém będzie korzystniejsze, im stos będzie wyższy, co jednak pociąga za sobą konieczność użycia jakiegoś podparcia dla podtrzymania stosu. I rzeczywiście też praktyka pokazuje pewną trudność w ułożeniu stosu bardzo wysokiego i w obciążeniu go znacznym ciężarem, bez naruszenia równowagi całej masy. Dla uniknięcia przeto zawalenia się stosu, jeżeli ma być znacznie wyższym, zdaje mi się, powiada autor, byłoby zawsze właściwiej zakładać taki stos pod szopą, któraby mu użyczyła swych dwóch ścian do podtrzymania równowagi. Kto niema szopy odpowiedniej, ten może w inny sposób poradzić sobie dla zapewnienia mocnego podparcia tych wyższych stosów, np. przez wzniesienie dwóch mocnych naprzeciw siebie ścian, lub zamiast nich dwóch rzędów słupów w odpowiedniej odległości. Oparcia stosu o budynek, co by dało już jedną ścianę, robić niemożna dla strumieni wody z okapów spływających. Być może, dodaje wynalazca, że za podparcie mogłoby posłużyć grubsze drzewo z obciążeniami do potrzebnej wysokości gałęziami, jakby oś dla stosu, nokoło której składana pasza utworzyłaby pewien rodzaj koła roślinnego. Wartoby to wypróbować."

Posłuchajmy teraz, co o tém nowym postępowaniu pod względem przechowywania paszy świeżej, zielonej powiada p.

A. Rouvière, zaliczany do najznakomitszych gospodarzy francuzkich i zamieszkały w departamencie Tarn, gdzie jako najlepiej prowadzący rolnictwo, otrzymał na konkursie pierwszą honorową nagrodę. Pan Rouvière jednak jeszcze i z innej strony zasługuje na uwagę: należy on do tego rodzaju gospodarzy, którzy dowiedziawszy się o jakimś nowym wynalazku mogącym znakomite usługi oddać rolnictwu, poczytuje sobie za obowiązek obywatelski i patriotyczny sprawdzić go praktycznie i upowszechnić zaraz w kraju. Piękne to i godne naśladowania. Otóż ten p. Rouvière powiada o przechowywaniu zielonej paszy w stosach na powietrzu wolnym, czyli o zadołowywaniu zielonej paszy bez dołów, co następuje: „Praktyczność moich prób w 1884 r. przechowywania zielonej paszy pod gołym niebem na ziemi, potwierdziła się i w roku 1885, w próbach dokonanych z paszami w czerwcu i dla tego wedle tych kolejnych doświadczeń mogę coś stanowczego powiedzieć o sposobie postępowania: Należy układać jak najrówniej świeżą paszę regularnymi warstwami na powierzchni gruntu, który powinien być horyzontalnym i wolnym od dopływu wody z miejsc wyżej położonych, tak aby się przez to utworzył stos prostokątnego kształtu. Węższa szerokość tego stosu zależna jest od długości desek, jakie do nakrycia posiadamy, jak u mnie np. 3½ metra (6 łokci pols.) Powierzchnię ziemi przez stos zajęta potrzeba dokoła otoczyć małym rowkiem wykopanym dla zapobieżenia, aby wody deszczowe spływając, niezamaczły stosu od dołu, coby spowodowało gnicie, i dla przeszkodzenia temu okrążający rowek musi mieć istotny odpływ z dobrym spadkiem do jakiegoś rowu. Miejsce na urządzenie stosu może być dowolnie gdzie bądź obrane; dla moich prób, powiada p. R., obrałem sobie miejsce na polu na wszystkie wiatry wystawianem. Skoro ułożenie stosu dojdzie do pewnej wysokości, należy go przykryć deskami ściśle do siebie przylegającymi, a to w kierunku najmniejszej szerokości, tak, aby przez to była cała pasza szczególnie przykryta i żeby deski jeszcze dłuższe od niej były z obydwóch stron choć na parę cali dla utworzenia okapu. Deski moje są tylko całówkami i skoro ich ułożę pierwszą warstwę, to na wierzch jęj daję drugą w taki sposób, żeby każda deska górna przykrywała swym środkiem spojenie czyli zetknięcie dwóch pod nią będących desek. Ponieważ wszystkie deski są jednej długości, stanowią przeto ściśle pokrycie, które, pozwolimy sobie dodać, zdaje się być lepsze od przykrycia utworzonego z jednego tylko pokładu desek dwucalówek, jakieśmy to widzieli przy doświadczeniu poprzednio podanem. Pan Rouvière te wierzchnie deski przytwierdza jeszcze krótkimi kawałkami desek w przeciwnym kierunku położonych tu i owdzie, które łącząc z sobą dwie lub trzy deski, są do nich gwoździami przybite. Na to pokrycie z desek utworzone, powiada p. Rouvière, kazałem nakłaść kamieni w dostatecznej ilości, aby mieć ciężenie na każdy metr kwadratowy (49 cali pols. w kwadrat) około 1000 kilogr. (24 centnarów stofuntowych). Pod tym ciężarem uleganie się czyli opadanie stosu odbywa się prędko, a temperatura w paszy podniosła się szybko do 48 st. C. (38 st. R.), obniża się potem i zostaje na mniej więcej 34 st. C. (27 st. Reaum.). Stos po takim przyciśnięciu zostawia się już samemu sobie, a pasza w nim zawarta z wyjątkiem nic nieznaczącym warstw bocznych, przewybornie się zachowuje. Wydobywanie przechowywaną paszy w tym stosie, odbywa się do użytku częściowo, a to przez usunięcie najprzód ciężaru, a następnie desek pokrywających ten pasczyli część paszy, który się przeznaczają do stopniowego brania, i tu potrzebną ilość wycina się za pomocą jakiegokolwiek narzędzia. Zwykle na raz odkrywa się tylko 2 lub 3 deski, a po wzięciu paszy przykrywa się otwór słomą. Jeżeli tak się kolejno usuwając deski wybiera potrzebną paszę, to całej jęj reszcie w stosie nie grozi żadne zepsucie z powodu dostępu powietrza, byle tylko cała czynność odbywała się porządnie, regularnie, jedynem słowem jak należy. Zeszłej zimy ze stosu takiego raz go napocząwszy, brałem codziennie przez dwa miesiące paszę, która jednak przez to najmniejszemu zepsuciu nieuległa. Cała ostrożność do zachowania przy robocie stosu polega głównie na tém, aby równo kłaść warstwy paszy na sobie, żeby próżni wewnątrz nie było, a obok tego żeby boki były ułożone równo i ściśle. W skutek bowiem przez ciśnienie na wierzch nałożonych ciężar-

rów, boki lepiej ściskając się, stają się tém mniej dostępnymi dla powietrza, więc też i cieńsza warstwa na nich ulega zepsuciu, więc i strata staje się nic nieznacząca. Trochę tej zepsutej paszy nie trzeba zostawiać, ale zebrawszy je na gnojowisku składać. Bardzo godnem zalecenia jest niekłaść od razu całej ilości ciężaru na deski, potrzebnego do ich obciążenia. Niebezpiecznymby było, jeżeli warstwy paszy nie są jednostajnie ułożone, albo jeżeli ciężary nie są równo rozdzielone, gdyż przez to albowy się stos mógł zwalić, albo też jego pokrycie nachylić się mocno na jedną stronę. Taby wymagało natychmiast przerobienia stosu, co jest zmusne i bezpotrzebnie nowe koszta za sobą pociągające, a obok tego narażające na zepsucie całej paszy lub jęj znacznej części. Lepiej więc jest pierwszego dnia włożyć pół ciężaru, lub nawet tylko część trzecią, a kiedy stos się osiadzie, nazajutrz znów dotożyć trzecią część, a następnego dnia resztę, tak, aby na każdy metr kwadratowy powierzchni, obciążenie to wynosiło 1000 kilogr., równo wszędzie rozdzielonych.“ Widzimy więc, że całe postępowanie jest bardzo proste a ztąd i łatwe do wykonania; główna tu rzecz na tém polega, aby paszę dobrze w tym prostokątnym stosie ułożyć, deskami przykryć i te należycie obciążyć. Dla ułatwienia sobie zadania, potrzebaby wiedzieć dla własnego doświadczenia, jak to wygląda powierzchnia metra kwadratowego (42 cali pols. w kwadrat), odmierzyć ją na ziemi i dopiero odważywszy sobie 1000 kilogr. (24 centnarów polskich stofuntowych) tego materiału, którym metr powierzchni obciążyć chcemy, jak kamieni, ziemi, cegły i t. d. ułożyć go na niej. Raz to widząc, już potem na oko można stos obciążyć, pamiętając, że bez porównania lepiej jest włożyć ciężaru więcej niż trzeba, aniżeli za mało. W ogóle jednak możnaby powiedzieć, że ten sposób przechowywania zielonej paszy w stosach jest po prostu udoskonaleniem oddawna znanego sposobu robienia tak zwanego brunatnego siana. Nie we wszystkich miejscowościach jednak w naszym kraju znajdują się potrzebne do obciążenia stosu kamienie, są bowiem np. w Galicyi nietylko całe wsie, ale całe rozległe okolice, gdzie nieznajdzie kawałka kamienia. W miejscowościach przeto takich zamiast kamieni, należy czém innem obciążać deski stos okrywające, a to stosownie do tego, co jest odpowiedniem na ten cel pod ręką, jak cegły, kawały opałowego drzewa i t. d. Ziemię dopiero w ostatnim razie, w braku czego innego należałoby brać do użycia, gdyż ją najtrudniej na pewną wysokość sypać do góry. Deski potrzebne do przykrycia, po użyciu powinny być gdzie pod dachem przechowane, aby wyschły i były znów na rok następny gotowe.

Zdaje mi się, że z powodu szczególniejszej tego roku wiosny, dużo koniczyn czy samych czy w mieszance z trawami zasianych przedstawi się jako rzadko powschodzone. Otóż dla zapobieżenia, aby w tych próżnych lukach nie rzuciły się chwasty, oraz aby dojść do powiększenia sobie zbioru paszy, należałoby za rzadko powschodzone koniczyny powtórnie ponadsiwać, tak jak to się pospolicie robi w Szlezwig-Holsztynie. Najlepszą porę do tych nadsiewów poczytują tam lato aż do końca sierpnia, a jeżeli nie można tego dla jakichbądź powodów uczynić, dokonują to następnej wiosny. Jeżeli na wiosnę rośliny koniczyny przedstawiają się za rzadko stojące, to wsiane nasiona pastewne jeszcze dobre tego roku pokosy wydadzą. Im zaś gęściej stoi koniczyna, tém trudniej utrzymać się i rozwinąć młodym nowym roślinom. Jeżeli rok mokry, a koniczyna rzadka, to gdy po sprężeniu zboża z nią będącego będzie zaraz zasiana odpowiednią mieszanką, nasiona jęj prędko wzejdą i zakorzenia się jeszcze przed mrozami. Nic tu nawet nie szkodzi ścięcie pierwszego pokosu tej rzadkiej koniczyny na jesieni dokonane. Do tego wsiewania używają tu różnych mieszanek, w miarę tego, czy ta za rzadka koniczyna ma przez jeden rok tylko, czy też dłużej zajmować pole. Pospolicie używają tu mieszaniny złożonej z lucerny chmielowej (Medicago lupulina), angielskiego i włoskiego rajgrasu, stokłosy rolowej (Bromus arvensis). Jeżeli grunt jest lżejszy, a niedość żyzny przytém, to z mieszanki tej opuszczają rajgras włoski, a za to dodają więcej stokłosy rolowej. (d. c. n.)

ROZMAITOŚCI.

Chronologia cukrowni w Cesarstwie i Królestwie Polskiem. Nazwiska fabryk powstałych w latach następujących: w roku 1826 Częstocice; 1827 Guzów; 1829 Michałów; 1832 Troszczyn; 1834 Olechówate, Orłowiec, Wedeń; 1835 Sadow, Mezenów, Białokodeck; 1836 Georgiew; 1837 Niższy Kiślansk, Gorodek, Mniszów, Hrebienniki, Mohryck; 1838 Poczapińce, Białaklejówka, Śmiła, Silniczek; 1839 Jabłonówka, Trubeczynsk; 1840 Ramońsk, Żuga, Czereszansk; 1842 Krasikówka Turbów, Kordylówka, Andrejew; 1848 Sojki, Strzeleck, Tomczyńsk, Szepetówka, Olchowice, Wiszniewczyk; 1844 Klembówka, Matusów, Kamieńsk, Łukowe, Szpików, Mało-Istrop; 1845 Leonów, Gregorówka, Plisków, Androszówka, Buhajówka, Ruska-polana, Gruszów, Boczczany, Żubno, Mirczańsk, Krasilów, Jorkowo, Elżbietów; 1846 Łanigta, Olszańsk, Potasznia, Kapitanówka, Lebedyn, Rytwiany, Suprunów; 1847 Dziunków, Jezierna, Sieliszczce, Jablonów, Kasperówka, Potuszynce, Lewada, Kuryłowce, Trościaniec; 1848 Ostrowy, Piwce, Horodyszczce, Mlejewskie, Rajgorodek, Gucin, Bogorodynsk; 1849 Sanniki, Oryszew, Talne, Michailów, Czarny Ostrów, Mojówka, Ziemetczynsk; 1850 Dobrzelin, Krzemieniczuk, Martynówka, Nabutówka, Steblew, Parafijewsk; 1851 Łyszkwice, Młodzieszyn, Czerepin, Stara-Osota, Pabianice, Czupachów; 1852 Michailów, Zbiersk, Młynów, Kisilew, Szpoła, Pije, Buncewce, Wielka-Berezówka, Spasy (orłowskie), Aleksandrya; 1853 Walentynów, Iwnia, Grażnia, Hołmsk, Swiersy; 1854 Stebajów, Dzierzbín, Ternów, Wielki Babryńsk, Nizów, Woroneż; 1855 Kahorlik, Wierchniaczka, Szalygin, Wielki Grybaszów; 1856 Cielce, Horodyszczce, Derugino; 1857 Hermanów, Potrów, Bużanka, Sydorówka, Sosnowiec, Rogożne; 1858 Mironówka, Stepaniec, Ryszczew, Kalnik, Toporów, Nowa Towolanka, Hołowczyn, Krupiec, Kapuściany, Wojtowce, Staryńsk, Gładkowce, Sławgoród, Koriukow, Kostobobr; 1859 Kożanka, Sieniawa, Jaropowce, Perewierziewsk, Chmielnik, Izabelin, Mohylany; 1860 Leśmierz, Andruszówka, Chodorków, Żaszków, Łuczaniec, Skomeroszki, Noskowo, Aleksandrówka, Uładówka, Wyższy Ołczodajew, Jaltuszów, Czarnomin; 1861 Telkin; 1862 Rabińsk; 1864 Rubieźna; 1865 Józefów, Konstancya, Nikołajew, Natalew; 1866 Zarożańsk, Boryńsk, Kornin, Rzewka, Duranów, Krasiniec, Stepanówka, Uścianiec, Sotniczyn, Kekin, Kijany, Buđa; 1867 Sitkowo, Ulanów, Borów; 1868 Czersk, Aleksiejew, Sobolówka, Stara Sieniawa; 1869 Huta; 1871 Czerwona, Brailów; 1872 Spiczynce, Cybulów, Działowszczyzna, Gruszków, Deraźnia, Strychowice, Wepryk, Parchomówka; 1873 Modele, Andruszówka, Macharzyńce, Saliwonki, Kamienna górka, Krasnojarsk, Woronowice, Kowalówka, Kalinówka, Szczodród, Sewerynówka, Chrepowiec, Honorówka, Tomaszpol, Aleksandrów; 1874 Zakrzew, Trościaniec, Gniewań, Berszada, Sokołów, Dżuryn, Jankowróg; 1875 Mizocz, Szpanów, Ilince, Rżawa, Zagnitków, Czezelnik, Ponury; 1876 Iwankowce, Zbrucz, Maryjsk, Szreniawa, Pobereże, Łozny, Łopatyniec; 1877 Wielkie Pryczki, Derebczyn; 1879 Ludwików; 1880 Korowińce, Szamrajew, Wieryńsk; 1881 Drużków, Tymaszów; 1883 Opole, Ciechanów, Zaliwańszczyzna; 1884 Obudówka, Bogatówka, Natalew, Olgin, Karpilówka, Dmitriew (Barbarówka).

Olbrzymie rozmiary amerykańskiej hodowli bydła. Przed czterema laty powstało w Texas Towarzystwo akcyjne, które za milion dolarów nabyło na własność 340,000 akrów ziemi. Posiadłość ta jest otoczona płotem z drutu przymocowanego do słupów drewnianych, mającego 40 mil angielskich długości (w przybliżeniu 10 mil naszych). W pobliżu budynków folwarcznych są okolicy (po angielsku corrals), każdy na 10,000 sztuk bydła. Prócz tego jest dziesięć pastwisk, każde dla 40,000 sztuk bydła i pięć małych okolic, każdy po 100 jardów kwadratowych (yard = 91 centymetrów) do cechowania bydła i ubezpłodnienia młodych byczków. Na osobnym, bardzo dobrém pastwisku miała ta spółka 4000 sztuk bydła polepszonej rasy, pochodzącego od byków rasy krótkorogiej, herford i angus. Byki dwuletnie idą do rozplodu do stada rozplodowego. Prócz tego ma spółka 8000 koni, z tego połowa klaczy rozplodowych. Prócz własnej posiadłości ma spółka powyższa w dwóch miejscach po 300,000 akrów gruntu w dzierżawie, na których utrzymuje 20,000 wołów, razem ma 1,140,000 akrów (czyli 57 mil kwadr.). Przed dwoma laty sprzedała 9000 sztuk bydła, a przeszłego roku 12,000. Majątek jej

wynosi sześć milionów dolarów. Dochód od tego kapitału wynosi 20%. Dowodem jak dalece spółka ta nie szczędzi pieniędzy na kupienie celujących rozplodników, jest następujący: Wangen, administrator tej spółki zapłacił 29 lipca r. z. 19,000 dolarów w Leonministerze w Anglii za byka „lord Bilten“ rasy Herford. Zaprawę cyfry bajecznej! Przypuszcemy, że byk ten jest ogromny i waży 20 centnarów, wówczas funt jego żywej wagi kosztowałby 11 rubli 40 kop. Czy mogą być taniemi przynajmniej jego wnuki? One będą wszakże tylko na mięso hodowane. Wątpliwem jest, aby ta hodowla doszła rychło do produkowania nabiału, boby musiała dziennie tysiące krów doić i masło i sery parową machiną wyrabiać. *

Żywe termometry i barometry. Niedokładnemi, ale przyjemnemi wróżami zmian ciepłoty i pogody jest wielka część zwierząt. Przed słońcem latają jaskółki nisko nad wodą, kryją się jaszczurki, ptaki skubią się, komary kłują gwałtownie, kury grzebią mocno i kąpią się w kurzu, ryby rzucają się nad wodę, gęsi i kaczki trzepią skrzydłami, wrzeszczą i nurzają się, bydło wietrzy pod wiatr, gromadzi się w kupy i staje tyłem do wiatru, kozy szukają schronienia, osły ryczą i potrząsają uszami, psy uciekają pod dach, koty garną się do ognia, świny spieszą do stajni, a stajenne wkopują się w swoją ściółkę, koguty pieją częściej i biją skrzydłami, wreszcie pawie zeskakują z drzew i dachów, tyrkoczą perlice i niepokoją się, wróble świszczą, zlatują na dół i gromadzą się pod krzewami lub pod dachami, kraczą wrony i kruki, ropuchy wylazą z kryjówek i rzegoczą żaby, nietoperze wlatują do budynków, pszczoły oddalają się mało od ulów, mrówki znoszą do środka poczwarki swoje, wylazą z ziemi dżdżowniki i rozlażą się ślimaki. Na pogodę tłumią się burzliwego wiatru jest skakanie bydła i owiec z potrząsaniem łba, niespokojność świń i noszenie w pysku łydzy, ocieranie się kotów o drzewa, zrywanie się gęsi do lotu, latanie jaskółek po jednej stronie drzew, w kierunku przyszłego wiatru i gromadzenie się srok. Przed burzą śpiewają kosy wytrwale i leci ku rzekom ptactwo nadmorskie, a jaskółki ożywiają się niezwykle i odlatują od siedzib swoich. Zwierzęta mylą się mocno w przewidywaniach swoich ciepłej pory wiosennej. Rok rocznie marnieje wiele tego ptactwa wędrownego, które przylatuje do krajów zimniejszych, zanim się poczną zielenie świeża roślinnością. *

Plaga szarańczy dotknięty został Alger. W dniu 1-ym b. m. zaległa ona tak olbrzymią masą linię kolejową Bordj-El-Achir, że pociąg musiał się w biegu zatrzymać. Odczepiono wagony i jeden po drugim przeprowadzono przez żywą falę owadów. Maszynista dał znać drogą telegraficzną do Bordy, że przysłano kilkuset robotników dla zniszczenia szarańczy. Olbrzymie chmury złośliwych tych owadów nawiedziły również Bagdad, tak, że całe żniwe uległo zniszczeniu. Chcąc zapobiedz o ile możliwości złemu, gubernator generalny, Hydajat basza, wydał rozkaz, aby wszyscy mieszkańcy miasta począwszy od liczących lat 7 życia, bez różnicy stanu i rodzaju wzięli udział w tępieniu skrzydlatego wroga. Nawet duchowieństwo i oficerowie załogi uczestniczyli w walce z szarańczą; wyjątek stanowiły tylko osoby chore i niezbędne do pielęgnowania dzieci. Co rano ludność Bagdadu opuszczała swoje siedziby i powracała dopiero wieczorem, a każdy mieszkaniec obowiązany był przynieść 2½ kilo zabitych szarańczy, które niezwłocznie zakopywano w ziemi. Ta wyprawa przeciw skrzydlatym niszczycielom trwała dni dziesięć.

Próba robienia nici z torfu. W tych dniach w fabryce pp. Schwarz, Birnbaum i Löw w Łodzi rozpoczęła się próba przędzenia nici z torfu rąbieńskiego. Torf ten nadaje się jedynie do wyrobu z niego przedży grubiej, zdatnej następnie do przeróbki na dery dla koni i t. p. Po otrzymaniu przedży, mają być z niej w tejże samej fabryce wyrabiane odpowiednie tkaniny, do których dodanem będzie 50% bawełny. Pp. Schwarz, Birnbaum i Löw podjęli się wykonania tych prób bezinteresownie, nawet nie żądali od p. Gałęckiego, właściciela kopalni w Rąbieniu, gwarancji, iż przy wyrobie nowego produktu maszyny nie ulegną uszkodzeniu, co jest możliwem ze względu na obecność części ziemistych w wołoku roślinnym. Będzie to pierwsza próba w naszym kraju wyrobu berodiny.

