

KORRESPONDENT

ROLNICZY • HANDLOWY I PRZEMYSŁOWY.

WYCHODZI JAKO PISMO DODATKOWE BEZPŁATNE PRZY „GAZECIE WARSZAWSKIEJ.”

Za ogłoszenia do „Korrespondenta” pobiera się za pierwszy raz po kop. 10, za następne po kop. 9.

Znaczenie rolnicze skanalizowanych odchodów ludzkich.

Rolnictwo skarży się w ogólności na brak lub drogocenne nawozów, równocześnie ceni ono wysoko wartość wody i niedokrotnie znaczne ponosi koszty na sztuczne nawodnianie. Robiono nawet próby w celu rozwodnienia obornika i sprowadzenia go na pole w kształcie płynnym. Kanalizacja miast ofiaruje rolnikom jednocześnie nawóz i wodę, w ogromnych ilościach, bardzo tanio, często nawet za darmo, a jednak ze wstrętem odrzucamy zwykle ten podarunek Danaów.

Wstręt ten tłumaczy się tem, że do podarku tego zawsze przywiązany jest warunek przyjmowania o każdym czasie wszelkich skanalizowanych odchodów. Warunku tego jednakowoż w żaden sposób znieść nie jest w stanie przeciętny nasz tryb gospodarczy; potrzebne są na to zupełnie nowe urządzenia, nowe sposoby uprawy, które jedynie za pomocą chemii rolniczej wytworzyć się dadzą. Gospodarstwo oparte na skanalizowanych odchodach ludzkich, jest uprawą wielką, użytkującą płynne składniki pożywne. Chemia rolnicza w swych początkowo jedynie teoretycznych kulturach w wodzie przy wyłączeniu ziemi, jako też w kulturze na zupełnie nieurodzajnych piaskach przy użytkowaniu odpowiednich składników pożywnych, nader korzystne osiągnęła rezultaty; próby te należy przeprowadzić dokładniej i w kierunku skanalizowanych odchodów miejskich.

Skanalizowane odchody ludzkie zawierają mniej więcej:

100 milionowych części 1)	azotu
40	alkaliów,
30—40	kwasu fosforowego,
15—20	magnezy,
150	wapna;

obok nieznacznych ilości kwasu krzemianego, kwasu siarczanego i t. d. Zawartość powyższą zmniejszają *chwilowo* silne deszcze, *trwale* nadzwyczaj silne użycie wody wodociągowej w odnośnym mieście. Obfity dopływ wody zaskórnej nie uwzględniamy tutaj, dopływ bowiem taki świadczy o wadliwym wykonaniu kanalizacji. Związek części pożywnych powyższego składu bardzo bogaty jest w azot, prowadzi też do olbrzymiej produkcji traw i podobnych roślin. Przy innych uprawach poleca się podwyższenie składników mineralnych, mianowicie kwasu fosforowego w stosunku do azotu. Podwyższania tego dokonać można albo za pomocą bezpośrednich dodatków, albo przez wybór odpowiedniego gruntu. W warunkach, gdzie zachodzi silne parowanie wody, i sztuczne rozcieńczenie należy mieć na oku.

Z wyżej wymienionymi składnikami skanalizowanych od-

1) 1 milionowa część = 1 miligramowi w litrze, albo 1 gramowi w metrze sześciennym, ponieważ gatunkowa ciężkość nieznacznie tylko się różni od wagi wody. Przy obliczeniach procentowych tak znacznie rozcieńczone rozżyny doprowadziłyby do zbyt znacznych ułamków, np. 7 milionowych części wyraziłoby trzeba przez 0,0007 procent.

chodów ludzkich łączy się zawartość 200—250 milionowych części chlorku sody. Pomiedzy uprawianymi roślinami nie znamy żadnej takiej, której wymagania co do chlorku sody nie zadowoliliby powyższa zawartość; natomiast wiele roślin, dla których zawartość ta jest za silna, i skoro koncentracja na polach irygowanych (odchodami) w skutek silnego parowania w suchych i ciepłych dniach letnich znacznie się wzmoże, wtenczas zagraża chlorek sody nie tylko rozwojowi kartofli i buraków, ale także i innych mniej wrażliwych roślin.

Z wyżej wymienionych 100 milionowych części azotu, pozostaje 90 w kształcie amoniaku, reszta w organicznych związkach. Nietylko ten ostatni nader jest zmienny, ale nawet gotowy amoniak odchodów ludzkich nadzwyczaj wielką przejawia skłonność do przejścia przy dostępie powietrza w kwas saletrzany (azotowy).

Oprócz powyższego składu uwzględnić także należy w skanalizowanych odchodach ludzkich dość znaczną ilość rozmaitych innych materiałów, mineralnych, a nawet organicznych. Do nich zaliczamy najpierw wióry, słomę, liście, gałgany, pierze i t. d. z jednej strony, piasek z drugiej; pochodzą one głównie z dziedzińców i ulic. Gdzie odchody ludzkie pompować trzeba, tam zwykle grubsze tego rodzaju materiały chwytają się za pomocą osobnych przyrządów, albo oddziela się przez stałe lub obracające się kraty. O oddaleniu ich dbać trzeba nawet w tych miejscowościach, gdzie odchody spływają własnym spadkiem.

Pozostający w zawieszeniu, a wynoszący około 100 milionowych części drobny szlam, pochodzący z odchodów ludzkich, odpadków kuchennych i fabrycznych, jako też błota ulicznego składa się w mniej więcej 2/3 części z organicznych materiałów, włącznie różnych mikroskopicznych organizmów, w jednej trzeciej części z drobnego piasku, gliny, wapna, fosfatów ziemnych, siarki i t. d. Szlam ten osusza się bardzo powolnie. Gdzie się w znaczniejszej osusza warstwie, tam nadzwyczaj szybko i energicznie zapobiega filtracji skanalizowanych odchodów, i dozwala jedynie na powolne przesiąkanie. Zapewnia to znaczne korzyści tak otwartym jak podziemnym kanałom i rowom w mieście, jak i doprowadzającym rowom na polu. Natomiast szlam ten tak znaczne nasuwa trudności uprawie opartej na skanalizowanych odchodach ludzkich, iż chętnie rolnicy zrzekliby się nawozowej jego własności i niejednokrotnie podnoszono myśl, czyby nie należało odchody ludzkie przed gospodarstwem ich użyciem na sztucznej drodze uwolnić od tego szlamu? Z wyjątkiem bowiem grubo-ziarnistego piasku, szlam ten w krótkim czasie zamuli każdą rolę, uczyni ją nieprzepuszczalną tak dla wody jak dla powietrza; tworzą się stawki pełne odchodów, trawa albo zbyt szybko wybuja, albo zgnije w tkankach korzeni. Przy suchym i gorącym powietrzu przepuszczalność roli jako tako przywrócić można, za pomocą poryodycznego wysuszenia warstwy mułu. W czasie zaś długotrwałej wilgoci i zimna nie ma innej rady, zwłaszcza na obszarach obsianych rawami, tylko za-prześcić irygacji skanalizowanymi odchodami. Ponieważ dalej muł ten zawiera w sobie właściwe odchody, a częściowo także pasorzytne trujące organizmy, przeto zbrukaną nim paszy zielonej byłoby żadną miarą spożywać nie będzie, warzywa zaś stają się dla ludzi co najmniej nie apetyczne, jeśli nie wprost niebezpieczne.

Oprócz wyżej wymienionych składników znajduje się jeszcze

w skanalizowanych odchodach ludzkich dość znaczna ilość przypadkowych materiałów, a mianowicie odpadki rozmaitych gałęzi przemysłu. Materiały te są po części dość szkodliwe dla wzrostu roślin, jak np. większą część soli metalowych. Zadaniem chemika rolniczego jest zwrócenie uwagi na obecność tych szkodliwych substancji. Zarząd zaś miejski powinien ku usunięciu ich stosowne zarządzać środki.

Do zadań, które chemia rolnicza przy bezpośrednim zużywaniu rolniczym odchodów ludzkich rozwiązać powinna, należy także drugie ważniejsze i trudniejsze pytanie, a mianowicie, jak zużytkować wszelkie wyprodukowane odchody w każdym wypadku i bez niebezpieczeństwa dla zdrowotności okolicy?

W Anglii, gdzie zima jest tak łagodna, iż wegetacja uprawianych traw i roślin kłosowych prawie nigdy nie usypia w zupełności, tylko cokolwiek zostaje osłabiona, zużytkowanie to żadnych prawie nie nastęca trudności. W każdym razie zmarznięcie roli nigdy prawie nie przeszkadza irygacji, wilgoć zimowa utrudnia ją jedynie. Ztąd też każdego czasu wywieźć można odchody w pole; rola pochłania nawozowe ich składniki i oddaje je następnie późniejszej wegetacji, o ile naturalnie nie wsiąkną one w podglebie lub nie spłyną z wodą w drenach. Dzieje się to niestety! najczęściej z powstającym przez oksydację azotu cennym bardzo kwasem saletrzanym (azotowym).

Do najłatwiej przyswajalnych składników skanalizowanych odchodów ludzkich należy kwas fosforowy, następnie alkalie. Z wapna natomiast i z magnezyi, w skutek silnej nitrifikacji (przemiany azotu w kwas saletrzany) skanalizowanych odchodów ludzkich w wyższym stopniu wyczerpać możemy ziemię, niż dowieźć jej tych składników. Ważną przeto jest rzeczą przed urzędzeniem irygacji przekonać się o zdolności pochłaniania danych gruntów.

W naszych warunkach klimatycznych, irygację skanalizowanymi odchodami ludzkimi w zimie tylko czasowo urządzać można. Przytém uwzględnić należy, że ziemia w skutek tego rodzaju irygacji zubożać się nadmiernie w saletrę. Z wiosną więc rozwija się bardzo silnie wegetacja, natomiast przy gorącym i suchym lecie niejednokrotnie wręcz przeciwny spotykamy objaw, a mianowicie tak zwane spalenie. Im płycej rozkorzeniają się uprawiane rośliny, tém więcej wystawione są na powyższe niebezpieczeństwo. Zapobiega tej niedogodności jedynie dostateczny dowóz wilgoci, już to naturalny, t. j. wynikający z przyrodzonej wilgoci roli, już też sztuczny za pomocą nawodniania.

Na wysoko położonym gruncie piaszczystym, zimowe nawożenie odchodami, bez nawodniania w lecie przy uprawie zwykłych naszych roślin więcej szkody niż korzyści przyniesie. Natomiast udowodniły liczne doświadczenia, że nawożenie to nader jest odpowiednie pod głęboko rozkorzeniające się krzewy i drzewa tak owocowe jak i wszelkie inne, z wyjątkiem może jedynie drzew iglastych.

Przy ostrzej naszej zimie i powodowanym przez to silnym zmarznięciu roli nie ma innej drogi wyjścia, tylko przechowywanie na czas ten odchodów w możliwie przepuszczalnych dołach (basenach). Uskutecznień to, rzecz jasna, należy zanim mróz głęboko wniknął w ziemię, w przeciwnym bowiem razie utworzy się w ziemi zapora, uniemożliwiająca wszelkie wsiąkanie odchodów.

Inną znów niedogodnością jest wyżej już wzmiankowane zamulanie spodu dołów przez muł zawieszony w skanalizowanych odchodach ludzkich. Ponieważ nigdy nie można wiedzieć z pewnością, jak długo mróz trzymać będzie, poleca się klarowanie odchodów przed wpuszczeniem ich do dołów, najlepiej za pomocą prostego aparatu, który nietylko nie nasuwa znacznych trudności, ale się także opłacić jest w stanie przez użycie osadu na rolnicze lub techniczne cele (przepuszczenie przez glinę, filtrowanie przez węgiel torfowy i t. d.)

Ponieważ jednak przy tego rodzaju przechowywaniu odchodów o zadowalającej pod względem sanitarnym przemianie składników odchodów w minerały nawet mowy być nie może, lecz tylko o przesiąkaniu przez mniej lub więcej chemicznie absorbujące warstwy ziemi, przeto dokładnie zbadać należy, dokąd wsiąkają filtrowane odchody i gdzie się łączą z wodą zaskórną, a to w tym celu, aby nie zatrwały studni, lecz przeciwnie z wiosną mogły być zużytkowane.

Woda zaskórna w ogóle uboga jest w chlorek; o kierunku więc i o miejscowym jak i czasowym rozszerzaniu się bogatych w chlorek skanalizowanych odchodów ludzkich łatwo się przekonać możemy, poddając wodę zaskórną w rozmaitych odległościach od dołów, w których przechowane są odchody, w rozmaitym czasie dokładnej analizie.

Wreszcie przekonać się także należy, jak głęboko wsiąka w ziemię muł odchodów skanalizowanych? O ile przepuszczalność gruntu zmienia się w skutek organicznej substancji mułu, lub przez resztki korzeni roślin wyprodukowanych za pomocą odchodów? O ile wreszcie zmniejsza się przepuszczalność ziemi stopniowo lub na dłuższy przeciąg czasu przez mineralne składniki mułu odchodów, albo też przez mechaniczną przemianę początkowych składników ziemi?

St. Beki.

Z francuzkiego rolnictwa.

Nicea, 28 stycznia 1888 roku.

(Dalszy ciąg.—Patrz Nr. 8).

Kongres higienistów w Wiedniu. — Myszy jako rzeczoznawcy czy jest sfałszowane masło. — Z czego się wyrabia margarina. — Rozmnożenie się niesłychane królików w Australii i nagroda 25.000 funtów szterlingów za sposób ich wytepienia. — Zdanie Pasteur'a o sposobie wyniszczenia królików. — Wróble jako druga plaga Australii.

Na ostatnim kongresie higienicznym jaki odbył się w Wiedniu, przedewszystkiem zajęto się wybraniem komitetu do rozpoznawania pofałszowania pokarmów. Komitet ten międzynarodowy, a na czele jego postawiono dra Brouardel'a, dziekana fakultetu medycznego. Komitet ten otrzymał rozmaite naukowe doniesienia nieraz bardzo ciekawe. Do liczby takich właśnie należy między innymi wiadomość, jaką nadesłał chemik Mecoy z Princeton w Stanach Zjednoczonych. Lisze on tak: „Dotychczas chemia nie mogła znaleźć praktycznego sposobu dla oznaczenia obecności margaryny w maśle. Otoż przypadek wskazał nam taki sposób i to bardzo oryginalny, chociaż mało naukowy, lecz za to pewny, o co podobno najwięcej w tej sprawie chodzi. Otrzymałem pewnego dnia, powiada p. Mecoy, 12 próbek masła do sprawdzenia, czy niezawierają w sobie margaryny. Dla dopełnienia analizy, każda z tych próbek osobno w innym naczyniu została przetopiona i po zlaniu potrzebną ilość do próby, reszta została tymczasem z naczyniem przez noc na stole w laboratorium. Jakżem się zdziwił nazajutrz, zobaczywszy, że z 12 tych naczyń z resztkami masła, z 10 zostały one do szczytu wyjedzone przez myszy, kiedy w dwóch naczyniach pozostało ono ani tknięte. Po dokonaniu analizy pokazało się właśnie, że myszy tych dwóch próbek masła nietknęły, które w sobie margarynę zawierały, zjadły zaś te, gdzie masło było naturalne, czyli niesfałszowane. Nie wiedząc zrazu, czy to należy przypisać przypadkowi, że właśnie te dwie próbki pozostały nieruszone, gdzie masło było margaryną sfałszowane, zrobiłem dla przekonania się kilka prób, stawiając na noc masło sfałszowane, obok naturalnego. Nazajutrz znowu się to samo pokazało: że masło naturalne zostało do szczytu wyjedzone, kiedy masło margarynowe zostało nietknięte. a tylko parę razy odrobiny skosztowane jakby na próbę, żeby się przekonać o jego wartości. Zrobiłem więc jeszcze więcej prób, powiada p. Mecoy, i z nich doszedłem ostatecznie do tego przekonania, że myszy jedzą tylko wtedy masło margarynowe, gdy będąc zgłodniałe, nie mają czem innym zaspokoić swego głodu. Nietkną go się jednak wcale, skoro obok niego znajdują coś innego do zjedzenia, jak tu masło naturalne. Zanim zatem chemia natrafi na środek prosty i łatwy do rozpoznania margaryny w maśle, to tymczasem komu to rozpoznanie potrzebne, może je na pewno przy pomocy myszy dopełnić.“

Dla objaśnienia dodamy: że margarina, czyli sztuczne masło, posiada kolor i miękkość naturalnego, a w smaku pewne podobieństwo do niego, dla tego też, gdy z niem jest zmieszane, to zwłaszcza w użyciu do potraw, niemożna rozpoznać smakiem: czy masło było naturalne, czy sfałszowane; otoż ta margarina przy pomocy chemii wyrabia się z wszelkich łojów, jak kawałków świec, odkrawków od mięsa, wywaru z kości i t. p. nie bardzo apetycznych ingrediencyj, które pod względem zdrowia podobno myszy najlepiej oceniają, że jest niepożyteczna.

Wiadomo, że niebaczone dozwoleństwo rozmnażania się królików w stanie dziczycałym w Australii do tego doprowadziło: że zwierzęta te rozmnożywszy się w niezliczonej liczbie, stały się

istotnie taką plagą dla tamtejszych rolników, że już nie wytopienie jej, lecz przynajmniej przyzwoite ograniczenie stało się dla nich niemożliwością. Króliki te mnożąc się cały rok ciągle, zjadają wszelkie płody rolnicze, zarządzając przez to nieobliczone szkody. Rząd nie widząc innego sposobu, wyznaczył nagrody 25.000 funtów szterlingów, temu, ktoby podał jakiś praktyczny a skuteczny środek wytopienia szkodników, co jednak wcale nie jest łatwą rzeczą. Jeden z paryzkich dzienników zamieścił w swych szpaltach ogłoszenie tej nagrody rządu australskiego i oto co w tej sprawie pod datą 27 listopada roku zeszłego odpowiedział Pasteur:

„Panie redaktorze! W dzienniku pańskim przed kilku dniami było doniesienie: że rząd Nowo-południowej Wallii (australskiej prowincji) czując się do tego stopnia bezsilnym w walce przeciw pladze szczególnego rodzaju, rozmnożenia się nad wszelką miarę królików, postanowił znaczną nagrodę 25.000 f. st. za wynalezienie postępowania na wytopienie tych szkodników, które już w całych okolicach zmusiły rolników do opuszczenia swych gruntów i do zaprzestania chowu owiec, ponieważ ich niema czym żywić. Każdej zimy wprawdzie ginie tam królików miliony, lecz mimo tego, gdy przyjdzie lato, nie znać, aby ich liczba zmniejszyła się, taka ich mnożność niezmierna.

„Pozwoliszże pan, abym za pomocą pańskiego dziennika przesłał do tych tak oddalonych od nas stron pewne myśli, których zastosowanie w praktyce być może, że zyskałoby pewne powodzenie.

„Dotychczas dla wytopienia plagi króliczej używano tam istot mineralnych, zwłaszcza połączeń z fosforem. Uciekając się jednak do podobnych tylko środków, postępowano po zupełnie błędnej drodze. Dla wytopienia zwierząt zdolnych do rozmnożenia się w niesłychany sposób, cóż pomódz mogą podobne mineralne środki? One zabijają tylko, a przynajmniej zabić mogą króliki w tym jedynie tylko miejscu, gdzie trucizna położona została. I może to przynieść jaki praktyczny skutek? Jeżeli by co istotnie mogło pomódz, to jeżeli mam wyznać, chyba trucizna tak samo jak króliki obdarzona życiem i jak one mogąc się rozmnażać z niesłychaną płodnością. Z tego to powodu chciałem, aby szukano takiego środka, któryby rozniósł śmierć po jamach króliczych w Nowo-południowej Wallii i w Nowej Zelandyi, a to przez zaszczepienie królikom choroby mogącej się stać dla nich zabójczą zarazą. Właśnie istnieje taka, znana pod nazwiskiem cholery kurzkiej, a którą w mém laboratorium bardzo pilnie badam. Choroba ta jest właściwą także królikom. W doświadczeniach moich zgromadziwszy pewną liczbę kur w dość ciasnym miejscu i dając im żywność zaprawioną mikroby tej zarazy cholery kurzkiej, otrzymując ten rezultat, że one wkrótce giną z tego powodu.

„Na wsiach często się zdarza, że drób zdycha w skutku tej epidemii, która się szerzy i udziela przez to, że pierwsze kury zapadłe na tę zarazę odchodami swymi zarażają inne sztuki przez zanieczyszczenie ziemi i żywności posypywanej dla wszystkich. Sądzę zatem, że podobny wypadek będzie miał miejsce i z królikami, które dotknięte zarazą, kryjąc się w swych norach i tam ginąc, udziela choroby innym, które ją znowu z kolei rozniosą coraz to dalej. Cóż więc robić, aby pierwszym królikom zaszczepić tę zabójczą zarazę? Nic nad to łatwiejszego, potrzeba tylko około pewnej liczby króliczych nor wznieść do koła niewielki, lecz nieprzebyty płot, aby ogrozić miejsce, na którymby zerowały wyszły ze swych nor króliki. Za pomocą doświadczeń przekonałem się, że bardzo jest łatwo rozmnażać w stanie zupełnej czystości i na skalę tak wielką, jak potrzeba mikroby cholery kurzkiej w rosole z jakiegokolwiek mięsa. Rosolem tym skoro się skropi paszę w zagrodzonych płotkach, króliki niemając co innego do jedzenia, zmuszone będą ją spożyć i wkrótce poczną zdychać w jamach swoich roznosząc wszędzie zarazę.

„Dodam, że mikroby zarazy o której tu mowa, nie są szkodliwe dla żadnych zwierząt folwarcznych, z wyjątkiem kur, które jednak nie będą na nią narażone, ponieważ się nie pasą po polach, tém więcej, że przez pewien czas mogą być zatrzymane w swych kurnikach, gdzie im jednak niepowinno zbywać na pokarmie, czystej wodzie do picia, świeżem dobrze odnawianem powietrzu, a przytém kurniki muszą być choć co parę dni dobrze czyszczone i suchym piaskiem wysypywane. Sposób ten zatem, który podaję jest prosty, tani i łatwy do wykonania, a o jego zupełnej skuteczności z góry zapewniony jestem.“

Być może, że podobny sposób znajdzie się i przeciw drugiej pladze, dającej się we znaki gospodarzom i ogrodnikom w Australii, które sprowadzone tam z Anglii niebacznie dla tępienia niby robactwa, a oprócz tego swym święgotem przypominania Anglikom ojczyznę, pod wpływem ciepłego klimatu rozmnożyły się

w niewypowiedzianej liczbie i zamiast żywić się robakami, wołą, się rzucić na pola obsiane pszenicą, na winnice, sady i t. d. Ze ta plaga musi być straszna, dowodzą skargi gospodarzy, w samych winnicach wróble nie w jednym miejscu po kilka centnarów dziennie zjadły im winogron, ich żarłoczność jest tak zuchwała, że nawet strzały ledwie na chwilę ich odstraszają. (D. n.)

ROZMAITOŚCI.

Uprawa topinamburów v. bulw. Topinambury (*Heliantus tuberosus*) pomimo znacznego rozpowszechnienia wielu rolnikom zupełnie nieznanym do dziś dnia są płodem. Posłuchajmy, co o uprawie tego płodu mówi pewien rolnik z Saksonii: Hodowałem tę niewymagającą roślinę na najgorszych nieużytkach, i sprzętałem ją do ośmiu lat z rzędu. Przy najstaranniejszym sprzęcie pozostaje zawsze w roli znaczna ilość mniejszych i większych kłębów, z których w następnym roku tak gęsto wyrosną topinambury, iż zachodzi potrzeba usuwania pojedynczych roślin. Uskutecznia się to za pomocą brony, radła, lub gdy rośliny stoja nierówno, za pomocą motyki. Zrobotą tą jednakowoż zbyt ciężko ociągać się nie wypada, ponieważ szybko rosnące rośliny cierpią na tém. Nawoziłem topinambury obornikiem, nie uważam go jednak za niezbędny; kaimit lub żuźle Thomasa zastąpią go bardzo odpowiednio. Azot jest zupełnie zbyteczny, ponieważ topinambury zdają się należeć do roślin azot gromadzących. Uprawa jest ta sama co kartofli, wysiew eokolwiek mniejszy: sześć do siedmiu centnarów na morg (magdebrski); wysiew rychłej można uskutecznić niż kartofli, ponieważ kłęb topinamburów nie ulega zmarznięciu. Sprzęt kłębów, ponieważ nie zmarzną, natomiast psują się w kopcach lub piwnicach, odbywa się na wiosnę. Gdy ich w późnej wiosnie spaść już nie można bydłem, najlepiej je zadołować. Łodygi lub nać należy związane poustawiać w polu i zwozić następnie według potrzeby na paszę. Natomiast niekorzystnie jest układać łodygi w sterty lub przechowywać pod dachem. Sprzętałem zwykle 40 do 80 centnarów kłębów i 10 do 40 centnarów łodyg z morga (magdebrskiego). Kłębami pasłem przeważnie żrebaki i konie robocze i woły. Zwierzęta przy tej paszy zawsze w dobrym były stanie, nie było też żadnych wypadków kolek, tak często się objawiających przy paszeniu kartoflami. Topinambury uważam za najodpowiedniejszą paszę dla żrebaków; dla koni i wołów służyć powinny jedynie jako dodatek do paszy. Zarówno kłęby jak łodygi topinamburów bardzo dobrą są paszą dla owiec. Owce obżerają chętniej łodygi topinamburów, niż najpikniejsze siano łączne. Nawet grube i twarde łodygi żrą owce z wielkim apetytem. Aby zatrzymać listki przy łodygach, należy je skosić przed nastaniem silnych mrozów; w przeciwnym bowiem razie poodpadają liście. Nie umiem rozsądzić, czy biały, czy czerwony topinambur znaczniejsze nasuwa korzyści; uprawiam obidwie odmiany. Uprawa topinamburów na znaczniejsze zasługuje rozpowszechnienie, na lichych nawet gruntach znaczne zapewnia sprzęty. Prócz tego zapewniają topinambury dla zajęcy i kuropatw bezpieczne schronienie przed słątą jesienną i zimową zamiecią. Zajęce też z wielką chciwością objadają liście i łodygi topinamburów, i bardzo dobrze przy tej paszy się przezimują. x

Dziesięcioro przykazań dla rolnika.

W ostatnim numerze *Gazety Rolniczej* jeden z ziemian naszych podaje pod adresem rolników następujące 10 przykazań:

- 1) Nie będziesz obciążał ziemi twojej długiem wymagalnym, którego sama w twojem ręku spłacić nie zdołała.
- 2) Nie będziesz brał pieniędzy ani podpisu bliźniego twego bez zupełnej pewności oddania długu.
- 3) Pamiętaj, abys terminów święcie dotrzymywał.
- 4) Szanuj fortunę i kochaj ziemię swoją.
- 5) Nie zabijaj mienia twego ryzykownemi wkładami.
- 6) Nie gospodaruj na oślep wedle wzorów cudzych; ucz się z przykładów i ksiązek, a stosuj podług rozsądku własnego.
- 7) Nie kradnij sobie czasu, służbie płacy, strawy ni okras, a dobytkowi paszy.
- 8) Nie mów bliźniemu twemu fałszywego świadectwa o powodzeniu gospodarki twojej.
- 9) Nie pożąday na skromnej niwie twojej świetnych zysków bankierskich.
- 10) Ani blasku, ani sławy, ani zbytku, ani żadnej rzeczy która z wielkiego świata jest.

Będziesz miłował zagrodę swoją nadewszystko, a pracował na szacunek współobywateli twoich.

Sprawozdanie tygodniowe.

Bank Kredytowy Donimirski, Kalkstein, Łyskowski i Sp. w Toruniu.

Toruń dnia 20 lutego 1888 r.

Prawie przez cały tydzień mieliśmy zupełną odwilż. Od wczoraj śnieg przy małym przymrozku.

W usposobieniu targów zbożowych nie zaszła prawie żadna zmiana. Chęci do kupna zawsze mało.

W Nowym-Yorku były targi zbożowe przeważnie słabe, chwilami okazywało się większe zainteresowanie, tak, że ceny nawet niekiedy cokolwiek wyższe osiągnęto. Zwyciężyły jednak były bardzo krótkotrwałe, tak, że ostateczne notowanie o przeszło pół centa jest niższe od przeszłotygodniowego. Eksport pozostał i w tym tygodniu mały, a mimo to zmniejszyły się zapasy kontrolowane o około 2/3 miliona buszli i wynoszą obecnie 40,288,000 buszli pszenicy w stosunku do 51,323,000 buszli przed rokiem.

W Anglii były dowozy zboża tak krajowego jak i zagranicznego bardzo niewielkie, skutkiem czego sprzedający wyższe stawiali trochę żądania; że jednak kupujący po tych cenach nabywać nie chcieli, obracał się interes w ciasnych bardzo granicach.

Targi francuskie były spokojne, ceny jednakże tak pszenicy jak i mąki notowano trochę wyższe.

Belgia miała targi spokojne przy cenach zeszłotygodniowych. Holandia niższe notowała ceny.

Na placu naszym pozostały ceny bez zmiany. Konieczny zaniebdane, popytu na towar ten żadnego, chociaż dowozów dotąd mamy mało.

Płacono za 1000 kilogramów		Rub. za pud	
w hol. fun.	Marek	przy kursie	175
Pszemica transito	118—133 fun.	90—118	0,93—1,10
krajowa pstra	120—128	138—142	
krajowa	126—131	142—144	
krajowa jasna	120—126	140—145	
krajowa wybor.	128—133	146—148	
Zyto transito	115—125	56—65	0,53—0,61
krajowe	115—124	95—98	
	126—128	100—102	
Jęczmień tranzyto		60—90	0,56—0,84
krajowy		80—110	
Owies ruski tranzyto		40—60	0,38—0,56
krajowy		85—100	
Groch tranzytowy		70—105	0,65—1,98
na paszę		90—95	
kuchenny		100—120	
Victoria		110—130	
Rzepak transito		170—180	1,58—1,68
Rzepak grubo ziarnisty świeży suchy		185—192	
Rzepak świeży suchy		180—190	
Lubin niebieski		50—58	0,47—0,54
zółty		60—68	0,56—0,64
Wyka czarna		80—90	0,75—0,84
Kuch rzepakowy		5,00—5,40	0,93—1,01
Kuch lniany		5,00—5,40	0,93—0,01
Otręby pszenne		2,90—3,10	0,54—0,58
Otręby żytnie		2,90—3,05	0,54—0,57
Koniczyna czerwona		18—35	3,35—6,51
biała		18—32	3,35—5,95
Tymotka		20—28	3,72—5,21

W Hamburgu targi na okowitę ciągle słabe, a ceny dalszym uległy obniżeniu. Płacono:

loco bez beczki marek	16 1/2	kop.	17
w beczk. kontrak. loco	21		36
na luty	21		36
na luty-marzec	21		36
na marzec-kwiecień	21 1/4		36
na kwiecień-maj	21 1/2		38
na maj-czerwiec	21 3/4		39

co odpowiadają franko Aleksandrowo po potrąceniu wszelkich kosztów i wartości beczki za wiadro 80% przy kursie 180.

Dzisiejsze kursa berlińskie.

Ruskie banknoty	171.80	Mrk.
Pszemica na kwiecień-maj	162.50	"
na czerwiec-lipiec	167.50	"
Nowy-York	89.50	"
Zyto loco	114.00	"
kwiecień-maj	120.70	"
maj-czerwiec	122.00	"
czerwiec-lipiec	124.25	"
Olej rzepakowy na kwiecień-maj	44.50	"
sierpień-październik	44.70	"
Okowita loco	97.50	"
70 mr. na opłatę konsumcyjną	30.10	"
na kwiecień-maj	98.30	"
na maj-czerwiec	98.90	"

Geny średnie w Warszawie ze źródła urzędowego

ZA MIESIĄC STYCZEŃ 1888 r.

Cena średnia		Cena średnia	
Pszemica	czetw. 10.25	Kapusty głowa	kop. 4—6
Zyto	" 6.22 1/2	Kartofli	czetw. rub. 2.40
Owies	" 3.98 3/4	Buraków	czetw. rub. 1.98 3/4
Jęczmień	" 5.40	Sól	pud kop. 45
Gryka	" 6.62 1/2	Pieprz	funt kop. 54
Groch polny	" 8—	Ocet winny	wiadro rub. 1.40
Rzepak letniego	" 13—	piwny	" kop. 80
Rzepak zimowy	" 15—	Spirytus 90°	pr. wiadro 11.37 1/2
Wół najlepszy	rub. 104.50	Spirytus 78°	pr. " 8.65
średni	" 85.25	Okowita 40	pr. " 4.85
Wołowina połędwica	f. kop. 11 1/2	Wódka 10 pr.	wiadro rub. 4.85
Cielęcina	kop. 12 1/2	6 pr. szum.	" 4.85
Wieprzowina	kop. 11 7/8	Siemie lniane	funt kop. 4 1/2
Baranina	kop. 15	Siemie konopne	" 4 1/2
Łój wołowy	pud 3.20	Chmiel krajowy	pud rub. 28.
Słonina	" 5.37 1/2	zagraniczny	" 38.
Sadło świeże	funt kop. 15	Świece stearyn.	funt kop. 24 1/2
Smalec wieprzowy	funt kop. 20	Drzewo twar. sąż.	kub. rub. 16.25
Indyk żywy	rub. 2.00—2.50	opał. sosn. za sąż.	" kub. zawier. 182 1/2
Indyk bity	" 2.00—2.50	ang. stóp kub.	rub. 13.50
Perliczka	kop. 90	Piwo zwycz.	wiadro kop. 50
Kaczka bita	kop. 75	bawarskie	" rub. 1.00
Kura	" kop. 50	Olej lniany	pud " 4.70
Kasza pszenna za czetw.	18.20	konopny	" " 5.50
perłowa	rub. 18.50	rzepakowy	" " 4.75
grycz. drob.	" 18.00	oczyszczony	" " 5.40
" zwycz.)	za czetw. 11.20	Wosk	funt kop. 57 1/2
jęczmienna	mająca 8 7.60	Mydło zwyczajne	" " 11
jaglana	pud. wagi 9.30	Mydło szare	" " 9
owsiana	" 13.00	Płótno szare	" " 20
Mąka żytnia razowa cz.	7.80	Płótno lniane	" " 25
Mąka żytnia pyłkowa	pud 1.25	Len	pud rub. 8.00
pszenna zwycz.	" 2.01 7/8	Konopie	" " 6.00
" krupecz.	" 2.40 3/8	Skóra końska	sztuka 5.25
gryczana	" 1.10	Skóra wołowa	" 11.00
ziemiaczana	" 2.00	Skóra cielęca	" 1.50
Otręby żytnie	pud kop. 5 7/8	Stal krajowa	pud 5.60
pszenne	" 5 1/2	Stal angielska	" 10.40
Chleb żytni	funt " 3	Żelazo kute	" 2.10
sytny	" " 2 5/8	walcowane	" 1.90
pszenny	" " 6 1/4	Węgiel kam. kraj.	pud kop. 17
lepszy	" " 7 1/2	Koks z fabryki gazu z do-	
Mleko świeże garniec	kop. 30	stawą korzec	kop. 77 1/2
zbierane	" kop. 24	Węgiel angielski	czetw. 1.80
Masła świeżego	funt kop. 40	Nafta kaukazka	pud 1.50
solonego	pud kop. 11.56 1/4	Płacono za dzień roboty	
Śmietany kwarta	od k. 30—35	wyrobnikowi	kop. 53 1/3
Cukier kostkowy	funt kop. 13	Wyrobnikowi z koniem r.	2.21 7/8
Kawa	funt kop. 60—70	Wyrobnikowi z 2 końmi	3.37 1/2
Jaj setka	rub. 2.51 7/8		