

# KORRESPONDENT

## ROLNICZY \* HANDLOWY I PRZEMYSŁOWY.

WYCHODZI JAKO PISMO DODATKOWE BEZPŁATNE PRZY „GAZECIE WARSZAWSKIEJ.”

### Ptactwo domowe.

Do ptactwa domowego, czyli drobin w ścisłym znaczeniu i z punktu czysto gospodarskiego, należą: kury, indyki, kaczki i gęsi.

Kura domowa należy niewątpliwie do najdawniej przez człowieka oswojonych stworzeń. Niezawodną jest rzeczą, że wcześniej od wszelkich innych ptaków, jako drób domowy, była już hodowana.

Ze znanych obecnie gatunków kur opiszemy tylko te, które ze względu na obfite znoszenie jaj i łatwość w tuczeniu, najwięcej pożytku w gospodarstwie przynieść mogą. Do takich w pierwszym rzędzie należą kury włoskie.

Głównymi cechami dobrych kur włoskich są: żółty dziób, duży grzebień u kur, sterczący w górę, u kogutów na dół spuszczone, gładko do ciała przylegające opierzenie, postawa wyprostowana, szyja i ogon do góry wzniesione. Włoskie kury wielkością niewiele przewyższają nasze ulepszone kokosze wiejskie, różnią się tęp jednak, że cała ich postać odznacza się lekkością, ruchliwością i elegancją. Wszystkie odcienie pierza, znajdujące się u naszych kur domowych, posiadają zarówno kury włoskie.

Rocznie znoszą one do 200 jaj, ważących średnio 71 gram., co odpowiada ogółem wadze 280 zwyczajnych jaj kurzych. Obfitość jaj i ich waga odznaczają kurę włoską, jako najlepszą z pomiędzy ras nośnych, przymiot daje się ona łatwo tuczyć, a mięsa ma wiele i bardzo delikatnego. Do krzyżowania nie radziłbym używać kur włoskich. Kto może dostać włoskiego koguta, nie znajdzie również trudności w nabyciu pary kur tego samego gatunku, i we dwa lata doczeka się tak obfitego plemienia kur nośnych, jakiego chyba po kilku pokoleniach wytworzyć zdołał, krzyżując włoskiego koguta z kurami wiejskimi.

Wczesne wysiadywanie kurcząt stanowi także przymiot kur włoskich. Nie należałoby nigdy sadzić ich później niż w początku kwietnia żeby wyhodować za wczesu jesienne i zimowe nośne kury młode. Kurczęta, prócz dobrego pożywienia, nie potrzebują żadnych szczególnych starań, rosną tak szybko, że zaczynają nieraz znosić jaja w piątym, a zwykle w szóstym miesiącu życia. Najbardziej do tej rasy kur zbliżoną pod względem powierzchownych oznak, jak też z innych przymiotów i płodności, jest rasa hiszpańska. Kury tej rasy mają bardzo duże, pojedyncze, foremne i głęboko w zęby wycięte grzebienie, długie, wielkie i cienkie dzwonki, gładko do ciała przylegające pierze, duże, białe płatki uszne, wysmukłe i długie pałki nóg i poważną postawę. Waga 3 do 4 kilogr.; kury nieco lżejsze od kogutów. Temperament żywy i do niezgody skłonny.

Hiszpanki niosą w ogóle jaja duże, 70 do 80 gr. wagi mające, o dość twardej, białej błyszczącej skorupie, lecz płodność ich bywa bardzo niejednostajna: niosą od 120 do 180 jaj średnio w ciągu roku.

Prof. dr. Heller z Kielu sądzi, że najlepsze do krzyżowania z hiszpankami są langshany. W rzeczy samej, jedyna ta rasa, posiadająca ca wszelkie pożądane przymioty, których hiszpankom brakuje, a których połączenie w potomstwie utworzyłoby najdoskonalszy gatunek drobin.

Następnie kury hamburskie, przynajmniej niektóre ich gatunki, ilością składanych jaj, lecz bynajmniej nie ich wielkością, częstokroć przewyższają wszystkie inne rasy, a przymiot do najpiękniejszych należą.

Główne cechy tej rasy są następujące: grzebień wycinany, ku tyłowi długo i ostro zakończony; płatki uszne zwieszane i zaokrąglo-

ne, długie i szerokie kopy, znacznie krótsze sterówki, niskie nogi, postawa zgrabna i temperament żywy. Hamburki dochodzą średniej wielkości, najpiękniejsze ich gatunki: zlocisto- i srebrno-centkowane należą nawet do mniejszych ras kurzych. Niosą się one prawie codziennie; jaja stosunkowo nie są zbyt duże, lecz smaczne. Do krzyżowania rasa ta wcale jest nieprzydatna.

Do rzędu rozpowszechnionych dopiero od lat kilku w szerszym rozmiarze, kur pożytecznych do chowu, należą kury tureckie. Wyróżniają się one z pomiędzy wszystkich innych ras czerwoną jak krew, nagą szyją. Nawet głowa, oprócz ciemienia, zarosłego kępką fryzowanych piórek, jest również obnażona i tej samej czerwono-krwawej barwy. Dziób umiarkowanie krótki, silny, grzebień w formie muszli, pojedynczy i mocno zakłowany. Kadłub krótki, gruby, nawet niezgrabny; pierś pełna, lecz niezbyt mięsista. Skrzydła raczej krótkie niż długie, ogon krótki i umiarkowanie szeroki.

Przymioty, jakimi się ta rasa w gospodarstwie odznacza, są następujące: obfitość mięsa, łatwość w tuczeniu, pilne znoszenie jaj umiarkowanej wielkości, nadzwyczajna wytrzymałość i niewybredność, szczególnie co do gatunku pożywienia, powszechnie uznana. Młode kury nawet przy silnym chłdzie wczesnie się nieść zaczynają i niosą 160 do 180 jaj rocznie, co stosunkowo do obecności wysiadywania, której ta rasa bardzo mało posiada, jest niezaprzeczenie bardzo wiele. Młode bez szczególnych starań rosną dobrze, zdrowe są, wesole i od samego wyklucia bardzo wytrwałe. Słusznie baron Villa-Secca gorąco zaleca hodowanie tych dużych, mocnych, dobrze zbudowanych kur, uważając tę rasę za bardzo cenny nabytek w gospodarstwie.

Przejdziemy teraz do opisu ras, które noszą ogólną nazwę szlachetnych kur francuzkich. Tu należą: hudany, crève-coeury i laflèche. Hudany uważane są za pierwiastkowe pokolenie, z którego ród swój wiodą kury francuzkie; od nich pochodzą, zawdzięczając doborowej hodowli, prowadzonej w Normandii, crève-coeury, a przez krzyżowanie z krwią hiszpańską w kilku naraz miejscowościach Francji powstała rasa laflèche.

U prawdziwych hudanów grzebień powinien być duży, podobny do dwóch kart książki, w środku rozdzielony niby gałązką koralową w pęczek ułożoną. Dziób umiarkowanej wielkości, płatki dość duże i pięknie zaokrąglone, uszy małe, pod zarostem nie widoczne prawie, czepek duży i suty, unoszący się po za grzebieniem, broda i bokobrody gęste i długie. Szyja umiarkowanej długości, pięknie zakrzywioną dumnie w górę noszona i gęsto pierzem porośnięta. Tułów pełny, okrągły i mięsisty; grzebień szeroki i nieco tylko ku tyłowi spuszczone, kupper również szeroki, pierś pełna, wystająca naprzód, skrzydła mocno rozwinięte, ściśle przylegające do ciała. Uda krótkie, pałki zupełnie z piór obnażone i silne; wszystkie palce, nawet piąty, dobrze rozwinięte; ogon duży z szerokimi, rozwiewającymi się sterówkami. Postawa wyprostowana, temperament żywy, lecz łagodny. Waga dorosłego koguta wynosi 4 do 4,5 kilogr.; młodego, zdatnego na zabicie 2,5 do 3 kilogr.; kury są nieco mniejsze i lżejsze.

Rasa hudańska łączy w sobie wszystkie przymioty, których tylko z ekonomicznego punktu widzenia od kur wymagać można. Szybki i wczesny wzrost młodych, a skutkiem tego wczesne niesienie się i przedkie tuczenie, do którego nawet starsze sztuki są skłonne; wielka płodność, duże, ciężkie, smaczne jaja; mięso pod względem delikatności smaku nie pozostawiające nie do życzenia, duża waga przy małych stosunkowo kościach; zapłodnienie pewne przy pomocy silnego zwykle koguta, któremu więcej kur wydzielić można niż samcom innej rasy; chów pomyślny w ciasnych nawet kurnikach łatwe hodowanie młodych, które wczesnie okazują skłonności płci swój właściwe, a młode kokoszki wiosenne już na jesieni wybornie się niosą, — wszystkie te przymioty razem połączone, rzadko która posiada rasa.

Mają jednak hudany i wady. Jedną z nich zjadanie piór, drugą stałe zamoczenie czubka. Pierwszej, której uczą się młode koguciki, skubiąc czubki kurek, zapobiedz można, odłączając od siebie za wczesu

dwa rodzaje, co też i z innych względów jest bardzo higienicznym, w szczególności jeżeli drób na utuczenie się przeznaczają. Trudniej jednak poradzić drugiej: przemoczeniu zbyt dużego czubka, gdy ptak pije, zjadł łatwo powstają choroby oczu i cierpienia reumatyczne. Jedynym na to radykalnym środkiem jest podcinanie czubka nad czołem i nad oczyma, co naturalnie powtarzać trzeba po każdym pierzeniu się.

Drugą szlachetną rasą kur francuzkich są crève-coeury, które otrzymały nazwę od wioski w Normandii, w której najpierw kury te hodować zaczęto i gdzie do dziś z największą pieczołowitością zajmują się ich chowem.

Główne cechy tej rasy: głowa w czepku, faworyty i dzwonki sute, grzebień dwurożny, płatki umiarkowanej długości, budowa ciała krótka i przysadkowa, postać niska, nogi krótkie i mocne.

Rasa ta należy do silnych, umiarkowanej wielkości, lecz niskonogich, a co do ilości mięsa pomiędzy wszystkimi innymi pierwsze trzyma miejsce. Kogut waży 4, kura 3½ kilogr.

Crève-coeury wytrzymalsze są od wszystkich innych szlachetnych ras we Francji, bardzo dobrze znoszą mrozy i upały. Młode w pierwszych dniach życia są wprawdzie nieco delikatne, strzedz je trzeba od zimna i wilgoci, lecz wkrótce porastają pierzem i hartują się.

Lafèches—trzecia i ostatnia rasa kur francuzkich różni się od dwóch pierwszych następującymi cechami: krótszymi różkami, głową o zmniejszonym czepku, bez zasłony, brody i dzwonek, płatkami umiarkowanie długimi, budową silną i postacią wyniosłą.

Lafèches mają być najładniejszą rasą francuzką. Mięso ich znajdują znawcy nieporównanym w smaku. Skórę mają tak cieką i delikatną, że bardzo starannie skubać je trzeba, żeby jej nie uszkodzić. Mięso ich jest mało włókniste, smaczne i soczyste. Niosą się obficie, ale nie do zbytku; jaja niosą duże, około 80 gramów ważące, białe i smaczne.

Pozostaje mi jeszcze wspomnieć o wielkich rasach kur ayatyckich: kochinchinach, brahmaputrach i langshansach.

Dwie pierwsze rasy blisko z sobą spokrewnione, największe i najcięższe ze wszystkich znanych, które w rzeczywistości swą ojczyznę, południowych Chinach i Indochinach, zapewne na oko więcej się od siebie odróżniają, w Europie i Ameryce po czterdziestoletnim zaledwie ich zaaklimatyzowaniu prawie, że za jedną rasę uważać można. Obie rasy dochodzą mniej więcej do 6% kilogr. wagi, mają grube kości, mięso na piersiach mniej im narasta, a co ważniejsze, nie jest ono równie smaczne i soczyste, jak francuzkich kur na mięso hodowanych, i tylko mięso dobrze rozwiniętego uda jest delikatne i soczyste, naturalnie wtedy jedynie, gdy ptak jest młodszy nad 12 miesięcy.

Jedną z najwyższych zalet w szczególności kochinchinek jest ich uderzająca chęć do wysiadywania, co je bardzo pożytecznymi czyni w hodowaniu i wodzeniu kurcząt innych ras.

Pod względem niesienia się brahmaputry przewyższają kochinchinki, wiele jednak jeszcze pozostawiają do życzenia, szczególnie co do ilości i wagi jaj.

Langshansy, ostatnimi dopiero czasy sprowadzone z północnych Chin, słyną naprzód z wielkiej płodności, nawet w zimie, dalej mają być niezmiernie wytrzymałe na zimno i nakoniec mają, niby bardzo ściśle potomstwu swemu przelewać cechy rodowe. Ponieważ przymioty rasy tej nie są jeszcze dobrze zbadane, a więc do chowu langshansów nie zalecam.

Po kurach najważniejszą rolę w gospodarstwie zajmują indyki. Pomiedzy oswojonymi indykami nie wyrodziła się jeszcze żadna wybitna rasa.

Co się tyczy hodowli, to do rozplodu wybierać trzeba trzyletnich samców i od dwóch do sześciu lat samice, naturalnie z pomiędzy najsilniejszych i najlepszych. Hodowanie młodych wymaga wielkiej staranności i uwagi. W okolicach, gdzie wiosna zwykle wilgotna i chłodna bywa, pomyslna hodowla indycząt do wyjątkowych należy. Chcąc uniknąć strat, potrzeba trzymać indyczęta w izbach ogrzanych i suchych. Co do pierwszego karmu dla indycząt, to najwłaściwszymi twardo ugotowane i drobno usiekane jaja. Młode ochraniać należy mniej więcej do ośmiu tygodni. Wtedy jedzą już jak stare wszystko, co im za pokarm służyć może, z wyjątkiem roślin groszkowatych a najlepiej im smakuje mięso zwierząt zarówno ciepło, jak zimnokrwistych: kretów, myszy, żab, ślimaków i robactwa wszelkiego rodzaju. Chcąc jednak mieć drób silny i wielki, trzeba rano i wieczorem dawać dobre ziarno, a karmę zieloną zawsze mąką osypywać.

(Dalszy ciąg nastąpi.)

## WINA Z JAGÓD.

(Dalszy ciąg — patrz № 10).

### Wino z terek.

Tarki są owocem posiadającym znaczną ilość kwasu i garbniku, a bardzo mało wody i cukru. Zbierać je należy po pierwszych przymrozkach, gdy nabiorą miękkości i słodczy, i podobnie jak głóg, kilka dni macerować, to jest mieszać często drewnianą łyżką. Gdy zażną się lepić, naówczas zlewa się je gorącą wodą i pozostawia na kilka dni w spokoju, dotąd, póki przez wessanie pewnej ilości wody nie nabrzmięją. Potem rozciera się je o ile możności na delikatną masę, baczyć jednak należy na to, aby pestki pozostały w całości. Po upływie doby prassuje się masę, a na wytłoczyny nalewa się znowu taką samą ilość gorącej wody, jak przedtem. W każdym razie ilość użytej wody na jeden nalew nie powinna przenosić ilości terek, to jest na jedną kwartę terek bierze się jedną kwartę wody; gdy więc dwa razy nalewać będziemy, wypadnie na jedną kwartę terek dwie kwarty wody, co jest dostatecznym; gdy woda wyluguje wszystkie ciała i materje potrzebne do wina, natenczas zlewa się masę do worków i prassuje się; do otrzymanego soku dodaje się potrzebną ilość cukru i ustawia się beczkę z moszczem w izbie fermentacyjnej.

Wina z terek są nadzwyczaj trwałe, ciemnego koloru, ściągające i bardzo przyjemnego smaku; z domieszką małej ilości miodu imitują wina hiszpańskie.

W z ó r.

100 kwart soku z terek w powyższy sposób otrzymanego, 50 funtów cukru i 20 funtów miodu. Po ukończeniu fermentacji dolać 10 kwart spirytusu, a otrzymamy wino imitujące malagę.

### Warmuth owocowy, czyli wino piolunowe owocowe.

Ten gatunek wina możemy z każdego moszczu owocowego otrzymać. Najstosowniejsze moszcze do fabrykacji win piolunowych są te, które posiadają garbnik. Fabrykuje się je dwoma sposobami: gotując pewną ilość moszczu z piolunem (2 łoty na 100 kwart moszczu) aż do wygotowania połowy całej ilości moszczu, lub sporządzwszy essencję piolunową, wlewa się je do wina lub do moszczu i manipuluje się tak, jak z każdym innym winem.

Wermuthy należą do win leczniczych, są rozmaitej barwy, stosownie do tego, jakie moszcze użyliśmy na ich fabrykację. Smak mają łagodny, niekiedy słodki, nie co ściągający i gorzkawy. Najślawniejsze wina piolunowe pochodzą z Włoch, z Turyngu.

### Wino z jablek i gruszek.—Jablecznik albo cydr.

Znamy mnóstwo gatunków jablek i gruszek, a także i ich odmiany, nadające się do fabrykacji win: jableczników albo cydrów. To wyrażenie: „jablecznik albo cydr,” oznacza wina fabrykowane z jablek i gruszek. W krajach, gdzie się zajmują tym przemysłem i gdzie on jest bardzo rozwinięty, jak np. w Bawarii, Francji, Anglii, Ameryce i nad Renem, uważają z jablek za najlepsze: złote renety, granaty, peppingi i parmeny. Dalej, dojrzewające we wrześniu: rajskie drobne, letnie renety i borsdorfski. Dojrzewające w październiku: gdańskie kantówki, królewskie, angielskie krótko-ogonkowe i renety jesienne. Dojrzewające w listopadzie: niemieckie letnie renety drobne, nadreńskie renety, rozmaryny i bony reńskie.

Z gruszek nadają się: szampanki, pomarańczówki, wilki, długie żółte, normandki, szwajcarki wodne, bery letnie-jesienne i zimowe, bery gruboskórne, panny jesienne i zimowe i wszystkie gatunki winiówek.

Nie sądźmy jednak, aby tylko z tych, tu wyżej wymienionych gatunków jablek i gruszek, można było wyrabiać wina — wszystkie jableka i gruszki nadają się do fabrykacji win bez wyjątku, a wina z nich, co do jakości, równają się winom oryginalnym średnim. Nadmienić i to musimy, że z gruszek wszelkie nieuszlachetnione dają aromatyczniejsze wina, aniżeli będące wysoko w kulturze, co sobie tłómaczymy tęp, że wolne kwasy, w moszczach tego rodzaju się znajdujące, sprzyjają bardzo rozwojowi eterów, stanowiących aromat wina.

Gruszki są zazwyczaj słodsze i delikatniejsze od jablek; w niektórych gatunkach ilość procentowa cukru równa się ilości procentowej cukru w winnych jagodach, a kwasów jest zazwyczaj za mało. W jablekach tego nie napotykamys stosunku; ilość kwasu w tym gatunku owoców, względem ilości cukru, jest zawsze nienormalną — kwasu jest zawsze za wiele.

Z tego powodu Normandczycy i Niemcy nadreńscy fabrykują cydry z jablek i gruszek w równej części. Bo gdy jableka uzupełniają

brakujący w gruszkach kwas, gruszki znów uzupełniają brakujący w jabłkach cukier, nadto posiadają garbnik, czego jabłkom zwykle brakuje, a jeżeli go posiadają, to bardzo mały procent, nie wystarczający do wydzielenia ciał białkowych z wina.

W ogóle w gruszkach stosunek cukru do kwasu jest o wiele normalniejszy. Według Frezenius'a, stosunek tych najgłówniejszych części składowych w jabłkach, biorąc średnio, ma się 1 kwasu do 11,16 cukru. Według dra Graeger'a, w renetach muszkatołowych: jak 1 kwasu do 31,61 cukru, w granatach, jak 1 kwasu do 22,50 cukru; średnio z siedmiu analiz, jak 1 kwasu do 14,7 cukru. Są to próby, które nas do celu nie prowadzą, bo widzimy, że o ile ten lub ów gatunek za mało ma cukru, o tyle znów tamtem za wiele; nadto są to próby z jabłkami z cieplejszych okolic, w których, jak wiadomo, tworzy się większa ilość cukru. My musimy uwzględnić nasze warunki, nasze owoce, które niewątpliwie posiadają więcej kwasu a mniej cukru, aniżeli owoce z krajów południowych. W praktyce zresztą na te różnice o tyle zwraca się uwagę, o ile jest wymagana z tego powodu domieszka cukru, gdyż w rzeczywistości, podczas przeróbki owoców na moszcz, kierować się nie możemy tak bardzo według naszej woli,—ze względu na gatunek owoców, lecz musimy brać takie owoce, jakie mamy do dyspozycji.

Co się tyczy stopnia dojrzałości owoców: w jakim stopniu najkorzystniej jest przerabiać je na wino?—mniemania są tutaj rozmaite. Jedni chcą mieć zupełnie dojrzałe, inni przejrzałe, a inni znów niedojrzałe. Ci ostatni powołują się na to, że w niedojrzałych owocach wielka ilość kwasu zamienia krochmal podczas fermentacji moszczów na cukier, a przeto z tego powodu żadnej nie ma straty. Nie będziemy temu przeczyli, lecz i popierać tej metody nie możemy. Chociaż w rzeczywistości pewna część krochmalu przechodzi w cukier zdaje się, że nierównie więcej przyniesie korzyści już gotowy cukier, w owocach, bo ten zapewnia wydatki. Z drugiej znów strony jesteśmy tego zdania, że przejrzałe owoce także nie mogą być zbyt pożądane do fabrykacji win, bo wiemy, że w takich owocach pewna część cukru niszczy, a nawet i kwasy doznają niejakię redukcji. Z tego wypada, że tylko takie owoce przerabiać powinniśmy, które są dojrzałe i których dojrzałość przypada w miesiącach: wrześniu, październiku i listopadzie. Wcześniej dojrzewające owoce, z powodu panującego naówczas upału, gdy je na moszcz przerobimy, fermentują za gwałtownie i mogą bardzo łatwo przejść w ocet, co niestety! często się przytrafia; później dojrzewające z powodu zimna fermentują za wolno, lub wcale nie będą fermentowały.

(Dalszy ciąg nastąpi.)

## Krowy jako inwentarz pociagowy.

Do dziś dnia jeszcze pomiędzy rolnikami panuje powszechne przekonanie, że używanie krow do pociągu jedynie w drobnych gospodarstwach jest możliwe i odpowiednie, gdy w wielkim trybie gospodarczym wykonanie wszystkich robot polnych za pomocą koni i wołów daleko większe zapewnia korzyści. Według doświadczeń dokonanych przez znanego agronoma niemieckiego prof. dra Backhaus'a, krowy w czasie głównych robot bez cokolwiek znaczącego zmniejszenia się wydajności mleka, mogą być używane z wielką korzyścią do pociągu podczas żniw, oraz podczas uprawy roli z wiosną i w jesieni.

Sposób ten od dawna jest praktykowany w niektórych majątkach ziemskich w Hessyi. Majątki te mają około 250 hektarów (500 morgów 300 prętowych), albo i więcej przestrzeni, a hodowane są w każdym z nich od 60 do 120 krow rasy przeważnie simmenthalerskiej, a także Vogelsbergery, Hollendry i Krzyżówki. W jednym z tych majątków obora składa się z 70 do 80 sztuk Simmenthalerów, których mleko bywa dostarczane do mleczarni spółkowej. Połowa krow jest przeznaczona do pociągu, z których za każdym razem przy rozpoczęciu trzech głównych okresów pracy bywa wybieranych 20 zwierząt, które się już wycieliły przed dość dawnym czasem, nie są więc ani świeżo po wycieleniu ani wysoko cielne. Krowy te sprzęgają się podług wielkości i temperamentu z sobą, i używa następnie regularnie do pociągu, zmieniając je co pół doby. Jedna połowa pracuje od rana do południa, druga od południa do wieczora. Krowy te bywają w parze używane do płytkiej orki lub lekkiego pociągu, w czwórkę do orki głębokiej i w ogóle do cięższych robot. Rozumie się samo przez się, że krowom używanym do pociągu musi być zadawana obfitsza i treściwsza pasza, niż zwyklemu bydłu mlecznemu, przyczem pasza sucha zasługuje na pierwszeństwo.

Niezaprzeczenie rzeczą jest bardzo dziwną, że wydajność mleka krow, używanych przeważnie tylko do pociągu, nie zmniejsza się do tego stopnia, jakby się to zdawać mogło, sądząc podług dość znacznego w każdym razie natężenia sił. Co prawda, nie bywają zaprzęgane krowy, które się świeżo wycieliły, ponieważ tutaj niedobór w wydajności

mleka jest cokolwiek znaczniejszy, głównie jednak ponieważ panuje obawa, iż zmniejszy się może wydajność mleka w przechówku. Jeżeli natomiast minęły dwa lub trzy miesiące od wycielenia, wówczas nie zmniejsza się już wiele wydajność mleka, i pozostaje zawsze jeszcze, chociaż krowa o normalnym czasie była zapłodniona, i na sześć tygodni przed wycieleniem zaprzestano jej używać do pociągu, w roku sześciu miesięcy, w których używać można krowy do robot polnych. Należy więc przyuczyć dwa razy tyle krow, ile zamysłamy używać do pociągu. Silny ruch powoduje naturalnie zmniejszenie wydajności mleka, jednakże, jak wykazują doświadczenia dokonane w owych majątkach w Hessyi, w niezbyt wielkim stopniu. W jednym z tych majątków otrzymano w r. 1890 od krow używanych do pociągu średnio tylko 252 litry (kwarty) mleka mniej niż od reszty krow, służących wyłącznie do produkcji mleka. Jest to różnica bardzo nieznaczna, jeżeli się zważy, iż najlepsze dojki w ogóle nie bywają używane do pociągu. W tym samym majątku otrzymano w roku 1890 od wielu krow przeszło 3,000 litrów aż do 3,424 litrów, od reszty pomiędzy 2,000 a 3,000 litrów. Zawartość tłuszczu w mleku wynosiła średnio 4%.

W zeszłorocznej wiosnie użyto w tym samym majątku do pociągu oprócz kilku jałówek, także 14 krow, które się wycieliły co najmniej dwa miesiące przedtem. Okres pracy, w którym używano tych krow trwał ośm tygodni, a mianowicie od 12 go kwietnia do 6 go czerwca. Krowy te wydały w okresie pociagowym 3,869 litrów, w czterech tygodniach, poprzedzających ten okres 2,579, w następnych czterech tygodniach 1,920 litrów, a więc ogółem, z wyjątkiem okresu pociagowego 4,499 litrów. Średnio więc wydajność mleka każdej krowy wynosiła w okresie pociagowym 276,4 litra mleka, czyli dziennie 4,90 litra, w okresie bez pracy 321,3 litra, to jest dziennie 5,73 litra. Tak więc wydajność mleka podczas pociągu było mniejsze tylko o 0,8 litra dziennie. Należy jednak uwzględnić, że w owych czterech tygodniach, następujących po okresie pociagowym, krowy otrzymywały obfitą paszę zieloną, co przyczyniło się u wielu krow do znacznego zwiększenia wydajności mleka, gdy w okresie pociągu karmiono je wyłącznie paszą suchą. Co prawda, krowy używane do pociągu spadły cokolwiek z mięsa albo nie zwiększała się ich waga żywa; fakt ten nie posiada wielkiego znaczenia, ponieważ krowy te zachowały w zupełności stan ciała, odpowiedni dla bydła pociagowego, oraz przeznaczanego na chów, a utrata wagi uwydatnia wyłącznie zbyteczne osadzanie się tłuszczu. Wydajność mleka cierpi zresztą więcej w skutek niekorzystnych warunków temperatury, niż w następstwie miernego ostatecznie wysiłku. P.zy gorącym, dusznym powietrzem, a następnie znów podczas bardzo zimnej, mokrej lub wietrznej pory, wydajność mleka u krow, używanych do pracy w takich dniach, zmniejsza się bardzo znacznie; lepiej więc nie zaprzęgać wcale krow przy bardzo niekorzystnych warunkach temperatury.

Na cielność krowy używanie jej do pracy bynajmniej nie oddziaływa nie korzystnie; przeciwnie stwierdził prof. Backhaus na podstawie licznych doświadczeń, dokonywanych przez cały szereg lat, iż przy cielieniu się krow, używanych do pociągu, i chowie ich cieląt zachodziło daleko mniej nieszczęśliwych wypadków, niż u krow innych, jak w ogóle regularny ruch stanowi jeden z najważniejszych warunków korzystnej hodowli nie tylko u bydła młodocianego, ale także u matek. Zdarzało się nawet niekiedy, iż krowy używane były do pociągu na krótko przed wycieleniem, a mimo to wycielenie odbyło się zupełnie normalnie. Lepiej jest jednakże w każdym razie najmniej na sześć tygodni przed wycieleniem nie można używać krowy do pociągu, ponieważ w przeciwnym razie często w skutek lekkomyślnego lub brutalnego obchodzenia się z bydlęciem pociagowym może nastąpić poronienie.

A. R.

## Wywar gorzelniczy.

Nienormalne tegoroczne warunki naszego gorzelnictwa są powodem, że w większości wypadków ziemianie nasi pędzą okowitę, kontentując się niewielkimi zyskami; pod zyskami pojmują tu gotówkę, otrzymywaną za wyprodukowaną okowitę, po potrąceniu kosztów produkcji. Oprócz powyższego zysku, gorzelnie przynoszą korzyść nierównie większą, która jednakże z rozmaitych względów nie bywa należycie oceniana, a korzyścią tą jest produkt fabryczny gorzelnictwa—wywar.

Wywar jest cieczą mętną, zawierającą w sobie części nierozłożonej mączki, dekstrynę, tłuszcz, ciała pektynowe i białkowe, glicerynę i trochę kwasów organicznych i nieorganicznych, a także w mechanicznym zawieszeniu włókien. Ilość i jakość wywaru zależy częścią od produktu, z którego się wytwarza okowitę, częścią zaś od aparatu, na którym się odbywa pędzenie. Zawartość ciał stałych w wywarze wynosi 4%—10%. Najpożywniejszą część wywaru stanowią ciała azotowa, które w postaci białka dają pożywny pokarm dla bydła, w nawozie zaś niezbędny dla gruntu azot. Stosunek ciał azotowych do nieazotowych w wywarze jest jak 1:3.

Analizy wywaru podług Rittbousen'a i Merker'a daly następujące rezultaty w 5-ciu wypadkach:

Ciał nieazotowych . . .	2,54	3,24	3,08	4,23	5,31
Ciał białkowych . . .	0,89	1,10	1,26	1,40	1,78
Włókniaka . . .	0,45	0,38	0,94	0,88	1,01
Popiołu . . .	0,63	0,60	0,72	0,79	1,00
Wody . . .	95,49	94,68	94,00	92,70	90,90

100% 100% 100% 100% 100%

Przyczem stosunek ciał stałych do wody wynosił od 1:8 do 1:3. Przy normalnych warunkach pędzenia okowity na dobrym aparacie, otrzymujemy z 200 wiader zacieru około 240 wiader wywaru, na złych apparatach stosunek ten dochodzi do 150%, co, biorąc na uwagę, że na powiększenie ilości wywaru wpływa para, za której pomocą gotuje się zacier, bardzo powiększa kosztą opału.

Ponieważ, jak powiedzieliśmy wyżej, najcenniejszą częścią składową każdej paszy dla bydła stanowią ciała azotowe, których wywar sporą zawiera ilość, nie przeto dziwnego, że ziemianie nasi, pomimo niewielkich korzyści, osiąganych w obecnej kampanii gorzelniczej z pędzenia okowity, starają się o ile możności czas kampanii przedłużyć, mając jedynie na uwadze zysk w wywarze.

O ile odpowiednie dawki wywaru znakomicie wpływają na powiększenie siły bydła roboczego i na wydajność mleka u krów, o tyle znowu nadmiar działać może szkodliwie. Szkodliwość ta zauważyć się daje głównie na sztukach młodych, a także żrebnych kłaczkach i cielnychkrowach. Szkodliwość nadmiaru wywaru objaśniać się daje tem, że wywar, jako zawierający w sobie dużo wody, wytwarza w ciele nadmiar wilgoci, i dla wydzielenia jej zużyć musi nieużyteczną sporą ilość ciepła, który, jak wiemy, wytwarza się z węglowodanów, czerpanych przez zwierzę z paszy. W ogóle, ilość dawek wywaru nie powinna być większą od ilości wody, której bydło potrzebować może na napój.

Podług obliczeń teoretycznych i praktycznych danych, na 1 sztukę bydła potrzeba na dzień około 12,5 funta części pożywnych paszy. Całej tej ilości pożywienia nie można zastąpić wywarem, połowę jednakże, to jest około 6 funtów, z wielką korzyścią można zadawać w postaci wywaru. Chcąc obliczyć, ile płynnego wywaru potrzeba na wytworzenie, 6 funtów części pożywnych paszy, przyjmujemy, że wywar nasz zawiera w sobie minimalny procent części pożywnych, to jest 4%, otrzymamy (6:4) 100=150 funtów, co, biorąc na uwagę, że wiadro wywaru waży około 30 funtów, da nam 5 wiader; ilość ta zatem równa się 6 funtom suchej paszy.

Stosunek wody do części pożywnych utrudnia przewożenie wywaru na dalsze odległości, technika gorzelnicza jednakże w osobie Henke'go na to poradziła, wynajdując sposób koncentracji wywaru, obecnie zatem nawet majątki, nie posiadające gorzelni, z łatwością korzystając będą mogły z niedrogięj i dobrej paszy.

Apparat Henke'go służy do oddzielania części stałych wywaru od wody, przed czem jednakże wywar traktowany być musi alkaliaми neutralizującymi kwasy. Skoncentrowany wywar podług prof. Merkera przewyższa swą pożywnością owies.

Apparat Henke'go daje pud suchego wywaru z 19 wiader szlempy kartoflanej albo z 12 wiader szlempy kukurydzowej. Stosunek pożywności wywaru kartoflanego i kukurydzowego do owsa wynosi jak 1:1,4:1,5.

Wywar, stanowiąc, jak widzieliśmy pokarm bardzo pożywna zasługuje również na uwagę ze względu na to, że ze wszystkich gatunków paszy daje najintensywniejszy nawóz, zawierając w sobie dużą ilość potasu i fosforu, to jest ciał najniezbędniejszych w odżywieniu roli. Z poniżej umieszczonej tablicy stosunek ten naocznie się przedstawia, przyczem analiza wykazuje procentową zawartość na 100 części ciał stałych:

	Żyto	Owies	Jęczmień	Groch	Siano	Koniczyna czerwona	Koniczyna biała	Lucerna	Seradela	Sloma żytnia
Kwasu fosforowego	9,9	7,2	9,0	10,9	7,4	7,0	10,4	6,6	5,0	2,4
Potasu . . . . .	6,5	5,0	5,3	11,4	5,0	22,0	12,3	18,3	15,1	9,1
	Sloma pszena		Wywar kartofli		Wywar kukurydzowy		Wywar żytni			
Kwasu fosforowego	2,6		18,0		20,2		21,0			
Potasu . . . . .	7,6		47,9		12,4		11,2			

Inżynier Józef Buchowski.

# ROZMAITOŚCI.

**Wydóz bydła z Ameryki.** Z rokiem każdym zwiększa się wywóz bydła ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Europy. Wywóz ten datuje się dopiero od roku 1876, w którym to roku dowieziono 300 sztuk bydła do Anglii. Od tego czasu wywóz ten zwiększał się stale z każdym rokiem. W r. 1877 wynosił wywóz, prawie wyłącznie przez New York, 11,500 sztuk bydła, a już w r. 1880 wywieziono do Anglii 156,490 sztuk wołów i 27,210 owiec. Aż do r. 1889 trzymał się wywóz mniej więcej na tej samej wysokości, podniósł się jednak następnie od razu do 295,000 sztuk. W r. 1889 dosięgnął wywóz bydła daleko większych rozmiarów, gdyż wywieziono ogółem 384,646 sztuk bydła i 3,904 sztuki owiec. Wynika z tego, że wywóz bydła się zwiększa, a zmniejsza się wywóz owiec. Objaw ten tem się tłumaczy, iż zwiększył się w ostatnich latach wywóz żywych owiec z Argentyny do Wielkiej Brytanii. Wywóz bowiem z Buenos Ayres do Liverpoolu wynosił w 1890 r. 22,000 owiec i 650 sztuk bydła. Większa część bydła wywożonego obecnie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przychodzi do Liverpoolu, w ostatnich jednak czasach wysyłane bywają także znaczniejsze transporta do Glasgow, Southamptonu, Londynu i Cardiffu. W r. 1889 zatrudnionych było około 200 parowców przewozem bydła ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Niektóre parowce, używane do przewozu bydła, są specjalnie na ten cel zbudowane i urządzone. Większa część jednak tych parowców służyła początkowo do przewozu towarów, i później dopiero ze wzrostem wywozu przebudowano je do przewozu bydła. Przewóz ten uległ z przebiegiem czasu znacznemu ulepszeniu; postarano się o wygodne obory, odpowiednią paszą i t. p. na parowcach. Postęp ten zaznacza się przedewszystkiem w zmniejszeniu się śmiertelności bydła podczas przewozu. Śmiertelność ta wynosiła w r. 1878 jeszcze 3,45%, a w r. 1890 zmniejszyła się na 1,72%.

**Stacje ogierów.** W r. b. założono stacje ogierów rozplodowych: w pow. Rawskim w majątku Żdźarach p. Siedliskiego, w Noworadomskim w Borowni p. Michalskiego, w Łódzkim w Remiszowicach p. Wojciechowskiego i Plotkowskim w Bogusławicach p. Boggowuta. Na stacjach znajduje się 7 ogierów, z tych dwa pociągowe, reszta półkrowi angielskiej wierzchowce. W gub. Siedleckiej urządzono 6 stacyj, z tych jedną z 6-u ogierami z zarządu statyni janowskiej w Janowie pow. Konstantynowskiego, pięć w majątkach prywatnych: w Czekanowie (pow. Sokolowski) p. Bądzińskiego, w Jabloniu (pow. Radzyński) hr. Zamoyskiego, w Miastkowie (pow. Turkowski) p. Gasowskiej, w Wojciechowie (pow. Łukowski) hr. Platara, w Sarnach (pow. Garwoliński) p. Kozłowskiego, na których to stacjach znajduje się po dwa ogiery, a w Wojcieszkowie trzech, wreszcie dwa rozplodowce są w dzierżawie w Patkowie Prusach (pow. Konstantynowski) p. Kopecia i w Międzyrzeczu p. Dmochowskiego. Z wyjątkiem jednego ogiera półnej krwi angielskiej („Wampir” kupiony od p. Mysyrowicza) i jednego pociągowego snfolka („Wint” ze stada derkulskiego), reszta są to wierzchowce półkrowi angielskiej.

**Jarmark na konie w Krakowie.** Ruch na jarmarku ogromny. Przybyli kupcy z Wiednia, Pragi Czeskiej, Wrocławia i Berlina. Za konie płać: pod klasztorem OO. Kapucynów i w ujeżdżalni od 300 do 1,200 złr. Znawcy gromadzą się około stajni p. Szańkowskiego z Kępia, który przysłał piękne okazy. Ogiera z jego stajni kupiono do Królestwa Polskiego za 1,000 rub. klacz „Carissima” za 950 złr. do Wiednia. P. Helcel sprzedał 4 konie, p. Psarski 8 koni, Cangiery 4, Konopka z Biskupiego, karego walacha za 950 złr., p. Rudzki klacz, p. Nowak Kozaka, p. Gołębowski za 700 złr. parę na remont. W ogóle kupiono bardzo dużo koni do wojska. Klacz „Rzymiankę” z Kępia, oceniono na 3,000 złr., dawano już 2,000 złr. P. Mander z Szyszkowa i p. Mander z Zabelcia również sprzedali konie za cenę od 400 do 800 złr., p. Młodecki z Sulisławic sprzedał parę. W ogóle hodowcy robili na jarmarku bardzo dobre interesa. Koni z Królestwa Polskiego było tu wiele.

**Lód sztuczny i naturalny.** Liczne doświadczenia z lodem sztucznym i naturalnym, dokonywane przez fizyologa Heyroth'a, wykazały, że znajdujące się w wodzie drobnoustroje, i to nie tylko zwykłe, nieszkodliwe bakterie wodne, ale także odmiany wywołujące choroby, są w stanie przetrwać naturalny przebieg marznięcia, i nawet przy dłuższym przechowywaniu w stanie zamrożonym, nie tracą swęj zdolności przenoszenia chorób. Doświadczenia powyższe wydały daleko niekorzystniejsze rezultaty przy lodzie sztucznym niż przy lodzie naturalnym. W obec tego poleca Heyroth, aby woda używana do wyrobu lodu sztucznego była przedewszystkiem wolna od wszelkich domieszek szkodliwych dla zdrowia.