




Przyczynek do obrazu epidemiologicznego miasta Krakowa

w ciągu 25lecia obejmującego czas od r. 1844 do r. 1868
włącznie, oparty na spostrzeżeniach zebranych w szpitalu
Izraelitów,

skreślił

Dr. Józ. Oettinger.

Przed dwustu laty wyrzekł Pascal równie głęboki jak świątobliwy myśliciel, że przyroda jest tak nieskończona w swych ogromach, jak na odwrót w swych drobnościach. Ostatnią część tego twierdzenia sprawdzają naukowo czasy najświeższe, uchylając drobnowidem zaslonę z nowego świata zjawisk, które dla swych rozmiarów nikłych usuwały się dawniej z pod gołego oka ludzkiego. Jeżeli zatapianie się w tych misternych drobnych dziwach cechujące przeważnie epokę naszą rozszerzyło niezmiernie zakres naszych wiadomości naukowych, jeżeli im dodało dokładności, pewności a przeto i ścisłości; to z drugiej strony usiłowań naszych nie powinno wyczerpywać i nie stępiać zmysłów naszych względem pojawów rysujących



się w rozmiarach co do miejsca i czasu obszer-
 niejszych, przekraczających zakres doraźnego wra-
 żenia a wymagających przeto ich skupiania i pod-
 ciągania pod ogólniejsze widoki, jeżeli mają być
 należycie dostrzeżone i użytkowane umiejętnie. —
 Przyznać to winniśmy badaczom starożytnym i zgoła
 wielu poprzednikom naszym, iż nie mogąc dla
 braku technicznych ku temu środków, zagłębiać
 wzroku swego w cudne tajniki mikroskopijnych
 szczegółów, zaostżeli i wprawiali go na chwytaniu
 obrazów i poglądów ogólnych, na bystrém
 dopatrywaniu związków rzeczy i ich wzajemnej od-
 siebie zależności, i że niedostatek szczegółów za-
 stępowali i wynagradzali sobie dość zręcznie traf-
 nym częstokroć uogólnianiem. Do rzędu badań
 o rozleglejszych takich zarysach należy pilne
 a wierne postrzeganie prądów chorobowych na-
 wiedzających ród ludzki czyli mnogości przypad-
 ków chorobowych w ogólności a w szczególności
 pewnych ich postaci pod względem natężenia i ko-
 leji, co do miejsca i czasu. Krążą one po ludnoś-
 ciach to jako powiewy ciche i łagodne, jeżeli cier-
 pienia są nieliczne i lekkie, to wzmagają się w groź-
 ne burze, jeżeli przybierają cechę chorób pospół-
 nych wiele ofiar pochłaniających, to nakoniec w zmi-
 atające i niweczające wszystko uragany, gdy pomór
 przerażające zrządza spustoszenia. Aczkolwiek
 genialny twórca sztuki iekarskiej w swych księ-

gach „o epidemiach“, pierwszy, starożytny podał wzór takich spostrzeżeń i to wzór równie ponętny głęboką przenikliwością jak prostotą i wdziękiem wykładu, toć przecież piękny ten przykład w późniejszych czasach mało a prawie żadnych nie znalazł naśladowców, dopiero w XVII. stuleciu słynny Sydenham w te same wszedł ślady, skreślając choroby nagminne swojego czasu. W obecnym stuleciu J. F. C. Hecker ponownie zwrócił uwagę badaczy na ten przedmiot nauki, wykazując trafnie ścisły jego związek nietylko z dziejami powszechnymi w ogólności, a w szczególności z lekarskimi, których ważną część stanowi, już jako opis dziejów zdrowia ludzkiego, już jako niepośledni czynnik w rozwoju samej nauki i sztuki lekarskiej, gdyż według panujących chorób zmieniały się i zmieniają systemy lekarskie; ale nadto z naukami przyrodniczymi, gdyż zajmuje się jak one badaniem i opisem zjawisk, wydarzających się w pewnym zakresie przyrody. Za naszych czasów z niemniejszym talentem jak powodzeniem uprawiają tę niwę Haeser i August Hirsch, stając się poniekąd, jeżeli nie pierwszymi twórcami, to przecież prawdziwymi wykształcicielami historycznej i geograficznej patologii. Już dziś podobno nikt nie zechce zaprzeczyć, że do dokładnego opisu przyrodniczego jakiegobądź okolicy, należeć powinien obok obrazu stosunków gie-

ologicznych, obok flory i fauny, obok stosunków etnograficznych także zarys pojawiających się w niej chorób.

Praca niniejsza stanowi tylko nader drobny przyczynek do tego rodzaju poszukiwania, obejmuje bowiem słaby rys epidemiologiczny, odnoszący się do miasta naszego, zamknięty w granicach 25lecia od r. 1844 do 1868 r, i to o tyle, o ile mógł być postrzegany w szpitalu Izraelitów. Zakład wzmiankowany przez cały ten przeciąg czasu urządzony był na 36 łóżek i przyjmował chorych płci obojga z wyjątkiem dzieci niżej lat 6ciu. Wykluczeni byli chorzy z cierpieniami umysłowemi i wenerycznemi, tudzież złożeni cholera nagminną, których w odrębnych zakładach pielęgnowano. Wynika z tych stosunków, że spostrzeżenia odnoszą się jedynie do wieku późniejszego niż dziecięcego, i że ani choroby niemowląt, ani umysłowe, ani weneryczne, ani nakoniec nagminna cholera do nich nie wchodzi.

Wszakże szpital ten co do innych niemocy o tyle uchodzić może za czuły ich prądoskaz, gdyż nasilenia ich odbijać się w nim musiały większym ruchem, zwolnienia zaś słabszym, tak dalece, że przy niezwykłym napływie potrzeba było koniecznie liczbę łóżek na czas jakiś pomnożyć, gdy przeciwnie przy mniejszej chorobliwości

mniejsza lub większa liczba łóżek pozostawała niezajętą.

Skromném zadaniem tój pracy jest wykazać liczbami :

1) jaka we wzmiankowanym przeciągu czasu była chorobliwość w ogólności i jaką jój wzrost lub ubytek w pewnej jednostce czasu okazywał kolej, czyli jakie ruch jój przedstawiał fale ;

2) które postacie chorobowe i w jakim stosunku najliczniejszy brały udział w tém ogólném paśmie chorobowém ;

3) jakie każdy z tych szczególnych prądów chorobowych w ciągu 25lecia okazywał wahania, pod względem nasilań i i zwalniań ;

4) jaki był ich wzajemny do siebie stosunek, czy zgodny, czy odwrotny, czy wykluczający ;

5) jakie w tym czasie były stosunki śmiertelności tak ogólnej jak i szczególnej ze względu na pojedyncze najliczniejsze choroby.

Krótki pogląd na ważniejsze zdarzenia w czasie od r. 1844 do 1868.

Lubo nie jest zadaniem mojem wchodzić bliżej w wyjaśnienie i określenie przyczynowych stosunków pomiędzy różnymi wpływami zewnętrznymi a pojawianiem się chorób, to przecież pominąć nie mogę pobieżnego rzutu oka na ten kawał czasu nie tyle ważny długim szeregiem lat,

ile ciekawych pamiętnemi zdarzeniami, ba nawet wstrząsającymi przewrotami, tak pod względem politycznym jako i społecznym, a nareszcie i gospodarskim.

Rok 1844, od którego poczyna się nasz okres,

zastał miasto nasze cichą, skromną rzecznospolitą, rozpamiętywającą spokojnie starożytnie swe dzieje, którego niegdyś świetną było stolicą, i którego drogich strzeże pamiątek. Życie polityczne i społeczne płynęło falą skromną, jednostajną, bez głębokich a niebezpiecznych politycznych wirów, bez ścierania się stronnictw, bez społecznych żądź i zawiści. Potrzeby skromne, tanio zaspakajane nadały mu pod względem gospodarskim cechę przestającą na małym mierności. Rok 1846 przerywa nagle ten spokój; lutowe powstanie, społeczna z nięm rzeź i pożoga, których sprawcami było chłopstwo rozjuszone, wtręca kraj cały w bolesne napręzenie. Kraków wojskiem 3ch opiekuńczych mocarstw zrazu obsadzony, wcielony zostaje do państwa rakuskiego. Wstrząśnienie to w ogólnęm zdrowiu fizycznęm kraju odbiło się smutnie szeroko rozpostartą, nader zjadliwą durzycą, tak zwaną głodową, gdyź szła w ślad za nieurodzajem i nagłą drożyzną. Zaraza ta i w szpitalu Izraelitów znaczy się najwyższą liczbą z pośród reszty lat całego tego okresu.

Broczyły jeszcze świeże rany, dymiły się jeszcze niedopalone zgliszcza, kiedy w r. 1848 cała niemal Europa zadrgnęła ruchem konwulsyjnym, który zatrzęsł do dna dawnym porządkiem rzeczy. Zagrały silnie tu szlachetne, tam brudne namiętności, zawrzała walka zaciekłych stronnictw, rozgorzały niepohamowane żądze podburzanego ludu; po krwawych starciach, bobaterskich wysileniach, dwie wojny jednocześnie wybuchły w państwie rakuskiem: we Włoszech i na Węgrach. Na ostatnią ciągnęły liczne wojska przez gród nasz, tak rakuskie jak i rosyjskie, a większą niż zabójcza broń ich szerzyła zagładę będąca w orszaku ich *morowa dziewica*, zionąwszy w r. 1849 cholera nagminną na ziemie i miasta nasze. Ze swobód konstytucyjnych dopiero co uzyskanych, pozostało tylko usamowolnienie włościan. Rok 1850ty w perzynę obraca znamienitą część Krakowa. We 4 lata później tędy odbywają się znaczne pochody wojsk gromadzonych w naszych okolicach z powodu toczącej się na wybrzeżu morza czarnego wojny krymskiej. W rok potem nawidza nas znowu *cholera*. Rok 1859ty pamiętny wojną między Rakuzami, a Włochami od Francuzów wspieranymi, jeżeli nie wprost to pośrednio dotknął miasto nasze nieuniknionemi w takich rachach ciężarami i ofiarami. Rok 1860ty przywraca formę rządów konstytucyjną. W świeżej pamięci są

lata rozgorączkowania i smutnego rozczarowania, tudzież niesłychanego moralnego i materyjalnego wysilenia, jakie przebyliśmy od r. 1863 do r. 1865. Po nich nastąpił rok wojenny 1866, którego odgłos i krwawe ofiary z pod Oświęcima aż pod Wawel sięgały, a pamiętny w dziejach chorób zabójczą także cholera.

Spółcześnie z temi wstrząsającymi wypadkami dokonało się przeobrażenie społeczne przez zrównanie w prawach i obowiązkach wszelkich warstw i stanów; pod względem ekonomicznym podniósł się wpływ kapitału, rozwinęły stowarzyszenia przemysłowe, podrożały w trójnasób wszystkie potrzeby życia.

Otóż przelotna wzmianka o tém, co owa 25-letnia fala czasu z sobą przyniosła.

I. Chorobliwość ogólna od r. 1844 do r. 1868.

W ciągu 25lecia liczba wszystkich w szpitalu leczonych przypadków wyniosła ogółem 11,047 — a mianowicie mężczyzn 5894, kobiet zaś 5153, a zatem kobiet mniej o 741. Średnia więc roczna wypada $441^{22/25}$, (dla mężczyzn $235^{19/25}$ a dla niewiast $206^{3/25}$). — Porównawszy tę średnią z liczbą każdoroczną spostrzeżemy, że do niej najwięcej się zbliża rok 1856, wykazujący liczbę 444 (m. 232: k. 212); najwyższą ma rok 1846 = 713 (m. 361, k. 352), najniższą zaś rok 1864 tj. 233

(m. 129, k.104). Zestawiwszy obok siebie liczby całoroczne chorych według lat po sobie następujących, utworzą one szereg, w którym zwróciwszy uwagę na setki z pominięciem dziesiątków i jednościami zobaczymy w pewnych granicach stateczny wzrost lub ubytek, a mianowicie od r. 1844 do r. 1846 podnosi się liczba od 500 przeszło do 713, odtąd poczyna się spadek niemal ciągły: bo w latach 1847 i 1848 zniża się liczba do przeszło 600, do r. 1851 wł. do 500, do r. 1857 wyżej 400, do r. 1862 ponad 300, od r. 1863 niżej 300, a w r. 1864 dochodzi do liczby najniższej 233; odtąd nieznacznie się znów podnosi dosięgając przez liczby: 275, 319, 280, wysokości 383 w r. 1868. Cała więc fala tego prądu przedstawia nam krzywiznę z krótkim ramieniem wstępującym obejmującym 3 lata, z długim ramieniem zstępującym, ciągnącym się od r. 1846 do r. 1864 — a zatem przez ciąg 18 lat, po którym zaczyna się znów ramię wstępujące, krótkie, a raczej jeszcze niedokończone, a którego dalszy kierunek przyszłe spostrzeżenia okażą. W całym więc szeregu okazują się dwa stanowiska zwrotne, rok 1846 jako szczyt, a r. 1864 jako najniższy spadek.

II. Z i m n i c a.

Przez całe 25lecie było przypadków zimnicy 1832 (m. 985, k. 847). Liczba średnia roczna wy-

nosi przeto $73\frac{7}{25}$. Najwyższa roczna przypada na r. 1854 wynosząc 206, (mężcz. 104 k. 102); najniższa na r. 1864 = 13 (m. 8, k. 5).

Liczby roczne zestawione według lat po sobie idących od r. 1844 do r. 1868 okazują zmienną nader kolej wzrostu i upadku. Po roku 1854 obfitującym w największą liczbę : 206, idzie wedle mnogości przypadków poprzednik jego tj. r. 1853 z liczbą 166 (m. 79, k. 87), następnie rok 1851 z liczbą 134 (m. 76, k. 58); ponim rok 1849 z liczbą 121 (m. 53, k. 68), dalej rok 1857 mający 113 (m. 63, k. 50), wyżej 90 okazują lata: 1850, 1852 i 1855 (99, 92, 99). Najniższą liczbę mają po roku 1864 (z ilością najszczuplejszą = 13), lata 1865 i 1867 = 18, następnie r. 1866 = 20 r. 1863 = 21, r. 1846 = 22, r. 1847 = 24.

W porównaniu z ogólnym ruchem chorych przypadają zgodnie tylko z sobą na rok 1864 liczby najniższe; najwyższe zaś rozchodzą się na różne lata, gdyż największa ilość chorych w ogólności przypada na rok 1846, któremu odpowiada jedna z liczb najniższych zimnie, bo tylko 22; rok zaś obfitujący w największą liczbę zimnie tj. 1854 znajduje się pod względem chorobliwości ogólnej na pochyłości zstępującej okazującej liczbę roczną 481.

W ogólności przewaga zimnie napotyka się od r. 1848 do r. 1857, które to dziesięciolecie oka-

zuje liczbę roczną wyższą nad 80; 5ciolecie od r. 1862 do 1867 wł. odznacza się liczbą najszczu- plejszą, nie przenoszącą rocznie przypadków 21. Jak po pierwszym roku naszego okresu tj. po r. 1844 nastąpił spadek nagły o przeszło połowę z 88miu do 42, tak samo w ostatnim roku nastą- pił zwrot przeciwny, tj. wzrost o przeszło połowę z 18 do 43.

Stosunek wszystkich zimnic do wszystkich przypadków chorobowych jest = 1832 : 11047 czyli nieco mniej jak $\frac{1}{6}$. Pod względem lat pojedyn- czych okazał stosunek najwyższy r. 1854, tj. ten sam, który bezwzględnie w największą ilość zim- nic obfitował, gdyż wynosił 206 : 481 czyli nieco mniej jak połowę. Nad $\frac{1}{3}$ ogólnej liczby rocznej wynosiła ilość zimnic w r. 1853 = 166 : 468; nad $\frac{1}{4}$ w latach 1851 (134 : 509) i 1857 (113 : 439); nieco mniej jak $\frac{1}{4}$ w latach 1849 (121 : 563) i 1850 (99 : 489).

Najniższy stosunek = 1 : 32 (22 : 713) okazuje r. 1846, w roku następnym 1847 zimnice wyno- noszą mniej jak $\frac{1}{27}$ ogólnej liczby chorych (24 : 658), rok 1864 odznaczający się najniższą liczbą chorych i bezwzględnie najmniejszą zimnic, okazuje stosunek bardzo drobny, bo blisko $\frac{1}{18}$ (13 : 233). W ogóle od r. 1849 do r. 1861 stosu- nek waha się w szczipłych granicach między mniej nieco niż połową a $\frac{1}{5}$, są to lata obfitsze

w zimnicy; od r. 1863 do 1867 stosunek waha się między $\frac{1}{12}$ do $\frac{1}{18}$, jest to pięciolecie skąpe w tę postać chorobową, stosunek najniższy przypada na lata 1846 i 1847 tj. $\frac{1}{32}$ i $\frac{1}{27}$. Rok pierwszy naszego okresu tj. 1844 ma stosunek $\frac{1}{6}$ a rok ostatni 1868 = $\frac{1}{9}$. — Widzimy z tego zestawienia, że szereg liczb stosunkowych zimnic mało się różni pod względem kolei, wzrostu i ubytku od szeregu liczb bezwzględnych.

III. D u r z y c a.

Od r. 1844 do r. 1868 przyjęto ogółem przypadków durzycy 1615 (mężcz. 839, kob. 776), wypada więc liczba średnia roczna $\frac{1615}{5} = 64\frac{3}{5}$. Najwyższą ilość roczną miał r. 1846 = 466 (m. 240 k. 226), najniższą rok 1864 i 1865 tj. po 4 (m. 1, 2; k. 3, 2). Zbliżał się najbardziej do średniej liczbą od niej wyższą r. 1849 mający 73 przypadki (m. 36, k. 37); liczbą zaś niższą r. 1850 okazujący 47 przypadków (m. 25, k. 22).

W ogóle liczby roczne średnią albo znacznie przewyższały, albo o wiele od niej były niższe. Górowało liczbą trzechlecie od r. 1846 do 1848 włącznie z ilościami 466, 408, 205, razem 1079, co czyni nieco mniej jak $\frac{1}{3}$ wszystkich durzyc całego 25lecia. Dodawszy do tego liczby z 3ch lat następnych 73, 47 i 45 = 165, otrzymamy 1244 czyli $\frac{3}{4}$ wszystkich durzyc przypada na 6lecie od

r. 1846 do 1851. — Wysokie liczby mają jeszcze r. 1855=97, (m. 44, k. 53); r. 1868 z 38 (m. 24, k. 14); a dalej r. 1853 z 34ma (m. 15, k. 19)— i r. 1854 z 23ma (m. 12, k. 11) przypadkami. Prąd cały 25 letni okazuje silne wezbranie w latach 1846 i 1847, następnie bystry spadek do r. 1852, w którym liczono 16 przypadków. Po kilku mniejszych wahaniami w granicach między 97 a 6ma z przewagą atoli liczb kilkunastowych, okres od r. 1862—1865 włącznie odznacza się najgłębszym spadkiem okazującym liczby roczne: 5, 6, 4, 4. Następnym lat 3 wykazuje stopniowy wzrost liczbami: 15, 15, 38.

W stosunku do ogólnej liczby chorych całego 25lecia, ogólna liczba durzyc miała się jak 1615: 11047, czyli mało co więcej nad $\frac{1}{7}$ a mniej jak $\frac{1}{6}$. Liczby roczne durzyc do liczb rocznych wszystkich chorych w odpowiednim roku leczonych okazują stosunki nader różne co do wielkości, waha-
jąc się w rozległości między blisko $\frac{2}{3}$ w r. 1847 (408 : 658), a $\frac{1}{73}$ w r. 1857 (6 : 439). Stosunek najwyższy znachodzi się w r. 1847 nieco mniej jak $\frac{2}{3}$, r. 1846 więcej nad $\frac{1}{2}$ (466 : 713) i rok 1848 więcej jak $\frac{1}{3}$ (205 : 608). Rok 1855 okazuje $\frac{1}{5}$ (97 : 497), rok 1849 mniej jak $\frac{1}{7}$ (73 : 563). Najniższy stosunek napotyamy oprócz wspomnianego roku 1857 okazującego $\frac{1}{73}$, w r. 1865= $\frac{1}{69}$ (4 : 275), w r. 1862 = mniej jak $\frac{1}{64}$ (5 : 321)

w r. 1854 = $\frac{1}{58}$ (4 : 233), w r. 1863 = $\frac{1}{44}$ (6 : 267).

Ze stopniem chorobliwości ogólnej i prądem zimniczym widzimy niejaką zgodność w spólnym spadku o tyle, że w latach od r. 1862—1865 włącznie mało jest chorób wogólności a w szczególności tak zimnic jak i durzyc. Jednakże, kiedy te ostatnie okazują najwyższe swoje wezbranie w latach od r. 1846 do r. 1848 włącznie, to prąd zimniczy odwrotnie wtedy jest nader drobny, to też w r. 1846, kiedy durzyc jest liczba największa, stosunek zimnic do ogólnej liczby chorych jest najniższy, bo $\frac{1}{32}$. W miarę opadania prądu durzycowego, wzмага się od r. 1851 do r. 1857 prąd zimniczy, następne lata do r. 1865 okazują dość jednostajny i spólny spadek, a ostatnie 3 lata mierny a spólny wzrost.

IV. Nieżyt żołądka, jelit i obojga razem.

Ogólna liczba przypadków całego okresu 25letniego czyni 1063 (m. 540, k. 523). Średnia roczna $\frac{1063}{25} = 42\frac{13}{25}$. Najwyższa roczna przypada na r. 1845 z ilością 101, (m. 48, k. 53); najniższa na r. 1864 wynosząca 17 (m. 6, k. 11). Liczbę najbliższą średniej z przewyższających ją ma rok 1849=45 (m. 24, k. 21); z niższych niż ona rok 1860=42 (m. 14, k. 28) i r. 1856=41 (m. 19, k. 22). Po najwyższej rocznej 101 w r. 1845 następuje

r. 1844 z liczbą 68, (m. 30, k. 38); dalej lata: 1851 i 1868 każdy po 64 (m. 38, 23; k. 26, 31), r. 1855 = 61 (m. 35, k. 26). Liczby najniższe rosna w następującym porządku: po r. 1864 z najniższą 17ową, idą lata 1853 i 1863, każdy po 25 (m. 16, 15; k. 9, 10); dalej lata 1850, 1865 i 1866 po 28, (m. 16, 15, 11; k. 12, 13, 17); r. 1859 = 29 (m. 16, k. 13).

Stosunek liczby niezłych całego 25lecia, do liczby ogólnej chorych tegoż okresu $\frac{1063}{11047}$, czyli mniej jak $\frac{1}{10}$. Stosunek w pojedynczych latach waha się między $\frac{1}{5}$ w r. 1845, a $\frac{1}{8}$ w r. 1853.

Cały prąd w ogólności przedstawia z wyjątkiem niepospolitego wzniesienia w r. 1845, falistość zmienną lecz w ogóle z przejściami nie nagłemi tj. bez wielkich skoków. Od r. 1861 do r. 1865 liczby tak bezwzględne jak stosunkowe są drobne, pierwsze między 17 a 30, drugie między $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{13}$, co odpowiada zmaleniu chorobliwości powszechniej. Pierwszy rok okresu tj. 1844 i ostatni 1868 mają liczby bezwzględne i stosunkowe dość wysokie, tamte bowiem = 68 i 64, te $\frac{1}{8}$ i $\frac{1}{6}$.

V. Zapalenia płuc.

Liczba ogólna wszystkich przypadków całego okresu = 510 (m. 302, k. 208); średnia roczna = $5^{10}/_{25} = 20^{2}/_{5}$; najwyższa roczna przypada na rok

1856 = 44 (m. 25, k. 19); najniższa na r. 1847 = 6 (m. 3, k. 3). Zbliżają się do średniej z przewyższających ją: r. 1860 okazujący 22 (m. 13, k. 9); następnie r. 1852 i 1858 po 23 (m. 13, 13; k. 10 i 10); r. 1855 = 25 (m. 19, k. 16). — Z niższych od niej lata: 1863 i 1854 = 20 (m. 11, 12; k. 9, 8); następnie lata: 1864 i 1865 po 18 (m. 12, 10; k. 6, 8); lata 1849, 1866 i 1867 po 16 (m. 6, 10, 12; k. 10, 6, 4).

Od liczby najmniejszej 44 w r. 1856 maleją ilości w porządku następującym: 39 (m. 29, k. 10); w r. 1862; 32 (m. 17, k. 15) w r. 1844; 29 w latach 1861 i 1868 (m. 22, 16; k. 7, 13).

Od l. najniższej 6 w r. 1847 rosną liczby jak następuje: 8 (m. 5, k. 3) w r. 1848; 11 (m. 6, k. 5) w r. 1850 i w r. 1857; 12 (m. 7, k. 5) w r. 1853.

Stosunek zapaleń płuc ze wszystkich 25 lat do ogółu chorych z tegoż samego przeciągu czasu = $510 : 11047$ czyli mniej jak $\frac{1}{21}$; z pojedynczych lat zbliżają się do niego jako nieco większe r. 1852 = nieco mniej niż $\frac{1}{21}$ ($23 : 482$), dalej r. 1866 = $\frac{1}{20}$ ($16 : 319$), r. 1855 = mniej jak $\frac{1}{19}$ ($25 : 497$); jako mniejsze r. 1854 = $\frac{1}{24}$ ($20 : 481$), dalej r. 1849 = $\frac{1}{35}$ ($16 : 563$), r. 1853 i 1857 = $\frac{1}{39}$ ($12 : 468$ i $11 : 439$). W ogóle waha się stosunek między najniższym w r. 1847 = $\frac{1}{109}$ ($6 : 658$), a najwyższym w r. 1862 = $\frac{1}{8}$ ($39 : 321$).

Od r. 1858 począwszy wszystkie późniejsze mają stosunek wyższy niż średni ogólny, gdyż się waha od $\frac{1}{8}$ do $\frac{1}{20}$, są to owe lata, w których zimnice i durzyce w mniejszej liczbie występują. Prąd cały wszelako okazuje stopień umiarkowany, mianowicie w kierunku wzbierania, podczas gdy opadanie w latach panującej durzycy było znakomite.

VI. Gruźlica płucna.

Summa wszystkich przypadków od r. 1844 do r. 1868 = 670 (m. 385, k. 285); średnia roczna = $\frac{670}{25}$ tj. $26\frac{4}{5}$; najwyższa roczna przypada na r. 1845 = 52 (m. 29, k. 23); najniższa na r. 1851 = 11 (m. 6, k. 5). Zbliżone są do średniej z nieco wyższych r. 1846 = 27 (m. 10, k. 17); r. 1868 = 29 (m. 19, k. 10); r. 1864 = 30 (m. 21, k. 9); z niższych zaś r. 1858 = 26 (m. 18, k. 8); lata 1853, 1854, 1860, 1862 każdy po 24 (m. 11, 7, 12, 18; kobiet 13, 17, 12 i 6). Od najwyższej liczby 52 w r. 1845 idą w porządku ubywającym r.: 1865 z liczbą 47 (m. 34, k. 13); następnie r. 1844 z liczbą 46, (m. 18, k. 26); następnie lata 1848 i 1866 z liczbami 33 (m. 16, 22; k. 17, 11). Od ilości najniższej 11 w r. 1851 rosną liczby jak następuje: 17 w latach 1850 i 1856 (m. 11, 10); k. 6, 7); 19 w roku 1857 (m. 12, k. 7); 20 w r. 1855 (m. 9, k. 11). W ogóle liczbom wysokim

chorych w ogólności a durzyc i zimnic w szczególności odpowiadają liczby gruźlic niższe i na odwrót.

Stosunek wszystkich przypadków gruźlicy płucnej do ogółu chorych całego okresu 25letniego wynosi 670 : 11047 tj. mniej jak $\frac{1}{16}$. Stosunek każdoroczny gruźlic do wszystkich przypadków chorobowych odpowiedniego roku waha się między największym w r. 1865 = mało co wyższy nad $\frac{1}{6}$ (47 : 275), a najniższym w r. 1851 = blisko $\frac{1}{46}$ (11 : 509). Stosunki wysokie $\frac{1}{8}$ w r. 1864 (30 : 233), $\frac{1}{9}$ w r. 1863 (31 : 207), $\frac{1}{10}$ w latach 1845 i 1866 (52, 33 : 506, 319) odpowiadają latom z mniejszemi stosunkami zimnic i durzyc; stosunki zaś nizkie jak $\frac{1}{46}$ w r. 1851 (11 : 509) większy niż $\frac{1}{30}$ w r. 1847 (22 : 658), blisko $\frac{1}{28}$ w r. 1850 (17 : 489), $\frac{1}{26}$ w latach 1846 i 1856 (27 i 17 : 713 i 444) przypadają równocześnie z wygórowaną ilością durzyc jak w r. 1846, lub zimnic jak w latach między r. 1850 a 1856.

Stosunek zimnic, durzyc, nieżytów przewodu pokarmowego, zapaleń i gruźlic płucnych razem wziętych do ogólnej liczby chorych w 25leciu od r. 1844 do 1868 włącznie ma się jak 1832+1615 + 1063 + 510 + 670 : 11047 czyli 5690 : 11047 = 1 : 1.⁹⁹ czyli więcej niż połowa.

VII. Śmiertelność.

Przez ciąg 25lecia od r. 1844 do 1868 umarło w szpitalu 1266 (m. 693, k. 573). Średnia roczna wynosi zatem $50^{16/25}$ ($27^{18/25}$ m., $22^{23/25}$ k.) Najwyższą liczbę roczną miał r. 1847 = 112 (m. 62, k. 50), najniższą r. 1857 = 30 (m. 16, k. 14).

Zbliżają się do średniej = $50^{16/25}$, z wyższych od niej r. 1853 = 52 (m. 25, k. 27), r. 1866 = 56 (m. 33, k. 23), r. 1861 = 57 (m. 30, k. 27); z niższych zaś od niej r. 1860 = 48 (m. 29, k. 19), r. 1849 = 47 (m. 26, k. 21); r. 1867 = 44 (m. 30, k. 14).

Od najwyższej = 112 w r. 1847 spadają liczby w porządku następującym: r. 1848 ma liczbę zmarłych 83 (m. 42, k. 41); r. 1846 ma 80 (m. 37, k. 43), r. 1855 ma liczbę 64 (m. 31, k. 32); lata 1852, 1854 i 1868 mają po 60 (m. 33, 33, 38; k. 27, 27, 22). Od najniższej 30 w r. 1857 rosną liczby: w r. 1859 = 31 (m. 18, k. 13), w r. 1851 = 32 (m. 14, k. 18); w latach 1844 i 1845 po 34 (m. 12, 20; k. 24, 14.) Najwyższą liczbę bezwzględną mają lata 1847, 1848 i 1846, w których i liczba chorych przemagała w ogólności, a w szczególności w których górowała durzyca. Najmniejszą mają lata 1857 i 1859, w których chorobliwość ogólna malała, ale nie doszła była do stanowiska najniższego. Owszem w tym ostatnim czasie śmiertelność z wyższymi występuje liczbami.

Co do stosunku zmarłych do ogólnej liczby chorych w całym okresie od r. 1844 do r. 1868 włącznie ma się on $= 1266 : 11047$ czyli jak $1 : 8^{919}/_{1266}$. Najwyższy stosunek ma rok 1864 $= 1/5$ ($42 : 233$), następnie lata 1847, 1861, 1865—1868 włącznie, w których wynosi $1/6$ ($112 : 658$, $57 : 386$, $45 : 275$, $56 : 319$, $44 : 280$, $60 : 383$). Najniższym stosunkiem odznacza się r. 1844 $= 1/16$ ($34 : 555$); po nim idzie r. 1851 $= 1/15$ ($32 : 509$), dalej lata 1845 i 1847 $= 1/14$ ($34 : 506$ i $30 : 439$).

W roku najniższej liczby chorych stosunek śmiertelności jest największy; a lata durzycowe 1846—1848 wykazują równie jak lata zmniejszonej ogólnej chorobliwości stosunki śmiertelności nader wysokie. Najniższe stosunki przypadają na pierwsze 2lecie naszego okresu i na lata, w których ubywała durzyca a wzmagala się zimnica tj. lata 1851 $= 1/15$ 1850 $= 1/12$.

Śmiertelność przypadków zimniczych bezwzględna wynosi 16 (m. 10, k. 6); stosunkowa ze względu na wszystkie przypadki zimnicze $= 16 : 1832$ czyli $1 : 114\frac{1}{2}$, w stosunku do ogólnej śmiertelności $= 16 : 1266 = 1 : 79\frac{1}{8}$.

Śmiertelność przypadków durzycy bezwzględna $= 161$ (m. 79, k. 82); w stosunku do wszystkich durzycowych $= 161 : 1615 = 1 : 10^5/_{161}$; do wszystkich zmarłych w ciągu 25lecia $= 161 : 1266 = 1 : 7^{139}/_{161}$.

Śmiertelność przypadków nieżytno łożądka i jelit, bezwzględna = 29 (m. 17, k. 12); w stosunku do wszystkich leczonych nieżytno łożądka i jelit = $29 : 1063 = 1 : 36^{19/29}$; do ogólnej śmiertelności = $29 : 1266 = 1 : 43^{19/29}$.

Śmiertelność w zapaleniu płuc: bezwzględna = 83; w stosunku do wszystkich zapaleń płuc = $83 : 510 = 1 : 6^{12/83}$; do ogólnej liczby zmarłych = $83 : 1266 = 1 : 15^{21/83}$.

Śmiertelność w gruźlicy płucnej bezwzględna = 266, w stosunku do cłorych na gruźlicę = $266 : 670 = 1 : 2^{138/266}$ do ogólnej liczby zmarłych = $266 : 1266 = 1 : 4^{101/133}$.

Ze wszystkich pięciorga wzmiankowanych chorób umarło: 555, co do wszystkich wypadków śmierci daje stosunek = $555 : 1266 = 1 : 2^{156/555} = 2^{52/185}$.

Śmiertelność ogólna z wyjątkiem gruźlicy = $1266 - 266 = 1000$. Średnia więc roczna = $1000/25 = 40$.

Stosunkowa ogólna do wszystkich chorych z wyjątkiem gruźlicy = $\frac{11047 - 670}{1000} = \frac{10377}{1000} = 1 : 10^{377/1000}$.

Liczba chorych roczna średnia bez gruźliczych = $\frac{10377}{25} = 415^{2/25}$.



W KRAKOWIE.

DRUKIEM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
pod zarządem K. Mańkowskiego.

1869.

BOOKKEEPER 2012



0010163754

