

ROLNIK

ORGAN C. K. GALICYJSKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARSKIEGO

wychodzi w każdą sobotę

Prenumerata wynosi wraz z przesyłką pocztową:
w Państwie Austriackiem.

rocznie 8 koron. | półrocznie 4 koron.

W Rosyi rocznie 5 rubli sr. — W W. Księstwie Poznańskim 3 talary.

Członkowie galic. Tow. gospodarskiego płaćący 10 K.
wkładki rocznej, otrzymują „Rolnika“ bezpłatnie.

Ogłoszenia zamieszcza się za opłatą 15 h. od wiersza trzy razy łamanego, drobnym drukiem, albo za jego miejsce.

Przy częstszym inserowaniu oraz przy ogłoszeniach większych, znaczny rabat.

Ogłoszenia przyjmuje: Agencja Ogłoszeń, Lwów, pasaż Hausmanna 9.

Manuskryptów niemieszczonych nie zwraca się.
Reklamacje uwzględnia się tylko do wyjścia numeru następnego.
Przedruk bez podania źródła niedozwolony.

Redakcyja i Administracyja „Rolnika“ ul. Słowackiego 1. S. II. piętro.

TREŚĆ:

Ceny nawozów sztucznych. — Doświadczenia polowe w Baszni, rok VI. przeprowadził i opracował Leon Moszyński II. — Ochrona przed gradami za pomocą strzałów, napisał K. Szule II. — Działanie różnych nawozów potasowych na plon i na jakość ziemniaków. — Z praktyki gospodarskiej: W sprawie trzymania nawozu pod bydłem, napisał Dionizy Nowakowski. — Kronika. — Drobne wiadomości. — Wiadomości handlowe.

Ceny nawozów sztucznych.

Ponieważ ceny wszystkich nawozów sztucznych pozostają nadal niezmienione, przeto nie będziemy drukować nowego cennika na lato b. r., lecz zatrzymujemy cennik wiosenny do użytku naszych P. T. członków.

Z Komitetu c. k. Gal. Towarzystwa gospodarskiego.

Doświadczenia polowe w Baszni.

Rok VI. 1898/99.

przeprowadził i opracował *Leon Moszyński*.

II.

Zestawiając działania nawozów sztucznych przy pojedynczych gatunkach roślin gospodarskich nabieramy przekonania, że każdy rodzaj nawozów przy odpowiednich oczywiście kombinacjach odmiennie się cokolwiek zachowuje wobec niektórych odmiennych gatunków roślin. I tak źużle działają w wysokim stopniu dodatnio już same nawet, bez pomocy azotu i potasu przy oziminach. Mniej silnie, choć finansowo korzystnie, przy jęczmieniu i owsie, który zresztą potrafi sobie — jak wyżej zaznaczyłem — przyswoić kwas fosforowy

z resztek pozostałych z nawożenia przedplonu. Same środki azotowe bez dodatku kwasu fosforowego (żużli) zdołają nieznacznie tylko podnieść plony owsa.

Kainit nie ma wpływu donioślejszego na o wies. Wystarcza dla owsa potas w glebie tutejszej zawarty, pod warunkiem, że mu się dostarczy azotu i odrobiny kwasu fosforowego w resztkach pozostałych z nawożenia kwasem fosforowym przedplonu; natomiast już dla jęczmienia okazuje się pomocnym zwłaszcza w obecności azotu i kwasu fosforowego. Przy kartoflach tym razem kainit skutkował: nać w czasie wegetacji dłużej się trzymała zielono, była bujniejszą niż na inaczej znawożonych polatkach. Plon wszelako choć dodatni — mniejszy był, niż po jakości i ilości naci spodziewać się należało.

Ponieważ kainit w latach poprzednich występował stale jako czynnik ujemny przy uprawie kartofli, muszą następne doświadczenia tę sporną sprawę rozstrzygnąć.

Stale dodatnio kainit działa przy oziminach nie tylko pod względem ilości ale także i jakości plonów.

Sądząc z zachowania się kainitu w obec owsa a nawet po części i jęczmienia, wnosić by można, że gleba ta z natury bogatą jest w zapasy soli potasowych. Tymczasem oziminy wskazują, że zasoby te są wcale skromne.

Zatem doświadczenia nasze przez szereg lat prowadzone wśród przeważnie niepomysłnych okoliczności wyjaśniły zasadniczo w sposób dość wyczerpujący zachowanie się kwasu fosforowego i soli potasowych w po-

„PERKUN”

Fabryka maszyn i odlewnia żelaza

Rok założenia 1837.

Spółka komandytowa

Ferd. Pietzcha

Adres: Perkun, Lwów, ul. św. Marcina 11. Telegramy: „Perkun — Lwów.” Kosztorysy gratis.
Biuro techniczne, zastępstwo i skład artykułów technicznych: Lwów, ul. Hetmańska 12, 1. piętro.

Gorzelnie, browary, młyny, tartaki, kotły, maszyny parowe, rezerwoary. — Maszyny rolnicze. Przybory do maszyn. — Wodociągi.

staci żużli i kaititu na tutejszej glebie w obec różnorodnych gatunków roślin gospodarskich.

Ponieważ zaś gleba, na której prowadzimy doświadczenia jest tak ubogą w pokarm azotowy, że prócz strączkowych a w części i ozimim nie mogą bez jego pomocy żadne inne wydać choć cokolwiek lepszych plonów — kwestya zasilania gleby stosownym środkiem azotowym jest pierwszorzędnego znaczenia. Aliści problemat ten został dotąd przez nas częściowo tylko rozstrzygnięty, boć używaliśmy azotu przy naszych doświadczeniach przeważnie w najbardziej rozpowszechnionej formie saletry chil. Gdy jednakże saletra kilkakrotnie bądź częściowo bądź też zupełnie zawiodła nasze oczekiwania, począłem mniej na niej polegać a szukać i porównywać jej działania z działaniem innych środków azotowych. W pierwszym rzędzie zwróciłem się do powolniej działającego, trudnego do wyługowania z gleby siarkanu amonowego. Z jakim skutkiem wyżej już wykazałem. Zachęca on do dalszych badań. Ponieważ lepsze jest nieprzyjacielem dobrego, nie powinno się ograniczać w obrębie tych dwóch środków azotowych lecz do badań porównawczych wciągnąć wszystkie tego rodzaju sposoby nawożenia.

Ponieważ dalej uprawa strączkowych (motyłkowatych) nie tylko nie wymaga jak wiadomo nawożenia azotowego ale owsz m wzbogaca grunt w azot i zostawia pewien zapas dla następnych plodów — wykazałem już w pierwszych latach mojej pracy możność uprawy z korzycią grochu, wyki na tutejszych glebach a na łęgococznych plonach owsa w Łowczy widać było bardzo wyraźnie — lepszy rezultat wśród zresztą zupełnie równych warunków, na wycyzysku niż w żytnisku.

Włączenie zatem motyłkowatych w płodozmiann jest u nas pedwójnie wskazanem. Jestto przeto jedna dalsza choć może nie zbyt intensywna forma wzbogacania gleby w azot, przez nasze doświadczenia do powszechnego użytku zalecana a nawet już gdzieindziej w praktyce na szersze rozmiary stosowana.

Nawozy zielone są bezsprzecznie nadszczajającym dodatnim środkiem, dostarczającym — pomiędzy innymi także bardzo obfitych ilości azotu. Na gruntach płaskich użyć zwłaszcza łubinu stanowić zaczęło epokę w rozwoju gospodarstwa rolnego.

Mają one wszelako także swoje ujemne strony. Najlepiej nadający się do tego łubin nie udaje się na gruntach wilgotnych i mokrych na suchych piaskach ze znacznieszą przymieszką wapna i wogóle na glebach płytkich.

Stosowanie nawozu zielonego na wiosnę w miejsce plonu głównego udaje się najpewniej ale jest finansowo niekorzystnem.

Jeżeli w ten sposób zasiany na przykład łubin nie przeorześmy na zielony nawóz, lecz dojrzały zbierzemy, osiągniemy 5 do 10 q ziarna i 10 do 15 q znakomitej ściółki. Gdybyśmy go zaś byli przeorali na zielony nawóz i zasiali na tem żyto, to w najlepszym razie przy normalnych zupełnie warunkach osiągnęlibyśmy dopiero w drugim roku co najwyżej taką samą ilość ziarna i słomy.

Ponieważ ziarno łubinu i żyta niewiele w tych czasach różni się w cenie, przeto przez zbiór łubinu na ziarno osiągnę taki zysk w jednym roku, jaki mógłbyśmy osiągnąć przez przeoranie go na zielony nawóz w dwu latach. Po łubinie bowiem zebrany na ziarno w pier-

wszym roku — można siać łubin lub co innego w drugim roku z takim samym rezultatem.

Zatem wskutek siewu łubinu lub innych motyłkowatych jako plonu głównego i przeoranie go na zielony nawóz traci się jeden cały zbiór. Ten więc sposób uprawy zielonego nawozu wychodzi powoli jako za kosztowny z użycia natomiast wprowadzają system międzyplonu (Zwischenfruchtbau) zainaugurowany przez Schulzta w Lupitz.

Jestto najpożyteczniejszy sposób wytwarzania nawozu zielonego, ale że to na świecie nie ma nic bezwzględnie doskonałego — ryzykowny, zawodny. Ziarno wysiewane w lipcu, przy zająć mogącej posusze dłuższej, może wcale nie wzejść lub tak późno, że ostateczny rezultat będzie bardzo skromny, a nawet w przepadliwych i słotnych czasach, jak np. w tym roku — wcześniej bo około 10. lipca zasiany łubin wskutek chłodnego lata, zimnych bardzo nocy, bardzo powoli się rozwijał wczesne przymrozki go zwarzyły; efekt ostateczny bez żadnej prawie korzyści. Tak sam ujemny rezultat osiągniemy, gdy z powodu słot lub innych jaki h przyczyn nie można żyta wcześniej wyżąć i zmuszeni zostaniemy przeto późno zasiać w tem miejscu ziarno na zielony nawóz. Każdy wogóle czynnik, opóźniający uprawę pod zielony nawóz, tem samem skracając okres wegetacyjny umniejsza w znacznym stopniu wytwarzanie organicznej substancji, siły nawozowej i rozwiewa różowe nadzieje przywiązowywane do zielonych nawozów.

Zresztą w pewnych danych razach pożyteczniejszem byłą ową masę zieloną wyprodukowaną, drogą międzyplonu przeznaczyć na pokarm dla bydła i nią później jako obornikiem znawozie pole.

Badacz, zajmujący się tego rodzaju wypośrodkowywaniem praktycznych wskazówek dla gospodarzy wiejskich znajduje tu nader szerokie pole do pracy a przy tem ogromnej doniosłości. Bo wśród zajęć przy doświadczeniach odnósze zwykle to wrażenie, że jeżeli działanie nawozów sztucznych nie dorównywa często ceniejonej powszechnie skuteczności obornika, to przyczynę takiego stosunkowo nieznacznego i niekiedy zawodnego działania nawozów sztucznych przypisać mogą przedewszystkiem niejednostajnej, na wszelakie przeciwności wrażliwej energii azotu w saletrze chil.

Ponieważ zaś wkłady na nawozy sztuczne są znaczne, to każdy zawód, zawiniony przez środek azotowy, użyty zwłaszcza na rozleglejszych przestrzeniach, może narazić gospodarza na bardzo dotkliwe szkody. Ryzyko jest wielkie; ażeby go zmniejszyć, używałem nawet do doświadczeń za małych ilości w azotu saletrze.

Badanie porównawcze przytoczonych kwestyj znajduje się w stadyum przygotowawczych czynności.

Dok. nast.

Ochrona przed gradami za pomocą strzałów

II.

Przyjrząwszy się metodzie strzałów przeciwgradowych, zadajemy sobie zaraz pytanie, czy ten sposób ochrony przed gradem może być dostatecznie uzasadnionym ze stanowiska meteorologii. Otóż nie ulega kwestyi, iż wprost zaprzeczać temu nie podobna. Wpra-

wdzie nie posiadamy jeszcze dostatecznie uzasadnionej teorii powstawania gradu, jednak te fakty, jakie w tym względzie znamy, nie pozwalają wprost odrzucać możliwości zapobiegania gradobiciom za pomocą strzałów. Aby tę sprawę lepiej wyswietlić, należy zastanowić się, na czem właściwie polega działanie strzałów w tej walce z gradem. Co do tego nie można powiedzieć nic pewnego, istnieją tylko przypuszczenia mniej lub więcej prawdopodobne: jedni sądzą, iż działają tutaj fale głosowe, powstające przy wystrzale, inni upatrują najważniejszy czynnik w tem, że powietrze, wznosząc się przy wystrzale w górę do warstw chłodniejszych, może działać tam ogrzewająco i powodować w ten sposób parowanie wody płynnej oraz topnienie wody już zmarzłej w lód; inni znów przypisują cały skutek wystrzałów mechanicznemu działaniu wirów powietrznych, jakie przy tem się tworzą. Odrzucając dwa pierwsze z tych przypuszczeń, jako mało prawdopodobne, zwróćmy się do trzeciego.

Przy wystrzałach przeciwgradowych wylatują z otworych wielkich lejów, usadzonych na moździerzach, wiry powietrzne z bardzo wielką prędkością. Posiadają one zapas energii o tyle znaczny, że jeszcze w odległości przeszło 100 m. są w stanie pokonywać opory, dość silne i np. rozrywają tarcze z grubego papieru, odrywają przybite deski i t. d. Przekonano się o tem najlepiej podczas prób w S. Kathrein a. d. Lamming w Styrii w obecności licznej grupy osób, pomiędzy którymi znajdowali się delegaci wiedeńskiego instytutu meteorologicznego. Przy tych próbach strzelano w kierunku pionowym oraz poziomym z moździerzy takich samych, jak te, które służą do strzałów przeciwgradowych, a dla należytego wyjaśnienia sprawy brano przy tym moździerz rozmaitej wielkości z otworami różnej głębokości i szerokości, leje różnego kształtu i różnej wysokości, oraz także ładunki różnej siły. Przy poziomych wystrzałach ustawiano przed moździerzami w odległości do 100 m. tarcze z grubego papieru, którego wytrzymałość przeciw rozerwaniu wynosiła 12 kilogramów, te tarcze były umocowane na drewnianych łąkach, mających poprzeczne wymiary 60 i 40 mm. Otóż, przy użyciu na jeden ładunek 80 do 120 gr. prochu, wiry powietrzne, trafiając w tarczę, rozrywały papier i odrywały jej ramę z tem większą siłą, im większym był ładunek; przy wystrzałach o ładunku 150 i 180 gr. prochu działanie wirów było jeszcze bardziej niszczącym, gdyż łąki zostały połamane, a kawałki odrzucone na odległość 18 m. Przy pionowych wystrzałach podczas wylatywania wirów dawał się słyszeć właściwy świst i szum, który trwał do 28 sekund przy 180 gr. ładunku prochu i przy 4 m. wysokości leja. Z tego można sądzić, że wiry wznoszą się nawet do wysokości około 2000 m. Z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, iż chmury gradowe zazwyczaj nie unoszą się w większych wysokościach.

Nie wdając się w szczegóły teorii powstawania gradu, należy wspomnieć, iż przy tworzeniu się ziarn gradowych znaczną rolę odgrywa woda przechłodzona. Jak wiadomo, jeśli oziębić ostrożnie wodę przy zupełnym jej spokoju, to wtedy można ją mieć w stanie płynnym jeszcze przy temperaturze -10° C, lub nawet w niższej; w chwili jednak raptownego wstrząśnienia lub zetknięcia z kryształkiem lodu przechodzi taka woda przechłodzona w lód, przyczem jej

temperatura podnosi się do 0° . Różne wzloty balonowe, dokonywane w celach meteorologicznych wykazały, że w chmurach napotyka się woda w stanie przechłodzonym poniżej temperatury 0° .

Przed burzą gradową najczęściej powietrze bywa parne, czemu towarzyszy cisza w atmosferze, sprzyjająca do tworzenia się wody przechłodzonej. Ta cisza wszakże jest stanem równowagi bardzo chwiejnej tak, że każde wstrząśnienie może ją łatwo naruszyć. Otóż wystrzały przeciwgradowe, dokonane we właściwym czasie przed burzą, naruszają ową chwiejną równowagę; wstrząśnienie powietrza może doprowadzić do zmarznięcia drobnych jeszcze kropelek wody przechłodzonej, zanim one pozlewają się w większe krople, a dalsze tworzenie się wody przechłodzonej byłoby już utrudnione; w ten sposób strzał, jak się zdaje, za pomocą wstrząśnienia może przeciwdziałać powstawaniu ziarn gradowych*). Nadto wprowadzenie powietrza w ruch za pomocą strzałów może przyczynić się do wyrównania napięć elektrycznych między chmurą i ziemią drogą spokojnego wyladowania, o czem świadczą wspomniane powyżej ustawianie błyskawic po rozpoczęciu strzałów; w ten sposób był by usunięty ten możliwy czynnik tworzenia się gradu.

W każdym razie trzeba przyjść do wniosku, że myśl stosowania strzałów, jako środka przeciwgradowego, nie powinna być odrzucaną *a limine*, gdyż próby w tym kierunku mogą doprowadzić do pożądaných rezultatów — jak to już kilkoletnie doświadczenie wskazuje. Oczywiście, kilkoletni materiał, jaki posiadamy w tej sprawie, jest jeszcze zbyt skromnym, aby na jego podstawie można było wydać stanowczy sąd o tym sposobie ochrony przed gradem; na to potrzeba większej liczby obserwacji, przeprowadzenia liczniejszych i umiejętnych prób; takie próby przyczynią się do lepszego wyjaśnienia kwestyi, a także pozwolą jeszcze lepiej stwierdzić, czy w każdym wypadku grad nie miał miejsca właśnie z powodu strzałów. Bądź co bądź dotychczasowe doświadczenie bardzo do prób takich zachęca. W Styrii kwestyją strzałów przeciwgradowych zajął się tamtejszy Wydział krajowy, który przyczynia się środkami materialnymi do rozwoju tej sprawy.

Pomysł strzelania przeciw gradowi napotykał ze strony ogółu na razie na pewne lekceważące niedowierzanie, które i dziś jeszcze nie znikło. Trudno się temu dziwić, jeśli się zważy, że ten sposób ochrony przed gradem nosi cechę czynnego wystąpienia człowieka względem zjawisk atmosferycznych, a ludzie z dawnych czasów aż nadto byli przyzwyczajeni do biernej swej roli w tym kierunku. Zresztą przykładów omyłek w ocenie nowych pomysłów dostarcza nam obficie historia wielu wynalazków. Przepomnijmy sobie np., że Airy utrzymywał, jakoby niemożliwym było telegrafowanie przez ocean, a w jakiś czas potem zaczął funkcjonować pierwszy telegraf transatlantycki; podobnie też

*) Wszakże J. Hann podaje w wątpliwość powyższe przypuszczenie co do tego, że wstrząśnienie, spowodowane przez wystrzały z moździerzy, doprowadza do zmarzania kropelek atmosferycznej wody przechłodzonej. Dla wyjaśnienia sprawy radzi ten uczony przeprowadzenie próbnych wystrzałów w ziemie, gdy przy temperaturze -5 do -10° zdarzy się, jak to bywa, mgła, składająca się z przechłodzonych kropelek wody. — *Meteorologische Zeitschrift* 1900, zeszyt II. str. 84.

komisya paryskiej Akademii orzekła niemożliwość zbudowania dynamo-maszyny, a w kilka lat potem pojawiła się maszyna Gramme'a.

Do przytoczonej powyżej rezolucyi kongresu w Casale Monferrato możnaby dodać życzenie, aby próby strzałoch przeciwgradowych zostały podjęte także i w innych krajach, nawiedzanych przez grady. Mamy tu na myśli Galicyę, która zwłaszcza we wschodniej swej części kłęski gradowe dotkliwie odczuwa. Dobrzeby było, gdyby i u nas rozpoczęto te próby, które może doprowadzą do równie pomyślnych rezultatów jak w Styrii. Mielibyśmy w takim razie sposób ochrony przed kłeskami gradowymi, nie równie chyba lepszy, niż wypłata premii asekuracyjnej, lub opust podatkowy.

Kazimierz Szulc.

Działania różnych nawozów potasowych na plon i na jakość ziemiaków.

W doświadczeniach wykonanych w roku 1896 przez bremeską stację doświadczalną na torfowisku hellweskim nad działaniem rozmaitych nawozów potasowych, zrobiono ciekawe spostrzeżenie, że kartofle wyprodukowane na poletkach, nawiezionych obfitą ilością kaimitu lub też chlorku potasowego dopiero na wiosnę, zawierały tyleż lub prawie tyle skrobi co i kartofle pochodzące z poletek nawiezionych tymi samymi nawozami dopiero w jesieni. Rezultat ten stał w sprzeczności ze spostrzeżeniami zrobionymi na glebach torfowych gdzieindziej, a przedewszystkiem z rezultatami próby wykonanej na tem samem torfowisku przed dwoma laty. Wówczas nawozy potasowe zawierające chlor dane dopiero na wiosnę znacznie obniżyły w ziemiakach zawartość skrobi. Ponieważ wykonanie prób w roku 1894 i 1896 tylko tem się różniło, że w roku 1896 dano przez pomyłkę mąkę żuźlową dopiero na wiosnę, można było z wielkiem prawdopodobieństwem przypuszczać, iż mąka żuźlowa, a mianowicie znajdujące się w niej wapno zobojętniło szkodliwy wpływ, jaki wywierają na zawartość skrobi w ziemiakach nawozy potasowe zawierające chlorki, zbyt późno przed sadzeniem do gleby wprowadzone. W celu wyjaśnienia, o ile to przypuszczenie było słuszne, przeprowadziła stacja bremeska w roku 1898 nowe doświadczenia nad tą kwestyą. Na torfie przeznaczonym do tych doświadczeń odmierzone dwanaście parcelek po 0.42 a i nawieziono je 13 grudnia 1897 r. marglem w ilości odpowiadającej 4000 kg wapna na 1 ha. Nawozy potasowe (kaimit lub 40% chlorek potasowy) dano w ilości odpowiadającej 200 kg tlenku potasowego na 4-ch półkach w jesieni (22 grudnia) a na 8-iu półkach na wiosnę (28 i 29 marca). Wszystkie poletka nawiezione potasem w jesieni i 4 z 8-u nawiezionych potasem na wiosnę, otrzymały w jesieni mąkę żuźlową w dawce odpowiadającej 150 kg kwasu fosforowego na 1 ha. Na czterech pozostałych półkach rozsiano mąkę żuźlową w takiej samej ilości równocześnie z nawozami potasowymi dopiero na wiosnę. Kartofle odmiany Simson zasadzono w dniu 13 maja 1898 r. W dniach 14 czerwca i 11 lipca rozsiano na nich saletrę chilijską, za każdym razem w dawce odpowiadającej 25 kg azotu na 1 ha. Kartofle powstąpiły w dniu 11 czerwca równo na wszystkich poletkach. W dniu 25 lipca kartofle posadzone na półkach nawiezionych kaimitem dopiero na wiosnę miały liście mocno skędzierawione i pożółkłe; na innych zaś półkach nać kartofli była zupełnie zdrowa. Na półkach nawiezionych kaimitem na wiosnę nać do 15 sierpnia zupełnie zeschła, na innych zaś była w tym czasie jeszcze zupełnie zielona. Sprzęt kartofli nastąpił w dniu 31 października, a przeciętny plon uzyskany z każdego dwóch

pólek jednakowo nawożonych wypadł po przeliczeniu na powierzchnię 1 ha, jak następuje:

rodzaj nawożenia	zbiór bulw	wartość skrobi	plon skrobi
kaimit w jesieni	182 q	17.82%	3246 kg
żuźle " "			
kaimit na wiosnę	130 "	12.72 "	1652 "
żuźle w jesieni			
chlorek potas. w jesieni	173 "	19.17 "	3327 "
żuźle w jesieni			
chlorek potas. na wiosnę	194 "	16.85 "	3268 "
żuźle w jesieni			
kaimit na wiosnę	128 "	14.36 "	1840 "
żuźle " "			
chlorek potas. na wiosnę	200 "	17.07 "	3410 "
żuźle			

Jak się zatem okazało, kaimit użyty dopiero na wiosnę działał w ogóle niekorzystnie; zbiór bulw jak i zawartość oraz plon skrobi były niższe. Chlorek potasowy użyty na wiosnę deprymował również zawartość skrobi w ziemiakach, ale w mniej znacznym stopniu, a na zbiór bulw nie wpłynął wcale ujemnie. Co się zaś tyczy wpływu zobojętniającego mąki żuźlowej użytej na wiosnę równocześnie z nawozem potasowym, to na działkach nawiezionych kaimitem dzięki równoczesnemu użyciu żuźli depresya zawartości skrobi była znacznie mniejsza; tak samo rzecz się miała z suchą substancją. Na działkach nawiezionych chlorkiem potasowym na wiosnę równoczesne użycie mąki żuźlowej korzystnie oddziaływało i na wysokość i na jakość plonu. W zupełności jednak szkodliwe działanie nawozu potasowego na wiosnę danego przez mąkę żuźlową nie zostało zniesione. Być może, że ten cel dałoby się osiągnąć przez równoczesne wprowadzenie na wiosnę do gleby razem z nawozami potasowymi, zawierającymi chlorki, wapna palonego albo też marglu. Wskazuje na to przynajmniej próba wykonana przez stację bremeską na torfie w 1897 roku, w której dawano na wiosnę razem z rozmaitymi nawozami potasowymi mąkę żuźlową i margiel i spostrzeżono, że silna dawka kaimitu zmniejszyła zawartość skrobi w kartoflach tylko o 0.2%, a karnalitu tylko o 1.8%. (Mitteilungen des Vereines zur Förderung der Moorkultur *Tyg. roln.*)

Z praktyki gospodarskiej.

W sprawie trzymania nawozu pod bydłem. Wobec niedawnej polemiki prowadzonej w „Rolniku“ na temat powyższy, niech mi wolno będzie dorzucić parę słów na podstawie własnego doświadczenia.

Nie da się nieczem zaprzeczyć, iż nawóz produkowany w stajni pod bydłem jest pod względem jakości jak najlepszym, gdyż nie traci on prawie nic ze swych składników nie będąc wystawionym bezpośrednio na działanie atmosferyczne.

Lecz, żeby uzyskać nawóz stajenny najlepszej jakości, trzeba bardzo starannie i ze zrozumieniem rzeczyć go narabiać. Samo ścielenie słomą i rozprawianie pod bydłem nie wystarcza. Przedewszystkiem trzeba wziąć pod uwagę, w jakich warunkach nawóz taki wyrabiany. Jeżeli było żywym brahą, parzonkami lub odpadkami fabrycznymi, to w takim razie odchody bydlęce będą zawierały więcej wilgoci a wtedy wystarczy dwa razy dziennie mokry nawóz z pod tylnych nóg podrzucić pod przednie nogi i co trzeci dzień całe stanowisko pod bydłem posypać na 4 cm. sproszkowanym torfem, a gdzie torfu niema, miałką suchą ziemią. Pospywanie nawozu ziemią lub torfem ma trojaki skutek. Po pierwsze wstrzymuje ułatnianie się amoniaku względnie azotu; powtórnie utrzymuje równomiernie wilgoć

we wszystkich jego warstwach, w końcu powstrzymuje wywiązywanie się ciepła w nawozie do tego stopnia, że ani legowiska pod bydłem nie są gorące, ani też stajnia nigdy za bardzo nie jest przecieplona. Ma to nie małe znaczenie wówczas, kiedy przy odpowiednio urządzonej stajniach trzymamy nawóz pod bydłem 2—3 miesięcy.

Zywiąc jednak bydło przeważnie suchą paszą z pewnym tylko dodatkiem buraków, kartofli lub kiszzonego końskiego żębu, otrzymujemy odchody bydłecę mniej płynne a w takim razie dla utrzymania pewnego stopnia wilgoci w nawozie, trzeba przynajmniej dwa razy w tygodniu polewać nawóz gnojówką a w braku tejże nawet i wodą. W przeciwnym razie, gnoj nie dostatecznie zwilżony przez bydło i nie polewany, pomimo najstaranniejszych zabiegów, spali się i spleśnieje. Nawóz z pod koni powinno się mieszać z nawozem bydłecym, ścieląc nim co dzień pod bydłem.

Do polewania nawozu jest najodpowiedniejszą zwykła sikawka ogrodowa lub mała sikawka ogniowa z rozpylaczem. Do małych obór wystarczy nawet kołniewka ogrodowa. Polewanie powinno się odbywać wtedy, kiedy bydło wyjdzie ze stajni do pola. A jeżeli jest zwyczaj pojenia bydła w stajni, to wtedy należy bydło albo częściowo albo wszystko razem wypuścić na kilka minut na dwór i manipulację polewania przeprowadzić.

Stajnia w której mamy zamiar narabiać nawóz pod bydłem, musi być urządzonej w ten sposób, ażeby w miarę przybywania nawozu żłoby można podnosić. Pamiętać przy tem należy, iż po podniesieniu żłobu, miejsce, w którym tenże stał, musi być najdokładniej samym wilgotnym nawozem wypełnione i raz koło razu silnie ubite, nato, żeby i tam gdzie bydło deptać nie może, gnoj był dobry i niespleśniały.

Środek korytarza stajennego powinien być także nawozem z pod tylnych nóg bydłecych cały założony. Stanowiska pod bydłem i korytarz powinny przedstawiać jedną równą powierzchnię.

W stajniach murowanych przy takim postępowaniu z nawozem nie ma się żadnej szkody, bo nawóz murów nie psuje. Podłoga zaś choćby była z drzewa, będąc przykryta zawsze nawozem i nasyconą wilgocią, także nie prędko się psuje.

Inaczej jednak ma się rzecz w stajniach budowanych z drzewa. W takich stajniach ściany do których bezpośrednio nawóz przytyka, psują się nadzwyczaj prędko. Chcąc jednak zabezpieczyć się od takiej szkody, należy nawóz od ścian izolować w ten sposób, że do słupków ustawionych pod samą ścianą a mających grubość 13—16 cm, przybijają się szalówki tak wysoko, jak wysoko można w danej stajni nawóz pod bydłem gromadzić. Powstała próżnia między nawozem a ścianą, zabezpiecza dostatecznie tę ostatnią od butwienia. Te same zaś słupki, do których są szalówki przybite, służą zarazem do podtrzymywania żłobów.

Stajnia taka powinna mieć o ile na to stosunki lokalne pozwalają, tylko dwoje drzwi w przycełkach tej szerokości i wysokości, ażeby można wygodnie wjechać wozem lub saniami do środka i nawóz wywozić.

Bocznych drzwi należy starannie unikać, już choćby z tego względu, że się traci wiele miejsca dla bydła a przytem zajazd takimi drzwiami jest bardzo niewygodny.

Gospodarstwa produkujące nawóz pod bydłem muszą posiadać obfity zapas podściółki, bo kto jej nie ma, temu nie radzę tej manipulacji z nawozem, ponieważ zabagniłby sobie stajnię i zanieczyścił bydło.

Co się tyczy kanalików ścielonych w takich stajniach, to twierdę stanowczo, że te muszą być porobione a szczególnie tam, gdzie się bydło odżywia wywarami. Doświadczenie bowiem nauczyło mię, że w stajni, w której kanalików nie porobiłem, gnojówka

pomimo równości terenu, zrobiła sobie przeciek pod podwaliną i na dwór odpływała.

Wentylacja musi być bardziej uwzględniana w takich stajniach, gdyż nagromadzony nawóz wytwarza więcej pary, a ta, gdy niema dostatecznego ujścia, skrapla się na ścianach i powale a wskutek tego psuje się budynek.

Gospodarz powinien także pamiętać o tem, że w stajniach produkujących nawóz pod bydłem, nie powinno się wyganiać bydła, szczególnie rano, wprost ze stajni na dwór, lecz na kilka minut przedtem należy otworzyć wszystkie drzwi w stajni, a jeżeli są okna urządzone do otwierania, to lepiej okna otworzyć zamiast drzwi i stajnię trochę przechłodzić, gdyż bydło rozgrzane można łatwo zaziębić, wypuściwszy od razu na zimne powietrze; zresztą i na mleczności w krów działa ujemnie taka gwałtowna zmiana temperatury.

Postępując z produkcją nawozu pod bydłem oraz wentylacją stajni w sposób wyżej opisany, można być pewnym, że ani choroby bydłecę mieć się nie będzie w oborze, ani też krowy nic nie stracą na mleczności. Zyska się tylko na dobroci nawozu, która się okaże zaraz przy pierwszym plonie w sposób zdumiewający.

Przez jedenaście lat trzymałem wielką oborę pełnej i pół krwi holenderskiej na nawozie stajennym, lecz zdrowotność u bydła była jak najlepsza. Zdarzały się wprawdzie sporadyczne wypadki choroby płucnej u pojedynczych indywiduów, lecz wiadomo powszechnie, że u bydła holenderskiego, choroba płucna występuje bardziej niż u innych ras bydła, nawet wtedy, gdy bydło to jest najstaranniej pielęgnowane i w czystych suchych stajniach trzymane.

Dyonizy Nowakowski.

KRONIKA.

Stan zasiewów. Według wiadomości z kraju zasiewy opóźnione wskutek marcowej zimy i zimna w pierwszej połowie kwietnia odbywają się obecnie w całej pełni a nawet na znacznej przestrzeni kraju w zachodniej i środkowej Galicyi na równinach, ukończone. Buraki i ziemniaki sadzą już również w wielu miejscach korzystnie położonych. Oziminy wyszły z zimy bardzo niejednostajnie — a szczegółolnie żyta późniejsze rzędzy bardzo znacznie i wymokły — wcześniejsze są lepsze z reguły, ale także wiele łysin okazują wskutek wyprzycnia pod wodą lub skorupą lodową. Pszenice przedstawiają się nieco lepiej zwłaszcza wcześniejsze, natomiast rzepaki wyjątkowo tylko dobre, po większej części liche i powstrzymane we wzroście wskutek ciągłego zimna. Wogóle stan oziminy można uważać za bardzo niepomyślny.

Stan zasiewów w Austrii w połowie kwietnia przedstawiał się według publikacji ministerstwa handlu jak następuje: Niezwykłe śniegi w marcu powstrzymały bardzo węg-tację i opóźniły początek siewów wiosennych. Silne opady deszczowe w pierwszych dniach kwietnia wyrządziły w niektórych okolicach znaczne szkody. Zasiewy jesienne, zwłaszcza żyto ucierpiało bardzo w marcu; pszenica przetrzymała prawie wszędzie lepiej od żyta i przedstawia się naogół zadowalniająco. Misy polne wyrządziły znaczne szkody. Rzepak tylko miejscami zadowalniająco; przetrzymał w ogóle nieświetnie.

Siewom wiosennym przeszkadzała niepogoda, siewów kukurudzy nie można było nigdzie jeszcze rozpocząć. Konieczna przetrzymała naogół dobrze i przedstawia się zadowalniająco. Wegetacja łąk silnie opóźniona. Siew buraka cukrowego tylko gdzieś niedługo rozpoczęto zatem ukończy się wyjątkowo późno. — Zbiór owoców zapowiada się dobrze.

Stan zasiewów na Węgrzech. Budapeszteńskie sprawozdanie urzędowe przedstawia stan zasiewów po dzień 15. b. m. jako niekorzystny: Zimne i wilgotne powietrze stało się powodem wielorakich szkód i wielkiego zastojów w pracach rolnych. Stan wcześniej zasianej pszenicy ozimej jest dość dobry i może się jeszcze polepszyć; później zasiana nie rokuje, aby mogła się

należyce rozwinąć. Żyto silnie ucierpiało, późniejsza pomyślna pogoda mogłaby sprowadzić jeszcze ogólne polepszenie. Rzepak przezimował po większej części średnio dobrze.

Z krakowskiego Towarzystwa rolniczego. 21. b. m. odbyło się zwykle miesięczne posiedzenie komitetu.

Na wstępie prezes poświęcił gorące wspomnienie pamięci zmarłego członka Towarzystwa hr. Brezy. Na wniosek p. Dyńskiego uchwalono prosić hr. Wodzieckiego o cofnięcie wniesionej rezygnacji godności I-go wiceprezesa. Delegatem komitetu do państwowej Rady kolejowej wybrano p. Struszkiewicza, zastępując zaś prof. dra. Leo.


Głównym przedmiotem obrad była sprawa traktatów handlowych. Uchwalono sprzeciwić się projektowi przeszerpczenia do naszego kraju t. zw. systemu francuskiego, polegającego na oznaczeniu w autonomicznej taryfie celnej i ceł minimalnych. Natomiast postanowiono zażądać uzniesienia na przyszłość w traktatach handlowych klauzuli największego uprzywilejowania (Meistbegünstigungsklausel). Obniżenie cła na żelazo i na maszyny rolnicze ma być jednym z głównych zadań przy odnowieniu traktatu z Niemcami, w zamian za to należy domagać się ułatwienia wywozu dla bydła i świń, oraz zwalczając zamiar podwyższenia niemieckiego cła na chmiel, nadozwojenia cła na jaja, masło, owoce, ryby i t. d. Memoryał Towarzystwa zajmuje się w dalszym ciągu wykazaniem szkodliwości ugody austro-węgierskiej dla galicyjskiego rolnictwa, oraz stosunkiem polityki taryfowej do celnej, w szczególności domaga się upaństwowienia kolei północnej.

Termin walnego zgromadzenia tegorocznego uchwalono na 11. czerwca b. r.

Wywóz bydła. Na odbytej niedawno temu w ministerstwie rolnictwa ankiecie, dla podniesienia eksportowego handlu bydłem, i urzędzenia wielkich rzeźni, większość ekspertów nie uznaje potrzeby urządzenia osobnego targu eksportowego dla bydła rzeźnego; tylko przedstawiciele handlu bydłem oświadczyli się za zorganizowaniem takiego targu w bliskości Wiednia. Wielu ekspertów zaznaczało, że rozwoju wywozu bydła przeszkadzają głównie wadliwe urządzenia komunikacyjne, stosunki taryfowe na austriackich kolejach, oraz dotkliwie konwenyety weterynaryjne.

DROBNE WIADOMOŚCI.

Pechłki ziemne (*haltica oleracea*) na rozsądzie kapuścianej są istną plagą dla tych, którzy się chcą dochować własnej dobrej rozsady. Spostrzegano nieraz, że więcej one napadają kapustę zasiewaną pod murem lub jakimś parkanem niż na grzędach w polu lub w ogrodzie umieszczonych bez ochrony.



i prowadząc ukośnie ponad grzędą z rozsady wystraszają się pechłki które skacząc z liści padają masami na deskę i przylepiają się na niej. Powtarzając to co dnia rano gdy pechły mają największą ruchliwość i ochotę do skakania można je doskonale wyłapać i wytepić. Deskę trzeba od czasu do czasu na nowo posmarować.

Wiadomości handlowe.

Ziemiopłody.

Lwów, 27. kwietnia Pszenica gotowa 7:40—7:60, na terminia —, żyto gotowe 5:80—6—, na terminia —, owies obrotowy gotowy 5:20—5:50, na terminia —, jęczmień pastewny 5— 5:25 brow. —, rzepak 11— 11:30, nowy 10— 10:50, groch pastewny 5:25—5:50, do gotowania 6:50—15—, wyka 6:50—7—, bobik 7:25—5:75, hreczka 8— 8:75, kukurudzianowa 6:25—6:50 stara —, chmiel za 56 kg. —, konieczyna czerwona —, biała —, szwedzka —, tymotka —, spirytus loco za 50 litr. gotowy paritas Tarnopol 17:25—17:75 na terminia 16:50—17—.

Notowania w walucie koronowej za 50 kilogramów.

Uposobienie co do żyta lepsze do pszenicy przeważają lokalne zapotrzebowanie to też ceny są lokalne.

Bydło i świnie.

Lwów, 25. kwietnia. 1900. Z powodu małej konsumcji mięsa ceny niezmiennione.

Placono za żywy towar od 52—62 kor. za 100 kg żywej wagi. Ceny mięsa w rzeźni: przednie od 0:96 do 1:06 kor., tyłne 0:96 do 1:04 koron.

Praga, 23. kwietnia. Spęd 666 sztuk wołów opasowych między temi galicyjskich 232 sztuk. Placono za galicyjskie woły średnie od 62—64 koron, za krowy od 50—58 koron, za buhaje od 62—70 koron. Za 100 kg. żywej wagi. Targ ożywiony.


Ogólny Związek handlarzy i hodowców bydła we Lwowie, ul. Kopernika 7.

Redaktor odpowiedzialny **Dr. Kazimierz Mieczyski.**

Nakładem galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego.

Czytelników naszych prosimy, aby zamawiając cokolwiek podług inseratu w naszym piśmie powoływali się zawsze na „Rolnika“.

Nowość



Patentowany automatyczny miernik pól i lasów w kształcie tacek, w wymiarze metrowym i sążniowym poleca 2—3

Leopold Herrmann Lwów ul. Gródecka 14a skład maszyn, narzędzi rolniczych i artykułów technicznych, pomp, sikawek i kas ogniowatych. Prospekt na żądanie gratis i franco.

W dobrach Bołszowce

stacya pocztowa, telegraficzna i kolejowa, są na sprzedaż następujące gatunki kartofli jadalnych i wysokoprocentowych, Topaz, Leliwa, Ozimek, Zawisza, Karmazyn, Zagłoba, Ateny, Tuczala, Piast, Lech, Ziemowit, Afrodyta, Gorz Iniak, Dołęga, Królowa Jadwiga, Ostoja, Aldona, Grażyna po 1 zł. 50 ct. za 100 kilo netto loco stacya kolejowa. Worki po cenie zakupu. 8—8 Zamówienia przyjmuje Zarząd dóbr Bołszowce.

Biurowywiadowcze 9—?

J. POLIŃSKI

Lwów, Pasaż Hausmana 5.

Poleca oficyalistów oraz wszelką służbę dworską z najlepszymi rekomendacjami.

Koże i capa w parze sprzedaje tanio Polwark Charytany, poczta 2—2 Bobrówka.

W Lipnikach p. Mojszka są na sprzedaż różę sztamowe w pięknych gatunkach, jedno roczne, silne.

Wysokie na 1/2 metra po 40 halerzy sztuka
" " 1 metr " 60
" " 2 metry i placzące po 2 korony
sztuka. Różę z nazwiskami o 10 halerzy drożej. 1—3

Ziemniaki na nasienie

„Andersony“ i „Sine“

loco folwark Dublany koło Lwowa

do zbycia po cenie 1 złr. 50 ct. wybie-rane, a po 1 złr. 40 ct. niewybie-rane.



Świeży transport koniczyny.

Szanownych odbiorców naszych, którym z powodu wyczerpania zapasów odmówiliśmy w ubiegłym tygodniu przyjęcia zamówień, uwiadamiamy uprzejmie, że otrzymaliśmy świeży transport koniczyny czerwonej, wolnej od kianianki, nie amerykańskiej, o należytej czystości i sile kielkowania.

Pierwszy Galicyjski

Dom dla Ziemi we Lwowie


(Firma kontrolowana przez kraj. stację botan.-rolniczą.)

Czas zażądać oferty na Kosiarki amerykańskie M. Cornicka.

17-2

Clayton & Shuttleworth

Lwów, ul. Gródecka 22.



polecają swe
uznane jako przodujące wyroby
lincolnskich lokomobil
i młócarń parowych

niemniej wyroby wiedeńskie

Elewatorów, pługów, walców, plewników konnych, garnitów młóciarnych konnych, młynków, trierów itd.

i upraszają o odwiedzanie ich składu oficje w maszyny zaopatrzonego.

Cenniki darmo i oplatnie.

Nowo otworzony

10-2

Oddział melioracyjny

Lwowskiej Filii Banku gal. dla handlu i przemysku

Jagiellońska 3.

wykonuje wszelkie prace melioracyjne jako to: zdjęcia planów, wygotowywanie kosztorysów do drenowania pól, nawodniania i odwodniania l k, budowy rowów, kanałów, dróg, szos, kolejek etc. etc. i poleca się do praktycznego przeprowadzenia powyższych prac. Finansowanie uskutecznia się podług każdorazowej szczególnej umowy. W razie już gotowych planów, nastąpić może na podstawie tychże wykonanie pracy.

Dyrekcya.

KANTOR WYMIANY

c. k. uprzyw. galicyjskiego akcyjnego

Banku hipotecznego

kupuje i sprzedaje

wszelkie papiery wartościowe i monety

po najdokładniejszym kursie dziennym, nie licząc żadnej prowizyi. 19-52

Wszelkie kupony

i wylosowane papiery wartościowe

wypłaca bez potrącenia prowizyi lub kosztów

Kantor wymiany

c. k. uprzyw. galicyjskiego akcyjnego

Banku hipotecznego.

Szparagi Argenteuil i Connovers colossal, trzy-letnie sadzonki z których pędy w 5-tym roku ważą do 20 deka jeden, 100 sztuk 2 zlr
Truskawki staropolskie ciemne, słodkie, ananasowe do smażenia,

Laxton Noble tuzin po 16 ct.

Poziołki mięsyczne białe i pasowe tuzin 18 ct.

Maliny remontanty tuzin 36 ct.

Agrast ogromny sztuka 10 ct.

Porzeczki sztuka 10 ct.

Konwalje kopa 60 ct.

Lilie białe, dumortiere, żółte pachnące, sztuka 10 ct.

Reum palmarum sztuka 50 ct.

Gładiole Chidsi, amerykańska nowość, sztuka 15 ct.

Gładiole Gandavensis sztuka 8 ct.

Ponie pachnące róża, białe, różowe, crème, Sella sztuka 25 ct.

Leb cardinalis pasowe, sztuka 10 ct.

kariety najnowsze sztuka 10 ct.

Narcyzy białe 100 sztuk 1 zlr.

" żółte, tuzin 60 ct.

Anemone hepatica, tuzin 20 ct.

Chryzantemy gruntowe żółte po 5 ct.

Campanula medium sztuka 3 ct.


Gynerium argenteum po 15 ct.

Irysy najnowsze angielskie, hiszpańskie, japońskie, tuzin 60 ct.

Wysyłka odwrotna do 15. maja.

Poleca 3-2

Ogród w Łapszynie
p. Brzeżany.



(prawnie ochroniony)

Dr. Weisenberga jedyny środek ochronny przeciwko zakaźnej bieguncie. Sposób prosty, działający przeciw

ginieniu cieląt.

Odosobnienie, desynfekcyje i t. d. niepotrzebne. Znakomite liczne odznaczenia.

Obstalunki jedynie u chemika

B. MENGE, TICHAU O. S.

Broszury gratis i franco.

Główny skład

u. C. Haubnera, Engelsapothekę

Wiedeń, I. Bognergasse 13. 18—?

Amerykańskie patentowane

Łańcuchy stalowe bez spajania

Więcej niż podwójna wytrzymałość w porównaniu do łańcuchów spajanych. Mocniejsze, lżejsze i tańsze niż jakiegokolwiek inne łańcuchy.

Świadectwa i cenniki gratis.

Towarzystwo akcyjne „STAHLWERKE WEISEN-SENFELS“ przedtem Goppinger i Sp., Weissenfels w Krainie górnej.

Można dostać w każdym większym handlu żelaznym. 15—24

Julian br. Brunicki

w Podhorcach p. Stryj

poleca

Owisy**Kartofle**

12—13

Drzewka**Krzewy**

owocowe i ozdobne;

narzędzia ogrodnicze.

Cenniki darmo i opłatnie.

Agronom, żonaty bezdzietny 34 lat liczący z szkołą agronomiczną, i praktyką w większych majątkach obznajomiony w szczególności z buchalterją, prowadził już samodzielnie gospodarstwa mogący się wykazać świadectwami, poszukuje umieszczenia. Łaskawe oferty uprasza pod M. G. Złoczów. 2—4

**Zarząd dóbr Niestuchów
poczta Żelechów wielki**

ma na sprzedaż

buhajki czystej krwi i półkrwi **Simmenthal-skiej** po cenie 60 ct. i 50 ct. za 1 kg. żywej wagi, jak również kartofle nasienne **Gracya** i **Topaz** po cenie 2 złr. za 100 kg. loco stacya Zadzówce. 4—3

HOTEL VICTORIA

we Lwowie, ul. Hetmańska l. 8, tuż przy stacyi kolei elektrycznej
zupełnie odnowiony. 6—26

Pokoje wzorowo urządzone od 70 ct. począwszy.

Przy dłuższym pobycie znaczny opust.

!!! Ważne dla P. T. Obszarów Dworskich !!!

PIOTR MIKOLASCH i SPÓŁKA

polecają po cenach najniższych towar pierwszorzędnej jakości, jakoto:
WERNIKSY i OLEJE, lakiery i pokosty do wszelkiego użytku,
Masy i farby do podłóg, woski

Pędzle wszelkiego rodzaju, **gąbki, lak, atrament**
PIPY do beczek, **GAZY** na pytle

Środki desynfekcyjne jak kresolina, lyzol i t. p.

Przyrządy i przybory do czyszczenia i leczenia koni i bydła,
ŚRODKI OWADOGUBNE,

Wiaderka, hydronety, latarnie gospodarskie

Pasy do maszyn, gurdy, rzemyki, śruby, węże gumowe i konopne

Płyty i sznury do kotłów, holendry

Ceraty, chodniki, rogózki i podściółki, oliwy, zapałki

SZPAGATY, SZNURY

Środki do czyszczenia metali, jak proszek, mydło, pasta i t. p.

Farbka, krochmal, mydło do prania, świece

Smarowidła, czernidła i lakiery do skór i uprzęży

SZCZOTKI, GRZEBIENIE — ARTYKUŁY GUMOWE


etc., etc.

Sklep i magazyn w domu własnym, ul. Kopernika l. 1.

Cenniki na żądanie gratis.

17—23

**Zarząd dóbr Suchodoły p. Brody sprzedaje Tymotkę po 26 złr.,
hreczkę po 8 złr. za ct. m. wraz z workiem.**



Drut kolezasty do ogrodzeń podwójny cynkowy z kolcami co 12 ^{cm}/_m
100 metrów złr. 3 50 z kolcami co 6 ^{cm}/_m złr. 4.

Drut podwójny cynkowy bez kolców 100 metrów złr. 3.

Siatka kolorowa druciana od owadów do okien metr □ złr. 1.

Łopaty do drenowania sztychówki i fugi po złr. 1. angielskie oprawne
od złr. 3, do złr. 4.

Ławki ogrodowe żelazne składane po złr. 6

Krzesła żelazne składane po złr. 2·20.

Stoły żelazne składane z płytą drewnianą po zł. 6.

Kasy ogniotrwałe z fabryki Wertheimera Nr. 0 złr. 70. 0 1/2 zł. 85.
Nr. 1 złr. 105. Nr. 2 złr. 125.

poleca

ANTONI HAŁSKI

handel żelazny — Lwów, plac Maryacki l. 9.

Osobny magazyn mebli żelaznych na lem. piątrze.