

W. B.

W. Blażowski 1865

Sierozynski 1863

HISTORIA NATURALNA

Biblioteka  
Ojców Kamedułów  
w Bieniszewie

1881

W. B. ...

Biem. C. V. 19

WYKŁAD POCZĄTKÓW  
HISTORII NATURALNEJ

WYKŁAD POCZĄTKÓW

**HISTORII NATURALNEJ.**

ANIMALIA

ANATOMIA

VEGETABILIA

MINERALIA

# WYKŁAD POCZĄTKÓW HISTORII NATURALNEJ

WEDŁUG PROGRAMMATU

przez Uniwersytet Francuzki pod d. 14 września 1840 przepisanego,

DLA UŻYTKU SZKÓŁ UŁOŻONY,

A PRZEZ

RADEY WYCHOWANIA KRÓLESTWA FRANCUZKIEGO

PRZYJĘTY,

MIANOWICIE:

## MINERALOGIA I GEOLOGIA

PRZEZ

**F. S. BEUDANT**

Członka Król. Akad. Nauk, Inspektora Jeneralnego Nauk.

## BOTANIKA

PRZEZ

**ADRYANA DE JUSSIEU**

Członka Instytutu, Professora w Muzeum historii naturalnej  
i w Wydziale nauk w Paryżu.

## ZOOLOGIA

PRZEZ

**MILNE-EDWARDS**

Członka Instytutu, Professora w Muzeum historii naturalnej  
i w Wydziale nauk w Paryżu.

WYKŁAD POCZĄTKÓW  
**BOTANIKI**

PRZEZ

**ADRYANA DE JUSSIEU**

Członka Instytutu, Profesora w Muzeum historii naturalnej  
i w Wydziale nauk w Paryżu.

PRZEŁOŻYŁ

*Tytus Chalubiński Dr. Med.*



TOM II.



**BOTANIKA.**



**WARSZAWA.**

W Drukarni Stanisława Strąbskiego.

—  
1849.

Wolno drukować, z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby exemplarzy.

W Warszawie d. 14 (26) Kwietnia 1849 r.

STARSZY CENZOR,

*L. T. Tripplin.*

Exemplarze, podpisem poniższym nieopatrzone, jako przedruk nieprawny poszukiwane będą.



NAR  
NAR  
włókn  
piersie  
Przem  
we 14.  
niczeni  
bia. Zie  
NAR  
Naskór  
Łódz  
Drewn  
61-71.  
Komó  
jania  
cze 83  
Łódz  
Łódz  
Korz  
Bezłis  
Liśc  
bis. - 1  
jój i ró  
Pochwa  
nie liśc  
liścian  
Uli  
Węzow  
kowe  
167-16  
Paç

## SPIS PRZEDMIOTÓW.

### NARZĘDZIA ROŚLENIA.

NARZĘDZIA PROSTE, § 2. — Komórki, Mięksiz 3-6. — Włókna. Tkanka włóknista 7. — Naczynia w ogólności 8. — Cewki rozkręcalne 9. — Cewki pierścieniowate i siatkowate 10. — Kręskowane 11. — Kropkowane 12. — Przemiany cewek węzownicowych 13. — Naczynia mlęczowe, czyli właściwe 14. — Sposoby połączenia narzędzi prostych 15-16. — Sposoby ich spólniczenia 17. — Zawartość narzędzi; gazy, płyny, ciała stałe. Jąderko. Skrobia. Zieleń. Kryształy 18-25.

NARZĘDZIA ZEOŻONE 26. — Zarodek i jego pierwsze rozwijanie się 27-35. — Naskórek i szparki 37-47. — Naskórek 48.

**Łodyga** 50. — *Roślin dwuliściennych* 51-59. — Układ drzewny. Rdzeń 60. Drewno. Wzrastanie tegoż. Cewa rdzeniowa i słoje spółośrodkowe; Miazga 61-71. — Promienie rdzenne 72. — Kora 73-75. — Okrywa korkowa 76. — Komórkowa 77. — Włókna korowe czyli lyko 78. — Różne sposoby rozwijania się kory 79-81. — Grudki 82. — Łodygi wyjątkowej budowy. Pnącze 83-90.

*Łodyga roślin jednoliściennych.* Budowa i sposób wzrastania 91-100.

*Łodyga roślin bezliściennych* 101-102. — Paprocie 103-108. Skrzypy 109.

**Korzeń** 110-117. — Dwuliściennych 118. — Jednoliściennych 119. — Bezliściennych 120.

**Liście** 121-122. — Powietrzne. Ich budowa 123-127. — Podwodne 127 *bis.* — Postać ogólna liści, Ułożenie ich nerwów 128-132. — Błazka, Obwód jej i różny stopień złożoności 133-136. — Ogonek 137-140. — Liściak 141. — Pochwa. Przylistki 142-145. — Rozwijanie się liścia 146-148. — Porównanie liści w głównych gromadach roślin 149. — Jednoliścienne 150. — Dwuliścienne 151. — Bezliścienne 152.

*Ulistnienie* czyli ułożenie liści na łodydze 153. — Liście naprzemianległe Wężownica. Kąt rozbiegu, Obiegi 154-163. — Liście naprzeciwległe i okółkowe 164-166. — Użytek tych piętn przy oznaczaniu narzędzi liściowatych 167-169.

**Pączek** 170-173. — Różne rodzaje przedlistnienia 174.

\*

**Ugałęzienie** 175-176. — Łodygi pojedyncze 177 — Rozgałęzione 178-179. — Rośliny trwałe 180. — Korzeniaki 181. — Cebule 182. — Łodygi czolgające 183. — Cebuleczki 184. — Gałązki naprzeciwległe względem liści 185. — zewnątrz-kątne 186-187. — Pączki przybyszowe 188. — Wezłki 189. — Gałązki korzeniowate 190. — Postać roślin zależąca od rozmaitego ugałęzienia 191-197. — Treść 198.

**Kwiatostan** 199-204. — Kwiatostany nieskończone. Grono, kiść, bukiet 205. Baldaszko-grono 206. Kłos, kotek, buławka, rosoczatka 207. Baldaszek 208. Kwiatogłówka 209. — Kwiatostany skończone, dwudzielne, Wierzchnotka 211-214. — Kwiatostany mieszane 215-217.

*Kwitnienie.* Porządek i prawa jego 218-222. — Wyjątki pozorne 223-225.

*Przykwiatki* 226-229. — Pokrywa, wirczka, kieliszek, uszko 230-234.

**Narzędzia przekształcone** 235. Ztaśmienie 236. Wasy 237. Ciernie 238. — Kolce 240.

*Włosy* 241-254. — Gruczoły 245. Włosy gruczołowate 245a-245c. — Gruczoły właściwe 246-246d.

CZYNNOŚCI NARZĘDZI ROŚLENIA 247-247 bis.

**Wsyanie korzeni.** Wnikanie i wynikanie 248-252.

**Krażenie.** Oskoła. Siły spowodowujące jej ustępowanie 253-258. — Jęj pojawy 259-265. — Sok zstępujący, czyli przerobiony. Obieganie 266-272.

*Kotowanie*, czyli krążenie wewnątrz-komórkowe 273-278.

**Oddychanie.** Narzędzia jego 279. — Skład powietrza i rozkładanie się jego w częściach zielonych, wystawionych na działanie światła 280-282. — w ciemności 283. — Działanie promieni 284. — Rozkładanie się w częściach niezielonych 285. — w nasieniu wschodzącym 286-287. — Pochłanianie saletrodu z powietrza 288. — Treść i porównanie z oddychaniem u zwierząt 289-298.

*Parowanie* 291-293.

**Żywienie i wydzielanie** 294-295. — Skład chemiczny istot roślinnych 296-298. — Istoty potrójne. Włóknik roślinny, skrobia, dekstryna 299. Cukier 300. — Istoty poczwórne 301. — Diastaza 302 — Drzewnik i inne wytwory zawierające węgiel lub wodoród w zbytku 303. — Związki saletro-rodne 304. — Alkaloidy 305. — Związki zawierające kwasoród w zbytku. Kwasy 306-307. — Próchnica, ulmina 308. — Stosunek saletrorodu w tkan-kach powstających 309-310. — Istoty kruszcowe brane z ziemi, i wpływ tychże na roślinie 311-316.

*Wydalenie* 317. Obłoczki lepkie, woskowe i śluzowe 318. — Istoty ustrojowe zbyteczne 319. — Wydalenia właściwe. Mniemanie o wysiękach znajdujących się na korzeniach i zastosowanie ich do teoryi płodozmianu 320-321.

**Wzrastanie tkanek** 323. — Tkanki komórkowej 324-326. — Teorya Schlejdena 327. — Mirbela 328-329. — Doświadczenia tyjące się powstawania miazgi 330. — Wzrastanie łodyg i korzeni 332. Teorya pp. Dupetit-Thouars i Gaudichaud 333-346. — Treść. Porównanie czynności żywienia u roślin i zwierząt 347-355.

## NARZĘDZIA ODRODCZE.

**Kwiat** uważany w ogólności. Odmiany liści dla utworzenia różnych jego części, jakoto: kielicha, płatków, pręcików i owoców 355-360. — Wzór ogólny kwiatów. Okółki w dwuliściennych 361. — w jednoliściennych 362.

**Zrośnięcia części kwiatowych** 363-372. — Osadzenie tychże 373. — Ich liczba 374. — Powiększenie się téjże liczby 375. — Przez dodanie okółków 376. — Przez rozdwojenie 377. — Pomniejszenie się liczby części kwiatowych 378-379. — Kwiaty bezpłatkowe 381. — Osobnopłciowe, wielożenne, oddzielno i rozdzielнопłciowe 382. — Nijakie, bezokrywe czyli nagie 383-384. — Porównanie kwiatostanu z kwiatem 385. — Połączenia tych rozmaitych odmian 386. — Wyrodzenie się i przekształcenie części kwiatowych 387. — Kwiaty niekształtne 388-393.

**Przedkwitnienie** 394. — Dachówkowe 395. — Łupinowe, skręcone 396. — Odmiany podrzędne 397. — Porównanie różnych okółków pod względem przedkwitnienia 399-400. — Piętna ztąd otrzymywane 401. — Pręciki i owocki uważane w paku 402. — Położenie kwiatów względem kwiatostanu 403. Ich umiarowość 404.

**OKRYWY KWIATOWE.** Okwiat 405-408.

**Kielich.** Jego części: listeczki czyli działki 409-413. — Zrośnięcie się ich w różnym stopniu, czyli kielich jednolisteczkowy 414. — Kieliszek 415. — Utkanie części 416. — Odmiana ich przy tworzeniu się puchu 417. — Trwałość 418.

**Korona.** Części jej czyli płatki 419. — Części płatków: paznogieć i kraj 420. — Ich rozwijanie się 421. — Ich barwa i utkanie 422-424. — Ich różne kształty 425. — Ich liczba i rozkład 426. — Imiona różnych kształtów kwiatu, zależących od tegoż rozkładu, w koronach wielopłatkowych 427. — W jednoplatkowych 428. — Przysadki 429. — Trwałość 430.

**Pręcik.** Jego części 431. — Nitka 432-434. — Pylnik. Woreczki jego, liczba tychże i kształty 435. — Stosunek do nitki i zwórki 436-439. — Pękanie woreczków 440-441. — Przysadki 442. — Płonność 444. — Stosunki pręcików względem okryw kwiatowych 445. — Pomiedzy sobą 446-447. — Długość i kierunek 448-449.

Budowa pręcika. — Nitki 450. — Pylnika 451. — Rozwijanie się pręcika w ogólności 452. — Pylnika w szczególności, a osobliwie pyłku 452.

**Pyłek** 454-458. — Uplodnik 459. — Okrywy i postać zewnętrzna pyłku 460-466. — Łagiewka 468-469.

**Wydełki roślin bezliściennych** 470.

**Słupek** 471. — Rozwijanie się owoców 472. — Części owodka 474. — Budowa zawiązka 475-476. — Szyjki; tkanka przewodcza 477. — Znamienia 478. — Działanie pyłku na znamię 479-480. — Rozkład względny owoców 482. — Stosunki ich względem dna kwiatowego 483. — Stosunki szyjki do zawiązka 484-485. — Zrośnięcie oboczne wielu owoców i różne stopnie onego 486. — Związek wielokomorowy 487-488. — Łożysko, lożyszcznia i ułożyszcznienie. Różne rodzaje tegoż 489-495. — Zrośnięcia w innym kierunku 496. — Stosunki słupka do innych okółków kwiatowych. Związek przyrosły i wolny 497. — Postać i powierzchnia zawiązka 499.

*Szyjki zawiązka wielokomorowego i rozmaity stopień ich zrośnięcia* 499.  
*Znamię* 500.

**Owoc** 501.— **Nasiennik** 502.— Różne warstwy jego 503-505.— **Szwy** 506-507.— **Łupiny** 508.— Odmiany owocu w porównaniu ze słupkiem 509-513.— **Uporządkowanie owoców** 514-515.— **Owoce oddzielnoowocowe, niepekające** 516.— **Pełające** 517.— **Owoce zrosłoowocowe** 519-520.— **Niepekające** 521.— **Pełające** 522-523. Różne rodzaje pękania 524-529.— **Owoce kwiatozrosłe** 530.— **Owoce skupione** 531-532.

**Dojrzewanie nasiennika** 533-540.

**Zalążek i nasienie.** Ich układ żywiący. Sznureczek i znaczek 541.— Ich położenie w komorach 542-544.— **Rozwijanie się i budowa zalążka** 545. **Jadra i jego okrywy.** **Otworek i osadka** 545-550.— Różne stosunki tych dwóch punktów i znaczką 551-554.— **Wyrostki i osnówka** 555-556.

**Nasienie.** Zmiany nasienia w porównaniu z zalążkiem 557.— **Tworzenie się i początek bielma** 558-561. Jego budowa 562.

**Zarodek.** Jego rozwijanie się 563-564.— Jego części 565.— **Zarodek jednoliścienny** 566.— **Dwuliścienny** 567-572.— **Położenie liścieni względem siebie** 573.— **względem kielka** 574.— **Stosunki zarodka względem bielma** 575-579.— **względem powłok nasiennych** 580.— **względem komory** 581-582.— **Otworek, osadka, znaczek, szewek** 583.

*Pawłoki nasienne*, 584-585.

*Rozsiewanie się nasion* 586-588.

*Wschodzenie* 589-599.

**Zarodnik roślin bezliściennych** 600.— **Woreczek który je zawiera czyli purchatka** 601.— **Rozwijanie się zarodników** 602.— **Różne ich kształty** 603.— **Puszki** 604-605.— **Ruchy niektórych zarodników** 606. **Teorya Schleidena co do powstawania zarodka** 608-612.

**Miodniki** 613-618.

**NIERTÓRE OGÓLNE ZJAWISKA ROŚLENIA.**

**Ubarwienie roślin za życia** 620-627.— **Siedlisko ubarwienia** 628-629.— **Zmiany barw** 630.— **Rozmaite mniemania o naturze barwników** 631-632.— **Teorya Marquarta** 633-634.— **Barwa brunatna** 635-637.— **Przemiany barw po śmierci** 638-639.

**Ciepło właściwe roślin** 640.— **Ciepło właściwe kwiatów w czasie kwitnienia** 641-644.— **Nasion w czasie wschodzenia** 645.— **Innych części rośliny** 646.

**Wywyżywanie się światła** 647-648.

**Kierunki i ruchy roślin.** **Kierunki stałe pewnych części** 649-651.— **Rozmaite ruchy** 652-653.— **Sen liści** 654-657.— **Sen i ruchy dzienne kwiatów** 658-663.— **Ruchy cząstkowe pręcików i słupków** 664.— **Ruchy wywołane przez bodźce zewnętrzne** 665-667.— **Ruchy dowolne** 668-669.— **Przypuszczenia co do natury ruchów** 670-673.— **Ruchy nieróżniące się od zwierzęcych** 674.— **Badanie piętń odróżniających zwierzęta i rośliny** 675-677.

## UKŁADNICTWO I RODZINY.

*Osobniki* 678.— *Gatunki* 679.— *Odmiany* 680.— *Rodzaje* 681-682.— *Układy i metody* 683-684.— *Metoda Raja* 685.— *Tourneforta* 686.— *Linneusza*. Jego słownictwo 687.— Jego układ 688-689.— *Metoda dwudzielna Lamarka* 690.— *Metoda przyrodzona* 691-692.— *Rodziny* 693.— *Rodziny Linneusza* 694.— *Bernarda de Jussieu* 695.— *Adansona* 696.— *Metoda A. W. de Jussieu*. Droga którą postępował 697-698.— *Podrzędność piętn* 699-700.— *Jego gromady* 701.— *Jego rodziny* 702.— *Prace jego następców* 703-705.— *Plan i porządek poniższego wykładu rodzin* 706-707.— *Uwagi według których porządek ten, czyli łańcuch został ułożony, czyli uwagi nad rozmaitemi stopniami ustrojności roślin w postępie ich od niższych do wyższych* 708-725.— *Uwagi nad nazwami rodzin* 726.— *Nad ich piętnami* 727.

Tablice skrócone rodzin, według głównych piętn tychże ułożone.

Rośliny bezliścienne . . . . .	— Tablica I.	str. 570		
— jednoliścienne	bezbielmowe, wodne . . . . .	— Tablica II. str. 593		
	opatrzone bezokwiatowe . . . . .	— Tablica III. str. 595		
	bielmem opatrzone okwiatem . . . . .	— Tablica IV. str. 614		
— dwuliścienne	osobnopciowe . . . . .	— Tablica V. str. 618		
	bezpłatkowe obopciowe . . . . .	— Tablica VI. str. 632		
	wielopłat- kowe	o ułożyszcznieniu środkowym i bielmie mączystym, otoczonym przez zarodek podzawiazkowe	o ułożyszcznieniu ściennym, o zarodku umieszczonym w osobnym woreczku . . . . .	Tablica VII. str. 641
	we	o ułożyszcznieniu osio- wym . . . . .	Tablica VIII. str. 645	
	kołozawiazkowe . . . . .	— Tablica IX. str. 648		
	podzawiazkowe	o koronie kształ- tnej . . . . .	Tablica X. str. 650	
		..... 2	— Tablica XI. str. 662	
		nie- kształ- tnej . . . . .	— Tablica XII. str. 683	
		..... 2	— Tablica XIII. str. 686	
		kształ- tnej . . . . .	— Tablica XIV. str. 686	
	kołozawiazkowe . . . . .	— Tablica XV. str. 701		

Szczegóły dotyczące znaczniejszych rodzin.

ROŚLINY BEZLIŚCIENNE 730-731.— *Wodorosty* 732.— *Grzyby* 733.— *Porosty* 734.— *Wątrobnice* 735.— *Mchy* 736.— *Ramienicowate* 737.— *Skrzypowate* 738.— *Paprocie* 739.— *Widłaki* 740.— *Korzenioziarne* 741.

ROŚLINY JEDNOLIŚCIENNE 742. — *Wodne, bezbielmowe* 743. — *Opatrzone bielmem* 744. — *Bezokwiatowe* 745. — *Turzycowate* 746. — *Trawy* 747. — *Opatrzone okwiatem* 748. — *Palmy* 749. — *Sitowate* 750 — *Liliowate* 751. — *Amarylkowate* 752. — *Kesaćcowate* 753. — *Zapylcowate* 754. — *Pochrzynowate* 755. — *Bananowate* 756. — *Kwiatotrzcinowate* 757. — *Zdzielecowate* 758. — *Storczykowate* 759.

ROŚLINY DWULIŚCIENNE 760. — *osobnopłciowe, nagoziarnowe* 761. — *Sagowcowate, Szyszkwowe* 762-763. — *Kotkowe* 764. — *Pokrzywcowate* 765. — *Pieprzowate* 766. — *Muskatowcowate* 767. — *Dzbanecznikowate* 768. — *Wieszczyńcowate, Morzyczyszkowate* 769. — *Ostromlęczowate* 770. — *Tykowate* 771. — *Figowcowate* 772.

Rośliny dwuliścienne o kwiatach obopłciowych bezpłatkowych 773. — *Kokornakowate* 774. — *Sandalowcowate* 775. — *Srebrnikowate* 776. — *Wawrzynkowate* 777. — *Wawrzynowate* 778. — *Rdestowate* 779. — *Dziwaczkowate* 780.

Rośliny dwuliścienne wielopłatkowe 781. — *O ułożyszczeniu środkowym, o bielmie mączystym, otoczonem przez zarodek.* — *Goździkowate* 781.

*Podzawiazkowe* 782. — *O ułożyszczeniu ściennem* 783. — *Fiolkowate* 784. — *Czystkowate* 785. — *Orleanowate, Rezedowate, Kaparowate* 786. — *Krzyżowe* 787. — *Makowate* 788. — *O zarodku zamkniętym w osobnym woreczku.* *Grzybieniwate, Bogoroślowate, Pływcowate* 789. — *O ułożyszczeniu kątnem* 790. — *Jaskrowate* 791. — *Ukęślowate, Bobrownikowate, Flaszowcowate* 792. — *Kwaśnicowate, Krepniowate, Miesiącznikowate* 793. — *Winoroślowate* 794. — *Rutowate* 795. — *Bodziszkwowe* 796. — *Ślázowate, Serecznikowate, Zatwarowate* 797. — *Cistronkowate* 798. — *Żółtosokowate* 799. — *Krasnosokowate* 800 — *Mydleńcowate* 801. — *Miodkowate* 802. — *Cedrzeńcowate* 804. — *Pomarańczowate* 805.

*Kołozawiazkowe* 806. — *Terpentynowcowate* 807. — *Strąkowe* 808. — *Rożowate* 809. — *Zaczerniowate* 810. — *Mirtowate* 811. — *Wiesiołkowate* 812. — *Męczennicowate* 813. — *Porzeczkowate* 814. — *Cierńcowate* 815. — *Gruboszowate* 816. — *Łomikamieniowate* 817. — *Baldaszkwowe* 818. — *Szakiłakowate* 819.

Rośliny dwuliścienne jednopłatkowe 820. — *Podzawiazkowe* 821. — *O koronie kształtniej, o pręcikach zazwyczaj podzawiazkowych, cząstkocratic niezależających od niej, wielokrotnych, podwójnych lub naprzeciwległych.* — *Wrzosowate* 822. — *Storaksowate* 823. — *Hebanowate* 824. — *Ostokrzewowate* 825. — *Dzielzaminowate* 826. — *Pigwicowate* 827. — *Pierwiosnkowate* 828. — *O pręcikach osadzonych na koronie* 829-831. — *Trąbkowate* 832. — *Rozdzięńcowate* 833. — *Wargowe* 834. — *Ogórecznikowate* 835. — *Psiankowate* 836. — *Tredownikowate* 837. — *Powojowate* 838. — *Goryczkowate* 839. — *Toinowate i Trojęściowate* 840. — *kołozawiazkowe, Marzanowate* 841. — *Przewiertniowate* 842. — *Gązewnikowate* 843. — *Kostkowate* 844. — *Drapaczowate* 845. — *Dzwonkowate* 846. — *Stroiczkwowe* 847. — *Złożone* 848.

## GEOGRAFIA BOTANICZNA.

Pojęcia wstępne 849-850. — Klimata. Wpływ szerokości 851-853. — wysokości 854. — wilgoci 855. — światła 856. — Obręb roślin i rozmaite ich rozdzielenie 857-859. — Roślinność pasu gorącego 860-863. — Pas równikowi i zwrotnikowy 864. — Pasy umiarkowane 865. — pozazwrotnikowe 866. — umiarkowane właściwe 867. — Pas umiarkowany ciepły europejski czyli pas oliwniku 868. — umiarkowany zimny europejski 869. — Następstwo tych i następnych pasów od spodu ku wierzchołkom gór. Rośliny podalpejskie i alpejskie 870. — Pas pod-arktyczny, arktyczny i polarny w Europie 871. — Porównanie tychże pasów na różnych innych punktach kuli ziemskiej i na wierzchołkach gór 872. — na obu dwu ładach i na obu dwu półkulach 873-874. — Pas umiarkowany w Azji 875. — w Ameryce północnej 876. — na półkuli południowej, w Chili 877. — na Andach 878. — w Nowej-Holandyi 889. — w Nowej Zelandyi 880. — na przykładu Dobrzej-Nadziei 881. — Roślinność wysp 882.

Wielość pierwotnych środków roślinności 883. — Ekwiwalenty jednego środka z drugim 884. — Flory 885. — Krainy botaniczne 886. — Arytmetyka botaniczna 887-893. — Rośliny gromadne 894. — Wpływ gruntu 895. — Rośliny wód słonych 996. — wód słodkich 897. — Bagna, torfowiska; rośliny ziemnowodne, zalane 898. — Wpływ składu chemicznego ziemi 899. — Wpływ stosunków geologicznych 900. — Niedostatku wody ciągłego lub przestankowego 901. — Stanowiska roślin 903. — Wpływ człowieka 904.

Rozdzielenie głównych, pokarm dających, uprawianych roślin. 905. — Zbóż, ziemniaku 906. — Quinoa 907. — Gryki 908. — Kasztanu 909. — Wielu drzew i korzeni krain zwrotnikowych 910-911. — Winorośli 912.

Rośliny kopalne 914. — Pokład węgla ziemnego 915. — Następstwo pokładów powtórnych 9a6. — Pokłady trzeciego rzędu 917. — Zakończenie 918.

Wielki niedziela...  
Wielki piątek...  
Wielki sobota...  
Wielki niedziela...  
Wielki piątek...  
Wielki sobota...  
Wielki niedziela...  
Wielki piątek...  
Wielki sobota...  
Wielki niedziela...

Wielki niedziela...  
Wielki piątek...  
Wielki sobota...  
Wielki niedziela...  
Wielki piątek...  
Wielki sobota...  
Wielki niedziela...  
Wielki piątek...  
Wielki sobota...  
Wielki niedziela...  
Wielki piątek...  
Wielki sobota...  
Wielki niedziela...

Za  
frau  
wiel  
go w  
kiedy  
Zpom  
wiak  
nauk  
twór  
znan  
jak i  
wan  
wan  
wyw  
zasa  
że p  
swér  
nych  
jeszo  
na s  
jeszo  
i daw  
syé  
re a  
nake  
zyka  
Dlat  
prac  
czna

## OD TLUMACZA.

Zajmując się przekładem dzieła jednego z najznakomitszych francuzkich botaników, dzieła nietylko odznaczającego się wielką przystępnością w wykładzie, ale zarazem obrobionego według nowszych pojęć nauki, uczulem więcej niż kiedykolwiek niedostatki naszego botanicznego słownictwa. Zpomiedzy botaników naszych Kluk, Andrzejowski i Czerwiakowski najwięcej położyli zasług w kształceniu języka nankowego. Pierwszy słusznie może być uważanym za jego twórcę; usiłowania drugiego, jakkolwiek mniej powszechnie znane, są jednak wielkiej wagi, gdyż równie w tworzeniu, jak i w wyszukiwaniu wyrazów już w pospolitej mowie używanych, widać u niego rzadką trafność i staranne zastosowanie się do ducha języka. Nakoniec w niedawno wypracowanym dziele trzeciego, widzimy mnóstwo nazwisk nowych, wywołanych postępem nauki i najczęściej krytycznie według zasad mowy naszej utworzonych. Nic jednakże dziwnego, że przy tak licznych pojęciach; jakie botanika w ciągłym swém rozwijaniu się przedstawia, prace powyższych uczonych, wspierane nadto szczegółowemi usiłowaniami kilka jeszcze innych, nie były w stanie posunąć naszego słownictwa na stopień zupełnego wykształcenia. Nietylko zbywa nam jeszcze na wielu nazwach oznaczających nowsze, lub nawet i dawniejsze pojęcia, ale nadto pomiędzy używanemi już i dosyć utartemi wyrazami znajduje się znaczna ilość takich, które albo są dwuznaczne, albo niewłaściwie rzecz oddają, albo nakoniec będąc dosłownem tylko, a niezawsze z naturą języka zgodnem tłumaczeniem, muszą być zastąpione innemi. Dlatego, nie czując nawet wcale upodobania w martwej pracy obrabiania wyrazów, zmuszony byłem utworzyć znaczną ich liczbę, stosując się zawsze ile możności do ducha

mowy naszej. Nie pochlebiam sobie bynajmniej, aby wypadki usiłowań moich mogły powszechnie być przyjęte i w każdym razie gotów jestem zarzucić wyraz przezemnie użyty dla innego lepszego; lecz gdyby nawet ani jedno z moich nazwisk utrzymać się nie mogło, i wtedy cieszyć się będę przynajmniej, jeżeli praca moja, zdoła przekonać poświęcających się botanice o potrzebie obrabiania własnego naukowego języka i wywołać ścieranie się zdań, bo wszakże na tém polega pewność wszelkiego postępu.

Dla łatwiejszego obejrzenia przyłączam tu spis wyrazów przezemnie wprowadzonych, tak zupełnie nowych, jako też zmienionych w znaczeniu, albo używanych w prawdzie w popolitej mowie, lecz przez ścisłe określenie sfery odpowiadającego im pojęcia, zamienionych w nazwy naukowe. Wiele z nich nie potrzebuje żadnego objaśnienia, są bowiem albo prostem przeproszeniem, albo się same dostatecznie tłumaczą; przy innych umieściłem uwagi jakie mnie do wprowadzenia ich skłoniły. Nakoniec rozebrałem tu jeszcze kilka wyrazów, które lubo już przez pojedynczych pisarzy były użyte, jednakże, nie są dotąd tak powszechnie przyjęte, jakby na to zasługiwały.



**Abortus, plonność.**—Upatrywanie analogii pomiędzy roślinami a zwierzętami było powodem, iż różnemi czasami wprowadzano do słownictwa botanicznego wiele wyrazów oznaczających pojęcia, które się właściwie do zwierząt tylko mogą odnosić. Jednym z takich jest wyraz *abortus*. Zrazu używano przymiotników *abortivus, abortiens* mówiąc tylko o nasieniu niemającym zarodka; dziś kładziemy je przy każdym narzędziu, które w rozwijaniu się nie przedstawiło wszystkich ważniejszych pojavów życia, właściwych innym na-

rzędziom tegoż samego gatunku. I tak, dodajemy je gałązkom, które nie wydały liści, liściom i listeczkom pozostającym w stanie łusk, kwiatom niemającym części rozrodczych, nasienikom wykształcającym się bez zapłodnienia i t. p. Pojęcie więc wyrazu *abortus* jakkolwiek rozległe, daje się jednak ściśle określić i przedstawia w użyciu wielką dogodność. Nasi botanicy oznaczali je przez *pmiotek*, wyraz dający się użyć tylko w zoologii; dalej przez *zamorek*, lecz nazwa ta nie jest stosowną dla nasienników lub

okryw nasiennych, które się wykształcają pomimo tego iż w nich nie dostaje nasion lub zarodka (patrz niżej: *atrophia, rudimentum*). Przymiotników *puszty, pustujący* nie można znów użyć na oznaczenie narzędzi liściowatych nie dochodzących zupełnego wykształcenia. Andrzejewski tylko sam użył wyrazu *plonność*, chociaż nie nadał mu w zastosowaniu całej rozciągłości, do której jest zdolnym, a która rzeczywistości w botanice najlepiej da się ograniczyć sferą pojęcia: *abortus*. W języku albowiem pospolitym, mówimy o plonności wszędzie, gdzie nie następuje skutek, jakiego oczekiwać można ze względu na zależność jednej rzeczy od drugiej. Na tej zasadzie nazywamy rolę, drzewa, zamiary, nadzieje i t. p. *plonnemi*. Nadto rzeczowniki *ploniec, plonienie*, przymiotnik *plonny* i słowo *ploniec* wraz z imiesłowem *ploniejący* dają nam z największą łatwością wszelkie odcienia związków w jakich pojęcie *plonności* stać może względem przedmiotów.

#### **Achenium, niełupka.**

**Amylum, skrobia.** — Wyraz *skrobia*, wprowadzony niedawno w użycie przez Czerwiakowskiego, uderzy zapewne wielu i nastreczy pytanie, dlaczego wynajdować nieznanne jakieś imię, kiedy przecież w pospolitej mowie mamy na to wyraz *krochmal*? Ani słowa; — lecz tu właśnie chodzi o nazwisko rzeczy, która od wieków musiała być znaną, i słusznieby się dziwić należało, gdyby dawna mowa nasza nie mając własnego dla niej wyrazu, z koniecznej potrzeby musiała pożyteć i nielitościwie kaleczyć wyraz obcy (*Kraftmehl*). W rzeczy samej znajdujemy w dawnych ksiązkach niejedną nawet taki wyraz ale dwa, tojest: *skrobia* i *rzerzydło*, które były jak widać dosyć powszechnie używane, mówiono bowiem *skrobić* lub *rzerzyć bieliznę*. Nie wchodząc bynajmniej w przyczynę upowszechnienia wyrazu *krochmal* i przyznając nawet, że i *skrobia* i rze-

*zydło* dość dziwnie dziś brzmią w uszach naszych, przyznając dalej jeszcze, iż trudnem, jeśli nie wcale niepodobnem byłoby dziś zupełne wyrzucenie z mowy niepotrzebnego gościa; nie widzimy jednak przyczyny, czemu by w ksiązkach przynajmniej nie można znaleźć miejsca dla wyrazu *skrobia*, który po niejakiem zastanowieniu wyda się każdemu daleko mniej dziwnym od pokaleczonego *krochmalu*.

**Anatropus**, (mówiąc o załączkach) *wsteczno-zwrotny*; podobnie: *campylotropus*, krzywozwrotny; *orthotropus*, bezzwrotny. \*Przymiotniki te dlatego jedynie przepolszczyłem w ten sposób, iż tekst koniecznie tego wymagał; zresztą bowiem oddać je można daleko stosowniej przez wyrazy: *wsteczny*; *krzywy*, *prosty*.

#### **Androecium, samcównia.**

**Annus, doroczny.** — Wyraz ten używany przez Syreńskiego zasługuje na wskrzeszenie, oddaje bowiem rzecz wybornie.

**Anthera, pylnik** — Unikając wieloznaczności wyrazu *główka*, nazwałem pylnikiem część pręcika zawierającą pyłek, co mi się stosowniejszém zdawało od wyrazu *pyłkownia*, którego użył Wolfgang. Tym sposobem zastrzymać można nazwę *główki* na oznaczenie zgrubiałości korzeni: *tubera*, co rzeczywiście najzgodniejszém jest z mową pospolitą i pismami dawnych botaników naszych. Rodzaj kwiatostanu, zwany *capitulum* oddałem przez wyraz *kwiatogłówka*; pomimo tego jednak sądzę, że najmniejszego ztąd powstać nie może zamieszania, jeśli ktoś dla uniknięcia powtarzających się dźwięków, zamiast kwiaty ułożone w kwiatogłówkę, powie: kwiaty ułożone w główkę.

**Antheridium, wydętka.** Nie niema niedogodniejszego w słownictwie, jak nazwiska stanowiące w duchu jakiegobądź nieuzasadnionej teorii. Teoria zostaje obaloną, a przedmiot nosi wciąż w nazwisku piętno prawdziwie pierwo-

rodnego grzechu. Do tysięcy przysiadków należy wyraz *antheridium*, oznaczający pewne narzędzie roślin niższych, w którym stronniccy Linnenczowskię płciowości upatrywali pylnika, a o którym rzeczywiście wiemy tylko tyle, iż istnieje i z prawdziwymi pylnikami nic niema wspólnego. Narzędzie to nazwałem *wydełką*: może niezbyt szczęśliwie, lecz w każdym razie stosowniej i wygodniej, niż gdybym idąc za przykładem twórcy wyrazu *antheridium*, usiłował utworzyć dlań nazwisko przypominające mniemane pokrewieństwo z pylnikiem.

**Anthocarpus** (fructus), owoc kwiatowzrosły.

**Aplosporeae**, pojedynczo-zarodnikowe.

**Appendix**, przysadek (porówn. *Bractea*).

**Arthrosporeae**; członkozarodnikowe.

**Atrphia**, zamorzenie.

**Basidium** podstawa; *basidiosporeae* podstawkozarodnikowe.

**Bractea**, przykwiatek. Idąc za przykładem Andrzejowskiego, który *stipula* mianuje przylistkiem, nazwałem *Bractea* przykwiatkiem; zmieniając zaś rodzaj dawniejszego wyrazu: przysadka oznaczyłem nim wszelkie narzędzia lub części narzędzi dodatkowe (*appendix*), których przyrodzenia bliżej określić nie chcemy.

**Camptotropum** (*ovulum*), zalążek zgięty.

**Campylosporeae**, ślōtkozarodnikowe.

**Capitulum**, kwiatogłōwka.

**Cariopsis**, ziarnczak. Czerwiakowski nazywa *achenium* ziarnczakiem, *cariopsis* zaś ziarnem; lecz wyraz *ziarno* oznacza tak rozległe i tak ogólne a zarazem tak dogodne w użyciu pojęcie, iż w żaden sposób nie wypada się go zrękać na korzyść pojęcia tak szczerpłej sfery, jakie przedstawia owoc zwany *cariopsis*.

**Chalaza**, osadka.

**Choriza**, rozszczepka.

**Choristosporeae**, podzielnozarodnikowe.

**Columella**, da się zawsze dostatecznie oznaczyć przez *os*.

**Communicatio**, spólniczenie; *communicare*, spólniczyć (\*). Wprawdzie samo tylko organologiczne znaczenie słowa *communicare*, da się stosownie oddać przez: *spólniczyć*, jednakże to stanowi raczej zaletę niż wadę, gdyż na ścisłym rozdzielaniu pojęć język zyskuje.

**Cremocarpium**, wiszonki.

**Cyma**, wierzchnotka. Dopóki wyraz *cyma* oznaczał kwiatostan mający niejakie podobieństwo z baldaszkiem (*umbella*), dopóty można było zatrzymać dlań nazwisko *podbaldaszka*; lecz kiedy w skutek prac Rōpera, braci *Bravais* i t. d. *cyma* wzięta została za wzór kwiatostanów skończonych, kiedy tēm samēm odniesiono doń mnóstwo kwiatostanów zwanych dawniej kiściami (*panicula*), kłosem lub gronem, i t. p., wyraz *podbaldaszek* stał się zupełnie niezdatnym, dlatego zastąpiłem go wyrazem *wierzchnotka*, którego źródłosłów przypomina *os* wierzchołkową zakończoną w tych kwiatostanach kwiatem.

**Cystidium**, pęcherzówka.

**Cystosporeae**, pęcherzyko-zarodnikowe.

**Emarginatus**, wyszczerbiony.

**Endospermium** i *perispermium*, wnasienie i onasienie. Bez obu tych nazwisk obejść się dziś może wszelki wykład botaniki; tylko więc dla zrozumienia niektórych dawniejszych pism przepolszczyłem je dosłownie, podobnie jak *trophospermium*, *podospermium* i t. d.

(\*). Wyraz tēn, równie jak *liściak*, za *phyllodium*, i *pnącz*, za *liana*, winien jestem J.W. Wacławowi Łuszczewskiemu, który ich użył w udzielonym mi swym botanicznym rękopiśmie.

\* **Endostoma** i **exostoma**, otworek wewnętrżny i zewnętrżny.

**Episporium**, nazarodnik.

**Equitans**, okraczający; semiequitans współokraczający.

**Extorsus** i **introrsus**, obrócony i odwrócony.

**Fasciatio**, ztaśmienie.

**Flagellum**, bicz.

**Florescentia**, ukwitnienie. — Czerwiakowski nazywa ukwitnieniem kwiatostan (*inflorescentia*), lecz wyraz ukwitnienie oznacza raczej sam tylko porządek kwitnienia (*florescentia*), nie zaś sposób ułożenia osi kwiatowych (*inflorescentia*), co by się prędkiej może wyrazić dalo przez *ukwiatnienie*. Wołałem przeto utrzymać dawny wyraz kwiatostan w swém znaczeniu, odnosząc *ukwitnienie* do pojęcia powyżej określonego.

**Gynandria**, słupko - pylnikowe.

**Homodromus**, *heterodromus*, tożsrotny, innostronny.

**Homotropus**, wprostległy.

**Induplicativus**, *reduplicativus*, wewnątrz, zewnątrzdwojący.

**Indusium**, zasłonka.

**Isochiméne**, *isothére*, *isotherme*, linia równozimowa, równoletnia, równociepla.

**Legumen**, strąk. Dla jakichś niejasnych filologicznych skrupułów, wszyscy niemal nowsi botanicy nasi, przeważali owoc krzyżowych (*siliqua*) strąkiem, legumen zaś, wbrew powszechnemu użyciu w pospolitej mowie *lupiną*. Jeden tylko Andrzejowski zwrócił uwagę na całą niestosowność ztąd wynikającą, lecz przykład jego pozostał dotąd jakby niepostrzeżony. Wprawdzie wieśniak nasz nazywa owoc kapusty strączkiem, lecz to dlatego, że prócz wielkości nie widzi w nim zresztą żadnej uderzającej różnicy od owocu grochu; ale czy zgodziłby się kiedy na to, aby ten ostatni miał przestać nazywać strąkiem. Botanik znajdując ważne różnice pomiędzy rzeczonymi

owocami, musi wyszukać drugiej nazwy, lecz rozumić się, że nie dla owocu mitylkowych, jako roszczonego sobie per excellentiam prawo do wyrazu mowy pospolitej; tylko dla owocu krzyżowych. Mamyż go więc nazwać *lupiną*? Wprawdzie nie tylko jest dozwoloném, ale niekiedy prawie koniecznym wybierać wyrazy z mowy pospolitej i przez logiczne określenie sfery pojęć niemi oznaczonych, zamieniać je w nazwy naukowe. Lecz w działaniu tém należy postępować bardzo ostrożnie aby nie obrazić ducha języka. Widzimy przykład takiego nadużycia na wyrazie *lupina*. W mowie pospolitej slyszymy o lupinie ze strąków, z orzechów, z ziemniaków, korzeni, i t. p.; nazwać więc cały owoc lupiną, będzie to jedno, co nazwać owoce traw *otrębami*, dlatego, że tak zowiemy cząsteczki okrywy ziarna, odłączone od tegoż przypadkowo, to jest bez żadnych praw ustrojności przepisanych. Znowu tu więc musimy przyznać słusżność Andrzejowskiemu, który *siliqua* wykłada przez: *luszczyna*, wyraz częstokroć jednoznaczny z *lupiną*, lecz daleko rzadziej używany w mowie pospolitej, a tém samém nie tak rażący. Nie idzie jednak za tém, aby i wyraz *lupina* nie mógł znaleźć miejsca w języku naukowym; owszem bardzo nam będzie pomocnym, jeżeli nie gwałcąc już mowy pospolitej, określimy tylko znaczenie jego do części dających się oddzielać od siebie według tak nazwanych szwów. Tak właśnie zrobił Andrzejowski używszy go za łacińskie: *valva*.

**Lenticella**, *grudka*. Imię soczewek (*lenticellae*) jakkolwiek dawne, nie ma jednak żadnej zasady, gdyż kształt narzędzi tych najrzadziej jest soczewkowaty. Nazwałem je tu *grudkami*, któryto wyraz w różnych dziełach rozmaite nosząc znaczenia i w tém już przez niektórych botaników był używany, chociaż w sposób mało oznaczony, mówiąc bowiem *np.* o częściach rośliny „*grudkowatych*”, przytaczają

między innymi gałązki trzmieliny,  
it. p.

**Litana**, *pnącz.*

**Lignum**, *drewno.*

**Loculus**, (*antherae*), *woreczek;*  
*locellus*, *półworeczek.*

**Lycotropus** (*embryo*), *zarodek*  
*wędzidłowaty.*

**Micropyle**, *okienko.*

**Monochlamydeae**, *jednookry-*  
*wowe.*

**Mycelium**, *grzybnia.*

**Nodus**, *gruzelek.*

**Organismus**, *ustrój; organicus,*  
*ustrojowy; organisatus, ustrojny; organ-*  
*non, narzędzie.* Wyrazy te może  
najmniej potrzebnie umieścić w ni-  
niejszym słowniczku pomiędzy innymi,  
które albo zupełnie są nowe, albo wcale  
jeszcze nieurtarte, albowiem pisarze  
nowsi krakowscy dosyć je już upo-  
wszechnili. Uczyniłem to jedynie dla  
powiedzenia przy tej sposobności parę  
słów do tych, którym się zdaje, że od-  
szukiwanie w dawniej mowie wyrazów  
oznaczających pojęcia, jakie każdy,  
choćby cokolwiek tylko wykształcony  
naród sam sobie tworzyć musi, sprowa-  
dza zawiłkaniem w myśleniu i obciąża ty-  
ko niepotrzebnie język. Organ, mowią,  
jest organem, nie narzędziem, funkcya  
funkcya, a nie czynnością it. p.; lecz  
na tém się kończy całe ich dowodzenie.  
Czyliż dziecko, którego umysł zna do-  
piéro same przedmioty zmysłowe i które  
zaledwie zaczyna tworzyć sobie po-  
jęcia oderwane, prędzej zrozumie wy-  
raz *organ*, od wyrazu *narzędzie*, *or-*  
*ganizm* od *ustroju*? bynajmniej. Jed-  
en i drugi potrzeba mu wprzódy okre-  
ślić, lub objaśnić przykładami i dla-  
czegoż nielepiej uczynić to z wyrazem  
własnym a dokładnie rzecz samą odda-  
jącym? Jakimże sposobem zniknęły  
z mowy naszej owe affekta i respekta,  
regulamenty i autoramenty, i tyle set  
wyrazów obcych wprowadzonych do  
niej w czasie zepsucia smaku? Oto  
przez zastanawianie się nad nią, przez  
pokładanie logiczne roztrząsanie owych

pojęć i odszukanie w dawnych pismach  
wyrazów im odpowiadających. A cho-  
ciaż są i z postepem czasu zawsze po-  
wstawać muszą nowe pojęcia, dla któ-  
rych nie mamy jeszcze gotowych naz-  
wisk, to przecież nie powazy się nikt  
twierdzić, aby język nasz nie miał do-  
syć źródłosłów, z którychby je wy-  
prowadzić można.

**Orthospermeae**, *plaskozziarnowe.*  
**Ovarium**, *zawiązek.* Zpomie-

dzy wyrazów użytych na oddanie tego  
narzędzia roślinnego, *zarodek i zalążek*  
znalazły już stosowniejsze daleko miej-  
sce; *jajecznik i jajnik*, są dokładnym  
wprawdzie tłumaczeniem łacińskiego  
*ovarium*, lecz równie jak to błędem,  
młody bowiem zaród nasienia (*ovulum*),  
nie ma najmniejszego podobieństwa  
z jajem zwierzęcym. Dziwna rzecz,  
że Czerwiakowski który uczuł całą nie-  
stosowność nazwiska *jajka roślinnego*,  
radzi jednak nazywać *ovarium: jajni-*  
*kiem*. Wszystkoto jednak nie może  
iść w porównanie z pociesną nazwą  
*guzika owocowego*, przerobioną z nie-  
mieckiego: *Fruchtknoten*. A wszakże  
narzędzie, o którym mowa, ze względu  
ważności swęj i samego już położenia,  
znane jest nie tylko nie botanikom z po-  
wołania, ale nawet wieśniakom naszym  
i to pod nazwiskiem *zawiązka*. Nie  
potrzebujemy nawet ani zmniejszać ani  
powiększać sfery tego pojęcia, tylko  
żywcem, jak mówią przenieść ten wy-  
raz z mowy pospolitej do naukowej.  
Rozumię się iż tym sposobem wyrazy:  
*hypogynus, perigynus, epigynus* i t. p.  
oddane być muszą przez: *podzawiązko-*  
*wy, kołozawiązkowy, nazawiązkowy*  
it. p.

**Perigonium**, *orośnia.*

**Perispermium**, *bielmo.* Wy-  
raz białko, dotąd najpowszechniej uży-  
wany, nie może się utrzymać raz dlate-  
go, iż przypomina część jaja zwierzęce-  
go, drugi raz dlatego, iż oznacza jeden  
z pierwiastków roślinnych. Gdy zaś  
z drugiej strony nazwisko obojętne, to-  
jest obce wszelkiej teoryi największa

przedstawia dogodność w użyciu, przeto oddałem *perispermium* przezbielmo, wyraz, brany w niektórych znaczeniach za jedno z białkiem.

**Perisporium, kolozarodnik.**

**Phyllodium, liściak.**

**Phyton, roślin.**

**Placentarium, łożyszcznia; placentatio, ułożyszcznienie.**

**Plumula, rostek.** W tém znaczeniu używa Jundziłł wyrazu *rostek*, kielkiem zaś mianuje *rostellum*. Przeciwnie czynią inni botanicy, czego przyczyny trudno się jest domyśleć. Wprawdzie w mowie pospolitej kielkiem nazywamy przy wschodzeniu w trawach część wyrastającą później w łodygę, w innych zaś roślinach, część obracającą się w korzeń, a lubo wątpić nawet nie można, iż właśnie ta część, ze względu na kształt swój dała głównie powód do powyższego nazwania, jednakże dosyćby jeszcze obojętną było rzeczą, która z dwóch owych części zarodka otrzymałaby imię kielka gdyby drugiej z nich nie nazwano *rostkiem*. Wyraz bowiem *rostek* znaczy w dawnym języku toż samo, co młoda latorośl, a zatem i w naukowej mowie odniesiony do części zarodka nie może być użytym w znaczeniu korzonka, ale tylko łodyżki.

**Podospermium, ziarnostopka.**

**Polygamia, wielożenne.**

**Pyxidium, kubczak.**

**Régime, rosochatka.**

**Replum, oddzierka.**

**Rhizoma, korzeniak.**

**Rudimentum, zamorek, ślad.**

**Ruminatus, pomarszczony.**

**Sève, oskolnica.** Wyraz ten używanym jest w wielu okolicach na oznaczenie soku wiosennego drzew; jest zaś stosowniejszym od wyrazu *oskole*, który w książkach brany bywa w témże znaczeniu, a który rzeczywiście oznacza porę wstępowania soków, i dlatego dawniej mówiono *oskole* zamiast wiosna.

**Spadix, bulawka.**

**Spira, wężownica.** W naukach przyrodzonych napotyknąmy wiele pojęć, które lubo oznaczone są wyrazami pożyczonemi od innych nauk, nie dozwalają jednak tak ścisłego określenia swojej sfery, jak w tych ostatnich. Najdobitniejszy może przykład przedstawia nam pojęcie oddane przez wyraz *spira*. Raz znaczy on w botanice linią zwiniełą na płaszczyźnie, tak, iż skręty jej są od siebie równoodległe; drugi raz takąż linią o skrętach coraz bardziej się oddalających; dalej znów linią o skrętach leżących na różnych płaszczyznach ponad sobą wzniesionych, obwiniełą na walec lub ostrokregu, na koniec powierzchnią ciała jakiego, zachowującego jeden z wymienionych kierunków. Nie jesto więc ściśle matematyczne pojęcie, a jednak w naukach przyrodzonych jest nadzwyczaj dogodnym i koniecznym, i nie da się w języku naszym oddać przez *śruba*, *śrubowaty*, *okręcony* i t. p. a tém mniej przez *grajcarkowaty* (!), jak to dotąd czyniono. Najstosowniejszym zdał mi się wyraz *wężownica*, który u Solskiego znaczył linią zwaną dziś *zwiniełą Archimedes*a, a oprócz tego oznacza w technologii naczynie złożone z rury skręconej w walec. Łatwo od niego wyprowadzić się dają przymiotniki: *wężownicowy*, *wężownicowaty*, któremi wyrazić można wszystkie stosunki owego pojęcia. Odróżnić tylko należy linią wężownicową od *wężykowatej*, to jest falistej, co wszakże żadnego zamieszania sprawić nie może.

**Sporadicus, wielosiedziwny.**

**Statio, stanowisko; habitatio, mieszkanie.** Dokładniej byłoby może mieszkanie *topograficzne* i *jeograficzne* lecz niedogodność nazwy dwuwyrazowej przemawia za pierwszemi.

**Stoma, szparka.**

**Stromatosporeae, pokładko-zarodnikowe.**

**Synsporeae, łączno-zarodnikowe.**

**Tegmen, obłoczka.**

**Testa, skórka.**

**Trichosporaeae, włosko-zarodnikowe.**

**Trioccia, rozrzucono-ściowa.**

**Trophospermium, ziarnożyw.**

**Tubus pollinicus, łagiewka,** może lepiej niż *mieszeczek*, albowiem wyraz miech, stracił dziś jedno ze swych dawniejszych znaczeń i budzi wcale obce przedmiotowi pojęcie. Ła-

giewką nazywano naczynie skórzane, wązkie a długie, używane do przenoszenia napojów; odpowiada ono dosyć dokładnie niemieckiemu *Schlauch* i dlatego oznaczyłem nim woreczki pyłkowe.

**Valva, lupina.**

**Vegetabile, rośl.**

**Zoosporaeae, zwierzo-zarodnikowe.**

Z kolei umieszczam spis nazwisk polskich nadanych przemnie roślinom. Nie będę tu wchodził w obszernie wywody potrzeby lub korzyści tworzenia takowych nazwisk, powiem tylko, że jak dziadowie nasi mieli niegdyś prawo nadawać imiona ziołom lub drzewom, których własności poznawali, lub które w jakikolwiek sposób na ich uwagę zasługiwały, nie troszcząc się bynajmniej o to, czy też same rośliny miały już swe nazwiska u Teofrasta, Pliniusza, lub gdziekolwiekindziej, tak i my dzisiaj, możemy tworzyć sobie własne wyrazy, o ile nam poznawanie nowych roślin wskazuje tego potrzebę. Komuby zaś nazwiska te zdawać się mogły za twarde i mniej dogodnie w użyciu, niż cudzoziemskie, ten niechaj spróbuje, jakby mu składnie było mówić we własnym języku o *Kalikodafnach, Ahowajach, Trikspermach, Synzyganterach, Schistostegach, Schizandrach* i t. p.

W tworzeniu następujących nazwisk trzymałem się ogólnych prawideł, w przedmiocie tym za stosowne uznanych, a zatem mając na względzie albo kształt jakowej części roślin, albo podobieństwo z innymi, albo zwyczaj i mniemanie, jakie krajowcy o nich mają, albo własności i t. p. (\*)

(\*) Wspomnieć tu muszę, iż dlatego polskie nazwiska rodzin kończą na *ate* (łacińskie: *aceae*), plemion zaś na *owe* (łacińskie *eae*), że właśnie zakończenia te najlepiej określają stosunek, w jakim rośliny jednych i drugich stoją względem siebie. Rodzaje jednej rodziny nie mają częstokroć żadnego uderzającego podobieństwa pomiędzy sobą i połączone są daleko mniejszą liczbą pięt niż rodzaje jednego plemienia, a właśnie takie stopniowanie podobieństwa wyrażają zakończenia *aty, owy*, w naszym języku. Wyjątek od tego muszą rozumieć się stanowić rodziny, biorące nazwiska nie od rodzajów, ale od kształtu korony, kwiatostanu i t. p., te bowiem ze względu na znaczenie zakończenia *owy* muszą utrzymać koniecznie. Zakończenia *sze, cze, szcze*, nadawane przez Czerniackowskiego plemionom, stosowniejsze są dla podrodzajów, oznaczają bowiem bardzo już ścisły związek pomiędzy przedmiotami, którym są dodane.

Achras  
Alanc  
Anaca  
Apost  
Ather  
Balan  
Barri  
Bassia  
Bauer  
Bauh  
Bomb  
Borbo  
Brom  
Bruni  
Buple  
Burm  
Bytt  
Cabor  
Cactu  
Calye  
Cariss  
Catha  
Cedre  
Celas  
Cepha  
Chail  
Cham  
Chan  
Chry  
Coba  
Cole  
Comi  
Cuno  
Cycla  
Cyrta  
Dille  
Dipte  
Drys  
Drim  
Ehre  
Eleoc  
Epac  
Eryth  
Esea  
Euph  
Exos  
Fico  
Fran  
Garr

**Achras, pigwica.**  
**Alangium, wyrzeczka.**  
**Anacardium, nerkowiec.**  
**Apostasia, wydziwek.**  
**Atherospermum, oboczek.**  
**Balanophora, galecznica.**  
**Barringtonia, pojawka.**  
**Bassia, maslosz.**  
**Bauera, niemarzanka.**  
**Bauhinia, nadwój.**  
**Bombax, sérecznik.**  
**Borbonia, tarniwoń.**  
**Bromelia, zapylec.**  
**Brunia, pogłowiczka.**  
**Bupleurum, przewiertnik.**  
**Burmannia, trójśeniec.**  
**Byttneria, różnolist.**  
**Cabomba, pływec.**  
**Cactus, cierniec.**  
**Calycera, pokoliczka.**  
**Carissa, szeregota.**  
**Catha, czuwaliczka.**  
**Cedrela, cedrzeniec.**  
**Celastrus, zimosz.**  
**Cephaëlis, skupiętka.**  
**Chaillertia, przyrośla.**  
**Chamaelaucium, przecięźnik.**  
**Chamaerops, karlatka.**  
**Chrysobalaus, złotomięś.**  
**Cobaea, sepota.**  
**Coleus, pochwiatka.**  
**Combretum, trudziczka.**  
**Cunonia, radziszek.**  
**Cyclanthus, okolnica.**  
**Cyrtandra, skrzęliczka.**  
**Dillenia, ukęśla.**  
**Dipterocarpus, dwuskrzydła.**  
**Dryas, dębik.**  
**Drimys, zacierp.**  
**Ehretia, skromnolka.**  
**Eleocarpus, postrzępa.**  
**Epyaxis, szczylnica.**  
**Erythroxylon, krasnosok.**  
**Escallonia, twardziczka.**  
**Euphoria, żyznica.**  
**Exostemma, obwieńcz.**  
**Ficoideae, soczystokowale.**  
**Frankoa, oziębla.**  
**Garrya, kotecznik.**

**Gesneria, łękolka.**  
**Gillesia, ubogła.**  
**Glycine, słodzik.**  
**Goodenia, nastłodka.**  
**Gunnera, wyskoczek.**  
**Haemodorum, zakrwawka.**  
**Haloragis, węgłosz.**  
**Homalium, umiarek.**  
**Hovenia, szypulotka.**  
**Humirium, morzylis.**  
**Hydrolea, przylepnia.**  
**Hydrophyllum, dziesiętka.**  
**Hypoxis, przyklek.**  
**Jungermannia, sprężyca.**  
**Lardizabala, krepień.**  
**Leptospermum, maticzka.**  
**Logania, połata.**  
**Malesherbia, zaziolek.**  
**Malpighia, nagwiadzka.**  
**Maregravia, najgrawnik.**  
**Marsilea, zeczwórnik.**  
**Melanthium, czernilec.**  
**Melastoma, zaczern.**  
**Monimia, poleniec.**  
**Moringa, stradalka.**  
**Myrobalanus, kończalka.**  
**Nelumbium, bogorośl.**  
**Nicandra, wzdętka.**  
**Nyctago, nocnica.**  
**Orentium, smoczek.**  
**Pandanus, pochutnik.**  
**Pittosporum, pospornica.**  
**Podostemon, zasennik.**  
**Potalia, gorzysko.**  
**Rafflesia, wieszczyniec.**  
**Rhizobolus, grubokla.**  
**Riccia, wglębka.**  
**Samyda, brzozowiec.**  
**Saururus, wąłkłoszek.**  
**Sauvagesia, wieloplonka.**  
**Scavola, okoczysł.**  
**Scleria, kościł.**  
**Simaruba, bieguncznik.**  
**Sphaenoclea, klinica.**  
**Spondias, sliwiec.**  
**Stackhousia, zastalka.**  
**Stapelia, brudnota.**  
**Stilago, przepotek.**  
**Stylidium, ślupiętka. \*\***

**Symphoricarpus**, śniegiczka.  
**Ternstroemia**, cistrzonka.  
**Tremandra**, wytrzymnik.  
**Trichillia**, trójnalka.  
**Turnera**, niżawka.

**Vaucheria**, zrostnica.  
**Vernonia**, sileniec.  
**Villarsia**, grzybieńczyk.  
**Vochysia**, otulek.



§ 1  
 śluy.  
 W  
 logji,  
 rzą; ;  
 ogólne  
 niu sa  
 re się  
 jestes  
 csuja  
 ny ni  
 ki; w  
 i be  
 D  
 wa z  
 pocz  
 dyge  
 każd  
 wie n  
 z wie  
 Jes  
 człon  
 podzi  
 sze,  
 dadze  
 biera  
 gana  
 twor  
 udzia  
 nośc  
 comp

## WYKŁAD POCZĄTKOWY

# BOTANIKI.

§ 1. Botanika jest umiejętnością, której przedmiotem są rośliny.

W wiadomościach wstępnych, umieszczonych na czele Zoologii, wymieniono główne piętna, odróżniające rośliny od zwierząt; a z porównania ich między sobą wyprowadzono określenie ogólne jednych i drugich. Tu ograniczymy się na przywiedzeniu samego tylko określenia: *Zwierzęta są to jestestwa, które się żywią, rozmnażają, czują i poruszają. Rośliny są jestestwa, które się żywią i mogą rozmnażać, lecz które ani czują, ani się dowolnie poruszają.* Określenie ściśléjsze rośliny nie mogłoby być dobrze zrozumianém na początku téj książki; wyniknie ono ze wszystkich wiadomości w niej wyłożonych i będzie niejako ich wnioskiem.

Do wyrazu roślina, przywiązujemy zwykle wyobrażenie drzewa lub ziela; pospolite to pójęcie, dostateczném jest dla nas na początku niniejszego wykładu. Roślina ma zwykle korzenie, łodygę i gałęzie, liście, kwiaty, potem owoce i nasiona. Tyle więc każdy, a ktokolwiek przypatrywał się roślinom nieco bliżej, wie nadto, że takowe części, np. kwiaty, składają się znowu z wielu części mniejszych.

Jeśli z kolei i te rozbierzemy, jeśli następnie w szeregu rozczłonkowań coraz bardziej szczegółowych, będziemy usiłowali podzielić części wprzód otrzymane, na cząsteczki jeszcze mniejsze, natrafimy nakoniec na takie, które się dalej podzielić nie dadzą, i te uważać musimy za pierwiastki ciał, któreśmy rozbierali. Pierwiastki te noszą nazwisko *narzędzi prostych* (organa elementaria), części zaś powstające z ich połączenia, tworzące same przez się całość dokładnie określoną i biorące udział w pełnieniu jakiego działania żywotnego, jakiej *czynności* (functio), nazywają się *narzędziami złożonemi* (organa composita).

## NARZĘDZIA PROSTE.

§ 2. Narzędzia proste, ten ostatni kres naszego rozbioru, nie są ostatecznie i bezwzględnie prostymi, ponieważ umysł nasz nie może pojąć ciała bez części. Musimy się więc zatrzymać na granicy, poza którą zmysły nasze wsparte wszelkimi środkami, jakich tylko nauki dostarczyć mogą, nie dają nam poznać nic wyraźnego, ani pewnego, — poza którą zaczyna się pole przypuszczeń. Granica ta posuniętą już została dosyć daleko przez udoskonalenie sposobów postępowania w postrzeganiu i ulepszenie narzędzi do tego celu służących, nadewszystko zaś mikroskopów <sup>(1)</sup>.

Jeśli za ich pomocą badamy jakąkolwiek część roślinną, postrzegamy, że ostatni stopień podziału do jakiegośmy doszli, przedstawia nam mnóstwo wydrżeń różnych co do kształtu i wielkości. Jedne są ograniczone ścianą właściwą, na podobieństwo woreczka; inne są tylko odstępami pierwszych, próżniami, które woreczki owe, umieszczone jeden przy drugim, tworzą wszędzie, gdzie ich ściany nie stykają się z sobą bezpośrednio.

Woreczki, czyli wydrżenia opatrzone ścianami właściwymi, dają się pod względem kształtu sprowadzić do trzech głównych odmian. Jużto rozciągają się prawie we wszystkich kierunkach równo, a przynajmniej nie ma kierunku, w którymby się więcej niż w innym przedłużyć mogły. Woreczki mające taką postać, nazywają się *komórkami* czyli *pęcherzykami* (*cellulae v. utriculi*) (fig. 1).

Żułto przedłużają się szczególniej w jednym kierunku, tak, że ich średnica podłużna wyrównywa kilka razy wziętej średnicy poprzecznej: wtedy zwykle są na obu końcach zwężone; jeśli są krótkie, mają prawie postać wrzeciona, co spowodowało Du-



Fig. 1.

(1) Bez pomocy mikroskopu, części, któremi się zajmujemy, nie mogą być dobrze widziane, i w rzeczy samej żalować przychodzi, że pierwsze wiadomości tu wykładane, nie mogą być naocznie przez uczących się sprawdzonymi. Dlatego potrzebaby, ażeby nauczyciel, sam oswojony z użyciem narzędzi i przyrządzaniem tkanek, pokazywał im pod mikroskopem główniejsze odmiany takowych i objaśniał, co tym sposobem widzą. W tym celu przykłady brane tu są ile możliwości z pospolitych i łatwych do dostania roślin.

troche  
są dła  
zaostr  
kszej  
wają  
im imi  
Nak  
dingie  
dalone  
widzia  
niama  
Po  
komó  
bardz  
że no  
przech  
kiego  
samym  
my ten  
jakie

§  
dy si  
jąc w  
(fig. 8)

lub eli  
tykają  
zetkn  
czyli

troche'a do nazwania ich *wrzecionami* (clostres) (fig. 2). Jeśli są długie, tworzą rurki śpiczasto na obu końcach zaostrzone. Ponieważ te ostatnie tworzą po największej części drewno i w takim razie nazywane bywają zwykle włóknami drzewnymi, przeto nadamy im imię rodzajowe *włókien* (fibrae) (fig. 3).

Nakoniec woreczki mogą mieć postać rurek tak długich, że oba ich końce są bardzo od siebie oddalone i że na raz, jeden tylko na polu mikroskopu widzianym być może. Wtedy nazywają się *naczyniami* (vasa) (fig. 4).


Pomiędzy temi trzema stopniami, to jest pomiędzy komórkami, włóknami i naczyniami, nie ma granic bardzo wyraźnych. Włókna mogą być tak skrócone, że noszą nazwę komórek, lub tak wydłużone, że przechodzą w naczynia; lecz przejścia te nie zrzadzają wielkiego zamieszania, zawsze bowiem mamy do czynienia z tym samym rodzajem narzędzi, różnie tylko odmienionych. Przejdźmy teraz do kolejnego badania kształtów i odmian podrzędnych, jakie każdy z nich przedstawia.



2. 3. 4.

## PĘCHERZYKI CZYLI KOMÓRKI.

§ 3. Kiedy komórki nie są ściśnięte jedne przez drugie, kiedy się rozwijają równo w całym swym obwodzie, nie znajdując w żadnym kierunku przeszkody, któraby je wstrzymywała (fig. 8), powierzchnia ich jest krzywą, a kształt kulistym (fig. 5),



7.

8.


5.

6.

lub eliptycznym (fig. 6). Kiedy przeciwnie rozwijając się, napotykać i cisną się wzajemnie, powierzchnie płaszczą się przez zetknięcie i pęcherzyki przybierają postać bryły o wielu kątach, czyli wielościanu (fig. 7). Wtedy to właśnie przypominają one

komórki wosku w ulach (fig. 14 i 15), zkąd téż nadano im nazwę komórek, która teraz używana jest zarówno z nazwą pęcherzyków. Tkanka wynikająca z ich połączenia, oznaczoną bywa imieniem złożoném tkanki pęcherzykowej lub komórkowej, albo tylko pojedynczym wyrazem *miękiśz* (parenchyma). Niektórzy pisarze radzą zachować to imię dla tkanki ściśnionej, której komórki są kątowate, albo wielościenne (fig. 7), a nazywać *tkanką kulistą* (merenchyma) tkankę wietką, utworzoną z komórek kulistych, lub eliptycznych (fig. 8).

Najpospolitsze kształty komórek wielościennych, są następujące: 1) sześciian czyli kostka (fig. 9); 2) graniastosłup czworokątny, którego wysokość przechodzi inne wymiary (fig. 10); 3) kształt tabliczkowaty, to jest kształt graniastosłupa; którego wysokość nie wyrównywa innym wymiarom (fig. 11); 4) dwunastościan (fig. 12 i 13). Nie widząc nawet komórek



oddzielonych, można do pewnego stopnia odgadnąć ich kształt, porównywając przecięcia poziome i pionowe tkanki. Nie ma potrzeby objaśniać, jakim sposobem komórki sześciienne, przecięte czyto pionowo czy poziomo, dają zawsze czworoboki równe; jakim sposobem dwunastościan (fig. 12 i 13) daje w jednym kierunku czworobok, a w drugim sześciobok (fig. 12 i 15), i t. d.; i t. d.?


Nie trzeba jednak sądzić, że postacie te posiadają ściśłą kształtność figur geometrycznych, z którymi je porównujemy. W ogólności wiele do tego niedostaje. Kąty bywają stępione, boki jednego czworoboku bywają niezupełnie równe, linje nie-

zupełnie proste. Znaczna część figur dołączanych dawniej przy anatomjach roślinnych, jest niedokładną dlatego, że przedstawia kształtność, jakiej nie ma w przyrodzie.

Komórki mogą przeto mieć z jednej strony powierzchnią krzywą, a być z drugiej spłaszczeniemi. Odmiana ta może być połączona z kształtnością, np. w postaci odłomku walca (fig. 16 *a*), beczki (*b*).

Nakoniec, mogą być gałęziste, to jest przedłużać się odrazu na wielu miejscach swęj powierzchnii w rozmaitych kierunkach. Wtedy zwykle dotykają się wzajemnie końcami przedłużeń i są najczęściej niekształtnemi (fig. 17). Jednakże może i pewna kształtność towarzyszyć téj odmianie; tak np. czasami komórki przybierają postać gwiazdek, ułomków słupa żłobkowego, i t. d.

§ 4. Rozumie się, że w tkankach ściśniętych, gdzie komórki zachodzą szczelnie jedne między drugie, dotykając się powierzchniami płaskimi, nie może między niemi zostawać miejsce próżnych (fig. 7 i 19). Przeciwnie, w tkankach wietkich, gdzie



powierzchnie krzywe komórek stykają się tylko na niewielu punktach, muszą między niemi pozostawać przestwory mniej lub więcej rozległe (fig. 8 i 18 *m*), które się nazywają *przestworami międzykomórkowemi* (ductus, meatus intercellulares). Znajdują się one w większej liczbie tkanek, gdyż z powodu owęj

17. Komórki gałęziste wzięte z bobu (*Vicia faba*). — *ll* Przerwy.

18. Tkanka komórkowa wietka czyli kulista, wzięta z młodego liścia rojniku zwyczajnego (*Sempervivum tectorum*). — *m* Przestwory międzykomórkowe.

19. Tkanka komórkowa ze rdzenia bzu pospolitego (*Sambucus nigra*). Komórki są kropkowane, tak jak na figurze poprzedzającej.

małej niekształtności, która jakeśmy widzieli jest powszechną, zetknięcie części nie jest zupełnem; przestwory jednak tém są mniejsze, im tkanka jest bardziej ściśnioną.

Pomiędzy komórkami gałęzistymi, które się dotykają końcami przedłużeń wychodzących ze wspólnego środka, przestwory są daleko większe, i w tym razie zowią się *przerwami* (lacu-



20.

nae) (fig. 17 *ll*). Wyrazem tym oznaczają się w ogóle wszelkie przestwory dosyć znaczne, zamknięte wielu komórkami i nie mające ścian innych, nad ściany komórek otaczających. Przerwy przedstawiają często wielką kształtność, czyto uważane same przez się, czy też w stosunku położenia jednych względem drugich (fig. 20).

§ 5. Komórki mogą być ułożone bez widocznego porządku jedne względem drugich, nadewszystko wtedy, kiedy są niekształtne i nierówne. Kiedy zaś są kształtne i równe, wtedy w uszykowaniu ich daje się postrzegać pewną kształtność, i często widzimy je ułożone jedne za drugimi w rzędy proste, czyto w kierunku poziomym, czy w pionowym. Wtedy komórki



21.



22.

dwóch sąsiednich rzędów stykających się z sobą, mogą być albo naprzeciwległe, to jest położone w jednej wysokości (fig. 21), albo naprzemianległe, to jest położone w różnych wysokościach, tak, że środki komórek jednego rzędu odpowiadają mniej więcej końcom komórek rzędów sąsiednich (fig. 22). Ten ostatni rodzaj uszykowania, musi prawie koniecznie

mieć miejsce tam, gdzie komórki są szersze w środku niż na końcach, np. przy kształcie dwunastościennym (fig. 14 i 15).

§ 6. Ściany komórek nie zawsze jednakowo wyglądają. Już to zdają się być utworzonymi przez błonę gładką i zupełnie jednostajną (fig. 5, 6); już też błona ta przedstawia większą, lub mniejszą ilość kropeczek (fig. 23), lub krótkich kręsek w kierunku poprzecznym, albo ukośnym (fig. 24); już nakoniec zdaje się być w pewnych przedziałach podwojoną przez małe nitki lub wstążeczki. Nitki opisują pospolicie wężownicę o skrętach mniej lub bardziej do siebie zbliżonych, w całej długości komórki (fig. 25). Wstążeczki biorą także kierunek wężownicy,

22. Przerwy w tkance jaskru wodnego (*Ranunculus aquatilis*).

lub dzi  
albo tés  
o oczk

że ta n  
mórek  
w któ  
postaci  
aby by  
rów i :

Bad.  
czynam  
utworz  
ną, kt  
je pow  
kształ  
powie  
w inn  
kształ  
nie p  
go, że  
nego,  
seach  
i zład  
wierzc  
ciągani  
kropki  
najczę  
w prze  
niejak

23 i  
litego.  
25, 2  
z tkank

lub dzielą się na wiele pierścieni prawie poziomych (fig. 26), albo też wreszcie tworzą na powierzchni komórki rodzaj siatki o oczkach mniejszych lub większych (fig. 27). Przekonano się,



że ta różna powierzchowność nie znamionuje stale różnych komórek, gdyż jedna i taż sama komórka może według czasu w którym się ją bada, przedstawiać kolejno kilka takowych postaci. Potrzeba więc śledzić bacznie rozwijanie się komórek, aby być w stanie zdania sobie sprawy z tych rozmaitych pozorów i z przyczyny która je spowoduje.

Badanie takie naucza nas, że komórka w chwili kiedy ją zaczynamy odróżniać jako narzędzie oddzielne, jest woreczkiem utworzonym przez błonę pojedynczą, nieprzerwaną i jednostajną, która z początku miękka i wilgotna, zsycha się i twardnieje powoli. Może ona pozostać w tym stanie, zamieniając tylko kształt i objętość; lecz w innych razach, na całej wewnętrznej powierzchni woreczka, tworzy się druga błona. Ta rozwija się w inny sposób jak pierwsza, gdyż zamiast rozciągać się nakształt obicia nieprzerwanego i dokładnie odpowiadającego błonie pierwotnej, rozdziela się na wielu miejscach, może dlatego, że wewnętrzny pęcherzyk, nowszy i miękniejszy od zewnętrznego, nie może mu w rozwijaniu się wydażyć. Na takich miejscach woreczek pierwszy nie jest podwojonym przez drugi, i ztąd owa nierówność grubości na rozmaitych punktach powierzchni. Można by przypuścić, że błona wewnętrzna tak rozciągana, rozdziela się na licznych punktach, tworząc przez to kropki, jakie na wielu komórkach postrzegać się dają. Lecz najczęściej zadziwiająca prawidłowość zdaje się panować w przerywaniu się pokrywy wewnętrznej, która rozpada się niejako w nitkę lub wstążeczkę wężownicowatą od spodu do

23 i 24. Komórki kropkowane i króskowane, wzięte z tkanki bzu pospolitego.

25, 26 i 27. Komórki wężownicowe, pierścieniowe i siatkowate, wzięte z tkanki jemioli zwyczajnej (*Viscum album*).

wierzchołka komórki. Jeśli skręty wężownicy są znacznie od siebie oddalone, otrzymujemy dwa paski wężownicowate równoległe od siebie; jeden, gdzie błona zewnętrzna podwojona jest przez wewnętrzną, drugi, gdzie tamta pozostaje nagą. Jeśli skręty stykają się dokładnie, przedziały między niemi są zaledwie odznaczone prążką nadzwyczajnie cienką, lub nawet nie dającą się spostrzedz. Lecz często skręty te oddalają się nieco od siebie w pewnych przestrzeniach, zostawiając błonę zewnętrzną nagą w miejscach, które oku naszemu wydają się zaledwie jako kropki, lub krótkie kréski. Być może, że ztąd pochodzi owa kształtność i kierunek, jaki często spostrzegamy w kropkach i kréskach, któremi cała komórka jest pokryta. Wstążeczki pierścieniowate lub siatkowate, zdają się dozwalać podobnego objaśnienia, które zachowujemy do opisu naczyń, gdzie zjawisko to stanie się mniej ciemném, z powodu, że je będziemy mogli postrzegać na większą stopę.

Grubość ścian komórki może się coraz bardziej powiększać przez utworzenie się woreczka trzeciego wewnątrz drugiego, czwartego wewnątrz trzeciego, i tak następnie. Jeśli się zdarzy, że trzeci nie tworzy się zupełnie na wzór drugiego, lecz wyścięła owe przestwory, w których tamten zostawił błonę pierwotną obnażoną, wtedy oczywiście ukaże się w tych przestworach, a pozostanie niewidzialnym we wszystkich innych miejscach, gdzie wspomniona błona jest podwojona. Niektórzy pisarze objaśniają tym sposobem odmianę, pod pewnym względem bardzo zagmatwaną, powierzchowności niektórych komórek, np. tych, w których oczka siatki są kropkowane: w tym razie siatka należałaby do błony powtórnéj, kropki zaś do trzeciej z rzędu.

Lecz zwykła błona powtórna służy za wzór tym, które się następnie na wewnątrz tworzą. Te ostatnie towarzyszą jój we wszystkich zarysach, i przerywają się w tychże samych miejscach co ona. Można się o tém przekonać na przecięciach poprzecznych (fig. 28), lub podłużnych (fig. 29) komórek złożonych z pewnej liczby warstw na sobie leżących. W takim razie widzimy do-



28.



29.

28. Przecięcie poprzeczne komórek wziętych z mięsiva gruszki.

29. Przecięcie podłużne tychże.

kładn  
wną  
warst  
male  
nej i  
jasną  
ich sl  
rzyły

§  
góły  
mied  
kove  
sam p

W  
ka w  
dzo z  
i któ  
pod m

T  
zyw  
z w  
wys  
mus

w k  
leżąc  
ki w  
plasz

bulae  
sita  
Se  
twor  
kto  
grub  
jedn  
wól

kładnie liczne okręgi współśrodkowe, około wydrążenia wewnątrz leżącego, które tém jest mniejsze, im liczniejsze są warstwy powtórne. Z tego wydrążenia wychodzą poprzecznie małe *jamki* (foveolæ), kończące się dopiero na błonie zewnętrznej i odpowiadające przerwaniu błon powtórnych. Rzeczą jest jasną, że jeżeli błony nie układały się jedne na wzór drugich, ich skręty nie będą sobie odpowiadać tak, aby przez to utworzyły jamki jednociągłe.


## W Ł Ó K N A.

§ 7. Mówiąc o włóknach, nie będziemy się wdawali w szczegóły, któreśmy rozbięrali przy komórkach, ponieważ różnica między niemi, zachodzi tylko co do postaci; a z powodu jednakowego rozwijania się, powierzchnia włókien musi mieć taki sam pozór, jak i powierzchnia komórek.

Widzieliśmy już, że długość włókien jest rozmaita: niewielka w jednych, które się zbliżają do komórek podłużnych, bardzo znaczna w innych, które się zbliżają do naczyń i które często umieszczane bywały razem z niemi pod nazwiskiem *naczyń włóknistych*.

Tkanka powstająca z połączenia włókien, nazywa się *tkanką włóknistą* (prosenchyma). Te z włókien, które są umieszczone prawie w jednej wysokości, dotykają się bokami, lecz na końcach muszą zostawiać między sobą przedziały wolne, w które wchodzą końce włókien pod i nad niemi leżących (fig. 30). W miększym przeciwnie, komórki wyższe i niższe położone są jedne na drugich płaszczyznami (fig. 19, 21) je ograniczającemi (*cellulae parenchymatis sibi extremitatibus oppositae sunt, prosenchymatis appositae*).

Ściany włókien, w ogóle grube i dosyć twarde, tworzą zrazu błona pojedyncza i nieprzerwana, która może sama przez się nabyć pewnego stopnia grubości. Lecz zwykle liczne warstwy tworzą się jedne po drugich od zewnątrz ku wewnątrz, tak, że włókno, którego oś wydrążona zacięra się coraz



30.

30. Włókna wzięte z powojnika zwyczajnego (*Clematis vitalba*).


bardziej i prawie niknie, może się wydać pełnym, czyli dokładnie bryłowatym.

Ząd pochodzi, że przecięcie tkanki włóknistej przedstawia ciało zwykle zbite, w którym części pełne daleko większą zajmują przestrzeń, niż miejsca próżne; najobszerniejsze nawet wydrażenie wewnętrzne włókien jest tylko kanałem podłużnym i wązkim, powierzchnie zaś ich zewnętrzne stykają się z sobą tak szczelnie, że prawie wcale nie zostawiają przestrzeni międzykomórkowych. Drugim skutkiem tego obocznego ułożenia, jest spłaszczenie brzołów stykających się, tak, że włókno wewnątrz obłe, od zewnątrz przybiera postać graniastostłupa. Widzieć to można wyraźnie na przecięciu poprzecznym tkanki włóknistej ostatecznie wykształconej (fig. 31).



31.

Powiedzieliśmy już, że rozwijanie się włókien jest takie samo, jak rozwijanie się komórek. Od wzrostu pęcherzyka pierwotnego czyli błony zewnętrznej, zależy ich długość i szerokość; od tworzenia się późniejszego warstw wewnętrznych, grubość i ostateczna postać ich powierzchni, która zatem przedstawiać może takie same odmiany, jak powierzchnia komórek. I tu zdarza się dosyć często, że warstwa wewnętrzna powleka całkowicie zewnętrzną, nie przerywając się wcale, tak, że włókno zostaje i później równym, tak jak było z początku. Wewnętrzna warstwa może tu również ukazać się w postaci nitki węzownicowatej, lub wstążeczek połączonych z sobą w siatkę; lecz stanu tego nie napotykamy zbyt często. Za to pospolitsze są włókna kręskowane, a nadewszystko kropkowane (fig. 32). Kropki odpowiadają tu równie jak w komórkach miejscom, w których błona zewnętrzna nie jest podwojona przez wewnętrzną i w których kończą się ślepo małe jamki powstałe z rozstąpienia się błony powtórnej. Jamki te odznaczają się szczególnie w drzewie jodły i innych podobnych roślin, nazy-



32.

33.

34.

31. Przecięcie poprzeczne tychże.

32. Włókna kropkowane wzięte ze skrzydła nasiennego surmi (*Bignonia*).

33. Włókna wzięte z drzewa sosny pospolitej (*Pinus sylvestris*).

34. Przecięcie podłużne tychże.

wanych zwykle iglastemi, a stanowiących rodzinę szyszkowych, którą później poznamy. Kropki są tu tak duże, że je zrazu wzięto za dziurki; ułożone są we dwa rzędy proste, zajmujące dwa przeciwległe boki włókna, a często każda z nich bywa obwiedziona *toczkiem* (areola) mniej lub więcej szerokim (fig. 33); budowa ta zbadaną została dokładnie. Jeśli uważamy przez mikroskop płatek bardzo cienki włókna przeciętego podług płaszczyzny przechodzącej przez oba równoległe boki okryte kropkami, widzimy, że w miejscu gdzie się znajduje kropka, włókno zachyla się ku wewnątrz, tworząc tym sposobem wklęsłość, której obwód jest okrągły lub eliptyczny (fig. 34). Ta to wklęsłość łamiąc światło inaczej od reszty powierzchni do której należy, tworzy toczek, w którego środku kończy się krótka boczna jamka, podobna do jamek włókien lub komórek kropkowanych i tworząca kropkę środkową. Ponieważ zaś kropki dwóch włókien sąsiednich zwykle sobie odpowiadają, przeto między nimi znajduje się mały przestworek soczewkowaty, taki, jakiby tworzyły dwa szkiełka zégarkowe zetknięte z sobą obwodami.

## NACZYNIA.

§ 8. Dotychczas rozróżnialiśmy włókna od naczyń jedynie większą bez porównania długością tych ostatnich; w istocie bywa ona niekiedy bardzo znaczną, a nawet wyrównywa prawie długości całej rośliny. Przekonywa nas o tém łatwo, przejście przez nie bardzo cienkich nitek, włosienia, lub włosów. Te bowiem wprowadzone przez otwór którego z naczyń na jednym końcu dość długiego kawałka rośliny, wychodzą drugim, świadcząc tym sposobem, że kanał jest nieprzerwany. Jeśli kanał jest bardzo wielki i prosty, jak np. w gałązkach winorośli, można, przyłożywszy oko do jednego końca, widzieć światło na drugim.

Jeśli obnażywszy jedno z naczyń długich uważamy je pod znacznym powiększeniem, spostrzeżemy stale dwie cechy: 1) powierzchnia naczyń nie jest nigdy gładką, jako często bywa w komórkach lub włóknach, lecz przedstawia zawsze pewną nierówność, która jak widzieliśmy, tworzy się w tamtych dopiero po pewnym czasie, a to w postaci kropek, kręsek, pierścieni, i t. d.; 2) walec utworzony przez naczynie nie jest zupełnie kształtny w całej swój długości, lecz na pewnych punktach posiada przewężistości czyli zwężenia. Te bywają nie-

kiedy w równych od siebie odstępach i bardzo jedno do drugich zbliżone, niekiedy zaś spostrzegamy je tylko w znacznych albo też nierównych odległościach. Przy uważném obejrzeniu części naczyń zawartych między dwiema najbliższemi przewięzistościami, uderza nas podobieństwo ich to do włókien, to do komórek. Podobieństwo zdaje się widoczniejszém po działaniu wrzącego kwasu saletrowego rozwiedzionego wodą, który zwykle części te od siebie oddziela. Mając je tym sposobem odosobnione przed oczyma, niepodobna jest odróżnić ich od komórek lub włókien, chyba przez to, że są przedziurawione szerzej lub wężziej na obu końcach, któremi się łączyły z innemi częściami naczynia.

Z tych postrzeżeń możnaby wnieść, że naczynie składa się z szeregu komórek lub włókien, które końcami są ustawione jedno na drugich i których wydrążenia łączą się z sobą przez otwory umieszczone na tychże końcach. Jeśli szereg takowy składa się z komórek, wtedy przewięzistości będą zbliżone, a linja która je oznacza będzie poziomą, lub z lekka tylko nachyloną, tak jak powierzchnie, któremi komórki zwykle na sobie leżą (fig. 32). Jeśli zaś szereg składa się z włókien, w takim razie przewięzistości będą mniej więcej od siebie oddalone, a linja je oznaczająca, będzie nadzwyczaj pochyłą, z przyczyny że należy do stożka, jakim się włókna kończyć zwykły (fig. 35).

Podług powyższego przypuszczenia, naczynia są narzędziami mniej już prostemi niż komórki i włókna, ponieważ właśnie z połączenia wielu takowych powstają. Nic dziwnego, że na ich powierzchni znajdujemy takie same postaci kropek, kręsek, wstążeczek, tworzących wężownicę nieprzerwaną, lub rozłączonych na pierścienie, albo też połączonych w siatkę, i t. d., i t. d., o których wspomnieliśmy przy komórkach i włóknach; lecz ponieważ tu znajdujemy je stale, zaś w komórkach, jak widzieliśmy, nie ma ich w stanie pierwiastkowym i powstają dopiero z wiekiem, przez dodanie nowych warstw na wewnątrz; przeto musimy wnieść, że naczynia takie, jakieżmy opisali, nie są bardzo młode; że takimi nie od razu zostały utworzone, lecz że wprzód przechodziły inne kształty.

W istocie, biorąc roślinę lub część rośliny, zaraz po pierwszém jej ukazaniu się, nie znajdujemy najmniejszego śladu naczyń, lecz tylko same komórki zamknięte błoną równą i je-

i jedno  
przed  
cają je  
te same  
błonow  
stanie  
samym  
rych je  
spojon  
Prze  
połącz  
tylko z  
dziur  
zamkn  
na wiel  
potrój  
Wed  
chni, ro  
tkości  
mórek  
ezenias  
dnakz  
które  
cznej  
i tu w  
Tyl  
nierów  
na ścia  
wężow  
znajduj  
czyni e  
rales),  
a to bą  
bądź w  
wili p  
Co o  
we (tra  
niowe,  
§ 9.  
cove s

i jednostajną. Później dopiero widzimy, że niektóre z komórek przedłużają się we włókna, a jeszcze później, że ściany utracają jednorodność i że ukazują się naczynia. Przechodzą one te same okresy kształcenia się, co komórki i włókna. Woreczek błonowy najprzód pojedynczy i jednociągły, grubiej przez wrostanie innych woreczków rozmaicie podziurawionych; w tym samym czasie woreczek zrasta się ściśle z dwoma innymi, z których jeden nad nim, drugi pod nim się znajduje; lecz ściany tak spojone zamiast grubić jak inne, cieńszeją i nikną w części. Przegrody, jakiby powinny znajdować się na powierzchniach połączenia, jeśli nie znikły zupełnie, to albo pozostawiają małe tylko zagięcia, mające kierunek ich obwodu, albo siatkę przedziurawioną. Tym sposobem otrzymujemy kanał nieprzerwany, zamknięty zewnątrz błoną również nieprzerwaną, pojedynczo na wielu punktach rozmaicie uszykowanych, zaś podwójną, lub potrójną na reszcie powierzchni wewnętrznej.

Według postaci rurki naczyń i różnych odmian ich powierzchni, rozróżniono rozmaite ich gatunki. Wymienimy je tu w krótkości jedno po drugim. Ponieważ naczynia są szeregiem komórek lub włókien, mamy tu więc do czynienia jedynie z połączeniami kształtów, z powtarzaniem postaci już znanych. Jednakże do przytoczonych już szczegółów możemy dodać niektóre nowe; gdyż właśnie w naczyniach, z powodu bardzo znacznej ich objętości, odmiany takowe ukazują się najwyraźniej, i tu właśnie były najwcześniej i najlepiej badane.

Tylko co powiedzieliśmy, że powierzchnia naczyń jest zawsze nierówną, poznaczoną kropkami lub kręskami ułożonemi jak na ścianach komórek, to jest zachowującemi w ogóle kierunek wężownicy: dlatego też w większej liczbie dzieł nowszych znajdujemy naczynia takie, oznaczone imieniem zbiorowem *naczyń* czyli *cewek wężownicowych* (*vasa spiralia*, *tubuli spirales*), dla odróżnienia ich od naczyń ze ścianami gładkiemi, a to bądź *włóknistych* o których mówiliśmy już przy włóknach, bądź *właściwych* albo *mlęczowych*, o których będziemy mówili później.

Co do samych cewek, rozróżniono *wężownicowe prawdziwe* (*tracheæ*), tudzież fałszywe, obejmujące *cewki pierścieniowe*, *siatkowate*, *kręskowane*, *kropkowane*, i t. d.

§ 9. **Cewki wężownicowe** (*tracheæ*). — Cewki wężownicowe składają się z walca błonowego, wewnątrz którego znaj-

duże się nitka zwinięta w węzownicę. Walec nie okazuje w dość znacznej długości żadnej odmiany, ani co do postaci, ani co do powierzchni; potem przechodzi w zwężenia stożkowate na obu końcach, z którymi często spojone są końce innych cewek, przedłużając tym sposobem pierwszą w górę i na dół. Właściwie przeto cewki węzownicowe składają się z włókien bardzo przedłużonych (fig. 35).



35.



36.

Nitka węzownicowa cewki, ciągnie się nieprzerwanie od jednego do drugiego końca takiego włókna. Bywa ona zwykle porównywaną do dróta mosiężnego, stanowiącego sprężyny szelek; i to maluje rzecz dosyć dokładnie. Barwa nitki jest zwykle perłowo biała. Kształt przypisywano jej rozmaity, i rozmaicie go też określano; jedni uważali nitkę za wydrążoną, drudzy sądzili, że jest rynienkowato na wewnątrz wyżłobioną, inni przyznawali jej inne jeszcze postaci. Najdokładniejsze postrzeżenia czynione przy pomocy narzędzi najdoskonalszych, jakie posiadamy, przekonywają, że nitka nie jest nigdy wydrążoną, lecz że różni się w kształcie swym podług miejsca i części, z których ją bierzemy; czasami jest spłaszczona jak wstążeczka, częściej jest zgrubiałą, a jej przecięcie daje koło, elipsę, lub czworobok. Ciągając z lekka przełamana cewkę węzownicową, skręty węzownicy oddalają się od siebie i nitka się rozkręca (fig. 36), tak jak drót sprężyny w szelkach, rozciąganej w podobny sposób. Łamiąc ostrożnie młode gałązki, np. bzu, widzimy niekiedy, że kawałek dolny zostaje zawieszonym na nitkach tak cienkich, iż zaledwie je dojrzyć można: są to cewki węzownicowe rozkręcone, i dla téj to własności nazywają się one niekiedy *rozkręcalnymi*, dla odznaczenia od innych cewek węzownicowych, które się rozkręcać nie dają. Zresztą własność ta nie w każdym zarówno wieku napotyka się. W cewkach bardzo młodych, których tkanina jest jeszcze nieco miękka, nitka nie posiada takiej sprężystości jakiej nabywa potem, i przerywa się wraz z rurką nie rozkręcając się wcale; w starości może znowu stracić tę sprężystość, zapewne w skutek ścisłego spojenia się z częściami sąsiednimi.

Odle  
części  
dnich,  
zewnę  
jących  
warzys  
kręcam  
wiają n  
wet da  
w tych  
na daje  
40).


Co  
cewki,  
napoty  
wój ku  
szczon  
do gór  
się pos  
wije si  
będzie  
Pod m  
duże si  
giem  
wka j  
zēm  
nitki n  
siatkę  
dła nie  
Jakiko  
dnego  
Naje  
lecz n  
bywa  
przesz  
żeczke  
włście.

37. C  
39. C  
bananu.

Odległość skrętów węzownicy od siebie jest rozmaita; najczęściej każdy skręt dotyka bezpośrednio obu skrętów sąsiednich, to jest leżących nad nim i pod nim (fig. 36); wtedy błona zewnętrznej nie można dostrzedz w odstępach prawie nieistniejących między nimi; bez wątpienia będąc zrosnięta z nitką, towarzyszy jej rozdziarając się, kiedy samą nitkę ciągniemy i rozkręcamy. W innych razach skręty pozostawiają między sobą odstępów widocznych, a nawet daleko szersze niż nitka, i właśnie w tych tylko przypadkach błona zewnętrzna daje się widzieć nieco wyraźniej (fig. 37, 40).

Co do kierunku, jaki bierze węzownica cewki, postrzeżono, że jeden częściej się napotyka od innych: jest to kierunek od prawej ku lewej ręce, jeśli patrzący uważa naczynie jako umieszczone przed nim w położeniu przyrodzonym, to jest obrócone do góry końcem najbardziej od ziemi oddalonym. Często uważa się postrzegacza umieszczonego w osi walca, około którego wije się węzownica, i rzeczą jest jasną, że wtedy kierunek jej będzie odwrotnym, to jest od lewej ku prawej ręce (fig. 38). Pod mikroskopem strona cewki obrócona ku patrzącemu, znajduje się względem niego w pierwszym, druga zaś strona w drugim położeniu, a oba kierunki krzyżują się z sobą. Jeśli cewka jest tak cienka, że obie jej strony znajdują się prawie razem w ognisku mikroskopu, pole jego przebiegać będą dwie nitki mające kierunek przeciwny, i które krzyżując się, kreślą siatkę złożoną z małych czworokątów (fig. 38). Ta postać zwiadła niektórych botaników, którzy nie byli w stanie jej objaśnić. Jakkolwiek kierunek bierze węzownica, nie zmienia go od jednego do drugiego końca cewki.

Najczęściej nitka skręcona w węzownicę, jest pojedynczą; lecz nierzadko zdarza się znaleźć i dwie (fig. 38). Niekiedy bywa ich więcej (fig. 30), a w bananie (*Musa*) liczymy ich przeszło 20. Wtedy nitki zbliżone i równoległe tworzą wstążeczkę węzownicowatą, która się także daje rozkręcać. Oczywiście, kierunek skrętów węzownicy będzie tym ukośniejszy,



37. Cewka węzownicowa o skrętach oddalonych, wzięta z łodygi dyni.  
 39. Cewka węzownicowa o wielu nitkach równoległych, wzięta z łodygi bananu.

im z większej liczby nitki obok ułożonych składa się wstążeczka, ponieważ dwa skręty tej samej nitki oddalone są zawsze od siebie o całą szerokość wstążeczki. Kiedy przeciwnie nitka jest tylko pojedynczą i dwa jej skręty dotykają się wzajemnie jak w sprężynie szelek, skręty te przedzielone są tylko grubością samej nitki i biorą kierunek linii, której wznoszenie się jest tak nieznaczne, że się wydaje prawie poziomą.



40.

Nitka pojedyncza nie zawsze pozostaje taką w całym swym biegu, gdyż niekiedy rozdziela się na dwoje, i wtedy zamiast jednej, widzimy dwie nitki cieńsze (fig. 40). Jest to przejście do cewek siatkowatych.

§ 10. **Cewki pierścieniowe i siatkowate.** — Jeśli patrzymy początku nazwy łacińskiej *tracheae*, ta przystałaby raczej



41.



42.



43.

cewkom nad którymi teraz zastanawiać się będziemy, niżli cewkom węzownicowym. Wrzeczy samej, będąc złożone z walca błonowego, obejmującego pierścienie czyli obrączki, umieszczone jedne nad drugimi (fig. 41), dałyby się słusznie porównać z tchawicą zwierząt. Wogóle są one większe od cewek węzownicowych i daleko mniej jednostajne w całej długości. Jakoż pierścienie jednej i tej samej cewki, nie są dokładnie sobie podobne (fig. 42); zwykle ułożone poziomo, mogą jednak nachylać się nieprawidłowo w tym lub owym kierunku, bywają poprzedzielane od siebie odległościami nierównymi, nakoniec mogą być przywiedzione do ułomków pierścieni, lub tworzyć nie koło, ale inny rodzaj linii krzywój.

Dlatego nie rzadko można widzieć między pierścieniami dłuższe lub krótsze kawałki węzownicy, która raz łączy je z sobą (fig. 43), drugi raz nie zostaje z nimi wcale w związku.

40. Cewka o węzownicy pojedynczej u spodu, a podwójnej u góry, wzięta z buraka (*Beta vulgaris*).

41 i 43. Cewki pierścieniowe wzięte z łodygi balsaminy zwyczajnej.

Takie kawałki węzownicy porównywano rozumie się do cewek węzownicowych; a ponieważ znaleziono w nich jedno tylko piętno odróżniające, to jest że nie są rozkręcalne, i ponieważ węzownica zrosnięta mniej więcej z błoną walcową otaczającą, unosi z sobą kawałki téjże przy rozdarciu, wniesiono więc zdąd, że to są cewki węzownicowe starsze, czyli stojące na wyższym szczeblu wykształcenia. Podług tego, pierścienie powstawałyby z jednego lub więcej skrętów węzownicy, zbliżonych i spojonych ściśle między sobą. Jednociągłość węzownicy znika podług jednych przez to, że takowa przerywa się pomiędzy częściami zrosniętymi, które w skutek przedłużenia się cewki, zostały od siebie oddalone; podług innych przez to, że część leżąca między dwoma najbliższymi pierścieniami była wessana. Całe to przypuszczenie zasada się na częstej obecności pierścieni połączonych z węzownicami, tudzież prążek, brózd, a nawet istotnych szpar znajdujących się na środku obrączek i równoległych względem ich brzegów; ta bowiem ich obecność zdaje się świadczyć o zrosnięciu się w jedno, dwóch lub więcej nitek równoległych.

Inni botanicy mniemają, że zgrubienia wewnętrzne błony cewek pierścieniowych nie miały w początku kształtu jednociągłej węzownicy, lecz że ukształcały się tak jak je znajdujemy: jedna część w kołach, inne w węzownicach, inne w kształtach mieszanych. Ci postrzegacze nie mogli nigdy znaleźć węzownicy jednociągłej, któraby potem zmieniała położenie i zniknęła. Zresztą, podług przypuszczenia zbijanego przez nich, część pośrednia między dwoma pierścieniami musiałaby zawsze jeden zachowywać kierunek; jój szerokość musiałaby być zawsze spójmierną względem szerokości pierścienia (zwykle być jego połową), gdyż ten musiałby powstawać z połączenia kilku (zwykle dwóch) skrętów; prążki lub szpary spostrzegane często na pierścieniu, musiałaby przypominać kierunek węzownicy. Tymczasem tego wszystkiego nie znajdujemy. Część pośrednia bierze niekiedy kierunki przeciwne, a to w jednym i tym samym podziale; jój szerokość równa się szerokości pierścienia, a prążki tegoż są równoległe z brzegami, nie zaś skierowane ukośnie z dołu do góry (fig. 44).



44. 45.

44 i 45. Kawałki cewek wziętych z przewodniczki główkowej (*Commelina tuberosa*).

Niekiedy dwa pierścienie po sobie następujące, lub nawet w jednym punkcie z sobą połączone, bywają nachylone względem siebie w dwóch przeciwnych kierunkach (fig. 45). Fakt ten, który się łączy z poprzednimi, może być tak objaśnionym, że pierścienie będąc z początku dość słabo spojone z walcem błonowym, mogą się od niego w części lub zupełnie oddzielić i opasć w jego wydrążenie; tracąc przez to położenie pierwotne, przybierają inne, mniej więcej pionowe.

Po tém co się dotąd powiedziało, snadno jest pojąć, z jaką łatwością cewki pierścieniowe mogą przechodzić w siatkowate. Pierścienie pochylone w różne strony, połączone z sobą albo bezpośrednio na kilku punktach obwodu, albo pośrednio paskami rozmaicie skierowanymi; podziurawione niekiedy szparami, tém samém już tworzą często siatkę wietką. Jeśli takie żywioły zbliżą się do siebie i będą liczniejsze, otrzymamy siatkę gęstszą i bardziej złożoną; ztąd też nierzadko można widzieć jedną i tę samą cewkę w części pierścieniową, w części siatkowatą (fig. 46).

Cewki te kończą się wązkim stożkiem. Ich długość dowodzi, że równie jak cewki węzownicowe, złożone są zwykle z włókien.

#### § 11. Cewki kréskowane.

— Cewki kréskowane zamiast węzownic, obrączek lub oczek niekształtnych, przedstawiają kréski poprzeczne, zajmujące część tylko obwodu rurki i ułożone zwykle prawidłowo jedno nad drugim (fig. 47). Cewka miewa często kształt graniastosłupa, którego powierzchnie pokryte są owemi kréskami, kończącemi się ku krawędziom (fig. 48). Ułożenie krések i ich odstępów, porównywano ze szczeblami drabiny, i dlatego cewki mające podobną postać, nazywają się niekiedy *drabinkowatemi* (vasa scalariformia, scalaria), jednakże kréski nie zawsze są tak długie, lecz przybierają czasem postać małych dziurek od guzików, podobnie ułożo-



47.



48.

47. Kawalek cewki kréskowanej, wziętej z winorośli.

48. Kawalek cewki kréskowanej graniastosłupowej, wziętej z długoosu królewskiego (*Osmunda regalis*).

nych, le  
powsta  
Cew  
reśmy  
jonego  
sca, k  
jest tyl  
zeniu i  
z częśc  
w tych  
błona  
w mie  
bie, is  
do kor  
Cew  
z pierś  
ostatni  
ple i p  
Uważa  
rych s  
dający  
niach  
nek u  
gana  
manit  
i wte  
nitki,  
ale ra  
wieraj  
(fig. 4  
poziom  
szych  
widzi  
która  
i równ  
i ile m  
kiego,

49. I  
sza czę  
50. C  
ktyla w


nych, lecz zazwyczaj liczniejszych, tak, jak gdyby kilka z nich powstało z jednej kréski poprzerwanej na kilku punktach.

Cewki te uważane są teraz równie jak i inne narzędzia, któreśmy poprzednio badali, za złożone z walca błonowego podwójonego na wewnątrz tkanką podziurawioną; kréski są miejscami, które odpowiadają dziurkom i na których cewka zamknięta jest tylko błoną zewnętrzną. Niektórzy pisarze sądzą, że w ułożeniu i kształcie krések daje się spostrzedz pewna zgodność z częściami otaczającymi i cisnącymi cewkę; że kréski leżą w tych miejscach, gdzie powierzchnie stykają się z sobą; że błona grubieje tam, gdzie się styka z krawędzią; że przeto w miejscach w których cewka leży obok innych podobnych sobie, istnieje kształtność znikająca tam, gdzie cewka przytyka do komórek krótszych i liczniejszych.

Cewki kréskowane brane były przez wielu pisarzy za jedno z pierścieniowemi i siatkowatemi; i w istocie kiedy siatka tych ostatnich posiada pewną kształtność, kiedy oczka jej są szczupłe i przedłużone poprzecznie, rozróżnienie staje się trudnym. Uważano je także za przemianę cewek węzownicowych, których skręty wyraźne i nieco oddalone na miejscach odpowiadających kréskom, łączą się z sobą w przestrzeniach środkujących. Przypadki, w których kierunek ukośny bieży w węzownicy, a cewka rozciągnięta rozkręca się naksztalt sprężyny, nadają mniemaniu temu pewne prawdopodobieństwo. Lecz i wtedy węzownica byłaby utworzoną nie z jednej nitki, ograniczonej kréskami nad sobą leżącymi, ale raczej z paska mniej więcej szerokiego i zawierającego wiele rzędów równoległych krések (fig. 49); zresztą kréski są najczęściej ułożone poziomo i jako takie dają się spostrzedz w najmłodszych nawet cewkach. Najpierwszą zmianą, jaką widzieć można na błonie pojedynczej i jednorodnej, która je tworzy z początku, jest ukazanie się linii szarawych i równoległych (fig. 50), a postrzeżenia czynione najwcześniej i ile możności najszczegółowiej, nie pozwalają rozeznaczyć takiego, coby było podobne do nitki zwiniętej w węzownicy.

49. Kończyna cewki kréskowanej, wziętej z widłaku (*Lycopodium*); niższa część jest rozkręcona we wstęgę.


50. Cewka drabinkowata zaczynająca się rozwijać, wzięta z korzenia daktyla wschodzącego.



49. 50.

Cewki króskowane składają się albo z szeregów komórek podłużnych, zakończonych i przystosowanych do siebie ścianami ukośnemi, albo też z szeregów włókien stożkowato zakończonych.

§ 12. **Cewki kropkowane.** — Cewki kropkowane, które ze



51.

wszystkich cewek największej dochodzą objętości i których kanał wewnętrzny może być często gołym okiem widziany, wydają się jakby przesłane mnóstwem punkcików ułożonych w linie równoległe poziome, lub co się rzadziej nieco zdarza, ukośne (fig. 51). Co do początku tych punktów w rzędy ułożonych, robiouo też same przypuszczenia co przy króskach; zarzuty podobnie są te same.


Cewki te mają postać walców, na których powierzchni pozakreślone są koła opatrzone kropkami, nieco ukośnie, lub częściej poziomo, umieszczone w przedziałach mniej lub więcej zbliżonych i w ogóle równych. Koła te mają też samą średnicę co i reszta rurki, niekiedy zaś nieco mniejszą, z kąd powstaje poczet zwężeń czyli przewężistości w pewnych odstępach (fig. 52). Przekięcie pionowe cewki pozwala spostrzedz, że zwężeniom odpowiada niekiedy wewnątrz małe



52.



53.



54.

okrągłe zagięcie, a czasem także cewka ogrzewana w kwasie saletrowym, rozdziela się w tychże miejscach na tyleż kawałków, z których każdy odpowiada oczywiście komórce mającej kształt beczułki o obu dnach wybitych. Tak więc cewka kropkowana, utworzona jest przez rząd komórek z sobą zrosniętych. Kropki są to miejsca, w których błona zewnętrzna jest nagą.

51. Kawalek cewki kropkowanej, wzięty z winorośli. Obok niego kilka włókien kropkowanych.

52. Kawalek cewki kropkowanej, wzięty z powojnika zwyczajnego.

53. Kawalek cewki kropkowanej, wzięty z jemioly; kształt cewki przechodzi w paciorkowaty.

54. Cewki kropkowane wzięte z balsaminy, przybięrające u góry kształt paciorkowaty.

Jeśli przewięzistości powstające przez zetknięcie się komórek bardziej wydętych w środku niż na końcach, są nadzwyczaj wydatne, cewka przypominać będzie kształt różańca, którego paciorki stykają się z sobą (fig. 53). Cewki więc tak nazwane *paciorkowate* czyli *robaczkowate* (dlatego że je także porównać można z ciałem robaka, złożonego z szeregu pierścieni) (fig. 54), są tylko odmianą postaci ogólniejszej. Odmiana ta okazuje się nietylko w cewkach kropkowanych, ale i w innych. W ogóle widzimy, że przy powstawaniu innych narzędzi, np. gałązek wychodzących z gałęzi, liści wychodzących z gałązek, i t. d.; tam, gdzie cewki dla przejścia z jednych w drugie muszą zboczyć z kierunku prostego, części je składające uławniają to zboczenie skracając się, stając się mniej kształtnymi i łącząc się z sobą powierzchniami mniej obszernymi. Linja prosta musi się złamać w wiele linii krótkich, aby przebieść drogę krzywą. Tym przeto sposobem, włókna składające cewki węzownicowe, pierścieniowe, lub kręskowane, zwykle bardzo długie w łodydze, skracają się w kolankach a nawet przechodzą w komórki (fig. 54).

§ 13. **Przeobrażenia cewek węzownicowych.** — Widzieliśmy, że cewki pierścieniowe mogą przedstawiać dość długie ulomki prawdziwej węzownicy; że z drugiej strony, przez cewki siatkowate przechodzą w kręskowane; widzieliśmy, że linja jednociągła tworząca kręski, przerywa się i zmienia w linję kropkowaną, stanowiąc tym sposobem przejście od cewek kręskowanych do kropkowanych; widzieliśmy, iż te rozkręcają się niekiedy przy rozciąganiu w paski węzownicowate. Nie więc dziwnego, że wielu botaników przypuszcza przeobrażenie jednych cewek w drugie, widząc w rozmaitych powyżej opisanych odmianach, różne tylko stopnie rozwinięcia jednego narzędzia, i mniemając, że ta sama cewka może kolejno przechodzić przez te wszystkie kształty, owszem okazywać w różnych wysokościach kilka takowych na raz. Nauka ta została dalej jeszcze posunięta, ponieważ niepodobna oznaczyć ścisłych granic między cewkami a włóknami, między włóknami a komórkami; ponieważ w ogóle cewki złożone są z włókien i komórek, a wszystkie te narzędzia z początku jedną tylko mają postać, postać komórki utworzonej przez błonę jednorodną. Dodajmy do tego, że zawsze istota tworząca ścianę komórki, włókna, lub jakiegokolwiek cewki, jest zupełnie tą samą, złożoną z tych

samych chemicznych pierwiastków i w tymże samym stosunku. Można by ztąd wnieść, że w roślinie jedno tylko jest narzędzie proste, prawdziwy Proteusz, który w szeregu przemian przywdzięwa rozmaite postaci, brane przez nas za różne narzędzia.


Ale strzeżmy się przesady w tej uwodzącej nauce o przeobrażeniach, i nie bierzmy podobieństw za tożsamość. Sąż wistocie różne odmiany cewek, kolejnemi tylko stopniami rozwijania się jednego narzędzia, i otrzymujemy tę lub ową odmianę w miarę jak rozwijanie zatrzymuje się na tym lub owym stopniu? Postrzeganie, ten stanowi warunek prawdy naszych teoryj, pokazuje nam, że rzeczy inaczej się mają. Śledząc rozwijania się cewki, nie znajdujemy, aby ta w różnych swych zmianach, przedstawiała wszystkie inne gatunki cewek; toż samo rzecz można o komórkach. Uważamy nadto: 1) że w każdej części rośliny znajdują się niezmiennie te lub owe rodzaje komórek, włókien lub cewek: tak znajdujemy naprzykład stale na pewnych miejscach cewki rozkręcalne, nigdy nie znajdujące się na innych; w takiej a takiej roślinie, w takiej a takiej części rośliny, nigdy nie napotykamy cewek kręskowanych; w takiej a takiej, znowu będzie ich podostatkiem; 2) że mimo jedności składu chemicznego ścian, skład istot zawartych w wydrążeniach bywa różnym; że ta różność jest stałą, tak jak kształty, i zależy od miejsca jakie wydrążenie zajmuje w roślinie. Tak więc, chociaż wszystkie narzędzia proste roślin są z początku komórkami, w których nie możemy odkryć widocznych różnic, niemniej jednak jest prawdą, że każda komórka zda się być od początku przeznaczoną do przyjęcia w dalszém rozwijaniu, takiej a nie innej postaci, do zawierania lub wyrabiania takiej a nie innej istoty. Nie jest to więc zawsze to samo narzędzie. Przechodząc ze swój postaci pierwotnej do ostatecznej, może przybierać wiele innych, pośrednich, i to jest właśnie granica istotnych przeobrażeń, którą trzeba się starać należycie oznaczyć, jeśli chcemy dobrze określić narzędzia. W tych poszukiwaniach bardzo się trzeba mieć na baczności co do złudzeń, do jakich może dać powód nadzwyczajna prostota tkanki roślinnej; prostota, która pokrywając różnice, a mnożąc podobieństwa, tworzy pojęcia o sztucznej jednakości, otrzymywane tém częściej i tém konieczniej, iż badano przedmioty daleko mniejsze, przy pomocy narzędzi daleko mniej doskonałych.

§ 14. **Naczynia właściwe czyli młeczowe.** — W skutek roztrząśnienia powyżej umieszczonego, odłożyliśmy na później opis naczyń, które się zanadto od wszystkich innych różnią, aby z nimi kiedykolwiek mogły być zamieszczone: są to naczynia noszące nazwę *właściwych* czyli *młeczowych* (*vasa propria, vitalia, seu vasa laticis*), ponieważ zawierają sok właściwy, zwany *młeczem*.

Są to rurki błonowe połączone z sobą gałęziami poprzecznymi, tak, że ogół ich tworzy obszerną siatkę (fig. 56, 57). Mają one przeto większe podobieństwo od poprzednio opisanych z naczyniami zwierzęcymi, których cechą jest rozgałęzienie się w swęj drodze. Jednakże wyraz rozgałęzienie, nie może być użytym właściwie przy naczyniach młeczowych, które nie wyczerpują się przez ciągle po sobie następujące podziały, tak jak pień np. dzieli się na gałęzie, gałęzie na gałązki, i t. d. Tu gałęzie są prawie równe kanałom, które łączą i z których wychodzą pod kątem prostym lub ostrym.

Ściana błonowa jest przezroczysta i jednostajna, gdyż lubo w pewnych miejscach grubsza jest niż w innych, zgrubienia te nie zdają się być innego przyrodzenia od reszty naczynia.

Cewki są z początku walcami kształtnymi, bardzo wąskimi i cienkimi (fig. 55 *a*); później rosnąc, zachowują niekiedy kształt walcowaty, lub też miejscami nabrzmiwiają (fig. 55 *b*, 56). Nabrzmiwienia przez ciąg życia rośliny, mogą być czasowemi i wynikać, jak w żyłach zwierząt z chwilowego zatrzymania się płynu zawartego w naczyniach; niekiedy jednakże zostają nawsze. Wydrążenie wewnętrzne może także nie wszędzie być równe, choćy nawet walec kształtnym był od zewnątrz, lecz może w pewnych odległościach mieć przewężistości.



55 i 56. Naczynia, właściwe wzięte z jaskółczego ziela (*Chelidonium majus*).  
57. Naczynia, właściwe wzięte z wilczomłęczy słodkiego (*Euphorbia dulcis*).

C. H. Schultz, któremu winni jesteśmy wiadomości najdokładniejsze, jakie posiadamy o naczyniach właściwych, przypuszcza, że z wiekiem na miejscach odpowiadających przewężistościom, także pod nabrzmieniami i tam gdzie się naczynia z sobą łączą, tworzy się ścieśnienie, a później przedział zupełny; wtedy naczynia zamiast wydrążenia nieprzerwanego, przedstawiają szereg wydrążeń oddzielonych jedne od drugich tyłuż stawami: Schultz nazywa je wtedy *naczyniami stawowatemi* (*vasa laticis articulata*) (fig. 57); *rozszerzonemi* (*expansa*) (fig. 55 b, 56) jeśli posiadają wspomniane nabrzmiałości (a co zdaje się stanowić najwyższy stopień ich działalności żywotnej), lub *skurczonemi* (fig. 55 a) w pierwszym okresie ich rozwinięcia.

Porównyując naczynia właściwe z cewkami, ujrzymy, że między nimi zachodzi stosunek zupełnie odwrotny, gdyż w pierwszych zamiast komórek początkowo oddzielnych, które się zrastają i otwierają w siebie dla utworzenia kanału jednociągłego, znajdujemy rurki właśnie z początku nieprzerwane, które się dopiero później przerywają i dzielą niejako na komórki. To przeto piętno, jeśli nie zaprzeczmy jego prawdziwości, a w każdym razie, częste łączenie się rurek tworzących prawdziwą siatkę, odróżniają nam wybornie naczynia właściwe, równie jak nieobecność dziurek w ich ścianach jednostajnej grubości; przez co błona pierwotna nie jest porysowana paskami, kręskami lub kropkami, jakieśmy to widzieli w cewkach, włóknach i komórkach. Ściany te cienkie zrazu, grubieją, jakieśmy wspomnieli, starzejąc się; niektórzy nawet sądzą, że w nich rozznaczyć można następstwo warstw.

§ 15. **Sposób w jaki narzędzia proste bywają spojone z sobą.** — Opisawszy główne odmiany narzędzi prostych u roślin, nie możemy pominąć zdania, które niedawno bardzo zajmowało botaników, to jest, w jaki sposób, jaką siłą połączone są te żywioły, któreśmy dotąd oddzielnie badali? Ponieważ wszystkie narzędzia dadzą się odnieść do komórki z której powstały, ponieważ często komórki tworzą większą część a niekiedy nawet całą miąższosć rośliny; zdanie przeto powyższe przywieść można do oznaczenia sposobu, w jaki komórki połączone są z sobą.

Podług jednych, połączenie to jest bezpośrednie; ściany komórek zrazu współplenne, zachowują czas niejaki pewien stopień

kości, k  
sąsied  
twię zle  
twardsz  
bięj, po

Nauk  
stronnik  
H. Mohl  
tunek k  
wiąże  
stantia  
budow  
nych z  
my po  
rych c  
pach o  
sto śre  
ry nape  
która p  
tęj roś  
złożon  
ziemię  
ca ich  
stewk  
rach  
że tak  
barwi  
my ze  
łączyc  
Istote,

§ 1  
cych,  
podob  
gęstnie  
mnóst  
Podln  
przed

58.  
mórki,

kości, która jest dostateczną, aby kiedy ściany wielu komórek sąsiednich rozwijając się, spotkają i zetkną się z sobą, ułatwić zlepianie ich, i aby, nawet wtedy kiedy komórki stają się twardszemi, utrzymać je zlepione tym sposobem, silniej lub słabiej, podług kształtu i przyrodzenia tkanki przez nie utworzonej.

Nauka o połączeniu pośredniem, licząca niewiele tylko stronników, powstała od lat kilku, wspierana wielką powagą H. Mohl'a. Ono sądzi, że pomiędzy komórkami znajduje się gatunek kleju różnego od nich co do przyrodzenia, a który je wiąże i który Mohl nazywa *istotą międzykomórkową* (substantia intercellularis). W niektórych roślinach prościej bardzo budowy, jak np. wodnych; szczególnie zaś morskich nazywanych zwykle *morszczykami* (Varechs), a które niżej poznamy pod nazwiskiem *Fucus* komórki (fig. 58 *a a*), z których cała roślina się składa, leżą w tak znacznych odstępach od siebie, że te ostatnie przewyższają często średnicę samych komórek. Całe te przestwory napełnione są istotą międzykomórkową (*b*), która przeto stanowi większą część miąższości tej rośliny. Przeciwnie, w roślinach bardziej złożonych, w drzewach i ziołach pokrywających ziemię, komórki stykają się (fig. 7, 28) z sobą, a istota łącząca ich powierzchnię przyprowadzona jest do tak cienkiej warstewki, że uchodzi naszego oka; niekiedy jednak w przestworach międzykomórkowych staje się widoczniejszą, a nawet może takowe całkowicie zapełniać. Poznać ją można po odrębnej barwie i budowie, a to z powodu, że skład jej nie jest tożsamy ze składem błony komórek; komórki bowiem dają się rozłączyć za pomocą odczynników, rozpuszczających wspomnianą istotę, a nietykających błony.



58.

§ 16. Mniemanie Mirbel'a, jest różne od obu poprzedzających. Podług niego, tkanka roślinna powstaje z pewnego kleju podobnego do roztworu gumy arabskiej, który coraz bardziej gęstnieje, a nieprzerwany i pełny z początku, z czasem nabywa mnóstwa maleńkich wydrążeń, które są wnętrzami komórek. Podług tego zdania, komórki sąsiednie byłyby pierwiastkowo przedzielone jedną tylko wspólną ścianą, która może pozostać

58. Kawałek tkanki z rośliny morskiej *Himanthalia lorea*. — *a a* Komórki. — *b* Istota międzykomórkowa.

pojedynczą, lecz która zwykłej podwaja się, albo w całym obwodzie, albo tylko w części, a w takim razie nasamprzód przy krawędziach. Rozwijanie komórek odbywałoby się podług tej teorii wcale przeciwnie jak podług innych; komórki bowiem dą-



59.

Mirbel nazywa ją *tkanką komórkową przekładaną* (fig. 59). Ma ona tu oczywiście znaczenie istoty międzykomórkowej Mohla, chociaż początek jej byłby zupełnie różnym.

§ 17. Sposób w jaki narzędzia proste spólniczą z sobą.— Jeśli sposób spojenia narzędzi prostych przedstawia w badaniu niektóre trudności, to przeciwnie sposób w jaki one spólniczą z sobą, jest bardzo jasnym. W rzeczy samej widzieliśmy, iż ograniczone są błoną cienką i pojedynczą, która jeśli grubieje, to niejednostajnie na całej wewnętrznej powierzchni, gdyż na wielu miejscach zostaje pojedynczą. Przepuszczalność zaś takiej błony dowiedziona jest licznymi i stanowczymi doświadczeniami. Gazy więc lub płyny zawarte w wydrążeniach cewek i komórek, znajdują zawsze dla przejścia mnóstwo jamek bocznych, zamkniętych samymi tylko przegrodami błonowymi. Wielu pisarzy zaprzeczało nawet istnienia tych przegród, nazywając dziurkami i szparami to, co my zwiemy kropkami i kręskami. Być może, iż błona znika w istocie czasami w miejscach gdzie pozostaje naga; widzieliśmy to na stykających się kończynach włókien lub komórek, których szeregi tworzą naczynia. Niekiedy wałec błonowy cewki znika zupełnie, a pierścienie jej utrzymywane są tylko przez części sąsiednie, które przeto miejscami tworzą ścianę cewki. W niektórych roślinach istnienie prawdziwych dziurek, nie ulega żadnej wątpliwości.

W dwóch stykających się komórkach, jamki boczne jednej odpowiadają zwykle jamkom drngiej, tak, że w ogóle dwie

59. Część środkowa młodego korzenia daktylu. — a a Jamki.

jamki m  
dnę (fig  
przerwa  
więc p  
zawsze  
przynaj

§ 18  
re odla  
ście, c  
się, ni  
szczon  
runek,  
do kor  
się tu  
mórek,  
chnie s  
dziuraw  
zbaczą

Cho  
dzieje,  
dnak n  
żowni  
pomoc  
można  
która  
rząc  
żowni  
się po  
niętych  
więc r  
kanał  
czynia  
tak w  
nado  
trudno

§ 1  
tkanka


60. I  
niczenia  
62. C

jamki należące do różnych komórek, zdają się zlewać w jedną (fig. 60 *a*), ułatwiając spólniczenie obu wydrążeń bez przerwania jednakże błony komórek. Przejście więc płynu z jednego wydrążenia w drugie, jest zawsze albo zupełnie wolnym, albo łatwym, albo przynajmniej możliwym.


§ 18. Gdy z wiązki skupionych cewek niektóre odłączają się i idąc w bok, np. z gałązki w liście, opuszczają kierunek prosty zakrzywiając się, niejednociągłość kanału zdaje się być zniszczoną w zagięciu; cewki biorące ten nowy kierunek, przytykają kończynami swemi (fig. 61 *aaa*) do kończyn cewek, które składały wiązkę pierwotną. Dzieje się tu więc to samo co przy każdym połączeniu włókien lub komórek, których szereg prosty tworzy cewkę, to jest powierzchnie stykające się, zostają częściowo lub całkowicie przedziurawione: tylko że końce, które się tym sposobem łączą, zbaczają nieco od siebie.

Chociaż rozgałęzienie się cewek dzieje się stale w ten sposób, mamy jednak niektóre przykłady, że cewki węzownicowe dzielą się na gałęzie nie za pomocą stawów. Widzieliśmy np. niekiedy można cewkę o podwójnej węzownicy, która się rozszczepia na dwoje, tworząc dwie cewki o pojedynczych węzownicach (fig. 62), przez oddzielenie się pod kątem dwóch węzownic zwinętych wprzód równolegle. Piętno więc rozgałęziania się jednociągłości kanału, przez które odróżniliśmy naczynia właściwe od cewek, nie jest tak wyłącznym jak uważano, chociaż narzędzia rzeczzone za nadto są zkądinąd od wszystkich innych różne, aby miało być trudno określić je dokładnie.

§ 19. Zawartość narzędzi prostych. — Widzieliśmy, że tkanka roślinna posiada wszędzie wydrążenia rozmaitych po-



60.



61.

62.

60. Komórki wydłużone, wzięte z korzenia daktyla. — *a a* Kanały spólniczenia.

62. Cewka rozkręcalna wzięta z dyni (*Cucurbita pepo*).

staci; że wydrążenia zajmują wnętrze komórek, włókien lub naczyń, albo też umieszczone są między nimi. Pozostaje nam śledzić, co się w wydrążeniach tych postrzega, czyli są próżne, czy też wypełnione przez inne ciała.

Często zdają się być zupełnie próżne, lecz wtedy otwierając je pod wodą, widzimy wymykające się małe bańki dowodzące obecności gazu. Wszystkie pośrednie stopnie gęstości, poczynając od powietrznej aż do najbardziej zbitej, dają się napotykać w istotach zawartych w wydrążeniach tkanki; mogą one mieć postać pary, płynów rzadkich lub gęstych, galarety, ciasta, ziarenek rozrzuconych lub zebranych w bryłki, kamyczków, lub kryształów. Oczywiście tém łatwiej je postrzegać, im więcej się zbliżają do stanu zsiadłego; jeśli są w stanie gazu, potrzeba dla oznaczenia ich przyzwać w pomoc chemją; płynne ulatniają się niekiedy po obnażeniu tkanki, a komórka która w czasie życia była płynem, może się okazać pod szkłem zmiętą i próżną, albo też posiadać ślady tylko osadu, jeśli po ulotnieniu zostały osuszone niektóre ciała wprzód rozpuszczone w płynach, jak np. gumy lub cukier w wodzie, żywice w olejku lotnym, etc. W czasie samego postrzegania, mogą także zajść niektóre zmiany chemiczne co do przyrodzenia zawartości; gdyż takowe wyrwane ze stosunków żywotnych, muszą być wystawione na zetknięcie się z nowymi działaczami, z powietrzem lub wodą, i t. d., i t. d. Poszukiwania przeto podobne, których wypadki są tak ważne dla objaśnienia życia roślinnego, wymagają więcej ostrożności, sposobów bardziej złożonych i rozmaitszych, a nakoniec nie mogą być tak wysoko posunięte, jak te, któremi zajmowaliśmy się dotąd.

§ 20. Jeżeli zaczniemy od istot stałych, których postrzeganie bezpośrednio jest łatwiejszem, obaczmy, iż mogą mieć różne położenia w wydrążeniu je obejmującym. Mogą np. wyścięłać całą jego powierzchnię i tworzyć przeto jakby warstwę wewnętrzną, która od prawdziwych warstw niekiedy dopięro za użyciem odczynników wykrywających skład chemiczny rozeznana być może: tak dzieje się z istotą mocno obfitującą w saletroród, którą znajdujemy umieszczoną w ten sposób we wszystkich prawie komórkach bardzo młodych, i której warstwa przyjmuje barwę różową, przy działaniu saletranu pierwszego merkurjuszu, niezminiającego reszty ścian. Istota zwana *włóknikiem* (fibrinum), którą napotykamy we włóknach

drzewn  
tak, ja  
zsiadła  
wartoś  
nawet  
z zawi

Toż  
rupia t  
źnie na  
istotę  
kala i  
szczon  
traw c  
kiedy z

§ 2  
kształ  
w kup  
nawet  
które  
tek ut  
blon,


W  
podłu  
ziarn  
socze  
lub cz  
W og  
w mia  
ka zu  
i w p  
ją jgd  
którą  
wydra  
czynn  
go sw  
jako z

drzewnych, nie tylko osiada na ścianach, ale przenika je nawet tak, jak gdyby istota jaka płynna wypełniwszy dziurki gąbki, zsiadła się i tworzyła z nią jedno ciało. W tym przypadku zawartość zetknięta bezpośrednio ze ścianami lub wprowadzona nawet w ich miąższość, zlewa się do pewnego stopnia w jedno z zawieralnikiem.

Toż samo dzieje się z krzemionką, która dosyć często oskorpia tkankę roślinną. Można się o tem przekonać, paląc ostrożnie na kawałku szkła małą ilość takiej tkanki. Ogień niszczy istotę roślinną, nie tykając istoty kruszcowej, która ją przenikała i która zostaje na szkło, dając szkielet krzemionkowy zniszczonej tkanki roślinnej. Odznaczają się w tym względzie źdźbła traw czyli słoma, i ztąd to owe zeszkłone bryły, jakie się niekiedy znajdują w szczątkach stert spalonych.

§ 21. Istota zawarta wewnątrz komórek, posiada często kształt ziarenek, z których jedne są rozproszone, inne zebrane w kupki. Leżą one często przy ścianach, do których zdają się nawet przywierać, i wtedy wydają się jak plamki lub kropki, któreby z zewnątrz wziąć można za kropki powstałe w skutek utworzenia się jamek, opisanych wyżej przy zgrubieniach błon, z jakich się ściany te składają.

W wielu komórkach bardzo młodych, a nawet we wszystkich podług zdania niektórych botaników, daje się spostrzedz bryłką ziarnkowatą, mającą kształt kulki lub częścię soczewki, leżąca na wewnętrznej powierzchni, lub czasami jakby zagłębiona w błonę (fig. 63). W ogóle staje się ona coraz niewyraźniejszą w miarę rozwijania się komórki, a nakoniec zanika zupełnie. Jednakże w niektórych częściach i w pewnych roślinach trwa ciągle. Nazwano ją *jąderkiem komórki* (nucleus cellulae), nazwa, którą Schleiden radzi zastąpić imieniem *cytoblastus* (κύττος, wydrążenie, komórka; βλάστος, pączek, zarodek), ze względu czynności jaką przypisuje jąderku, tworzenia w skutek dalszego swego rozwijania się komórek, których przeto byłoby niejako zarodkiem.



63. Młode komórki z jąderkami *n n n*, wzięte z buraka.

Ziarnka znajdujące się w komórkach, są niekiedy tak liczne i skupione, że łączą się (szczególniej po wyparowaniu plynów) w jedną bryłę zbitą, która wypełnia całe prawie wnętrze komórki; w innych razach są wyraźne i leżą każde z osobna. Przyrodzenie ich jest rozmaite, o czém można wnosić z rozmaitej ich postaci a nadewszystko z różnego sposobu działania na nie pewnych istot, mianowicie roztworu jodu, zwykle używanego w tym celu przez postrzegaczy. Puściwszy kroplę tego roztworu na komórki, których zawartość badamy, widać jak ziarna przyjmują barwę, raz brunatną lub bledziej albo mocniej żółtą, drugi raz niebieską lub ciemniej albo jaśniej fioletową. W pierwszym razie można zwykle uznać ziarnka te za zawierające saletroród, za ziarnka *białka* (albumen), lub *sérownika* (caseinum); w drugim przekonujemy się, że ziarnka złożone są z istoty, która zupełnie pozbawioną jest saletrorodu, a która jest nadzwyczaj obfita w roślinach; ma wielkie znaczenie w ich odżywianiu; tą istotą jest *skrobia* czyli *krochmal* (amylum). Ziarnka te rozpoznać można nie barwiąc ich nawet, po pewnych piętnach tyjących się ich postaci, która zwykle przedstawia niekształtną kulę lub wielościan, na którym dają się widzieć liczne okręgi spółśrodkowe, nakreślone około jednego punktu, leżącego zwyczajnie na kraju ziarna. Punkt ten czyli *znaczek*, odpowiada punktowi błony wewnętrznej komórek, na którym osadziła się pierwsza warstwa ziarnka skrobi, potem druga, która posunęła pierwszą ku wewnątrz komórki, potem trzecią, która podobnie posunęła drugą i tak następnie. Ztąd ziarno skrobi uważać można za złożone z pewnej ilości warstewek lub krążków ułożonych w stos jedne na drugich, jużto prosto, już ukośnie i tém późniejszych i większych, im się bardziej zbliżają do znaczk; tém zaś starszych i twardszych im się bardziej od niego oddalają. Może się zdarzyć, że dwa lub trzy najbliższe ziarnka zlewają się w jedno, w którym wtedy spostrzegamy dwa lub trzy wyraźne znaczk; lecz wzrastanie dalsze, odbywa się zawsze na jednym z nich, gdzie układają się warstewki powstające po tém połączeniu. Wchodząc w drobniejsze szczegóły, spostrzedz można, że kształt ziarenek niejednakowy jest w skrobi różnych roślin, lecz jest tak jednostajny w jednym i tymże samym gatunku, że wprawne oko zdoła rozpoznać z jakiego jest wzięta. I tak weźmy przykłady najbardziej

znane:  
z ziem  
rozy (fi  
dostał  
rozezn  
płatki  
roztwor  
biorą b  
zawiera




Obec  
cze czy  
zwicko  
nakszt  
które z  
jod daj

§ 22  
ształy  
w nar  
liczne  
roślin  
szcza  
twory  
mionk  
Te róż  
w wyd  
jedno  
rzenia  
skrysta  
wszyr  
które  
wało

64. E  
65. 2  
66. 2

znane: i porównajmy płatki nadzwyczaj cieniutkie, odcięte z ziemniaka (fig. 64), z ziarna żyta (fig. 65) i z ziarna kukuruzy (fig. 66), a ujrzymy, że ziarnka skrobi wszystkich trzech dostatecznie się od siebie różnią, aby mogły być z łatwością rozeznanne. Jeśli do kropelki wody, w którą zwykle kładziemy płatki odcięte aby nie wyschły, dodamy znacznie mniejszą ilość roztworu jodu, zobaczymy jak w téjże chwili ziarnka przybiorą barwę i odznaczą daleko wyraźniej komórki, które je zawierają (fig. 64).



Obecność także licznych ziarenek daje nam poznać mleczce czyli soki właściwe, krążące w naczyniach którym dają nazwisko (fig. 55, 56, 57); są one tu w ogóle bardzo małe, nakształt drobnego proszku, lecz nierówne między sobą; niektóre z nich większe od innych i często dziwacznej postaci, jod daje nam poznać jako ziarnka skrobi.

§ 22. Bardzo często napotykamy we wnętrzu komórek kryształki; obecność ich niema w sobie nic zadziwiającego, gdyż w narzędziach rośliny, tworzą się w skutek samego rośnięcia liczne kwasy (np. szczawiowy, jabłkowy i t. d.); prócz tego roślina czerpie z powietrza i z ziemi kwas węglowy rozpuszczalny w wodzie. Z drugiej strony, w ziemi znajdują się roztwory alkaliów nieustrojowych, jakoto: wapna, potażu, krzemionki, które bywają wessane przez rośliny i krążą z sokami. Te różne roztwory muszą częstokroć spotykać się z sobą w wydrążeniach rośliny; a jeśli ciała w tychże zawarte, mają jedno do drugiego dostateczne powinowactwo i własność tworzenia razem związków nierozpuszczalnych, będą się mogły skryształizować w sole różnego przyrodzenia i postaci. Na pierwszy rzut oka, zdaje się, że to jest działaniem czysto-chemicznem, które się odbywa we wnętrzu komórek, tak jakby się odbywało w jakimkolwiek naczyniu, w którymby roztwory te zo-

64. Komórka napelniona ziarnkami skrobi, wzięta z ziemniaka.

65. Ziarnka skrobi z żyta.

66. Ziarnka skrobi z kukuruzy.

stały zmieszane i zostawione w spoczynku; a ponieważ kryształy znajdują się tém obficie, im starszym jest miękisz i im bardziej działalność jego żywotna jest osłabioną, możnaby się utwierdzić w tém mniemaniu, że tworzenie się ich zależy od sił nieustrojowych, nie zaś od życia. Jednakże następuje się tu wiele uwag przemawiających za mniemaniem przeciwném, wspartém nadewszystko świeżemi postrzeżeniami Payena, podług których kryształy nie tworzą się i nie pływają wolno w komórce, lecz istnieje oddzielny, należycie zbudowany przyrząd, który je tworzy i zawięra. Z jednego punktu ściany komórki, wychodzi sznurek złożony sam z komóreczek mniejszych, na którym zawieszona jest bryłka będąca drobną, jakby dopiero rozwijającą się tkanką komórkową (fig. 67). We wnętrzu właśnie komóreczek składających



67.

ową bryłkę, gromadzi się i krystalizuje istota nieustrojowa, jakoby w żyłce kruszcu, i komórki właśnie zdają się określać jej granice i postać; ztąd jedna i ta sama sól, np. szczawian wapna, może się w roślinach krystalizować w rozmaite kształty zupełnie od siebie różne, a zależące od różnic przyrządu, w którym się odbywa krystalizacja. Bryłka

komórkowa daje się widzieć przed i po złożeniu w niej soli; lecz w ostatnim razie bardziej jest rozwinięta, wyraźniejszą co do swjej postaci, szczególnie po rozpuszczeniu soli w odczynnikach nie naruszających tkanki. Bez użycia bowiem tego środka, tkanka ustrojowa odziewająca kryształ, uchodzi oka dla cienkości swych błon, ściśle przystających do powierzchni kryształów.

Niekiedy komórka zawiera jeden tylko albo kilka kryształów, i wtedy objętość ich znaczna, dozwala rozemnać dokładnie ich postać. Lecz częściej napotyka się kryształy liczne, skupione i tak małe, że oznaczenie ich staje się trudnem i niepe-

67. Pokład tkanki komórkowej, wziętej z liścia figi sprężystej (*Ficus elastica*), w której się tworzą kryształy, mające postać jądra najeżonego kolecami *n*. Jądro to zawieszono jest na nitce *s*, w komórce bardzo obszernej *c*, leżącej pod naskórkiem i otoczonej komórkami mniejszemi *u*, które zawierają ziarenka ubarwione zielenią.



wném  
chodząc  
Wpierw  
większe  
ich prz  
listego  
nego z  
(fig. 68.  
się jak  
(fig. 70  
ślizne,  
dia).  
wyłąc  
mówili.



Op  
umies.  
Błąd t

68. 7  
ków na  
69. 1  
(Rheum  
70. 7  
zieleni  
71. 7  
także z  
72.  
napelni  
rej stér

wném. Wtedy układają się zwykle albo promienisto, to jest wychodząc ze wspólnego środka, albo też równoległe od siebie. W pierwszym przypadku są one większe lecz krótsze, a ogół ich przybiera postać jądra kulistego lub jajowatego, najeżonego zewsząd małemi kolcami (fig. 68, 69); w drugim wydają się jak wiązka cienkich igiełek (fig. 70, 71). Teto kryształki, wzięte zrazu za narzędzia roślinne, za rodzaj włosów, otrzymały nazwisko *igiełek* (raphidia). Godném uwagi jest, że obecność kryształku w komórce, wyłącza zazwyczaj obecność ziarenek ustrojowych, o których mówiliśmy wyżej.



Opisywano czasami kryształy, a mianowicie *igielki*, jako umieszczone w przewodach lub przerwach zewnątrz komórek. Błąd ten pochodzić może z wielu przyczyn: najczęstszą i naj-

68. Tkanka komórkowa z buraka; w jednej z komórek zbiór kryształków najeżonych *a*. — *c* Kryształki odosobnione.

69. Kryształki skupione, wydobyte z komórki ogonka rabarbaru falistego (*Rheum undulatum*).

70. Tkanka komórkowa obrazków pospolitych (*Arum vulgare*). Ziarnka zieleni *g*, wypełniają wiele komórek; w innych widać wiązki igiełek *r r*.

71. Wiązki igiełek w komórce obszerniej, otoczonej mniejszemi, wzięte także z obrazków.

72. Płatek tkanki z rośliny obrazkowatej (*Colocasia odora*). Komórki napełnione ziarnkami zieleni *g g*, zostawiają między sobą przerwę, w której sterczą cztery inne komórki zawierające wiązki, igiełek *r r r r*.

bardziej przyrodzoną, jest rozproszenie tych ciałek przy robieniu odcinków z rośliny, które wymaga wielu starań i zręczności, aby nie rozedrzeć ścian komórek; często bowiem nóż przecina takowe, rozłącza igielki i przenosi je w którekolwiek z wydrżeń sąsiednich. Lecz można niekiedy napotkać wiązkę igielek sterczącą w przerwach lub zajmującą takowe prawie całkowicie, chociaż tkanka nie zostanie obrażoną. Komórki bowiem, w których się tworzą kryształy, rozwijają się niekiedy tak nadzwyczajnie, że wewnątrz ich zda się być przerwą (fig. 71), albo też leżąc na ścianie prawdziwej przerwy, sterczą w jej wnętrzu (fig. 72), które wtedy zdaje się samo zawierać kryształy. Dotychczas przeto znaleziono kryształy tylko w wydrżeniach komórek.

Wprawdzie można czasem napotkać w przewodach lub przerwach istotę niustrojową, złożoną z krzemionki lub kwarcu krzemionkowego, ale tylko w bryłkach niekształtnych.

§ 23. Komórki, które składają największą część ziarn pszenicy i innych zbóż tak bogatych w skrobią, z których otrzymujemy mąkę, zawierają nadto w swych wydrżeniach istotę miękką i sprężystą, która je wypełnia i zlepia ziarnka skrobi. Ta istota nazwaną została *klajstrem* (gluten).

§ 24. Inne istoty posiadają gęstość coraz mniejszą, nie będąc jednak jeszcze płynnymi; ukazują się one w postaci płatków obłóczkowatych lub w postaci galarety: taką jest istota zwana *zielenią* (chlorophyllum), która tak wielkie ma znaczenie w życiu rośliny i nadaje im barwę. Pływa ona w rozcieku zawartym w komórkach i osadza się na częściach stałych, które się z nią stykają, na ścianach wewnętrznych komórek i na ziarnkach jakże się w tychże znajdować mogą; dlatego jedni brali ją za płyn zielony, inni za bryłki ziarnek téjże barwy. Lecz płyny i ziarnka są same przez się bez barwy, i przybierają taką od warstewek je obłóczających. Ziarnka więc zieleni mogą również jak te któreśmy już dotąd przejrzeni, zajmować różne położenie: mogą przylegać do powierzchni wydrżeń, lub pływać w rozcieku tamże zawartym; mogą okazywać różne kształty i wymiary, i bez wątpienia mogą także być różnego przyrodzenia. Widzimy, że wiele z nich barwi się niebiesko za użyciem roztworu jodu, co przekonywa, że są ziarnkami skrobi. Inne brunatnieją, czy to dlatego, że zielona obłóczka jest bardzo gruba i nie dopuszcza jodowi wpływać na

jąderko  
czne zi  
rzą prz  
rzona p  
rozpusz  
dobieńs

Istota  
zieleni  
blesko,  
puszcza  
mórek j  
oskolni  
tworze  
téz pier  
wstana,  
jących k  
rozpusz  
puszczo  
łożony  
syé gle

§ 25  
przyro  
tych n  
umiesz  
że nie  
zawier  
prawie  
stępuje  
pod wp  
a starze  
ziarnka  
piéro z  
rze osk  
niaczn  
na czyn  
we wsz  
mniema  
żenia ca

jąderko, czy też że istota ziarenek jest odmienna. Często liczne ziarnka zlepione są razem jakby galaretą zieloną i tworzą przez to ziarnko złożone. Część rośliny zielona, zanurzona przez czas niejaki w wysokoku, traci barwę, co dowodzi rozpuszczalności zieleni w tym płynie, i pozwala wnosić o podobieństwie jej z żywicami.

Istota barwiąca niekiedy komórki żółto, zdaje się być blizką zieleni co do przyrodzenia i własności; zaś barwiąca je niebiesko, różowo lub fioletowo, jest płynem wodnistym i rozpuszcza się też zupełnie w wodzie. Częściej jeszcze płyn komórek jest prawie bezbarwnym, tak jak ten który pod imieniem oskolnicy, wstępuje przez cewki. Oskolnica zawiera już wroztworze niektóre istoty, które się gromadzą w komórkach, albo też pierwiastki, przez których połączenie istoty takowe powstają. Znajdujemy jeszcze w komórkach lub przerwach, mających kształt zawieralników, płyny innego przyrodzenia: gumę rozpuszczoną w wodzie, oleje tłuste i lotne, w których rozpuszczone są żywice. Gazy napotkać można w przerwach położonych albo ku powierzchni rośliny, albo nawet niekiedy dosyć głęboko.

§ 25. Widzimy z tego co się powiedziało, że istoty różnego przyrodzenia i różnej gęstości, napełniają wydrążenia rozmaitych narzędzi składających roślinę, a to nie bez wyboru, lecz umieszczone koniecznie w tém, a nie inném narzędziu. Jednakże nie trzeba sądzić, że jedno i to samo narzędzie musi stale zawierać tę samą istotę; działanie żywotne sprawia tu zmiany prawie ciągłe, i tylko z zawieszeniem lub ustaniem życia, następuje stan niezmienny i ciągle trwający. Komórka zzieleniała pod wpływem światła, nie posiadała wprzód żadnej barwy, a starzejąc się zmienia ją rozmaicie; zanim napełnioną została ziarnkami zsiadłemi, zawierała tylko płyny; później także dopióro zawiera kryształy; naczynia prowadzące o pewnej porze oskolnicę, w innej napełnione są tylko powietrzem. Badania czynione w jednej tylko epoce, rzuciłyby więc błędne światło na czynności wszystkich tych narzędzi, które trzeba postrzegać we wszystkich pojawach ich życia, i bez wątplenia dlatego mniemania w tym przedmiocie tak są różnorodne, że postrzeżenia czynione były tylko urywkowo.

## NARZĘDZIA ZŁOŻONE.

§ 26. Narzędzia proste, których główne odmiany opisaliśmy, łącząc się z sobą, tworzą *narzędzia złożone*. Te znowu mniej lub bardziej powiązane, mniej lub więcej liczne, łączą się z sobą dla utworzenia rośliny. Najpewniejszym środkiem do poznania ile możności dokładnego wszystkich tych narzędzi, stanowiących ogółem swoim postawę, a czynnościami swemi życie rośliny, jest badać też roślinę od początku, to jest w postaci jej najprostszej i śledzić dalej jej rozwijanie się, zbierając wszystkie przemiany jakim podlega, rozbiierając wszystkie części które jej przybývają.

§ 27. Pierwszą postacią w jakiej się roślina okazuje, jest komórka (fig. 74, 75 E<sup>1</sup>) napełniona istotą ziarnkową (fig. 75 E<sup>2</sup>). Są rośliny, które przez czas całego swego istnienia mało co wyżej wznoszą się nad ten stopień największej prostości, a wszystkie zaczynają od niego, nawet te, które później dosięgają najwyższego stopnia ustrojności roślinnej. Pierwszy okres życia jestestw ustrojnych jest ten, kiedy stanowią jeszcze cząstkę jestestw sobie podobnych, w których się tworzą i które je rodzą. Nazywają się one wtedy zarodkami, a okres ten ich życia zarodkowym.

Zarodek więc rośliny jest zrazu komórką zawierającą w wydrążeniu swoim ziarnka (fig. 73); jedyne zmiany, jakie zachodzą przy rozwijaniu się niektórych zarodków, tyczą się ich okryw i istoty w nich zawartej; niekiedy także inne komórki gromadzą się około pierwszej; lecz w tej małej i jednostajnej bryłce, niepodobna jest odróżnić wielu części, wielu okolic odrębnych.

§ 28. Często przeciwnie, roślina w stanie zarodka nie tylko powiększa się znacznie przez nagromadzenie dość wielkiej ilości komórek, lecz przybiera kształty całkiem wyraźne i wcześniej można w niej rozeznaczyć dwie różne od siebie kończyny. Jedna idzie w kierunku osi zarodka i jest mniej więcej kształtnie jajowata, druga zbacza nieco od tej osi, tworząc albo je-

73. Zarodek bezliścienny porostnicy gwiazdkowej (*Marchantia polymorpha*). Takie zarodki nazywają się *zarodnikami (spora)*.



73.

dnę bro  
brodaw  
dzy któ

Z ty  
dones)

zarode

zarode

siadają

beziłie

§ 2

wszry

zank

cierzy

cie w

nych

większ

liścien

ry),

powsta

74. Z

tum). W

jest jesz

c, zaczy

75. Z

żnych o

komórk

E<sup>4</sup> kied

wyrażn

dnę brodawkę położoną bocznie (fig. 74 E<sup>4</sup> c), albo też dwie brodawki umieszczone naprzeciw siebie (fig. 75 E<sup>4</sup> c c), między którymi przechodzi oś.




Z tych brodawek utworzą się tak zwane *liścienie* (cotyledones). Już więc w tym okresie mamy trzy odmiany zarodka: zarodek jednorodny bez części osobnych, bez liścieni (fig. 73); zarodek posiadający jeden liścień (fig. 74 E<sup>4</sup>) i zarodek posiadający takowych dwa (fig. 75 E<sup>4</sup>). Pierwszy nazywa się *beźliściennym*, drugi *jednoliściennym*, trzeci *dwuliściennym*.

§ 29. W ogóle zarodki liścienne nie przestają na tym pierwszym stopniu rozwinięcia narzędzi je składających, lecz zamknięte w ziarnie, przytwierdzone jeszcze do rośliny macierzystej, rosną we wszystkich swoich częściach, a mianowicie w liścieniach, czy w pojedynczych (fig. 76 c), czy podwójnych (fig. 77 c), które stanowią znaczną, a niekiedy nawet większą część zarodka wykształconego. Koniec przeciwny liścieniom nazwany został *kielkiem* (radicula) (też same figury r), czyli *korzonkiem*, gdyż właśnie z jego rozwinięcia się powstaje korzeń rośliny. Nad kielkiem na przedłużeniu osi

74. Zarodek jednoliścienny rdestnicy przerosłej (*Potamogeton perfoliatum*). W różnych okresach rozwijania się: E<sup>1</sup> zaraz po ukazaniu się, kiedy jest jeszcze komórką; E<sup>2</sup> kiedy się składa z trzech lub więcej komórek skupionych. E<sup>4</sup> kiedy różne jego części, kielek r, rostek g, liścień c, zaczynają być wyraźnymi.

75. Zarodek dwuliścienny z gatunku wiesiolku (*Oenothera crassipes*) w różnych okresach rozwijania się. E<sup>1</sup> zaraz po ukazaniu się kiedy jest jeszcze komórką. E<sup>2</sup> E<sup>3</sup> kiedy się składa z trzech lub więcej komórek skupionych. E<sup>4</sup> kiedy różne jego części, kielek r, rostek g, liścienie cc, zaczynają być wyraźnymi.

sposprzegać się daje, pomiędzy liścieniami jeśli takowych jest dwa (fig. 75 *g*), lub we wklęsłości nasady liścienia, kiedy ten jest pojedynczym (fig. 76 *g*), ciałko daleko mniejsze od dopięro wymienionych. Na pierwszy rzut oka ma ono także postać brodawki, lecz badane uważniej i przez szkła powiększające, okazuje się złożonem z wielu blaszek bocznych względem osi, tak jak liścienie, których też postać początkową przypo-



minają. Te małe blaszki rozwiną się później w liście; ogółowi ich nadano imię *rostka* (gemmula, plumula), czyli *pączuszka*, ponieważ tak nazywa się połączenie liści nierozwiniętych i nagromadzonych na osi bardzo krótkiej, która się ma rozwinąć w gałązkę. Liścienie są także tylko jednym lub dwoma pierwszymi liśćmi młodej rośliny, lecz zwykle różniąciami się od następnych co do postaci i czynności. Zarodek przedstawia nam przeto poczet narządzi bocznych czyli liści osadzonych na osi, której kończyzna niepokryta liśćmi, stanowić będzie korzeń, a reszta utworzy łodygę. Ta zowie się w zarodku *łodyżką* (cauliculus).

76. Zarodek jednoliścienny rdestnicy przerosłej prawie dojrzały. — *r* Kielek. — *t* Łodyżka. — *c* Liścien. — *g* Rostek.

77. Zarodek dwuliścienny dojrzały migdału pospolitego. *r* Kielek. *c* Liścienie.

78. Tenże z odsłoniętymi częściami, które się pomiędzy liścieniami ukrywają, po odjęciu jednego z liścieni. *r* Kielek. *t* Łodyżka. *c* Liścien pozostały. *ic* Blizna powstała przez odjęcie drugiego liścienia. *g* Rostek złożony z wielu listeczków.

§ 30  
nazwan  
ścienly  
w skut  
tak na  
je też  
odmian

§ 31  
i po tel  
jednak  
połącz  
mórki  
nadew  
we w  
wyłąc  
nastep  
odłącz  
wodu  
służy  
rodku  
już po  
wiazk

§  
zuies  
mi w  
zwija  
ów d  
pomie  
miejsc  
wia z

§ 3  
pożyw  
to w  
podle  
nowe  
ją się  
wotr  
Zrazu  
możn  
kielek

§ 30. **Narzędzia zasadnicze.** Narzędziami zasadniczemi nazwane być mogą trzy owe części, już w samym zarodku liściennym bardzo wyraźne. Wszystkie zaś inne, które się w skutek rozwijania dalszego rośliny pojawiają, mimo różnic tak na pozór uderzających, mimo różności imion, któremi je też oznaczamy, są teraz w znaczeniu ogólném uważane za odmiany tylko owych narzędzi pierwotnych.

§ 31. Pierwotne zaś te narzędzia rozeznajemy w kształcie i po ich względném położeniu, gdyż skład ich ostateczny jest jednakowy; jestto zbiór komórek mniej lub bardziej wietko połączonych. Kiedy zarodek jest zupełnie wykształcony, komórki jego liścieni są zwykle mniej lub więcej bogate w skrobią, nadewszystko jeśli liścienie są znacznej grubości; wtedy takowe wypełniają zazwyczaj całe nasienie i przeznaczone są wyłącznie do żywienia młodej roślinki w pierwszych chwilach następujących po okresie życia zarodkowego, to jest kiedy odłączona od rośliny macierzystej, zaczyna żyć osobno. Z powodu właśnie nagromadzenia skrobi w zarodkach, wiele nasion służy za żywność dla ludzi i zwierząt. Kiedy liścienie w zarodku już są bardzo rozwinięte, a szczególnie kiedy posiadają już postać liści, można w nich znaleźć w pewnych kierunkach, wiązki komórek podłużnych; są to pierwsze początki naczyń.

§ 32. Po rozsianiu się nasion, które możnaby uważać za zniszczenie jajek roślinnych, jeśli takowe otoczone będą pewnymi warunkami, sprzyjającymi dalszemu i niezależnemu ich rozwijaniu się, zostaną niejako wysiedziane i roślina zaczyna ów drugi okres swego życia, który się nazywa *wschodzeniem*; pomiędzy zaś warunkami wspomnianymi, pierwsze zajmuje miejsce pewien stopień wilgoci i ciepła, jaki zwykle przedstawia ziemia jeśli w nią niezbyt głęboko wsadzimy nasiono.

§ 33. W pierwszych chwilach wschodzenia, roślina bierze pożywienie z siebie samej, ze związków nagromadzonych czy to w okrywach nasiennych, czy też w liścieniach. Związki te podlegają różnym chemicznym przemianom, wywołanym przez nowe okoliczności w jakich nasiono będzie umieszczone, i stają się przeto zdolnymi do wzięcia udziału w działaniach żywotnych roślinki. W skutek tego, kiełek i rostek wzrastają. Zrazu prędzej się odbywa rozwijanie pierwszego, i wtedy można się przekonać, że tylko kończyzna części osi nazwanej kiełkiem i leżącej poniżej liścieni, należy właściwie do korze-

nia i kieruje się na dół; reszta zaś kieruje się do góry i należy do łodygi. Korzeń poznać można łatwo po nitkach drobnych, które przykrywają całą jego powierzchnię (fig. 120 *b*, *rr'*) i którymi zaczyna wciągać soki ziemne. Wkrótce i rostek przedłuża się i ukazuje także, odpychając liście lub liścienie



które go okrywały. Listki składające go, otwierają się (fig. 79, 81 *g*) kolejno z dołu do góry osi, to jest tém wcześniej im są niższe; w miarę wzrastania liści i powiększania się ich liczby, liścienie wyczerpują się, cieńszeją, pochylają w dół, a w końcu

79. Zarodek wschodzący jednoliścienny trawnicy błotnej (*Zannichellia palustris*), podobny do zarodka rdestnicy. — *m* Szyja, punkt środkujący między łodygą *t*, i korzeniem *r*. Widzimy iż korzeń pozostał z brodawki końcowej (fig. 76 *r*), leżący u spodu zarodka pod rozszerzeniem, które tu ma postać jakby kołnierzyka *m*. — *c* Liścień. — *g* Rostek, którego pierwszy liść wyglądający z pochwy liścienia, ukrywa inne.

80. Zarodek dwuliścienny wschodzący z gatunku klonu (*Acer negundo*). — *m* Szyja. — *r* Korzeń. — *t* Łodyga. — *g* Rostek.

81. Część wyższa tegoż bardziej rozwinięta. — *c* c Liścienie. — *g* Rostek, którego pierwsze listki już są

79. otwarte.

zwykłe kształt go, ja Jednak średnic

§ 35 cych si z liście wnątrz Nie wy w skut rodku. Narzęp dłuza,

§ 35 niem s składa

żnych dwuliś wyrost wiają rostk Pącz stopr dygi piérw kami, w jak stania, razy, jedyni rozwij a opis gałęzi ostiach i co d dzenie podleg liści.

zwykle opadają. Liście nowe różnią się w ogóle od nich kształtem (fig. 81) i dążą coraz bardziej do przybrania takiego, jaki posiadają nareszcie, rośliny zupełnie wykształconej. Jednakże liście pierwsze, a mianowicie te, które leżą bezpośrednio nad liścieniami, różnią się jeszcze często od innych.

§ 34. Kiedy roślina uwolniła się od swych okryw, stających się teraz niepotrzebnymi, kiedy nie biorąc już pożywienia z liścieni, które uschły lub opadły, czerpie je całkowicie z zewnątrz, wtedy rzecz można, że wschodzenie skończyło się. Nie wywołało ono pojawienia się części nowych, lecz uczyniło w skutek rozwinięcia, widoczniejszymi te, które istniały w zarodku, to jest narzędzia zasadnicze: łodygę, korzeń i liście. Narzędzia te nie przestają rosnąć, a w miarę jak się oś przedłuża, ukazują się na jej bokach nowe liście.

§ 35. Rośnienie niektórych roślin jest takim tylko rozwijaniem się przez dłuższy lub krótszy przeciąg czasu; przeto też składają się one z pojedynczej tylko osi, otoczonej liśćmi różnych kształtów. Lecz bardzo często, szczególnie w roślinach dwuliściennych, na pewnych punktach łodygi, ukazują się małe wyrostki nazwane pączkami, które rozwijając się, przedstawiają z kolei wszystko to, cośmy widzieli przy rozwijaniu się rostka: to jest wydają liście w około osi, która się przedłuża. Pączek więc, a później gałązka, która jest tylko wyższym stopniem jego rozwinięcia, tém tylko różni się od rostka i łodygi otoczonej liśćmi, że wyrasta z łodygi a nie z ziemi. Ta pierwsza gałązka może z kolei sama znów pokryć się pączkami, które zostają względem niej w takim samym stosunku, w jakim ona zostawała względem łodygi. Sposób ten wzrostania, który się może powtarzać większą lub mniejszą ilość razy, i którego skutkiem jest rozgałęzienie się rośliny, jest jedynie tylokrotném powtórzeniem tego, co nam przedstawiało rozwijanie się pierwszej osi, znajdującej się już w zarodku; a opis tego, jest zarazem opisem rozwijania się wszystkich gałązek. Na wszystkich napotykamy tylko liście osadzone na osiach, różniących się wprawdzie co do porządku następstwa, i co do wieku, lecz posiadających zawsze też samo przyrodzenie. Zajmijmy się więc badaniem zmian, jakim stopniowo podlega pierwsza oś, co do swój budowy i co do budowy liści.

§ 36. Badanie to podzieli się oczywiście na trzy rozdziały: o łodydze, korzeniu i liściach; lecz te rozmaite części posiadają jedną wspólną im wszystkim: jestto okrywa cienka, obciągająca całą powierzchnię rośliny, nazwana *naskórkiem* (epidermis), a którą zajmujemy się nasamprzód.

## NASKÓREK.

§ 37. Przez długi czas mniemano, że naskórek należy do tkanki komórkowej, którą pokrywa, że jest tylko częścią jej najzewnętrznąszą, która twardniejąc w jednej lub więcej warstwach, zwolna zostaje zmienioną, w skutek zetknięcia się z powietrzem. Tak jest w istocie w pewnej ilości roślin bardzo prostych pod względem swój ustrojności; lecz w innych komórki tworzące naskórek, są w ogóle tak różne co do postaci, wymiarów, sposobu połączenia i zawartości, od tkanki pod nimi leżącej, że dziś zgodzono się, aby naskórek uważać za układ zupełnie odrębny.

§ 38. Uważmy go najprzód na częściach znajdujących się w zetknięciu z powietrzem, na łodygach i liściach. Ono właśnie daje się oddzielić z większą lub mniejszą łatwością, od powierzchni narzędzi tych młodocianych, w postaci błony części bezbarwniej i przezroczystej. Czasem nie wymaga to żadnego szczególnego przygotowania, czasem zaś oddzielenie następuje dopiero po krótszym lub dłuższym moczeniu, przez które tkanka komórkowa, pod naskórkiem leżąca i nietylko co on wytrwała, zostaje zniszczoną. Jeśli moczenie trwa długi czas, naskórek zostanie także naruszonym, i tym sposobem przekonamy się że jest złożony z dwóch części. Z tych jedna, trwalsza i zewnętrznější, jest skóreczką cienką i jednostajną, rozciągniętą na całej powierzchni (fig. 82, *p p*), druga wewnętrzniejsza, jest właściwym naskórkiem utworzonym z komórek obok ułożonych (fig. 82 *e e*).

§ 39. W ogóle komórki te posiadają wymiary prawie równe, a kształt tabliczkowaty, i tworzą pojedynczą warstwę jednostajnej grubości (fig. 83 *e e*). Prawie zawsze większe są od komórek tkanki pod nimi leżącej, chociaż znajdujemy czasem, że przeciwnie bywają mniejszemi, np. w sldze sprężystej (*Ficus elastica*); w śniedku leśnym (*Ornithogalum sylvaticum*). Umieściwszy przezroczystą blaszkę naskórka na płask pod

mikrosk  
ich n  
nieksz  
złożon  
a częś  
żykow  
W pier  
częstsz  
napoty  
kąt lu  
W ka  
ka odr  
ny bo  
ną, i ś  
Ściany  
mocno  
ścianar  
dnich,  
połącz  
wych,  
przy b  
stople




82. F  
(Iris ge  
kształt  
szóstok  
83. F  
połączen  
lonym s  
we m.  
84. F  
dnego w


mikroskopem, komórki ukazują się bardzo wyraźnie; obwody ich na powierzchni zewnętrznej są kształtne (fig. 82), lub niekształtne (fig. 84), złożone z linii prostych, a często także z linii wężykowatych (fig. 85). W pierwszym razie najczęstsze kształty jakie się napotykają, są czworokąty lub sześciokątne.

W komórkach naskórka odróżnić można ścianę boczną, ścianę dolną, i ścianę górną. Ściany boczne spojone są mocno z odpowiednimi ścianami komórek sąsiednich, i z tego


ścisłego połączenia wynika nieobecność przestworów międzykomórkowych, tudzież wytrzymałość całej błony. Komórki lubo cieńsze przy brzegach niż w środku, posiadają jednak i tam znaczny stopień grubości.



82.



83.



84.

82. Płateczek rozpostarty naskórka, wzięty z liścia kosaćcu pospolitego (*Iris germanica*). — Naskórek *pp* przeszyty jest otworkami mającymi kształt dziurki od guzików *f*; pod nim właściwy naskórek *ee*, o komórkach sześciokątnych podłużnych. — *s s* Szparki.

83. Przecięcie pionowe naskórka tegoż samego liścia, pokazujące ścisłe połączenie komórek naskórkowych między sobą, a wietkie z miękiszem zielonym spodnim *p*, w którym widać przerwy *l* i przestwory międzykomórkowe *m*. — *s* Szparka.

84. Kawalek naskórka wziętego z powierzchni górnej liścia jaskru wodnego wystającego nad wodę. — *ee* Komórki naskórka. — *s s s* Szparki.

Ztąd też wydrążenia ich są przedzielone od siebie paskami dość szerokimi, które pod szkłem wydają się określone dwiema cienkimi linjami, co dało powód do złudzenia, wskutek



85.

którego niektórzy pisarze przypuszczali niegdyś bytność uplotu drobnych naczyń, w przedziałach komórek naskórka; mianowicie w przypadkach kiedy obwód tych nie jest wężykowaty (fig. 85). Te mniemane naczynia, są przeto tylko ścianami samych komórek.

Ściana dolna w zwykłych przypadkach, kiedy naskórek składa się z pojedynczej warstwy, spoczywa na komórkach tkanki spodniej i

spojona jest z niemi daleko słabiej. Ztąd też i ze spojenia komórek naskórka między sobą wynika łatwość, z jaką tenże oddzielać się daje od owęj tkanki, w większych lub mniejszych kawałkach.

Ściana zewnętrzna zostająca w zetknięciu z powietrzem, jest często daleko grubszą od innych, tak że wynosi niekiedy połowę grubości komórki (fig. 91 e). Ściana ta jest

zwyczajnie płaska, czego skutkiem jest równość powierzchni naskórka, lecz

niekiedy każda komórka jest wypukła w środku, i wtedy powierzchnia naskórka badana przez szkło powiększające, wydaje się jakby pokryta brodawczkami lub kolcami (fig. 86 e').

Kiedy ko-

85. Kawałek naskórka wzięty z powierzchni dolnej liścia marzany farsbierskiej (*Rubia tinctorum*). c Komórki naskórka — s Szparki.


86. Przecięcie poziome naskórka liścia z *Rochea falcata*. — Naskórek e składa się z dwóch warstw: komórki zewnętrznej e', wielkie i wdęte; komórki wewnętrznej (przeszyte przy s szparką) maleńkie, mniejsze nawet od miększu zielonego leżącego pod niemi p. — ll Przerwy z których jedna odpowiada szparce.

87. Ka-  
mórek p

mórki bardziej wystają na zewnątrz powstaje włos, lub inne podobne narzędzie (fig. 87 *p*). Nie będziemy tu jednak wchodzić w bardziej szczegółowe badania takowych, toby nam bowiem przerwało wykład ogólniejszy, który nas teraz zajmuje.

§ 40. Szparki (stomata). — Powierzchnia zewnętrzna naskórka pokryta jest na wszystkich miejscach zostających w zetknięciu z powietrzem, małemi plamkami, ułożonemi w pewnych od siebie odległościach, a które za użyciem dostatecznych powiększeń okazują się tyłaż przerwami, obwiedzionemi właściwą wyniosłością. Badając tym sposobem odcinek wzięty z liścia kosańca zwyczajnego (fig. 82) ujrzymy, że takowy składa się z komórek tworzących na powierzchni naskórka sześciokątą podłużną w kierunku długości liścia, ułożone w szeregi proste i bardzo wąskie.

Między bokami mniejszemi sześciokątów, następujących po sobie w dość krótkich odstępach, leżą ciała małe, jajowate (*s s*), opatrzone w środku szparą podłużną, otoczoną wystającym obwodem samychże ciałek. Obwód ten utworzony jest przez dwa ciała nieco łukowate, obrócone wklęsłością ku szparze, wypukłością zaś ku zewnątrz, a końcami połączone z sobą. Porównywano je do warg, a szparę znajdującą się między nimi do ust; ztąd nazwanie *stomata* (στομα, usta), którym teraz oznaczane bywają te narzędzia, posiadające w większej liczbie roślin kształt podobny mniej więcej do tego, jakiśmy opisali w kosańcu. Nie będziemy się tu zatrzymywali nad wyliczaniem wszystkich drobnych odmian postaci, napotykamy bowiem wszystkie pośrednie stopnie między kołem a elipsą bardzo wąską i długą. Zresztą kształt téjże szparki może się zmieniać w miarę zmiany stosunków w jakich się znajduje, w miarę wilgoci lub suchości komórek ją tworzących. Przekonywa nas o tém porównanie pod mikroskopem dwóch połówek jednego odcinka, z których jedna jest zmoczona, druga sucha. W pierwszej wargi szparek są wzdęte i zosta-



87.

87. Kawalek naskórka zdjęty z młodego korzonka marzany. Wiele komórek *p* podłużniejąc, tworzy włoski. Inne *e* pozostają splaszczonemi.

wiają między sobą szeroki otwór, w skutek powiększenia się ich łękowatości; w drugiej wargi te są ściśnione, zbliżone a nawet dotykające się wzajemnie. Łatwo pojąć, że za życia rośliny, przypływ soków musi sprawiać pierwszy z wyżej wymienionych skutków, to jest musi otwierać szparki i utrzymywać spólniczenie części okrytych naskórkiem z zewnątrz.

§ 41. Szparki niezarówno ukazują się na wszystkich częściach rośliny, zostających w zetknięciu z powietrzem; na liściach najobficiej się znajdują, a szczególnie na dolnej ich powierzchni. Ilość ich różni się bardzo według gatunku roślin, i rozumié się, że tém ich jest więcej, im są mniejsze. Dla objaśnienia różnic takowych kilku przykładami, przytaczamy tu liczby przybliżone, jakie podali niektórzy badacze dla liści pewnych roślin.

Ilość szparek liczonych na przestrzeni cała kwadratowego naskórka liści, wynosi:

	Powierzchnia górną.	Powierzchnia dolną.
1. W jemiolu ( <i>Viscum album</i> ).....	200	200
2. Kosańcu pospolitem ( <i>Iris germanica</i> )	11,572	11,572
3. Gwoźdźniku ogrodowym ( <i>Dianthus caryophyllus</i> ).....	38,500	38,500
4. Babce wodnej ( <i>Alisma plantago</i> )...	12,000	6,000
5. Sepocie pnącej ( <i>Cobaea scandes</i> )...	0	20,000
6. Lilaku ( <i>Syringa vulgaris</i> ).....	0	160,000


Przykłady te wybrane ze znacznej liczby innych, dostatecznie wykazują niezmienną różnicę, jaka zachodzić może co do bezwzględnej ilości szparek rozmaitych liści i co do ilości ich względnej na różnych częściach jednego i tegoż samego liścia. Ten ostatni stosunek wyraża dosyć dokładnie stopień różnicy, jaka zachodzić może między dwiema powierzchniami jednego liścia, jak to później obaczymy.

§ 42. Ułożenie szparek jest rozmaite równie jak ich ilość. Jużto zdają się być rozrzucone, bez żadnego porządku (fig. 84 s s s), jużto uszykowane są w szeregi proste, a to zwykle wtedy, kiedy komórki naskórka są podobnie ułożone (fig. 82). Niekiedy szeregi oddzielone są od siebie przestrzeniami równymi, innym razem zbliżone są po dwa lub po trzy, poczem

następuj  
tém zno  
i wielu  
kach, s  
od siebie  
dnak ch  
leży bli  
że wyją  
py, pow  
da więc  
czne pr  
go ułoż  
nach sr  
waty ch  
§ 43  
nie zaw  
na płas  
rodzaju  
wierzch  
dno tan  
pomaga  
takim  
razach  
naskó


88. F  
mentaa  
ki są m  
89. 2  
dnie wy  
m m W  
krawędz  
90. 2  
e e Kom  
rzą wal

następuje pas dosyć szeroki, wcale pozbawiony szparek; potem znowu pas, na którym się one znajdują. W różnych tych i wielu jeszcze innych przypadkach, szparki są zawsze nieco od siebie oddalone; niekiedy jednak chociaż rzadziej, wiele z nich leży blisko siebie i kupkami, tak, że wyjąwszy te właśnie małe grupy, powierzchnia liścia nie posiada więcej szparek (fig. 88). Liczne przykłady tego szczególnego ułożenia, napotykamy w rodzajach srebrnicowatych, ukośnicowatych i łomikamieniowatych.



88.

§ 43. Położenie szparek względem powierzchni naskórka, nie zawsze także jest jednakowe. Patrząc na płatki naskórka na płask położone, nie dojdziemy niczego; do postrzeżeń tego rodzaju, potrzeba robić odcinki cienkie, prostopadłe do powierzchni i któreby przechodziły przez szparki; nie jest to trudno tam, gdzie szparki są dosyć duże, a zresztą przypadek dopomaga nam często, jeśli robimy znaczną liczbę odcinków. Na takim też tylko rodzaju odcieć, można stwierdzić w niektórych razach obecność wielu warstw na sobie leżących, które tworzą naskórek (fig. 56 i 92 e), i oznaczyć dokładnie kształt komó-



89.

90.


88. Płateczek naskórka z liścia łomikamienia wiciowatego (*Saxifraga sarmentosa*). — s s Szparki skupione na powierzchni naskórka, którego komórki są mniejsze około nich niż w miejscach pozbawionych szparek e e.

89. Naskórek sagowcu odwinionego (*Cycas revoluta*). — s Szparka na dnie wydrążenia utworzonego przez ściany komórek przyległych naskórka — m m Wał wystający nad równią naskórka e e, i utworzony przez wystające krawędzie tychże komórek.

90. Naskórek jednej ze srebrnicowatych (*Leucadendron decorum*). — e e Komórki naskórka. — s Szparka, której komórki ścianami górnymi tworzą wał m m.

rek, gdyż inaczej widzielibyśmy zawsze tylko obwód ściany zewnętrznej.

Na odmianach takowych, wziętych z rozmaitych roślin, widzimy, że komórki tworzące szparkę, nie zawsze jednakowo leżą względem reszty naskórka; często nie przerywają jego równi, lecz częściej-bywają pograżone mniej więcej głęboko, czy to że leżą niżej od komórek naskórka (fig. 89 i 91 s), czy też chociaż leżą obok tych ostatnich, znacznie są od nich mniejsze; co spowoduje różnicę w równi (fig. 73 s). Zdarza się nawet, że wyklęsłość zdąży wynikająca, powiększa jeszcze wystawanie ściany górnej komórek otaczających, które się wznoszą nad nią tworząc wał (vallum) (fig. 89 i 91 m m), jakby cembrowinę studzienki, na której dnie leży szparka. Wał ten może istnieć nawet bez zagłębienia, albo należeć do komórek samej szparki (fig. 99 m m).



91.

Rozumię się, że tu może powstać złudzenie, kiedy uważamy szparkę nie na przecięciu pionowem, ale na odcinku umieszczonym poziomo; gdyż wtedy, widziana nie już bezpośrednio, ale wskrós wału, lub wskrós komórek sąsiednich górujących nad nią, musi przybierać postać inną niewłaściwą. Pomieszenie komórek sąsiednich z komórkami szparki, było powodem, że przyznawano téjże skład i kształty daleko rozliczniejsze, niż je w istocie posiada.

§ 44. Kiedy szparki ułożone są kupkami, kupki te zajmują często dno wklęsłości, którą nie dziwnego, iż brano zrazu za samą szparkę. To daje się widzieć w liściach np. płochowca pospolitego (*Nerium oleander*), gdzie powierzchnia górna nie posiada wcale szparek; na dolnej zaś znajdują się w pewnych odległościach małe dołki, szczuplejsze przy otworze,

91. Naskórek innej srebrnicowatej (*Hakea pachyphylla*). — Komórki naskórka w ścianach górnych bardzo grubych. Komórki przyległe szparkowym s, wystają nad nie o całą swą długość i tworzą jakby studzienkę, na której dnie leży szparka. Każda z nich wznosi się oddzielnie w listewkę tworzącą wał m m. — p Miełkisz spodni, którego komórki napelnione są ziarenkami zieleni. — l Przerwa.

niż w  
dnie ty  
maleńk  
włoska  
budow

§ 4  
przyro  
żność  
cie zac  
szcze  
zwy ja  
zywan  
wemi;  
mi. S  
tém oz  
jakięj  
szczeg  
kach.

istotę;  
doje w  
rzający  
kulec  
niekie  
oczy  
same  
i gdy  
żnaby  
leżący  
zawar  
rym w  
nionye  
zwyca  
kszej g

§ 46  
nych, s  
roślin

92. F  
oleander  
rzędow  
włoskan


niż w reszcie obrębu, i całe pokryte włoskami (fig. 92). Na dnie tych dołków znaleziono maleńkie szparki ukryte pod włoskami, lecz posiadające budowę zwyczajną.

§ 45. Jakie jest istotne przyrodzenie szparek? Różność zdań w tym przedmiocie zachodziła i zachodzi jeszcze dotychczas. Same na-

zwy jakie im nadawano, świadczą o tém. W rzeczy samej nazywano je: *otwórkami podłużnymi, wyziewającymi, korowemi; gruczołami prosowatymi, korowemi, naskórkowemi*. Sąż to rzeczywiście gruczoły? Lecz wszakże imieniem tém oznaczamy narzędzia, będące siedliskiem wyrabiania się jakiej szczególnej istoty, a postrzeżenia najbardziej nawet szczegółowe, nie były w stanie odkryć takowej istoty w szparych. Niekiedy znajdujemy wprawdzie na szparych pewną istotę; lecz śledząc jej pochodzenia, dostrzeżemy, że się znajduje w miejscu mniej więcej oddalonym, a nie w ciałkach tworzących wargi szparek. Ciałka te są wydrążone i zawierają kuleczki lub ziarenka (fig. 83 i 84 s) różnego przyrodzenia, niekiedy bezbarwne, częściej powleczone zielenią. Są to więc oczywiście dwie komórki, których utwory są prawie takież same jak pęcherzyków leżących bezpośrednio pod naskórkiem, i gdyby nie oddzielały się zawsze razem z tym ostatnim, można by sądzić, że należą raczej do pokładu komórek pod nim leżących. Powiedzieliśmy dopiero, że mają jednakową z nimi zawartość; zbliżają się też niekiedy do nich i kształtem, a którym właśnie różnią się znacznie od komórek naskórka, napełnionych prócz tego zwykle płynem bezbarwnym, i dlatego zazwyczaj białych lub przezroczystych, według mniejszej lub większej grubości ścian.

§ 46. Dotychczas badaliśmy tylko naskórek części roślinnych, stykających się z powietrzem, i to z wyjątkiem jeszcze roślin niższych. W rzeczy samej nie można powiedzieć, ażeby

92. Kawałek odcinka pionowego z liścia płochowca zwyczajnego (*Nerium oleander*), a mianowicie z powierzchni dolnej. — e Naskórek złożony z wielu rzędów komórek na sobie leżących. — p Mięksisz. — c Wklęsłość opatrzona włoskami, na dnie której dostrzeżono szperek.




92.

grzyby, mchy, i t. d., posiadały prawdziwy naskórek; tkanka komórkowa tworząca całą miąższość rośliny, albo się wcale nie zmienia na jej powierzchni, albo bardzo nieznacznie. Rośliny bezliścienne z ustrojnością bardziej złożoną, jak widłaki i paprocie, zbliżają się do liściennych ze względu naskórka, który posiada podobną budowę i szparki. Rośliny wodne są wcale pozbawione szparek, a nawet i naskórka; a to nie tylko takie, które składają rodziny umieszczone (jak wodorosty, *Algae*) z powodu prostej ustrojności na ostatnim szczeblu państwa roślinnego, ale nawet takie, które niewątpliwie należą do rodzin najwyższych w tém stopniowaniu. Środek to właśnie w którym roślina żyje, spowodowuje obecność lub nieobecność naskórka. Że tak jest niezawodnie, dowodzą liście pływające, których powierzchnia górna, zostająca w zefknięciu z powietrzem, opatrzona jest naskórkiem i szparkami; powierzchnia zaś dolna pozbawiona jest takowych.

§ 47. Korzenie będąc usunięte, chociaż niekoniecznie z pod wpływu powietrza, są również pozbawione szparek (fig. 87); a nawet w ogóle, lubo w nich rozeznac można warstwy naskórka, ten daleko się mniej różni od tkanki pod spodem leżące, niż naskórek łodygi; niekiedy nawet różnica znika zupełnie.

§ 48. **Nadskórek** (*pellicula, cuticula*). — Powiedzieliśmy (§ 38), że moczenie dość długie dzieli naskórek na dwie części; z tych jedna wewnętrzniejsza czyli właściwy naskórek, któryśmy tylko co opisali, pokryta jest w całej swój rozległości drugą cienką skóreczką, towarzyszącą wszystkim wyniosłościom, wszystkim zarysom jej powierzchni. Można to widzieć na liściu kapusty, gdzie nadskórek dość łatwo dający się oddzielić, jest utworzonym zupełnie na wzór pokrytego przezeń naskórka, a to nawet we włosach, których pochwy stanowił (fig. 93 *ppp*). Prócz tego przeszyty jest małemi podłużnemi otworkami na miejscach odpowiednich szporkom (*ff*). Obecność



93. Kawalek nadskórka oddzielenego moczeniem od liścia kapusty. Widać pochwy odpowiadające włoskom w różnym stopniu wykształconym (*ppp*), i dziurki szparek (*ff*).

przeto błony tej jedności, którą napotyamy na powierzchni pewnych roślin, lub pewnych części pozbawionych właściwego naskórka, jest daleko powszechniejszą niż obecność tego ostatniego: dlatego też wielu pisarzy radzi zatrzymać dla niej nazwę naskórka.

Co do jej powstania zachodzi różność zdań. P. Brongniart, któremu winniśmy wiadomość dokładną o naskórku, uważa go za niezależny od warstw spodnich, i przypuszcza, nie bez powątpiewania jednak, że takowy składa się z ziarenek, z powodu, że w niektórych roślinach okazuje na powierzchni wewnętrznej budowę mocno ziarenkowatą; tego jednak nie ma w wielu innych razach. Niektórzy pisarze uważają naskórek jako powstały z osadzenia istoty zsiadającej się, wyrobionej i dostarczonej przez komórki samego naskórka. Mohl utworzył zrazu dowcipną teorią powstawania naskórka, opartą na innej poprzednio wyłożonej (§ 15), według której istota międzykomórkowa, rozlana także między komórkami naskórka i na ścianach ich zewnętrznych, tworzy na powierzchni tegoż błonę jednorodną i dokładnie mu odpowiadającą. Lecz postrzeżenia nowe, spowodowały tego badacza do opuszczenia swojego zdania i przystąpienia mniej więcej do zdania Meyen'a, podług którego skóreczka rzeczona jest tylko częścią ścian komórek naskórka, ścian, które jak we wszystkich komórkach, zgrubiały także przez nowe kolejne pokłady na wewnątrz. Zewnętrzniejsze z tych pokładów, zrazu wyraźne między komórkami sąsiednimi, zrastają się później brzegami i zlewają z sobą tworząc ostatecznie błonę jednostajną. Lecz przypuszczając taki początek, trzeba uważać, że dla utworzenia narzędzia tego, tak różnego już co do samej postaci, ściany zewnętrzne komórek naskórka, muszą się zmieniać szczególnie, muszą zgrubić daleko bardziej, niż inne ściany tych samych komórek, i że ich skład chemiczny zmienia się zarazem w całej tej rozległości; co łatwo można sprawdzić za pomocą pewnych odczynników, np. jodu, który tę część ścian barwi inaczej od innych; podobnie przez kwas siarkowy, który na nią nie działa, a który przeciwnie rozpuszcza wszystkie inne części. Te to nowo nabyte własności warstw zewnętrznych, powodują możność oddzielenia ich od warstw głębiej leżących. Początek naskórka tkómaczy częstą obecność siatki złożonej z linii wystających, które wewnętrzną jego stronę dzielą na zagródki. Linje te od-

powiadają pierwotnym komórkom i powstają ztąd, że grubie nie ściany zewnętrznej rozciągnęło się i na ściany boczne mniej lub więcej głęboko.

Zbadawszy okrywę wspólną narzędzi zasadniczych, powróćmy do nich samych.

§ 49. Widzieliśmy, że oś młodej roślinki rozwija się w dwóch przeciwnych kierunkach. Części wyższej, okrytej liśćmi, podnoszącej się zwykle w górę i będącej w zetknięciu z powietrzem, nadaliśmy nazwę *łodygi* (caulis); część zaś niższą oś, pozbawioną liści i najczęściej zagłębiającą się w ziemię, nazwaliśmy *korzeniem* (radix). Punkt, z którego wychodzą te dwie części, w którym stykają się i łączą, nazywają *szyją* (collum) albo *węzłem żywotnym* (nodus vitalis), ponieważ go uważano za środek życia rośliny, i przyznawano przez to ważność, jakiej w istocie nie posiada; albo nakoniec *zwężeniem* (coartura), z powodu przewężistości osi, jaka się często w tém miejscu w bardzo młodej roślinie znajduje. Z czasem oznaki te zwykle słabieją, zaciągają się, i dosyć jest trudno oznaczyć istotne miejsce szyi po kilku latach rośnienia.


Zastanówmy się najprzód kolejno nad temi dwiema częściami osi, tojest nad łodygą i korzeniem; później nad narzędziami bocznymi (liśćmi), które wychodzą z łodygi.

#### Ł O D Y G A.

§ 50. Według tego jak zarodek jest bezliścienny, jednoliścienny, lub dwuliścienny, łodyga rozwinięta przedstawia różnice tak uderzające, że badanie ich jednoczesne mogłoby pociągnąć za sobą niejaki zamieszanie, i dlatego lepiej będzie mówić o każdej z tych trzech gromad z osobna. Zaczniemy tu od łodyg roślin dwuliściennych, jako będących najstosowniejszym punktem, z którego wyjść można, najlepszym przedmiotem porównania z innymi. W rzeczy samej łodygi te są właściwe wszystkim drzewom naszego klimatu, mogły przeto być postrzegane we wszystkich epokach rozwijania się, w gatunkach najrozmaitszych i pod wpływem rozlicznych okoliczności, a uczący się może bez trudu znaleźć wokoło siebie te przedmioty swojej nauki.

## L O D Y G A R O Ś L I N D W U L I Ś C I E N N Y C H.

§ 51. W zarodku cała łodyżka składa się równie jak inne części z tkanki komórkowej. W czasie wstąpienia, niekiedy później, niektóre komórki zaczynają przedłużać się we włókna, ustrajać w narzędzia, i widać jak mnożąc się, skupiają się w liczne wiązki (fig. 94  $f f$ ), które uważane razem, ułożone są prawidłowo w okrąg. Okrąg ten otacza inne koło środkowe, czysto komórkowe, stanowiące rdzeń (medulla) ( $m$ );



sam zaś jest otoczony od zewnątrz znowu pasem, również komórkowym, który należy do kory; wiązki nakoniec oddzielone są od siebie pasami podłużnymi ( $r$ ) tkanki komórkowej, które wiążą korę ze rdzeniem i stanowią pierwsze promienie rdzenne (radii medullares).


§ 52. Promienie te, równe rozumie się co do liczby wiązek, są z początku bardzo szerokie. Nieco później stają się węższymi i liczniejszymi, ponieważ w ich środku utworzyły się (fig. 95) nowe wiązki ( $f'' f''$ ), które przeto stanęły między pierwotnymi ( $f' f'$ ). Po jakimś czasie wiązki stają się tak liczne i tak się do siebie zbliżają, że tworzą okrąg zamknięty, przetrzynięty promieniami rdzennymi, w postaci bardzo tylko cienkich linii. Wtedy łodyga składa się od wewnątrz ku zewnątrz: 1) z miększu rdzennego, 2) ze słupa włókno-naczynnego, 3) z miększu kory, 4) z naskórka.

§ 53. Łodyga roślin zielnych doroczných zatrzymuje się zwykle na tym, albo nawet na jednym z poprzedzających stopni rozwinięcia. Stosunek rdzenia i promieni rdzennych względem części włókno-naczynnej, jest u nich zwykle bardzo wielki.

§ 54. Łodyga roślin drzewnych wiele lat żyjących, ulega dalszym zmianom, lecz z początku była podobną do łodygi roślin doroczných; była bowiem zrazu zielną i przedstawiała tenże sam stosunek części, z tą tylko różnicą, że pokład włókno-naczynny wcześniej się u nich pokazuje i jest twardszym. Ga-

Łązka przeto roczna, wzięta z któregokolwiek naszego drzewa, może wygodnie służyć do śledzenia wszystkich kolejnych zmian, o których mówiliśmy poprzednio. Gałązka ta rośnie u wierzchołka; podstawa jej przeto jest najdawniej, wierzchołek zaś najpóźniej utworzony. Ztąd w rozmaitych jej wysokościach widzieć można te same różnice, jakie przedstawia kilka łądyg jednięże rośliny w różnych okresach rozwinięcia: począwszy od tego który jest jeszcze stanem zarodkowym, a który przedstawia wierzchołek gałązki, aż do tego który kończy wzrost jednoroczny, a który nam nasada gałązki ukazuje. Porównując przeto cieniutkie płateczki, odcięte poziomo w różnych wysokościach gałązki, obejrzymy łatwo i prędko wszystkie zmiany, jakie zachodzą przez jeden rok w życiu łądygi: a stan jaki postrzeżemy przy podstawie, posłuży z kolei za punkt, z którego będziemy mogli wyjść, porównując odmiany jakie sprowadzi rok następny; czyli co na jedno wychodzi, odmiany, jakie można spostrzedz w gałązce dwuletniej.

§ 55. Rozbierzmy teraz szczegółowiej żywyoli, z jakich się składa łądyga jednoroczna; a ponieważ przykład objaśni i uwyraźni nasz rozbiór, weźmy gałązkę klonu pospolitego, i opiszemy wszystkie jej części od wewnątrz ku zewnątrz, powiększywszy je dostatecznie, aby poznać należycie przyrodzenie wszystkich narzędzi prostych, z których się ostatecznie składa.



96.

96. Przecięcie poprzeczne młodej gałązki klonu pospolitego (*Acer campestre*), powiększone 26 razy w średnicę. — *m* Rdzeń. — *em* Cewa rdzeniowa. — *fb* Wiązki drzewne. — *vp* Cewki kropkowane. — *rm* Promienie rdzenne. — *c* Miazga. — *fc* Włókna korowe. — *vl* Naczynia właściwe. — *ec* Okrywa komórkowa. — *p* Okrywa korkowa. — *ep* Naskórek.


Odetnijmy poziomo płateczek bardzo cienki z wierzchołka gałązki, gdzie takowa posiada zaledwie 1 1/2 milimetra średnicy (fig. 96). Obwód płateczka będzie okrągły, albo mniej więcej sześciokątny. Rdzeń (fig. 96 *m*) położony w środku, wynosi połowę lub więcej całej średnicy. Wewnątrz składa się z komórek większych, wietko

z sobą  
stych;  
mórki  
bnieją  
coraz z  
rdzeń  
tworzy  
zielony  
ki dro  
nej, z  
dza p  
ne (r,  
barwy  
włókn  
około  
Wiązk  
Każda

Już  
dają si  
przesi  
więks  
szem  
wym,  
namy  
reszt  
się z  
grabe  
otwor  
są uł  
rdzeń  
rzadk  
kowan  
są roz  
inne m  
Zbiór

97.  
wiązki  
t Cewk  
rze pop

z sobą spojonych, przezroczystych, dwunastościennych lub kulistych; ku wewnątrz komórki stopniowo drobnieją (fig. 97 *m*) i są coraz zieleńsze, tak, że rdzeń przy obwodzie tworzy pasek ciemnozielony, złożony z tkanek drobnej i ścieśnionej, z którego wychodzą promienie rdzenne (*r, m*) téjże saméj barwy, dzielące pasek włókno-naczynny, nokoło rdzenia leżący i z nim spółśrodkowy na wiele wiązek. Wiązki te (*f b*) różnią się od rdzenia tkanką daleko zbitszą. Każda z nich ma kształt kąta tępego.



97.

Już na przecięciu poziomém zgadnąć można, że związki składają się z różnych żywiołów, ponieważ pośród tkanek zbitéj, przesianej maleńkimi dziurkami, widać inne otworki daleko większe. Jeśli będziemy postrzegać te części przy mocniejszém powiększeniu, czy to na odcinku bardzo cienkim pionowym, czyli téż rozłączywszy je końcem ostréj szpilki, przekonamy się, że otworki większe należą do cewek (fig. 97 *vp*); reszta zaś tkanek, która zdawała się być prawie pełną, składa się z włókien (*fl*) średniej długości, których ściany tak są grube, a w skutek tego kanał wewnętrzny tak szczupły, że otwory ich wydają się tylko jakby maleńkie kropeczki. Włókna są ułożone po większej części rzędami, rozchodzącemi się ze rdzenia nakształt promieni. Cewki nie leżą w tym samym porządku; największe z nich i najzewnętrzniesze są cewki kropkowane (*vp*), zaś stykające się bezpośrednio z rdzeniem są rozkręcalne (*t*). Zajmują one w łodydze zawsze to, a nie inne miejsce, i tworzą się najpierw z wszystkich naczyń. Zbiór cewek i włókien najpierw w drzewie wykształconych,

97. Wycinek z téjże gałązki prowadzony równolegle do średnicy przez wiązki drzewne, i powiększony bardziej jeszcze od figury poprzedzającej. — *t* Cewki węzownicowe. — Inne głoski mają toż samo znaczenie, co na figurze poprzedzającej.

otaczających bezpośrednio rdzeń, nazwany został *cewą rdzeniową* (fig. 96 *em*) (*canalis medullaris*).

§ 56. Zewnątrz każdej wiązki włókno-naczynnej, spostrzegamy na przecięciu pionowym inną kupkę włókien (fig. 96 i 97 *fc*) mniej białych, połączonych w kształt półksiężyca obróconego wypukłością na zewnątrz. Kupka ta oddzielona jest od reszty wiązki paskiem tkanki komórkowej zielonkawatej (*c*), który godnym jest uwagi z tego względu, że oddziela korę od drzewa i staje się później ogniskiem tworzenia się nowych warstw, czego skutkiem jest wzrost łodygi obwodowy, czyli grubienie. Włókna oddzielone od drzewa owym paskiem, są włóknami korowemi, dłuższemi i mocniejszymi od drzewnych.

Przecinając gałązkę klonu, widzimy wysączający się z niej płyn białawy i młeczny. Wychodzi on z kory, bezpośrednio na wewnątrz wiązki włókien korowych, i w rzeczy samej za użyciem szkła, spostrzegamy w tém miejscu układ naczyń właściwych, czyli młeczowych (fig. 96 i 97 *vt*).

Dalej jeszcze ku zewnątrz znajdujemy tylko komórki, których ogół tworzy miękisz korony. Ten opasany jest skóreczką czerwonawą: naskórkiem (*ep*), który się składa z pojedynczego rzędu komórek i jest pokryty na całej swój powierzchni puszkami drobnym i białym. Wspomnieliśmy już o kształceniu się tych włosków, będących komórkami naskórka i posiadających postać odrębną.

Pod naskórkiem znajdują się liczne rzędy komórek sześciennych lub podłużnych tak jak komórki promieni rdzennych, widziane poziomo (fig. 97 *p*); różnią się one nieco kształtem i barwą od komórek naskórka. Najzewnątrzniejsze noszą jeszcze na sobie cień czerwonawy, leżące zaś bardziej ku wewnątrz są raczej brunatne. Rzędy leżą warstwowato i prawidłowo jeden na drugim. Ku wewnątrz od paska brunatnego widać inny pasek zielony (fig. 96 i 99 *ec*) złożony z komórek napęcznionych zielenią, które nadto odznaczają się kształtem bardziej zaokrąglonym lub wielościennym; leżą też mniej prawidłowo, nie w rzędach obejmujących się wzajemnie warstwami spółośrodkowemi. Widzimy przeto, że w miękiszu korowym rozróżnić można dwa układy: zewnętrzny o komórkach prostokątnych i brunatnych, który Mohl nazwał *pokładem* lub *okrywą korową* (*stratum suberosum*) (*p*), i wewnętrzny zielony, który

zachowa  
dy na oz

W po  
rdzenne  
się z je  
wiązki  
mego p  
blaszki,  
dla pod  
mórkom

§ 57.  
pospoli  
dwulisc  
w stosu  
samprz  
wny, dr  
mórek.

Uklac  
i z pask  
1) wew  
wej i p  
z włók  
zbiór v

Ukl  
dów o  
korkow  
cone sa  
rym tak

§ 58.  
lązką d  
rek, kt  
i korow  
wie plyn  
gacze pi  
komórka  
ki takow  
idzie o  
nych. C  
źniej ro

zachował nazwę *pokrywy komórkowej* (*ec*), używanej wprzódy na oznaczenie obu tych pokładów odmiennego przyrodzenia.

W pokładzie komórkowym zielonym kończą się promienie rdzenne (*r*, *m*) mające też samą barwę. Każdy z nich składa się z jednego lub więcej rzędów komórek, które parte przez wiązki drzewne, ścieśniają się i przedłużają w kierunku samego promienia, tworząc przez połączenie się z sobą cienkie blaszki, nazywane niekiedy *tkanką murową* (tela muriformis) dla podobieństwa z murem, którego cegły odpowiadałyby komórkom spłaszczonym i leżącym warstwami jedne na drugich.


§ 57. Gałązka tedy jednoroczna, którąśmy wzięli z klonu pospolitego, lecz która wzięta z większości drzew naszych dwuliściennych, dałaby nam spostrzedz też same części, tylko w stosunkach i postaciach nieco odmiennych, przedstawia namprzód dwa układy wcale odmiennie: jeden wewnętrzny drzewny, drugi zewnętrzny korowy; oba przedzielone paskiem komórek.

Układ drzewny znowu składa się ze rdzenia środkowego i z paska zewnętrznego wiązek włókno-naczynnych, mających: 1) wewnątrz cewki rozkręcalne, wykształcające się najpierw i położone bezpośrednio przy rdzeniu, a stanowiące wraz z włóknami obok leżącemi cewę rdzeniową; 2) ku zewnątrz zbiór włókien poprzerzynanych cewkami innego rodzaju.


Układ korowy składa się oprócz naskórka z trzech pokładów odrębnych: dwa zewnętrzne komórkowe, to jest pokład korkowy i komórkowy właściwy, na którego granicy rozrzucone są naczynia młeczowe; trzeci wewnętrzny włóknisty, w którym także napotyka się naczynia właściwe.

§ 58. Porównajmy wszystkie te części tak oznaczone z gałązką dwuletnią (fig. 98). Na wiosnę, mały ów pasek komórek, który jakeśmy widzieli, leży między układem drzewnym i korowym, jest bardzo wązki i jakby zapefniony galaretą prawie płynną. Galareta owa grubieje stopniowo, a biegli postrzegacze przyznają jej jednozgodnie ustrojność rodzącej się tkanki komórkowej, chociaż różnią się w zdaniach co do sposobu w jaki takowa się tworzy, co zresztą nie może dziwić tam, gdzie idzie o zbadanie tworów nadzwyczaj drobnych i prawie płynnych. Cóżkolwiek bądź, w tej właśnie tkance zaczną się później rozwijać wszystkie narzędzia proste, podobnie jakeśmy

to widzieli w gałązce rocznej, i ztądto nazywają ją *cambium* (miazga), dla własności przemieniania się w te różne narzędzia.



98.



99.

W rzeczy samej, po jakim czasie widzimy, że w przedziale tym, utworzyły się dwa nowe paski (fig. 98, 2), jeden korowy (*fc*), drugi drzewny (*fl. w.*), w ogóle podobne do pasków przeszłorocznych, na których się układają i na wzór niejako których są ukształcone. Pasek korowy składa się z włókien jak warstwa najwewnętrzniejsza kory, z którą się styka; drzewny zaś z włókien i cewek tak jak część zewnętrzna włókno-naczynnych, obok których jest położony. Część wewnętrzna rzeczonych wiązek, czyli cewa rdzeniowa, nie ma odpowiedniej sobie w tym świeżym pokładzie, gdyż nigdy w nim nie znajdujemy cewek rozkręcalnych. Część paska miazgi stykająca się z promieniami rdzennymi, ustraja się na wzór tychże i staje się komórkową, tak, iż promień przedłużonym zostaje bez przerwania i odmiany wskroś pokładów świeżych.

W następnych latach powtarza się toż samo, co zaszło w roku drugim; ciągle bowiem tworzą się między poprzednio utwo-

98. Wycinek z gałązki dwuletniej klonu pospolitego, w którym 1 oznacza części utworzone w pierwszym, 2 części utworzone w drugim roku. — Znaczenie głosek toż samo co na figurach 96 i 97.

99. Niektóre części figury poprzedzającej mocniej powiększone, dla lepszego okazania ich budowy, np. kropek, włókien drzewnych. — Głoski mają ciągle toż samo znaczenie.


rzonem  
sposob  
spółstro  
wyróżn  
korowe  
w który

§ 59  
widziéć  
drzew  
kładu,  
w ogół  
wiadom  
biérają  
z nasz  
odmian  
umiark  
pór rok  
a przez  
wet w  
żeń,  
uwaga  
nad te  
byśm  
nazw  
nastę  
króte  
dwniś  
przed  
więcej  
miesz  
strony  
przeł  
wneg

100.  
widac  
dajacy  
środko  
rzenie  
który  
żniejsz

rzoném drzewem a korą nowe pokłady drzewa i kory; tym sposobem po kilku latach otrzymujemy pewną ilość słojuw spółśrodkowych z drzewem i korą. Słoje drzewne są bardzo wyraźne, a ogół ich stanowi prawie całą miąższość gałęzi; korowe zaś nadzwyczaj cienkie, tworzą wązki tylko pasek, w którym nie łatwo jedno od drugich rozróżnić się dają.

§ 59. Zmiany jakie zachodzą w gałązkach klonu, możnaby widzieć z niejakiemi tylko odmianami w większej ilości innych drzew naszych, i badanie jednego tego szczegółowego przykładu, może zastąpić do pewnego stopnia badanie wszystkich w ogóle łodyg roślin dwuliściennych. Uzupełnijmy jednakże wiadomości, na których musieliśmy się zrazu ograniczyć i przybierając kolejno części, jakie rozróżnialiśmy w łodydze jednego z naszych drzew, badajmy teraz jakie w nich mogą zachodzić odmiany w drzewach innych. Te które rosnąc w naszych umiarkowanych stronach, podlegają prawidłowym zmianom pór roku i służyły, jak się łatwo domyslić, botanikom za główny, a przez długi czas za wcale nawet wyłączny przedmiot postrzeżeń, zajmą nasamprzód naszą uwagę; zatrzymawszy się nieco nad temi łodygami, które mogliśmy pod pewnym względem nazwać prawidłowemi, zwrócim następnie oko, porównawczo i pokrótce, na łodygi roślin również dwuliściennych, których budowa przedstawia różnice mniej lub więcej znaczne, lecz które zamieszkując po większej części strony zwrotnikowe — badane w ogóle pod względem roślenia przelotnie tylko przez podróżników i to zaledwie od niedawnego czasu, — znane są dotąd jeszcze bardzo niedokładnie.



100. Przecięcie poziome gałęzi dębu ośmioletniego. — *b* Drewno w którym widać 8 słojuw spółśrodkowych, pooddzielanych szeregami kropek, odpowiadających otworom cewek wielkich — *c* Kora posiadająca także 8 słojuw spółśrodkowych, ale daleko cieńszych i mniej wyraźnych. — Drewno i kora przernięte są promieniami rdzennemi, idącemi do obwodu, jedno aż do środka który stanowi rdzeń, inne tylko do słoju utworzonego w jednym z lat późniejszych.

Rozbierzemy z kolei układ drzewny i korowy: w pierwszym rdzeń, drewno i promienie rdzenne, w drugim pokład włóknisty i dwa pokłady komórkowe.

## UKŁAD DRZEWNY.

§ 60. **Rdzeń.**— Widzieliśmy że miękisz, z którego z początku cała łądoga wyłącznie się składała, później w skutek utworzenia się słoju drzewnego zostaje podzielony na dwa obręby, z których środkowy nosi nazwisko rdzenia. Na przykładzie wyżej podanym, widzieliśmy, że się składa z komórek, które od środka ku obwodowi zmniejszają się co do objętości, przybierając zarazem barwę zieloną coraz ciemniejszą. Komórki brzożne napełnione są obficie sokami, których przeciwnie nie posiadają komórki środkowe; po tych piętnach łatwo poznać, że im komórki są młodsze, tém silniejszym życiem są obdarzone; powoli siła życia słabiej a po pierwszym roku cały prawie rdzeń przybiera jednostajną barwę, często białą, niekiedy zaś inną. Komórki jego, których objętość zmniejsza się od wewnątrz ku zewnątrz, zawierają wtedy już tylko powietrze; życie w nich zdaje się być zupełnie zawieszonem, często nawet rozrywają się, a przerwy mniejsze lub większe, ukazują się między niemi. Spostrzedz się to daje niekiedy nawet przed rzeczonym czasem, mianowicie téż w roślinach dorocznych o rdzeniu bardzo wielkim i których rośnienie jest bardzo szybkie. Jednakże w pierwszym roku, a nadewszystko w początku, komórki posiadają zawsze żywotność bardzo czynną, dość długo trwającą. Dowodzi tego częste zgrubienie i kropki na ich ścianach znajdujące się, które pozostać mogły, tylko w skutek tworzenia się nowych warstw wewnątrz każdej z nich, a co przeto wymagało dość długiego odbywania się czynności żywotnych.

Rdzeń tworzy wpośrodku łądogi słup, którego kształt można odgadnąć na przecięciu poziomem; z początku widzimy na takowym postać gwiazdki, z powodu że związki drzewne pooddzielane są od siebie, zostawiając między sobą kąty wypełnione rdzeniem jeszcze zielonym. Kształt ten zostaje niekiedy nazawsze, w innych razach bywa okrągłym; często także otrzymujemy na przecięciu wielokąt, mniejszej lub większej

liczbie  
tworzą  
pnącyc  
weu po  
kształt  
nadwoj

Sądzi  
dygi, lu  
ulożone  
zasadza  
ją tab  
nas tu  
kątniej  
w rozni

Śred.

Łązkach

w jedne

Zmiany

Łodygi.

dziej z ni

wiązki

stać się

ich ku

chodzi

tań ob

przeko

Łązkach

prześci

knie w

względ

kim. Mi

ków prz

Opisa

Znajduje

naczym

anie bu

gromadz

mianowi

także i

roślin dr

liczbie boków. W niektórych roślinach znajdujemy cztery boki tworzące kwadrat lub prostokąt (np. w lipie, w wielu surmiach pnących); niekiedy nawet napotyamy trójkąt (np. w płochowcu pospolitym); nakoniec rdzeń może przybierać inne jeszcze kształty bardziej uderzające, np. kształt krzyża (w niektórych nadwojach: *Bauhinia*).

Sądono że kształt rdzenia jest w związku z kształtem łodygi, lub nawet ze sposobem w jaki liście a zatem i gałęzie są ułożone. Przypuszczenie to na pozór dość prawdopodobne, zasadzało się na wielu przykładach; inne jednakże znowu zbijają takowe. Tak, nie mówiąc nawet o ułożeniu liści, które nas tu zajmują, można znaleźć rdzeń obły w łodydze wielokątnej. Zresztą rdzeń nie zawsze posiada jednakowy kształt w rozmaitych wysokościach tej samej łodygi.

Średnica jego może także być rozmaita, a to nawet w gałązkach jednej grubości; zmienia się ona także z czasem w jednej wysokości? powiększa się, czy zmniejsza z wiekiem? Zmiany takie mogą zachodzić, lecz tylko w pierwszej młodości łodygi. Wskutek mnożenia się komórek i rozrastania się każdej z nich, rdzeń musi się powiększać; później znowu kiedy wiązki drzewa rozwijają się swoją drogą, mogą także rozrastać się we wszystkich kierunkach, a przez rozszerzanie się ich ku wewnątrz, rdzeń może być nieco ściśniętym. Lecz nadchodzi czas w którym równowaga zostaje przywróconą, i od-tąd objętość rdzenia zostaje niezmienną. Można się o tém przekonać porównywając go w starych pniach i młodych gałązkach bzu pospolitego. Długi czas mniemano, że party nieprzestannie ku wewnątrz w skutek rozrastania się drzewa, niknie w końcu; lecz to było złudzeniem, wywołaném przez względną jego małość, skoro go śledzimy w pniu bardzo wielkim. Mierzenie bowiem dokładne doprowadza nas do wypadków przeciwnych.

Opisaliśmy rdzeń jako złożony tylko z tkanki komórkowej. Znajdujemy w nim jednak niekiedy rozproszone wiązki włóknonaczynne, nadewszystko w roślinach zielnych których rozwijanie bujne i szybkie spowodowuje wymiary niezwykle w tej gromadzie roślin: np. w różnych olbrzymich baldaszkowych, mianowicie w rodzaju *Ferula*. Wiązki rzezone ukazują się także i są trwałe w rdzeniu pieprzów, chociaż te należą do roślin drzewnych. Skład wiązek, których naczyniami są cewki

rozkręcalne zdawałyby się dowodzić, że one są częściami cewy rdzeniowej, które odłączyły się i zboczyły ku wewnątrz. Przy cewkach rozkręcalnych dają się widzieć kupki włókien a często także i naczynia właściwe. Obecność tych ostatnich w rdzeniu jest daleko częstszą niż obecność innych naczyń: np. w rdzeniu bzu lub figi, który w chwili kiedy go przecinamy, wysącza sok mleczowy, lecz to tylko w gałązkach młodych; w ogóle naczynia właściwe ukazują się tu rozproszone tylko i nieliczne.

§ 61. **Drewno.** — Widzieliśmy (§ 56) że pierwsza warstwa drzewna składa się z wiązek włókno-naczynnych, ułożonych w okrąg około rdzenia, pooddzielanych od siebie pasami dosyć szerokimi tkanki komórkowej, które się rozchodzą naksztalt promieni od rdzenia do kory; widzieliśmy że później, nowe wiązki tworzą się w środku owych promieni powiększając ich liczbę a zmniejszając szerokość (fig. 95 *f f'*); że nakoniec wiązki, w skutek tak pomnożenia się, jako też powiększenia całej ich objętości, będącej wypadkiem rozrastania się pojedynczych narzędzi prostych, z jakich są złożone; zbliżają się do siebie i prawie stykają, przywodząc promienie je oddzielające do postaci nadzwyczaj cienkich blaszek. Tym sposobem tworzy się słoń drzewny (fig. 96 *f b*).

§ 62. **Widzieliśmy** jeszcze, że część wewnętrzna tego okręgu, stykająca się ze rdzeniem, posiada budowę odmienną od reszty; że tam tylko a nie gdzieindziej znajdują się cewki rozkręcalne (fig. 97 *z*), i że ta wewnętrzna część otrzymała imię cewy rdzeniowej. Cewa układa się na wzór rdzenia, albo raczej ten układa się na wzór cewy, a kąty wklęsłe, które zawsze w początku posiada, i które w pewnych łodygach pozostają na zawsze, odpowiadają tyłuż kątom wypukłym, utworzonym przez brzeg wewnętrzny każdej z wiązek. Cewa rdzeniowa jest częścią drewna najmniej ulegającą zmianom. Naczynia jej zachowują objętość jakiej wcześniej nabyły, i dają się rozkręcać nawet w łodygach dość starych.

§ 63. Reszta okręgu drzewnego a zarazem część jego większa, składa się z włókien i cewek innego rodzaju, jakoto: pierścieniowych, kreskowanych lub kropkowanych (fig. 97 *zp zp*) i posiadających średnicę daleko większą. Wiemy iż na tym punkcie zatrzymuje się rozwijanie roślin zielnych, pomiędzy nimi znajdują się takie, które nabywają dość znacznej

tward  
się tój  
łów. V  
więcej  
drzew  
wnem  
(fig. 9  
w tkan  
jów rd  
jako z  
i stwie  
Tak n  
wnye  
mna:  
pozos  
rych z  
warst  
postrz  
niej le  
dowa  
stary  
takow  
pokr  
rają  
cie  
w g  
wany  
(175  
stwar  
słój  
do cz  
(1)  
lecz or  
który  
1581,  
cy w  
„ze w  
„to na  
„nad  
„i pos  
„mow  
„wo i

twardości, w przeciągu jednego roku, a to przez rozróżnienie się tej pierwszej warstwy i przez zbitość ułożenia jej żywiołów. Wiemy dalej że w roślinach, których łądyga żyje mniej więcej znaczną liczbą lat, co rok utworzy się nowa warstwa drzewna na wzór poprzedniej, a to w przedziale pomiędzy drzewem a korą, który to przedział wypełniony jest miazgą (fig. 97 c), istotą zrazu prawie płynną, później ustrajającą się w tkankę komórkową. Jasną jest przeto rzeczą, że ilość słojów równa się ilości lat życia rośliny; że wiek téjże jest niejako zapisany na przecięciu. Prawda ta oddawna jest znana <sup>(1)</sup> i stwierdzona licznemi, mniej lub więcej ciekawemi faktami. Tak np. przypuścimy że warstwa miazgi zostaje zepsuta na pewnych miejscach, co może nastąpić w skutek zbyt ostrego zima: w miejscach tych drewno nie odnowi się i tyleż przerw pozostanie w tkance drzewnej. W ciągu lat następnych, w których zimno nie wywrze podobnego wpływu, odpowiednia ilość warstw drzewnych utworzy się i pokryje przerwę. Skoro więc postrzeżemy takową, obliczyć możemy na słojach zewnątrz niej leżących, ile lat upłynęło od ostrzej zimy, która ją spowodowała. Doświadczenie sprawdza to w istocie. Przy ścinaniu starych i olbrzymich wiązów (w Paryżu), znaleziono przerwy takowe. Obliczono ilość słojów spółśrodkowych któremi były pokryte, i dowiedziano się w którym roku słoje drzewna zawierający przerwy został utworzonym; rok ten odpowiadał w istocie nadzwyczaj ostrzej zimie. Kawałki tych drzew znajdują się w galerjach botanicznych paryżkiego muzeum. Tamże zachowany jest kawałek buku, na którego korze widać wryty rok (1750), ten sam rok jest także ukryty w środku pod warstwami drzewa; obie liczby przedzielone są pewną ilością (55) słojów; jestto właśnie ilość lat upłynionych od wyrzycia liczby do czasu w którym drzewo zostało ścięte. Zapewne napis wy-

(1) Malpighi'emu przyznają zaszczyt, że pierwszy zrobił to postrzeżenie, lecz ono musiało być już upowszechnionem za czasów tego sławnego anatoma, który się urodził w 1628 r., gdyż w *Podróży Montaign'a po Włoszech* z r. 1581, czytamy ustep takowy: „Pracownik, człowiek uzdatniony i posiadający, cy wziętość w wyrabianiu pięknych narzędzi matematycznych, dowodził mi, że wszystkie drzewa posiadają tyle słojów, ile lat żyły, i pokazywał mi, to na wszystkich drzewach jakie miał w swoim sklepie (pracował bowiem, nad wyrobami z drzewa). Część drzewa obrócona ku północy, jest cieńsza, i posiada słoje bardziej ściśnione i twardsze od innych. Dlatego też podej- mował się on z kawałka jaki mu kto przyniesie, poznać ile lat miało drzewo i w jakim kierunku stało.”

ryty na drzewie dość jeszcze młodo, nietylko przeniknął całą grubość kory, ale naruszył nieco i drewna, w którym przeto utworzyła się przerwa pokryta, następnie jak przerwy powstające przez działanie mrozu, słojami lat późniejszych. Tylkoż tu doświadczenie jest dokładniejszem, gdyż obejmuje razem korę i drewno, i nosi nadto datę autentyczną. Większa część zbiorów botanicznych posiada przykłady tego rodzaju, jedne przypadkowe, inne wywołane przez doświadczenia robione w celu wyśledzenia sposobu w jaki drzewa nasze wzrastają. Łatwo jest w rzeczy samej wprowadzić między korę i drewno ciało jakie obce, np. blaszkę metalową, a przecięwszy potem gałąź po upływie pewnej liczby lat, znajdziemy ową blaszkę pokrytą tyłuż warstwami drewna.

Powiedzieliśmy że każda gałąź rośnie w ten sam sposób co łodyga. Gałązki przeto zrodzone w pierwszym roku, posiadają tę samą ilość słojów; z tych które wydane zostały w rok, dwa lub trzy lata później, ostatnia posiada trzy słoje mniej, druga dwa, pierwsza jeden tylko mniej. Można przeto, ścinając drzewo, przy podstawie powiedzieć kiedy się utworzyła każda z jego gałęzi, odejmując od liczby słojów znajdujących się przy podstawie, liczbę słojów gałęzi. Jeśli pień zawiera 50 słojów spółśrodkowych, gałąź zaś jedna ma takowych 30, druga 10, to drzewo wydało pierwszą w 20, drugą w 40 roku.

§ 64. Ale jak można odróżnić pojedyncze słoje złożone z jednakowych żywiołów? Przez to właśnie, że te żywioły nie są wszędzie jednostajnie rozdzielone, lecz rozłożone są podług pewnego stałego porządku. Przetnijmy gładko wpoprzek polano dębowe (fig. 100, 101) lub wiązowe, i uważajmy słoje drzewne na przecięciu, a ujrzymy że brzeg wewnętrzny każdego z nich odznaczony jest jednym lub kilku rzędami małych dziurek, których nie widać w reszcie słoju. Są to otworki tyłuż wielkich cewek, które się znajdują tylko ku brzegowi wewnętrznemu, reszta zaś słoju bardziej ku zewnątrz składa się z włókien ściśnionych; o ścianach tak grubych, że wydają się pełnemi, gdyż kanał przebiegający całą ich długość, nie daje się gołym okiem spostrzedz. W polanach wziętych z grabu, lipy lub klonu, nie widać tych wielkich cewek, których szeroki otwór tak wyraźnie odznacza wewnętrzny brzeg słoju rocznego; takowy przesiany jest otworkami cewek daleko mniejszych i równiejszych pomiędzy sobą, jednakże zawsze brzeg zewnę-

trzy m  
łączn  
ściśn  
żone;  
bywa  
wraż

W w  
jest ok  
nych;  
drewn  
gdzie b  
wielki  
za po  
rzon  
stawio  
wnątr  
rdzeń  
rzutu j  
owych  
stkich


§ 64  
większ  
kowé  
kiej,  
dziele  
począ  
niom  
94, 9  
mnoż  
innym  
wrot  
spose  
promie  
tworza

101.  
lezi wie  
rni, po  
czniejsz  
im tak  
później  
która w

trzny nie posiada i tych nawet otworków i jest utworzony wyłącznie przez liczne szeregi włókien tém cieńszych, bardziej ściśnionych i ciemniejszych, im bardziej na zewnątrz są położone; ztąd powstaje linja dzieląca słoje ten od następnego, która bywa niekiedy bardzo ciemna, niekiedy zaś jaśniejsza i mniej wyraźna.

W wielu drzewach taka linja odznaczająca, nacechowana jest okręgiem komórek podobnych komórkom promieni rdzennych; rzadziej tkanka ta kómkowa, włożona między słoje *drewna*, dochodzi znaczniejszej grubości, jak np. w sumaku, gdzie komórki jej ułożone w wiele kręgów spółśrodkowych są wielkie i tej samej barwy co rdzeń. Postrzeżenie to posłużyło za podstawę dowcipnej teorii, podług której każdy słoje utworzony po pierwszym roku, posiada swój osobny rdzeń, przedstawiony właśnie przez pasek ów kómkowy, leżący na wewnątrz jego drzewa i stojący z nim w tym samym stosunku co rdzeń ze słojem drzewnym, który go otacza. Lecz prócz zarzutu jaki wypływa ztąd, że najczęściej nie znajdujemy *pasków* owych *rdzennych*, nieobecność cewy rdzeniowej we wszystkich późniejszych słojach stanowiłaby jeszcze istotną różnicę.

§ 65. Widzieliśmy (§ 52) że ilość wiązek drzewnych powiększa się przez powstawanie nowych w przestrzeni kómkowej zrazu szerokiej, która ją oddzielała i która dała początek promieniom rdzennym (fig. 94, 95). Wiązki mnożą się później innym jeszcze odwrotnym niejako sposobem, gdyż promienie rdzenne tworzą się między żywiołami drzewnymi (fig. 101). Wiemy



101.

101. Przecięcie poziome dwóch wiązek drzewnych dębu korkowego z gałęzi wieloletniej. Widać jak wiązki te przedzielone promieniem rdzennym *rm'*, podzieliły się w następnych latach na wiele wiązek powtórnych tém liczniejszych i poprzedzielanych promieniami tém krótszemi (*rm''* *rm'''* *rm''''*), im takowe biorą początek ze słoja bardziej na zewnątrz leżącego, a przeto późniejszego. — *m* Rdzeń. — *ec* Okrywa kómkowa. — *p* Okrywa korkowa, która w tym gatunku dębu rozwija się nadzwyczajnie.

że co rok do każdej tkanki już istniejącej, przyrasta tworząc się tkanka podobna: komórki do komórek dla przedłużenia promieni rdzennych, włókna i cewki do włókien i cewek dla powiększenia tkanki drzewnej. Lecz wiązka nowa, przyłożona do dawniej, nie jest tak jak tamta pojedynczą, lecz podwójną lub potrójną, dzieli ją bowiem szeregi komórek zaczynających nowe promienie ( $rm''$ .  $rm'''$ .  $rm''''$ ), w tém od pierwotnych różne ( $rm'$ ) że nie wychodzą ze środka. W nowym słoju który jest większy od poprzednich, gdyż leży zewnątrz nich a jest z niemi spółśrodkowym, musi się oczywiście tworzyć więcej promieni i wiązek międzyległych.

§ 66. Rozrastanie się pojedynczych słojuw kończy się w przeciągu roku: każdy z nich nabywszy pewnej grubości, zatrzymuje się, służąc tym sposobem za stałą podstawę, na której złożony zostanie słoju przyszłoroczny. Dalsze zmiany jakim podlega, zależą od zmian zachodzących wewnątrz narzędzi jego prostych. W młodości wydrążenia ich okryte ścianami cieńszymi, zawierały soki płynne. W miarę jak się starzeją, stosunek płynów do części stałych zmniejsza się, już to w skutek zgrubienia ścian każdego narzędzia, przez dodanie warstw okrywających się wzajemnie (§ 6), już też wskutek gęstnienia i twardnienia stopniowego istot zawartych, a to albo przez wyparowanie części płynnych, albo przez nowe związki chemiczne. Tymto sposobem tworzy się pierwiastek drzewny: *drzewnik* (le ligneux), istota która powiększa zbitość ściany złożonej z włókniaka, przenikając ją w całej miąższości. Włókniak ma we wszystkich rodzajach roślin jedno i toż samo przyrodzenie, drzewnik zaś zawarty w każdej w innym stosunku, nadaje im własności szczególne. W skutek tego nadchodzi czas, w którym włókna nabywszy zbyt wielkiej zbitości, przestają przepuszczać płyny.

§ 67. Ponieważ zmiany te spowodowane są wiekiem, przeto muszą być znacznie wyżej posunięte w słojach wewnętrznych, których tkanka jest pełniejszą, twardszą i suchszą, niż w słojach zewnętrznych. W gatunkach drewna barwnego, barwienie zaczyna się od środka i równie jak twardość rozszerza się ku okręgowi. Złądto pochodzi, że w wielu drzewach rozróżnić można dwie części: 1<sup>o</sup> zewnętrzną, która posiada jeszcze własności drewna młodego, to jest zawiera soki dla których jest przepuszczalną, a w skutek tego jest miększą

i jaśnie  
(albo  
nazywa  
Dwi  
ciemne  
widzen  
nin, tw  
się od  
tych p  
które  
przyk  
natęże  
krajów  
kowe  
zmiana  
bywa n  
twardz  
wno ba  
czonęj  
Twa  
najcier  
najtwa  
mięks  
bielu.  
tęz h  
po tém  
swęj z  
stałych  
części,  
lub na  
przez  
związk  
go nie  
obfite  
bedący  
istot p  
§ 65  
daleko  
bardzo  
wet p

i jaśniejszą, a nawet wcale białą, zkad też nazywa się *bielem* (albumum); 2<sup>o</sup> wewnętrzną, suchszą, stwardniałą i barwną, nazywaną pospolicie *drewnem właściwém* (duramen, *twardziel*).

Dwie te części nadzwyczaj są wydatne w drzewach barwy ciemnej, używanych zwykle przez stolarzy: łatwo pojąć bez widzenia nawet, jak dalece w hebanie, palisandrze lub mahoniu, twardziel z którego zwykle bywają wyrabiane meble, różni się od jasnego wcale bielu. Nie potrzebujemy tu wymieniać tych przyrodzonych odcieni, tak różnych w różnych drzewach, które każdemu są znajome i których rzadsze lub mniej znane przykłady znaleźć można w zbiorach botanicznych. Lubo mocne natężenie barwy daje się postrzegać szczególnie w drzewach krajów gorących, jednakże i niektóre z naszych posiadają takowe w dość wysokim stopniu; tylko że po większej części zmiana zachodzi tu wolniej i przejście od bielu do twardzielu bywa mniej lub więcej znaczném. W wielu drzewach mających twardziel bezbarwny i które dlatego dają tak nazwane *drewno białe*, (np. topola i wierzba), nie postrzegamy wcale rzezonej różnicy.

Twardość idzie w ogóle w stosunku prostym barwy; drzewa najciemniejsze jak heban, drzewo żelazne i t. d., znane są jako najtwardsze i najtrwalsze. Drewna zaś białe są zarazem najmiększe i najprędzej się psujące, gdyż zachowują przyrodzenie bielu. Wiadomo, że takowy na mało co bywa zdatnym, o czém też bez pomocy nawet doświadczenia, wnieśćbyśmy mogli po tém co się wyżej powiedziało, to jest że takowy w tkance swęj zawiera stosunkowo najwięcej płynów, a najmniej części stałych. Łatwo więc pojąć że oprócz zmniejszenia przez to części, która sama jedynie zdatną jest do długiego zachowania, lub na rozmaite wyroby, obfitość płynów sprowadza—już to przez parowanie, już to przez łatwiejsze tworzenie się nowych związków,—liczne zmiany w objętości i w samym składzie tego niewykształconego jeszcze drewna. Nadewszystko zaś obfitość ta płynów przywabia licznych i zawsze w gotowości będących nieprzyjaciół, to jest owady czyhające na zapasy istot przeznaczonych do żywienia tkanki roślinnej.

§ 68. Słoje roczne posiadają grubość bardzo niejednostajną; daleko grubsze bywają w drewnie miękkim, które jak wiadomo bardzo szybko rośnie, niż w drewnie twardém. Różnią się nawet pod tym względem w tym samym gatunku drzew podług

okoliczności w jakich się takowe znajdowały. Tak np. drzewo mniej grubieje jeśli jest gęsto innemi otoczone, i jeśli rośnie w glebie mało mu sprzyjającej; w ostrzejszym klimacie lub kiedy zima trwa dłużej. W ostatnich drzewach znajdujących ku biegunom, można wprawdzie jeszcze odróżnić słoje różne, lecz takowe są nadzwyczaj cienkie. Dla téj samej przyczyny znaleźć można częstą nierówność między kolejno po sobie następującemi słojami jednego drzewa, nierówność wywołaną przez różnice jakie zachodziły w porach lat odpowiednich.

Inna trudniejsza do oceny przyczyna nierówności słoików, zależy od wieku. Drzewo starsze rośnie prawidłowiej, lecz wolniej niż w młodości swojej, a i w czasie téj są znowu okresy w których rośnie więcej niż w innych: tak np. dąb od 20 do 30 roku. Z drugieji strony mniejsza grubość słoików, z jakiegobądź przyczyny ona powstaje, połączona bywa z większą ich twardością. Umiejętny leśnik zna te właściwości każdego gatunku drzewa; umie on wspierać je lub tamować; umie wybrać do wyrębów czasowych w których idzie głównie o ilość drzewa, porę w której wzrastanie zaczyna wolnieć; wybiera zaś inny czas tam, gdzie idzie o jakość drzewa.

Ten sam słoik nie zawsze posiada w całym obwodzie jednaka grubość, a kiedy się znajdują gdzie nierówności, te rozciągają się na znaczną liczbę kolejnych słoików i to po téjże samej stronie, tak, iż widoczną jest, że powstały z przyczyny stałe w tym kierunku działającej. Za taką przyczynę uważano zrazu rozmaite wpływy na jakie różne strony drzewa są wystawione; sądzono, że drzewo więcej rośnie od południa niż od północy. Lecz przekonano się, że to nie wywiera żadnego wpływu, w przeciwnym bowiem razie skutki musiałyby ogólnie i prawidłowo następować. Odkryto owszem, że zjawisko to zależy od wpływów czysto miejscowych; np. od tego jak drzewo zacienione jest i zakryte przez inne z jednej strony, a wolne i wystawione na wpływ światła z drugieji; nadewszystko zaś jak korzenie jego znajdują z jednej strony ziemię lepszą niż z drugieji.

§ 69. Za powód tworzenia się słoików rocznych, naznaczyliśmy zmianę pór roku, gdyż przez to roślenie bywa przerywane i odnawiane z kolei. Cóż więc dzieje się pod zwrotnikami, gdzie zimy są dość ciepłe, aby w czasie ich miała nastąpić przerwa w rośleniu? Zdawałoby się iż to powinno być trwałe

ciagle i  
przedsta  
znaczn  
sze s  
ślenie  
która w  
pod pe  
czynion  
dać jes  
eśmy p  
§ 70  
zostaw  
szaly i  
nym pr  
można  
zielny  
wpływ  
sze wo  
W rozdz  
mnogoś  
w zwyc  
§ 71  
przy pa  
ostatku  
wnych  
klimatr  
bardzie  
sto w  
pory ro  
słoje dr  
dają do  
całoroc  
dzieli, r  
tych ro  
te same  
spółro  
ukazuje  
całych  
snością  
mientam


ciągle i że drewno powstając w każdej porze, nie powinno by przedstawiać oddzielnych słojów. W istocie słoje mniej są znaczne w drzewach tych okolic, chociaż w ogóle dają się jeszcze spostrzegać. To dlatego, że po większej części i tu roślinie ulega także perjodycznemu spoczynkowi: pora sucha, która w wielu drzewach spowodowuje opadanie liści, zastępuje pod pewnym względem naszą zimę, wreszcie spostrzeżenia czynione w klimatach tak różnych od naszego, mogłyby nam dać jeszcze poznać wiele faktów różnych od tych do jakich-śmy przywykli i objawić nam takowe.

§ 70. Łatwo pojąć, że jeśli w ciągu jednego roku roślina zostawała w takich okolicznościach, które naprzemian zawieszają i ożywiają jej wzrastanie, mogły powstać w słoju ogólnym przez ten rok utworzonym, słoje cząstkowe. W istocie można to widzieć w niektórych naszych roślinach, szczególniej zielnych, których wzrost szybszy może ulegać przemianom wpływom i nosić na sobie ślady takowych, drzewo zaś twarde i lepiej ukształcone zostaje na nie nieczułym. W rozdziale o liściach i pączkach znajdziemy objaśnienie tej mnogości słojów cząstkowych, tworzących słoje drzewny w zwyczajnych przypadkach pojedynczy.

§ 71. Brak słojów oddzielnych w drzewie wieloletniem jest przypadkiem przeciwnym, częstszym od wymienionego na ostatku, a nawet stale napotykanym w wielu roślinach drzewnych. Zdawałoby się że takowy objaśnić można przez wpływ klimatu, w którym zmiana pór roku nie daje się uczuć; tém bardziej że przypadek rzeczony spostrzegać się daje dość często w drzewach hodowanych w naszych cieplarniach, gdzie pory roku są ile możności sztucznie zniesione. W niektórych słoje drzewne wcale nie są widoczne; w innych nie odpowiadają dokładnie liczbie lat. Jednakże ponieważ jednostajność całoroczna pory jest warunkiem, który jakeśmy dopiéro widzieli, rzadkim bywa nawet pod zwrotnikami; ponieważ obok tych roślin żyje wiele innych, które chociaż wystawione są na te same wpływy, przedstawiają mimo tego kolejność słojów spółśrodkowych; ponieważ wreszcie ustrojność ta szczególna ukazuje się w pewnych tylko gatunkach, rodzajach, a nawet całych rodzinach, — sądzić więc należy że takowa jest własnością przyrodzenia niektórych roślin. Jako przykłady wymieniamy tu cierńce (*Cactus*) i pieprze.

Są nakoniec rośliny, w których spostrzegamy wielość słojów, lecz każdy z nich jest utworem kilku lat. Sagowiec (*Cycas*) przedstawia jeden z tych przypadków jakie wymieniliśmy mówiąc o drzewach i krzewach hodowanych w cieplarniach.

§ 72. **Promienie rdzenne.** — W paragrafach poprzednich wypadało nam często mówić o promieniach rdzennych; opisaliśmy ich budowę, sposób tworzenia się i pomnażania. Te z nich które istniejąc od samego powstania łodygi, ciągną się bez przerwy od rdzenia do kory, nazwane zostały *promieniami wielkimi* (fig. 101 *rm*); te zaś które się dopiero w następnych latach ukazały, i które biorą początek ze słojów odpowiadających tym latom, nazywają się *promieniami małymi* (fig. 101 *rm''* *rm'''* *rm''''*). Ostatnie istnieją nawet w drzewach w których oddzielność słojów nie jest widoczną, i oznaczają lubo niewyraźne utwory kolejne, których dla jednorodności całej istoty drzewnej, nie można dostrzedz inaczej.



102. Przecięcie pionowe gałązki rocznej klonu pospolitego, idące przez rdzeń i bardzo powiększone. Widać blaszkę utworzoną przez promień rdzenny *rm*, idącą od rdzenia *m* do miększu korowego *ec*, przytykającą (do wiązki drzewnej złożonej od zewnątrz ku wewnątrz z cewek wężownicowych *l* i włókien drzewnych *fl*, wśród których spostrzedz można wielką cewkę kropkowaną *cp*; 2. do wiązki włókien korowych *fc*.

103. Przecięcie pionowe téjże gałązki prostopadle do promieni rdzennych *fl*, *fl* włókna drzewne tworzące małe wiązeczki łękowate i zostawiające przeto między sobą przestwory, w których leżą promienie rdzenne *rm*, *rm*.

Bada  
na łody  
z który  
dnym l  
*rm*). J  
wojnik  
ciągają  
wtedy  
ścią. L  
pogięte  
zbacza  
przeko  
z kory  
cienkie  
jak wi  
schodz  
wypełn  
podług  
ku niż  
Nie  
a prze  
tęż i k  
które  
znaczn  
powo  
są skł  
przez  
dem k  
przejś

§ 7  
od dr  
w okr  
tym  
dwie  
kory,  
drewn  
wiąze

Badając promienie nie tylko na przecięciach poziomych, ale na łodydze rozszczerpionej w poprzek, widzimy, że komórki z których się składają, umieszczone jedne na drugich w jednym lub więcej szeregów, tworzą cienkie blaszki (fig. 102 *rm*). Jeśli bieg wiązek jest dokładnie prosty, jak np. w powojniku (*Clematis*), blaszki utworzone przez promienie przeciągają się bez przerwy od jednego do drugiego końca łodygi: wtedy drzewo łupie się podług nich i to z największą łatwością. Lecz najczęściej wiązki cząstkowe bywają mniej więcej pogięte w swym biegu pionowym; wtedy tam gdzie takowe zbaczają na stronę, blaszki są przzerwane. Łatwo się o tém przekonać czy to badając powierzchnię drzewa obnażonego z kory, czy też, co lepiej, badając przecięcia pierwsze bardzo cienkie i prostopadłe do promieni (fig. 103). Widzimy tam jak wiązki zrazu złączone, rozchodzą się i znowu nieco niżej schodzą, zostawiając tym sposobem pomiędzy sobą przestwór wypełniony komórkami promieni, których blaszki układają się podług tych przedziałów i przez to są często grubsze w środku niż w górze i u dołu.

Nie rzadko promienie są najszerze ku obwodowi drzewa, a przeto w miejscu gdzie się stykają z układem korowym; tam też i ich żywotność zdaje się być najsilniejszą. W twarzędziu którego barwę komórki ich noszą, a nawet do utworzenia onej znacznie się przyczyniają, żywotność ich zdaje się wygasać powoli; w bielu zaś a mianowicie na jego obwodzie napełnione są skrobią, lub sokami rzadkimi, według pory, i ubarwionemi przez zieleni. Można je więc uważać za ściślej związane z układem korowym, niż ze rdzeniem; dlatego też przyrodzonym będzie przejście od badania ich do badania kory.

## K O R A .

§ 73. Wiemy już że w początku układ korowy nie różni się od drzewnego, że później nieco, każda z wiązek ułożonych w okrąg około rdzenia, przedzielona jest wazliuchnym łękowatym paskiem tkanki wólpłynnej (miazgi) (fig. 96, 97 *c*) na dwie nierówne części; z tych zewnętrzna (*fc*) należąca do kory, jest daleko mniejsza od wewnętrznej (*fb*) należącej do drewna; wiemy dalej że cały pasek komórkowy leżący zewnątrz wiązek, stanowi mięksiz kory, w którym oprócz naskórka

(*ep*) rozróżnić można wyraźnie dwa odrębne pokłady, to jest: okrywę korkową (*p*) i komórkową (*ec*); że nakoniec w tej okrywie, tudzież pomiędzy wiązkami włókien korowych, umieszczone są liczne naczynia młeczowe. Kora więc, równie jak układ drzewny, posiada część komórkową i włókno-naczynną. Lecz odwrotny tu zachodzi stosunek; co do położenia i co do ilości względnej obudwu części, gdyż miękisz ten, niby rdzeń korowy, leży na jej obwodzie i rozwija się daleko bardziej w kształtach daleko rozmaitszych niż wiązki włókno-naczynne; przeciwnie zaś widzieliśmy w drewnie, że wiązki takowe są i bardziej rozwinięte i nie tak prostego składu jak rdzeń.

Z powodu tego odwrotnego położenia części, odwrotny też zachowamy porządek w ich badaniu; nasamprzód będziemy uważali część zewnętrzną komórkową, która się najpierw tworzy, potem wiązki i włókna które składają część wewnętrzną każdego słoju, gdyż wiemy (§ 58) że w naszych drzewach tworzy się co rok słoje kory razem ze słojem drzewa. Lecz odwrotne położenie pierwszego, pociąga za sobą łatwe do przewidzenia następstwo. Kiedy słoje drewna pozostają niewzruszone, bo nowe układają się na dawniejszych, pokrywając je, słoje kory parte są bezustanku na zewnątrz dla zrobienia miejsca nowym warstwom drewna, które się na wewnątrz względem nich tworzą. Doszedłszy raz rozwinięcia jakiego osiągnąć były zdolne, nie mogą rozciągać się nieskończenie, muszą koniecznie uleść przemianom mniej lub więcej ważnym, a które jeszcze posiłkowane są położeniem zewnętrznym samej kory; pojedyncze więc warstwy pękają w różnych kierunkach i oddzielają się w większych lub mniejszych kawałkach i t. d. i t. d., a to w porządku ich tworzenia się, to jest że najdawniejsze i najzewnętrniejsze, najprzód się psują.

§ 74. Naskórek którym zajmowaliśmy się już tak szczegółowo (§ 37), że nie potrzebujemy w tém miejscu zastanawiać się nad nim, jest tą częścią kory, która w skutek rozciągania się, spowodowanego grubieniem stopniowem łodygi i wpływem działaczy zewnętrznych, musi niszczeć najpierw. W istocie istnienie jego jest zupełnie czasowem, prędzej czy później pęka, łuszcze się, usycha i niszczeje.

§ 75. Pod naskórkiem leżą jak wiemy inne warstwy komórkowe, które zastępują wtedy jego miejsce odziewając łodygę i które niekiedy znikając, z kolei zastąpione bywają

przez L  
obciążę  
wielu p  
więzyw  
riderm.  
pokład  
trzne z  
może p  
ściach.  
składaj  
§ 76  
nazwis  
stanow  
Nazwa  
z przy  
daje za  
dnego  
przedlu  
ściśle z  
ścianan  
brunatn  
ciwnie.  
grubos  
korkow  
tego p  
lecz w  
bardzi  
dzieląc  
ulożeni  
zwyca  
bardzo  
kłady d  
i z tabl  
W brzo  
rek tabl  
która z  
łatwo s  
brunatn  
lają. N  
tylko k

przez nowe pod niemi leżące pokłady. Te warstwy komórkowe obciążające powierzchnię kory, nazwane były naskórkim od wielu pisarzy, którzy przeto do wyrazu tego inne niż my przywiązywali znaczenie. Mohl radzi nazywać je *oskórkim* (periderma); która to nazwa wyraża dość dobrze położenie tego pokładu, wewnętrzne względem właściwego naskórka, zewnętrzne zaś względem ogółu kory czyli skóry (*δέρμα*). Oskórek może powstawać w rozmaity sposób i w rozmaitych głębokościach. Poznamy to lepiej badając szczegółowo różne części, składające korę od zewnątrz ku wewnątrz.

§ 76. 1<sup>o</sup> **Pokład** czyli **okrywa korkowa**. — Nadano jęj to nazwisko dlatego, że onato właśnie w niektórych drzewach stanowi istotę znaną pospolicie pod imieniem korka (*suber*). Nazwano ją także *naskórnią* (epiphloeum; ἐπίνα, *επιλος* kora); z przyczyny powierzchniowego jęj położenia. Postrzegać się daje zaraz pod naskórkim (fig. 97, 98 p); jest złożona z jednego lub więcej rzędów komórek sześciennych, lub często przedłużonych znacznie w kierunku poziomym, połączonych ściśle z sobą i nie zawierających nigdy ziarenek, opatrzonych ścianami cienkimi, które z początku są bezbarwne, później brunatne. Naskórnia raz nie rozwija się dalej, drugi raz przeciwnie rzędy jęj pomnażają się, przez co nabywa dość znacznej grubości, mianowicie w gatunku dębu znanym pod imieniem korkowego (*Quercus suber*) (fig. 101 p). Nie zawsze komórki tego pokładu posiadają zupełnie jednakową postać i barwę; lecz w pewnych odległościach znajdują się często komórki bardziej ściśnione lub tabliczkowate, ułożone również w rzędy dzielące ogół pokładu na wiele pokładów cząstkowych. Takie ułożenie niezbyt wyraźne, daje się widzieć w korku lub wiązcie zwyczajnym, gdzie warstwy komórek tabliczkowatych są niebardzo kształtne i wydatne. W *Gymnocladus canadensis* pokłady cząstkowe złożone naprzemian z komórek szerokich i z tabliczkowatych a wązkich, są prawie równej grubości. W brzozie zwyczajnej (*Betula alba*) pokłady brunatne komórek tabliczkowatych rozwijają się daleko bardziej od reszty, która zostaje białą i wietką, i dlatego, kiedy łodyga grubieje, łatwo się od nięj oddzielają; ztąd owe kawałki od wewnątrz brunatne, do zewnątrz białe, które się od kory brzoź oddzielają. Nakoniec w buku (*Fagus sylvatica*) rozwijają się same tylko komórki tabliczkowate.

§ 77. **Okrywa komórkowa.** — Nazywa się także *pokładem zielonym*, z przyczyny barwy jaką najczęściej posiada; *śródkórną* (mesophloem), z przyczyny środkowego położenia w pokładzie korowym (μεσός środkowy, φλοιός kora). W istocie od pokładu korowego otaczającego ją tém się różni, że zawiera od ścianach grubych niezbyt ściśle z sobą połączonych i zostawiających przeto między sobą częste przerwy. Wpółród komórek zielonych znajdują się dosyć często inne, zawierające kryształy.

§ 78. **Włókna korowe** czyli **łyko.** — Wiązki łyka są ułożone naprost wiązek drewna, przedzielonych od nich często cienką warstwą okrywy komórkowej; później zawsze pokładem komórek miążgi. Włókna korowe białe połyskujące, dłuższe są i cieńsze od drzewnych. Ściany ich starzejąc się, grubieją bardzo i pokryte zostają kropkami w skutek tworzenia się warstw wewnętrznych. Oneto są najmocniejsze ze wszystkich komórek roślinnych, i dlatego wiele roślin oddaje ludziami ważne usługi, dostarczając materiałów na powrozy, nici i tkaniny najtrwalsze; moc zaś włókien pozwala zostawiać takowym całą ich cienkość. Jako przykłady, wspomnimy tylko między innymi len i konopie. Sam sposób przyrządzania tychże, okazuje dostatecznie o ile włókno korowe mocniejsze jest od wszystkich innych części roślinnych; gdyż po moczeniu i miądleniu, w skutek którego wszystkie inne części zostają zniszczone, otrzymujemy włókna nietknięte.

Wiazki korowe, których ogół tworzy słoń środkowy ze słojem drzewnym, poprzedzielane są promieniami rdzennymi, będącemi niejako przedłużeniem promieni układu drzewnego, lecz daleko szerszemi i utworzonymi rozumić się z mniej ściśniętych i nie tak ściśle z sobą spojonych komórek. Jak w drewnie tak i tu wiązki albo zachowują kierunek prosty (np. w winorośli, kasztanie gorzkim), i wtedy ich promienie tworząc blaszki także proste, rozciągają się każdy między dwiema wiązkami od jednego do drugiego końca łodygi; albo też bieg ich jest pogięty (jak w wiązcie, lipie, dębie), i wtedy zachylając się naprzemian do włókien sąsiednich z prawej lub lewej strony, stykają się i zlewają z niemi, aby się niżej nieco znowu od nich odłączyć; przez to promienie rdzenne zostają przzerwane i tworzą krótkie tylko blaszki; a z przyczyny częstych

połącz  
oka sa  
(fig. 1  
wych  
dzo rz  
rych h  
cieńsz  
kszałt  
ki, w k  
dają k  
rém o  
Niekł  
niq (e  
kora)  
wewn  
Sło  
i war  
siebie  
tworz  
Jas  
połącz  
rego  
nie u  
rzają  
prze.

§  
żywo  
niepr  
zaraz  
słój  
kork  
pows  
Różn  
gich.  
Pr  
nikaj  
jedny

połączeń jednych wiązek z drugimi, powstaje siatka, której oka są właśnie napełnione promieniami (fig. 104). Każda warstwa włókien korowych przedstawia jakby rodzaj tkaniny bardzo rzadkiej. Ogół zaś warstw łyka, z których każda daje się dzielić znowu na wiele cieńszych, jeśli tylko włókna ułożone są kształtnie w rzędy, porównywano do książki, w której pojedyncze warstwy odpowiadają kartom; stąd nazwanie: *liber*, którym oznaczano zwykle włókna korowe. Niektórzy pisarze nazywają łyko *podskórnizą* (endophloeum) (ἐνδόν, wewnątrz; φλοῖος, kora), ponieważ stanowią część kory najwewnętrzniejszą.

Słoje różnych lat bywają, jak niekiedy i warstwy roczne drewna, odłączone od siebie warstwami komórek należących do okrywy, w której tworzyły się wiązki włókien.

Jasną jest rzeczą, że grubienie stopniowe łydgi, musi być połączone z odpowiedniemi rozciąganiem się słojów łyka, którego wiązki oddalają się od siebie dopóki tkanka żyje. Promienie rdzenne w skutek pomnażania się swych komórek, rozszerzają się w tym samym stosunku i wypełniają tym sposobem przestwory powstające z oddalenia się wiązek.

§ 79. W rzeczy samej, układ miękiszu korowego zachowuje żywotność bardzo silną, a nowe komórki tworzą się w nim nieprzestannie i to nie w jednym tylko punkcie, ale na wielu zarazem; gdyż oprócz corocznego powstawania pojedynczych słojów łyka i komórek bezpośrednio je otaczających, okrywa korkowa może także, jakeśmy właśnie widzieli, wzrastać, przez powstawanie komórek szerokich i komórek tabliczkowatych. Różne te narzędzia zdają się rozwijać niezależnie jedne od drugich.

Przyrodzenie oskórka i wykształcenie kory w ogólności, wynikają ze sposobu, w jaki się odbywa rozwijanie stosunkowe jednych części kory względem drugich. Rozbiéraliśmy już przy-



104. Siatka utworzona przez łyko wawrzynku mniejszego (*Daphne laureola*). — f Wiązki włókniste. — r Promienie rdzenne.

padek, w którym wzrastanie objawia się najczynniej w okrywie korkowej; wtedy łyko i okrywa komórkowa rosną prawidłowo, ale w daleko mniejszym stosunku; a oskórek składa się z pokładu komórek tabliczkowatych okrywy korkowej, czyto dlatego, że takowy sam się tylko rozwija, czy też że umieszczonym będąc pod warstwami korka prędko obumierającymi, odpycha je i zrzuca w blaszkach znacznej wielkości.

W wielu jednak drzewach okrywa korkowa nie wykształca się, owszem wcześniej zanika wraz z naskórkiem, i wtedy oskórek tworzy się albo na powierzchni okrywy komórkowej, albo w jej wnętrzu. W pierwszym razie oskórek wprzód wykształcony, zostaje party na zewnątrz przez okrywę komórkową rozwijającą się pod nim później i łuszczy się w blaszki, jak np. w jaworze, który swoją powierzchnią gładką, winien jest coraż nowym warstwom. W drugim przypadku oskórek prze na zewnątrz warstwy komórkowe i włókniste, na których wewnętrznej stronie sam się rozwija i które odpadają: albo w łykach obejmujących liczne i czas niejaki z sobą spojone warstwy miększu i łyka (np. w dębie i lipie); albo też w płatach szerokich jak w brzozie, ale odmiennego składu i pochodzenia, ponieważ miasto pokładu korowego, zawierają łyko i okrywę komórkową (jak w jałowcu i wielu srebrnicowatych (*Proteaceae*). W winorośli i przewiertniu (*Lonicera caprifolium*) słój łyka tworzący się co rok, zrzuca słój roku przeszłego i stanowi ciekawą korę łodygi. Czasem nakoniec (np. w modrzewiu i sosnie zwyczajnej), okrywa komórkowa rozwija się nadzwyczajnie i stanowi *niewłaściwy korek*, który kawałkami odpada.

Zbierzmy w krótkości to co się wyżej powiedziało. Obok ciągłego niszczenia części zewnętrznej kory, istnieje ciągłe tworzenie się komórek w jej wnętrzu. Podług tego zaś jak komórki powstają wewnątrz okrywy korkowej, na powierzchni okrywy komórkowej, lub wewnątrz téjże, części parte na zewnątrz i nakoniec odpadające, obejmują mniejszą lub większą ilość części składających korę; część zewnętrzna czyli oskórek, składa się z pokładu bardziej zewnętrznego, lub bardziej wewnętrznego względem pokładów stanowiących pierwsiakowo korę.

§ 80. Dotąd przemilczeliśmy o naczyniach właściwych, które się obficie znajdują w najwewnętrzniejszej części kory. Ła-

two mo  
poprze  
zwykle  
mogą  
obumi  
w któr  
§ 8  
wielka  
łałnoś  
po wyl  
stają w  
bywają  
biorą  
§ 8  
kor, s  
kle po  
się, że  
łami s  
przyro  
dygą,  
coraz  
i sled  
okry  
wają  
jako  
jej w  
obecn  
wnetr  
czynni  
De  
gałaz  
staje  
re naz  
wego  
czył  
wych  
znac  
sunek  
łazek  
innych

two możemy się przekonać o ich istnieniu, uważając przecięcie poprzeczne młodej łądygi, gdyż wtedy z otworów ich sączy się zwykle sok barwny. Ponieważ czynności ich odbywać się tylko mogą w częściach młodych i pełnych życia, wcześniej przeto obumierają i zostają odepchnięte na zewnątrz wraz ze słojami, w których się znajdowały.

§ 81. Następtwem tego wszystkiego co poprzedza, jest wielka działalność układu komórkowego w porównaniu z działalnością drewna, które przestaje rosnać a nawet i żyć, zaraz po wykształceniu się łądygi. Dlatego i promienie rdzenne zostają w związku nietyle z drewnem co z korą, przy której téż bywają i najliczniejsze i najszerze. Pierwszy jednak początek biorą jak się zdaje, w pokładzie miazgi.

§ 82. **Grudki** (*lenticellæ*). — Na powierzchni wielu młodych kor, spostrzegać się dają małe plamki różnego kształtu, zwykle podłużne w kierunku osi łądygi; przy dotknięciu pokazują się, że to są maleńkie wyniosłości. Nazwano je zrazu *gruczolami soczewkowatemi*; a gdy poznano, że nie posiadają wcale przyrodzenia gruczolów, *grudkami*. Wzrastają one wraz z łądygą, lecz więć w wysokości niż długość, tak, że stają się coraz wypuklejszemi i szerszemi. Badając je przez mikroskop i śledząc ich początku, przekonywamy się, że są wyrostkami okrywy komórkowej, która prze na zewnątrz części ją pokrywające, przerywa takowe i wychodzi na wierzch, tworząc niejako przepuklinę. Okrywa korkowa którą przebija, towarzyszy jej w części i stanowi obwódkę u podstawy grudki. W skutek obecności mnogich grudek na powierzchni kory, pokłady wewnętrzniejsze mogą spólnie z powietrzem, po ustaniu nawet czynności szparek ze zniknięciem naskórka.

De Candolle przyznawał grudkom inny użytek. Wiadomo, że gałązka włożona w wodę lub ziemię wilgotną, zwykle nie przestaje żyć; na powierzchni jej rozwijają się liczne korzenie, które nazwano *przydatkowemi* i które zastępują miejsce właściwego korzenia, jakiego rozumie się nie posiada owa gałązka czyli zraz. De Candolle dostrzegłszy, że korzenie przydatkowe wychodzą często ze środka grudek; uważał te ostatnie za przeznaczone do takowej czynności, naznaczając im ten sam stosunek względem korzeni, w jakim pączki stoją względem gałązek. Lecz spostrzeżono, że korzenie wychodzą także z wielu innych miejsc, na których nie ma grudek, i przypisano częste

ich wyrastanie ze środka tychże, zbiorowi komórek, który ułatwia tworzenie się nowych narządzi.

LÓDYG I BUDOWY WYJĄTKOWEJ ROŚLIN DWULIŚCIENNYCH.

§ 83. Dotąd badaliśmy takie łodygi roślin dwuliściennych, jakie zwykle napotykamy u drzew naszego klimatu. Jednak wspomnieliśmy już o niektórych wyjątkach pod względem tworzenia się, albo wielu słojuw drzewnych w jednym roku (§ 70), albo jednego pozornie słoju, powstającego z połączenia wielu wydanych przez lat kilka (§ 71). Ostatni ten przypadek nie jest zbyt rzadkim; promienie rdzenne istnieją wtedy zazwyczaj, i mogą nawet dopomóc do rozeznania wielu utworów spółśrodkowych przez to, że powstają w miejscach mniej lub więcej odległych od rdzenia środkowego. Lecz promienie te mogą także zniknąć, a cała istota drzewna może się wydawać jednorodną do tego stopnia, że niepodobna dojść ani jęj wieku, ani sposobu w jaki się tworzyła: to spostrzegamy w *Pisonia aculeata*, której łodyga mająca 12 centymetrów średnicy, nie przedstawia żadnej widocznej różności, w jakim bądź punkcie między drewnem a korą badać ją będziemy; cała składa się z cewek bardzo wielkich i prawie równych, umieszczonych dość prawidłowo w tkance komórkowej, lub włóknistej nadzwyczaj drobnej.

§ 84. Innym znowu razem pokłady kory rozwijają się nie podług prawideł zwyczajnych, daleko rozliczniejszych jakęśmy widzieli, niż co do tworzenia się drewna. Tak w wielu łodygach (np. w kokornakach) tylko przestaje rosnać po pierwszym roku, a przeto zamiast tworzyć warstwy spółśrodkowe, przywiedzione zostaje do jednego tylko słoju o małych wiązeczках.

§ 85. Pod zwrotnikami to szczególniej znajdujemy wielką ilość roślin, których łodygi różnią się od naszych. Oznaczają się w tym względzie rośliny zwane *pnąciami* (Lianes), które nie stoją o swojej mocy, lecz wspierają się na innych oplatając je i pnąc się tym sposobem aż ku ich wierzchołkowi, upadając zaś jeśli podpora zostanie usunięta. Nasza winorośl i powojnik mogą nam dać o tém wyobrażenie. Łodygi niektórych są obłe, jak gałęzie drzew naszych; w wielu jednak płaszczą się w jakim bądź kierunku, przybierając przez to mniej więcej dziwaczne kształty. Można by sądzić, że spłaszczenie powstaje

w sku  
przy  
rzeczy  
strony  
scach  
jednak  
łodygi  
ciała,  
siano  
mém ie  
istota  
runka  
grubo  
innych  
prawi  
my w  
(Bauh  
B. sec  
nie na  
w dru  
wy ks  
§  
od r  
wijan  
stajni  
ostro  
runka  
zaś m  
walca  
mniej  
więcej  
ra alb  
tom is  
powtar  
całej  
105,  
mniejsz  
106,  
anomala  
oznacz

w skutek przeszkody mechanicznej, jakiej roślinie ich doznaje przy zetknięciu się z drzewem które oplatają, i to też może rzeczywiście mieć miejsce, jeśli łodygi spłaszczone są tylko ze strony w zetknięciu będącej a wypukłe z drugiej, i jeśli w miejscach w których są wolne od zetknięcia, rozwijają się prawie jednakowo w całym obwodzie. Lecz w wielu pnączach kształt łodygi zostaje ten sam, czy takowe przyciśnięte były do innego ciała, czy też rosły wolno; ztąd rzeczywiście musiano wnieść, że niekształtność postaci leży w samym ich przyrodzeniu. W łodygach spłaszczonych istota drzewna rozwija się tylko w dwóch kierunkach wprost sobie przeciwnych, i tam też jej grubość jest dosyć znaczną. We wszystkich zaś innych kierunkach grubość jest bardzo mała, lub prawie żadna. Uderzające przykłady znajdujemy w pnączach z rodzaju strąkowych: nadwój (*Bauhinia*); w niektórych nawet gatunkach (np. *B. scandens*), łodygi nie tylko są spłaszczone, ale nadto przez zgięcie raz w jedną, drugi raz w drugą stronę, posiadają niezwykle i szczególny kształt zygzaków (fig. 105).



105.

§ 86. Postać wyjątkowa wielu pnączów, zależy najczęściej od również wyjątkowej przyczyny, to jest od nierównego rozwijania się istoty drzewnej, która zamiast rosnąć prawie jednostajnie w całym swym obwodzie i przez to tworzyć walec lub ostrokąg, grubieje w niektórych kierunkach bardzo znacznie, w innych zaś mało; ztąd traci zupełnie kształt walca lub przybiera kształt słupa mniej lub więcej głęboko, mniej lub więcej kształtnie żłobkowanego. Kora albo towarzyszy wszystkim zakrętom istoty drzewnej, której kształt powtarza się wtedy od zewnątrz na całej łodydze (fig. 106); albo też




106.

105. Przecięcie kawałka łodygi z rośliny *Bauhinia scandens*, znacznie pomniejszone.

106. Przecięcie poziome łodygi rośliny nagwiazdkowatej (*Heteropterys anomala*). — Na tej i następnej figurze punkta jakimi drewno jest pokryte, oznaczają otwory wielkich cewek kropkowanych.

wyżłobienia są tak wązkie, a kora tak gruba, że je w całości wypełnia; wtedy łądoga od zewnątrz przedstawia powierzchnią prawie równą, lub tylko zlekką wyżłobioną, chociaż w drewnie rowki są bardzo głębokie (fig. 107, 2), i tém głębsze, im ich wyżej patrzymy. Rowki wypełnione tym sposobem tkanką kory, kierują się ku środkowi naksztalt promieni, i mogą spotykając się w środku, przecinać łądogę na tyleż części mających kształt kątów, i z których każda posiada kawałek okry-



107.

107. Przecięcie innej rośliny brazylijskiej z rodziny nadgwiazdkowatych (*Banisteria nigrescens*), w różnym wieku. — 1. Kawałek łądogi odciętej poziomo, której obwód przedstawia tylko cztery lata powierzchowne. — 2. Przecięcie poziome łądogi posiadającej sześć głębszych lat; niektóre z nich zaczynają się już także dzielić. — 3. Takież przecięcie łądogi o latach weale oddzielonych i mających postać tyłuż galezi wyraźnych i położonych obok siebie. Widzimy, iż środkowa tylko posiada rdzeń i cewę rdzeniową.

wy kon  
lania si  
dy otrz  
rdzeń  
żec be  
warzys  
wstaje  
razem,  
(fig. 10

§ 8  
kształt  
tnim p  
kne po  
istota  
ski, ro  
dwóch  
tem pro

§ 88  
łać się  
wój dr  
i twor  
szące  
lecz ok  
żna w  
cowaty  
gdzie  
środek  
wnych,  
środkov

kręcaln  
§ 89  
kovega  
otacza,  
do sieb  
wszém;  
drugieg  
pnie. T

108. F

109. E

wy komórkowej. W innych razach w skutek większego pochylania się ku sobie, rowki te spotykają się przed środkiem, i wtedy otrzymujemy osobno część środkową drzewa, która zawiera rdzeń wraz z cewą rdzeniową nienaruszoną, wokoło zaś leżące będą inne wiązki pozbawione rdzenia. W ogóle kora towarzyszy wszystkim podziałom drzewa i okrywa je; ztąd powstaje pozór jakoby wiele gałęzi było zbliżonych i skręconych razem, chociaż w istocie mamy przed sobą jedną tylko gałąź (fig. 107, 3).

§ 87. Podziały te mogą się tworzyć kształtnie lub niekształtnie, a w tym ostatnim przypadku przedstawiają niekiedy piękne postaci; tak np. w wielu surmiowatych istota drzewna tworzy jakby krzyż maltański, rozwijając się w cztery strony według dwóch średnic przecinających się pod kątem prostym (fig. 108).



108.

§ 88. Może się zdarzyć, iż wiązki drzewne zamiast oddzielać się stopniowo od części środkowej drzewa, oddzielają się nagle i tworzą jakby tyleż gałęzi wznoszących się równolegle z łądygą, lecz okrytych wspólną korą. To można widzieć w niektórych mydleńcowatych (*Sapindaceae*) (fig. 109), gdzie rzeczą godną uwagi jest, iż środek każdej z tych części drzewnych, ułożonych w okrąg około środkowej, posiada kilka cewek rozkręcalnych; jestto zatem jakby rozdzielenie cewy rdzeniowej.




109.

§ 89. Wiązki uszykowane tym sposobem wokoło walca środkowego, oddzielone od niego warstwą kory, która je zewsząd otacza, mogą pozostać odosobnione lub zbliżyć się tak dalece do siebie, że się zetkną i utworzą koło spółśrodkowe z pierwszemu; później nowe wiązki mogą się także oddzielić od koła drugiego, a zbliżone utworzą z kolei trzecie koło, i tak następuje. Tym sposobem otrzymamy wiele pasów spółśrodkowych,

108. Przecięcie poziome łądygi z gatunku surmi (*Bignonia capreolata*).

109. Przecięcie poziome łądygi jednej z mydleńcowatych brazylijskich.

których nie można porównać ze zwyczajnymi słojami roślin dwuliściennych; gdyż w ogóle nie są utworami jednego roku i są poprzedzane od siebie pokładem tkanki korowej. Takie naprzemian ułożenie pokładów drzewa z pokładami kory, niekształtne jednakże, można widzieć w wielu pnących się powojowatych (*Convolvulaceae*), w miesięcznikowatych (*Menispermaceae*), w niektórych winobluszczach (*Cissus*) (np. pnącź wodnisty, p. myśliwcy), a mianowicie w *Gnetum*. W ostat-



110.

niem każdy pas drzewny przecięty jest przez promienie rdzenne na wiele wiązek, a każdej z nich odpowiada wiązka włókien łyka w otaczającej korze. Godnym jest uwagi, że łyko znajduje się we wszystkich pasach spośródkowych *Gnetum*, zaś (fig. 110) w miesięcznikowatych

tylko w pasie najwewnętrzniejszym; wszystkie zaś inne są tam złożone tylko z komórek.

§ 90. Za długo byłoby opisywać wszystkie odmiany tych łądyg wyjątkowych, znanych bardzo jeszcze niedokładnie, gdyż z przyczyny, że zamieszkują krainy odległe, nie mogły być śledzone pod względem rozwijania się tak jak drzewa nasze. Przystaliśmy na przytoczeniu głównych i na zwróceniu szczególnej uwagi na poplątanie pokładów drzewnych z korowemi, jakie w nich często można spostrzegać. Ani wątpić, że fakta lepiej i w większej liczbie poznane objaśnią ten przedmiot, i że zamiast odkrywania mnogich i nieznanych praw, znajdziemy jedno, przewodniczące rozwijaniu się wszystkich łądyg dwuliściennych, a którego przypadkiem tylko ogólniejszym będzie rozwijanie się drzew naszych. Zdaje się, iż ułożenie liści i gałęzi, które zawsze bezpośrednio nad nimi powstają, prowa-

110. Przecięcie poziome wycinka z łądygi *Gnetum*. — m Rdzeń. — em Cewa rdzeniowa. — b b b b b b b Wiązki drzewne stanowiące 7 słojuw spośródkowych, z których każdy jest utworem wielu lat. — l l l l l l l l Małe wiązki łyka, leżące na stronie zewnętrznej każdej z wiązek poprzednich i tworzące tym sposobem tyle słojuw międzyległych, ile było słojuw drzewnych.

drąc za  
wywier  
działów  
jest na  
wielkie  
leko je  
nie jest  
a zafer  
które p  
bie od  
dowy w  
z tych

§ 9  
liścien  
ukazar  
się jak  
zewnę  
rek);  
wsch  
które  
w okn  
łądygi  
Lee  
czniej  
dają in  
kowan  
rzą je  
linjami  
nych (  
dozno  
dne ba  
zewna  
tworz  
dzony

111.  
ziomo,  
przecię

drażąc za sobą tworzenie się większej ilości tkanki drzewnej. Wywiera znaczny wpływ na powstawanie tych wrębów i podziałów istoty drzewnej, mianowicie w pączkach, których wzrost jest nadzwyczaj szybki i których liście leżą często w bardzo wielkich odstępach. W naszych drzewach łądygi grubieją daleko jednostajniej w całym obwodzie, już to dlatego, że rośnięcie jest powolne, już też, a co najgłówniej, dlatego, że liście, a zatem i gałęzie są bardzo zbliżone. W roślinach zielnych, które prędko rosną i w których liście często są bardzo od siebie odległe, znajdujemy też częste wyjątki co do postaci i budowy wewnętrznej, wyjątki mogące być porównane do wielu z tych, któreśmy właśnie dali poznać.

## ŁODYGA ROŚLIN JEDNOLIŚCIENNYCH.

§ 91. Śledziliśmy zarodek jednoliścienny równie jak i dwuliścienny w pierwszych okresach życia, to jest od pierwszego ukazania się (fig. 74, 76, 79). Zarodek jednoliścienny składa się jak i dwuliścienny z tkanki komórkowej (której warstwa zewnętrzna co do postaci odmienna od reszty stanowi naskórek), aż do czasu dojrzałości, czyli w ogóle aż do okresu wschodzenia. Wtedy dopiero powstają w nim włókna i cewki, które się układają w wiązki. Wiązki są zrazu uszykowane w okrąg, i aż dotąd nie ma żadnej różnicy w jego łądyżce od łądyżki wschodzącego zarodka dwuliściennego.

Lecz w miarę jak roślina się powiększa i pokrywa coraz liczniejszymi liśćmi, wiązki drzewne mnożą się wewnątrz i układają inaczej jak w dwuliściennych, gdzie uszykowane w okrąg, zbliżają się, stykają i tworzą jeden słoń drzewny poprzerywany tylko linjami promieni rdzennych. W jednoliściennych (fig. 111) wiązki rozproszone są bez widocznego porządku w tkance komórkowej, jedne bardziej ku środkowi, inne, liczniejsze, ku zewnątrz. Tkanka leżąca między niemi, nie tworzy w odstępach linii prostych wyprowadzonych od środka do okręgu, słowem pro-



111.

111. Kawałek łądygi szparagu, którego koniec wyższy odcięty został poziomo. Na téj i na wszystkich następných figurach punkta znajdujące się na przecięciu, znaczą wiązki drzewne. — *f* Liść przywiedziony do postaci luski.


mieni rdzennych. Środek wcale z komórek złożony lub przernięty nie wielu tylko wiązkami, przedstawia poniekąd rdzeń, niedokładnie jednak określony i pozbawiony swęj cewy, której piętnem jest obecność cewek rozkręcalnych, jakieśmy to widzieli w dwuliściennych. W wielu jednoliściennych, rdzeń tworzy wa-



112.

lec dość duży i kształtny, nie zawierający zupełnie wiązek drzewnych, mianowicie téż w trawach, jak to można widzieć w kukuruzie, trześni, etc. Lecz wtedy nie może się zastosować do szybkiego rozwijania łodygi, której środek z początku wypełnia, a która później staje się czezą, w skutek zniknięcia rdzenia (fig. 112). Resztki tegoż dają się widzieć na ścianach wewnętrznych rurki, w jaką zamieniła się łodyga; co wreszcie zdarza się i w dwuliściennych, o rdzeniu bardzo wielkim, a których wzrost jest bardzo szybki, np. w baldaszkowych.

§ 92. Porównajmy pod względem budowy wiązkę włókno-naczynną roślin jednoliściennych z wiązkami jakieśmy opisali w łodydze, lub gałęzi przynajmniej rocznej, dwuliściennych, a znajdziemy, iż jest do nich podobne. W istocie (fig. 113), posiada ona od wewnątrz ku zewnątrz: 1) Cewki węzownicowe (*l*), następnie cewki większe kręskowane lub kropkowane (*vp*), jedne i drugie otoczone komórkami kropkowanymi (*u*), a niekiedy przedłużonemi we włókna; 2) kupki naczyń właściwych (*l*) i włókien o ścianach pojedynczych bardzo cienkich, obciążnione innemi włóknami (*f*) leżącemi najbardziej na zewnątrz, które mają ściany grube i są ułożone w półksiężycu, warstwami obejmu-



113.

112. Kawalek łodygi trzeiny błotnej (*Arundo phragmites*) z węzłem. Łodyga jest czezą w skutek zniknięcia miększu środkowego rdzenia, który się jeszcze daje widzieć w równi z węzłem *n*.

113. Przecięcie poziome wiązki włókno-naczynnej, wziętej z palmy *Corypha frigida*. — *t*. Cewki węzownicowe. — *vp* Cewki wielkie kropkowane. — *u* Komórki towarzyszące cewkom, tworzące miększ lub na innych miejscach przedłużone we włókna. — *l* Naczynia właściwe czyli mlęczowe. — *f* włókna grube podobne łykowym.

jącami jedna drugą. Nie znajdujemyż w tém połączeniu wszystkich żywiołów wiązki włóknonaczynnej dwuliściennych, w części wewnętrznej odpowiadających drewnu, w zewnętrznej zaś korze? Dlatego też dosyć trudno jest odróżnić w pierwszym roku, łodygi zielne jednoliściennych od wielu dwuliściennych, mianowicie tych, przy którychśmy wspomnieli o rozdzieleniu wiązek cewy rdzeniowej w korze. Lecz posuńmy porównanie dalej, a podobieństwo zniknie.

Wiązka dwuliściennych posiadała jednakową budowę w całej długości; wiązka jednoliściennych uważana w różnych wysokościach przedstawia różną grubość i budowę. Pierwsza o pewnym czasie (zwykle po roku) dzieliła się na dwie części, jedną należącą do drewna, drugą do układu korowego, między nimi zaś ustrajała się wiązka nowa, która się później podobnie rozdzieli.

Żywioty wiązki jednoliściennych nie rozdzielają się nigdy, a jeśli porównalibyśmy wewnętrzne z drewnem, zewnętrzne z łykiem, tylko to byłoby rozrzucone po całej łodydze pomiędzy wiązkami drzewnymi, do których byłoby przyłączone, bez widocznego porządku.

Po tym pierwszym rzucie oka, przewidzieć można, jak dalece sposób wzrastania musi być różny w łodygach dwu i jednoliściennych, i że w tych ostatnich nie można się spodziewać ani słojuw drewna




114.

114. Dwa drzewa jednoliścienne, należące do dwóch różnych rodzin: jedno, 1. do palm, drzewo kokowe (*Cocos nucifera*); drugie, 2. do pochutnikowatych (*Pandanus odoratissimus*). Pierwsze przedstawia przykład łodygi pojedynczej, drugie łodygi gałęzistej. — Dwie postaci ludzkie są umieszczone u spodu, aby dać wyobrażenie o wysokości tych drzew.

spółśrodkowych, z których co rok jeden się tworzy, ani słojuw łyka.

§ 93. Na nieszczęście, nie mamy prawie w klimacie naszym roślin jednoliściennych drzewnych, nie możemy tu przeto, jak przy dwuliściennych, przytaczać uczącemu się przykładów mu znajomych, i których łatwo może dostać; za to znaleźć można często pomiędzy rycinami, jakie zwykle dołączone bywają do opisów podróży, obrazy palm, które z drzew jednoliściennych są najznakomitsze, a widząc je, każdy uderzonym zostanie różnicą, jaka zachodzi między nimi a drzewami naszymi. Palmy bowiem posiadają pień wyniosły, grubości zwykle jednostajnej od góry do dołu, wcale nagie, niepodzielony na gałęzie i gałązki i tylko u wierzchołka noszący pęk wielkich liści (fig. 114, 1). *Yucca aloëfolia*, dosyć częsta w ogrodach, szczególnież południowych, może o postawie palm dać małe wyobrażenie.

§ 94. Przejdźmy od uważania zewnątrz palm do ich wnętrza (fig. 115), a znajdziemy zbiór wiązek włóknistych rozrzuconych bez porządku w tkance komórkowej, jakieśmy opisali w łodyżce jednorocznej. Tylko że wiązki rozmożyły się



115.


nadzwyczajnie; rzadsze i bardziej od siebie oddalone w środku łodygi (*m*), stają się liczniejszymi i bardziej ściśnionemi a zarazem mocniej barwnemi ku obwodowi, gdzie też tworzą słoju zbity i czarniawy (*b*). Takowy jużto bywa bezpośrednio pokryty pokładem komórkowym który nazwano korą (*e*), już też pomiędzy nim i owym pokładem znajduje się pas (*l*) wiązek mniej ściśle połączonych, cieńszych, mniej ściśnionych i mniej barwnych, a któryto pas z położenia i przyrodzenia swego, brany był może często za pas łyka.

115. Przecięcie poziome wycinka z łodygi palmy (*Astrocaryum murumuru*). *m* Część środkowa, czyli rdzeniowa, w której wiązki drzewne są rzadsze i bardziej rozproszone. — *b* Część zewnętrzna czyli drzewna, w której wiązki liczne i ściśnione tworzą słoju zbity i czarniawy. — *l* Słoju wiązek cieńszych i mniej ściśnionych, który porównywano z łykiem — *e* Pokład komórkowy korowy.

§ 95. Budowa taka większej ilości palm znaną była już starożytnym. Desfontain'owi przynależy zaszczyt odkrycia jęj we wszystkich jednoliściennych i objawienia następnego, bardzo prostego prawa: *Rośliny dzielą się podług budowy wewnętrznej łodyg na dwie wielkie gromady: 1° na takie które nie posiadają wyraźnych słojów spółośrodkowych, których twardość zmniejsza się od obwodu ku środkowi, w których rdzeń leży między wiązkami włókien i które nie mają przedłużeń w kształcie rozbiegających się promieni: rośliny jednoliściennne; 2° na takie, które posiadają słoje spółośrodkowe wyraźne, których twardość zmniejsza się od środka ku obwodowi, w których rdzeń zamknięty jest cewą podłużną, i które mają przedłużenia rdzenne w postaci rozbiegających się promieni: rośliny dwuliściennne.* Prawo to, tak wyrzeczone przez Desfontain'a nie zostało dotychczas zaczeponém. Inaczej się ma z włośkami o sposobie rozrastania się łodyg jednoliściennych, które z praw tych wyciągnął, z wielkiém wprawdzie powątpiewaniem jak świadczy Daubenton, lecz które później powszechnie przyjęte i uznane były. Ponieważ wszystkie liście są tu zwykle skupione na wierzchołku drzewa, a w skupieniu tém najmłodsze czyli na ostatku utworzone umieszczone są w samym środku; ponieważ dalej w liściach kończą się wszystkie wiązki włókno-naczynne, których ogół stanowi część twardą łodygi; wiązki zatem kończące się w liściach najmłodszych, a zatem także na ostatku utworzone, położone są w środku względem reszty wiązek. Pień przeto twardnieje ciągle; przez tworzenie się w jego wnętrzu nowych wiązek, odpychających na zewnątrz dawniejsze, które tym sposobem zbliżone i coraz bardziej ścieśnione tworzą pas ów zewnętrzny, twardszy od wszystkich innych części. Byłbyto sposób rozrastania się zupełnie odwrotny względem rozrastania się dwuliściennych, gdzie pokład najnowszy jest zawsze najzewnętrzniejszym, a tém jest starszy, im się bliżej środka znajduje. Nazwano *zewnątrz-rostemi (odśrodkowemi Cz.)* łodygi dwuliściennych, które podług téj teoryi wzrastają ku zewnątrz; *wewnątrz-rostemi (dosrodkowemi Cz.)* łodygi jednoliściennych, które rosna ku wewnątrz.

§ 96. Lecz aby wnioski te były prawdziwemi, potrzeba iżby wiązki zachowały wszędzie te same stosunki, a przeto aby zatrzymały kierunek równoległy, w całej swój drodze, tworząc

niejako snopek. Tego właśnie nie znajdujemy, owszem przeciąwszy łądęgę palmy wzdłuż, widzimy iż wiązki gną się, krzywią i krzyżują we wszystkich kierunkach. Toż samo lubo



116.

i zbliża się coraz bardziej do obwodu, dopóki nie napotka kory, gdzie bieg jój staje się prawie prostym. Opisuje więc długi łuk obrócony wypukłością ku wewnątrz i bardziej krzywy u góry.

116. Stosunek czterech par wiązek *a, b, c, d*. — 1. Podług teorii łądęgi wewnątrzrosłych. — 2. Podług teorii Mohla.

nie tak wyraźnie można widzieć w krótkiej łądędze poru (*Allium porrum*), lub każdej innej roślinie zielnej z naszych jednoliściennych, gdzie liście osadzone są gęsto na łądędze bardzo skróconej.

Jeśli zechcemy śledzić jedną z wiązek w całym jój biegu od góry do dołu, to jest od punktu na powierzchni łądęgi, w którym wiązka opuszcza tę ostatnią i przechodzi w liść, ujrzymy, że takowa idzie najprzód nieco ukosnie ku wewnątrz, a następnie dosięgnąwszy mniej więcej środka, zstępuje w dół. Tymto sposobem zdaje się wychodzić ze środka łądęgi, i właśnie przez zaniechanie śledzenia dalszego jój przebiegu, postrzegacze omyleni zostali co do miejsca, z którego bierze początek, i przypuszczali łądęgi wewnątrzrosłe. Śledząc wiązkę rzeczoną niżej, byłiby się przekonali, że przybiera kierunek pochyły, przeciwny temu, jaki zachowywała u góry, to jest, że idzie ku zewnątrz

W prz  
mi ws  
ona, p  
w ko  
wną  
najba  
że wi  
w swy  
lają si  
tego,  
że prz  
wiązk  
końca  
tęj się  
Jedna  
oznacza  
rji o k  
co opi  
sunku  
i w dr  
§ 9  
jest j  
włoty  
które  
nia s  
wiązk  
stawia  
żownia  
komór  
ilości  
Te ost  
toś w  
żę nie  
od we  
które  
dujemy  
stawie  
tylko,  
się na  
kami s

W przebiegu swym wiązka musi się krzyżować kolejno z temi wszystkimi, które leżą pod nią i są utworzone wprzód niż ona, ponieważ takowe szły do liści niższych, a przeto starszych; w końcu jednakże wiązka, o której mowa, kończy się na zewnątrz od nich. Wiązki więc najnowsze, muszą także leżeć najbardziej na zewnątrz, równie jak w dwuliściennych, tylko że wiązki jednoczesne zamiast pozostać prawie równoległemi w swym biegu i tworzyć przez to ogółem swoim walec, nachylają się ku sobie u góry, a rozbiegają się u dołu. Dodajmy do tego, że łuk, jaki zakreślają, nie leży na jednej płaszczyźnie; że przeto przecięcie pionowe łodygi nie może nam odkryć wiązki którejkolwiek w całości od jednego do drugiego jej końca. Bieg jej kręty i trudności śledzenia go wpośród całej tej siatki, czynią poszukiwania takowe bardzo zawikłanemi. Jednakże, dwie schematyczne figury (fig. 116), na których oznaczono bieg czterech par wiązek (*a, b, c, d.*) podług teorii o łodygach wewnątrz roślących (1) i podług drugiego tylko co opisanego sposobu widzenia (2), ułatwią zrozumienie stosunku, w jakim zostają względem siebie wiązki w jednym i w drugim razie.

§ 97. Napomknęliśmy, że budowa pojedynczych wiązek nie jest jednostajną w całej ich długości. U góry przeważają żywioły, któreśmy porównali do drewna, u dołu przeciwnie te któreśmy porównali z korą; stosunek jednych do drugich zmienia się stopniowo. W wyższej części drogi jaką przebiegają wiązki, to jest tam, gdzie ich łuk zmierza ku środkowi, przedstawiają od wewnątrz ku zewnątrz: najprzód liczne cewki węzownicowe, później cewki większe innego rzędu, otoczone komórkami; nakoniec w mniejszej, różnej, lub nieco większej ilości naczynia właściwe i włókna grube podobne łykowym. Te ostatnie pomnażają się ciągle i powiększają przez to objętość wiązek, im bardziej te zbliżają się do obwodu, tak, że niżej nieco znajdujemy owe włókna w znacznej ilości obrzeżone od wewnątrz niewielu tylko komórkami drzewnymi, wpośród których leży jedna lub dwie wielkie cewki; niżej jeszcze znajdujemy same tylko włókno łykowe. Przy samej nakoniec podstawie wiązka przebiegając wzdłuż kory i już wcale włóknista tylko, staje się zwykle bardzo cienką, a często nawet dzieli się na liczne cząstkowe wiązeczki, które zlewając się z wiązkami sąsiednimi, powiększają zagmatwanie.

Na przecięciu poziomém łodygi, wiązeczki tworzą część zewnętrzną. Są one cieniutkie, połączone wietko za pomocą miększu bardzo drobnego i stanowią pokład, który brano niekiedy za łyko, lecz który jak widzimy ma tu inny początek jak w dwuliściennych, i który niekiedy wcale nie istnieje. Część wiązek złożona głównie z włókien o ścianach grubych, tworzy pas ów twardy i barwny; nakoniec część ich wyższa, gdzie oprócz włókien znajdują się cewki i komórki drzewne, tworzy owe punkta rzadszą wpośród miększu wewnętrznego, tudzież punkta znajdujące się przy osadzie liści. Wszystkie te wiadomości winni jesteśmy nowym pracom Hugona Mohl'a.

§ 98. Łodyga grubiała w początku szczególniej przez rozrastanie się osobnicze każdego z żywiołów ją składających. Lecz czemuż zwykle grubienie to wstrzymuje się dość rychło, i dlaczego łodyga posiada prawie tę samą średnicę u góry co u dołu, kiedy wszakże zdawałoby się, że przytwarzanie się ciągle nowych wiązek odpowiadających nowym liściom, powinno ją ciągle zgrubiać? Oto dlatego, że ilość wiązek nie może iść w porównanie z ilością ich w dwuliściennych, gdyż najczęściej łodyga, miasto być gęsto pokrytą gałęziami i liśćmi, nosi te ostatnie tylko u wierzchołka, a wwyż rośnie jedynym tylko wierzchołkowym pączkiem. Prócz tego, wiemy, że wiązki nie są równej grubości w całym swym biegu, ale że idąc na dół, stopniowo cieńszeją i jak się zdaje wyczerpują w końcu. Podstawa więc łodygi nie posiada całego ogółu wiązek, a ilość tych, które w niej napotykamy zrównoważoną jest przez to, że są cieńsze u dołu a grubsze u góry; podobnie dzieje się na każdym stopniu wysokości łodygi. Jednakże niekiedy zrównoważenie to nie jest zupełnym w każdej wysokości i dlatego napotykamy łodygi nabrzmiałe u dołu, w środku, lub u góry, bez wątpienia podług epoki, w których drzewo rosło najsiłniej.

§ 99. Dotąd uważaliśmy łodygi jednoliścienne nierozgałęzione i rosące wwyż jednym tylko wierzchołkowym pączkiem. Jednakże przypadki takie lubo najliczniejsze, nie stanowią prawa ogólnego. Widzimy, że wiele naszych jednoliściennych: szparag, złotogłowiec i wielka liczba traw, posiadają gałęzie; lecz ponieważ łodygi ich żyją rok tylko jeden, niepodobna przeto z pewnością obliczyć, jaki wpływ ma rozwijanie się gałęzi na ich grubienie. Więcćj stanowezemi są spostrzeżenia czynione na niektórych drzewach krain ciepłych, które się ta-

koż r  
i smo  
nadz  
kiew  
drzew  
go z  
rozwi  
wiązk  
jej śr  
grubi  
jaka  
pozost  
§ 1  
który  
stawy  
skład  
pokry  
pokła  
włók  
znac  
stają  
jakt  
wys  
istot  
jedn  
gdz  
liście  
jedn  
pełni  
wyż  
nazw  
w to  
nawe  
moż  
wagi

(4)  
jedno  
wzras  
mogła  
żył z

koż rozgałęziają jak np. pochutnik (*Pandanus* fig. 114. 2) i smokwie. Takowe grubieją także, a nawet mają niekiedy nadzwyczaj wielką średnicę. Dosyć będzie przytoczyć tu smokiew krwawosok (*Dracaena draco*), jedno z najgrubszych drzew na kuli ziemskiej, tak, że w pniu wypróchniałym jednego z nich urządzono małą kapliczkę (1). Skoro pęczki boczne rozwiną się na ukształconej już łodydze roślin jednoliściennych, wiązki im odpowiednie zamiast przerywać łodygę i dążyć do jej środka, zbiegają między drzewem a korą i wtedy łodyga grubieje podobnie jak w dwuliściennych, z tą tylko różnicą, jaką wynika z położenia względnego i budowy wiązek, które pozostają niepodzielone, jak wiązki środkowe.

§ 100. Korą jednoliściennych nazwaliśmy pokład komórkowy, który pokryty zrazu naskórkem, i zgrubiony zwykle przez podstawy liści, stanowi część najzewewnętrzniejszą łodygi. Co do składu, różni on się dostatecznie od pokładu włóknistego, który pokrywa, i od którego się czasem oddziela. Niekiedy znowu pokład ten nadzwyczaj cienki i mocno przywarty do pokładu włóknistego, zléwa się z nim zupełnie; rzadko kiedy dochodzi znacznej grubości. Tak np. łodyga *Tamus elephantipes*, rośliny dosyć częściej teraz w naszych cieplarniach, ma postać jakby kopuły, której powierzchnia podzielona jest na liczne wysepki pooddzielane brózdami. Wysepki te są pokładami istoty korowej podobnej do korku, lecz mimo tego podobieństwa jednostajna tkanka komórkowa tej istoty, nie przedstawia nigdy okrywy korkowej ani komórkowej, jaką opisaliśmy u dwuliściennych. Zresztą wiemy, iż łyko nie znajduje się w korze jednoliściennych, ponieważ to, co za nie uważano, inny ma zupełnie początek, jest tylko dolną kończyną włókien drzewnych; wyżej przedstawia istotnie drewno i może słusznie przyjąć to nazwanie. Kora więc równie jak układ drzewny, różne są w łodygach tych dwóch wielkich gromad roślin i odrzuciwszy nawet podział na wewnątrz i zewnątrzrosłe, niemniej przeto można je rozróżnić za pomocą piętn anatomicznych wielkiej wagi i łatwych do ocenienia.

(1) Często zdarzające się niszczenie środkowej części łodygi w roślinach jednoliściennych, jest najmocniejszym zarzutem przeciw teorii o wewnątrz-wzrastaniu. Roślina wewnątrzrosła, której środek zostałby zniszczony, nie mogłaby żyć tak, jak zewnątrzrosła, którąbyśmy do pewnej głębokości obnażyli z kory.

## EODYGI ROŚLIN BEZLIŚCIENNYCH.

§ 101. Widzieliśmy (§ 27) że zarodek roślin bezliściennych czyli *zarodnik (spora)*, nie przedstawia żadnej różnicy w częściach, z których się mają rozwinąć korzenie, łodygi i liście; że to jest zwykle komórka pojedyncza, wypełniona istotą ziarenkowatą. Jeśli się znajduje w okolicznościach sprzyjających wschodzeniu, strona zwrócona ku ziemi, lub każda inna powierzchnia dostatecznie zwilgocona, przedłuża się w rurkę, która zastępuje korzeń. Drugi koniec w skutek powstania nowych komórek układających się obok pierwotnej, rozrasta się w rozszerzenie czyli blaszkę zwykle poziomą, a wiele z tych nowych komórek wypuszcza znowu rurki korzeniowe podobne pierwszej. Roślenie znacznej liczby bezliściennych nie postępuje dalej: łodygi nie rozwijają się wcale. W wielu żyjących w wodzie, np. w ramienicy (*Chara*), podczas kiedy korzenie zagłębiają się w mule, wznosi się w przeciwnym kierunku walec, który można nazwać łodygą lub gałęzią. Jestto po prostu rząd rurek czyli komórek podłużnych zrosniętych końcami. Inne mają łodygę bardziej już złożoną, ponieważ takowa powstaje z połączenia wielu komórek. Najzewnętrniejsze z tych, zachowując kształt pierwotny zaokrąglony lub wielokątny, tworzą okrywę osi złożonej z komórek innej postaci, podłużnych lub nawet naśladowujących włókna. To można widzieć np. w mchach i wątrobnicach. Lecz wszystkie te rośliny są całkowicie komórkowe; cewki nie istnieją w nich wcale.

§ 102. Ukazują się one dopiero w zeczwórnikowatych (*Marsileaceae*) i widłakach, których łodyga pod okrywą komórkową posiada osć komórkowo-naczynną. Ta składa się z jednej lub wielu wiązek połączonych drobnym miękiszem. Wiązki bywają zwykle spłaszczone, nie zaś jak w roślinach liściennych mniej więcej walcowate; tworzą one jakby wstążki różne złożone w podłuż lub pogięte. Jeśli chcemy oznaczyć pod drobnowidzem gatunek naczyń zbliżonych tym sposobem w spłaszczone wiązki, znajdziemy same tylko cewki pierścieniowe, albo najczęściej te, któreśmy nazwali drabinkowatymi. Są to także włókna części niezależne jedne od drugich niż połączone w jednociągłą rurkę. Wszystkie te rośliny tak jak je teraz na kuli ziemskiej znajdujemy, są zielne; lecz wnosząc

z pozos  
w stani  
łodygi  
że sam  
miary o  
drewna

§ 10  
dzina ro  
rozszer  
rodzina  
bieństw  
dać nie  
były ow  
rośliny.

umiark  
tylko sa  
nawet

jeden ro  
te pod

równie  
lub kil

także  
drabin

stawia  
czyli,

kszye  
szu kro  
gatis).

§ 10  
siednic

cie ina  
dzą bo

sokich  
tylko r

jednoli  
reśmy

117.  
Eodyga  
le z nag  
jących j

z pozostałości roślin kopalnych, których teraz nie napotykamy w stanie życia, twierdzić można, że w epoce bardzo odległej, łodygi zdające się należyć do tych-że samych rodzin, posiadały wymiary daleko większe i twardość drewna.

§ 103. Jest jeszcze jedna rodzina roślin bezliściennych bardzo rozszerzona na ziemi, a tą jest rodzina paproci, które dla podobieństwa w budowie mogą nam dać niejaki wyobrażenie, czém były owe wielkie przedpotopowe rośliny. Wprawdzie, w naszym umiarkowanym klimacie rosną tylko same zielne paprocie, a jeśli nawet łodygi ich żyją więcej nad jeden rok, to są czołgające i ukryte pod ziemią. W środku posiadają równie jak łodygi widłaków, jedną lub kilka tylko wiązek złożonych także z cewek po większej części drabinkowatych. Figura 48 przedstawia kilka kawałków tych naczyń, wziętych z jednej z największych naszych paproci, z długości królewskiego (*Osmunda regalis*).

§ 104. Pod zwrotnikami i w sąsiednich krajach ciepłych, paprocie inaczej się rozwijają; dochodzą bowiem wielkości drzew wysokich, 15—20 metrów. Z temito tylko możemy porównać drzewa jednoliścienne i dwuliścienne, któreśmy poprzednio badali. Są one




117.

117. Paproć drzewna (*Alsophila perrotetiana*) z Indji Wschodnich. — Łodyga walcowata posiada przy podstawie *ra* zgrubienie stożkowate, powstałe z nagromadzenia korzeni przydatkowych wyrastających z niej i pokrywających ją zupełnie.

z zewnątrz podobniejsze do jednoliściennych, mają bowiem pnie wyniosłe, pojedyncze, prawie równej grubości przy podstawie i u góry; noszą też równie na wierzchołku koronę wielkich liści, których nie posiadają na reszcie powierzchni.

§ 105. Długi czas sądzono, że budowa tych paproci jest taka sama jak roślin jednoliściennych. Lecz jeśli przeciąwszy pień paproci drzewnej (fig. 118), będziemy badać jej żywioły, przekonamy się o różnicy jaka



118.

z położenia i z przyrodzenia swego może być wzięty za rdzeń (*m*). Zewnątrz słoju leży inny pas komórkowy (*p*), powleczoney w początku życia rośliny naskórkem, później zaś okrywą twardą (*e*), utworzoną z długotrwałych podstaw liści które opadały, w miarę jak pień się wznosił a one przestawały tworzyć jego koronę.

Na przecięciu poziomem poznają się wiązki po zbitości ich utkania i barwie zwykle czarniawej; barwa ta należy do tkanki drzewnej (*f*), której pasek w każdej z wiązek otacza liczne cewki (*v*) pierścieniowe, kręskowane, a najczęściej drabinkowate. Całe wiązki a zatem i słoju utworzony przez ich zbliżenie lub połączenie, ma zwykle postać przepaski, która poskła-

118. Przecięcie poziome łodygi paproci drzewnej (*Cyathea*). — *m* Rdzeń zajmujący cały środek. — *zl* Pas drzewny utworzony przez wiązki ułożone w tym przypadku w okrąg poprzerywany, w innych w słoju jednociągły. — *f* Zbiór włókien drzewnych czarnych, tworzących brzeg każdej z wiązek. — *v* Zbiór cewek drabinkowatych, zajmujących środek każdej z wiązek i tworzących pasek białawy różnie pogięty i otoczony czarnym brzegiem — *p* Słoju zewnętrzny miękkiszem zostający lub nie w związku ze rdzeniem. — *e* Okrywa twarda zastępująca miejsce kory.

dana lub  
więcej d

Schult  
białawy  
drzewny  
między f  
podobne  
tu się zn

Niekie  
głe, złoż

Badają  
kie jego  
wnych o  
od siebie  
przeło F  
ten moż  
moczeni  
zostają  
wionej l  
porówna  
idą tak

§ 10  
dzi mię  
liścienn  
a nie ro  
jeden f  
w dwul  
budowa  
w nich  
czej usz  
pojął de  
sikie ce  
trzebne

§ 10  
przez r  
później  
kową s  
tak grub  
dłatego,

dana lub pogięta rozmaicie, przedstawia kształty mniej lub więcej dziwaczne, mniej lub więcej wytworne.

Schultz twierdzi, że oprócz tych żywiołów, to jest cewek białawych, stanowiących środek wiązek i oprócz komórek drzewnych czarniawych, tworzących ich obwód, znalazł jeszcze między jednymi i drugimi naczynia mlęczowe i włókna długie podobne łykowym. Mohl zaś przeczy, aby naczynia mlęczowe tu się znajdowały.

Niekiedy w środku rdzenia leżą inne małe wiązeczki okrągłe, złożone z takich samych cewek jak wiązki tworzące słoje.

Badając słoje ów na przecięciu podłużnym, widzimy, że wielkie jego wiązki nie idą prosto, lecz wężykowato, tworząc w pewnych odległościach, przez wzajemne zbliżanie i oddalanie się od siebie, przestwory wypełnione tkanką komórkową, która przeto łączy rdzeń z tkanką przy obwodzie leżącą. Rozkład ten można dobrze widzieć niszcząc tkankę komórkową przez moczenie, które nie narusza ani włókien, ani naczyń. Te pozostają w postaci walca wydrażonego lub pochwy podziurawionej licznymi, dosyć kształtnymi otworami. Walec takowy porównać można do walca tych dwuliściennych, których wiązki idą także falisto, a lepiej jeszcze do okrywy tychże łykowej.

§ 106. Opis ten dostatecznie wyjaśnia różnicę, jaka zachodzi między łądygą paproci drzewnych, a łądygą jedno i dwuliściennych. Różnica ta jest następująca: wiązki ułożone w okrąg, a nie rozproszone bez porządku jak w jednoliściennych, tworzą jeden tylko a nie więcej słojeów spółośrodkowych, którym w dwuliściennych odpowiada tyleż słojeów kory. Prócz tego, budowa i postać wiązek jest zupełnie inna; nie znajdujemy w nich nigdy cewek rozkręcalnych, i żywioły są tu wcale inaczej uszykowane jak w roślinach liściennych. Jeśli uczący się pojął dobrze opis jednych i drugich, odkryje z łatwością wszystkie cechy odróżniające, które wyszczególniać byłoby niepotrzebnym powtarzaniem.

§ 107. Pień paproci drzewnych nabywa pewnej grubości przez rozrastanie się różnych żywiołów, które go składają; później przestaje grubieć i posiada w każdej wysokości jednakową średnicę. Za ledwie wyrosłszy nieco nad ziemię, jest już tak gruby, jak nim będzie mając 15 metrów wysokości, a to dlatego, iż roślinie tylko u wierzchołka, a wiązki jego przedłu-

żają się bez rozgałęzienia, i powstają niezmiennymi w każdym wieku i w każdej wysokości.



119.

Mniemano, że pień paproci bywa zawsze pojedynczy, jednakże mamy przykłady że się rozgałęzia. W ogrodzie paryzkim znajduje się pewna paproć indyjska (*Alsophila perrotetiana*), u góry widelkowato podzielona. Przeciawszy wpodłuż takie widelki (fig. 119), widzimy, że nie powstają przez wyrośnięcie gałęzi z pnia jak w dwuliściennych, lecz że pień jest jakby rozdwojony, że cewa rdzenna przedłuża się równo i bez przerwy w obie gałęzie.

Wiele roślin bezliściennych zielnych, o których już wspomnieliśmy, jakoto paprocie, widłaki, zeczwórnikowate, zdają się być także rozgałęzionemi; lecz można się przekonać, że to jest jak i w poprzednim przypadku, skutkiem rozdwojenia wierzchołkowego, nie zaś wyrastania bocznych gałązek. Każde rozgałęzienie jest widelkowatém, a kiedy śledzimy sposób w jaki powstało, widzimy, że w skutek obecności dwóch pączków wierzchołkowych zamiast jednego. Te przedłużają się albo jednakowo, albo niejednakowo, a następnie jeden z nich lub obadwa rozdwarzają się znowu. Roślina wydaje się mniej lub więcej gałęzistą, podług tego, jak często powtórzył się taki podział.

§ 108. Jestto więc prawem ogólném dla łodyg roślin bezliściennych, że rosną tylko u wierzchołka i tylko w skutek przedłużania się wiązek raz utworzonych, że się przeto różnią od łodyg roślin liściennych, gdzie na powierzchni dawnych wiązek tworzą się bez przestanku nowe. Z tego powodu radzono im nadać nazwę *wierzchołkorostłych* (*acrogenae*), i przez to położyć je obok wspomnianych poprzednio *wewnątrz* i *zewnątrzrośłych*. Lecz widzieliśmy, że nazwiska te muszą być odrzucone, a więc i owo nowe staje się niepotrzebném. Jednakże te wyrazy niekiedy wygodnie mogą być użyte w wykładzie, jeśli zapomniemy o ich źródłosłowie i jeśli je zechcemy określić pojęciami ściśle naukowemi.

119. Przecięcie pionowe paproci (*Alsophila perrotetiana*), przy rozdwojeniu jej łodygi.—*m* Rdzeń.—*z* Skój czyli pochwa drzewna.

§ 109. Wspomnijmy tu jeszcze o jednym wyjątku od wyżej przywiedzonego prawa: znajdziemy go w jednej szczególnej rodzinie bezliściennych, w tak nazwanych skrzypiach (*Equisetum*), których łodygi nie mają nic wspólnego co do budowy z opisanymi dotychczas. Wewnątrz nich znajduje się wielkie wydrążenie walcowate, poprzedzielane w pewnych odległościach przegrodami, które odpowiadają tyłuż stawom. Ich części mięszsze, prawie całkowicie komórkowe, zawierają inne mniejsze przerwy (przewody powietrzne), ułożone w jeden lub dwa okręgi. Kilka cewek pierścieniowych bieży wzdłuż tych przewodów. Zewnątrz łodygi, ze stawów wyrastają wokoło gałązki. Liści nie ma i śladu, gdyż nie można brać za nie pochewek błonowych, które się znajdują także w stawach na wewnątrz od gałązek; gdyby bowiem takowe powstawały ze zróżniczenia okółka liści, gałązki musiałyby wyrastać z pomiędzy łodygi i pochewek. Za to naskórek posiada mnóstwo szparek, ułożonych w rzędy prawidłowe. Nie znajdujemy przeto w budowie skrzypców nic takiego, coby można porównać z łodygami, o których mówiliśmy poprzednio.

## K O R Z E Ń.

§ 110. Korzeniem zowie się ta część rośliny, która zachowuje kierunek przeciwny łodydze, to jest, która dąży ku wnętrzu ziemi. Nasadą korzenia nazywamy kończynę jego wyższą, która go łączy z łodygą, w punkcie nazwanym szyją; wierzchołkiem zaś korzenia, jest kończyzna jego niższa. Szczegółowy rozbiór łodygi, którym zajmowaliśmy się wyżej, dozwoli skrócić znacznie badanie korzenia, ponieważ idzie tylko o porównanie go z tamtą.


§ 111. Będziemy go śledzić jakeśmy to z łodygą czynili, od pierwszego ukazania się w zarodku. Okazaliśmy już, że część tegoż nazwana kiełkiem, nie cała należy do korzenia; że owszem część ta w górze, a często nawet prawie w całej swjej długości aż po kończynę dolną, należy do łodygi. Przy wschodzeniu dopióro, kiełek okazuje się czém jest w istocie, i tu już w samym początku, trzy wielkie gromady roślin różnią się od siebie. Nie wspominając już o zarodkach bezliściennych, w których nie ma odrębnych części, a przeto i kiełka, i gdzie korzenie są tylko przedłużeniem komórek stykających się z ziemią,

kiełki zarodków dwu i jednoliściennych rozwijają się w odmienny wcale sposób. W pierwszych kończyła korzonkowa osi przedłuża się, w drugich (fig. 120) powstaje w niej otworek, przez który wychodzi kiełek (*r*), pokryty dotąd warstewką powierzchniową istoty zarodka, która warstewka stanowi później jakby pochwę (*c*) nasady tego pierwszego korzenia. Dlatego rośliny dwuliścienne nazywane bywają niekiedy *nago-kiełkowemi* (*exorhizæ*), jednoliścienne zaś *okryto-kiełkowemi* (*endorhizæ*), ponieważ w pierwszych korzeń (Πίζα) jest nagim, to jest leży na zewnątrz (ἔξω, zewnątrz), w drugich zaś jest okrytym, to jest leży wewnątrz (ἔνδω, wewnątrz). Ztąd także nazwisko *pochewki* (*coleorhiza*) (κολεός, pochwa), nadane błonie otaczającej kiełek jednoliściennych.



120.

§ 112. Kiełek czyli niższa część osi młodej roślinki, przedstawia w dalszém rozwijaniu się dwie ważne odmiany. Albo się sam przedłuża (fig. 121), grubieje, wydaje gałęzie mniej więcej liczne, i zostaje w tym samym stosunku do całego układu podziemnego korzeni późniejszych, co łodyga do układu powietrznego łodyg powtórnych, czyli gałęzi; a wtedy stanowi *macicę* (*rhizoma*), którą dosyć często spostrzegamy w dwuliściennych. Albo jak w innych razach, obok pierwotnego korzenia tworzą się inne, prawie jemu równe a nawet i większe. Wychodzą one tuż przy nasadzie i zdają się być zupełnie wykształconemi już w zarodkach wielu okryto-kiełko-



121.

120. Ziarno wschodzące żyta. — *g* Ziarno. — *t* Łodyżka. — *r* Korzeń główny. — *r' r' r' r'* Korzenie boczne pokryte jak i główny małemi włoskami. — *c c c* Pochewka obejmująca podstawę każdego korzenia, skoro ten przebieje warstewkę powierzchniową tkanki zarodka.

121. Korzeń pionowy ślazu gęsjego (*Malva rotundifolia*).

wych. D  
scach  
boczne  
nające  
sokość  
pek alb  
rozgałę  
tkac je  
nazywa  
lub włó  
ciwnie  
bardzo  
ciono  
Roz  
nami, r  
średnie  
korzen  
korzen  
izawsz  
że zach  
mać st  
inne b  
§ 1  
na po  
lub p  
łatwo  
kończ  
ziemię  
scach  
dłużaj  
byszow  
mym s  
które  
lub w  
łęzi; a  
dzą k  
kiedy  
Nie  
datkow

wych, ponieważ takowe zostają przedziurawione na wielu miejscach, a przez otworki wychodzą korzonki boczne (fig. 120 *r' r' r' r'*). Korzonki wyrzynające się tym sposobem, prawie w jednej wysokości rozwijają się jednocześnie, tworząc pęk albo wiązkę. Chociaż niekiedy każdy z nich rozgałęzia się u dołu, nie rzadko jednak napotkać je można niepodzielone. Wielu pisarzy nazywa te korzenie *złożonemi*, *wiązkowemi* lub *włóknistemi* (fig. 122); pierwsze zaś przeciwnie *pojedynczemi*; a jeśli oś rozwija się bardzo znacznie w kierunku pionowym, *wrzecionowatemi* (fig. 121).

Rozumię się, że między temi dwiema odmianami, można napotkać wszystkie stopnie pośrednie podług różnicy stosunków, w jakich korzenie boczne wykształcają się względem korzenia osiowego. Ten często pojedynczy i zawsze najważniejszy przy wschodzeniu, może zachować swoją przewagę albo ją utracić, a nawet zatrzymać się w rozwijaniu i być całkowicie zamorzonym, a wtedy inne biorą na siebie jego czynność.

§ 113. Wreszcie łodyga, w pewnych okolicznościach może na powierzchni swój wydawać korzenie zwane *przydatkowemi* lub *przybyszowemi* (rad. accessoriae seu adventitiae), jak to łatwo widzieć na gałązkach, np. wierzb lub topoli, których kończynę dolną zanurzymy w wodę, lub wsadzimy w wilgotną ziemię, a które nazywają się wtedy zrazami. Na różnych miejscach powierzchni tej kończyny, ukażą się wkrótce nitki przedłużające się i kierujące na dół; sąto właśnie korzenie przybyszowe, względem których część niższa gałęzi stoi w tym samym stosunku, co macica korzenia względem jego odnóg. Niektóre rośliny nie potrzebują nawet być w zetknięciu z ziemią lub wodą, aby wydać korzenie na powierzchni łodyg lub gałęzi; a korzenie ich kierujące się od punktu z którego wychodzą ku ziemi i zawieszane w powietrzu w całej tej drodze, niekiedy bardzo długiej, nazywają się *powietrznemi*.

Nie ze wszystkich zarówno miejsc wyrastają korzenie przydatkowe, ale z takich szczególniej, w których soki i żywność



122.

są nagromadzone i na których naskórek jest przerwany; zatem, z węzłów łodygi, z nabrzmień przypadkowych i ran, a często bardzo z grudek.

§ 114. Jakikolwiek będzie początek korzeni, czy powstają z przedłużenia się kielka lub jego rozgałęzień, czy tworzą się przypadkowo na łodydze lub gałęziach, zawsze są ustrojne na jeden prawie sposób. W rzeczy samej, ukazują się zrazu w postaci małego narostka, złożonego z komórek, z których środkowe przedłużają się wraz z całym ciałkiem; później niektóre z nich ustrajają się w cewki, które płaczą się w dłuższej lub krótszej przestrzeni z cewkami wiązek łodygi. Budowa ostateczna jest jednakowa we wszystkich korzeniach tej samej rośliny. Uważmy ją tu pokrótce, opisując najprzód piętna jej wspólne we wszystkich roślinach, a potem odmiany jakie przedstawia w trzech wielkich gromadach.

Korzenie nie mają ani liści, lub narzędzi im podobnych, ani pączków, któreby się tworzyły w stosunku stałym z łodygami. Rozgałęzienie się ich przeto, jeśli następuje, jest wcale różne od rozgałęzienia łodyg i poddane innym prawom, które dotąd nie są znane dla nadzwyczajnej nieprawidłowości. Odnoży coraz mniejsze kończą się wreszcie *niteczkami* czyli *włóknkami* (fibrillæ), które nazwano także w niektórych przypadkach *czubem korzeniowym* (coma radicalis). Powierzchnia kończyn w korzeniach pojedynczych, bywa często w całości pokryta temi niteczkami; często one same tylko zdają się tworzyć korzeń, a często znowu nie ma ich wcale. Istnienie niteczek jest czasowe; więdną one na częściach starych korzenia, a na jego kończynach tworzą się inne nowe.

§ 115. Na tychto właśnie kończynach odbywa się najżywiej główna czynność korzeni, to jest wsysanie płynów z otaczającej ziemi. Sądono, że takowe dzieje się szczególniej w nabrzmieniach komórkowych kończących niteczki, czyli w najdrobniejszych komórkach, któreto nabrzmienia miały się nakształt gąbki napawać płynami otaczającymi, i dlatego nazwane zostały *gąbeczkami* (spongiolæ). Badanie mikroskopem uczy, że to wyobrażenie o gąbeczkach było mylném, z powodu uważania ich początkowo przy pomocy powiększeń niedość mocnych, przez co kréski płateczków kleju roślinnego, lub innych obcych odrobinek, przylegających do kończyny korzonkowej, uważano jako należące do jej składu; że w rzeczy samej nie-

które korzonki kończą się zgrubieniem czyli guziekiem komórkowym o tkance wietszej niż w innych częściach korzonka (np. zabiściek, *Hydrocharis*), lecz że w innych razach guzieczek ten składa się z tkanki daleko zbitszej (np. w rżesie, *Lemna*); że bardzo często zgrubienie wcale nie istnieje, a niteczki na końcach okryte są naskórkiem, tak samo jak reszta ich powierzchni.

Co do kończyn grubszych odnóg korzeni, które nie więdną tak jak niteczki, lecz rosną ciągle, te muszą w ogóle posiadać tkankę młodą, ponieważ ona jest jedynym siedliskiem rozwijania się nowych części; ztąd musi wypływać niejaka różnica między tym punktem a innymi bliższymi nasady korzenia, w których tkanka doszła już ostatniego stopnia wykształcenia, do jakiego jest zdolną.

§ 116. Naskórek korzenia (fig. 87) różni się od łądogowego, stałą nieobecnością szparek. Tęm też równie jak i postacią swoją daleko mniej się różni od tkanki pod nim leżącej.

Komórki składające go, przedłużają się często we włosy pojedyncze lub brodaweczki. Można to widzieć w ogóle przy podstawie kiełka, skoro takowy zaczyna się przedłużać przy wschodzeniu (fig. 120 r r'), na ostatnich rozgałęzieniach jeszcze młodych i na niteczkach. Przedłużenia te powiększają powierzchnią części korzenia, w czasie w którym takowe jak się zdaje, biorą udział (lubo w niższym stopniu) we wsysaniu płynów otaczających. Te włoski naskórka nazwali niektórzy *niteczkami* lub *czubem*, lecz nadanie tego imienia raz narzędziom prostym, drugi raz złożonym i mającym tamte w swym składzie, może się stać przyczyną niejakiego zamieszania.


§ 117. Naczynia napotymane w korzeniach aż po same prawie ich kończyny, są takie same jak w łądogach prócz cewek rozkręcalnych, które znajdowano w nich tylko wyjątkowo i to nie z pewnością.

Włókna są również takie same.

Tkanka komórkowa jest w nich w ogóle napełniona sokami, a często obecność skrobi w ich wydrążeniach dowodzi, że korzenie oprócz czynności wsysania i prowadzenia cieczy pokarmowych jeszcze nieprzerobionych, pełnią prócz tego inną, to jest służą za skład żywności już przerobionej. W takim przypadku tkanka komórkowa nabywa znacznej objętości, i ztąd powstają zgrubienia już to w pewnych tylko miejscach, już w całym ko-

rzeniu. Raz sama macica korzenia grubieje, a to albo najbardziej przy nasadzie (np. w marchwi), albo w środku (w rzodkwi); drugi raz wszystkie lub niektóre tylko gałęzie korzenia złożonego nabrzmiwiają w pewnych odległościach, nakształt paciorków (w muszkatelu smutnym) (fig. 123), albo na jednym tylko punkcie (w parzydle wiśniowatym) (fig. 124), albo na koniec w całej długości, przez co powstaje postać korzeni kulista, jajowata lub bardziej jeszcze podłużna, (rozmaite odmiany przedstawiają nam storczyki (fig. 125)). Te nabrzmiałości zawierające skrobią, nazywają się *główkami* (tubera), a korzenie posiadające takowe *główkonośniami* (główkowymi).

Rzucmy teraz okiem na korzenie w trzech wielkich gromadach roślinnych.



§ 118. **Korzeń dwuliściennych.** — W této gromadzie roślin, a nadewszystko u drzew najczęstsze są korzenie wrzecionowate, których rozgałęzienia liczbą, grubością i rozległością,

123. Korzeń muszkatelu smutnego (*Pelargonium triste*).

124. Korzeń parzydła (*Spiraea filipendula*).

125. Korzeń storczyku, którego dwie tylko odnogi nabrzmiwiają w główki; wszystkie zaś inne są oble.


podobne są łądogowym. Niekiedy macica nie sięga zbyt głęboko, ale owszem kończy się blisko nasady odnogi; zaś boczne rozwijają się silnie, bardziej nawet niż w wielu łądogach. Lecz mimo częstego podobieństwa, stosunek korzeni i łądog względem siebie nie jest zawsze stałym, tak co do postaci, jak i co do objętości. Czasem rośliny dość małe posiadają bardzo wielkie korzenie, a wielkie drzewa mogą mieć korzenie mało rozwinięte; takie oczywiście łatwe są do wyrwania.

Porównywając budowę wewnętrzną łądygi z budową korzenia drzew dwuliściennych, widzimy, że ten różni się od niej brakiem rdzenia i cewy rdzeniowej. Osł przeto korzenia składa się z drewna, pozbawionego cewek rozkręcalnych. Za daleko jednak posunęli się ci, którzy rzeczone piętno uważali za bezwarunkowe, przyjmując, że rdzeń kończy się zawsze i zupełnie wraz z cewą swoją w szyi. Zdarza się to wprawdzie w większej części roślin zielnych, ale nie we wszystkich drzewach. Tak np. rdzeń wcale rozwinięty, znajduje się w znacznej długości korzenia orzecha włoskiego i kasztanu dzikiego.

Zresztą, korzenie grubieją tak samo, jak łądygi przez przybywanie co rok jednego słoju drewna i jednego kory; lecz wzrost ich wzdłuż nie jest zupełnie taki sam. W łądogach i gałęziach młode pędy dopóki się tylko przedłużają, rosną w całej długości; w korzeniach kończyny tylko przedłużają się, jakżeśmy to już widzieli. Można to łatwo stwierdzić, robiąc znaki w pewnych odległościach na korzeniu, który rosnąć będzie od czasu doświadczenia, poza ostatnim znakiem. Wspominając o braku pączków, jako o piętnie rozróżniającem wybornie korzenie od łądygi, rozumieliśmy pod tém tylko pączki normalne, które wyrastają w położeniu jednostajnym i dającym się naprzód oznaczyć, to jest zwykle tuż nad liśćmi. Obaczymy później, że i na łądydze mogą powstawać tu i owdzie w miejscach, w których się zwykle nie rozwijają i które tylko zostały wystawione na wpływ okoliczności sprzyjających takiemu rozwijaniu się. Pączki te nazwane przybyszowemi, okazują się także niekiedy i na korzeniach, szczególnie jeśli takie umieszczone zostaną w okolicznościach stosownych dla łądygi. Ta możność wydawania wzajemnego pączków przybyszowych przez korzenie, a korzeni przybyszowych przez łądygi, jest ważnym stosunkiem, który między jednymi i drugimi zachodzi.

Kończąc to porównanie, dodajmy, że wyjątkowe budowy, jakieśmy widzieli w łodygach, powtarzają się także i w korzeniach. Można się o tym przekonać uważając korzeń rośliny miesięcznikowatej, znaniej w aptekach pod nazwiskiem *Pareira brava*, lub korzeń jednego z powojów, znany pod imieniem *radix Turpethi*.

§ 119. **Korzeń jednoliściennych.** — Najczęściej bywa złożony (fig. 120, 122, 125), a odnogi jego lubo niekiedy podzielone, częściej jednak są pojedynczemi. Wszystkie te cząstkowe korzenie, tworzące razem korzeń złożony, nie są trwałe jeśli łodyga jest taką, lecz obumierają w porządku, w jakim się tworzyły, tak, iż przez to tworzą okółki coraz zewnętrzniejsze, gdyż korzenie pierwszego roku wyrastały wokoło kiełka będącego przedłużeniem samej osi. Korzenie powietrzne nadzwyczaj rzadkie w dwuliściennych ukazują się tu daleko częściej, a to niżej lub wyżej na łodydze. W wielu palmach wychodzą bardzo obficie z podstawy pnia, który zupełnie pokrywają, i przez to znacznie grubszymi czynią. Budowa ich wewnętrzna jest ta sama co w łodygach. W grubych korzeniach znajdują się wiązki włókno-naczynne mniej więcej liczne



126.

rozrzucone w miększu, rzadsze w środku, liczniejsze i bardziej ściśnięte ku obwodowi. Prócz tego, pokład korowy komórkowy, pokrywa często pokłady włókniste; w korzeniach mniejszych wiązki zbierają się w kilka, albo nawet w jedną tylko, która tworzy oś, otoczoną pasmem komórkowym. Jednakże co do ułożenia żywiolów tych wiązek, zachodzi różnica ich od wiązek łodygowych. Cewki bowiem uszykowane w rzędy pojedyncze, lub często ułożone w V (fig. 126), skierowane jak promienie idące od osi korzenia, maleją od wewnątrz ku ze-

126. Przecięcie poprzeczne wiązek korzenia palmy (*Diplothemium maritimum*), dla okazania położenia odnośnego cewek względem siebie i względem innych żywiolów. — *vp* Cewki wielkie kropkowane, położone wewnątrz. — *vs* Cewki drabinkowate tém zewnętrzniejsze i mniejsze, im bardziej się oddalają od środka. — *f* Tkanka włóknista, albo złożona z komórek podłużnych towarzyszących cewkom. — *z* Kupki naczyń właściwych szerokich ku środkowi, mniejszych ku zewnątrz.

wnątrz, to jest, że tém są cieńsze (*vs*) i tém wczesniej utworzone, im leżą bardziej na zewnątrz, tém zaś grubsze (*vp*), chociaż później utworzone, im są wewnątrzniejsze: jest to ułożenie i rozwijanie się prawie wcale przeciwne jak w wiązkach łądogowych.

§ 120. **Korzeń bezliściennych.** — Tu nie ma kielka, któryby się wykształcał przy wschodzeniu. Przedłużenia przeto, jakieśmy kilkakrotnie wspomnieli (§ 110—111), komórek podobnych komórkom naskórka innych korzeni, zastępują miejsce tych ostatnich i są pożywienie dla młodej łądyki. Ta rozwijając się, wypuszcza korzenie przybyszowe, jedyne jakie się w tych roślinach znajdują. Wychodzą one często z węzłów albo okółkiem, jeśli oś rośliny wznosi się pionowo, albo tylko od strony ziemi jeśli oś leży poziomo. Na pniach paproci drzewnych korzenie te skupiają się u dołu w takiej ilości, że powiększają ich grubość dwa lub trzy razy (fig. 117 *ra*): dlatego pnie te są stożkowate aż do pewnej wysokości, mianowicie do miejsca, w którym walec łądygi jest nagim, pozbawionym owęj jakby czupryny gęstej, którą u spodu tworzą korzenie przybyszowe. Korzenie te są ustrojności podobnej jak łądygi roślin, do których należą; czysto komórkowe w roślinach składających się tylko z komórek, posiadają oprócz tego naczyń w bezliściennych, w których takowe i w łądydze się znajdują. W ostatnim przypadku tworzą niteczki mniej lub więcej rozproszone, pojedyncze lub gałęziste, w których oś włókno-naczynna oznaczona jest pokładem komórkowym, a ten znowu powłoką brunatną, później czerniejącą. Wiązka ma często postać słupa głęboko żłobkowanego o kątach ostro wystających; zład w przecięciu poziomym tworzy kształtną gwiazdkę. Włókna i cewki korzeni tych, są podobne łądogowym (§ 105). W wielu paprociach i widłakowatych, wiązki te przed wyjściem z łądygi w korzenie przydatkowe, przechodzą przez część miękiszu, a niekiedy nawet w starych łądogach widłaków, pomiędzy tym miękiszem a wiązką włókno-naczynną środkową, któreto części oddzieliły się od siebie, zostawiając przestrzeń próżną.

## L I Ś C I E.

§ 121. Badaliśmy dotąd oś rośliny: 1) w części jej idącej w górę, czyli łądydze; 2) w części na dół idącej, czyli korzeniu.

Widzieliśmy, że ten ostatni może wydawać odnogi; takowe dochodzą często dość znacznej objętości w stosunku do macicy, która prędyż lub później może ustać w swém rozwijaniu, albo nawet nie rozwinąć się wcale. W takim przypadku odnogi same stanowią cały układ korzeniowy. Może się nawet zdarzyć, że macicy nie ma wcale, a wszystkie korzenie wychodzą z części dolnej łodygi. Ten postępowanie niejakim małe korzeni, zdaje się być w związku z łańcuchem roślin; gdyż widzimy, że w dwuliściennych rozwinięcie osi jest największe, w jednoliściennych nadzwyczaj małe w porównaniu z korzeniami bocznymi, w bezliściennych zaś nie istnieje wcale.

§ 122. Przejdźmy teraz do utworów bocznych łodygi: do liści i pączków. Najprzód zaś uważmy liście same w sobie pod względem budowy i postaci, później zaś stosunki z ich łodygą.

#### OGÓLNA BUDOWA LIŚCI.

§ 122 bis. Liście sąto owe rozszerzenia najczęściej spłaszczone i zielone, które wychodzą z obwodu łodygi i które w tej postaci są znajome każdemu. Podstawa ich jest kończyzną zwykle zwężoną, która je łączy z łodygą; wierzchołek zaś stanowi drugą kończynę przeciwległą pierwszej.


Podstawa zwęża się najczęściej w kształt niby ogona, który jest znacznie dłuższy niż szerszy i tworzy niejaką gałązeczkę mniej lub bardziej cienką, która nazywa się *ogonkiem* (petiolus).

Często się zdarza, że ogonek rozszerza się znowu u dołu, tam, gdzie przytyka do łodygi i obejmuje niekiedy takową w mniejszej lub większej części jej obwodu; to rozszerzenie nazywa się *pochwą* (vagina), bywa zaś czasami w części, albo i zupełnie odłączone od ogonka, i wtedy zwykle tworzy po obu jego stronach małe przyrostki różnego (najczęściej liściowatego) kształtu. Przyrostki te zowią się *przylistkami* (stipulae).

Można więc uważać liść zupełny jako złożony z trzech części: 1) blaszkowatej, która tworzy rozszerzenie końcowe zwykle spłaszczone, czyli *blaszki* (limbus); 2) ogonkowej; 3) pochewkowej, utworzonej przez pochwę lub przylistki.

Liść rd  
zne.  
siada d  
kowyc  
szka s  
najwię  
jąca w  
ną, po  
zywam  
nieważ  
ności,  
znaczc  
śliny,  
nas tu  
żyjący  
§ 12  
roku, v  
że i ot  
łek lub  
rę wzr  
przybi  
cznie  
pełnie  
dyga,  
Sąto t  
czynia  
więc  
zachow  
Wiązki  
wielu  
przy n  
samęj  
od sieb  
naczyn  
nie jej  
nia mi  
żeniem  
127.  
gi, na ka  
pochwo

Liść rdestu (fig. 127) przedstawia wyraźnie trzy te części różne. W wielu roślinach liść posiada dwie, albo jedną tylko z takich części. Ponieważ blaszka stanowi zwyczajnie część największą, najbardziej wpadającą w oko i najpierw utworzoną, ponieważ ją właśnie nazywamy pospolicie liściem i ponieważ w niej odbywają się czynności, które narzędzie to przeznaczone jest pełnić w życiu rośliny, przeto badanie jej będzie nas tu głównie zajmować. Uważmy ją zaś najprzód w liściach żyjących w powietrzu, a potem w liściach żyjących pod wodą.



127.

nas tu głównie zajmować. Uważmy ją zaś najprzód w liściach żyjących w powietrzu, a potem w liściach żyjących pod wodą.

§ 123. Liście powietrzne. — Ich budowa. — W tym samym roku, w którym powstaje łodyga lub gałąź, ukazują się na tychże i otwierają liście. Zrazu widzimy je w postaci małych bryłek lub płateczków, zbliżonych i przyciśniętych do siebie. W miarę wzrastania łodygi oddalają się od siebie i zarazem rosną, przybierając stopniowo kształt i wymiary, jakie mają ostatecznie posiadać. Jeśli badamy wnetrze liścia rozwiniętego zupełnie, widzimy, iż się składa z tych samych żywiołów co łodyga, że te żywioły zdają się nawet przechodzić w niego z téjże. Są to te same naczynia, te same włókna, ten sam miękisz. Naczynia i włókna są już w łodydze połączone w wiązki; jeśli więc w miejscach gdzie się mają oddzielić i oddalać od niej, zachowują nieco dłużej to ułożenie, powstanie zład ogonek. Wiązki zwykle nie są pojedyncze, lecz powstają z połączenia wielu cząstkowych; a kiedy boczne oddalą się nieco od reszty przy nasadzie liścia, otrzymamy pochwy lub przylistki. Przy samej nasadzie, lub nieco wyżej, wszystkie wiązki zwykły się od siebie oddalać, a zład powstaje blaszka. Wiązki włóknonaczynne tworzą najtwardszą część blaszki, a zarazem wiązanie jej niejako czyli szkielet. Przewłokny między innymi wypełniają miękisz; całość zaś okrywa naskórek, który jest przedłużeniem naskórka łodygi.

127. Liść rdestu pieprzowego (*Polygonum hydropiper*) z kawałkiem łodygi, na której jest osadzony. — l Blaszki. — p Ogonek. — g Pochwa czyli część pochwowata liścia, obejmująca łodygę i zakończona w górze rżesami.

§ 124. Blaszka będąc rozszerzeniem spłaszczone, musi rozumie się posiadać dwie powierzchnie (*paginae*) i dwa brzegi (*margines*), które wychodząc od nasady, łączą się przy wierzchołku. U większej części [prawie u wszystkich naszych (1),] blaszka liścia stoi prostopadle, lub co częściej nieco ukośnie względem łodygi, tak, że powierzchnia jej górna obrócona jest ku niebu a dolna ku ziemi; brzeg zaś jeden leży na prawo, drugi na lewo.

§ 125. Blaszka lubo spłaszczona, posiada jednak między oboma błonami naskórka ją okrywającego, pewną grubość przynależącą miększowi i szkieletowi włókno-naczynnemu. Naczynia i komórki liści bywają rozmaite? Jeśli zaś tak jest, w jaki



128.

sposób ułożone są jedne względem drugich? Powiedzieliśmy, że wiązki ich są przedłużeniem łodygowych; z drugiej strony wiemy, że wiązki czyto w łodygach jednoliściennych, czy dwuliściennych, składają się w pierwszym roku z cewek wężownicowych, położonych na wewnątrz (fig. 128 *t*); dalej leżą cewki innego rodzaju, pierścieniowe, kręskowane lub kropkowane (*v*) wraz z włóknami drzewnymi (*f*); wcale zaś na zewnątrz naczynia, właściwe i włókna korowe. Stosunek tych narządzi zostaje ten sam

128. Przejście wiązki włókno-naczynnej z gałęzi *b* w ogonek *p*. Widać jak jej żywoły skierowane pionowo w pierwszej, przyjmują kierunek poziomy w drugim, zachowując mimo tej zmiany też same stosunki względem siebie. Widać także jak się odmieniają wraz z tkanką komórkową przy przejściu z jednego narzędzia w drugie, a z kąd powstaje staw *a* między obu narzędziami. — *t* Cewki wężownicowe. — *v* Cewki innego rzędu; w tym razie pierścieniowe. — *f* Włókna drzewne. — *l* Włókna korowe lub łykowe.

(1) Powierzchność drzew i lasów Nowej-Holandji przejął pierwszych podróżników, którzy je widzieli, szczególnym uczuciem, jakie sprawiało niezwykłe rozdzielenie światła i cieni. Dziwiono się długo nad tém osobliwszym wrażeniem, nie mogąc odgadnąć jego przyczyny. R. Brown, zwiedzając te kraje, łatwo sobie zdał sprawę z tego dziwaczne oświetlenia, przekonawszy się, że drzewa te po większej części posiadają liście inaczej osadzone jak w naszych, tak, że światło wpada między blaszki ułożone pionowo, nie zaś na leżące poziomo. W niektórych gatunkach są to właściwe liście, w innych tylko liściaki (patrz § 141).


i w liściu (fig. 128 *p*). Wiązka pionowa łądygi, biorąc w liście kierunku ukośny lub poziomy, obraca w górę ścianę, która leżała na wewnątrz, na dół zaś ścianę dawniej zewnętrzna. Wiązka więc włóknonaczynna liścia, posiada w części swęj zwróconej ku powierzchni górnej najprzód cewki węzownicowej (*l*), potem cewki innego rzędu (*v*) wraz z włóknami (*f*); w części zaś obróconej ku powierzchni dolnej naczynia właściwe i włókna podobne łykowym (*l*), tak że przeto część górną możnaby poniekąd porównać z drewnem, dolną zaś z korą.

§ 126. Naskórek przedstawia zwykle także znaczne różnice na obu powierzchniach. Wspomnieliśmy już wyżej (§ 44), że szparki daleko częstsze są na powierzchni dolnej niż na górnej. pierwsza posiada nadto jeszcze w wielu razach włoski lub łuski, których albo wcale nie ma na powierzchni górnej, albo też są przynajmniej daleko rzadsze; ztąd wielkie podobieństwo z postacią naskórka młodej łądygi. Przeciwnie w liściach pływających (np. w grzybieniu) naskórek górny nosi szparki, dolny zaś nie posiada takowych. We wszystkich liściach szparki dają się widzieć tylko na miejscach odpowiadających tkance komórkowej, niema ich zaś wcale na tych, które odpowiadają wiązkom włóknonaczynnym.


§ 127. Co się tyczy mięksizu, ten jako siedlisko czynności właściwych liściom, zasługuje na szczegółowe badanie.

W ogóle w liściach dość cienkich i spłaszczonych (fig. 129, 130) odróżnić można dwie okolice czyli dwa pokłady mięksizu: wyższy i niższy. W obudwu komórki w stanie, normalnym napełnione są ziarenkami ubarwionemi zielenią, lecz w jednym i drugim mają inną postać i inaczej są ułożone. W wyższym bowiem pokładzie (*p s*) znajdujemy pod nazwiskiem (*e s*) jeden, dwa lub trzy rzędy komórek podłużnych, mniejszych od komórek naskórka, tępych na obu końcach, położonych prostopadle do powierzchni liścia i tak ściśnionych, że między nimi małe tylko pozostają przestwory międzykomórkowe (*m*). Niekiedy jednak komórki oddalają się od siebie, a ztąd powstaje przerwa odpowiadająca najczęściej szparce (fig. 83 *s*). Pokład niższy (*p i*) składa się z komórek niekształtnych: już gałęzistych, połączonych z sobą końcami tylko odnożeń, już pojedynczych i zrastających się z sobą większą częścią powierzchni, lecz w każdym razie tworzących liczne przerwy (*l*), które się

z sobą łączą i nadają miększowi postać siatki. Miększ taki możnaby nazwać jamowatym lub gębczastym. Wiele przerw leży tuż pod naskórkiem dolnym, posiadającym jak wiadomo większą ilość szparek niż górny, i właściwie szparkom odpowiadają przerwy. Miększ przeto takich liści jest w ogóle zbityszy u góry (*ps*), wietszy u dołu (*pi*) i zawiera większą lub mniejszą ilość przerw łączących się z sobą bezpośrednio, lub za pośrednictwem przestworów międzykomórkowych, a z zewnątrz za pośrednictwem szparek.



129.



130.

Nieco odmiennie jest jego ułożenie w liściach grubych roślin nazywanych mięsistymi, których komórki dość wielkie, mało przestworów między sobą zostawiają i napełnione są niewielkiemi ziarenkami zielnemi, szczególnież też ku środkowi, gdzie mają barwę białawą, i przez to tworzą niejako rodzaj rdzenia.

Nie ma potrzeby rozwodzić się nad różnemi odmianami jakie przedstawiać może miększ liści według rośliny, w której go badamy, według miejsca jakie liść zajmuje na téjże, a nawet według rozmaitego wieku jednego liścia. Dwóch jednakże okoliczności ogólnych, nie należy spuszczać z uwagi: obecności pewnej liczby przestworów i przerw z których zewnętrzniejsze otwierają się przy szparkach, tudzież stosunku stałego jaki zachodzi między ilością tych próżni a natężeniem zieloności.

129. Przekięcie pionowe liści lilii znacznie powiększone. — *es* Naskórek powierzchni górnej. — *ei* Naskórek powierzchni dolnej. — *ps* Miększ okolicy górnej. — *pi* Miększ okolicy dolnej. — *m* Przestwory międzykomórkowe. — *ll* Przerwy.

130. Przekięcie podobne liścia balsaminy. — Głoski mają toż samo znaczenie co na figurze poprzedzającej. — *ss* Szparki.

Prze-  
bardzo  
(fig. 15)  
bardzo  
ko, jeś  
szpark  
można  
kach n  
rym od  
wkę k  
zrośnię  
szklen  
o oka  
dyncze  
§ 1.  
przed  
skórka  
znajdu  
chu że  
przy p  
mórki  
wali s  
cznie  
lub tr  
po wie  
jąc w  
kniec  
jącym  
tne i  
łączor  
one a  
przerw  
dnakż  
wda,  
(fig. 1


131.  
dolna m  
powiad  
132.  
rdzestni

Przekonać się można o ułożeniu takowem na płateczkach bardzo cienkich liścia przeciętego prostopadle do powierzchni (fig. 130). Przecięcia takie są bardzo nauczające, nadewszystko, jeśli zajęły kilka szparek. Że szparki odpowiadają przerwom, można także widzieć na kawałkach naskórka (fig. 131), z którym oddzielono zarazem warstwę komórek zielonych z nim zrosniętych (*p p*), a które pod szkłem tworzą siatkę zieloną, o okach bezbarwnych, w których środku zwykle leżą pojedyncze szparki.



131.

§ 127 bis. **Liście podwodne.** — Liście żyjące pod wodą, przedstawiają budowę wcale odmienną. Nie posiadają one naskórka, a przeto i szparek. Szkielet włóknonaczynny nie znajduje się w nich także, a jeśli kiedy się nam zdaje z wierzchu że go spostrzegamy, to badanie uważniejsze i wykonane przy pomocy dostatecznych powiększeń, daje nam widzieć komórki podłużne tam, gdzieśmy zrazu przez analogją spodziewali się znaleźć naczynia. Liście te więc składają się wyłącznie z miększu, ale komórki jego zwykle ułożone we dwa lub trzy rzędy, a przeto po większej części zostając w bezpośredniem zetknięciu z płynem otaczającym, są zwykle kształtne i ściśle z sobą połączone; nie zostawiają one ani przewodów ani przerw, zawierają jednakże we wnętrzu swém ziarenka zielone (fig. 132 *p*). Prawda, że w grubszych liściach znajdujemy niekiedy przerwy (fig. 132 *l*), lecz te, są zwykle kształtne co do postaci i uło-



132.

131. Kawałek naskórka dolnego *e* liścia balsaminy, pod którym warstwa dolna miększu *p* tworzy siatkę. Oczka tej siatki są tyluż przerwami *l* odpowiadającemi często szparkom *s*.

132. Przecięcie prostopadle do powierzchni kawałka liścia podwodnego rdestnicy przerosłej. — *p* Miększ. — *l* Przerwy.

zenia, nie łączą się ani z sobą, ani z zewnątrz, owszem zamknięte są dokładnie ścianami komórek otaczających. Są one jak się zdaje przeznaczone do zmniejszenia ciężkości gątkowej liścia i do utrzymywania go przez to w wodzie; zastępują przeto pod pewnym względem pęcherz powietrzny ryb.

Widzimy, iż liście te wyjęte z wody zsuchają się, marszczą, i tracą bardzo prędko kształt, co się objaśnia nieobecnością naskórka opóźniającego wyparowanie płynów zawartych w miększu, — i skieletu twardego, który liściom za podporę służy.

## OGÓLNA POSTAĆ LIŚCI.

§ 128. Widzieliśmy dopiéro, że liście utworzone są z miększu i wiązek składających się, albo z naczyń i włókien, albo też, jak w roślinach wodnych czyli niższych, z komórek podłużnych i cienkich. Wiązki te, dające się zwykle spozstrzegać z zewnątrz, szczególnież na powierzchni dolnej blaszek, gdzie często znacznie wystają, nazwane zostały *nerwami* (*nervi*), a ich uszykowanie: *ułożeniem nerwów* (*nervatio*). Od tego ułożenia i od rozległości, w jakiej miększ wypełnia odstępy międzynerwowe, zależy ogólna postać liścia. Wiązki przeznaczone do utworzenia nerwów, mogą w krótszej lub dłuższej przestrzeni pozostać nierozdzielone, i dalej dopiéro odłączać się od siebie, w skutek niejako rozpostarcia; wiemy już że w takim razie ogonek jest odosobnionym od blaszki.

§ 129. Odkładamy na późniój obszerniejsze badanie ogonka, ograniczając się nateraz przywiedzeniem tego tylko przypadku, w którym wiązka nie bywa wcale podzieloną, a w którym przeto cały liść posiada postać ogonka. Jeśli się kończy śpięczasto, przypomina kształt igły i nazywa się *iglastym* (*folium acerosum*); znajdujemy go na wielu naszych roślinach zawsze zielonych, jak sosna, jodła, modrzew (fig. 133).

§ 130. Lecz daleko częściej wiązka podzieloną zostaje na wiele innych powtórnych wiązek, które rozbiegają się, albo pozostając na jednej płaszczyźnie, — w którymto razie liść

133. Liść jodły z góry widziany.

posiada  
biorąc  
trzy w

§ 1  
wszyst  
leży og  
tęż co  
z ogon  
się dzi  
re roz  
ki, —  
liść za

nerwi

do wi

węj s

niej ja

pięrcz

fig. 13

dłużer

czyli s

które

są ne

Co

gając

samog

której

chy k

zowie

nerwo

W

moga

katam

strzej

równ

sposó

134.  
Nerw g

135.

posiada głównie tylko wymiary długości i szerokości, — albo biorąc kierunki różnych płaszczyzn, a wtedy liść gruby posiada trzy wyraźne wymiary.

§ 131. W pierwszym razie, nerwy rozłączając się, mogą wszystkie wziąć kierunek płaszczyzny różnej od tej, na której leży ogonek i tworzącej kąt z tym ostatnim; albo też co się częściej zdarza pozostać na jednej z ogonkami płaszczyźnie. Wtedy wiązka albo się dzieli na wiele innych niemal równych, które rozchodzą się prawie jak palce otwartej ręki, — a ztąd ułożenie to nazywa się *dłoniastem*, liść zaś *dłoniasto-nerwowym* (*folium palmi-nervi*), albo przebiega w kierunku ogonka aż do wierzchołka blaszki, wydając z prawej i lewej strony wiązki powtórne, leżące względem niej jak chorągiewka pióra względem trzonka; ztąd nazwano ułożenie to *piérzastem*, a liść *piérzasto-nerwowym* (*folium penninervi*; fig. 134). Nerw wielki (*nm*), który jest przedłużeniem ogonka (*p*), nazywa się *głównym*, czyli *żeberkiem* liścia. Nerwy boczne (*ns, ns*) które z niego wychodzą pod kątem mniej lub więcej ostrym, są nerwami powtórniemi.



134.

Co się tyczy przypadku, w którym wiązki powtórne rozbiegają się wszystkie na jednej płaszczyźnie, opuszczają od samego wierzchołka ogonka płaszczyznę, na której tenże leży i uszykowane są jak sprzchy koła względem jego osi, ułożenie nerwów zowie się *tarczowatęm*, a liść *tarczowato-nerwowym* (fig. 135).

W piérzasto-nerwowych, nerwy powtórne mogą wychodzić z głównego, pod wszelkiemi kątami, zaczawszy od prostego aż do najostrejszego. Bywają zaś albo wszystkie sobie równe, i to krótkie lub długie, albo też nierówne w rozmaity sposób, czyto malejąc od dołu do góry liścia, czy przeciwnie



135.

134. Liść pokrzyki lekarskiego (*Atropa belladonna*). — *p* Ogonek. — *nm* Nerw główny. — *ns ns* Nerwy powtórne.

135. Liść wąkroty pospolitej (*Hydrocotyle vulgaris*).

powiększając się ciągle, czy też powiększając się od pewnego punktu a potem malejąc; tym sposobem albo będą najdłuższe w środku liścia, albo u dołu, albo też u góry.

§ 132. Kiedy nerwy rozbiegając się dla utworzenia blaszki, biorą kierunki różnych płaszczyzn, powstaje ztąd albo powierzchnia różnie względem siebie samej skrzywiona, albo też bryła pełna i gruba. Do pierwszego kształtu odnieść można kształt puszczalkowaty, czyli cewkowaty (np. w wielu gatunkach czosnku), równie jak kilka innych kształtów szczególniejszych i dosyć rzadkich, przypominających np. trąbkę, kapturek, bułkawkę, urnę i t. d.; liście tak w swjej postaci zmienione, nazywane niekiedy bywają *kubkami* (*ascidia*), w drugim przypadku który zdarza się, gdy miękisz wypełnia przestwory między nerwami rozrzuconemi po różnych płaszczyznach, liść przedstawia postać bryły objętej powierzchnią krzywą, lub kilku powierzchniami płaskimi, tworzącemi przy zetknięciu się z sobą węzły, krawędzie, albo też połączenie jednych i drugich. Liść taki bywa niekiedy tyle kształtnym, że postać jego można odgadnąć, jeśli ją oznaczymy nazwiskami brył geometrycznych (jak np. ostrosłup, graniastosłup, walec, ostrokątek); innym razem dla braku kształtności nie możemy jej ściśle określić i oznaczamy ją stosowniej nazwiskami przedmiotów powszechnie znanych (jak miecza, pałasza, języka, garbu etc. etc.; z kądem otrzymujemy przymiotniki: *mieczowaty*, *pałaszowaty*, *językowaty*, *garbaty*, etc.).

§ 133. Powróćmy do blaszki spłaszczonej i śledźmy ułożenie miękiszu względem nerwów. Może on zapełniać w całości ich odstępy, tak, że linja przechodząca przez końce nerwów najdłuższych i stanowiąca brzeg liścia, jest jednociągłą, wtedy liść nazywa się *całobrzegim* (*folium integrum*) (fig. 134). Często miękisz kończy się bliżej niż nerwy; wtedy liść jest powycinany, a jego brzeg ograniczony linją łamaną. Wycięcia odebrały różne nazwy, podług tego jak miękisz kończy się bliżej lub dalej od nerwu głównego i jak przez to brzeg przedstawia naprzemiany kąty wypukłe lub wklęsłe, płytsze lub głębsze. Jeśli wypukłości są bardzo krótkie, nazywają się *zabkami* (*dentes*), jeśli są bardzo ostre (fig. 142), ząbkami pilki; *karbami* (*crenae*), jeśli są tępe. Wycięcia głębsze, a przeto zwykle i szersze, zwą się *łatami* (*lobi*). Głębokość więc może być rozmaita, a podług tego różne są ta-

kże n  
blaszk  
nerwu

136.  
137.  
138.  
139.

kże nazwy łat. Jeśli wcięcia nie sięgają do środka połowy blaszki, otrzymany *rozcinki (fissurae)*; jeśli dochodzą bliżej nerwu głównego, otrzymany *podziałki (partitiones)*; jeśli



136.



137.



138.



139.

136. Liść dębu.

137. Liść kozłku oddzielnopłciowego (*Valeriana dioica*).

138. Liść rącznika zwyczajnego (*Ricinus communis*).

139. Liść poziomki pospolitej.

dochodzą do samego nerwu, *wycinki (segmenta)*. Liście określane bywają przymiotnikami utworzonymi z tych nazwisk. Mówi się że są *ząbkowane, pilkowane, karbowane, rozcięte (szczepne)*, dzielne, wycięte (*f. dentata, crenato dentata*) (fig. 138), *crenata, fida* (fig. 136), *partita* (fig. 138), *secta* (fig. 139), według głębokości postaci i wielkości wycięć. Lecz zwykle te wyrazy nie kładą się same, ale tworzą część innych złożonych i oznaczających wiele odmian zarazem, tak np. mówiąc że liść jest trójszczepny, pięcioszczepny, wieloszczepny, lub dłoniasto-szczepny, piérzasto-szczepny (fig. 136) i t. d.; oznaczamy że brzeg jego jest rozcięty do głębokości niedochodzącej do środka jego połowy, na trzy, pięć, lub wiele łąt, ułożonych jak nerwy dłoniasto, piérzasto, etc. etc.—Jeśli za końcówkę *szczepny*, podstawimy: *dzielny (f. multipartita, palmatipartita* [fig. 138], *pinnatipartita* [fig. 137]), rozumujemy że wcięcia sięgają za środek połowy blaszki; jeśli dodamy końcówkę *cięty (palmatisecta* [fig. 139], *pinnatisecta* etc.), oznaczamy że wycięcia sięgają nerwu głównego i że łąty nim tylko połączone są z łątami sąsiednimi, przedstawiając nadto odmiany, które określa początek wyrazu.

§ 134. We wszystkich liściach o których mówiliśmy dotąd, miękisz leżący pomiędzy nerwami powtórными zwykły znikać dopiero w pewnej odległości od nerwu głównego, tak, że blaszka przerwana od brzegów, pozostaje jednociągłą ku środkowi. Jednakże przy najgłębszych wcięciach widzieliśmy że tylko sam nerw główny łączy pojedyncze wycinki z sobą, takowe jednak w dość jeszcze znacznej rozległości z nim są zrosnięte, a nawet często w tém właśnie miejscu posiadają największą szerokość.

Jednakże może się zdarzyć inny jeszcze przypadek, mianowicie, że wycinki przyczepione będą do nerwu głównego, samemi tylko wiązkami powtórными, które się od tegoż oddzielają właśnie dla utworzenia wycinków; w takim razie wiązki w pewnej dopiero od nerwu odległości, zaczną się rozpościierać i przekładać miękiszem. Oczywiście, że każda z owych wiązek stoi w takim samym stosunku do nerwu głównego, w jakim ogonek stoi do gałęzi, z której wyrasta. Nerw zatem wydawać się będzie jak gałązka, wycinki zaś jak małe listki niezależne jedne od drugich. Pomimo to, można jeszcze poznać że to jest jeden tylko liść, ponieważ wszystkie wycinki z których się

składa  
z gałęzi  
tum),  
tiolus  
wiązk  
stawy  
szos  
nie liś  
jednoc  
Poz  
domys  
tym,  
leżą  
wyraz  
(fig.  
(fig. 1  
stym

140.  
141.  
licie: ak

składa, leżą na jednej płaszczyźnie i ponieważ od razu cały z gałęzi odpada. Taki liść nazywa się *złożonym* (*f. compositum*), nerw jego główny *ogonkiem głównym* (*rachis* v. *petiolus communis*), a wycinki *listkami* (*foliola*); a jeśli wiązka środkowa każdego z nich, nie dzieli się zaraz u podstawy, wtedy otrzymamy *ogoneczek* (*petiolulus*). Wyraz: *złożony*, odpowiada wyrazowi: *prosty*, użytemu na oznaczenie liści, o których mówiliśmy poprzednio i których części są jednociągłe.

Poznawszy sposób powstawania liści złożonych, łatwo się domyślić, że takowe mogą przedstawiać odmiany podobne tym, o których mówiliśmy przy liściach prostych, a które zależą od ułożenia ich nerwów dłoniasto lub piérzasto. Wtedy wyrazy te przydają się listkom: np. listki kasztanu dzikiego (fig. 140) są dłoniaste; listki grochowniku amerykańskiego (fig. 141) są piérzaste. Kiedy mówimy o liściu że jest *piérzastym* (*pinnatum*), oznaczamy przez to ostatnią tę postać. Do



140.



-141.

140. Liść kasztanu gorzkiego (*Aesculus hippocastanum*).

141. Liść grochowniku amerykańskiego (*Robinia pseudo-acacia*), pospolicie: akacji.

wyrazów złożonych, któremi określamy różne odmiany tych liści, bierzemy zakończenia: *listkowy (foliatus)*, mówimy: liść *dwu*, *trój*, *cztero*, *wielolistkowy* (fig. 141), podług ilości listków go składających. Często listki wyrastają po dwa, jeden z jednej, drugi z drugiej strony ogonka głównego (fig. 148), co stanowi *parę (jugum)*, z kąd przymiotniki: *jedno* —, *dwu*, *trój*, *wieloparzysty*, podług ilości par. Mówimy że liść jest *parzysto-piérzastym (f. abruptly pinnatum)*, lub *nieparzysto-piérzastym (imparipinnatum)*, podług tego jak się składa z jednej tylko lub wielu par bocznych (fig. 146), albo (fig. 141), jak nerw główny tworzy u wierzchołka listek, który się zowie *końcowym*.

§ 135. Dotąd mówiliśmy tylko o nerwie głównym i nerwach powtórnych. W pewnej liczbie roślin podział nie rozciąga się dalej, lecz w większej ich ilości nerwy powtórne dzielą się znowu z kolei, a ztąd otrzymujemy szereg podziałów coraz liczniejszych. Wszystko to cośmy powiedzieli o nerwach powtórnych, daje się zastosować do nerwów 3<sup>go</sup>, 4<sup>go</sup> i 5<sup>go</sup> rzędu



142.

142. Liść brzoštu (*Ulmus effusa*).



143.

143. Liść maku (*Papaver argemone*).

i t. d.,  
powsta  
prosty  
a pod  
tych s  
dzony  
albo:  
np. liś  
kawat  
142);  
pny, k  
łaty,  
ści st  
łowo

144.  
145.  
rzone,  
na któ

i t. d., ponieważ każdy z nich ma się tak do nerwu z którego powstaje, jak nerw powtórny do głównego. W liściach zatem prostych, łaty mogą być także całe lub różnie podzielone, a podziały te mogą znowu ulegać drobniejszym. Do określenia tych stosunków używamy tych samych przymiotników poprzedzonych wyrazami: *podwójnie*, *potrójnie*, lub *dwu*, *trój*, albo: *dwoisto*, *troisto*, które oznaczają ile razy liść się dzieli, np. liść *dwoisto-ząbkowany* (*f. biserratum*), jest liściem piłkowanym, którego ząbki znowu są obrzeżone ząbkami (fig. 142); liść *dwu-pierzasto-szczepny*, jest liść pierzasto-szczepny, którego łaty są znowu pierzasto porożcinane, na mniejsze łaty, czyli *łatki* (fig. 143). Po za powtórny podziałem części stają się zwykle zbyt małemi, abyśmy je jeszcze szczegółowo badać mieli, dlatego wszystkie liście o łatach bardzo



144.



145.

144. Część liścia bucieńszczyki szorstko-włosistego (*Laserpitium hirsutum*).

145. Liść akacji (*Acacia heterophylla*). — *p* Liściak czyli ogonek rozszerzony, który często stanowi cały liść. — *l* Część blaszkowa dwoisto-pierzasta na której wielu liściom zbywa zupełnie.

licznych i wiele razy podzielonych (fig. 144), oznaczane bywają imieniem *poszarpanych* (*f. laciniata*).

W liściach złożonych, listki mogą być także ząbkowane, lub łątowe; jeśli się zaś dzielą, to najczęściej znowu na listeczki (*f. decompositum*), które z kolei mogą się jeszcze dzielić (*supradecompositum*). Mówimy wtedy że liść jest *dwoisto-troisto-piérzastym*, lub *dłoniastym* (*f. bi-tri-pinnatum, bi-tri-palmatum*). Nerwy powtórne stały się *ogonkami szczególnymi* (*p. partiales*).

§ 136. Nie będziemy się dłużej zastanawiali nad kształtami liści, których rozmaitość jest tak wielka. Wyłożenie wyrazów używanych w botanice na oddanie wszystkich znanych odcieni, których nie mogliśmy tu przywieść i które zresztą stosują się nietylko do liści, ale do każdego narzędzia złożonego rośliny, stanowi przedmiot osobny. Znajomość tych wyrazów potrzebną jest do zrozumienia książek opisujących różne gatunki roślin, lecz zbyteczną tam, gdzie idzie o poznanie rośliny w ogóle. Dosyć nam tu przeto było dać poznać, że ułożenie narzędzi stanowiących liść, to jest nerwów tworzących jego szkielet i mięksizu będącego częścią jego miękką i istotną, spowodowuje postaci owe tak różne; że w gruncie nie ma różnic prócz co do stopnia rozwinięcia stosunkowego jednych względem drugich, i że liść najbardziej złożony nie posiada więcej części, lecz tylko jedną część powtórzoną więcej razy.

§ 137. **Ogonek.** — Wspomnieliśmy już o kształcie najpospolitszym ogonka, o kształcie wynikającym z połączenia szczegółowych wiązek włóknonaczynnych, które odłączając się od łodygi, aby utworzyć rozszerzenie liścia, pozostają w mniejszej lub większej rozległości, zbliżone w jednej ogólnej wiązce i przedstawiają jakby małą gałązkę, leżącą między łodygą i blaszką liścia. Mięksiz towarzyszy tej wiązce i stanowi jej okrywę, powleczoneą z kolei naskórkiem, nie posiadającym szparek, tak jak na powierzchni nerwów, które są przedłużeniem ogonka (§ 126).

§ 138. Powiedzieliśmy wyżej (§ 12), że cewki, w miejscu w którym powstaje nowe narzędzie z dawniejszego, pod kątem zmieniającym ich pierwotny kierunek, przedstawiają niejaki zmiany co do postaci swych żywiołów t. j. komórek lub włókien. Te bowiem skracają się i łączą na końcach powierzchniami mniej szerokiemi. Z tego mniej ścisłego połączenia wynika

łatwoś  
miękiś  
dobne  
stopni  
ném,  
tęz za  
ticulati  
rych d  
złach  
Liść  
wtedy  
razac  
speln  
więdn  
przypa  
w inny  
zostają  
Tak up  
mi: prz  
szłanu  
Liść  
posiad  
dygą,  
dając,  
którzy  
mi liść  
zupeln  
§ 13  
sto na  
które w  
stawę  
stek bo  
i w gór  
ogonka  
(fig. 16  
raźnie  
które t  
tych ro  
i całego  
źnienia

łatwość rozdzielania się tychże, do czego przyczynia się jeszcze miękisz, którego komórki przedstawiają w tych miejscach podobne odmiany. Dlatego też często się zdarza, że na pewnym stopniu rozwinięcia, spojenie tych części może być tak osłabionem, iż się w końcu wcale rozłączą, czyto dobrowolnie, czy też za małą zewnętrzną pobudką. Nazywa się to *stawem* (*articulatio*), a daje się często spostrzegać w miejscach, w których dwa narzędzia złożone stykają się z sobą, zatem w węzłach łodygi, u nasady gałęzi, liści, i t. d.

Liście więc łączą się często z łodygą stawem, a to zwykle wtedy, kiedy powierzchnie ich zetknięcia są wązkie. W takich razach prędzej lub później oddzielają się od łodygi, skoro tylko spełniły czynności, do jakich były przeznaczone i zaczynają więdnąć. Czas ten jest różny dla rozmaitych roślin. W wielu przypada w tym samym roku, w którym utworzyły się liście, w innych daleko później; kiedy zaś nie ma stawów, liście pozostają przy roślinie, chociaż obumierające lub wcale obumarłe. Tak np. widzimy w zimie, że dęby okryte są zeschniętymi liśćmi: przeciwnie liście orzechu włoskiego (*Juglans regia*) i kasztanu dzikiego opadły w jesieni.

Liście pojedyncze są bardzo często trwałe; złożone zaś posiadają zwykle stawy, a to nie tylko między ogonkiem a łodygą, lecz nawet między ogoneczkami a listkami, które opadają, oddzielają się od nich. Tegoto nawet piętna używają niektórzy, dla określenia liści złożonych, nazywając pojedynczemi liście jednociągłe, chociażby te w młodości swęj posiadały zupełnie postać złożonych.

§ 139. Skoro ogonek odpadnie w stawie, widzieć można często na łodydze w miejscu z którego wychodził, nabrzmienie, które wprzód zdawało się być jego częścią i które mu za podstawę służyło. Nazwano sęczeniem (*pulvinus*) ten mały wyrostek boczny łodygi; powierzchnia jego obrócona na zewnątrz i w górę, a która wprzód łączyła się z podobną powierzchnią ogonka, stanowi niejako bliźnę pozostałą po opadnięciu liścia (fig. 162, 163, e). Na powierzchni jej widać zwykle dosyć wyraźnie wespół miękiszu, liczne punkta wskazujące wiązki, które tworzyły ogonek. Są one rozmaicie ułożone w rozmaitych roślinach, a sposób ten ułożenia równie jak postać bliźny i całego sęczenia, mogą dostarczyć wygodnych pięt do rozróżnienia w zimie drzew ogołoconych z liści.

§ 140. Ogonek bywa zwykle krótszy od blaszki; niekiedy równiej z nią długości, niekiedy zaś przewyższa ją w tym względzie. Różni on się także i co do grubości; jeśli jest znacznie grubym w stosunku wymiarów blaszki, a przeto i w stosunku jej ciężaru, utrzymuje ją nie zginając się wcale, nade wszystko jeśli jest zarazem krótki, jak to można łatwo przewidzieć podług praw mechaniki. Kiedy jest cienki lub długi, albo też składa się z tkanki miękkiej, w której miększy przeważa w porównaniu z włóknami i cewkami, wtedy zawiesza się lub zgina w łuk dla ciężaru blaszki przyczepionej na końcu tego giętkiego drażka.

Często bywa walcowaty, częściej jeszcze zaokrąglony na powierzchni dolnej, spłaszczony zaś lub zwykłej jeszcze rynienkowato-wyżłobiony od góry. Niekiedy cały jest spłaszczony według płaszczyzny blaszki. W rzadkich przypadkach koniec jego spłaszcza się w kierunku przeciwnym, tworząc powierzchnie pionowe, wystawione z łatwością na działanie wiatrów: ztądto liście topoli są tak ruchome, że je niekiedy nazywają drżącemi.

§ 141. **Liściak** (Phyllodium). — Dotąd mówiliśmy o wiązkach ogonka, które zbliżone do siebie, zachowują kierunek równoległy aż po samą blaszkę; jestto przypadek najpospolitszy wprawdzie, ale jednak nie wyłączny, gdyż niekiedy wiązki zaczynają się rozbiegać już w samym ogonku. Gdyby rozbiegały się coraz dalej, byłby to początek blaszki; lecz w pewnej odległości zbiegają się znowu, i wprzód nim wejda i rozszerzą się w blaszkę prawdziwą, zbliżają się nawzajem, właśnie jak przy wyjściu z łodygi. W tej drodze przestały być równoległymi, lecz pozostały na téjże samej płaszczyźnie i nie wydały odnóg. W skutek tego ułożenia, ogonek rozszerzony przybiera sam postać blaszki (fig. 145, p) i bywa też pospolicie brany za liść; dlatego nadano mu oddzielną nazwę *liściaka*.

Liściak tém się różni od blaszki liściowej, że zamiast nerwów powtórnych, wychodzących pierzasto z nerwu głównego, który się stopniowo wyczerpuje w miarę jak takowe od niego się oddzielają, posiada pewną liczbę nerwów podłużnych, rozpostartych na jego powierzchni i prawie równych przy podstawie i u góry. Różni się jeszcze i tém, że jest osadzony na łodydze w przeciwnym kierunku jak liście prawdziwe, to jest, że powierzchnie jego są prawie pionowe, nie zaś poziome.

§ 14  
że og  
to alb  
zywa  
Wtedy  
i raze  
obwod  
sły, lu  
coby u  
i pełny  
lone, z  
chwa  
jesto  
jącego  
w inu  
ki bo  
szym  
przed  
zuy og  
ogonk  
sza. C  
czy ty  
i zdaj  
stków

§ 1  
narze  
w dzi  
szego.  
sposot  
sam ja  
to są p  
oddalo  
z nim  
dziej  
liścia,  
dy, p

146.  
wraz z

§ 142. **Pochwa. — Przylistki.** — Powiedzieliśmy (§ 122), że ogonek rozszerza się niekiedy przy nasadzie i obejmuje przez to albo całą łodygę, albo jej część tylko; rozszerzenie to nazywa się *częścią pochwowatą ogonka*, albo *pochwą liścia*. Wtedy wiązki wychodzące z łodygi zamiast zbierać się w pęk i razem przechodzić w ogonek, oddzielają się pojedynczo od obwodu łodygi, a przegrodzone mięksizem tworzą płat wkłasy, lub też walec wydrążony, zamiast coby utworzyć miały walec maleńki i pełny. Niekiedy wiązki zrazu oddalone, zbiegają się nieco wyżej, a pochwa zwęża się powoli w ogonek; jestto więc rodzaj liściaka, zaczynającego się bezpośrednio na łodydze; w innych razach (fig. 146 s) wiązki boczne zatrzymują się po dłuższym lub krótszym biegu, albo też przedłużają się nie według płaszczyzny ogonka; wtedy różnica między ogonkiem i pochwą jest najwydatniejsza. Często nakoniec mięksiz nie łączy tych bocznych wiązek ze środkowymi, które idą w ogonek, i zdaje się, że w ten właśnie sposób powstaje wiele przylistków.



§ 143. Przylistki określamy zwykle jako małe liściowate narzędzia, leżące po obu stronach nasady liścia, i w istocie w dzisiejszym stanie nauki, niepodobna dać określenia ściślejszego. Anatomja roślinna nie objaśniła jeszcze dostatecznie sposobu w jaki powstają; zdaje się jednak, że tenże jest taki sam jak w łatach bocznych liści prostych, lub w listkach; że to są podobnie rozszerzenia boczne wiązek mniej lub bardziej oddalonych od podstawy liścia, mniej lub bardziej połączonych z nim przez mięksiz środkowy i kończących się mniej lub bardziej nagle. Chociaż one wychodzą z łodygi wraz z wiązkami liścia, mogą jednakże pozostać niezależnymi od tamtych, i wtedy, ponieważ zdają się należeć tylko do łodygi, nazywają się

146. Kawalek gałązki *r* róży dzikiej (*Rosa canina*), na którym liść *f* wraz z ogonkiem *p*, przylistkami ogonkowymi *s*, i pączkami *b*. — *a* Kolec.

*przylistkami łodygowymi* (fig. 147). Mogą też w mniejszej lub większej długości być połączone z ogonkiem (fig. 146); a ponieważ wówczas zdają się należeć do niego, nazywają się *przylistkami ogonkowymi*.

W wielu razach przylistki nie istnieją wcale, wszelako nie tak często jakby sądzić można; gdyż czasem uchodzą wzroku, albo dlatego że są nadzwyczaj małe, albo że są krótko-trwałe. Szukając ich starannie przy pomocy szkła, lub w liściach bardzo młodych, odkrywamy je u wielu roślin, u których sądziliśmy że ich nie było.

§ 144. Postać przylistków jest bardzo rozmaita. Często okazują się tylko jako maleńkie kolce, niteczki, łuski. Innym razem rozwijają się daleko bardziej, posiadają utkanie liścia, a pozór łat lub listków, na których spostrzegamy nerwy, ząbki, łatki, a nawet zwężenia dolne w kształt ogonka. Nierzadko także tkanka przylistków, zamiast grubieć i zieleńić, zamienia się w błonę cienką, bezbarwną, lub przezroczystą. Lecz postać ich tak rozmaita w rozmaitych roślinach, jest stałą we wziętych pojedynczo, a nawet w wielu pokrewnych z sobą, które dla wspólności licznych piętn tworzą to, co w historii naturalnej nazywamy rodzajem, rodziną, i t. d. Całe rodziny odznaczają się obecnością lub nieobecnością przylistków, lub jaką właściwością ich postaci.

§ 145. Widzieliśmy, że przylistki bywają, albo wcale wolne, albo zrosnięte z ogonkiem. Jeśli są bardzo szerokie i obejmują przez to łodygę do połowy, wtedy jeden z nich może się spoić z drugim na stronie przeciwnej osadzie liścia, a brzegi ich zewnętrzne mogą się nawet zrosnąć, czyto u dołu tylko, czy też w całej długości, i wtedy otrzymujemy pochwę rozszczepioną (fig. 148), lub całą (fig. 127), czyli raczej przylistek pochwowaty. Jeśli przylistki rozszerzając się, zetkną się i zrosną brzegami wewnętrznymi, wtedy tworzą jeden płat, którego środek leży między łodygą a nasadą liścia, w pasze, czyli ką-

147. Kawalek gałązki *r* wierzby uszkowatej (*Salix aurita*), na którym liść *f* wraz z swym ogonkiem, przylistkami łodygowymi *s s.* i pączkiem *b.* Część wyższa blaszki jest odcięta.




147.

cie liś  
149)  
osadz

stron  
zrosn  
listki  
dzyle  
ogon  
zwar  
dzy  
W k  
nych  
pozn  
pow  
ko z  
dujer  
W  
się,

14  
dolna  
w jed  
14  
sady  
15  
occide  
mu.  
wy s.

cie liściowym, a zład przylistki kątowe (stip. axillares) (fig. 149). Jeśli dwa liście w jednej wysokości, naprzeciw siebie są osadzone, a każdy z nich posiada dwa przylistki, i jeśli po obu



148.




149.

stronach przylistek liścia leżącego po prawej ręce, zetknie się i zrosnie z przylistkiem liścia leżącego po lewej, wtedy dwa przylistki utworzą jeden międzyogonków, czyli tak nazywany przylistek międzyogonkowy (fig. 150).

W każdym z wymienionych przypadków można poznać jakim sposobem

powstały przylistki zrosnięte, gdyż już to bywają w części tylko z sobą spojone, już też w roślinach pokrewnych, albo znajdujemy je odosobnione, albo napotyamy stopnie pośrednie.

W objaśnieniach poprzedzających, wyrażenia: rozszerzanie się, spotykanie i zrastanie przylistków, są użyte przenośnie;



150.

148. Kawalek liścia traganku sparcetty (*Astragalus onobrychis*). — *f* Część dolna liścia złożonego, z trzema parami listków. — *s* Przylistki zrosnięte w jeden, ze strony przeciwnej gałązce *r*.

149. Liść *f* *Houttuynia cordata*, siedzący na kawałku gałązki *r*; u nasady ogonka widać przylistek kątowy *s*.

150. Dwa naprzeciwległe liście *f f* jednej z marzanowatych (*Cephalantus occidentalis*), przy nasadzie ich leżą dwa przylistki obrócone ku patrzącemu. Oba są zrosnięte na linii środkowej w jeden przylistek międzyogonkowy *s*. Podobnie jest ze strony przeciwnej. — *r* Gałązka.

gdź rozszerzenie owo i zrośnięcie, istnieje od pierwszego ukazania się przylistków i jest skutkiem ułożenia wiązek w łodydze, a mianowicie w tych miejscach, z których one wychodzą, dając początek rzeczonym narzędziom.

§ 146. Nie zawsze jak wspomnieliśmy, liść składa się z trzech części; owszem, może ich mieć dwie tylko, albo nawet i jedną. Nazywa się *bezogonkowym* (fol. sessile) jeśli nie ma ogonka, *bezprzylistkowym* (f. exstipulatum), jeśli jest pozbawiony przylistków. W ogóle, części na których mu najprędzej może zbywać, są ogonek i część pochwowata, rzadziej zaś blaszka, w którymto razie liść traci swą postać zwyczajną i bywa niekiedy inaczej nazywany.

§ 147. Jakim zmianom ulega liść w różnych okresach rozwijania się swego? Najsamprzód ukazuje się w postaci małego guziczka lub płateczka, w którym nie można rozróżnić osobnych części ani wewnątrz (składa się bowiem z samych komórek), ani zewnątrz. Później dopiero, komórki odpowiadające linii środkowej, wydłużają się i zaczynają tworzyć nerw główny, który się wykształca ostatecznie przez powstanie naczyń różnego imienia, najsamprzód zaś cewek węzownicowych. Jest to więc, jak się spodziewać było można, ten sam porządek, jak przy wykształcaniu się łodygi.

Co się tyczy wykształcenia się względnego jednych części zupełnego liścia względem drugich, obaczmy co się daje spostrzedz na roślinach, w których rzeczony części są dosyć wyraźne, np. w rdeście, gdzie część pochwowata tworzy istotną pochwę; na miódosoku większym i mniejszym (*Melanthus major et minor*), gdzie takowa tworzy wielki kątowy przylistek, pojedynczy w pierwszym, podwójny w drugim gatunku. Łatwo zaś można porównać zmiany, jakie zachodzą w różnym wieku liścia, na gałęzi niezupełnie jeszcze wykształconej, której liście dolne doszły już największych swoich wymiarów; górne dopiero co się ukazują, a między jednemi i drugimi dają się spostrzedz wszystkie stopnie pośrednie. Widzimy tym sposobem, że blaszka ukazuje się najpierwej, poczem wkrótce i część pochwowata; obie rozwijają się prawie zarówno i dochodzą już wprzód pewnej wielkości, zanim się ukaże ogonek. Pochwa najprędzej dosięga ostatecznych swych wymiarów, zwykle wszakże mniejszych niżli wymiary blaszki, i przestaje rosnąć, kiedy jeszcze blaszka i ogonek rozwijają się dalej czas niejaki. Dla

objaśn  
sercov  
bie na  
i najm  
niższe  
długo.

Osta  
dłuższ  
zaś (w  
listka,  
tym, a  
ściu p  
do dłu  
w czw  
Biora  
znależ

Moz  
nasad  
czynac  
dnoce  
tak nie  
rodzen  
własni  
sze nie  
coraz  
stawsz  
kn. Gó  
żnym,  
dłużej  
dzie; ż  
względ  
dem ga

objaśnienia stosunków tych liczbami, weźmy gałązkę kornaczni sercowatej (*Houttuynia cordata*), i wymierzmy sześć po sobie następujących liści, poczynawszy od najwyższego a zarazem i najmłodszego, który jest zaledwie 3 milim. długi, aż do najniższego, którego długość wynosi do 9 centymetrów. Oto jest długość względna części tych sześciu liści:

	Błaszka.	Ogonek.	Przylistek kątowy.
1.	0,2	0,	0,1
2.	0,6	0,08	0,25
3.	3,0	0,5	1,0
4.	4,0	1,5	1,0
5.	5,0	2,0	1,4
6.	6,0	2,3	1,5

Ostatecznie więc blaszka jest w tym przykładzie trzy razy dłuższa od ogonka, a cztery razy od przylistka. Z początku zaś (w liściu pierwszym), była tylko dwa razy dłuższa od przylistka, nieco więcej w liściu trzecim; trzy razy w liściu czwartym, a cztery razy w następnych. Ogonek, nie istniejący w liściu pierwszym, zaczął się ukazywać w drugim; wynosił co do długości, połowę przylistka w liściu trzecim, wyścięgnął go w czwartym, a w dwóch ostatnich był już dwa razy większy. Biorąc inne rośliny, np. przywiedziony wyżej rdest i miodosok, znaleźlibyśmy stosunki nieco odmienne, lecz w ogóle podobne.

Możnaby ztąd wnieść, że liść przedłuża się w części swęj nasady, leżącęj tuż nad pochwą, nie zaś jak korzenie na kończynach wolnych. Lecz czyli przedłuża się tak jak łodyga, jednocześnie w całej swęj rozległości? Łatwo się przekonać że tak nie jest, mierząc odstępę między punktami, bądźto z przyrodzenia, bądź sztucznie przeznaczonemi na liściu, który się właśnie rozwija; dowiemy się tym sposobem, że punkta wyższe nie oddalają się od siebie, najniższy zaś oddalać się będzie coraz bardziej od nasady; ztąd prosty wniosek, że liść, przedstawia rosnąc u góry, rośnie jeszcze przy nasadzie i w ogonku. Gdybyśmy czynili podobne spostrzeżenia, nie już w podłużnym, ale w poprzecznym kierunku liścia, ujrzelibyśmy, że tenże dłużej niekiedy rośnie w szerokość we środku, niż przy obwodzie; że nerwy boczne przedłużają się w takim samym stosunku względem nerwu głównego, w jakim tenże przedłuża się względem gałęzi, z któręj liść wychodzi.

To co się powiedziało o wzrastaniu wzdłuż, tyczy się tylko liści prostych; złożone można raczej pod tym względem porównać z gałązkami, ponieważ rozwijają się od dołu do góry; listki ukazują się i wykształcają tém później, im są wyższe. Uderzający przykład przedstawia nam pewien rodzaj miodkowatych (*Guarea*), w którym cała część wyższa liścia jest jeszcze jakby w stanie pączka, kiedy tymczasem niższa rozwinęła się już zupełnie, tak, że zdaje się, iż liść nosi dwa oddzielne pokolenia listków.

§ 148. Liście doszedłszy ostatecznych swych wymiarów, żyją dłuższy lub krótszy przeciąg czasu. Wiadomo, że życie to, w liściach większej części drzew naszych, trwa ledwie kilka miesięcy. W niektórych, nadewszystko w zamieszkujących ciepłe kraje, trwa dwa lata lub więcej; drzewa takie nazywają się zawsze-zielonemi, ponieważ je widzimy ciągle pokryte liśćmi, niezmienną swą barwą. Nie są to ciągle jedno i też same liście, lecz drzewo dostaje nowych, nie zrzucających wprzód dawnych; przez co zachowuje stale jednakową powierzchność. Łatwo to możemy sprawdzić na sosnach, ostokrzewiu (*Ilex*), niektórych gatunkach dębu, i t. d. Widzieliśmy, że między liśćmi dorocznemi, jedne zwiędłszy pozostają na drzewie, inne w skutek utworzenia się stawów opadają. Nie ma potrzeby przypominać jak barwa zielona zmienia się stopniowo w tak nazwaną barwę *ushtëgo liścia* (*feuille-morte*). Lecz często liście, szczególnież stawowate, zanim opadną, przybierają liczne odcienia, których rozmaitość, a niekiedy nawet rzadka okazałość, nadaje roślinom owe wspaniałe jesienne barwy, które nadewszystko ogółem swoim, tyle czynią wrażenia.

§ 149. Porównanie liści trzech wielkich gromad roślinnych.— Dotychczas porównywając narzędzia zasadnicze trzech wielkich gromad roślinnych, znaleźliśmy znaczne i stałe między nimi różnice. Czy podobnie ma się i z liśćmi? Przypomnijmy najprzód, że one składają się z nerwów i miększu; że nerwy są ułożone dłoniasto lub pierzasto, podług tego jak wiązka ogonka, albo się dzieli zaraz przy wejściu w blaszkę na wiele innych, prawie równych i rozbiegających się, albo też przebiega po linii środkowej blaszki, wydając w lewo i w prawo wiązeczki mniejsze. Nie śledziliśmy wprzód dalszego biegu, ani stosunków tych wiązek, czyli nerwów powtórnych. Otóż mogą się zdarzyć dwa przypadki: 1) w całej swą drodze nie

rozgał  
żek b  
dniami  
się zu  
czą je  
rój ok  
pełnio  
Pew  
dwoma  
madan  
liścien  
§  
siatk  
wzgl  
i t. d.  
lub w  
te two  
cona j  
ści i r  
bywa  
my po  
wycie  
dzimy  
piéro  
wnole  
pierza  
Cze  
dzo r  
liścien  
cznej  
wając  
ją się  
roślin  
na kon  
nierzy  
g l),  
lub po  
151.  
blaszki.  
wolna,

rozgałęziają się wcale, albo jeśli nawet wydadzą kilka odnóży bocznych, to jednak nie łączą się nigdy z wiązkami sąsiednimi; 2) nerwy powtórne rozgałęziają się, odnogi ich dzielą się znowu, a przechodząc od jednego do drugiego nerwu, łączą je z sobą, tak, iż ztąd powstaje jakby siatka naczyńska, której oka są utworzone przez ostatnie podziały nerwów, a wypełnione miękiszem.

Pewien stały stosunek zdaje się zachodzić pomiędzy temi dwoma rodzajami ułożenia nerwów, a dwiema wielkimi gromadami roślin; pierwszy bowiem napotykamy zwykle w jednoliściennych, drugi w dwuliściennych.

§ 150. **Liście jednoliściennych.** — Nerwy ich nie tworzą siatki, niekiedy wszystkie zachowują kierunek równoległy względem siebie (fig. 151), jak np. w liściach kosaćcu, trzciny, i t. d.; innym razem wiązki powtórne, oddzielają się od jednego lub więcej nerwów głównych i biorą inny kierunek; lecz wiązki te tworzą linią mniej więcej łukowatą, a ich wypukłość obrócona jest do nerwu głównego (fig. 152). Z przyczyny równości i równoległości nerwów powtórnych, liść bywa najczęściej całobrzegi. Wprawdzie palmy posiadają liście pierzasto lub dłoniastowycięte; lecz śledząc ich rozwijanie się, widzimy, że w początku były całobrzegie, i dopiero później rozdzieliły się na wiele łatek, równoległe do nerwów swych dłoniastych lub pierzastych.

Część pochwowata bywa częstokroć bardzo rozwinęta w tych liściach roślin jednoliściennych, które obejmują łodygę w znacznej długości; teto nawet pochwy, pokrywając jedna drugą, umacniają łodygę i zdają się stanowić większą jej część w wielu roślinach, np. w bananie. Niekiedy pochwa na końcu swym przedłuża się jakby w kołnierzyk, zwykle błonisty i białawy (fig. 151 *gl*), raz całobrzegi, drugi raz strzępiasty lub poszarpany, a najczęściej umiarkowo po-



151.

151. Kawałek liścia mozgi trzciniowatej (*Phalaris arundinacea*). — *f* Część blaszki. — *g* Pochwa. — *gv* Część pochwowata téjże. — *gl* Część jej górna, wolna, błonista, czyli języczek.

dzielony na dwie boczne części. Takie przedłużenie pochwy zowie się *języczkiem* (ligula), a znajduje się prawie we wszystkich trawach. Porównywano języczek z przylistkami; nie ma bowiem w jednoliściennych innych przylistków, jeśli zechcemy narzędzia te uważać za zupełnie różne od pochwy.

Ponieważ pochwa połączona jest z łodygą w znacznej części jej obwodu, i ponieważ zachowuje jej kierunek, nie stawo- wacieje przeto i liść odpada dopiero wtedy, kiedy obumrze.

Jeśli nerwy są równoległe od spodu do wierzchołka liścia, ten posiada zwykle kształt wstążki (np. w ożypalce [*Typha*] trzcinie), i wtedy niepodobna odróżnić w nim ogonka od blaszki. Innym razem rozbiegają się powoli u podstawy, a zbiegają znowu ku wierzchołkowi; wtedy otrzymujemy poniekąd blaszkę (niektóre storczykowate jak *Epipactis ovata*, *latifolia*, etc.). Jeśli nerwy powtórne oddzielają się od głównych w innym kierunku, wtedy tworzą rozszerzenie, blaszkę, wcale odrębną od ogonka, który przedstawiały niżej, dopóki jeszcze były zbliżone. Banan daje nam przykład tego na wielką stopę (fig. 152). Po większej części możnaby tu cały liść porównać raczej z liściakiem, co usprawiedliwia jedna z roślin bardzo pospolicie na brzegach rzek naszych rosnąca: strzałka (*Sagittaria sagittifolia*), gdyż widzieć można na niej zarazem, liście o dużych blaszkach strzałkowatych, osadzonych na długim prostym ogonku, tudzież inne leżące na wodzie, przedłużające się znacznie w cienkie wstążki, bez różnicy ogonka i blaszki; łatwo także napotkać przejścia od jednego do drugiego z tych tak różnych od siebie kształtów.

Kilka rodzin jednoliściennych stanowi wyjątek od prawideł poprzedzających, a to z przyczyny nerwów rozgałęzionych i połączonych w siatkę; zkad powstaje prawdziwa blaszka, posiadająca czę- sto na obwodzie łaty. Takimi są: obrazkowate, kolcowojowate (*Smilacaceae*) i pochrzynowate (*Dioscoreaceae*).

152. Liść bananu bardzo pomniejszony, na którym widać nerwy powtórne, równoległe i krzywe przy początku.



152.

§ 151. **Liście dwuliściennych.** — Tu to napotykamy liście stawowate, prawdziwie złożone (fig. 140, 141), ząbkowane (fig. 142), karbowane, podzielone na łaty kątami czyli zatokami (fig. 136, 137, 138, 139), a nie linjami prostymi, powstającymi z rozdarcia. Nerwy, wychodząc jedne z drugich, tworzą właściwe kąty, najczęściej ostre (fig. 134, 136); wydają odnogi i łączą się z sobą najdrobniejszymi gałązkami. Zajmując się liśćmi w ogóle, na tę gromadę mieliśmy szczególniej zwróconą uwagę; nie ma więc potrzeby zastanawiać się tu dłużej nad nią.

Należy jednakże wspomnieć, że u niektórych dwuliściennych, z powodu równoległości lub niepodzielności nerwów, liście bywają podobne jak u jednoliściennych. Tak np. w niektórych jaskrach (*Ranunculus gramineus*, *lingua*, etc.). Niektóre można bez wahania się uznać za liściaki, jak np. w akacjach mających liście całobrzegie, gdzie owe mniemane liście, posiadają zawsze blaszkę, z wyjątkiem tylko tych, które się w czasie wschodzenia rozwijają. Wielu botaników usiłowało przez analogją, objaśnić podobnie wszystkie liście tej klasy, które posiadają taki kształt i takie wyjątkowe ułożenie nerwów.

§ 152. **Liście bezliściennych.** — W tej gromadzie najwięcej bywają wykształcone liście paproci, raz bezogonkowe, drugi raz opatrzone ogonkiem, całobrzegie, lub powycinane. Podziały ich mogą być wielokrotne. Tak np. orlicy zwyczajnej (*Pteris aquilina*), wielkiej owiej paproci, rosnącej w naszych lasach, to, coby wziąć można za gałąź okrytą liśćmi, jest jednym tylko liściem, który wychodzi z pnia podziemnego i jest wielokrotnie pierwiastkowo wycięty. Nerwy tworzą tu często rozgałęzienia i siatki daleko nawet rozmaitsze, niż w roślinach liściennych, i mogą dostarczyć dogodnych piętn do klasyfikacji. Ogonki złożone są z wiązek włókno-naczynnych, podobnych co do budowy wiązkom łądygi, tojest posiadających cewki najczęściej drabinkowate, zbliżone w pasek rozmaicie pognięty; wiązki te otoczone są miękiszem czarniawym. Zład na przecięciu poziomém ogonka, dają się widzieć rozmaite dziwaczne kształty, mogące także posłużyć do odróżnienia pojedynczych gatunków. Tu przytoczymy tylko owo, dalekie wprawdzie podobieństwo, z dwugłównym orłem herbu austriackiego, które upatrzone, na ukośnem przecięciu podstawy ogonka

orlicy. Na tym ogonku można śledzić naczynia i włókna właściwe paprociom.

W innych bezliściennych, których łodygi nie posiadają układu włókno-naczynnego, liście są bardzo proste; w zeczwórniku (*Marsilea*), są jeszcze podzielone jakby cztero-listkowe, i posiadają wiele nerwów; w widłakowatych ograniczają się na blaszce komórkowej, którą jedna tylko mała wiązeczka przebiega. I ta zastąpiona bywa, w rodzinach nie posiadających cewek, kilku tylko komórkami podłużnymi, jak to widzimy w mchach i jungermanjach; a nakoniec wszelki ślad liści znika wraz z łodygą w ostatnich rodzinach, jakoto: porostach, grzybach, wodrostach.

UŁOŻENIE LIŚCI NA ŁODYDZE, CZYLI ULISTNIENIE (Phyllotaxia).

§ 153. Liście mogą być rozmaicie ułożone na osi wspólnej, która je nosi. Nazywają się *łodygowemi* albo *gałęziowemi*, podług tego jak siedzą na łodydze, albo na gałęziach. Niekiedy zamiast wyrastać z różnych wysokości łodygi, skupione są wszystkie u dołu przy szyi, i wtedy zowią się *korzeniowemi*, chociaż wcale nie należą do korzeni, tylko się w bliskości ich znajdują, (np. w pierwiosnkach, i t. d.).

Częściej ułożone są na osi w pewnych odstępach. *Węzłami* (nodi) nazywamy punkta leżące w rozmaitych wysokościach łodygi, z których wyrastają liście (fig. 154, n); *międzywęzłem* (internodium, meritallus) zaś, odstęp nagi (fig. 154 m) pomiędzy dwoma najbliższymi węzłami. Z węzła wyrasta dwa albo więcej liści, które przeto osadzone są w jednej wysokości, albo też tylko jeden. Weźmy tu najprzód pod uwagę ostatni przypadek.

§ 154. **Liście naprzemianległe.** — Najczęściej jeden tylko liść wyrasta z każdego węzła, i wtedy mówimy, że liście są naprzemianległe (*fol. alterna*). Długo czas przestawano na tém wyrażeniu, używano zaś przymiotnika: *rozrzuczone* (*fol. sparsa*) dla liści osadzonych bez żadnego na pozór porządku; gdyż uważano, że najwykłej pewna prawidłowość zachodzi w ułożeniu liści naprzemian. Bonnet pierwszy dostrzegł, że poprowadziwszy linią od dołu do góry, przez punkta z których wychodzą liście, linja ta opisze na łodydze węzownię; dalej, że liście zostają względem siebie w stosunku prawie stałym,

gdź k  
obwod  
piérws  
przedz  
po ow  
lei; liś  
dacz u  
liście s  
pięciu  
jedenas  
siódmy  
kłańsz  
np. dz

§ 14


uwaga  
pp. Sch  
twierdz  
i pomno  
wadzają  
nia kilk  
czącyel  
i wsz  
cznych  
połącze  
odznac  
liście c  
(fig. 15  
nią prze  
osady, a  
żownica  
ścia sze  
skręty o  
waż owe  
wnych o  
łodygi,

153. H  
wprost p  
drugi obie  
na której  
blizny ws.

gdyż każdy z nich oddalony jest od następnego o równą część obwodu łodygi, tak, że jeśli wzięwszy któryk olwiek liść za pierwszy, znajdziemy nad nim pionowo umieszczony liść inny, przedzielony od tamtego kilku pośrednimi, to liść następujący po owym górnym, przypadnie wprost nad liściem drugim z kolei; liść dalszy nad trzecim, i tak następnie. Wspomniany badacz uważał ten przypadek za najpowszechniejszy, w którym liście stojące tym sposobem ponad sobą, powtarzają się od pięciu do pięciu, tak, że szósty stoi wprost nad pierwszym, jedenasty nad szóstym, siódmy nad drugim, dwunasty nad siódmym i t. d. Dostrzegł on, że bywają jeszcze inne, zawiłksze połączenia, gdzie zamiast szóstego, inny wyższy liść, np. dziewiąty, umieszczony bywa pionowo nad pierwszym.

§ 155. Nowe badania w tym przedmiocie, czynione z wielką uwagą i bystrością, a które po większej części winni jesteśmy

pp. Schimper i Al. Braun, potwierdziły powyższe wypadki i pomnożyły ich liczbę, doprowadzając zarazem do poznania kilku praw, przewodniczących ułożeniu liści, a ztąd i wszystkich narzędzi bocznych rośliny. Zaczniemy od połączenia, które Bonnet tak odznaczał, to jest, w którym liście co pięć się powtarzają (fig. 153). Poprowadźmy linią przez kolejne punkta ich osady, a spostrzeczemy że węzownica zanim doszła do liścia szóstego, opisała dwa skręty około łodygi. Ponieważ owe pięć liści leżą w różnych od siebie odstępach, a cała linja obiega dwa razy obwód łodygi, przeto odległość któregośkolwiek z nich od poprzedniego





153.

153. Kawalek gałązki wiśni, z sześciu liśćmi, z których szósty przypada wprost ponad pierwszym, po dwóch skrętach węzownicy, i zaczyna przeto drugi obieg. — Obok nakręślona jest gałązka powiększona i ogołocona z liści, na której oznaczona jest węzownica, — w pewnych odległościach téż widać bliźny wskazujące nasadę liści.

lub następnego, wyrazić można przez  $\frac{2}{3}$  obwodu łodygi. Nazywano kątem rozbiegowym albo kątem rozbiegu (*angulus*



154.



155.

154. Kawalek gałązki lipy z czterema liśćmi, tworzącymi dwa obiegi, ponieważ kąt rozbiegu jest  $\frac{1}{2}$ . — Obok skreślony kawalek gałązki powiększonej, z węzownią i bliznami wskazującymi punkta osady liści. — *n* Węzeł. — *m* Międzywęźle.

155. Młoda kępka gatunku cibory (*Cyperus esculentus*) o liściach trzyczędowych. — Obok powiększony kawalek łodygi z węzownią i bliznami wskazującymi nasadę liści.

*diverg*  
między  
że liczą  
dwom  
zaś il  
szósty  
dwóch  
liści, k  
znajdu  
wszyst  
łączeni

§ 3  
są de  
dwóc  
dy z n  
dygi:  
liści tr  
obieg.

§ 1  
w wie  
są na  
pierw  
=  $\frac{1}{2}$

§ 1  
najpo  
liści,  
liści w  
że ką  
i t. d.  
znaczn

i jeśli  
tojest  
nown  
a ztą  
z róż  
 $\frac{3}{8}$  =

*divergentiae*), ułomek ten, który nam wyraża łuk zawarty między osadą dwóch po sobie następujących liści: uważajmy, że licznikiem jego jest liczba skrętów węzownicy, pomiędzy dwoma pionowo nad sobą stojącymi liśćmi; mianownikiem zaś ilość wszystkich liści zawartych w tym odstępie. Liść szósty zaczyna nowy poczet pięciu, ułożonych podobnie na dwóch skrętach w węzownię. Każdy z takowych układów liści, które powiązane w podobny sposób, ponad pierwszym się znajdują, nazywa się obiegiem (*cyclus*). Określiwszy dokładnie wszystkie te wyrazy, łatwo nam będzie przejrzyć rozmaite połączenia jakie się w roślinach przedstawiają.

§ 156. Najprostszym przypadkiem jest ten, w którym liście są *dwurzędowe* (*fol. disticha*), to jest ułożone naprzemian na dwóch przeciwległych stronach łodygi (fig. 154). Wtedy każdy z nich jest przedzielony od następnego połową obwodu łodygi: na końcu jednego skrętu węzownicy, znajdujemy wtedy liść trzeci, który leży wprost nad pierwszym i zaczyna nowy obieg. Kąt rozbiegu będzie  $\frac{1}{2}$ .

§ 157. Daleko rzadszemu jest ułożenie, jakie napotykamy w wielu ciborowatych (fig. 155), gdzie trzy liście osadzone są na jednym skręcie węzownicy, a czwarty stoi wprost nad pierwszym. Kąt rozbiegu jest w tych *trzyrzędowych* liściach  $= \frac{1}{3}$ .

§ 158. Wszystkie wzyż wymienione obiegi nie są wcale najpospolitszemi. Daleko częściej napotykamy większą ilość liści, osadzonych w liczniejszych skrętach węzownicy; np. 8 liści w 3<sup>ch</sup> skrętach, 13 w 5<sup>ciu</sup>, 21 w 8<sup>miu</sup>, czyli innymi słowy: że kąty rozbiegu dwóch najbliższych liści, są  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{5}{13}$ ,  $\frac{8}{21}$ , i t. d. Jeśli ułamki te otrzymane wprost przez postrzeganie znacznej ilości roślin, napiszemy jeden za drugim:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{8}, \frac{5}{13}, \frac{8}{21}, \text{ i t. d.},$$

i jeśli porównamy je z sobą, uderzy nas pewien stosunek stały, to jest że licznik każdego składa się z summy liczników, — mianownik z summy mianowników dwóch poprzednich ułamków; a ztąd, że licznik i mianownik każdego, można także otrzymać z różnicy wyrazów dwóch następnych ułamków. Tak np.

$$\frac{3}{8} = \frac{1+2}{3+5} \text{ albo } \frac{8-5}{21-13}$$

Zastosowując prawo to do oznaczenia innych możliwych połączeń, i dodając przeto wyrazy ostatnich już znanych ułamków, otrzymamy  $13/34$ , następnie  $21/53$ ,  $34/89$ ,  $55/144$ . Liczby te, wypadające z tak prostego rachunku, znajdujemy potwierdzone postrzeżeniami, które jednakże tém więcej ostrożności wymagają i tém są niepewniejsze, im bardziej liczby rosną. W rzeczy samej, łatwo pojąć, że jeśli międzywęzła są dosyć długie, a liście także znacznemi przedzielone odstępami, trudno jest okazać, że liść np.  $35^{\text{ty}}$  lub  $36^{\text{ty}}$  leży wprost nad pierwszym. Jeśli przeciwnie łodyga jest krótka, a w skutek tego liście osadzone są blisko siebie, albo nawet stykają się z sobą jak np. w karczochu, łatwo będzie spostrzedz, że jeden leży tuż nad drugim, lecz za to z największą tylko trudnością będziemy mogli śledzić następstwo liści pośrednich.


§ 159. Niemniej przeto i w takich przypadkach można dość łatwo oznaczyć liczbą każdy liść. Sposób postępowania w takich razach jest bardzo prosty, a zasada się na pewnych własnościach ułożenia prawidłowego w węzownicy, które zaraz wymienimy. Dla uproszczenia zważajmy, że łodyga, którą dotychczas braliśmy za walcowatą, rzeczywiście zwięza się stopniowo od dołu do góry, i jest zatem stożkiem bardzo długim; że przeto skręty węzownicy, która ją obwija, zmniejszają się ciągle; że w skutek tego nie leżą dokładnie jedne na drugich jak w sprężynie szelki, lecz raczej jak w sprężynie zegarka, którąbyśmy za koniec jej wewnętrzny pociągnęli w górę; że, jeżeli przypuścimy, iż oś jest nadzwyczaj skrócona, i zamieniona prawie w płaszczyznę, węzownica weźmie postać sprężyny od zegarka, będzie się z każdym następnym skrętem zmniejszać prawidłowo w swój średnicy, i tym sposobem przez szereg po sobie następujących spółośrodkowych skrętów, zbliżać się coraz bardziej do środka, który nam przedstawia wierzchołek osi (fig. 157). W tém przypuszczeniu, część położona w samym środku węzownicy, leżałaby najwyżej, gdyby oś była przedłużoną; część zaś położona na końcu zewnętrznym, przypadłaby w takim razie najniżej, a części pośrednie im są zewnętrzniejsze, tém byłyby niższe na osi przedłużonej. Nie jest to wszakże tylko czystém przypuszczeniem, ułożenie takie napotykamy dość często w przyrodzie, a to wtedy, kiedy na łodydze do najwyższego stopnia skróconej, siedzi mnóstwo li-

ści zhl  
156);

Nal  
i wez  
złożo  
np. 5  
częst  
Ze  
a na  
równ  
częst  
idąc  
stępn  
każdy  
na ty  
tów v  
wnic  
lej li  
wych  
mien  
40ty

156  
z górn  
węzow

ści zbliżonych w jeden pęk, który się nazywa *różyczką* (fig. 156), jak np. w rojniku drzewnym.




156.

Nakreślmy więc (fig. 157) na papierze podobną wężownicę, i weźmy aby objaśnienie było zarazem jasne i zupełne, obieg złożony z niezbyt wielkiej i niezbyt małej ilości skrętów i liści; np.  $\frac{5}{13}$ , które też połączenie jest rzeczywiście jednym z najczęstszych w przyrodzie.

Ze środka wężownicy zakresłmy końcem jej przeciwnym, a na którym umieścimy liść 1, koło, i podzielmy takowe na 13 równych części, za pomocą tyluż promieni. Pięć takowych części będzie stanowić kąt rozbiegu. Odliczmy ich przeto pięć, idąc za biegiem wężownicy i oznaczmy liść 2<sup>gi</sup>; po pięciu następnych liść 3<sup>ci</sup> i tak następnie; kiedy dojdziemy do 13<sup>go</sup>, na każdym promieniu będzie leżał jeden liść, a 14<sup>ty</sup> przypadnie na tym samym co 1<sup>szy</sup>; będzie od tegoż oddalony o pięć skrętów wężownicy i zacznie nowy obieg. Przypuśćmy, że wężownica opisuje jeszcze 10 skrętów aż do środka i oznaczmy dalej liście, zaczynając od 14<sup>go</sup>, a obaczmy, że po pięciu nowych skrętach, 27<sup>my</sup> przypadnie znowu na tymże samym promieniu co 1<sup>szy</sup> i zacznie 3<sup>ci</sup> obieg, który się skończy liściem 40<sup>ym</sup>. Trzy liście będą leżały na każdym promieniu, oddzielone

156. Obieg złożony z trzynastu liści skupionych w różyczkę, widziany z góry. Na osi bardzo krótkiej A, która je nosi, nakreślono pięć skrętów wężownicy i wskazano początek każdego liścia.

od następnych pięciu skrętami, a różnica liczby jednego od liczby drugiego, będzie zawsze 13.



157.

Lecz każdy z liści stoi nadto w pewnym stosunku z liśćmi najbliższymi po prawej lub lewej stronie, tak np. 1<sup>szy</sup> z 6<sup>lym</sup> po prawej, a ponieważ każdy z osobna liść może być wzięty za punkt wyjścia, ten 6<sup>ly</sup> stoi właśnie z 11<sup>lym</sup>, leżącym na najbliższym promieniu po prawej stronie, w tym samym stosunku w jakim liść 1<sup>szy</sup> stoi względem niego, tak samo 11<sup>ly</sup> względem 16<sup>go</sup>, 16<sup>ly</sup> względem 21<sup>go</sup>, 24<sup>sz</sup> względem 26<sup>go</sup>, i t. d., tak, że poprowadziwszy linią przez wszystkie te punkta 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, takowa utworzy nam także kawałek węzownicy. Ponieważ zaś liść 2<sup>gi</sup> stoi względem 7<sup>go</sup>, 3<sup>ci</sup> względem 8<sup>go</sup>, 4<sup>ty</sup> względem 9<sup>go</sup>, 5<sup>ty</sup> względem 10<sup>go</sup> w tym samym

157. Zarys węzownicy na płaszczyźnie, skierowanej od prawej ku lewej ręce, i złożonej z pięciu obiegów, z których każdy posiada 13 liści, osadzonych na pięciu skrętach węzownicy. Węzownice powtarne, utworzone ku prawej ręce przez szereg liczb od pięciu do pięciu, ku lewej, przez szereg liczb od ośmiu do ośmiu, wskazane są linjami kropkowanymi.

stosunk  
12, 17,  
i t. d.,  
węzow  
wszyst  
liści. W  
zarazer  
liści. J  
siednim  
przycz  
węzow  
a potér  
2, 5, 8  
żnięć s  
różnica  
kierunk  
zbliżają

Otrzy  
się zow  
a która  
w kole  
małszym  
względ  
samym  
czyli w  
wyraża  
na któ  
nłomku  
piérwo  
ciwnym  
czyli m

Łatw  
wtórne,  
kierunk  
liczb, je  
two też  
(mając  
rym ką  
którego  
węzown


stosunku, co 1<sup>sz</sup>y względem 6<sup>go</sup>, przeto przez punkta: 2, 7, 12, 17, 22 i t. d., 3, 8, 13, 18, 23, i t. d., 4, 9, 14, 19, 24 i t. d., 5, 10, 15, 20, 25 i t. d., można poprowadzić 4 inne węzownice podobne i równoległe (?) względem pierwszej wszystkie zaś pięć, obejmować będą wszystkie punkta osady liści. W każdej z nich liczba pięć, to jest ilość węzownic, musi zarazem być różnicą liczb, dwóch którychkolwiek najbliższych liści. Jeśli śledzić będziemy podobnie stosunki liścia 1<sup>go</sup> z sąsiednim mu po lewej stronie 9<sup>ym</sup>, będziemy mogli dla tej samej przyczyny i tym samym sposobem nakreślić odrębną znowu węzownicę, przechodzącą przez liczby 1, 9, 17, 25, 33 i t. d.; a potem 7 innych zaczynających się kolejno od punktów: 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, i przedstawiających w szeregu swych liczb różnicę stałą 8 od jednej do drugiej. Im większa jest takowa różnica, tém bardziej węzownica przybliży się do prostego kierunku promieni, i tém krótszą jest droga, którą przebiega zbliżając się do środka.

Otrzymałszy zatem najprzód pierwszą węzownicę, która się zowie *pięrowną*, czyli *macierzystą* (*spira generatrix*), a która przechodzi przez liście 1, 2, 3, 4, 5, 6, i t. d., to jest w kolejnym porządku ich wysokości na łodydze; dalej otrzymaliśmy wiele węzownic powtórnych, wijących się równoległe względem siebie, jedne od prawej ku lewej ręce, to jest w tym samym kierunku co pierwotna, drugie od lewej ku prawej ręce, czyli w kierunku przeciwnym. Tych ostatnich było 5, liczba wyrażająca różnicę liczb, dwóch po sobie następujących liści na którejkolwiek węzownicy, i będąca właśnie licznikiem ułamku, który nam oznacza kąt rozbiegu ( $\frac{5}{13}$ ) w węzownicy pierwotnej. Z drugiej strony, węzownic równoległych w przeciwnym kierunku jest 8; która to liczba dodana do 5, daje 13 czyli mianownika tegoż ułamku.

Łatwo teraz pojąć, że jeśli zdołamy zliczyć węzownice powtórne, równoległe do siebie w jednym, a następnie i w drugim kierunku, mamy wiadomy kąt rozbiegu. Mniejsza z tych dwóch liczb, jest licznikiem, a summa obudwóch mianownikiem. Łatwo też będzie wtedy oznaczyć wszystkie liście, albowiem (mając zawsze przed oczyma przypadek obecny, to jest, w którym kąt rozbiegu =  $\frac{5}{13}$ ), jeśli wyjdziemy z punktu osady któregośkolwiek liścia i oznaczymy go liczbą 1, następne na węzownicy powtórnej z prawej strony będą 6, 11, 16 i t. d.;

zaś następne na wężownicy z lewej strony: 9, 17, 26, i t. d., a przez to oznaczywszy jeden liść wężownicy, wszystkie inne z łatwością znajdziemy, gdyż potrzebujemy tylko dodawać liczbę 5 lub 8, jeśli idziemy z dołu do góry, a odejmować, jeśli idziemy z góry na dół.

§ 160. Lecz czyliż w istocie łatwiej jest dojść liczby wężownic powtórnych, niż wężownicy pierwotnej? Ta ostatnia wyraźniej się daje widzieć, jeśli liście są nieco oddalone, na osi, która jest mniej lub więcej długa, ale znika tam, gdzie liście są tak zbliżone na krótkiej bardzo osi, że niepodobna prawie ocenić ich względnej wysokości. Za to w takich razach wężownice powtórne stają się bardzo wydatne; aby się o tym przekonać, dosyć jest rzucić oko na różyczkę złożoną z mnóstwa liści, jaką np. przedstawiają rojniki, zanim łodyga ich się rozwinie, a szczególniej gatunek hodowany w naszych cieplarniach pod imieniem *Sempervivum tabulare*. Rysunek fig. 156 urzeczywistnia się w takich różyczkach o małym bardzo



158.

kombinacją  $\frac{5}{13}$ , która nam służyła do okazu (fig. 158). Gdybyśmy wzięli szyszkę świerku (*Pinus picea*), znaleźlibyśmy

158. Szyszka sosny białej, na której poznaczano liczbami łuski, w porządku względnym wysokości. Szeregiem kropek wskazano rząd prosty i dwie wężownice powtórne, z których jedna idzie od lewej ku prawej, druga od prawej ku lewej ręce.

8 wężo  
a zład

Częs  
tak np.

my prz  
dojdzie  
najpos

§ 16  
wtóry  
zbliżo

każda  
jedna  
któraby

21, i t.  
§ 16

wo. St.  
w całej

tęże se  
jest sta

wiekba  
rasta a

względ  
śnie te

ta b ra  
przeci

modro  
inno-s

Wog  
wnicy,

ułamku  
 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$   
dnego

wuley w  
gałązka  
się z cz

tę zmia  
Co do p  
macy p  
stancji

8 węzownice powtórnych w jednym, a 13 w drugim kierunku, a ztąd wnieslibyśmy że kąt rozbiegu jest  $\frac{8}{13+8} = \frac{8}{21}$ .

Często możnaby zagadnienie to innemi sposobami rozwiązać: tak np. kiedy szeregi proste dadzą się łatwo zliczyć, otrzymamy przez to mianownika kąta rozbiegu, a znalazłszy takowy, dojdziemy licznika z rzędu ułamków wyrażających rozbiegi najpospolitsze.

§ 161. Mówiliśmy dotąd tylko o dwóch węzownicach powtórnych, które są najwidoczniejsze i najbardziej do pionu zbliżone; lecz jasną jest rzeczą, że istnieje wiele innych, gdyż każda linja któraby przechodziła przez szereg liczb, dających jedna od drugiej też samą różnicę, byłaby węzownicą; np. ta, któraby przeszła przez 1, 4, 7, i t. d., albo przez 1, 11, 21, i t. d.

§ 162. Węzownica pierwotna może iść w prawo lub w lewo. Starano się dojść, czyli kierunek ten jest stałym, czyto w całej roślinie, czy w gałązkach jednych względem drugich téjże samój rośliny. W niektórych przypadkach znaleziono, że jest stałym, lecz że w większej części, tak nie jest. Cóżkolwiek bądź jeśli mamy dwie gałązki *a* i *b*, z których druga wyrasta z pierwszej; pierwszy liść gałązki *b*, leży zawsze tak względem liścia gałązki *a*, z którego kąta wyrasta *b*, że właśnie ten liść zaczyna węzownicę gałązki *b*. Lecz węzownica ta *b* raz ma kierunek ten sam co *a*, drugi raz kierunek wcale przeciwny. W pierwszym razie nazywa się *toż-stronną*, (*homodroma*; ὁμός, podobny, jednaki; ὁρόμος, bieg), w drugim *inno-stronną* (*heterodroma*; ἕτερος, różny).

Wogóle nie bywa jednostajności, ani co do kierunku węzownicy, ani co do kąta rozbiegu, aż dopiero tam, gdzie wyrazy ułamku oznaczającego ten ostatni, są liczbami bardzo małemi,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , a najwyżej  $\frac{1}{5}$ . Dalej zaś albo bywają przejścia z jednego obiegu do obiegów najbliższych, albo kierunek węzownicy w prawo lub w lewo, napotyka się prawie zarówno na gałązkach wychodzących z téjże samój gałęzi, a nawet zmienia się z czasem na jednej gałązce. Przyczyny, które sprowadzają tę zmianę kierunku, nie są dotychczas dostatecznie zbadane. Co do przejścia z jednego obiegu w drugi, to łatwo się tłumaczy porównywając kąty rozbiegowe, które w ostatniej instancji bardzo mało się od siebie różnią. Gdyż wyraziwszy je

w stopniach i minutach, obaczmy, że zaczynając od  $5/13 = 138^{\circ} 24'$ , wszystkie inne wynoszą  $137^{\circ}$ , więcej pewną liczbą minut, która lubo się nieco zmienia, zbliża się jednak coraz bardziej do 30, a w końcu zaledwie tylko że się różni. Zważmy teraz że tu chodzi o kilka minut okręgu małej gałązki; najmniejsze zboczenie, pochodzące czyto ztąd, że gałązka skręci się nieco, czego częste przykłady w przyrodzie, czy też ztąd, że przy postrzeganiu zajdzie niedostrzeżona, często niepodobna do uniknięcia omyłka, zmienia o te kilka minut rozbieg, i podstawia przeto jeden obieg za drugi. Dlatego też Bravais uważa odmienne ułożenia liści na jednociągłej wężownicy, tylko za odmiany jednego ułożenia, w którym kął rozbiegu jest stały. Takim kątem jest podług niego  $137^{\circ} 30' 28''$ , niespółmierny z okręgiem, to jest nie dzielący go nigdy bez reszty, a przeto nie mogący nigdy sprowadzić liścia wprost nad jeden z poprzedzających. Liście przeto 6, 9, 14, 21, 35, 56 i t. d., które jak widzieliśmy w szeregu obiegów znanych, przypadają nad liściem pierwszym, nie leżałyby podług tego dokładnie na linii pionowej przechodzącej przez punkt osady liścia pierwszego, lecz będąc umieszczone to z jednej, to z drugiej strony téjże linii, zbliżałyby się do niej coraz bardziej, nie mogąc jej jednakże nigdy dosięgnąć.

Bravais dzieli zatem liście pod względem ich ułożenia na łodydze, na dwa wielkie działy: 1. *krzywo-rzędowe*, to jest te, z których jeden nigdy nie przypada nad drugi w linii prostej, i które przeto opisują linią krzywą nieoznaczoną; 2. *prosto-rzędowe*, których rozbieg jest częścią, raz, lub kilka razy wziętą, okręgu, a które przeto muszą przypadać jedne nad drugimi, tworząc przez to szeregi proste wzdłuż łodygi: widzieliśmy już kilka takich przykładów na liściach dwurzędowych i trójrzędowych, których rozbieg jest połową, lub trzecią częścią okręgu.

§ 163. Mówiliśmy dotąd o kątach rozbiegu, które się zwykle napotykają w rzędach wężownicowych, i które jak widzieliśmy, zbliżają się wszystkie do  $137^{\circ}$ . Lecz niekiedy napotykamy inne jeszcze, wcale odmienne, jak np.  $1/4$ ,  $1/5$ ,  $2/9$ ,  $3/14$ , i t. d., które jak łatwo spostrzedz, tworzą szereg, w tém do poprzedzających podobny, że wyrażenia jego otrzymywać się dadzą również przez dodawanie liczników i mianowników. Nie będziemy się tu zatrzymywali, ani nad tym, ani nad dwoma

innemi  
odkry  
zać za  
aby ur  
niach  
Bra  
kiedy  
otrzym  
cy, kt  
owsze  
młode  
kształ  
czyli  
ułoża  
nieco  
stać g  
dzie w  
rzędy  
(Cact  
§ 1  
padki  
dzi.  
naprz  
oppo  
cilla  
W og  
odstę  
ściam  
liści  
naprz  
Prawi  
wpros  
stepy,  
w sar  
§ 2  
żdy t  
są pr  
będzi  
zywa  
ta), [

innemi szeregami, które także w skutek postrzeżeń zostały odkryte, gdyż to-są przypadki tak rzadkie, że je można uważać za wyjątki. Uczący się powinien jednak o nich wiedzieć, aby uniknął zamieszania i wątpliwości, skoro w poszukiwaniach swych natrafi na które z tych niezwykłych połączeń.

Bravais sądzi, że zmiany te rozbiegu wtedy się zdarzają, kiedy wszystkie liście węzownicy jakiej powtórnej znikną, i że otrzymujemy tę lub ową zmianę, według téj właśnie węzownicy, która zniknęła. Przypuszczenie to nie jest bezzasadnem, owszem przypadek taki zdarza się czasami. Tak np. bardzo młode łądygi niektórych cierńców (*Cactus*), mają wcale inny kształt niż później. Zrazu wcale zaokrąglone nosiły liście, czyli raczej małe kupki koleców, które ich miejsce zastępują, ułożone w pewną liczbę węzownic, z których wiele urywa się nieco wyżej i wcale niknie, a zarazem i łądyga przybiera postać graniastopupa lub słupa żłobkowanego, którego krawędzie wystające oznaczają ilość rzędów liści trwałych, a jeżeli rzędy te spadną aż na dwa tylko, łądyga spłaszczy się zupełnie (*Cactus phyllanthus*).


§ 164. **Liście naprzeciwległe.** — Rozbierzmy teraz przypadki, w których z każdego węzła więcej nad jeden liść wychodzi. Jeśli ich jest tylko dwa w równych wysokościach, jeden naprzeciw drugiego, mówimy, że są *naprzeciwległe* (*fol. opposita*), jeśli ich jest więcej, że są *okółkowe* (*fol. verticillata*), a ogół ich nazywamy *okółkiem* (*verticillus*). — W ogóle liście tego samego okółka są poprzedzielane równemi odstępami, a przeto łuk leżący między dwoma sąsiednimi liśćmi jest równy obwodowi łądygi podzielonemu przez liczbę liści okręgu; jest zatem połową obwodu, jeśli mamy dwa liście naprzeciwległe; trzecią częścią, jeśli mamy trzy liście i t. d. Prawie ogólnem jest prawo, że liście jednego okółka nie leżą wprost nad liśćmi okółka niższego, ale przypadają w ich odstępach, jużto bliżej jednego boku niż drugiego, już też dokładnie w sam środek.

§ 165. Jasną jest rzeczą, że w tym ostatnim przypadku każdy trzeci okółek przypadnie ponad pierwszym, a jeśli liście są prosto tylko naprzeciwległe, para wyższa krzyżować się będzie pod kątem prostym z parą niższą. Takie ułożenie nazywa się *krzyżowem*, a ztąd i liście *krzyżowe* (*fol. decussata*), [fig. 159]. Ogół liści na łądydze ukazuje się wtedy w czte-

rech rzędach prostych. Jeśli okółki są złożone z trzech liści (fig. 160), otrzymamy sześć rzędów; jeśli z czterech, — ośm rzędów. Wszystkie te połączenia należą do liści prostopadłych podług Bravais.



159.



160.

Tu zatem, zamiast jednociągłej węzownicy, mamy poczet okółków nad sobą stojących (fig. 161). Ponieważ zaś liść jakikolwiek  $f$ , stoi w pewnym stosunku do liści  $f'$   $f''$ , bezpośrednio wyższych względem niego; ponieważ dalej, jeden z tych, np. prawy, stoi znowu w tym samym stosunku do liścia wyższego z prawej strony  $f''$  i tak następnie, przeto jasną jest rzeczą, że poprowadziwszy linią przez liście tym sposobem po sobie następujące, otrzymamy węzownicę wijącą się około łodygi  $z$ . Podobnąby można zakreślić od każdego z liści okręgu, a ztąd wypadnie tyleż węzownic równoległych i podobnych tym, któreśmy nazwali powtórniemi w liściach naprzemianległych.

Chcąc dojść tutaj rozbiegu dwóch po sobie następujących liści, za pomocą sposobu, któregośmy używali przy liściach naprzemianległych (§ 160), to jest oznaczając go ułamkiem, który ma za licznika ilość węzownic równoległych, a za mianownika ilość rzędów prostych, widoczną jest, że pierwszy równający się liczbie liści jednego okółka, będzie zawsze połową drugiego, równającego się liczbie liści dwóch po sobie

159. Liście krzyżowe z *Pimelea decussata*.

160. Liście bazanowcu pospolitego (*Lysimachia vulgaris*), ułożone po trzy w okręgi, stojące w drugi ponad sobą

następn  
zone s

ległych  
kazuje,  
dwóch  
cój na  
najbliż  
wprost  
okółki,  
ułożone  
z tych  
dzące pr  
niższeg

§ 160  
den okó  
pod nim  
sobie id  
wszym  
pary liś

161. Z  
z których  
mieniami,  
jak takow  
inne od pr

następujących okółków. Ztąd wynika, że ile razy liście ułożone są w okółki o jakiegokolwiek liczbie, rozbieg dwóch przy-



161.

ległych sobie będzie równy połowie obwodu. Wypadek ten pokazuje, że każdy okółek pochodzi z ułożenia przeciwnego dwóch po dwóch liści; a tam, gdzie w okółku znajduje się więcej nad dwa liście, wychodząc z punktu osady jednego, liść najbliższy nie jest właściwie sąsiednim, takim bowiem jest liść wprost przeciwny. Rzeczywiście, nietrudno jest napotkać okółki, których liście rozłączają się i pokazują jawnie, że są ułożone po parze. Tak np. w okółkach o trzech liściach, jeden z tych bywa umieszczonym wyżej lub niżej od innych, dowodząc przez to, że rzeczywiście należy do okółka wyższego lub niższego.

§ 166. Wspomnieliśmy wyżej o przypadkach, w których jeden okółek nie krzyżuje się dokładnie z drugim, nad nim lub pod nim leżącym; wtedy musimy pominąć wiele okółków po sobie idących, zanim znajdziemy ten, który wprost nad pierwszym jest umieszczony. Tak np. u wielu goździkowatych, pary liści naprzeciwległych przypadają ponad siebie dopiero

161. Zarys na płaszczyźnie czterech okęgów, co dwa naprzeciwległych, z których każdy składa się z czterech liści. Rzędy proste wskazane są promieniami, rzędy węzownicowate równoległe linjami kropkowanymi. Podobnie jak takowe nakreślone tu są od lewej ku prawej stronie, możnaby nakreślić inne od prawej ku lewej.

co pięć, tak, że wychodząc z punktu osady jednego liścia, naliczmy wprzód 8 pośrednich, zanim znajdziemy taki, który nad pierwszym pionowo stoi. Śledząc bacznie ich stosunki między sobą, widzimy, że ich ułożenie zbliża się raczej do liści naprzemianległych, stojących w węzownicy jednociągłej, i że skracając coraz bardziej oś, tak, iżby liście zebrały się w różyczkę, otrzymalibyśmy prawie tę samą kombinacją, która zachodzi przy ośmiu liściach mających rozbieg  $\frac{3}{8}$ . Rzeczywiście też, często widzieć można, że liście goździkowatych, zamiast stać po dwa naprzeciw siebie, zbaczają nieco na jedną stronę łodygi, jak żeby rozbieg ich był w istocie mniejszym od  $\frac{1}{2}$  czyli  $\frac{4}{8}$  obwodu.

§ 167. Przejsście od ułożenia liści naprzemian, do ułożenia naprzeciw, nie jest rzadkiem. Napotykamy je niekiedy, np. u mirtu, wyżlinu, i t. d. Inne naprzeciwlistne rośliny posiadają także przejścia na kończynach młodych gałązek, jeśli takowe zbyt prędko rosną. Być więc może, iż różnica dwóch tych gromad liści, nie jest rzeczywiście tak ważną jakby się zdawało. Niemniej jednak położenie względne liści, jest w ogóle dosyć stałym u większej ilości gatunków, tak, że można je wziąć za piętno przy ich poznawaniu. Rozumię się, iż używać do tego należy połączeń niezbyt łatwo się zmieniających; tak np. opisujemy liście jako krzyżowe, naprzeciwległe, dwurzędowe, trójrzędowe, i t. d., i t. d. Niekiedy możnaby iść dalej, gdyż rozbieg  $\frac{2}{5}$  zamionowałby nam jeszcze dość wyraźnie pewne drzewa; lecz jak już powiedzieliśmy, rozbiegi wyrażone przez ułamki o wyrazach złożonych z liczb większych, przechodzą często w inne, na téjże samój roślinie. Łatwo pojąć jak dogodną byłaby znajomość tych praw, gdyby takowe były dostatecznie i na wielkiej ilości roślin zbadane. Gdybyśmy np. mieli przed sobą gałązki pokryte samymi liśćmi, albo nawet bezlistne, tylko z wyraźnemi bliźniami wskazującemi osadę liści, lub gdybyśmy chcieli oznaczyć wycisk jaki kopalny, moglibyśmy w prawach tych znaleźć pewną pomoc, w rozwiązaniu zadania zkaźdinał nieprzystępnego.

§ 168. Rośliny jednoliścienne, których pierwsze liście są naprzemianległe, zachowują i później toż samo ułożenie. Nie-wielka tylko ich ilość miéwa liście pozornie naprzeciwległe lub okółkowe; lecz i wtedy łatwo jest poznać, że takowe nie stoją dokładnie w jednéj wysokości.

U dwuliściennych, liście zachowują często położenie przeciwległe, które istniało już w liścieniach; lecz często także tracą je, a zmiana zachodzi, albo w pierwszych bezpośrednio liściach roztka, albo też zwolna. Niektórych rodzin wszystkie rośliny, mają bez wyjątku liście naprzeciw albo naprzemianległe, a niekiedy także przedstawiają inne podrzędne odmiany. Tak np. wszystkie wargowe mają liście osadzone krzyżowo, większa część lipowatych ma liście dwurzędowe, i t. d.

I u bezliściennych bywają liście naprzemian, albo naprzeciwległe. Niektóre paprocie drzewne mogłyby posłużyć za przykład ułożenia w okółki, może najbardziej prawidłowe w całym państwie roślinnym.

Wreszcie, trzy wielkie gromady roślin przedstawiają też same połączenia co do ułożenia liści w węzownię. Jednakże niektóre bywają w jednych rzadsze niż w drugich: tak np. rozbieg  $\frac{1}{3}$  nie istnieje wcale u dwuliściennych, u jednoliściennych zaś jest dosyć częstym.

§ 169. Mówiliśmy, że liście niezawsze bywają zupełne, owszem, że mogą nie posiadać niektórych swych części. Ponieważ blaszka mięwa zwykle największe wymiary, i bywa spolicie brana za cały liść, przeto jeśli takowa się nie rozwija, liście przybierają postać wcale odmienną i najczęściej nie noszą nawet wtedy tego nazwiska. Jednakże położenie ich boczne na łodydze, pozwala je rozpoznać; a odkrywając w sposobie uszykowania tych, tak zmienionych narzędzi, prawa przewodniczące ułożeniu względnemu liści, nie można pozostac w wątpliwości co do istotnego ich przyrodzenia. Tak np. u szparagu widząc małe łuski (fig. 111 f), osadzone na łodydze w węzownię, nie wahamy się wyrzec, że to są liście, przywiedzione tylko do części pochwowatęj. Kiedy tym sposobem zamiast liści istnieje tylko pochwa lub ogonek, albo raczej tylko krótkie przedłużenie wiązki mającej utworzyć nerw główny; małe te wyrostki przybierają najczęściej postać zgrubiałych łusk, lub cienkich błon, albo też zwężone są w nitki. Obaczymy później, że podobnie zachowują się często i w bliskości kwiatów.

## P A C Z K I .

§ 170. Punkt, z którego liść wyrasta, ma podwójną ważność w życiu rośliny, gdyż zwykle bezpośrednio nad nim, powstaje

*pączek* (gemma), [fig. 161, *ba, ba, ba*], w kącie zawar-  
 tym między łodygą a liściem, czyli w *pa-  
 sze* (axilla) liścia: zładto wyraz *kątowy*  
 (axillaris). Pączek jestto gałąź w pier-  
 wszym okresie swego życia, której części  
 boczne to jest liście, tylko co zaczynające  
 się rozwijać, są skupione na nadzwyczaj  
 krótkiej osi. Dlatego też porywnywno pą-  
 czek z zarodkiem, od którego jednak tém  
 się różni, że, zamiast być niezawisłym i wy-  
 żywić samego siebie, za pomocą jednego  
 lub dwóch mięsistych pierwszych liści czyli  
 liścieni, stanowi część rośliny już wykształ-  
 conej, która mu dostarcza pożywienia; tu-  
 dzież że pierwsze jego liście, przeznaczo-  
 ne do pełnienia innych usług, nie posiadają  
 wcale postaci liścieni. Dlatego niektórzy nazywają go *za-  
 rodkiem przytwierdzonym* (embryo fixus).

§ 171. Jest on początkowo małą kupką komórek, zоста-  
 jącą w związku z końcami promieni rdzennych, a która zrazu  
 ukryta wewnątrz, odpycha następnie korę, i ukazuje się na ze-  
 wnątrz. Później rzędy wewnętrzne komórek tej małej osi ustra-  
 jają się w cewki, a powierzchnia jej okrywa się małemi wyro-  
 stkami komórkowemi, które są pierwszym początkiem liści,  
 ukształcających się następnie, według praw poprzednio wyło-  
 żonych. Wiemy już także, iż gałąź powtarza niejako łodygę  
 w swym składzie i sposobie rozwijania się. Naczynia i włókna  
 jednej przechodzą w drugą; rdzeń tylko nie zachowuje tej je-  
 dnościągłości: cewa rdzeniowa gałęzi zamyka się i kończy w pun-  
 kcie z którego gałąź wyrasta, tak jak cewa rdzeniowa łodygi  
 kończyła się przy korzeniu.

§ 172. Pączek, przeznaczony do wydania liści, mających  
 nastąpić po tym, w którego kącie sam powstał, żyje dłużej od  
 tego liścia, i po jego opadnięciu lub zwiednięciu przy końcu ro-  
 ku, zostaje przy łodydze, w zawieszaniu niejako aż do pory,  
 która ożywiając roślinie, nada i jemu nowy popęd i pozwoli  
 rozwinąć się w gałąź. W ciepłych krajach, gdzie czas ów spo-

162. Wierzchołek gałęzi suchodrzewki czarnej (*Lonicera nigra*) w stanie  
 zimowania, to jest noszącej pączki po opadnięciu liści; jeden z pączków jest  
 wierzchołkowy *bt*, inne kątowe *ba, ba, ba*.



162.

czynku nie istnieje wcale, lub z przyczyny dość wysokiej temperatury nie jest niebezpiecznym dla młodego pączka, pierwsze liście tegoż, są zupełne i prawie takie same jak następne. Lecz w stronach, gdzie panuje mniej lub więcej ostra zima, której nie mogłyby się oprzeć narzędzia tak wężle jakimi są pierwsze, najzewnętrniejsze liście, służące w tym jakby kłębku, za okrywę innym; części te przedstawiają ważne odmiany pod względem postaci i utkania, które nietylko je same czynią wytrzymałymi, ale im nadto pozwalają ochraniać części wewnętrzne. Utkanie tych pierwszych liści, jest w takim razie od botaników tak zwane *łuskowate*, to jest, że narzędzia te są twarde i suche, tak jak np. okrywa ziarna melonu lub gruszki. Nadto, bywają one jeszcze przejęte istotami nierozpuszczalnemi w wodzie, i które są złemi przewodnikami ciepła, jak żywica (np. u niektórych topoli), innym razem bywają pokryte puszkami (np. u wielu wierzb).

Niekiedy liście te czyli łuski są tak wielkie, iż jedna druga z łatwością pokrywa. Częściej bywają krótsze od pączka, i wtedy ułożone są *dachówkowo* (*imbricatim*) w wielu rzędach, to jest tak, że zewnętrzne pokrywają spód wewnętrznych, mniej więcej jak dachówki (fig. 162, 163, 1). W takich razach byle tylko kilka łuski się znajdowało, a pączek był podłużnym, z pier-



163.

163. 1. Pączek łuskowaty klonu jaworowego (*Acer pseudo-platanus*). — r Gałązka. — p Sęczek (*pulvinus*), noszący u góry bliźnię c, która pozostaje po opadnięciu liścia, i na której widać 3 wiązki w liść przechodzące. — e Łuski dachówkowate pączka. — 2. Przecięcie tegoż samego pączka. — e Łuski. — f Liście.

wszego wejrzzenia łatwo jest rozpoznać porządek wężownicowy, podobnie jakśmy to widzieli w szyszkach sosny. Nazywamy pączki *łuskowatemi*, jeśli są w ten sposób zabezpieczone; *nagiemi* zaś, jeśli liście zewnętrzne nie różnią się bardzo od innych, jak np. u większej ilości drzew podzwrotnikowych. Niektóre z drzew naszych np. kruszyna (*Rhamnus frangula*), mają także pączki nagie, lecz to jest bardzo rzadki przypadek.

Podano rozmaite nazwy (*tegmenta, perulae*), dla liści zewnętrznych i zmienionych, które przeto są narzędziami ochronnymi. Linneusz nazywał je dowcipnie *hibernacula* (ozimki), to jest schronienie zimowe. Ogół takowych nazywa Decandolle pączkiem, resztę zaś oznacza imieniem młodego pędu (latorośli). Dla uniknięcia zbytnej mnogości wyrazów, nazywać je tu będziemy łuskami, ostrzegając jednak, że lubo postać ta jest najczęstszą, nie jest jednakże wyłączną.

§ 173. Liść obrócony w łuskę, bywa pozbawionym jednej lub dwóch swoich części, a zład rozmaite wyrazy, dla oznaczenia tych odmian. Tak pączki są *liściowate*, jeśli łuska składa się z samej tylko blaszki zmienionej, *ogonkowate*, jeśli też utworzona jest z rozszerzenia części niższej ogonka czyli z pochwy; *przylistkowate*, jeśli z tych utworów bocznych, to jest z przylistków; *odparte*, jeśli z ogonka i przylistków zarazem. Czasami rozpoznanie tych części jest łatwem i potwierdza często nasze domysły, pokazując przejścia stopniowe od łusk najwewnętrzniejszych do pierwszych istotnych liści; tak np. w rodzaju *Pavia*.

§ 174. Liście właściwe, skoro blaszka ich doszła w pączku pewnej wielkości, są zwykle rozmaicie poskładane, lub pozwijane na sobie samych, przez co się zastosowują do kształtu okrągłego pączków, i zajmują jak najmniej miejsca. Stan ten nazwano *przedlistnieniem* (*praefoliatio*, dawniej *vernatio*, czyli stan liści wiosenny). Każda z odmian przedlistnienia otrzymała osobną nazwę, którą wymienimy w nawiasie, po określeniu pojedynczych odmian. Uważając liście pojedynczo, jako niezawisłe jedne od drugich, ujrzymy, że mogą być: 1) albo poskładane wpół, a to już częścią wyższą na niższej, przez co podstawa zbliży się do wierzchołka (*liście załamane, fol. reclinata*); np. tulipan [fig. 164, 1]; już połową prawą na lewą, przy czem kończyny i nerw główny nie zostają ruszone (*l. zdwojone, fol. conduplicata*), np. dąb [fig. 164, 2]; albo poskła-

dane w  
dług g  
klon [  
zostaj  
nięte,  
tylko,  
maryn  
involu  
z góry  
circin

się łą  
załam  
że sam  
mu, ja  
dziec  
procin  
liść, a  
· Uwa  
z drug  
tylko z  
jąc się

164.  
dziane  
8-12. F  
czném,  
bnicze,  
grubiej.

dane wiele razy, na podobieństwo wachlarza, i to zwykle według główniejszych nerwów (*l. pozaginane, fol. plicata*), np. klon [fig. 163, f, i 164, 3]; 2) pozwijane, albo tak, że ich oś zostaje prostą, i to, już całe w trąbkę, na sobie samych (*l. zwinie, fol. convoluta*, np. morela [fig. 164, 4]; już brzegami tylko, raz na zewnątrz (*l. odwinie, fol. revoluta*); np. rozmaryn [fig. 164, 6], drugi raz na wewnątrz (*l. wwinie, fol. involuta*), np. siołek [fig. 164, 5]; albo też na osi swojej z góry na dół na podobieństwo pastorału (*l. ślimakowate, fol. circinnata*), np. paprotnica [fig. 164, 7]. Odmiany te mogą



164.

się łączyć jedne z drugimi, jak np. kiedy blaszka pozaginana załamuje się względem ogonka, albo być powtórzonemi na tymże samym liściu, kiedy nerwy powtórne zginają się ku głównemu, jak ten ostatni ku osi, na której liść jest osadzony. Widzieć to można często na liściach głęboko pociętych (np. u paproci), gdzie wycinki są ślimakowato zwinie, tak jak i cały liść, a nadewszystko na liściach prawdziwie złożonych.

Uważmy teraz liście tego samego pączka w stosunku jednych z drugimi, a obaczmy, że mogą być: 1) płaskie, lub z lekka tylko zgięte, i dotykać się wzajemnie brzegami nie pokrywając się wcale (*przedlistnienie łupinowate, fol. valvata*) [fig.

164. 1-7. Liście w stanie wiosennym, uważane oddzielnie. — 1 i 7. Widziane na przecięciu podłużnym. — 2, 3, 4, 5, 6. Na przecięciu poprzecznym. — 8-12. Połączenia wielu liści w jeden pączek, widziane na przecięciu poprzecznym, które pokazuje ułożenie ich względne, tudzież ich przedlistnienie osobnicze. Na tych i na poprzednich figurach, nerw środkowy jest narysowany grubiej, a oś nosząca liście, oznaczona kółkiem umieszczonem z boku.

164, 8], albo mogą pokrywać się w części tylko swęj długości (*przedl. dachówkowe, fol. imbricata*), a wtedy najczęściej także i brzegami, według kierunku węzownicy, który mają zachować później (*przedl. węzownicowate, vern. spiralis*) [fig. 164, 9]; 2) poskładane na sobie samych, a wtedy już dotykają się tylko brzegami przeciwnymi (fig. 164, 10), już powierzchniami przyległymi (*przedl. wedwójne, vern. induplicata*) [fig. 164, 11], już znowu liść zdwojony obejmuje inny (*l. okraczające, fol. equitantia*) [fig. 164, 12], już nakoniec obejmuje tylko połowę innego liścia zagiętego (*l. wpół-okraczające, fol. invicem equitantia s. obvoluta*) [fig. 164, 13]. Wszystkie te wyrażenia służą nie tylko wyłącznie dla liści w pączku, ale oznaczają podobne sposoby i stosunki złożenia lub zwinięcia wszystkich płaskich części rośliny, w jakimkolwiek narządzie i o jakiegokolwiek porze. Głównie jednak zastosowujemy je do części młodych, tak np. do pączka kwiatowego. Napotykamy je przeto niżej, i dlatego dobrze jest wrazić je sobie w pamięć.

#### UGAŁĘZIENIE.

§ 175. Wyłożywszy rzecz o pączkach, możemy teraz łatwo zrozumieć ugałęzienie rośliny, ponieważ takowe wynika z rozwinięcia pączków, przedłużających się w gałęzie, z których każda znowu nosić będzie pączki, dające gałęzie nowe i przygotowujące trzecie pokolenie, za którym nastąpi czwarte, piąte, i t. d. Jeśli łodygę nazwiemy osią pierwotną, możemy nazwać osiami powtórными gałęzie, które bezpośrednio z niej wychodzą; trzecimi, gałęzie wyrastające z powtórnych, i tak następnie. Zwykle nazywamy te dalsze przedziały *gałęziami* (*rami*), *gałązkami* (*ramuli*); a ponieważ często bywają bardzo liczne, przeto wyrazy te, niemające ścisłego znaczenia, określamy albo za pomocą przymiotników, albo innym jakim sposobem, aby dać poznać mniej więcej, do którego stopnia podziału należy gałąź o której mowa. Zdarza się też często, że wyrazom tym nadajemy wartość zupełnie względną, odnosząc się nie do łodygi, ale do osi, która od takowej jest mniej lub bardziej oddaloną. Tak np. co w zielnikach zowią gałęzią, na drzewie możnaby zaledwie nazwać małą gałązeczka.

§ 176. Rozumię się, że gdyby w kącie każdego liścia pączek rozwijał się w gałąź, położenie względne gałęzi byłoby takie same jak liści; przedstawiałoby ono stale i na większą stopę owe proste lub krzywe rzędy, któreśmy wyżej widzieli. U roślin zielnych, gdzie ilość liści i osi musi być daleko mniejszą, często większa część pączków się rozwija. Ulistnienie i ugałęzienie powtarzają się tu i wskazują wzajemnie z pewną dokładnością; jednakże bywają przypadki, że i tu już pewna ilość pączków kątowych nie rozwija się wcale. U roślin drzewnych jeszcze się to częściej zdarza, ponieważ dłuższe trwanie ich życia sprowadza zakwikłanie ugałęzienie.

Pierwszą zatem przyczyną, która zmienia uszykowanie gałęzi względem uszykowania liści, jest przytłumienie pewnej liczby pączków. Drugą, wcale przeciwną przyczyną, jest przydanie pewnej liczby innych, mogących się nie w zwykłych miejscach rozwijać. Uważmy z kolei te dwie przyczyny wraz z ich skutkami.

§ 177. Dotąd nie mówiliśmy o pączku, którego obecność jest bardziej jeszcze stałą, niż pączków kątowych: jestto pączek wierzchołkowy, przeznaczony do przedłużenia osi, na kończyźnie której sam pozostał (fig. 162, *bt*). Pierwszym takim był rostek w zarodku. Skoro ten dojdzie najwyższego stopnia rozwinięcia do jakiego jest zdolnym, skoro łodyga przybywszy do tego pierwszego kresu, przestaje rosnąć; na jej wierzchołku tworzy się pączek, który ją niejako wieńczy. Po pewnym przestanku, który w naszym klimacie odpowiada zimie, pączek zaczyna się rozwijać, poczem z kolei znów się zatrzymuje przygotowując inny, na rok następny. Łodyga więc składa się rzeczywiście z pewnej liczby gałęzi, ustawionych końcami na sobie; dlatego też u naszych drzew dwuliściennych, słoje drzewne zmniejszają się po jednym w miarę, jak ich od dołu do góry patrzymy; a gdyby można z zewnątrz rozpoznać pęd jednego roku, od pędu roku poprzedzającego, można, o ile wzrost rośliny nie był kiedy wstrzymanym, od zewnątrz zliczyć lata drzewa.

Są rośliny, u których ten tylko wierzchołkowy pączek się rozwija, i wtedy nie ma wcale gałęzi bocznych: łodyga jest pojedyncza. Jestto przypadek dość wprawdzie rzadki u dwuliściennych, lubo i te przedstawiają go niekiedy, jak sagowcowate lub jęczmienie (*Carica*), których pień wznosi się na-

kształt słupa uwiecznionego pękiem liści; za to u jednoliściennych jest bardzo zwyczajnym (fig. 114, 1); widzieliśmy, że te z nich, które wyrastają w drzewa, posiadają zwykle pień pojedynczy: dlatego też radzono dla dojścia ich wieku używać sposobu, o którym mówiliśmy dopiéro. Lecz chociaż w górnej części łodygi, znajdujemy ślady obrączkowate, oznaczające nam pędy po sobie następujące, takowe jednak oddawna są zafarte przy podstawie drzew starych. Zresztą nie wiemy jeszcze dokładnie, czyli w krajach ciepłych nieznaną zimy, tworzenie się pojedynczych obrączek odpowiada jednemu latu, lub jakimkolwiek jednostajnemu przeciągowi czasu.

§ 178. Weźmy teraz przypadek, w którym pączki kątowe rozwijają się w mniejszej lub większej liczbie, ale jednak nie wszystkie. Przyczyna, dla jakiej niektóre z nich nie rozwinięły się całkowicie, może być zmienną, miejscową tylko lub osobniczą. Ztąd od strony, z której roślina jest ścieśniona, pozbawiona światła, umieszczona w złej ziemi, lub wystawiona na jakiekolwiek inne szkodliwe wpływy, pączki płonieją, albo niedosyć rosną, albo wkrótce giną. Nie ma potrzeby zastanawiać się tu nad temi, czysto przypadkowemi wpływami, które mogą dziać w każdym kierunku, w każdej wysokości, stają się przyczyną tylu pozornych różnic między roślinami jednego i tegoż samego gatunku. Często jednakże pączki płoniejąc, zachowują w tém rzadką prawidłowość. Tak w jodłach liście bardzo liczne i ścieśnione, uszykowane są w węzownię, a jednak gałęzie ukazują się w okółkach przedzielonych od siebie znacznemi odstępami. To dlatego, że w węzownicy znajdujemy naprzemian długie rzędy liści bez pączków, a potém wiele pączków w kątach liści tuż po sobie następujących; skrety zaś węzownicy liściowej są zanadto do siebie zbliżone, aby można dostrzedz różnicy w wysokościach, w jakich się rozwinięły gałązki na pozór okółkowe. Z liści naprzeciwległych, często jeden tylko wydaje w kącie swym pączek; następnie w parze przylgłej pączek rozwija się w kącie liścia drugiej strony: tym sposobem przy liściach naprzeciwległych dwurzędowych, otrzymujemy gałązki dwurzędowe wprawdzie, ale naprzemianległe (np. u buzydganu, *Tribulus*); przy liściach ułożonych w pary ukośnie się krzyżujące, otrzymujemy gałązki osadzone w pojedynczą węzownię (u wielu goździkowatych). Nie rozbiérając szczegółowo różnych połączeń, jakie się mogą w przyrodzie znajdować, na-

mienimy tu tylko, że niekiedy w szeregu narzędzi po sobie następujących, niektóre z takowych zostające w pewnym stałym stosunku do innych, nie rozwijają się wcale, i że prawo to, które zresztą znajdziemy przy wszystkich częściach rośliny, wpływa szczególnie na ugałęzienie.


§ 179. Przypuśćmy teraz, że pączek wierzchołkowy płonie, boczne zaś rozwijają się; łodyga będzie w takim razie krótką lub prawie żadną, roślina rosnąc będzie częściami bocznymi, już to we wszystkich kierunkach, już szczególnie w niektórych tylko, jeśli płonność wywołana jest przez któregoś ze stałych wpływów, o jakich wspomnieliśmy dopiero.

Tu to właśnie należą pewne odmiany, zwykle odnoszone do łodygi, a które rzeczywiście zależą tylko od szczególnego ugałęzienia. W przypadkach o których mowa, łodyga utworzona przy wschodzeniu, przestaje rosnąć po jakimś czasie; a ponieważ nie przedłuża się następnie pączkiem wierzchołkowym, przeto jedna z gałęzi bocznych, zwykle wychodząca przy jej nasadzie, zastępuje ją i bierze na siebie wydawanie następnych utworów. Prócz tego łodyga nie zawsze poczyna się ponad ziemią, ale często zagłębia się w nią mniej więcej, a przeto i gałąź mająca ją zastąpić, może powstać pod lub ponad ziemią.


§ 180. W takim przypadku są rośliny, zwane pospolicie *trwałemi* (pl. perennes). W pierwszym roku ukazuje się łodyga, która podlega takim samym zmianom, jak łodyga roślin doroczych, i która także w końcu obumiera, lecz tylko w częściach nad ziemię wyniesionych. Pod ziemią zaś żyje korzeń i nasada łodygi, opatrzona jednym lub więcej pączków. Te ostatnie zagrzebane, nie zważają na zimę, ocucają się na wiosnę i rozwijają w tyleż łodyg. Pączki takie posiadają zwykle odrębną postać: ich oś gruba i mięsista przedłuża się znacznie zanim wyda liście, i nazywa się *wypustkiem* (turio). Przykłady przedstawiają piwonje, lub co bardziej jeszcze jest każdemu znanem, końce jadalne szparagów.

§ 181. Gałęzie podziemne zamiast pozostać w zawieszaniu niejako aż do następnego roku, a potem wyjść po nad ziemię, mogą rosnąć pod ziemią. Widzieliśmy już (§ 113), że w takich okolicznościach łodyga wydaje zwykle korzenie przybyszowe. To samo też zdarza się i w gałęziach, o których mówimy, i które wtedy, czołgając się poziomo lub ukośnie pod zie-

mią, okryte odnogami i niteczkami korzonkowemi, przybierają postać korzeni. W takim razie nazywają się *korzeniakami* (rhizoma). Jedne rosną wciąż pod ziemią, i wydają na powierzchni górnej lub po bokach pączki, które wyrastają pionowo, wychodzą na wierzch, gdzie się wykształcają i otwierają; drugie podnoszą się same i ukazują kończynę swoją, na której siedzi pączek; lecz zwykle wprzód jedna z podobnych im i z nich wyrastających gałęzi, zachowała położenie i bieg podziemny. Tym sposobem roślina może przebiec znaczną przestrzeń i dostać się na miejsce odległe od tego, w którym zaczęła żyć przy wscho-



zdeniu. Często, szereg blizn pozostających na powierzchni górnej korzeniaka, pokazuje następstwo pojedynczych pędów: tak np. (fig. 166, *c c*), u kokoryczki (*Convallaria polygonatum*).



ściwą jednoliściennym. Część podziemna łodygi wydaje tu pączek boczny, gruby i wewnątrz mięsisty, pokryty mniej więcej licznymi liśćmi. Zewnętrzniejsze z tych, a przeto osadzone niżej, posiadają tylko część pochwowatą, obróconą w łuskę, i mają takie samo znaczenie, jak narzędzia, któreśmy tuż nazwaliśmy jednoliściennym.

165. Część korzeniaka *r* sitowia błotnego (*Scirpus palustris*), znacznie powiększona. — *fe fe* Liście siedzące w korzeniaku, w postaci łusk. — *pa* Część powietrzna rośliny, jej gałęzie noszące liście lub kwiaty, które się ponad mul wznoszą. — *t* Równia ziemi przed korzeniakiem.

166. Kawałek korzeniaka *r* kokoryczki (*Convallaria polygonatum*). — *b* Pączek już rozwinięty w gałązkę na kończyńce korzeniaka. — *b'* Pączek mający się później rozwinąć. — *c c* Blizny wskazujące nasadę gałązek dawniejszych, które zwiędły i odpadły.

ozna  
okry  
szaf  
ny p  
cebr  
mi c  
otac.  
i ul  
wted  
(b. s  
waż  
są d  
się  
ścią  
prze  
tego  
W in  
zach  
tylko  
niew  
nabr  
wie  
sol  
daja  
zow  
iloś  
Jedr  
rych  
same  
rzys  
niej  
cone  
późn  
W  
jeden


16  
w 2.  
a nab  
Liście  
w ka

oznaczyli przy pączkach powietrznych. Raz, cienkie te pochwy okrywają cały spód łodygi (fig. 167, *e*), jak w hijacyntach, szafranach i cebuli ogrodowej (od której też, wszystkie rośliny posiadające tę odmianę łodygi, nazywają się pospolicie *cebulo-wemi*), u botaników cebule takie, zowią się *słojowate-mi* (*bulbus tunicatus*). Drugi raz zamiast powłók błoniastych otaczających cały pączek, znajdujemy wyrostki prostsze, liczne i ułożone dachówkowo (fig. 168, *e*) naokoło cebuli, która się wtedy nazywa *łuskową*

(*b. squamosus*), ponieważ wyrostki te podobne są do łusk, od których się tylko różnią mięśistością swoją. Lilja biała przedstawia nam dobry tego przykład (fig. 168). W innych nakoniec razach znajdujemy małą tylko ilość powłók, a ponieważ wtedy oś bardzo nabrzmiała, stanowi pra-

wie całą miąższość cebuli, przeto ta zowie się *miąższą* (*b. solidus*) (fig. 169). W kątach, tych tak przeobrażonych liści, dają się widzieć pączki powtórne, daleko mniejsze, które się zowią *cebulkami* (bulbuli) i których większa lub mniejsza ilość stoi, jak się zdaje, w pewnym stosunku z ilością liści. Jedne z tych cebulek mogą się rozwijać w cebuli, co w niektórych roślinach trwa przez wiele lat, inne mogą z kolei stać się same cebulkami; a że słabo tylko są zrosnięte z cebulą macierzystą, która nadto w końcu więdnije, przeto odłączają się od niej zwykle o pewnym czasie i wszystkie rośliny tak ukształcone, chociaż zrazu należą do jednego szczepu, tworzyć będą później tyleż odrębnych szczepów.

W cebulach miąższych, często na jednej stronie rozwija się jeden tylko pączek (fig. 169, *a''*), przybierający z kolei postać




167.

167. Cebula słojowata poru (*Allium porrum*), cała w 1, poczęta pionowo w 2. — *r* Korzonki. — *p* Piętka (*lecus*), część leżąca między korzonkami, a nabrzmieniem cebulowatém. — *e* Łuski, czyli liście dolne zmienione. — *f* Liście wyższe rozwinięte, które ucięto przy podstawie. — *b* Pączek leżący w kącie łuski i tworzący na tępnie nową cebulę.

tego, z którego sam powstał, i wydający znów w swoim czasie pęczek boczny ( $a''$ ), leżący zwykle na stronie przeciwnej, według praw naprzemian ułożenia liści i pęczków. Tym sposobem co rok powstaje jeden krzaczek, a jeśli drugi wyrasta po prawej stronie pierwszego, trzeci wyrośnie po lewej drugiego, czwarty po prawej trzeciego: tak, że znajdziemy roślinę



168.



169.

zawsze na tém samym miejscu, wahającą się tylko co rok, to w prawo, to w lewo. Można to wyraźnie widzieć na zimowicie.

W każdój cębuli znajduje się pod powłokami, jakby talerzyk (fig. 167, p. [piętka; *lecus*]), na którego dolnej powierzchni tworzą się korzenie wiązkowe. Część tę, z powodu położenia środkującego między liśćmi a korzeniami, uważają za łodygę, lecz ona może być raczej uważaną za spód gałęzi, ponieważ jest podstawą pęczka bocznego: tylko że pęczek jest tu odosobniony; stał on się jakby zrazem przyrodzonym macierzystej rośliny.

§ 183. Gałęzie boczne zastępując miejsce łodygi, która przestaje rozwijać się u wierzchołka, i spowodowując przez to

168. Cębulka łuskowa lilji białej. — r Korzenie. — e e Łuski. — t Łodyga ucięta.

169. Cębulka mięsza zimowitu (*Colchicum autumnale*). — r Korzenie. — f Liść. —  $a'$  Oś główna uwiedła przeszłoroczna —  $a''$  Oś powtórna czyli łodyga tegoroczna. —  $a'''$  Miejsce, na którym rozwine się łodyga roku następnego.

powiększanie się rośliny macierzystej w kierunku poziomym, mogą powstawać ponad ziemią. Wtedy nazywają się pospolicie *łodygami czołgającymi się*. Mniemane te łodygi najczęściej cienkie i giętkie, przebiegają pewną przestrzeń, albo weale nie wydając liści, albo tylko małą ich ilość i to w pewnych odstępach; czasami zaś powstaje na nich jeden tylko liść, (fig. 170 *a'' f*), w którego kącie mógłby się wprawdzie pączek rozwinąć w gałąź, lecz zwykle płonieje i kończy się tylko różyczką liści,



170.

skierowaną naturalnie do góry (fig. 170, *r*); wtedy ze spodu tej różyczki wychodzą korzenie i zagłębiają się w ziemię; z kątów zaś najniższych liści wyrastają nowe gałązki (*a''*), które się podobnie kończą. Każdy zna takową ustrojenność w poziomce (fig. 170), w jaskrze czołgającym się i tylu innych roślinach, którym dodano to imię gatunkowe.


Najczęściej pędy te boczne, zwykle *biczami* (flagella) nazywane, usychają i odłączają się, a wkorzenione szczepy, które niemi były połączone, stają się tyłuż osobnemi kępkami. Ogrodnicy naśladują tę sprawę przyrody *obłąkowaniem*, to jest pokrywając ziemię gałęziami, które wtedy tu i owdzie wypuszczają u góry liście, u dołu zaś korzenie, tworząc przez to osobne szczepy, zaczynające następnie rościć same przez się, i dające się w końcu całkowicie oddzielić.

U roślin mięsistych, których liście mogą czas niejaki wystarczyć na ich wyżywienie, nie potrzeba czekać z odłączeniem i przesadzeniem różyczki liści, powstałej na wypustku, aż dopóki się nie pokażą korzenie. Rodzaj ten wypustka nazywamy *przyplódkiem* (propagulum).

§ 184. Do przypadków poprzedzających, w których widziemy tak wielką dążność pączków i ich dalszych utworów, do

170. Część kępki poziomki.—*a'* Pierwsza oś, która wydała różyczkę liści; *r* z tych wyższe *r* zielone, niższe *f* w zawiązkach. Z kąta jednego z nich wychodzi druga oś *a''*, czyli bicz, noszący na środku liść w zawiązku, przy *f*, a na końcu różyczkę *r* podobną pierwszej, i z której wychodzi oś trzecia *a'''*.

stawania się niezależnymi od łodygi macierzystej i nawzajem od siebie samych, dodać należy odmianę pączka powietrznego, znaną pod nazwiskiem *cébuleczki* (*bulbillus*), która rzeczywiście wiele ma wspólnego z cebulą. Pączek taki nabywa utkania mięsistego, właściwego każdemu pojedynczemu narzędziu, lub ogółowi narzędzi, które mogą żyć czas niejaki kosztem własnej istoty. Jego łuski są nieliczne, grube i niekiedy całkowicie, niekiedy zaś w części tylko z sobą zrosnięte, tak, że tworzą małą jednostajną bryłkę, która słabo przytwierdzona do kąta liściowego, oddziela się następnie od niego, może w tym stanie przetrwać czas niejaki, a nakoniec puściwszy korzenie wydać roślinę podobną tej, z której sama powstała. Jestto prawdziwe przejście od pączka do zarodka. Lilja żółta (fig. 171) i żywiec cebulonośny (*Dentaria bulbifera*), przedstawiają tego przykłady.



171.

§ 185. We wszystkich powyższych przypadkach, gałąź przedstawiająca i zastępująca łodygę, zachowywała względem tejże położenie boczne. Lecz może się zdarzyć, że mocniejsza od samej łodygi, odpycha ją na stronę i wznosząc się natomiast sama przybiera jej położenie. Wtedy uszykowanie względne części, daje nam poznać prawdziwe ich przyrodzenie. Kiedy np. w winorośli (fig. 172), łodyga w pewnych odstępach wydaje po jednej stronie liść bez pączka kąтового (1), po drugiej zaś nie wydaje liścia, lecz tylko gałązeczkę zielną z odnóżkami, znaną pospolicie pod imieniem wąsa, wtedy przedłużenie łodygi umieszczane między liściem a wąsem, a przeto w kącie samego liścia, uważamy za utwór pączka kąтового, który rozwijając się bardzo silnie, odepchnął na drugą stronę kończynę wyczerpniętej łodygi, która płonieje w postaci wąsa. To samo daje się wyraźniej jeszcze widzieć w rączniku lub

171. Kawalek łodygi lilji żółtej (*Lilium bulbiferum*), z trzema liśćmi *f*, i trzema *cébuleczkami* kątowymi *b*.

(1) Czasem na wewnątrz tego liścia siedzi jeden lub dwa nawet pączki; lecz to cokolwiek z boku, a nie w samym kącie.

alkier  
mając  
neco  
iż ni  
że to  
towa.  
ślin, r  
lu inn  
wąsa,  
dzieli  
je się  
czek  
szcie  
także  
niałyc  
re naw  
w pun  
norosi


§ 1  
żaliśm  
ugale  
w sku  
widło  
cholk  
w sku  
jać si  
ści. V  
mi (e  
np. ki  
zrosni  
z pods  
dnie, w  
Zwa  
sposo

172.  
który o  
lązka a  
i noszą  
sem e

alkiermesie (*Phytolacca*), ponieważ tu, oś nowego rzędu, mająca przedłużać łodygę, nie idzie w linii prostej, ale zbacza nieco na stronę, tak, iż niepodobna wątpić, że to jest gałązka kątowna. U tych dwóch roślin, równie jak u wielu innych, na miejscu wąsa, któryśmy widzieli u winorośli, daje się spostrzedz pączek kwiatów; wreszcie isam ów wąż jest także pęczkiem spłoniących kwiatów, które nawet rozwijają się w punktach, gdzie winorośl kwitnie.

§ 186. Dotąd uważaliśmy sposób w jaki ugałęzienie zmienia się wskutek płonności prawidłowej albo nieprawidłowej, pewnej ilości pączków wierzchołkowych lub kątowych. Lecz ono może się także zmieniać w skutek przemieszczenia się pączków, jeśli te zamiast rozwijać się w kątach liści, wyrastają w pewnej odległości. Wtedy pączki lub gałązki nazywają się *zewnątrz-kątowymi* (extra-axillares). Może to nastąpić z wielu przyczyn, jak np. kiedy niektóre liście wcale spłonieją, albo kiedy łodyga zrośnie się czy to z dolną ich częścią, np. z ogonkiem, czy też z podstawą gałązki kątownej, tak, że przez to pączek przypadnie, w pierwszym razie pod—w drugim razie nad liściem.

Zważając te stosunki, wyjaśniono sobie pewne wyjątkowe sposoby ułożenia liści, np. u wielu psiankowatych. Nie bę-



172.


172. Kawalek gałązki winorośli. — *a'* Oś główna zakończona wąsem *v'*, który odepchnięty został w bok, i nosząca liść *f'*. Z jego kąta wychodzi gałązka *a''*, która pozornie przedłuża oś *a'*, zakończona podobnie wąsem *v''*, i nosząca liść *f''*. — *a'''* Gałązka pozostała w kącie liścia *f''*, zakończona wąsem *v'''*, i nosząca liść *f'''*, z którego kąta wychodzi oś *a''''*.

dziemy tu wchodzić w drobniejsze szczegóły tych wyjątków, które zresztą napotkamy jeszcze przy kwiatostanie.

§ 187. Jeżeli z jednej strony ugałęzienie zmieniane bywa w skutek płonności, to z drugiej może się także zmieniać, z przyczyny wcale przeciwniej, to jest przez pomnożenie się pączków.



173.



174.


Tak niekiedy, lubo w ogóle rzadko, znajdujemy pączki *przydatkowe*, oprócz tego, który zwykle istnieje w kącie liścia, a z kąd w takim razie wychodzi wiele gałęzi. Leżą one raz jedna nad drugą, i jest ich albo dwie tylko, albo u niektórych roślin więcej, np. u wiciokrzewów (*Lonicera*), i orzechu włoskiego, gdzie można widzieć w jednym rzędzie trzy, cztery lub pięć pączków, u tamtych coraz to mniejszych od dołu do góry (fig. 174), u tego zaś od góry do dołu (fig. 173); drugi raz umieszczone są na jednej poziomej linii, a wtedy zdaje się, jakby oprócz pączka odpowiadającego nasadzie ogonka, były z każdej strony inne, odpowiadające przylistkom. Tak u wierzb i topoli; a ztąd powstają owe małe gałązki, które wyrastają niekiedy dwie po dwie z gałęzi świeżo z tych drzew uciętych.

173. Kawalek gałązki *r* orzechu włoskiego, noszącej ogonek *p* liścia odciętego. W kącie jej kilka nad sobą leżących pączków *b*, tém większych im są wyższe.

174. Kawalek gałązki *r* wiciokrzewu sybirskiego (*Lonicera tatarica*) noszącej dwa liście naprzeciwległe, z których jeden ucięty, drugi *f* pozostawiony. W ich kątach rząd pączków nad sobą leżących *b*, tém więcej rozwiniętych, im są niższe.

§ 188. Częściej daleko liczba pączków pomnaża się temi, o których mówiliśmy już nieco, a które nazywają się *przybyszowemi* lub *ukrytemi*.

Zdaje się, iż wszystkie części komórkowe, przyległe powierzchni łądygi, mogą się ustrajać w pączki, skoro tylko stosowne wpływy pobudzą ich żywotność i nagromadzą potrzebnych do tego istot, przez mocniejszy napływ soków. Utwory te, lubo najczęstsze na łądydze, mogą się niekiedy ukazywać i na innych częściach, jakoto: na korzeniach wystawionych na powietrze, na liściach mniej lub więcej mięsistych, a to raz na ich brzegach (jak w płodnolisciu [*Bryophyllum calycinum*], wątliku błotnym [*Malaxis paludosa*, fig. 175]) i t. d., drugi raz na powierzchni nawet, jak w gatunku śniedka: *Ornithogalum thyrsoides* [fig. 176]. Można



175.



176.

szczerze wywołać utworzenie się pączków przybyszowych, przez podwiązanie lub zranienie, to bowiem spowodowuje przepływ soków i nabrzmienie części tym sposobem naruszonej.

Postać tych pączków musi oczywiście być inna jak zwyczajnych. Nie mają one ani tych wymiarów, ani owych zewnętrznych, w ochronne łuski zmienionych liści, ponieważ nie były wydane rokiem wprzód, a przeto nie potrzebowały osłony na

175. Koniec liścia *l* wątliku błotnego (*Malaxis paludosa*), którego cały brzeg okryty jest pączkami *b b*.

176. Część blaszki liścia *f* gatunku śniedka: *Ornithogalum thyrsoides*, na której pączki przybyszowe czyli cebuleczki *b b* mniej lub więcej rozwinięte.

zimę. Uistoczone w ciągu pełnego siły rośnienia, rozwijają się bezpośrednio i bez przerwy; zrazu ukazują się w postaci małych wyrostków, które przedłużwszy się mniej lub więcej pokrywają się liśćmi. Postać tych, które się ukazują niekiedy na samych liściach, podobna jest raczej do cebuleczek (fig. 176).

§ 189. Bywają i takie, które zamiast rozwijać się zewnątrz, jak się to zwykle dzieje, rosną zamknięte w miększu korowym. Dutrochet dał nam poznać te osobliwsze ciątka, które się znajdują szczególnie w korze niektórych drzew dwuliściennych (w buku, grabie, cedrze), w postaci bryłek niekształtnie kulistych, utkania drzewnego, a które w tym piérwiastkowym



177.

stanie można nazwać *gruzelkami* (noduli). W ich środku leży rdzeń otoczony zewsząd warstwą drzewną, przetrziętą promieniami rdzennymi, a na której co roku osadza się słoje nowy, zupełny (fig. 177). Takich słoików naliczono do 25. Bryłka owa drzewna, rozszerzając się we wszystkich kierunkach, styka się nakoniec czasami z układem drzewnym rośliny (z którym wprzódy łączyła się tylko przedłużeniem nitkowatém), zrasta się z nim i stanowi to, co w wielu razach zwą pospolicie guzem (*loupe*), który wtedy może oprócz swego własnego rośnienia, brać udział w rośnieniu łądygi. Jeśli zamiast jednego gruzelka, znajduje się ich wiele, odosobnionych wprawdzie u wierzchołka, lecz nadzwyczaj zbliżonych i zrosniętych w jedną bryłę od zewnątrz, pełną garbków, wtedy otrzymujemy narośl, dającą poszukiwane do wyrobów stolarskich słoje (*broussin*). Gruzulek można porównać z gałęzią, któraby żyła bez liści i pączków, a która przeto nie może rosnać wzdłuż, lecz grubiej zapewne kosztem żywności przerobionej, jakiej dostarcza kora okrywająca, a może także i drzewo, przez owo cieniutkie przedłużenie; gałąź ta przedstawia w swém jedyném międzywęzlu, na którym rzecz można, iż się ogranicza, zbiór słoików rocznych w takiej ilości, jaką posiada międzywęzle niższe, każdej spólcześnie powstałej gałęzi; rozwija się ona we wszystkich kierunkach

177. Przecięcie pionowe gruzolka *n*, zawartego w korze *e* cedru, na zewnątrz której tworzy wydatność.

i przyj  
zenia  
ani po  
od zew  
jąca  
wodzi

§ 1  
umiesz  
przyby  
błąd ut  
rzenie

cia się  
na poz  
zewnę  
w dwó  
łodygą  
znamio

tych pr  
pod zie  
utkania  
ści: se

chocia  
i wtedy  
tecznie  
odznac

kiedy  
coraz  
z odno

wypusz  
stają z  
po dro

Zada  
jakim p  
ziemna

stać się  
wierają  
szość.

rozwią  
stawiaj  
małemi

i przyjmuje postać kulistą zamiast walcowatej, tak co do ułożenia słoju, jak co do kierunku promieni, ponieważ niema ani podstawy, ani wierzchołka wyraźnego. Niekiedy jednakże, od zewnątrz wychodzi z niej gałązka, zwykle mało się rozwijająca i przestająca żyć wczesnie, lecz która dostatecznie dowodzi podobieństwa gruzełków z pączkami przybyszowemi.

§ 190. Jakkolwiek części należące do łodygi, to jest gałęzie umieszczone często pod ziemią i noszące wtedy korzonki przybyszowe, mogą być łatwo wzięte za korzenie, który to błąd utrzymywał się nawet długo; jakkolwiek na odwrót, korzenie opuszczając niekiedy ziemię, mogą, w skutek rozwinięcia się pączków przybyszowych, pokryć się liśćmi i stanowić na pozór część powietrzną łodygi: jednakże przy pomocy piętn zewnętrznych, któreśmy powyżej opisali, jesteśmy w stanie w dwóch powyższych przypadkach, dokładnie oznaczyć co jest łodygą, lub częścią od niej zawisłą, a co korzeniem. Łodygę znamionują zawsze pączki wyrastające z kątów liści ułożonych prawidłowo. Liście te wprawdzie na gałęziach rosnących, pod ziemią są bardzo zmienione co do wielkości, kształtu, utkania i barwy; jednem słowem w całej swój powierzchowności: sąto najczęściej łuski, lub błony krótkie i brunatne; lecz chociażby nawet prawie nie dawały się spostrzedz, to jeszcze i wtedy ułożenie prawidłowe pączków i ich przyrodzenie, dostatecznie okazują, że to co widzimy nie jest korzeniem, który odznacza się właśnie nieobecnością pączków. Tym sposobem kiedy roślina w pewnych odległościach, wydaje z pod ziemi coraz nowe szczepy, można poznać czyli takowe wyrastają z odnóg jej korzeni, które rosną poziomo, i od czasu do czasu wypuszczają na wierzch pączki przybyszowe, czy też wyrastają z podziemnych łodyg, podobnie rosnących i wydających po drodze podobne pączki.

Zadanie staje się niekiedy trudnijszém, z przyczyny zmian, jakim pod względem postaci i przyrodzenia ulega gałąź podziemna, pod wpływem środka w którym żyje: może bowiem stać się krótką, grubą i mięsistą, dla mnóstwa komórek zawierających skrobią, a które stanowią prawie całą jej miąższość. Jednakże i wtedy nawet, za pomocą tych samych piętn rozwiązanie jest możliwém. Przykład, wszystkim znajomy, przedstawiają ziemniaki (fig. 178, T). Powierzchnia ich jest pokryta małemi wydatnościami, które się zowią oczkami (*b*), a które,

zrazu ukryte w kątach małych łuszczynek, wkrótce odpadających, ułożone są z pewną prawidłowością, najczęściej w węzłownicę. Oczka rozwijają się w gałęzie, jeśli główka umieszczoną zostanie w stosownej wilgoci, i będą zielenić przy



178.

przystępie światła. Ztąd przeto wnosimy, że to są prawdziwe pączki, a ziemniak gałęzią. Wniosek ten na pozór dość dziwny, łatwo się daje sprawdzić codziennem postępowaniem ogrodników, którzy okopując roślinę, to jest pokrywając ziemią część jej niższą, pomnażają ilość główek przez obrócenie pączków zagrzebanych w ziemniaki. W latach dżdżystych i pochmurnych przeobrażenie to odbywa się samo z siebie i stopniowo, ponad ziemią nawet, gałązki kątowe skracając się grubiejają i okrągłejają, a tym sposobem można otrzymać wszystkie pośrednie stopnie między gałęzią a główką. Główki georginy są na pozór zupełnie podobne ziemniakom, lecz nie posiadają ani łusk, ani oczek; są to więc istotnie korzenie zgrubiałe.

§ 191. Rozbieraliśmy dotąd różne rodzaje ugałęzienia i wdziteliśmy w ułożeniu względnem gałązek, powtarzające się ułożenie liści, jeśli rozwinęło się tyleż pączków kątowych, lecz częściej daleko ugałęzienie zmienia się, bądźto w skutek płonności, albo pewnej liczby pączków kątowych, albo pączka wierzchołkowego, bądź też przeciwnie w skutek ich przemieszczenia się i pomnożenia, do czego głównie przyczyniają się pączki przybyszowe. Mamy więc znaczną ilość połączeń możliwych, które muszą postawie roślin nadawać wielką różnorodność. Jasną jest rzeczą, iż część podziemna rozgałęzienia wpływa tylko pośrednio na tę zewnętrzną postawę; że ztąd otrzymujemy wprawdzie większą lub mniejszą ilość szczepów

178. Niższa część kepki ziemniaka. — *pa* Część powietrzna, czyli łodygi opatrzone liśćmi — *t* Część podziemna czyli główki. — Jedna z tych nieco większa, narysowana przy *T*, na której widać oczka czyli pączki *b*, ukryte jeszcze pod liśćmi mającemi kształt łusk regularnie ułożonych. — *ss* Równia ziemi.

podob  
się by  
że roz  
kie sa  
nastor  
§ 1  
tylko  
są z so  
się w k  
znaczn  
czyli e  
(*ma*),  
zupeln  
jakeśn  
rzy oz  
*corm*  
cia si  
opadni  
Uważa  
stać u  
niższe  
nie o  
się zu  
dać p  
dno je  
bie. R  
uważ  
wpływ  
§ 1  
z przy  
mia lu  
ga, z k  
nek; z  
(*multi*  
wyras  
niami  
i robia  
Nazyw  
*culi*).  
dobne

podobnych sobie i zależących od pierwotnego, lecz zdających się być oddzielnymi, a nawet często rzeczywiście oddzielnych; że rozwijanie się pączków podziemnych, daje od zewnątrz takie same wypadki, jakieby sprowadziło wejście pewnej liczby nasion, rozsianych z tej samej rośliny.

§ 192. Pomińmy więc te ostatnie przypadki, a zajmijmy się tylko takimi, w których gałązki tej samej rośliny, widocznie są z sobą w związku. Łodyga może się utrzymywać sama przez się w kierunku mniej więcej pionowym. Jeśli dochodzi dość znacznych wymiarów, rozróżniamy w niej: *pień* (*truncus*), czyli część niższą огоłoconą z liści; *szczyt* czyli *koronę* (*cyma*), część wyższą pokrytą liśćmi. Nagość pnia albo jest zupełną, i powstaje z płonności wszystkich pączków kątowych, jakieśmy to widzieli np. u palm, których pień, radzą niektórzy oznaczyć osobnym wyrazem *trzon* lub *kłodzina* (*stipes*, *cormus*); albo jest tylko częściową niepełnego rozwinięcia się pączków dolnych, a częściej jeszcze z przyczyny opadnięcia wczesniej lub później, gałęzi z nich powstałych. Uważać należy, że większa część drzew naszych winna tę postać usiłowaniu człowieka, który wczesnie obcina gałęzie niższe; niekiedy zaś przeciwnie, gałęzie korony bywają kształtnie obcinane, tak, że przyrodzona postawa drzewa zmienia się zupełnie. Wiązy przydrożne i wierzby nasze, mogą nam dać przykłady zmian wywołanych podobnym obcinaniem: trudno jest rozpoznać w nich postać wrodzoną wiązowi i wierzbie. Rozumię się, że tu mówiąc o postaci zewnętrznej roślin, uważać je tylko będziemy w stanie przyrodzonym, a nie pod wpływem noża ogrodniczego lub siekiery.

§ 193. Czasami roślina zdaje się posiadać wiele łodyg z przyczyny, że dolne jej gałęzie, wyrastające w równi z ziemią lub zaledwie cokolwiek wyżej, rozwinęły się tyle co łodyga, z której biorą początek i wzięły prawie tenże sam kierunek; ztąd też mówimy wtedy, że roślina jest *wielolodygową* (*multicaulis*). Sztuka korzysta często z tych gałęzi bocznych wyrastających równo z ziemią, a przeto opatrzonych korzeniami przybyszowemi, odłączając je, skoro się tylko ukażą i robiąc z nich tyleż osobników, przez zasadzenie oddzielne. Nazywają się one wtedy *latoroślami* lub *odziemkami* (*surculi*). Ponieważ każda z tych łodyg może z kolei wydać podobne sobie, nie oddzielając się od głównego szczepu, do któ-

rego należy; łatwo przeto pojąć, jak daleko mogą się wszystkie razem rozszerzyć. Zdaje się, że taki był początek kilku sławnych pniów, jak np. owego kasztanu na Etnie, zwanego *drzewem stu koni*, ponieważ wydrążenie jego może ich tyle w sobie pomieścić. Zwiedzając sąsiednie lasy, można spostrzedz, że tam jest zwyczajem obcinać równo z ziemią stare zrąbane kasztany, po czém wkrótce spód pnia pozostały w ziemi wraz z korzeniami, wypuszcza wokoło nowe pędy, które mogą się spleść, powszczepiać niejako jedne w drugie, i z których wiele, wyrastając znowu w wielkie drzewa, może kiedyś ogółem swoim, utworzy po upływie wieków, drzewa podobne kasztanowi stu koni. Postać tego ostatniego wraz z wydrążeniami pnia, które dają przystęp do ogromnej pustej przestrzeni, zajmującej jego środek, zdają się wskazywać ten sposób powstania. Podobne postaci wielu największych drzew znanych, mogłyby dozwalać podobnych wniosków, lecz tym sposobem, byłyby to raczej korony zaczynające się tuż przy ziemi, nie zaś pnie prawdziwe.

§ 194. Wogóle podług teorii, grubość i wysokość pnia powinny stać w prostym stosunku z wiekiem i mogłyby posłużyć do obliczenia tegoż, we wszystkich drzewach, o których wiemy mniej więcej o ile się zwiększają w różnych swych wymiarach. Znana jest znaczna liczba drzew nadzwyczajnej wielkości, których początek sięga wielu wieków, albo nawet po za wszelkie podania. Sąto najczęściej drzewa dwuliścienne, pomiędzy niemi są lipy, gatunki klonu, kasztany, cisy; na wschodzie jawory, figi i cedry; pod zwrotnikami adansonje i wiele innych należących podobnie do familji serecznikowatych (*Bombacae*); ale i drzewa jednoliścienne odznaczają się między niemi: np. smokiew (*Dracaena*), na wyspach Kanaryjskich. Obwody ich różnią się oczywiście podług osobników i podług gatunków: przytaczają niektóre, wynoszące około 30 metrów, mnóstwo innych wynoszących połowę lub trzecią część tego; lecz nie zatrzymujemy się tu nad temi wyjątkowemi olbrzymiami.

§ 195. Pomiedzy roślinami drzewnemi zwyczajnego wzrostu, rozróżniono podług stopni do jakich tenże dochodzi, różne gromady, które też różnie ponazywano i poznaczano: tak nazywamy *drzewem* (*arbor*) rośliny takowe, których wzrost przewyższa o wielekroć wzrost człowieka, zachowując niekiedy imię zdrobniałe *drzewka* (*arbuscula*), dla przewyż-

szających go nie więcej jak pięć razy; *krzewem* (*frutex*) jeśli nie dosięga trzech razy tego wzrostu i jeśli się od dołu rozgałęzia, *krzewiakami* (*fruticuli*) zaś oznaczamy mniejsze jeszcze; *podkrzewem* (*suffrutex*) rośliny drzewne nieprzechodzące długości ramienia. Jeśli krzew jest niski i bardzo u spodu gałęzisty, miannjemy go *krzakiem* (*dumus, dumetum*). Przymiotniki *drzewiasty* (*arborescens*), *krzewiasty* (*fruticosus v. fruticosus*), *podkrzewiasty* (*suffruticosus*), *krzakowaty* (*dumetosus*), utworzone są z tych rozmaitych nazwisk, i nie potrzebują objaśnienia.

§ 196. W innych razach łodyga nie trzyma się o swojej mocy i potrzebuje wesprzeć się na innych ciałach: jeśli się kładzie na ziemi, nazywamy ją *leżącą* (*procumbens*); jeśli zaś na innym wzniesionym przedmiocie, *pnącą się* (*scaudens*). Pnąć się, raz zachowuje mniej więcej kierunek prosty, jak np. u bluszczu, który na każdym punkcie zetknięcia wydaje małe korzonkowate wyrostki, przytwierdzające łodygę do powierzchni, na której się wspiera; drugi raz okręca się około swęj podpory i przybiera nazwę *wijącą się* (*volubilis*), tworząc często węzłownicę kształtną, skierowaną albo w prawo (*dextrorsum*), jak u chmielu, albo w lewo (*sinistrorsum*) jak u powoju, albo częścią w lewo, częścią w prawo i przerywaną, lub miejscami niekształtną. W klimatach zimnych lub umiarkowanych, większa część pnących się roślin jest zielna, lubo zdarzają się i drzewne, które nawet mogą dochodzić dość znacznych wymiarów, jak np. przewiercień, powojnik, a osobliwie winorośl: wtedy gałęzie ich zowią *wiciami* (*sarmenta*). Mają one podobieństwo z pnąciami, które obficie rosną w krajach podzwrotnikowych, i o których już mieliśmy sposobność mówić (§ 85). Raz są zwinięte w węzłownicę około pniów najwyższych, drugi raz z wysokości téj spadają w prostęj linii ku ziemi, lub przeskakują z gałęzi na gałęź, z drzewa na drzewo, wiążąc je z sobą, lub tłumiąc niekiedy całkowicie. W tym nieprawidłowym biegu, którego niepodobna ściśle opisać, przebywają niekiedy dość znaczne przestrzenie, nie wydawszy liści ni gałęzi; podróżnicy nie mogli często dostrzedz liści, ani kwiatów należących do tych łodyg dziwacznych, które ich wokoło otaczały.

§ 197. Oprócz stosunków któremi zajmowaliśmy się dotąd, ugałęzienie wywiera inny jeszcze wpływ na postawę roślin, a to przez rozwijanie się pewnej liczby pączków, ułożonych

według pewnego porządku. Mamyż objaśniać w jaki sposób kierunek, ukanie, długość względna gałęzi i gałązek, zmieniają zewnętrzną postać rośliny? Gałęzie wyrastają z łodygi, a gałązki z gałęzi, pod kątem albo bardzo ostrym, albo prostym, najczęściej zaś nieco rozwartym; w pierwszym razie są *wzniesione* (erecti), w drugim *odstające* (patentes), i tworzą przeto w obu razach korony wcale różne, jak np. u cyprysu, lub topoli włoskiej, a cedru lub dębu. U tak zwanych drzew płaczących, gałęzie biorą kierunek przeciwny zwyczajnemu, zwieszając się ku ziemi, czyto że długie i słabe, gną się pod własnym ciężarem jak u wierzy płaczącej (*rami penduli*), czy też że chociaż dość wyprężone, zwracają się jednakże wspak od samej nasady (*r. retroversi*), jak u jesionu i różnanezniku (*Sophora*) płaczącego. Gałęzie odstające, wyrastając niekiedy tuż przy korzeniu z łodygi, która się nie wznosi pionowo, czołgają się, pokrywając ziemię gałęziami swemi jakby darnią. Można korzystać z takowego rozkładu, szczepiąc gatunek posiadający podobną właściwość, na gatunku pokrewnym o łodydze wysokości, np. nieszpulkę równowązką (*Mespilus linearis*) na głogu pospolitym (*Crataegus oxyacantha*). Pierwsza wypuszczając gałęzie z wierzchołka drugiego, rozkłada się w powietrzu tak, jakby się rozkładała na ziemi, tworząc przez to gęsty i kształtny parasol; w jednej z alei ogrodu botanicznego w Paryżu, można tego widzieć przykłady. Przypomnimy jeszcze gatunek nieszpuki: *Cotoneaster buxifolia*, który ma to w sobie szczególne, że rosnąc na pochyłości, nie rozszerza się we wszystkich kierunkach, ale zbiega z góry na dół.

Długość względna gałęzi, musi także wywierać znaczny wpływ na postawę roślin. Jeśli najniższe z nich, a zarazem najstarsze, przedłużają się ciągle, to wyższe będą coraz krótsze; im się bardziej zbliżają do wierzchołka, a ogół gałęzi będzie miał postać stożka lub ostrosłupa (np. jodły); jeśli środkowe prześięgną we wzroście dolne, korona będzie kulistą lub jajowatą (np. kasztan gorzki); jeśli najwyższe najbardziej się rozwiną, otrzymamy kształt parasola (sosna włoska) [*Pinus pinea*]. Wymieniliśmy tu tylko ostateczności, między niemi znajduje się mnóstwo postaci pośrednich.

§ 198. Zbierzmy w kilku wierszach to, cośmy powyżej powiedzieli: właściwą łodygą nazwalimy kłace roślin dwuli-

ścienn  
rośl  
zwyk  
głębi  
dla p  
pochy  
ża się  
chołk  
zatrzy  
go z  
rosną  
wtrón  
tym s  
sam p  
wet c.  
tnim r  
stapio  
Dłateg  
albo p

U r  
wdzi  
kieg  
zieln  
z ży  
pieni

U  
we sa  
przyk  
dzi u  
ścięj

W  
ścienn  
jeśli i  
piéro  
wie p  
waty  
ku, c  
podw  
jenia.

ściennych, powstające w skutek wzejścia, z rozwijającego się rostką, to jest części osi pierwotnej, która się zawsze wznosić zwykła pionowo, wstecz drugiej części kielka, który się zagłębia w ziemię. Kierunek ten pionowy może się zmieniać tylko dla przeszkód mechanicznych, lub ze słabości łodygi, która pochyla się w dół dla własnego ciężaru. Łodyga raz przedłuża się ciągle w tym samym kierunku, za pomocą pączków wierzchołkowych, które się kolejno uistaczają i rozwijają; drugi raz zatrzymuje się prędzej lub później z przyczyny płonności jednego z tych pączków: a jeśli pomimo tego roślina nie przestaje rosnać, to tylko pączkami bocznymi, a tém samém osiami powtórnymi, które zastępują miejsce pierwotnej. Os podstawiona tym sposobem na miejsce głównej, może zachować albo ten sam pionowy, albo niekiedy inny, więcej ukośny kierunek, a nawet czasami poziomy czyto nad, czy pod ziemią: w tym ostatnim razie, prawdziwa łodyga wczesnie rosnać przestaje i zastąpioną bywa przez pączek umieszczony przy jój podstawie. Dlatego też uważaliśmy łodygi tak nazwane czołgające się, albo podziemne, za osobne tylko rodzaje ugałęzienia.

U roślin dwuliściennych napotykamy najwięcej łodyg prawdziwych, dochodzących u drzew całego rozwinięcia, do jakiego są zdolne, zwykle obficie rozgałęzionych; u roślin zaś zielnych, łodyga wstrzymuje się po pierwszym wysileniu, wraz z życiem osobnika. Rośliny trwałe dają nam przykłady zastąpienia łodygi głównej przez osi boczne, czasami równoległe.

U jednoliściennych szczególniej trwałych, zastąpienia takowe są bardzo częste: u nichto znajdujemy prawie wszystkie przykłady cebul i korzeniaków. Jeśli łodyga właściwa dochodzi u nich znacznego stopnia rozwinięcia wzdłuż, to najczęściej rozgałęzia się przytém.

W przeglądzie tym nie zwróciliśmy wcale uwagi na bezliścienne, których zarodnik nie posiada rostką; gdyż tu łodyga, jeśli istnieje, to nie rozwija się w skutek wschodzenia, ale dopiero później. W nich to tylko można przyjąć łodygi prawdziwie podziemne, jak np. u paproci zielnych i u zeczwórnikowatych. Jeśli łodyga rozgałęzia się w jakimkolwiek kierunku, czyto w poziomym, czy w pionowym, dzieje się to przez podwójny pączek wierzchołkowy, a przeto w skutek rozdwojenia.

## KWIATOSTAN.

§ 199. Łodyga, lub jęj rozgałęzienia mniej więcej liczne, noszą na swych kończynach kwiaty. Każdy kwiat można porównać z różyczką liści, a tém samém z pączkiem. Jego listki różnią się mniej więcej od tych, któreśmy dotąd badali, co do postaci, barwy i niektórych stosunków budowy; nadto różnią się jeszcze tém, że w kątach swych nie wydają nigdy nowych pączków; ten więc pączek, który stanowi kwiat, jest istotnie wierzchołkowym, jest kresem rozgałęzienia. *Kwiatostanem* (inflorescentia) nazywamy sposób ułożenia kwiatów na gałązkach;



179.

179. Kępka jaskru główkowego (*Ranunculus bulbosus*). Oś jego *a'* przy podstawie cebulowato rozszerzona *b*, z kąd u dołu wyrastają korzenie, u góry liście korzeniowe; oś kończy się kwiatem wierzchołkowym, otworzonym *f''*. Ze środka jęj wychodzi liść, w którego kącie poczyna się oś powtórna *a''*, zakończona kwiatem *f'''* nieco młodszym od *f''*. — *a'''* nosi liść i oś trzecią zakończoną pączkiem *f''''*; zaś na *a'''* widać siedzący czwarty liść, ledwie że rozwinięty, w którego kącie siedzi inny pączek daleko jeszcze młodszy, i którego oś nie zaczęła się jeszcze przedłużać.

dlatego zajmujemy się nim zaraz po badaniu ugałęzienia, które tym sposobem uzupełniamy, ponieważ on jest rzeczywiście końcem tego ostatniego. W istocie, roślenie gałęzi opatrzonych liśćmi, musiałoby trwać ciągle, skutkiem wydawania nowych pączków, gdyby go śmierć, płonność lub obca jaka przyczyna nie wstrzymała. Roślenie gałęzi noszącej kwiat na swym wierzchołku, zatrzymuje się oczywiście w inny znowu sposób, na tym pączku wierzchołkowym, niewydającym wcale dalszych pączków.

§ 200. Kwiaty rozwijają się czasami pojedynczo (fig. 179, *f' f'' f'''*), a to już bezpośrednio na końcu łodygi czyli osi głównej *a'*; już na końcu osi powtórnej *a''*,

trzeciej  $a''$ , lub nawet dalszego rzędu  $a'''$ . Liście pod kwiatem osadzone, albo zachowują swe przyrodzenie, albo też niekiedy zaczynają się odmieniać co do postaci i barwy, nie wydając w kątach swych ani liściowego, ani kwiatowego pączka. We wszystkich tych przypadkach, mówimy, że kwiaty są *samotne* (flores solitarii).

§ 201. Lecz najczęściej z kątów liści odmienionych wychodzą gałązki, czyto nagie, czyli pokryte liśćmi podobnie odmienionemi, ale w wyższym stopniu i kończące się kwiatami: rozgałęzienie to, może się powtarzać większą lub mniejszą ilość razy, przez co otrzymujemy skupienia kwiatów, poprzepłatanymi liśćmi zmienionemi; skupienia, które się dostatecznie różnią od wszelkiej części rośliny noszącej prawdziwe liście, i które też nazywamy *kwiatostanem*. Wyraz ten przeto ma dwa znaczenia, w których go niżej używać możemy: widzieliśmy bowiem, że raz oznacza sposób ułożenia kwiatów, drugi raz ogół kwiatów niepoprzepłatanych liśćmi właściwemi.

§ 202. W kwiatostanie, różne części przybierają ze zmianą postaci nowe nazwiska: liście zmienione czyli *kwiatowe*, nazywamy *przykwiatkami* (bractea) [fig. 183 b b b]; gałązki opatrzone kwiatami tylko i przykwiatkami, zowią się *szypułkami* (pedunculi) [ $a'$   $a''$ ]. Gdzie rozgałęzienie jest wielokrotnem, nazywamy ostatnie, bezpośrednio pojedyncze kwiaty noszące gałązki *szypułeczkami* (pedicelli) [ $a'''$ ,  $a''''$ ]. Często ostatnie przykwiatki nie posiadają w kątach swych gałązek, a z drugiej strony można znaleźć szypułeczki noszące pod kwiatem wiele małych przykwiatków, które oznaczamy imieniem zdrobniaków *przykwiateczków* (bracteolae). Ponieważ przyrodzenie tychże jest takie same jak innych, i ponieważ w ich kątach dają się także niekiedy widzieć kwiaty, tak, że przeto szypułeczki nosząc znowu na sobie wiele kwiatów, przestają zasługiwać na tę nazwę, przeto też lepiej będzie używać takowej dla ostatniego międzywęzła szypułki, a wtedy szypułeczka będzie się odznaczać nie tylko tępem, że nosi na końcu kwiat, ale nadto nieobecnością wszelkich przykwiatków.

§ 203. Opisując kwiatostan jakikolwiek, potrzeba najprzód oznaczyć stosunki, w jakich zostaje z resztą rośliny i z właściwymi liśćmi: może bowiem albo wychodzić z kątów tych ostatnich, albo też kończyć gałązkę; podług tego będzie *kątowym* lub *wierzchołkowym*, położonym wyżej lub niżej na roślinie;

oddzielającym się od części ulistnionej w większej lub mniejszej rozległości, i t. d., i t. d. Następnie trzeba go uważać w niezawisłości od reszty rośliny i co do stosunku jednych jego części względem drugich. Biorąc go tym sposobem za całość oddzielną, nazwiemy osią główną, szypułką wspólną, którą niektórzy nazywają *osadką* (*rachis*), a z której wszystkie inne wychodzą. Następne szypułki oznaczymy imieniem osi powtórnych, trzecich, i t. d., podług porządku w jakim się ukazują. Po większej części odmiany, jakie nam przedstawia rozgałęzienie osi noszących liście, znajdują się i przy osiach kwiatonowych, z tą jednakże różnicą, że w pierwszych każda oś przedłuża się ciągle, w skutek powstawania pączków wierzchołkowych, i zatrzymuje się tylko przez przytłumienie takowych; w drugich zaś przeciwnie, przedłużenie zostaje wstrzymanem w skutek utworzenia się kwiatu, którego jeśli nie będzie, oś należy oczywiście do rzędu pierwszych.

§ 204. Oś przeto główna kwiatostanu może: 1) kończyć się kwiatem samotnym; wtedy zatrzymuje się na tym stopniu, i kwiatostan nie może się dalej rozciągać, chyba osiami powtórными, które z kolei wstrzymane zostają także kwiatami wierzchołkowymi, potem osiami trzecimi, i tak następnie; 2) nie być zatrzymaną w swém przedłużaniu się, w skutek wydania kwiatów, które będą tylko kończyć albo osi powtórnych, albo trzecie, i t. d.


Ztąd dwa wielkie działy kwiatostanów: *określone* czyli *skończone* i *nieokreślone* czyli *nieskończone*; pierwsze tam gdzie oś główna bezpośrednio zakończona jest kwiatem; drugie tam gdzie takowa nosi pośrednio tylko kwiaty, tojest na końcach osi dalszego rzędu.

Mamy tu więc te same dwie wielkie odmiany, któreśmy już widzieli przy rozgałęzieniu łodygi; zwracać też następnie będziemy uwagę na podobieństwo rozgałęzień powtórnych, które i tu zależą od rozmaitej ilości kolejnych podziałów osi, zanim takowa się skończy, od długości względnej osi różnego rzędu, od prawidłowego płonienia niektórych z nich, i t. d., i t. d.

Uwagi te, któreśmy po większej części winni Röper'owi, dozwoliły wprowadzić nieco większą dokładność w określania kwiatostanów, wprzódy bardzo często niepewne i pełne zamieszania. Zatrzymując nazwiska dawniej przyjęte i usiłując ile możności zachować dla nich dawne znaczenie, musiano jednak

takow  
szem  
uwa

§  
Os  
mi og  
praw



180  
ścia f  
główn  
tych  
winie  
najwy  
18  
osadk  
mi i  
z któr  
z wiel  
sze, n  
są ni

takowe nieco zmienić, dla uczynienia go stalszém i dokładniejszém. Przystąpmy tedy do określenia tych nazwisk, biorąc pod uwagę kolejno oba, wyżej wymienione działy kwiatostanów.

## KWIATOSTANY NIESKOŃCZONE.

§ 205. Oś główna przedłużona nie kończy się kwiatem.

Osi powtórne mogą być zakończone kwiatami, a wtedy nie-mi ogranicza się kwiatostan. Jeśli w takim razie wszystkie są prawie jednej długości, otrzymujemy *grono* (racemus) [fig. 180].



180.



181.

180. Grono kwaśnicy (*Berberis vulgaris*). Widać jak wychodzi z kąta liścia *f* zmienionego w koleć i posiadającego jeszcze oba przylistki *s*. — *a'* Oś główna, z której wychodzą małe przykwiatki *b* naprzemianległe, a kątów tychże, osi powtórne *a''* zakończone kwiatami. Widać także stopniowe rozwinięcie się kwiatów od spodu ku górze; niższe noszą już zawiązki owocu, najwyższe są jeszcze w pączkach, pośrednie otworzone.

181. Kiść gatunku szpilecznicy (*Jucca gloriosa*). — *a'* Oś główna czyli osadka. — *a''* Osi powtórne. — *a'''* Osi trzeciego rzędu, zakończone kwiatami i noszące nazwę szypuleczek. — *b b b b* Przykwiatki różnego stopnia, z których kątów wychodzą owe osi. — Widać, iż kwiatostan ten składa się z wielu gron, na wspólnej osi *a*, które tém są więcej rozwinięte i wcześniej-sze, im niżej przypadają; w każdym zaś gronie kwiaty tém są starsze, im są niższe.

W innych razach osi powtórne albo wszystkie, albo niektóre tylko (najczęściej niższe), nie kończą się kwiatami, lecz wydają po bokach osi trzecie, które z kolei mogą się także rozgałęziać. Wtedy grono tak złożone, przybiera nazwisko *kiści* (*panicula; wiecha* ant.) [fig. 181]. Postać jej zwykła jest ostrosłupowa z powodu nierównego rozwinięcia szypulek, które u dołu są dłuższe, u góry krótsze. Niekiedy jednak szypułki środkowe są dłuższe od innych, a wtedy kiść nazywa się *bukietem* (*thyrsus*).

§ 206. Jeśli zamiast szypulek prawie równych co do długości, lub skracających się nieznacznie tylko, od dołu do góry, znajdujemy, że niższe są daleko dłuższe od wyższych, a będąc co do położenia wzniesione, wtedy dopiero wnoszą kwiaty, kiedy się zrównają prawie z innymi, przez co ogół kwiatów tworzy jakby parasol o nierównych promieniach, otrzymujemy tak nazwany *baldaszkogron* (*corymbus*) pojedynczy (fig. 182, 1),



182.

182. 1. Baldaszkogron proste wiśni ś. Łucji (*Cerastium maiale*). — *a'* Oś główna, na której przykwiatki *b* naprzeciwległe, wydające z kątów swych osi powtórne *a''* zakończone kwiatami, czyli szypuleczki. Takowe rozwijają się kolejno od zewnątrz ku wewnątrz; najwewnętrzniejsza nosi jeszcze pączek. — Baldaszkogron wychodzi z kąta liścia, który już opadł, i kończy gałązkę spłwiałą, na której widać liście niższe w postaci lusek *e*.

2. Baldaszkogron złożony z gatunku głogu (*Crataegus torminalis*). — *a'* Oś główna. — *a''* Osi powtórne. — *a'''* Osi trzecie zakończone kwiatami, czyli szypuleczki. — *b b b* Przykwiatki.

lub złożony (fig. 182, 2), podług tego jak kwiaty siedzą na osiach powtórnych, lub na szypułkach wiele razy rozgałęzionych.

§ 207. Przypuśćmy teraz, że osi powtórne są nadzwyczajnie skrócone, tak, że oś główna okryta jest zewsząd kwiatai, które w gronie były od niej oddalone o całą długość osi powtórnych, a które tutaj zdają się bezpośrednio na nią siedzieć, czyli jednem słowem są bezszypułkowe: to będzie *kłosem* (spica) [fig. 183]. Nazywamy kłosem złożonym taki, którego oś główna nosi powtórne, dość długie, lecz niezakończone, tylko okryte po bokach kwiatai bezszypułkowemi.



183.

184.

185.

183. Kończyna kłosa koszyka zwyczajnego (*Verbena officinalis*). Kwiaty niższe przeszły już w owoce, środkowe są otwarte, wyższe w pączkach.

184. Kotek leszczyny. Przykwiatki w postaci łusk są tak zbliżone, że łatwo widzieć ułożenie ich w węzownię. Zpod nich wystają końce pręcików, należących do kwiatów męskich, które odpowiadają łuskom.

185. Buławka obrazków pospolitych (*Arum vulgare*). — 1. Okryta uszkciem *b* skręconém w trąbkę, z której wystaje kończyna buławki *a*. — 2. Taż sama buławka po przecięciu wzdłuż uszka, tak, że widać całą oś *a* okrytą mnóstwem kwiatów żeńskich *f* u dołu, a męskich *m* u góry.

Poznaczano rozmaitemi imionami kłosy, posiadające piętna szczególne i właściwe pewnym gromadom lub rodzinom roślinnym, jak np. *kotek* (amentum), to jest kłos pojedynczy, który opada stawowaciejając po okwitnieniu, i który się składa z kwiatów jednopłciowych, zwykle męskich (fig. 184); *buławka* (spadix) [fig. 185], kłos jednoliściennych, osłonięty u spodu dużym przykwiatkiem, który zowią *uszkciem* (spatha); kwiaty są tu bardzo zbliżone i jakby tkwiące w osi grubej, najczęściej pojedynczej, niekiedy gałęzistej, jak u palm, gdzie się zowie *rosochatką* (régime).

§ 208. Zróbmy teraz przypuszczenie przeciwne pierwszemu, to jest, że część osi głównej, z której wychodzą powtórne, jest skrócona, czyli raczej nie przedłuża się wcale, tak, że jest nieledwie żadną (fig. 186 *a'*); przeciwnie zaś osi powtórne *a'*, które się zowią *promieniami*, są znacznie rozwinięte. Wtedy zwykle, promienie wychodząc z jednego punktu, przedłużają się prawie równo; a jeśli każdy z nich kończy się kwiatem, kwiaty te zostają w jednej wysokości, tworzą rodzaj parasola o promieniach równych, co też zowiemy *baldaszkciem* (umbella) [fig. 186, *o' o' o' o'*]. Jestto więc grono, którego oś jest nadzwyczaj skrócona; a w skutek tego, stosunek szypulek jednych do drugich, zupełnie się zmienia: wyższe stają się wewnętrzniejsze, niższe zewnętrzniejszymi w baldaszku.

Baldaszek jest trzonkowy (*umb. stipitata*), jeśli oś główna posiada pewną długość, przed punktem, z którego wychodzą powtórne; beztrzonkowy jeśli nie ma téj dolnej części. Szy-



186.

186. Kilka baldaszków rośliny *Aralia racemosa*. — *a* Oś główna czyli wierzchołek gałęzi, zakończony baldaszkiem starszym od innych. — *a' a'* Osi wychodzące z pierwszej, i względem niej powtórne, lecz z których każda nosi kwiatostan, względem którego przeto są głównymi. — *a' a' a'* Osi powtórne czyli promienie baldaszku. — *b b b* Przykwiatki naprzemianległe na osi głównej. W kącie jednej z nich przy *d*, widać wychodzące dwie osi jednego rzędu, wyrastające ponad sobą, z przyczyny obecności dwóch pączków. — *i i i* Przykwiatki okrągowe na osiach pojedynczych kwiatostanów, tworząc ich pokrywę.

pułki powtórne, mogą nie nosić kwiatów tylko się podobnie rozgałęziać (fig. 187); zkaąd otrzymujemy wiele baldaszków powtórnych, czyli *baldaszczków* (umbellulæ), *o*'' ułożonych w baldaszek ogólny czyli złożony, który się tak ma do pojedynczego, jak kiść do grona.



187.

§ 208 *bis*. Kiedy z osi głównej nadzwyczajnie krótkiej, wychodzi wiele cienkich szypulek powtórnych, które zamiast się wznosić, rozbiegać i przez to rozpościierać swoje kwiaty w kształt parasola, skupiają się i cisną jakby w snopek, a często nawet przechylają się wszystkie w jedną stronę; jeśli są dość długie, wtedy ułożenie to odróżnić można od baldaszka i nadać mu nazwisko *wiązki* (fasciculus) [fig. 202 *f*]. Wiazki bywają zwykle beztrzonkowe, i siedzą w kątach liści lub przykwiatków.

§ 209. Nakoniec, osi powtórne mogą być równie jak główna, z której wychodzą skrócone; wtedy wszystkie kwiaty są zbliżone jakby w krążek lub kłębek, w którym zewnętrzne odpowiadają najniższym na osi przedłużonej, wewnętrznym zaś,

187. Baldaszek złożony marchwi. — *a*' Os główna skrócona w kwiatostanie w powierzchnią wypukłą. — *a*'' Osi powtórne, czyli promienie baldaszka głównego, noszące na sobie baldaszeczki *o*.'' — *o*''' Osi trzecie czyli promienie baldaszków. — *z*' Przykwiatki pierzasto-dzielne okrągowe, tworzące pokrywę ogólną. — *z*'' Przykwiatki pojedyncze tworzące pokrywki.


górnym. Kwiatostan ten zowią *kwiato-główką* (capitulum) [fig. 188], która podobnie jak baldaszek może być trzonkowatą lub beztrzonkową.



188.

Nadano osobną nazwę *koszyczka* (calathis) tej odmianie kwiatogłówki, która zależy od szczególnego ukształcenia wierzchołka kwiatonośnego osi głównej. Wierzchołek ten jest

gruby i wypłaszczony, tak, że kwiaty siedzą na dość wielkiej powierzchni płaskiej, wklęsłej lub wypukłej. Przykłady tych wszystkich gatunków, dają się znaleźć w tak nazwanych kwiatkach złożonych, a które są właściwie zbiorem maleńkich kwiatków, połączonych w jedną kupkę, podobną na pierwszy rzut oka do wielkiego, samotnego kwiatu; tak np. u podróżniku (*Cichoreum*) lub wężymordu (fig. 189, 1), u osłu lub słoneczniku. Każdy sobie przypomina w tym ostatnim łodygę rozplaszczoną na końcu, jakby w talerz okrągły i mięsisty, okryty żółtymi kwiateczkami. Ten talerz kwiatonośny (fig. 189, 2 r)



189.

188. Kwiatogłówka dryjakwi ogrodowej (*Scabiosa atropurpurea*). Kwitnienie tém jest wyżej posunięte, im kwiaty są bliższe obwodu.

189. 1. Koszyczek cały wężymordu ogrodowego (*Scorzonera hispanica*). 2. Ten sam przecięty pionowo do pokazania wierzchołka szypułki rozszerzonego w osadnik *r* noszący kwiaty *f* na swój powierzchni. Kwiaty na obwodzie są już otwarte, środkowe w pączkach. — *b* Przykwiatki dachówkowate tworzące okrywę.

otrzym  
teraz  
thium,


Wsp  
wklęsł  
brzega  
szą tal  
brzegi  
otrzym  
widzim  
jące w  
cych n  
się po  
gładka  
tej sa  
knięte  
brzega  
takowa

§ 2  
rodzaj  
wiedz  
nienie

190.  
lej wew  
191.  
pogrąż  
kończy

otrzymał różne imiona: dawniej *osadnika* (receptaculum), teraz *podkwiatnika* lub *kwiatotoża* (phorantium v. clinanthium, według źródłosłowa: podpora lub łożo kwiatów).

Wspomnieliśmy dopióro, że powierzchnia jego bywa niekiedy wklęsłą, zwykle jednakże nie głęboko, i jest wypłaszczona ku brzegom; w niektórych tylko razach wklęsłość bywa znaczniejszą tak, że ztąd powstaje kształt kubka lub urny; nakoniec brzegi mogą się zbliżyć do siebie, zetknąć z sobą, przez co otrzymujemy wydrążenie zupełnie zamknięte. Taką odmianę widzimy u figi (fig. 190), i z tego powodu osoby nie posiadające wiadomości botanicznych, nie znają jej kwiatów, siedzących na całej wewnętrznej powierzchni osadnika zamykającego się ponad nimi, a którego tylko powierzchnią zewnętrzną, gładką i upostacowaną w gruszkę widzimy. W innych roślinach tej samej rodziny, znajdujemy przejścia od wydrążenia zamkniętego i zawierającego kwiaty figi, aż do wypłaszczonego na brzegach osadnika czerwirzepy (*Dorstenia*) (fig. 191), który takowe na wierzchu nosi.



190.



191.

§ 210. Porównywając z sobą wszystkie wymienione dotąd rodzaje kwiatostanu, widzimy, iż: jakieś to najprzód zapowiedzieli, takowe różnią się tylko rozwinięciem się, lub płonieniem niektórych osi, albo nakoniec względną długością

190. Figa rozcięta wzdłuż, dla pokazania kwiatów *f* osadzonych na całej wewnętrznej powierzchni osadnika *r*.

191. Kwiatostan rośliny *Dorstenia contrayerva*, gdzie kwiaty *f* są na wół pogrążone w osadniku *r* nieco wklęsłym, na powierzchni którego wystają ich kończyńki.

tychże. Jestto do tego stopnia słuszném, że łatwo można dać określenie każdego z tych kwiatostanów, które będzie tylko wyrażeniem porównawczém względem innego. Tak np. można rzec, iż grono jest kłosem o osiach przytłumionych; kłos, gronem o kwiatach bezszypułkowych, baldaszek beztrzonkowy, gronem bez osi głównej czyli osadki; kwiatogłówka, gronem weale bez osi, lub kłosem bez osadki, albo wreszcie baldaszkiem bez promieni; baldaszek, kwiatogłówką o kwiatach szypułkowych i t. d.

W każdym z wymienionych kwiatostanów, osi drugiego lub dalszego rzędu, mogą być naprzemian — lub naprzeciwległe. Położenie ich względne powinny być zawsze takie same, jak liści, ponieważ właśnie wyrastają z kątów liści zmienionych tylko co do postaci: w wielu téż razach, tak jest w istocie. Lecz wspomnieliśmy już (§ 167), że w roślinach naprzeciwlistnych, nie rzadko można widzieć, iż prawdziwe liście stają się naprzemianległemi u wierzchołku gałązek. Nic więc dziwnego, że przykwiatki leżąc zawsze przy wierzchołku gałązek, częstokroć stają się naprzemianległemi, chociaż nawet liście są naprzeciwległe.

#### KWIATOSTANY SKOŃCZONE.

§ 211. Kwiatostan skończony bywa najczęstszym i najbardziej prawidłowym u roślin naprzeciwlistnych. Zaczniemy go przeto badać na jednej z takich roślin: np. na jednej z goryczkowatych, na tysiączniku (*Erythraea centaurium*) (fig. 192).

Oś główna  $a'$  kończy się nieco wyżej lub niżej kwiatem  $f'$  (1), zaraz pod tym, lub nieco niżej, dwa liście osadzone są na osi głównej; z kąta każdego z nich wychodzi oś powtórna  $a''$   $a''$ , która się również kończy kwiatem środkowym  $f''$   $f''$ , a niżej nieco nosi dwa liście, z każdej strony po jednym; z kolei każ-

(1) Część osi głównej, leżąca ponad osadą dwóch osi powtórnych, wychodzi tu z kąta jaki takowe tworzą. Wyraz: *kąt* (*axilla v. ala*), którym oznaczyliśmy przestrzeń zawartą pomiędzy liściem a gałęzią, z której tenże wychodzi, był dawniej używany na oznaczenie przestrzeni zawartej pomiędzy widelkami jakiegokolwiek rozdwojenia rośliny. Ztądto niektórzy pisarze używają wyrażenia: kwiat, lub kwiaty kątowe, na oznaczenie kwiatu, lub ogółu kwiatów kończących tym sposobem oś główną, ponad widelkami utworzonymi przez osi powtórne.

dy z ty  
bnież z  
nie tak  
dzieln  
powtar  
zy, a  
osi, a  
zostaje  
Jesli  
to ich  
łek p  
a z ka  
stała  
z kole  
leżeni  
(trich  
większ  
okreg  
Nie  
niewa  
kwiat  
(któr  
wyda  
rozdw  
kwiat  
Gdy  
kwiat  
przeis  
w jede  
Najno  
wprzó  
obszer  
W w  
bie o

192.  
główna  
du. —  
osi do  
szego n  
czkach

dy z tych liści wydaje w kącie swym oś trzecią  $a''' a'''$ , podobnie zakończoną. Rozgałęzienie takowe *widełkowate (dwudzielne; dichotomia)*, może się powtarzać mniej albo więcej razy, a za każdym razem, ilość osi, a tém samém i kwiatów zostaje podwojoną.

Jeśli zamiast dwóch liści, było ich trzy, ułożonych w okółek pod kwiatem środkowym, a z kąta każdego z nich wyrosła oś powtórna, dzieląca się z kolei znowu na trzy, rozgałęzienie będzie *trójdzielne (trichotomia)*. Można by znaleźć większą jeszcze ilość liści i osi okręgowo ułożonych.

Nie wspomnieliśmy wyżej o tych rodzajach ugałęzienia, ponieważ one pokazują się przy kwiatach, a przeto należą do kwiatostanów. Niekiedy jednakże, osi niezakończone kwiatami (które uprzednio sploniały), mogą się kończyć, przy każdym wydaniu nowych gałęzi, a ztąd otrzymujemy szereg kolejnych rozdwojeń, lub co rzadziej, roztrojeń opatrzonych liśćmi bez kwiatów.


Gdyby obok kwiatów istniały liście, otrzymalibyśmy szereg kwiatów samotnych i wierzchołkowych. Lecz kiedy liście przeistaczają się w przykwiatki, cały takowy układ zmienia się w jeden kwiatostan, który nazywamy dwu lub trójdzielnym. Najnowsi pisarze dają mu imię *wierzchnotki (cyma)*, brane wprzód, a nawet od niektórych i teraz, w znaczeniu mniej obszerném.

W wierzchnotce kwiaty mogą być mniej lub bardziej od siebie oddalone, podług tego jak wszystkie kolejne osi, dość



192.

192. Wierzchołek kępki tysiączniku (*Erythraea centaurium*). —  $a'$  Oś główna. —  $a'' a''$  Dwie osi powtórne. —  $a''' a''' a'''$  Cztery osi trzeciego rzędu. —  $a'''' a'''' a''''$  Ośm osi czwartego rzędu. —  $f$  Kwiaty, oznaczone według osi do których należą, tyłuż kręskami. Kwiaty tém są starsze, im do wyższego rzędu osi należą;  $f'$  w stanie owocowania,  $f'' f''$  otwarte;  $f''' f'''$  w pączkach.



193.



194.

długie i przechodzące o wiele wierzchołek kwiatonośny osi poprzedzających, nadają ogółowi postać przewróconej kiści, lub jak stając się coraz krótszemi, ledwie że jedna nad drugą wystaje, z kąd też wszystkie kwiaty znajdują się prawie w jednej wysokości tak, jak w baldaszokogronie.

Dość często się zdarza, że rozgałęzienie dwudzielne nie w całej długości kwiatostanu jest prawidłowem, lecz kiedy w pewnej wysokości jedna z osi wydaje pod kwiatem wierzchołkowym dwa przykwiatki i dwie nowe osi, druga, jej przeciwna, nosi kwiat bez przykwiatków, albo przynajmniej w kącie takowych nie się nie rozwija, przez co rozgałęzienie zostaje z jednej strony wstrzymane, z drugiej zaś ciągnie się dalej.

§ 212. Zatrzymanie się takowe boczne, zdarza się wprawdzie najczęściej, ku wierzchołkowi kwiatostanu, jednakże niekiedy zaczyna się już u jego spodu, a wtedy przy każdym węzle niedostaje jednej z osi, któreby się tam mogły rozwinąć.

193. Kwiatostan gatunku rogownicy (*Cerastium grandiflorum*). Głoski mają to samo znaczenie, co na figurze poprzedzającej. — *b b b* Przykwiatki naprzeciwległe przy każdym rozgałęzieniu.

194. Kwiatostan innego gatunku rogownicy (*C. tetrandrum*). — Znaki te same jak wyżej. — Osi czwartego rzędu *a''''* są pojedyncze i boczne, skutkiem płonności ich po drugiej stronie.

Tym sposobem otrzymujemy postać grona lub kłosu, lecz zamiast jednej tylko osi bez kwiatu wierzchołkowego, noszącej szereg innych, powtórnych osi, opatrzonych kwiatami, jak to było w kwiatostanach nieskończonych, mamy tu szereg osi różnego rzędu, które kolejno jedne z drugich wychodzą i z których każda kończy się kwiatem. Łatwo też poznać istotne przyrodzenie tego na pozór grona, ponieważ osadka jego, zamiast być prostą, przedstawia zwykle szereg skrzywień albo kolanek, a prócz tego wszystkie kwiaty siedzą tu zwykle najnieżej na jednej, najeźściżej na wewnętrznej stronie, ponieważ zwykle wszystkie osi jednej strony płonieją.

§ 213. Kiedy liście nie są naprzeciw, ale naprzemianległe, można napotkać to samo ułożenie kwiatów i osi je noszących, nawet nie w skutek płonności. Oś pierwotna wydaje np. jeden tylko przykwiatek, a potem kończy się kwiatem. Z kąta przykwiatka wychodzi oś powtórna, zakończona podobnie i nosząca także przykwiatek, z którego kąta wychodzi oś trzecia. Ta, daje początek czwartej; czwarta piątej i t. p.; tym sposobem otrzymujemy szereg osi wychodzących jedna z drugiej, i kończących się bezpośrednio kwiatami, a z połączenia tej wynika, jak i w poprzedzającym przypadku, niewłaściwe grono lub kłos. Ułożenie to, jest zupełnie podobne do opisanego wyżej przyłodygach czołgających się (§ 183), lub innych (§ 185), których każde międzywęźle przedłuża się na pozór międzywęźlem rozwiniętym w kącie liścia wierzchołkowego. Cała różnica w tém, że tu każda oś kończy się kwiatem, a nie wąsem lub różyczką liści. W każdym razie łatwo jest odróżnić ten kwiatostan od prawdziwego grona lub kłosa, ponieważ przykwiatki, leżą tu naprzeciw kwiatów, a nie bezpośrednio pod nimi.

W przypadkach tych, kwiaty mogą zajmować względem łodygi dwa różne położenia, zależące od porządku w jakim się rozwinęły przykwiatki. Przypomnijmy sobie bowiem, że liście naprzemianległe ułożone są w węzownice; że te węzownice na dwóch osiach *a* i *b*, z których jedna z drugiej wyrasta, zwracają się albo w tym samym, albo w odwrotnym kierunku; że pierwszy liść *b*, kieruje się zawsze według tego liścia gałązki *a*, który wydaje w kącie swym gałązkę *b* (§ 162). Wystawmy sobie teraz po *a* i *b* szereg osi *c*, *d*, *e*, i t. d., wychodzących kolejno jedna z drugiej, chociaż każda z nich nosi jeden tylko

liść lub przykwiatek; położenie jednakże liścia osi *b* stosuje się do położenia liścia *a*, położenie liścia *c* do położenia liścia *b* i t. p., położenie więc względne tych dwóch liści wystarcza do oznaczenia kierunku węzownicy od prawej ku lewej, lub od lewej ku prawej stronie. Węzownica zaś jest w szeregu tych osi, albo tożstronna, albo innostronna. W pierwszym razie, jeśli węzownica osi *a*, szła od lewej ku prawej ręce, liść osi *b* przypadnie po prawej stronie liścia *a*, liść *c* po prawej stronie liścia *b*, liść *d* po prawej stronie liścia *c*, i t. d. i t. d., a ztąd otrzymamy poczet przykwiatków opisujących węzownicę od lewej ku prawej ręce. W drugim razie przeciwnie, liść osi *b* przypadnie po lewej stronie liścia *a*, liść *c* po prawej liścia *b*, liść *d* po lewej liścia *c*, liść *e* po prawej liścia *d*, i t. d. i t. d., a ztąd otrzymamy poczet przykwiatków, ułożonych naprzemian to na prawo to na lewo, tak, że linja przechodząca kolejno przez punkta ich osady, utworzy rodzaj zygzaku.



195.



196.

195. Wierzchnotka okręcona z gatunku lilji peruańskiej (*Alstroemeria*). Widać następstwo osi *a'* *a''* *a'''* *a''''* które zdają się tworzyć oś jednociągłą, a same wydają się międzywęzłami. Każda z nich wychodzi z kąta liścia, zakończonego kwiatem *f* naprzeciwległym względem liścia.

196. Wierzchnotka niezapominajki (*Myosotis palustris*).— Kwiaty ułożone są naprzemian we dwa rzędy i po jednej stronie szypułki ogólnej.

Ztąd dwa niezmiernie od siebie różne ułożenia w niewłaściwych gronach lub kłosach, o których mówimy. Te z nich, w których znajdujemy pierwsze połączenie, więcej są podobne do prawdziwych, z którymi je też dotychczas mieszano, ponieważ ich kwiaty leżą naokoło osi pozornie jednociągłej; ten to rodzaj kwiatostanu nazywają pp. Bravais, *wierzchnotką okręconą*, (*cime hélicoïde*; fig. 195). Te zaś, w których znajdujemy drugie połączenie, a które były i bez tego odróżniane z przyczyny jednostronnego ułożenia kwiatów, nazywają się *gronami*, *kłosami*, albo lepiej *wierzchnotkami zwiniętymi*, (*cimes scorpioides*; fig. 196).

Ostatni ten przymiotnik nadany im został dlatego, że kończy się na zewnątrz, jak ogon niedźwiadka. Zwinięcie to łatwo jest objaśnić (fig. 197). Oś *b* tworzy kąt na zewnątrz osi *a*, oś *c* tworzy taki sam z osią *b*, *d* podobnie z *c*, *e* z *d*, i t. d. i t. d., z kąd powstaje linja łamana, krzywo idąca, która przebiegłszy półokręgu powtórnie się zwija. Osi zaś tém później się rozwijają, a przeto tém są krótsze, im się bardziej oddalają od punktu, z któregośmy wyszli; linja więc krzywa, utworzona przez niższe ich międzywęzła, będzie węzownicą na płaszczyźnie zwinięta, której przeto skręty są coraz mniejsze. Zwinięcie prędsze lub wolniejsze, zależy od mniej lub więcej ostrych kątów, pod którymi jedna oś z drugiej wychodzi; ułożenie zaś kwiatów we dwa, mniej lub więcej wyraźne rzędy, od mniejszej lub większej odległości dwóch najbliższych przykwiatków. Wszystkie te odmiany widzieć można na znacznej liczbie roślin: na rucie, wielu rozchodnikach, których kwiatostan był dla Linneusza i jest jeszcze dla wielu botaników, wzorem prawdziwej wierzchnotki (*cyma*); nade wszystko zaś w rodzinie ogórecznikowatych, gdzie można znaleźć mnóstwo przykładów objaśniających rozmaite odmiany.

§ 214. We wszystkich dotąd tu rozbieganych kwiatostanach skończonych, mianowicie zaś w pierwszych z kolei, może się zdarzyć, iż w skutek nadzwyczajnego skrócenia osi, wszystkie kwiaty zostaną zbliżone i skupione, jak to np. widzimy w goździkach. Röper nazywa ten kwiatostan *wiązką*, jeśli osi posiadają pewną długość i są kształtnie ułożone; *kupką* zaś (*glomerulus*), kiedy osi są prawie nieznaczne, a częsta płon-



197.

ność niszczy prawidłowość ułożenia. Tu wzięliśmy pierwsze z tych nazwisk w inném znaczeniu (§ 208 *bis*), w obu zaś wymienionych przypadkach, wystarczy nadana przez de Candolla nazwa *wierzchnotki ściągniętej* (*cyma contracta*).

§ 215. De Candolle objął pod nazwiskiem *kwiatostanów mieszanych*, takie, które należą zarazem do skończonych i nieskończonych, ponieważ osi ich niejednakowo się w tym względzie zachowują. U wargowych np. kwiaty tworzą wierzchnotki osadzone w kątach liści naprzeciwległych, na osi wspólnej nieskończonej. Jeśli liście zachowują swoje przyrodzenie, niema trudności w opisaniu, gdyż wtedy *wierzchnotki* będą *kątowe*; lecz kiedy liście przemieniły się w przykwiatki, a przeto wszystkie wierzchnotki tworzą jeden tylko kwiatostan, jak nazwać takowy? Zadanie to łatwo rozwiązać, wspominając, że wierzchnotki ułożone są w kłos, kiść, lub grono, oznaczmy dostatecznie podwójny rodzaj takiego kwiatostanu.

§ 216. W innych razach nietylko oś główna, ale wiele innych z nię wychodzących, nie kończy się bezpośrednio kwiatami; kwiatostan nie przedstawia u spodu, ani dwudzielności, ani następstwa różnych osi; słowem, zda się nie być skończonym, a jednak jest rzeczywiście takim na swych kończynach, gdyż ostatnie szypułki dzielą się kształtnie widelkowato, lub noszą wierzchnotki jednostronne. Oczywiście, przypadek ten zdarzyć się może tylko w kwiatostanach wiele razy rozgałęzionych, jakoto: w kiściach (fig. 198) i baldaszkogronach.

Można jednakże znaleźć coś podobnego i w kwiatostanach prostszych np. w gronie i kłosie; kiedy oś główna kończy się kwiatem, jak np. u większej części dzwonek (fig. 199).

Potrzebujemyż znajdować nowe wyrazy, lub zmieniać znaczenie dawnych, dla nazwania tych odmian? Daleko prościej będzie i jaśniej, używać nazwisk znanych, a oznaczać przymiotnikiem zmianę, jakiej uległ przedmiot przez nie wyrażony. Tak, można powiedzieć, kiści lub baldaszkogrony zakończone wierzchnotkami, albo krócej jeszcze, kiści, baldaszkogrony, lub grona skończone. Kształty pośrednie nie mogą i bez tego być oznaczone pojedynczą nazwą, ponieważ wymagają dwóch wyrazów porównania.

§ 217. Jakiekolwiek nazwiska przyjmiemy w tym względzie, uważać należy, że kwiatostany mieszane są nadzwyczaj częste, a liczba skończonych, które z razu uważano za daleko

rzads  
uważ




W  
kwiat  
to prz  
nów n  
czyli  
mamy

198  
powtór  
du o"  
wemi  
śniejse  
199  
kwiate  
ne, zał

rzadsze od nieskończonych, rośnie z każdym dniem przez uważniejsze i wprawniejsze badania.



198.



199.

W tym nawet przypadku, kiedy ostatnie szypułki kończą się kwiatami samotnymi, nie dzieląc się wcale widelkowato, który to przypadek zdaje się na pozór należyć do rzędu kwiatostanów nieskończonych, obecność wielu małych przykwiatków, czyli przykwiateczków, na tej ostatniej szypulce, dowodzi, że mamy do czynienia z kwiatostanem skończonym. Często znaj-

198. Kiść skończona wierzchołkowa ligustru. — Osł główna *a'* wydaje osi powtórne naprzeciwległe *a'' a'''* z których znowu wychodzą osi trzeciego rzędu *a'''' a'''''* na końcu dwudzielne, a ztąd zakończone maleńkimi trzykwiatowymi wierzchołkami *c c*. — W każdej z tych kwiatów środkowy jest wcześniejzy od bocznych.

199. Grono skończone gatunku dzwonku. — *a' a'* Osł główna zakończona kwiatem *f'* już uwiedłym i zaczynającym owocować. — *a'' a'' a'''* Osi powtórne, zakończone kwiatami *f''* tém wcześniejzemi, im leżą niżej w gronie.

dujemy dwa takowe przykwiatki naprzeciwległe, pod kwiatem siedzące, a ztąd łatwo jest poznać w tém ułożeniu małą trzykwiatową wierzchnotkę, której dwie boczne osi nie rozwinęły się wcale. Innym razem przykwiatki są naprzemianległe; a ponieważ właśnie poznaliśmy już kłosa i grona skończone, łatwo nam będzie takowe rozpoznać w szypułce, zakończonej kwiatem i opatrzonej przykwiatkami, z których kąta mogłyby wychodzić kwiaty drugiego rzędu względem kwiatu wierzchołkowego, chociaż w tym razie sponiały. Dla téjto właśnie przyczyny zachowaliśmy nazwisko szypułeczki dla ostatniego tylko międzywęzła szypułki, a nie dla niej całej, ponieważ każda szypułeczka musi być istotnie jednokwiatową.

Przejścia przeto od kwiatostanów skończonych do nieskończonych, są częste, czasami prawie nieznaczne. Dlatego też nie należy pomnażać liczby nowych imion, dla oznaczenia tych przypadków różnych, a niezbyt wyraźnie odgraniczonych. Lepiej daleko zachować wyrazy dawne, określać takowe należyte, nie odbierając im wszakże w zupełności dawnego znaczenia i objaśniając je w razie potrzeby przymiotnikami, a niekiedy nawet krótkimi opisami, jakieśmy to uczynili tutaj w przypadkach najogólniejszych, których inne są tylko odmianami, jakie poznać można przy szczegółowém zajęciu się przedmiotem.

## K W I T N I E N I E.

§ 218. W jakim porządku rozwijają się kwiaty na różnych kwiatostanach? Wiadomości poprzednio wyłożone ułatwiają odpowiedź na to pytanie. Przy rozmaitych szczegółach kwiatostanów nie omieszkaliśmy porównywać gałęzi okrytych liśćmi, z gałęziami noszącymi kwiaty; widzieliśmy że rozgałęzienie obudwóch, podlega tym samym prawom, i że każda szypułka zakończona kwiatem, może być porównaną do gałązki. Każda zaś gałązka musi się rozwijać piérwój od tych, które z niej wychodzą: wykształcenie jój postąpiło już mniej lub więcej, kiedy pączki boczne dopiéro się zaczynają ukazywać. Toż samo ma się rozumieć i o osiach kwiatowych: każda z nich rozwija się piérwój, od osi względem niej powtórnych: *kwiaty więc kończące rozmaite osi, otwierają się w porządku następstwa osi, na których siedzą.*

Zamiast gałęzi wiele razy podzielonej, weźmy gałązkę ograniczającą się na samych tylko pęczkach bocznych, czyli innemi słowy, osi główną wraz z pewną ilością osi tylko drugiego rzędu. Wiemy, iż gałęź ta, rośnie u wierzchołka, tak, że części jej tém są wcześniiej utworzone, im są niższe. Jej pęczki ulegają temu porządkowi rozwijania się z dołu do góry, i wykształcają się tém wcześniiej, im są niższe. Ten sam porządek musi panować w szeregu osi kwiatowych, wychodzących bezpośrednio z jednej i téj saméj szypułki. Rozwijanie kwiatów je kończących musi się zacząć od kwiatu osi najniższéj, i postępować kolejno od dołu do góry. Ztąd przeto drugie prawo: *że kwiaty kończące osi drugiego rzędu, ułożone na téj saméj osi głównej, rozwijają się od dołu do góry.*

Prawa te wypływają zarówno ze spostrzeżeń i z teorii. Przewodniczą one rozwijaniu się wszystkich kwiatostanów, z wyjątkiem kilku przypadków nieprawidłowości, wywołanej wpływem przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych, które wymagają osobnego rozbioru. Poznawszy te prawa, łatwo jest rozróżnić pojedyncze kwiatostany, których oznaczenie byłoby trudném i ciemném bez téj pomocy.

§ 219. Wiemy już, że kiedy wszystkie kwiaty jednego kwiatostanu przypadają w jednej, lub prawie w jednej wysokości, w skutek przedłużenia się niektórych osi, a skrócenia innych, kwiaty niższe znajdująć się muszą na zewnątrz, wyższe zaś ku środkowi. Można wtedy użyć wyrazów: zewnętrzny zamiast niższy, wewnętrzny zamiast wyższy; z zewnątrz ku wewnątrz, zamiast z dołu do góry; od wewnątrz ku zewnątrz, zamiast z góry na dół. Jeśli więc uważamy baldaszek lub kwiatogłówkę, obaczmy że otwieranie się kwiatów postępuje od obwodu ku środkowi kwiatostanu, podobnie jak w gronie postępowało by z dołu do góry. Ztąd nazwanie *rozwijania się dośrodkowego*, którem oznaczono porządek otwierania się kwiatów w tych kwiatostanach, a tém samém we wszystkich kwiatostanach nieskończonych.

Weźmy teraz przeciwnie, wierzchnotkę złożoną z osi głównej i z wielu osi powtórných. Kwiat kończy tamtę, i zajmujący przeto środek kwiatostanu, otworzy się nasamprzód, po nim kwiaty, które kończą osi powtórne, a które przypadają na obwodzie. W tym razie rozwijanie się zachowuje kierunek odwrotny względem pierwszego, postępuje bowiem od środka

ku obwodowi i nazywa się też *odsrodkowém*, wyrazem tym oznaczono porządek kwitnienia wszystkich kwiatostanów skończonych. Rozumić się jednak, że nazwanie to w wielu razach jest wcale niedokładnym, gdyż tam, gdzie się znajduje pewna liczba kolejnych dwudzielności kwiatowych, pomiędzy kwiatem środkowym, a kwiatami kończącymi osi powtórne, przypadają osi trzeciego rzędu, które kwitnąć będą później od powtórnych, chociaż są wewnętrzniejsze. Należy więc używając tego wyrazu, pamiętać, że nie może być wziętym w całej ścisłości swego znaczenia.

§ 220. Wiedząc to wszystko, łatwo jest spostrzedz, ile stosunki ułożenia kwiatów, rozwiniętych w rozmaitym stopniu, dopomóc nam mogą przy pierwszym już rzucie oka na ogół kwiatów, do oznaczenia rodzaju kwiatostanu. Jeśli spostrzeczemy w środku lub u góry kwiat bardziej rozwinięty od innych, położonych około niego lub pod nim, wiemy zaraz, że mamy do czynienia z kwiatostanem skończonym; jeśli przeciwnie, kwiaty środkowe lub górne, są mniej rozwinięte od kwiatów u dołu, lub na obwodzie leżących, wiemy iż kwiatostan jest nieskończony. Stopnie kwitnienia, do jakich doszły różne kwiaty, jedne względem drugich, wskazują nam najprzód, na jakim stopniu stoją ich osi, lub jakie jest ich względne położenie na wspólnej szypułce.

§ 221. Braliśmy tu dla większej jasności przypadki najprostsz, to jest te, w których kwiatostan nie jest bardzo rozgałęziony. W tym bowiem ostatnim razie, badanie staje się zawiąkszą z przyczyny rozrzczenia osi jednego rzędu na wiele punktów kwiatostanu. Wspomnieliśmy już o tém przy wierzchotkach; lecz to samo rzec można o kwiatostanach nieskończonych; w kiści np. w której każda z osi powtórnych, położonych w różnych wysokościach, nosi kwiaty różnych stopni, można ku spodowi znaleźć kwiaty mniej wykształcone od innych, które względem nich są wyższemi, co jest na pozór przeciwném rozwijaniu się dośrodkowemu.

Potrzeba zważać, że w tym przypadku, ogół kwiatostanu jest tylko powtórzeniem pewnej ilości kupek kwiatowych, mniej więcej podobnych, ułożonych na wspólnej osi: tak np. kiść bywa w ogóle połączeniem tylko gron na jednej szypułce. To skłania do przyjęcia *kwiatostanów złożonych*, gdzie w kwiatostanie *ogólnym* (o jakim wyłącznie mówiliśmy dotąd),

możn  
sobie  
ne. I  
dem  
nego  
że, j  
wyks  
będą  
końc  
sto w  
na d  
wyrz  
kwi  
roz  
w ku  
Ro  
razy  
kiś  
na gr  
§  
sob  
nie  
ści  
śmy  
w st  
Tak  
psac  
pion  
re z p  
byśm  
wdzi  
stępo  
ry; t  
jedn  
wnos  
zór p  
20  
lone s  
żoną.  
na ka

można rozróżnić wiele cząstkowych, z których każdy w sposobie swego kwitnienia, okaże nam prawa poprzednio wyłożone. Porównując następnie sposób kwitnienia jednych względem drugich, obaczymy, iż każda z kucek kwiatostanu złożonego, może być porównaną z kwiatem kwiatostanu prostego; że, jeśli wszystkie są boczne względem osi, tém będą mniej wykształcone, im ich wyżej patrzymy, czyli że się rozwijają będą od dołu do góry; że jeśli jedna z nich położona jest na końcu osi, to się najsamprzód rozwinie (fig. 186), a nawet często w takim razie, kwitnienie innych zstępować będzie z góry na dół, to jest będzie odśrodkowem. To nas doprowadza do wyrzeczenia trzeciego prawa: że w kwiatostanie złożonym, kwiatostany cząstkowe podlegają co do swego względnego rozwijania się tym samym prawom, co kwiaty pojedyncze w kwiatostanie prostym.

Rozumię się, że rozgałęzienie kwiatostanu może być tyle razy powtórzonem, iż je można na wiele części rozkładać, np. kiść ogólną można rozłożyć na kiści cząstkowe, a każdą z tych na grona, i t. d., i t. d.

§ 222. Kwitnienie odstania niekiedy w kwiatostanach sposób ułożenia, któregobyśmy inaczej nie doszli; np. w wierzchnotkach ściągniętych (§ 214), którychbyśmy bez téj pomocy nie byli prawie w stanie odróżnić od kwiatogłówki. Tak w drapaczu suknowalskim (*Dipsacus fullonum*), kwiaty są skupione w długie eliptyczne głowy, które z pierwszego wejrzenia nazwalibyśmy kłosami. Lecz w kłosie prawdziwym, kwitnienie powinno postępować prawidłowo z dołu do góry; tu zaś ono zaczyna się prawie jednocześnie na wielu piętach, z kądem wnosić musimy, że kłos ten, na pozór pojedynczy, powstał ze zrośnię-



200.

200. Kwiatostan drapacza leśnego (*Dipsacus sylvestris*). Kwiaty podzielone są długimi, kończystemi przykwiatkami, z kądem i cała główka jest najeżona. Rozwijanie się kwiatów dzieje się od razu na wielu piętach *es em ei*, na każdym zaś kwiaty niższe są już otwarte, wyższe zaś w pączkach jeszcze.

cia wielu, z których wierzchołkowy jest największy. Tak znowu, że przywieziemy inny przykład, jeżonóg kulisty (*Echinops sphaerocephalus*) posiada kwiaty połączone w kulę, której kwitnienie postępuje z góry na dół, a nie z dołu do góry; zamiast więc kwiatogłówki, musimy przyznać mu kwiatostan złożony i skończony.

§ 223. Pozostaje nam jeszcze mówić o kilku kwiatostanach, które z powodu, iż z niezwykłego miejsca wychodzą, zdają się stanowić wyjątek od ogólnego prawa; szypułki będąc ostatniemi gałązkami rośliny, powinny wychodzić zawsze z kątów liściowych, a właśnie w niektórych razach, rzecz się ma inaczej.

I tak, przyjmowano niegdyś kwiatostany korzeniowe, jak gdyby kwiat mógł niekiedy wyrastać bezpośrednio z korzenia; wszelako samo określenie tego przypadku, jakie się odtąd dawać zwykło, wskazuje, że przyrodzenie tych kwiatostanów było dobrze pojęte; że poznano, iż nadzwyczajne skrócenie łodygi w części ulistnionej, dało powód do tego złudzenia. W takich razach, międzywęzła niższej części łodygi, są tak do siebie zbliżone, iż wszystkie liście (które się też korzeniowemi zowią), tworzą w równi z ziemią różyczkę, ze środka której wychodzą kwiaty, kończąc tę ściągniętą łodygę, lub też wyrastają z kątów zbliżonych liści. Często jednakże nie wychodzą one z tak bliska ziemi, a łodyga obnażona z liści, wznosi się do pewnej wysokości, na której dopiero okrywa się przykwiatkami i kwiatami: nazywa ona się wtedy *głębikiem* (*scapus*). Pod innemi względami kwiatostan ten należy do przypadków już znanych. Przykłady są częste u wielu roślin cebulowych, jak np. u hyacyntów, pierwiosnków, stokroci, i t. d., i t. d.

§ 224. Przytaczano także kwiatostany ogonkowe i nalistne, przypuszczając tém samém, iż kwiaty mogą powstawać na liściach. To dlatego, że często brano za liść, gałązkę, która się może do tego stopnia zmienić w swjej postaci, jak to później zobaczymy (§ 236, fig. 202). W innych razach kwiat wychodzi rzeczywiście z liścia, ponieważ wtedy szypułka nosząca go, zrasta się w części z liściem, w którego kacie powstała, a to, już z ogonkiem (jak w rodz. *Helwingia*, *Chailletia* i wielu proświnnikach [*Hibiscus*]), już w mniejszej lub większej rozległości z samą blaszką, (jak u webla) [*Zostera*]. Liść kwiatonośny może być wtedy zmieniony w przykwiatek, jak

np. u lipy, na której łatwo się przekonać o tém częściowem zrośnięciu się szypułki.

§ 225. Przez zrośnięcie podobnież, części zwykle odosobnionych, objaśnia się wiele kwiatostanów zewnątrz-kątowych, tojest takich, które zdają się powstawać nie w kącie liści, ale na inném miejscu. Psiankowate dostarczają uderzających tego przykładów. Osada szypułki, zrośniętej w pewnej długości z gałęzią, wydaje się przeniesioną mniej lub bardziej wysoko ponad liść; a jeśli część zwinięta téj szypułki jest dłuższą od międzywęzła, to pomiędzy liściem, z którego kąta szypułka wychodzi, będzie się mógł jeden lub więcej liści znajdować: linja prosta poprowadzona na dół z owego punktu, musi przechodzić przez liść rzeczony, pomijając inne, i tym sposobem dochodzimy prawdziwego stosunku części, który z powodu zrośnięcia szypułki, stał się trudniejszym do poznania.

Co do przypadku, w którym kwiatostan jest naprzeciwlistny, tojest powstaje wprost naprzeciw liścia zamiast wychodzić z jego kąta, takowy dostatecznie już został objaśnionym (§ 185).

PRZYKWIATKI (*bracteae*).

§ 226. Powiedzieliśmy, że przykwiatki są liśćmi zmienionemi, z których kąta wyrastają osi noszące kwiaty. Niekiedy przeobrażenie nie jest zupełnem, i przykwiatki zachowują, mianowicie u spodu kwiatostanu, zieloną barwę i całą postać liści, zmniejszonych jednakże i skróconych; wtedy niewiadomo jaką nazwę nadać im wypada: nie są już liście takie jak u spodu rośliny, lecz zarazem nie są to jeszcze przykwiatki. Oznaczamy ten rodzaj przejścia, dodając do nazwiska kwiatostanu przymiotnik: *liścisty* (in flor. foliosa). W tento sposób opisujemy kiści, grona, i t. d., opatrzone liśćmi.

W innych razach przeciwnie; płonność liści towarzyszących kwiatom, jest zupełną; nie znajdziemy nawet śladu takowych, ani przy nasadzie kwiatostanów ogólnych lub szczególnych, ani téż przy pojedynczych kwiatach. Oznaczamy ten niedostatek przykwiatków, nazywając kwiatostany lub kwiaty pozbawione takowych, *bezprzykwiatkowemi* (flores ebracteati). Widzieć to można np. na kwiatostanach roślin krzyżowych.

§ 227. Pomiedzy rozwinięciem liściowatém przykwiatków, a zupełnym ich niedostatkiem, znajdujemy stopnie pośrednie,

i wtedy liść może przedstawiać te same odmiany, o których mówiliśmy przy okrywach pączków (§ 173). Najczęściej może niedostawać ogonka, i pozostaje tylko blaszka, mniej lub bardziej zmniejszona. Często także sama część pochwowata daje się widzieć; wreszcie pozostać może, w postaci kolca dłuższego lub krótszego, sam tylko koniec ogonka, będący śladem niejako wiązki środkowej naczyni, których przedłużenie utworzyłoby nerw średni liścia. Czasami nakoniec spostrzegamy tylko przylistki, które się do tego stopnia rozwinąć mogą, jak przy właściwych liściach. Jeśli inne części liścia zupełnie spłonęły, to wtedy postrzegamy przykwiatki na pozór podwójne; jeśli prócz tego znajduje się blaszka, ogonek lub pochwa, rozwinięta także do pewnego stopnia, przykwiatek będzie trójłatowy, albo nawet potrójny, podług tego jak przylistki są ogonkowe lub łodygowe. Przypadek taki odróżnić należy od tego, w którym przykwiatek zdaje się być potrójnym, w skutek znajdowania się bezpośrednio obok niego dwóch przykwiateczków naprzeciwległych.

§ 228. Po większej części, przeobrażenie liścia w przykwiatek jest tém zupełniejsze, im takowy siedzi na osi dalszego rzędu w kwiatostanie; na jednym zaś i tym samym kwiatostanie, można niekiedy znaleźć od spodu do wierzchołka, wszystkie przejścia, któreśmy dopiero wymienili. Taka różność, może czynić zawikłaném opisanie, które wspominając o niej w ogóle, musi ją jednak należyście określić.

Kiedy blaszka liścia tworzy przykwiatek, ten może obok kształtu szerszego, przypominającego mniej więcej liść, zachować budowę tegoż i barwę zieloną, a wtedy nazywa się *liścio-watym*. W innych przypadkach skraca się i grubieje w łuskę, lub cieńszeje i zmienia się w błonę barwną lub przezroczystą, w którymto razie zwykle tworzy część pochwowatą. Kiedy ogranicza się na cienkiej tylko wiązce naczynnej, przybiera postać nitki, lub krótkiej osi, albo wreszcie maleńkiego tylko ciernia, zwykle tegiego i czarniawego.

Często przykwiatek zaczyna przybierać barwę kwiatów, a wtedy mniej lub więcej żywe odcienia tychże, znajdujemy w nim albo bledszemi, albo równie natężonemi; zwykle przylistek taki bywa szeroki: przykładów dostarczają dosyć pospolite rośliny, jak szalwia brazylijska (*Salvia splendens*) z przykwiatkami szkarłatnemi, niektóre pszenice (*Melampyrum*), it. d.

W skutek obrócenia się blaszki w przykwiatek, takowy ma zwykle brzegi całe; niekiedy jednakże znajdujemy je rozcięte w zęby, lub wycinki mniej więcej głębokie (np. u pszciców).

§ 229. Przykwiatki mogą zostawać długi, lub nawet nieoznaczony czas przy nasadzie szypułki; lecz najczęściej stawowiąc i wcześniej opadają: należy to dokładnie wiedzieć, aby kwiatostanów posiadających przykwiatki nie opisać jako bezprzykwiatkowych; wtedy więc zapewnić się o tém należy, kiedy kwiatostan mało jeszcze jest rozwinięty.

§ 230. Przykwiatki oprócz przypadków wyjątkowych kwiatostanu zewnątrz kątownego (§ 225), muszą zachowywać względem siebie stosunki ułożenia szypułek: kiedy te ostatnie w skutek skrócenia osi wspólnej wychodzą z jednego punktu, albo z punktów bardzo blizkich, jak w baldaszku i kwiatogłównie, przykwiatki znajdują się także w jednej wysokości, i tworzą około osi rodzaj okółka lub różyczki, która się zwykle zowie *pokrywą* (*involucrum*), i w której one noszą imię listeczków, lub niekiedy łusk z przyczyny swego utkania. Jeśli kwiatostan jest złożony, to oprócz pokrywy u spodu kwiatostanu ogólnego, znajdujemy podobną u spodu każdego z cząstkowych: takie nazywają się drobniale *pokrywkami* (*involucella*). Tak w baldaszkowych, baldaszeczki są *pokrywkowe* (fig. 187, 1''), baldaszek zaś ogólny *pokrywowy* (fig. 187, 1'). Można także na oznaczenie tych okółków przypadkowych, użyć dość znamionującego wyrazu *kołnierzyk* (*collerette*); ten zaś może być ogólny lub cząstkowy.

Listeczki pokrywy mogą być ułożone, albo w okółek pojedynczy (*jednorzędowe*), jak to właśnie najczęściej bywa u baldaszkowych, albo też mogą być *wielorzędowe*, jak to często spostrzegamy w kwiatostanach tak zwanych złożonych. W tym ostatnim przypadku, przyciśnięte są jedne od drugich; zewnętrzne okrywają spód wewnętrznych naksztalt dachówek, dlatego też zowią się dachówkowatymi (fig. 189, 1, b). Jeśli są bardzo liczne, można z łatwością rozpoznać, iż są ułożone w wężownicę powtórne: przykwiatki karczochu, które zowią liśćmi, dają przykład dobrze znajomy. Niekiedy jednakże ułożenie to nie daje się spostrzedz, a to wtedy, kiedy przykwiatki są nieliczne, mianowicie zaś, kiedy są osadzone dwoma rzędami, w których listeczki zewnętrzne mniejsze, nie są podobne do wewnętrz-

nych. Niektórzy oznaczają ten ostatni sposób ułożenia imieniem *pokrywy kieliszkowatej* (invol. calyculatum).

§ 231. Listeczki pokrywy bywają albo zupełnie wolne, albo zrastają się pomiędzy sobą, czyto przy nasadzie tylko, czy też w całości: według pierwszego lub drugiego z tych przypadków, nazywamy pokrywę *oddzielno-listeczkową* lub *zrostlo-listeczkową*. Jeśli listeczki te same stoją w jednym rzędzie, tworzą kołnierzyk albo cały, albo porozcinany na brzegu (np. u przewiertników *Bupleurum*); jeśli stoją w wielu rzędach, tworzą



201.

jakby kubek najeżony od zewnątrz łuskami lub kolcami, będącemi kończyną wolną listeczków zrosniętych z sobą w reszcie swęj rozległości. Taki jest początek *miseczki* (cupula) [fig. 201 c]. Łupina kolczysta kasztanu, jest podobnikiem miseczki: jestto pokrywa, której skóra korowata i brunatna stanowi znowu pokrywkę, zamykającą wiele kwiatów, jak o tem przekonywa wielość owoców zawartych często w jej wnętrzu. Widzimy, iż wszelkie podobieństwo z liściem zacięra się tu zupełnie, w skutek szeregu przeobrażeń i zrosnięć, które tak często stają zmysłem naszym na przeszkodzie, w dokładnem poznaniu faktów.

§ 232. Rozumię się, że kiedy przykwiatki zrastają się w wielu rzędach z sobą, kwiaty mogą się rozwijać tylko w kątach tych, które leżą najwyżej; lecz to zdarza się także w przypadkach, gdzie przykwiatki są zupełnie wolne, i zwykle samo ułożenie dachówkowe pociąga za sobą płonność pączków we wszystkich kątach listeczków zewnętrznych kwiatogłówki, lub korszyczka. Często w takim razie listeczki zewnętrzne rozwijają się znacznie; te zaś, które w kątach swych noszą kwiaty, są mniejsze i odmiennego kształtu. Tak np. u karczochu, którego osadnik, część mięsista, jadalna, otoczona listeczkami płonnymi, długimi, grubemi i zielonemi, nosi na całej swęj górnej powierzchni pomiędzy kwiatami, inne, krótkie przykwiatki, białe i białawe; tę to część odrzucamy pod imieniem nitek lub włókien.

201. Żołądź dębowa. — c Miseczka utworzona przez zrosnięcie wielu przykwiatków, których widać jeszcze wolne końce, ułożone w węzownię.

Są rośliny, u których pod kwiatem samotnym znajduje się wiele przykwiatków płonnych, ułożonych w pokrywę oddzielno lub zrosło-listeczkowe, a które wtedy nazywają się kieliszkiem lub kielichem zewnętrznym. Piętno to posiadają proświrniki (*Hibiscus*), ślężawa (*Malope*), ślęzy i wiele innych ślazo-watych.

§ 233. Niekiedy pojedynczy przykwiatek otacza kwiatostan w części, lub zupełnie. Wspomnieliśmy już (§ 207) o uszku (*spatha*), które napotykamy u wielu jednoliściennych, około kłosa szczególnego przyrodzenia: pojedynczego w buławce, złożonego w rosochatce palm. Jestto gatunek liścia pochwo-watego u spodu, często zwiniętego w trąbkę, niekiedy przed-dłużonego na końcu jakoby w języczek boczny; raz zielonego (jak w obrazkach pospolitych) [fig. 185, b], drugi raz innej barwy (jak w czermieniu etjopskim [*Calla aethiopica*]). Jego brzegi, zwykle u spodu skrócone i niekiedy zrośnięte, rozszcze-piają się i oddzielają od siebie, jeśli kwiatostan, lub owoc gru-biejąc, rozpięra ściany wydrążenia, które się stało za szczu-płm. Niekiedy uszko dzieli się w takich przypadkach na dwie części, czyli ściany, ponieważ się składało z dwóch przykwia-tków zrośniętych lub odosobnionych, z których zawsze jedna musi być zewnętrzną względem drugiej, według prawa stałego naprzemian — ułożenia liści roślin jednoliściennych. Czasem na innych, wyższych punktach buławki, znajdują się pod pojedyn-czemi kwiatami, lub też u spodu małych kupek kwiatowych, przykwiatki mniejsze zwane *uszczkami* (*spathellæ*). Uszko jest jak się zdaje, przeznaczoném do ochrania kwiatostanu w pierwszej jego młodości; gdyż w tym czasie osłania go za-wsze, chociaż u wielu roślin (np. u ożypalki, potosów i t. p.), nie rozwija się potem w tym samym stosunku, owszem ode-pchnięte zostaje u spodu kłosa, albo nawet wcześniej odpada. Wreszcie, podobne urządzenie daje się spostrzegać u wielu dwu-liściennych, gdzie okrywa ta niekiedy przez analogją nazywana uszkiem, a którąby właściwiej nazwać można *pokrywą uszko-watą*, powstaje zwykle z połączenia, lub zbliżenia dwóch wiel-kich naprzeciwległych przykwiatków.

§ 234. W trawach, u spodu małych kłosów czyli kłosków, które przez długi czas uważano za kwiaty, a które są właśnie ułożone albo w kłos ogólny, albo w kiści, spostrzegać się dają zwykle dwie łuski zielone, zwane *plewami* (*glumæ*), odpowia-

dające uszkom. Takowe damy bliżej poznać, kiedy przy opisie pojedynczych rodzin, przyjdziemy z kolei do traw.

NARZĘDZIA PRZEKSZTAŁCONE.

§ 235. Śledziliśmy roślinę we wszystkich stopniach jej rozwinięcia od pierwszego ukazania się zarodka, aż do wydania kwiatu, który ją kończy; widzieliśmy, iż różnaitość na pozór niezmierna jej narzędzi, zależy rzeczywiście od różnaitości kształtów przybieranych przez małą tylko liczbę narzędzi zasadniczych; nakoniec przejrzelismy najpospolitsze z takowych kształtów. Badanie tych przeobrażeń, odgadywanie niejako narzędzi w tych przybranych postaciach, stanowi jedną z podstaw botaniki, która bez tego nie mogłaby porównać z sobą niezliczonych gatunków, jakie ma rozróżniać i porządkować. Od czasu jak umiejętność wyszła ze swego niemowlęctwa i obrała tor filozoficzny, musiała zająć się tą organologją porównawczą, która, w ostatnich szczególniej czasach, została uproszczoną i udoskonaloną przez gienjalne teorje i liczne zastosowania, a która przybrawszy nowy zwrot, musiała także przybrać nowe imię *morfologii* (μορφη, kształt). Najbezpieczniejszą przewodniczką w tej nauce o kształtach, jest znajomość stosunków stałych położenia jednych części względem drugich. Dlatego też staralismy się wynaleźć te stosunki, i sprawdzilismy je, śledząc każde narzędzie we wszystkich jego stopniowaniach; nie mogliśmy zaś pozostać w wątpliwości, co do istotnego przyrodzenia narzędzi, widząc, iż takowe pomimo wszelkich zmian postaci swojej, podlegają niezmiennie owym prawom względnego położenia. Do najtrudniejszych przypadków, które prawie koniecznie muszą wprowadzić w błąd postrzegacza, nie używającego owęj nitki, dla wydostania się z tego odmětu, należą przypadki, w których jedno narzędzie przywdzięwa zupełnie postać innego, i za takowe też pospolicie jest branném. I tak, widzieliśmy, że korzenie powietrzne, nadewszystko pnących się roślin, przybierają pozór gałęzi; widzieliśmy także, iż naodwrot gałązki biorą niekiedy postać korzeni, jak np. w ziemniaku (§ 190).

§ 2  
stać L  
przy e  
listn C  
dają  
niach,  
te (ne  
widzi  
jące  
wiązł  
współ  
nus),  
a w ga  
poglo.  
na poz  
główn  
dawni  
wiedz  
tylko  
kowe  
a pos  
liść p  
ki, z  
ściwy.  
kiedy  
ją z t  
gałązk  
przez g  
i innye  
szczon  
i właśn  
wy liśc  
tegie i

Z TA ŚMIENIE (*fasciatio*).

§ 236. Dostyc często można napotkać gałązki, mające postać liści, w skutek zmiany podobnej do tej, którąśmy opisali przy ogonku rozszerzonym w liściach (§ 141). Tak u drzewolistu (*Xylophylla*), gałęzie obłe wydają w ostatnich swych rozgałęzieniach, rozszerzenia zielone liściowate (fig. 202, *r*), na obwodzie których widzimy nie bez podziwienia, wyrastające w pewnych odległościach małe wiązki kwiatów (*f*). U myszopłochu współpłciowego (*Ruscus androgynus*), kwiaty ułożone są podobnie, a w gatunkach *Ruscus aculeatus* i *hypoglossum*, takowe wychodzą także na pozór z liścia, lecz tylko z nerwu głównego. W tychto razach mówiono dawniej o kwiatostanie nalistnym. Lecz wiedząc, że kwiaty mogą wychodzić tylko z gałązek, rozpoznamy zaraz takowe w mniemanych owych liściach, a posuwając badanie dalej, ujrzymy liść prawdziwy w postaci małej błonki, z której kąta wyrasta liść niewłaściwy. Przyrodzenie potwierdza niekiedy te wypadki teorii, wyprowadzając z tych liściowatych, inne podobne gałązki, tak jak tamte wydane zostają przez gałęzie, równie jak w opuncjach i innych cierńcach osi kwiatowe splecione wychodzą jedne z drugich, i właśnie z tamtymi porównane być mogą, gdyż nigdy właściwy liść nie wyrasta z drugiego liścia. Wreszcie, samo utkanie tęgie i drzewne owych narzędzi, nie jest wcale utkaniem liści.



202.

202. Gałązka liściowata *r* drzewolistu (*Xylophylla longifolia*). — *fff* Wiązeczki kwiatów, które z niej wychodzą.

Nazwano *ztaśmieniem* niezwykle rozkład wiązek drzewnych gałązki, które zamiast pozostać w pęczku obłym, układają się równolegle obok siebie



203.

jakby w taśmę (*fascia*). Szeroki i gruby grzebień (fig. 203), który u grzebionatki (*Celosia*), rośliny pospolitej w naszych ogrodach uprawianej, nosi kwiaty na rozszerzonej kończyźnie łodygi, jest spłaszczeniem taśmowatym. Podobne zmiany widzimy często na wypustkach szparagu, na gałązkach jesionu, warzyczku, i t. p., lecz w tych razach jest to wyjątkiem, przypadkiem dziwotworności.

WĄS Y (*cirrhī*).

§ 237. Mieliliśmy już poprzednio sposobność mówienia o wąsach winorośli (§ 185, fig. 172 v' v''), i widzieliśmy, że takowe były przeobrażeniem kwiatostanu, którego kwiaty spleśniały, a szypułki zmniejszone co do liczby, niekiedy nawet sprowadzone do jednej tylko (głównej), przedłużyły się w nitki zielne i giętkie, posiadające własności obwijania się około przedmiotów jakie napotykają. Są to więc ostatnie gałązki pnącej się łodygi, dające się porównać do młodych jej pędów; lecz w tym różnie od prawdziwych gałązek, że liście ich wcale się nie rozwijają. Wiemy, że w winorośli wąsy te, zastępujące kwiatostan wierzchołkowy odepchnięty w bok, leżą naprzeciw liści. U większej liczby roślin opatrzonych wąsami, takowe zajmują miejsce zwykłe kwiatostanom, czyto na końcach gałązek, czyli też w kątach liści, np. u męczennicy (*Passiflora*). Bywają przypadki, iż przeobrażenie nie jest zupełnym, i kwiatostan obok szypułek kwiatonośnych, przedstawia inne zmienne w wąsy. Niekiedy nie gałązki ani szypułki, ale inne narzędzia zostają w wąsy przeobrażone: mianowicie różne czę-

203. Wierzchołek łodygi grzebionatki (*Celosia cristata*), rozszerzone w rodzaj grzebienia mięsistego, gęsto pokrytego przykwiatkami ostro zakończonemi; u góry zaś noszącego kwiaty.

ści samego liścia. Wtedy same tylko nerwy przedłużają się pod tym kształtem, i albo nerw główny stanowi wąż pojedynczy na końcu liścia (np. u *Flagellaria indica*, *Methonica gloriosa*), albo też częściej wąż jest złożony (np. u grochu, wyki, groszku). U roślin tych wąsy kończące pierzaste ich liście, wydają często po bokach nitki, powstałe z przeobrażenia najwyższych listków. Nie rzadko zdarza się, że miękisz znika całkowicie w liściach zmienionych i ograniczających się albo na większych nerwach, a wtedy wąż jest gałęzisty, albo na samym tylko nerwie głównym, w którymto razie wąż jest pojedynczy (np. u *Lathyrus aphaca*). Ponieważ nerw główny i ogonek są przedłużeniem tej samej wiązki, przeto wąsy te nazywają *ogonkowemi*.

W bardzo rzadkich razach, wiązki boczne części pochwo-  
watęj przechodzą w wąsy, a wtedy liść przy nasadzie swojej posiada takowych dwa, w miejsce przylistków, po jednym z każdej strony; zdaje się, że taki jest porządek wążów kolcowoju.

W każdym z tych przypadków, miejsce z którego wychodzą wąsy, wskazuje jakie narzędzie zostaje w ten sposób zmienione, jeśli wąż powstał z przeobrażenia wielu osi różnego rzędu, jak u winorośli, spostrzedz można często przy nasadzie każdej nitki bocznej, maleńki nierozwinięty liść, z którego kąta właśnie wychodzi nitka.

C I E R N I E (*spinae*).

§ 238. Wszystkie te narzędzia, które przechodzą w wąsy, mogą przybierać inną jeszcze postać, zupełnie od tamtej różną, owszem prawie przeciwną, a tą jest postać cierni. Zamiast nitki giętkiej i miękkiej, jaką przedstawia wąż, mamy tu maleńką gałązkę skróconą, tęgą i ostro zakończoną, raz pojedynczą, drugi raz rozgałęzioną.

Najczęściej przemieniają się tym sposobem gałązki, a to, już cały ich ogół, jak w janowcu ciernistym (*Genista germanica*), w rodzaju *Colletia*, już też ostatnie z nich, albo nawet same tylko ich kończyny, które zamiast grubieć i wydawać pączki wierchołkowe, przeistaczają się i twardnieją. Te cierniste gałązki mogą zachować jeszcze w części swoje przyrodzenie, okrywając się liśćmi albo nawet kwiatami (jak

u tarni, fig. 204), lub też tracić je na pozór zupełnie, stając się wcale nagimi jak u bobodrzewu (*Gleditschia*). Jednakże rozbiór anatomiczny ich wnętrza, pokazuje zawsze tożsamość ich budowy z gałązkami.

Szypułki daleko rzadziej przechodzą w ciernie (np. u smagliczki ciernistej (*Alyssum spinosum*)).

W liściu może się to zdarzyć z wiązkami, należącymi do różnych jego części; tak: 1) nerwy główne mogą się przemienić w ciernie, chociaż pewna część miększu łączy jeszcze ich nasady, w którymto razie mamy blaszkę zakończoną, lub opatrzoną na brzegu swym cierniami dłuższymi lub krótszemi jak u ostów; niekiedy nawet miękisz znika zupełnie, jak to często ma miejsce u kwaśnicy (*Berberis vulgaris*) [fig. 205 f]. Czasami cierni powstaje z samego tylko ogonka. Często tworzy się on dopiero wtedy, kiedy się narzędzia starzeją: tak np. osadka liścia pierzastego niektórych traganków (*Astragalus*



204. Gałązka tarni (*Prunus spinosa*), zakończona cierniem.

205. Gałązka kwaśnicy (*Berberis vulgaris*), której liście *f f f* przybrały postać cierni rozgałęzionych. Z kąta każdego z nich wyrasta różyczka *r r r* liści zwyczajnego kształtu.


206. Liść złożony jednego z traganków (*Astragalus massiliensis*), którego osadka *r* kończy się cierniem.— *s* Przylistki ogonkowe.— *f f f* Listki osadzone w 9 par.

verus  
w mi  
nieki  
u nas  
stają  
śli m  
jeśli  
ma tu  
wnie  
części

§ 2  
który  
o tkan  
mi po  
razem

207.  
acacia  
208  
sęczki  
f f f

*verus*) i t. d., przechodzi w cieriń po opadnięciu listków, które w młodej roślinie nosiła (fig. 206). 2) Przylistki twardnieją niekiedy i tworzą dwa krótkie cieriń przy nasadzie liścia, jak u naszej akacji (*Robinia pseudoacacia*) [fig. 207]. Sęczek stając się cierińowatym (fig. 208), łatwo daje się poznać, jeśli ma jeden tylko koniec ostry, leżący tuż pod liściem; lecz jeśli ma dwa końce, nie tak snadno rozeznac można. Nie ma tu potrzeby powtarzać, że początku cierińi dochodzimy również jak wąsów, na stosunku ich położenia względem innych części rośliny.



207.

208.

§ 239. Pozostaje nam jeszcze mówić o kilku narzędziach, których rozbiór można było wprawdzie umieścić w rozdziale o tkance komórkowej lub o korze, gdyż one są tylko osobnymi postaciami tej tkanki (osobliwie też korowej); lecz że zarazem obecność ich nie jest stałą i tylko miejscową, stosowniej

207. Niższa część liścia złożonego niewłaściwej akacji (*Robinia pseudoacacia*), którego przylistki *s s* przybrały postać cierińi.—*b* Gałąź.—*r* Osadka.

208. Gałązka gatunku porzeczki (*Ribes wa crispa*), na której widać sęczki *c c c* liściowe, rozwijające się w kolce pojedyncze lub potrójne.—*f f f* Spody liści.—*b b* Pączki powstające w kątach liści.

przeto było odwlec badanie ich aż dotąd, niż przerywać rozbiór ogólny owych tkanek.

K O L C E (*aculei*).

§ 240. Zaczniemy od kolców, jako stanowiących przyrodzone przejście od cierni, o których mówiliśmy dopiero, i z którymi długi czas brane były za jedno. Tak nazwane *ciernie róż* mogą nam tu posłużyć za przykład. Uważając je z zewnątrz, spostrzegamy zaraz, że nie zajmują wcale stałego miejsca na gałęzi, lecz, że bywają jużto oddalone, już zbliżone bez żadnego porządku; widzimy także iż słabo się tylko na roślinie trzymają, i że nie wiele potrzeba, aby je od niej oddzielić w całości. Rozbiór pod mikroskopem okazuje, że się składają z samej tylko tkanki komórkowej, podobnej do tkanki pokładu korkowego, równie prędko jak tenże tracącej soki i żyjącej tylko u spodu, którą też częścią narzędzie samo, zresztą suche i stwardniałe, wzrastać może. Te przeto ciernie róż nie mogą być porównane z cierniami, które powstają w skutek przeobrażenia narzędzia zasadniczego lub jego części, a które tém samym zachowują prawidłowe położenie i utkanie włóknonaczynne. Słuszniej daleko porównałby je można z włosami, od których różnią się tylko większą grubością i skupieniem większej liczby komórek je składających. Kolce siedzą nietylko na łodydze i jej gałęziach, lecz także na liściach, a nawet na częściach kwiatowych, posiadających wyraźniejsze cechy liści, jednakże prawie wyłącznie tylko na ogonkach i nerwach. W ogóle mają kształt stożka, niekiedy prostego, najczęściej jednak zakrzywionego w haczyk, i zwykle są w jednym kierunku spłaszczone.

W Ł O S Y (*pili*).

§ 241. Już kilka razy przyszło nam wspomnieć o włosach, lecz tylko w stanie ich najprostszym, to jest kiedy każdy z nich powstaje z przedłużenia jednej tylko komórki naskórka (fig. 87). Komórka ta, tkwiąc dolną częścią między innymi, wystaje wreszcie swęj długości na zewnątrz i skierowana jest albo pionowo do powierzchni naskórka (fig. 209, 1), albo ukośnie, a to już, jak to najczęściej bywa z dołu do góry, już z góry na


dół (A  
szcic  
244).  
sto na  
mięwa  
go i c  
209,  
wa p  
nawer  
ły na  
że od  
cej k  
rozg  
choć  
jedno  
go do

Wie  
rek, k  
zetkni  
komór  
groda  
Zkadi  
rzony  
jąc na  
1), al  
albo n  
wresz  
Kiedy  
dзелеk  
fig. 21  
wnoleg  
całe r  
bą ko  
swęj d  
jącej,

209.  
ka e. —  
kiewnik  
gęsiówk

dół (*pili retrorsi*; włosy wsteczne; fig. 87), albo też wreszcie prawie równoległe (*pili adpressi*; wł. przytulone, fig. 214). Powierzchnia tej komórki bywa albo równa, albo też często najeżona małemi nierównościami (fig. 210, 4); włos taki miéwa postać stożka długiego i cienkiego, lub igły (fig. 209, 1); niekiedy jednak bywa prawie walcowaty, albo nawet pałeczkowato zgrubiały na końcu. Nakoniec, może od razu brać dwa lub więcej kierunków (fig. 209, 2), rozgałęziać się (fig. 209, 3), chociaż wewnątrz jego przedstawiać będzie zawsze wydrążenie jednociągłe. Niezawsze zaś dzieli się tym sposobem od samego dołu, ale niekiedy w pewnej dopięro wysokości.


Wiele włosów składa się nie już z jednej, ale z wielu komórek, końcami z sobą zrosniętych; ponieważ zaś powierzchnie zetknięcia, któremi na sobie stoją lub któremi się zrastają te komórki, zdają się przerywać jednociągłość włosa tyluż przegrodami, przeto też włosy takie zowią się poprzegrodzanemi. Zkądinąd kształty ich są prawie takie same jak włosów utworzonych z jednej tylko komórki: stożkowate, gdy komórki stoją na sobie, zmniejszają się od dołu do góry włosa (fig. 209, 1), albo walcowate, gdy komórki mają średnicę prawie równą; albo maczugowate, gdy komórki wyższe są coraz szersze; albo wreszcie rozgałęzione mniej więcej w drzewko (fig. 210, 2). Kiedy wiele włosów wychodzi z jednego punktu, tworzą pędzelek (*pili penicillati*), lub gwiazdkę (*pili stellati v. radiati*, fig. 210, 3), podług tego jak rozchodzą się ukośnie, lub równoległe względem powierzchni naskórka. Ostatnie cechują całe rodziny roślin (np. ślázowatych). Komórki połączone z sobą końcami, mogą pojedynczo wzięte, nie posiadać w całej swéj długości, średnicy równéj, lub stopniowo się zmniejszającej, lecz mogą zwięzać się albo w środku, albo, co częściej



209.

209. Włosy utworzone z pojedynczych komórek wychodzących z naskórka e. — 1. Włos prosty. — 2. Włos widelkowaty wzięty z gatunku rzodkiewniku (*Sisymbrium sophia*). — 3. Włos gałęzisty wzięty z liścia gatunku gęsiówki (*Arabis alpina*).

na kończynach swoich, co nadaje włosowi postać małego różańca (*p. moniliformes*; fig. 210, 4).



210.


Włos złożony niezawsze powstaje z jednego rzędu komórek, owszem czasami widzieć można wiele takowych rzędów w jednakowej wysokości obok leżących. Jestto pierwsze przejście do kolca, który się jednak tém różni, że wyrasta z głębszej warstwy.

Badanie za pomocą szkła pokazuje, że komórki włosów składają się z podwójnej błony. To dlatego, że naskórek, jakżeśmy to widzieli (§ 48, fig. 93) powłóczy włosy, równie jak resztę naskórka, tworząc tyleż pochewek, przez co błona właściwa każdego włosa przyodziana jest drugą zewnętrzną.

§ 242. Włosy rozbiegające się nakształt promieni z jednego punktu, zrastają się niekiedy z sobą, zapewne za pomocą naskórka, który powłóczy cały ich ogół, a wtedy, zamiast

210. Włosy złożone, utworzone z wielu komórek. — e Naskórek, z którego włos wychodzi. — 1. Włos poprzegradzany prosty, wzięty z łodygi przestępu zwyczajnego (*Bryonia alba*). — 2. Włos gałęzisty, wzięty z kwiatu rośliny *Nicandra anomala*. — 3. Włos gwiazdkowy, wzięty z liścia topolówki różowej (*Althaeae rosea*). — Włos paciorkowaty, wzięty z firletki płomieńczyku (*Lychnis chalcidonica*); powierzchnia jego cała najeżona jest małemi chropowatościami.

gwiazdy, tworzą rodzaj blaszki błoniastej (fig. 211), połączonej środkowym tyłko punktem z powierzchnią, która je nosi i oddzielającej się z łatwością, jak owe małe łuszczyki, które się odłupują od skóry. Włosy takie nazwano *łuszczkowatemi* lub *tarczowatemi* (*p. squamosi* v. *scutati*, albo też pojedynczym, z greckiego wziętym wyrazem *lepis*). Posiadają one zwykle świetny, a czasami jakby metaliczny połysk, jak np. w liściach przewierzbwiatych (*Elaeagneae*).



211.

Obok tych, wspomnieć należy o innych rozszerzeniach łuszczkowatych lub błonowatych, które zamiast siedzieć na powierzchni rośliny środkiem, przylegają do niej całym, najszerszym swoim brzegiem. Są to jakby zagięcia naskórka, albo raczej jakby włosy złożone, powstałe ze zrosnięcia znacznej liczby komórek, i rozciągnięte wszcz, zamiast wzdłuż. Nazwano je *pakołuszczkami* (*pili ramentacei*, lub jednym wyrazem *ramenta s. vaginellae*). Znajdujemy je bardzo rozwinięte, na ogonkach i blaszkach liści wielu paproci. Barwa ich staje się zwykle brunatną.

§ 243. Rozumić się, że włosy będące tylko komórkami przedłużonymi i wystającymi nad inne, napotykają się wszędzie, gdzie wystawanie to jest możnem; w istocie też znajdujemy je w wydrążeniach wewnętrznych niektórych roślin, np. w przetrwach łodygi lub ogonku grzybienia i innych roślin wodnych. Jednakże to tworzenie się wewnętrzne jest właściwie raczej wyjątkiem tylko, najpospoliciej zaś znajdujemy je na naskórku rozmaitych części roślinnych, szczególnie na częściach wystawionych na powietrze, lubo dają się niekiedy widzieć i na takich, które zpod jego wpływu są usunięte, jak np. na nasionach, lub na powierzchni wnętrza komór owocu, który je zawiera, tudzież dość zwykle na młodych korzeniach, jakśmy o tém gdzieindziej już mówili (§ 115).

211. Łuszczyka, czyli włos tarczowaty, wzięty z liścia rokitnika (*Hippophae rhamnoides*).

W znacznej liczbie znajdują się częstokroć na gałązkach i liściach, na tych zaś ostatnich daleko częściej i obficiej na powierzchni dolnej; na nerwach i ogonkach. Obecność ich i czynności, zdają się stać w stosunku z młodością tychże części, z przyływem soków, któremi podówczas są napełnione, i z żywością parowania, które się oczywiście z okolicznościami temi łączyć musi, a które powściągać jest jak się zdaje przeznaczeniem włosów. Niezawsze powstają coraz nowe włosy, w miarę jak powierzchnie powiększają się w skutek rozszerzenia części, które się już starzeją. Włosy tworzące zrazu gęstą powłokę na naskórku, oddalone od siebie powiększającemi się przestrzeniami, pokrywają go w końcu tylko niedokładnie. To jest przyczyną, że włosy tak liczne na młodych pędach, zdają się znikać, skoro te rozwiną się do pewnego stopnia. Czasami oddzielają się rzeczywiście lub usychają, i rzadko tylko znaleźć je można na korze wyrosłych gałęzi roślin drzewnych.

§ 244. Wymieniliśmy najpospolitsze kształty włosów uważanych pojedynczo. Zwykle w opisach wspomina się o tych tylko, które można spostrzedz gołym okiem, lub za pomocą szkła powiększającego, tak, mówimy o włosach pojedynczych, lub tym albo owym sposobem rozgałęzionych, nie wglądając w to, czyli są jedno, czy wielokomórkowe; co też w istocie nie zdaje się być rzeczą wielkiej wagi, ponieważ można znaleźć obadwa te rodzaje, jeden obok drugiego.

Za to przy opisie, staramy się oznaczyć powierzchowność, jaka powstaje z połączenia mniej lub więcej licznych włosów na jakiej części roślinnej; wypada zatem dać poznać główne odmiany, jakie się pod tym względem spostrzegać dają, tudzież wyrazy używane na oznaczenie takowych. Wyrazy te, są następujące:

*Gładki* (glaber), oznacza stan powierzchni wcale ogołoconej z włosów. *Glabratus* (zglądzony), pozbawiony włosów.

*Włosisty* (pilosus), opatrzone włosami.

*Omszony* (pubescens), opatrzone włosami miękkimi, dość krótkimi i dość rzadko osadzonemi, słowem, jakby meszkiem (*pubes*), który porównać można z meszkiem brody młodzieńca.

*Kosmaty* (villosus), pokryty długimi, miękkimi, nieco krzywymi włosami.

*Jedwabisty* (sericeus), pokryty włosami leżącymi, cienkimi, mającymi mniej więcej świetny połysk.

*Szorstki* (hispidus, hirtus), najeżony włosami tęgimi, nieleżącymi.

*Kudłaty* (hirsutus), trzyma środek między szorstkim a kosmatym.

*Aksamitny* (velutinus), pokryty puszkami krótkimi, rzadkim jak aksamit.

*Pilśniowy* (tomentosus), pokryty włosami kędzierzawymi jak bawełna, spletanymi jakby w pilśni (*tomentum*); taki stan wynika w ogóle z nagromadzenia włosów pędzelkowatych, lub promienistych.

*Wełnisty* (lanatus, lanuginosus), pokryty włosami długimi, miękkimi, pokrzyżowanymi jak wełna.

*Tarczowłosisty* (lepidotus), pokryty tarczami łuszczkowatymi.

*Łuszczkowaty* (ramentaceus), z porozrzucanymi łuszczkami.

Jeżeli włosy, uważane nie już na powierzchni, ale na jej brzegu, za który przechodzą, są dosyć tęgim i nieco oddalone od siebie, nazywają się *rzęsami* (ciliae); jeśli siedzą kępami, biorą nazwisko *brody* (barba), z kądem przymiotnik *brodaty* (barbatus).


Niema potrzeby określać odcieni, które się wyrażają przymiotnikami zdrobniałymi: *glabriusculus*, *pilosiusculus*, *villosiusculus*, *tomentellus*, *hispidulus*, *ciliolulatus*, oznaczającymi stan powierzchni, na której włosy są względnie krótsze, rzadsze i t. d.

#### GRUCZOŁY (*glandulae*).

§ 245. Nazywamy gruczołem, u roślin, jak i u zwierząt, przyrząd zawierający płyn osobnego przyrodzenia, różny od tych, które w reszcie ciała są zawarte; płyn, który w skutek czynności narzędzi składających przyrząd zostaje *wydzielanym*, to jest otrzymywanym z istot zostających w związku z owymi narzędziami. W roślinach czynność tę podejmuje zawsze tkanka komórkowa, która się niczém nie różni od tkanki o jakiejś mówiliśmy poprzednio. Rozpoznajemy ją tylko przez

jój zawartość, gdyż z kształtu niepodobna wnosić o jój działalności; dlatego też narzędzia, uważane dzisiaj za gruczołowe, były długo zamieszane z innymi, które nie wydzielają żadnego szczególnego płynu, np. tak nazwane włosy gruczołowe z właściwemi włosami.

§ 245 a. **Włosy gruczołowe.** — Te włosy wydzielające posiadają nawet niekiedy jeden z kształtów, jakieśmy dopiero



212.


widzieli, a to bez najmniejszej odmiany. Nie spostrzegamy w nich żadnej różnicy, prócz płynu zbierającego się w ostatnich komórkach i wysączonego się ztamtąd. Częściej jednakże własność wydzielania połączona jest z małą zmianą postaci, zwykle ze zgrubieniem wierzchołkowym. Jeśli włos składa się z jednej tylko komórki, ta albo rozszerza się w całej swój

212. Włosy gruczołowe. — e Naskórek, z którego włos wychodzi:

1. Włos utworzony z jednej komórki, wzięty z *Sisymbrium chilense*.
2. Włos złożony z wielu komórek, a zakończony jedną z nich, wydzielającą, wzięty z szypułki wyżłinu większego (*Antirrhinum majus*).
3. Włos złożony z wielu komórek, a zakończony dwiema wydzielającemi zrosniętymi z sobą, wzięty z szypułki bazanowcu pospolitego (*Lysimachia vulgaris*).
4. Włos złożony z wielu komórek, zakończony kilku takowemi, wydzielającymi, zrosniętymi końcami, wzięty z kuklika goździkowego (*Geum urbanum*).

rozległości (1), albo tylko u wierzchołka, a to kulisto, jajo-  
wato, lub maczugowato (fig. 212, 1); jeśli zaś składa się  
z wielu komórek, wtedy zawsze najwyższe z nich są wydzie-  
lającymi, a to albo sama tylko ostatnia (fig. 212, 2), rozsze-  
rzona w jedną z dopiero przytoczonych postaci; albo też kilka  
wierzchołkowych, umieszczonych czyto końcami na sobie  
(fig. 212, 4), czy też w jednej wysokości po dwie obok siebie,  
(fig. 212, 3), czyli wreszcie po cztery ułożone w krzyż i t. d.,  
albo nakoniec wiele, połączonych w jedną bryłkę, która stanowi  
nabrzmiałość włosa. Inne komórki leżące pod tamtymi, są  
zwykłej budowy i przytwierdzając gruczoł jedno lub wieloko-  
mórkowy do naskórka, podnoszą go w górę i stanowią jego  
trzonek.

§ 245 b. Za wcale odmiennie zbudowane uwa-  
żano *włosa parzące* (setae urentes), których  
ukłócie sprawia dojmujące świerzbie: np. u po-  
krzywy. Przypuszczano, że płyn wydzielony zo-  
staje w kupce komórek gruczołowych, ukrytej  
pod naskórkiem, i że ze środka tej kupki wyrasta  
włos, przez którego kanał jad przechodzi i wy-  
lewa się w ranę, właśnie jak w zębie żmji, za-  
wierającym kanał, który spólniczy z małym gru-  
czołem leżącym u spodu zęba; lecz rzecz ma się  
wcale inaczej. Włosa pokrzywy (fig. 213), ożwi  
(*Loasa*), niektórych obrzydłców (*Jatropha*),  
składają się wszystkie z jednej tylko komórki  
stożkowatej, dłuższej i tęgiej, rozszerzonej u spo-  
du jakby w cebulkę (*b*) i zakończonej z drugiej  
strony małym guziczkiem, prosto lub nieco z bo-  
kū siedzącym (*s*). W tęto komórce tworzy się  
płyn piekący; a kiedy takowa utkwii w skórze,  
łamiąc się, zostawia w niej kończynę swoją nie




213.

(1) Do takich gruczołów, ograniczających się na jednej tylko powierzchownej komórce, i prawie beztrzonkowych, policzyć należy owe żółtawe ziarenka, znane pod imieniem *gorczychiemlowej* (lupulinum), które się tak obficie znajdują rozrzucone na liściach, przykwiatkach i kwiatkach chmielu. Są to pęcherzyki pojedyncze, wypełnione płynem i pierwiastkami żywicznymi, gorzkiemi, które w końcu twardnieją i same tylko pozostają, a w których zawarte są własności, dla jakich roślina ta jest powszechnie używana.

213. Włos pokrzywy zwyczajnej (*Urtica dioica*), stożkowaty, zakończony nabrzmiemieniem *s*, czyli guziczkiem, u spodu cebulkowato rozszerzony *b*.

łatwą do wydobycia, z powodu owego guziczka. Zład podwójna przyczyna drażnienia: obecność ciała obcego i szczególna własność jego zawartości.

§ 245 c. Liczono także do włosów parzących, godne uwagi pod względem postaci swój, włosy niektórych nagwiazdek (np. *Malpighia urens*, *fucata* i t. d., fig. 214); sąto jakby długie, bardzo wąskie czółenka, środkowym punktem do liścia



214.

przytwierdzone. Punktowi temu odpowiada otwór okrągły, prowadzący do kanału zajmującego wnętrze włosa, i zatkanego maleńkim gruczołem (*g*), leżącym tuż pod naskórkem liścia. Mniemano, że włos taki, utkwivszy w skórze, wylewa w nią płyn wydzielony w gruczołku. Lecz włos ten, nadzwyczaj tegi i posiadający niezmiernie grube ściany, nadewszystko na obudwu swych końcach, nie jest czczy w tém miejscu, i nie przyłamuje się w ranie, o czém się łatwo, wyjąwszy go przekonać; nie może przeto wlewać w ranę płynu, i drażni tylko jako zwykły cieri: drażnienie ustaje natychmiast po jego wyjęciu. Nadano włosom tym leżącym, osadzonym środkiem swym na gruczole, nazwę włosów czółenkowatych (*p. malpighiacei*), i często mieszano je z innymi włosami leżąciami, mająciami postać czółna; lecz nieobecność gruczołów w tych ostatnich, stanowi ważną między nimi różnicę.

§ 246. **Gruczoły właściwe.** — Przejście od włosów gruczołowych do samych gruczołów, jest prawie nieznaczne. Mając przed sobą kupkę komórek wydzielających bez trzonka, lecz zwięzoną przy nasadzie i siedzącą w naskórku, nazwiemy ją włosem złożonym beztrzonkowym? czy też gruczołem powierzchniowym krótko-trzonkowym? Lecz wszakże nazwisko mało tu znaczy; w podobnych przypadkach spostrzedz się dają dwie nieco ważniejsze odmiany: 1<sup>o</sup> gruczoł jest wydrążony

Spód ten otoczony jest komórkami naskórka *ue*, który się w tém miejscu podnosi, stanowiąc podporę włosa. W wydrążeniu włosa widać strumyczki istoty ziarenkowatej *ff*.

214. Włos *p* z *Malpighia fucata*, na kawalku naskórka *e*. — *g* Gruczołek łączący je z sobą przez zagłębienie się częścią w naskórek, częścią w otwór leżący w środku włosa.

wewr  
rek  
wnat  
stopi  
grucz  
przyt  
naksz  
żynac  
wierz  
podst

§  
szu k  
nasko  
powle  
zmien  
mi n  
szą g  
§ 2  
gują  
aktó  
wyd  
barw  
mi,  
patrz  
świę  
ruty  
demu  
tych  
ste, s

215  
ciety F  
ścianę  
różow  
216  
postać  
217  
utwor  
przet  
liścia,  
i twor.

wewnątrz, a ścianę jego stanowi jedna tylko warstwa komórek (fig. 215); 2<sup>o</sup> gruczoł jest mięszyszy, nieposiadający wewnątrz żadnej przerwy. Znajdujemy też stopniowe przejścia od tego trzonkowego gruczołu (fig. 216) do innych, które przytwierdzone są szeroką podstawą, nakształt brodawki. Tak, w różach, jeżynach, znajdujemy gruczoły, których wierzchołek jest mało co szerszy od podstawy.




215.

216.

§ 246 a. W innych razach, gruczoły leżą wewnątrz miększu korowego, jednakże zwykle nie głęboko, owszem tuż pod naskórkiem; a nawet i wtedy nierzadko wystają na zewnątrz, powleczone samym tylko naskórkiem, niekiedy cokolwiek zmienionym, który się układa według ich powierzchni. Czasami naskórek przerywany, otacza wokoło odkrytą część wyższą gruczołu.

§ 246 b. Pomiędzy temi wewnętrznymi gruczołami, zasługują na oddzielną uwagę te, które nazwano *pecherzykowatemi*, a które opatrzone ścianami przezroczystymi, wydzielając olejek lotny wcale, lub prawie bezbarwny, wydają się kropkami przezroczystymi, na zieloném tle liścia, jeśli na takowy patrzymy obróciwszy go ku światłu. Liście święto-jańskiego ziela, pomarańczy, mirtu, ruty (fig. 217), dostarczają znajomych każdemu przykładów i mogących posłużyć do tych poszukiwań. Widzieć tu można, że kropki te przezroczyste, składają się z kilku komórek *g*, większych od komórek



217.


215. Gruczoł wzięty z szypułki dyptanu białego (*Dictamnus albus*), rozcięty pionowo dla pokazania wnętrza *l*, napelnionego zielonym olejkiem. Ścianę wydrążenia stanowi jedna warstwa komórek *e* napelnionych sokiem różowym. — *e* Naskórek.

216. Gruczoł wzięty z róży stolistnej. — Gruczoły te miewają rozmaite postać. — *e* Naskórek.

217. Gruczoł pecherzowaty z liścia ruty (*Ruta graveolens*). — *gl* Gruczoł utworzony z dużych przezroczystych komórek, oddalonych i zostawiających przerwę między sobą przerwę środkową *l*. — *e* Naskórek powierzchni górnej liścia. — *uc uc* Komórki podłużne lub innych kształtów, napelnione zielenią i tworzące miększ liścia.

tkanki otaczającej *uc* i wietko z sobą spojonych. Niekiedy nawet jedne oddalają się od drugich, zostawiając pomiędzy sobą przerwę *l*, w której zbiera się płyn. Teto gruczoły tworzą prawie całą skórę owocu pomarańczy. Na białych kwiatach téjże, widzieć je także można w postaci kropek zielonawych, co dowodzi, iż płyn jest barwnym, pomimo swój przezroczystości.

Zawieralniki soków właściwych, gum i żywic, uważane za utwory wcale różne od gruczołów, są przerwami wysłanemi warstwą odrębnych komórek, w których się wyrabia, i z których się wysącza płyn owych zawieralników, zbliżających się zatem bardzo do gruczołów pęcherzykowatych i różniących się tylko położeniem daleko głębszém.



218.

§ 246 c. Po największej jednakże części, gruczoły wewnętrzne, są, przeciwnie jak w dotąd przytoczonych, ciemniejsze i utworzone z komórek, daleko mniejszych od otaczającej

218. Przecięcia pionowe gruczołu wziętego z podstawy ogonka jednej z nagwiazdkowatych (*Heteropterys chrysophylla*).—*p* Część ogonka.—*g* Gruczoł z tymże zrosnięty, pokryty naskórkiem *e*.—*f* Wiązka naczynna, która idzie wzdłuż gruczołu i zdaje się udzielać mu kilku odnózek. — Obok przedstawiono maleńkie cząstki tych samych narzędzi bardziej powiększonych: 1<sup>o</sup> części tkanki gruczołowej z naskórkiem *e*, komórkami wewnętrznymi okrągłymi *ur*; z tych niektóre zawierają kryształki; komórki zewnętrzne długie i nitkowate *ul*; 2<sup>o</sup> część wiązki włóknonaczynnej utworzonej w środku z cewek węzownicowych *t*, ku zewnątrz zaś z komórek drobnych, podłużnych *c*.

tkanki, ściśle z sobą zrosniętych, i nie zostawających w środku odbieralnika. Najwięcej jeśli pomiędzy nimi utworzy się kilka przerw przypadkowych. Niekiedy, jak to przynajmniej spostrzegamy w nagwiazdkowatych (fig. 218), całą powierzchnią gruczołu otacza warstwa komórek *ul*, zupełnie różnych od leżących wewnątrz *ur*. Są to jakby włoski tępe i bardzo cienkie, które powiększają powierzchnią gruczołu, powłócząc ją na kształt aksamitu.

§ 246 *d*. Istota wyrobiona w gruczołach, bywa albo płynną, albo dość gęstą, i posiada rozmaite własności, podług roślin, w których się tworzy. Widzieliśmy, iż zbiera się wewnątrz komórek ją wydzielających, albo też w przyległych zawieralnikach. Często wysąca się na zewnątrz, czyto że sama powierzchnia zewnętrzna jest wydzielającą, czyli też co prędzej, że przecieka przez ściany komórek. Wtedy, zostając w zetknięciu z powietrzem, zmienia często swe przyrodzenie, gęstnieje, i w tym stanie znajdujemy ją zwykle na powierzchni roślin.

§ 246 *e*. Upatrywano pewnego związku między gruczołami a cewkami węzownicowemi, i sądzono nawet, iż te wchodzą w skład gruczołów doskonalszych. Powiedzieliśmy wyżej, iż tkanka gruczołów jest wyłącznie komórkową. Niemniej jednakże jest prawdą, że cewki znajdują się częstokroć w pobliżu i przechodzą jeśli nie przez nie same, to przynajmniej przez tkankę otaczającą (fig. 218 *f l*). Czasem nawet można widzieć, iż dochodzą aż do podstawy gruczołów trzonkowych: np. u roszarki (*Drosera*). Mają one w istocie coś wspólnego w swych czynnościach, lub jestże to przyrodzonem następstwem, jednoczesnego rozwijania się tych dwóch rodzajów narzędzi w częściach młodych i takich tylko, które w ciągu jednego roku powstają, dlaczego też mogą się często znajdować obok siebie?

## CZYNNOŚCI NARZĘDZI ROŚLENIA.

§ 247. Rozbiéraliśmy narzędzia rośliny od pierwszego ukazania się jéj w postaci zarodka, aż do utworzenia się kwiatu. Ponieważ wszystkie te narzędzia, które nas dotąd zajmowały, biorą udział w życiu właściwém rośliny, której część składają; przeto odróżniamy je pod zbiorowém imieniem *narzędzi roślenia*, od narzędzi *odradzania* (reproductionis), które w kwiecie, przyczyniają się do wydania nowych zarodków, przeznaczonych żyć z kolei swoim własném życiem, przebiegając w stopniowém rozwijaniu się też same koleje. Zanim przystąpimy do badania tego nowego rzędu narzędzi, wypada dla uzupełnienia historii pierwszych, uważanych tu dotychczas pod względem organograficznym, tojest pod względem ich budowy, postaci i uszykowania, uważać je teraz pod względem fizjologicznym co do ich czynności, co do ich działania żywotnego.

§ 247 bis. Śledziliśmy już (§ 32—35) pierwsze zmiany, jakim podlega młoda, samodzielnie żyć zaczynająca, czyli jedném słowem, wschodząca roślina. Kiedy się wschodzenie skończyło, roślina stoi częścią swoją niższą, tojest korzeniami w związku z ziemią; wyższą zaś, tojest łodygą i liśćmi w związku z powietrzem. Korzenie ssą płyny z ziemi, lub z innego jakiegokolwiek wilgotnego środka, w którym się znajdują: czynność ta zowie się *wsysaniem* (absorptio). Płyny wszedłszy w roślinę, przebiegają tkankę jéj we wszystkich kierunkach, gdyż, jak widzieliśmy (§ 17) sposoby spółniczenia, są ktemu wybornie przyrządzone; oznaczamy to wyrazem *krążenie* (circulatio), wziętym z zoologii, chociaż u zwierząt czynność ta odbywa się za pomocą sił i sposobów wcale odmiennych. Płyny nieprzerobione noszące imię oskólnicy, zmieniają się w swém drodze, szczególniej zaś przy powierzchni części roślinnych, zostających w zetknięciu z powietrzem: wpływ powietrza na oskólnicę, stanowi *oddychanie* roślin (respiratio). Oskólnica przerobiona w ten sposób, staje się zdolną do żywienia tkanek, tojest do umacniania za pomocą cząsteczek podobnych, narzędzi już istniejących, tudzież do nistaczania innych narzędzi tegoż samego przyrodzenia: ztąd wynika *żywienie* (nutritio) czyli

*przypodobnienie* (assimilatio). Na niektórych jednakże miejscach wytwarza istoty mniej lub więcej odmienne, czyto przeznaczone do szczególnego użytku, czyli też odłożone na stronę do późniejszego wyrobienia, czyli wreszcie nieużyteczne a nawet szkodliwe dla rośliny, która je oddala z tkanki żyjącej. Są to *wydzielania* (secretiones), które w ostatnim przypadku zowią się *wydalalnemi*. Taki jest ogół czynności roślenia wspólnych roślinie i zwierzęciu. Poznawszy je szczegółowo, będziemy mogli rzucić oko na różnice, jakie się przedstawiają w obu państwach jestestw ustrojnych.

## WSYSANIE KORZENI.

§ 248. Widzieliśmy (§ 115), że korzenie pokryte są jednociągłą warstwą komórek bez otworów. Jakimże sposobem płyn zostający z nimi w zetknięciu może w nie wejść, i jak z nich, przejdzie we wszystkie inne wydrążenia, znajdujące się w tkance roślinnej, i poprzedzielane od siebie cienkimi błonami? Błony te, przepuszczają wprawdzie płyny, lecz, aby takowe mogły przejść przez nie, potrzeba do tego pewnej, dostatecznej siły. Otoż, tak nazwana przez Dutrochet'a i od niego wybornie opisana siła *wnikania* (endosmosis), wystarcza nietylko do objaśnienia wsysania odbywającego się w korzeniach, a następnie i w dalszych komórkach, lecz nadto pozwala zdać sobie sprawę z jednej części krążenia, które bez tego odkrycia, byłoby wcale niewytłumaczonem.

Jeśli zanurzymy w czystą wodę pęcherzyk, zrobiony czyto z błony zwierzęcej, czy z roślinnej (np. ze strąka truszczeliny [*Cohutea arborescens*]), zawierający płyn gęstszy, np. roztwór cukru lub gumy; oba płyny będą się chciały zrównoważyć co do gęstości, w skutek czego, przez ściany pęcherzyka przechodzić będzie na zewnątrz woda czysta do roztworu gumy lub cukru, ku wewnątrz zaś roztwór rzeczony do wody czystej. Lecz nie z równą łatwością i prędkością oba płyny przenikają przez błonę, rzadszy bowiem przechodzi prędzej niż gęstszy. Tym sposobem wewnątrz pęcherzyka więcej wody przybywa niż ubywa, zewnątrz zaś więcej jęj ubywa niż przybywa. Ztąd musi wynikać różna wysokość wzniesienia się obu dwu płynów; ten z nich, który jest zawarty w pęcherzyku, musi się coraz bardziej podnosić, co dopóty trwa, dopóki oba, w sku-

tek tej ciągłej wymiany, nie nabędą równej gęstości. Przystosowawszy do pęcherza rurkę pionową (fig. 219), podzieloną na stopnie, można obliczyć prędkość i siłę wznoszenia się płynu. Jeżeli zamiast prostej użyjemy rurki dwa razy skrzywionej, w której średniem ramieniu znajduje się rtęć (merkurjusz); ta wstępując w ramię zewnętrzne oznaczone stopniami, pokaże nam wysokością swego słupa, jaki opór przeciężyć musiał słup roztworu cukru. Podobne doświadczenia przekonują nas, że prędkość i siła *wnikania* idą obok siebie, że obie są znaczne, a działanie ich trwa dość długo. Roztwór jednej części cukru w dwóch częściach wody, podnosi słup rtęci w przeciągu dwóch dni, przeszło na metr; a po upływie tego czasu, zawiera zaledwie trzy części wody na jedną cukru.



219.

§ 249. Wsyanie korzeni jest przeto łatwem do wytłumaczenia. Komórki tworzące ich tkankę, są wypełnione sokami gęstszymi od wody, którą ziemia jest napojona, a która wnika przez ich błony, powiększa ilość płynu zawartego w ich wnętrzu, zmniejszając zarazem jego gęstość, i następnie w tenże sam sposób przechodzi do komórek wewnętrzniejszych. Myliłby się, ktoby sądził, że pomoże żywieniu się rośliny, dostarczając jej żywności gotowej, zanurzając np. jej korzenie w roztwór cukru, gdyż przez to przeszkodziłoby wnikaniu, a przeto i wsyaniu.

§ 250. Na jakichżeto punktach korzenia wsyanie najczynniej się odbywa? Doświadczenie uczy, iż właśnie na ostatnich, najświeższej powstałych odnózkach, na ich kończynach i nitczkach, lub w czubie korzeniowym, jeśli takowy posiadają. Wiadomo, iż aby sobie zapewnić żądany skutek przy przesadzaniu roślin, należy zachować w całości ile można najwięcej tych nitek, utrzymując je w stanie dla nich zwyczajnym, to jest w stanie wilgoci i wypełnienia sokami. Widzieliśmy (§ 115), że ostatnie odnózki korzeni pokrywają się w początku miękkimi włosami, które jak się zdaje, służą do powiększenia ich powierzchni, a zatem i punktów, na których się odbywa wsyanie. Jednakże postrzeżenie uczy, że czynność stron bocznych

korzenia jest bardzo słabą w porównaniu z czynnością samych jego kończyn. W istocie, umieściwszy wszystkie korzenie rośliny nieco ponad wodą, tak, iż tylko ich kończyny będą zanurzone, działalność rośliny przekona nas o bardzo czynnie odbywającym się wsysaniu. Przeciwnie, zanurzwszy też same korzenie tak, iż całe będą w wodzie prócz tylko samych kończyn, które utrzymywać będziemy ponad wodą, roślenie nie ustanie wprawdzie w zupełności, ale będzie słabiej: ztąd widno, iż wsysanie odbywa się wprawdzie, lecz już nie dosyć wystarczająco.

Powiedzieliśmy (§ 114), iż korzenie i wszystkie ich odnogi przedłużają się wyłącznie na swych końcach, które zatem przez cały ciąg działalności rośliny, znajdują się w stanie tkanki świeżo powstającej. Te więc kończyny korzonkowe, wciągają wilgoć otaczającą, nie, jak mniemano, z powodu szczególnej odmiany tkanki wzdłuż i działającej na sposób gąbki, ale dlatego, iż komórki ich świeżo powstające, a jako takie, napełnione już sokami gęstymi, posiadają warunki najprzyjaźniejsze wnikaniu. Nie mają one jeszcze naskórka, który właśnie powstając ponad nimi, tamuje wsysanie, ponieważ warstwa jego jest suchszą i mniej przepuszczającą płyny.

§ 251. Płyn otaczający, wsysanym bywa tém łatwiej i w tém większej ilości, im jest rzadszy. W ziemi, woda zawiera w roztworze rozmaite rozpuszczalne istoty, które się tamże znajdują i które różnią się według gatunku ziemi. Rozpuszczenie tych istot musi być zupełnem; bo gdy są tylko zawieszony w wodzie, nie mogą przenikać błon, choćby były najmniejszymi. Zmieszawszy z wodą proszek jak można najdrobniejszy, najmniej dający się uczuć w dotknięciu, lecz nierozpuszczalny, jak np. proszek węgla, i poddawszy tę mieszaninę do wsysania korzeniom, obaczmy, iż tylko woda w nie przejdzie, wszystek zaś węgiel pozostanie zewnątrz i ani odrobinki jego nie znajdziemy w roślinie. Toż samo dzieje się ze wszystkimi prawie roztworami barwnymi: woda, przechodząc w kończyny korzonkowe, osadza na powierzchni tychże wszelką istotę barwiącą.

§ 252. Starano się przekonać, czyli owa wsysająca powierzchnia może objawiać działanie jakie żywotne, czy służy jej dowolność wyboru w przyjmowaniu istot, jakie się jej nadarzają; odpowiedź była przeczącą: ponieważ roślina wsysa wiele roztworów szkodliwych dla siebie, które niszczą jej życie, skoro

się tylko wewnątrz dostaną. Znanym jest jednakże jeden przypadek przeciwny, to jest, że roślina żywiona roztworem wodnym saletranem stroncjanu, wsysa wodę, sól zaś zostaje w zupełności na zewnątrz, jak gdyby była tylko zawieszona w wodzie. Co się tyczy doświadczeń Saussura, z których dowiadujemy się, że dostarczając roślinie pewnych rozpuszczonych istot, ilość wessanej wody jest stosunkowo większą od ilości istoty w roztworze będącej, lub że z dwóch istot rozpuszczalnych w tej samej wodzie, jedna przenika w większej ilości niż druga; on sam wyciągnął z nich bardzo roztropny wniosek, sądząc, że się to dzieje nie z przyczyny żadnego powinowactwa, lecz w stosunku stopnia rzadkości lub lepkości rozmaitych istot. Przycinając on gęstości cedzidła utworzonego tu przez błonę roślinną, wypadki owe, których przyczyną daleko jeszcze silniejszą jest wnikanie.

## K R A Ż E N I E.

§ 253. **Oskólnica** (sok wstępujący). — Płyny dostawszy się z ziemi w korzenie przez kończyny tychże, przechodzą podobnież w komórki bezpośrednio wyższe, a z tych w leżące jeszcze dalej. Tym sposobem wznosząc się coraz wyżej w korzeniu, dostają się do łodygi, w której ich ruch wstępujący nie ustaje. Można bowiem porównać roślinę z przyrządem endosmotycznym, w którym ziemia zastępuje miejsce zawieralnika napełnionego wodą; przyrząd zaś ten, tém jest działalnieszy, że część jego stojąca nad zawieralnikiem, nie jest rurką próżną i nieczynną, ale tkanką napełnioną licznymi zasobami istot podobnych do tych, które właśnie wywołały działanie korzeni, tak, iż działanie to nie tylko że nie ustaje, ale utrzymuje się i odnawia na każdym punkcie. Płyn nie traci tu jak w powyższym doświadczeniu, gęstości swojej w miarę tego, jak ilość jego się zwiększa i jak się skutkiem tego wznosi; owszem, działając na istoty, jakie na swęj drodze napotyka, rozpuszcza część tych, które były w stanie stałym, a przeto coraz bardziej gęstnieje. Zmieniający tym sposobem od czasu jak wszedł w roślinę, przybiera nazwę oskólnicy. Jeśli ponawiercamy dosyć głęboko pień drzewa w różnych wysokościach, a zastosowawszy do każdej z dziur rurkę, zbierać będziemy osobno oskólnicę wypływającą z tych różnych kanałów, przekonamy się, iż ona tém jest gęstsza, z im

wyższego miejsca pochodzi; obaczmy później, jakie zmiany zachodzą w jej składzie i jak się o tćm przekonać można.

§ 254. Dotąd mówiliśmy tak, jak gdyby roślina składała się wyłącznie z samych tylko komórek, co w istocie zdarza się w niektórych roślinach. Jednakże wiemy, że częścić w roślinach liściennych, liczne naczynia ukazują się wpośród tćj tkanki komórkowej i przybićrają kierunek osi. Łatwo pojąć, o ile wstępowanie oskolnicy partćj ciagle od dołu, musi być przyspieszonćm w tych długich kanałach, w których nie znajduje zawad, i jak zatćm prćdko takowa przebiegać może znaczne odległosci, któreby idąc z komórki do komórki, powoli tylko przebyć mogła.

Uważmy teraz, że srodek korzeni zajmują wiązki naczyń, które dochodzą aż do kończyn, na których wysanie się zaczyna. Płyn więc wessany spotyka prawie od razu tć łatwą drogę, i bez wątpienia, w tćm leży także jedna z przyczyn, dla których skutek wysania kończynami, jest daleko prćdszy i daleko rychlćj widzićć się daje na reszcie rośliny.

§ 255. Fizyka uczy, że w rurkach nadzwyczaj cienkich, nazwanych włoskowatemi, ściana wewnćtrzna kanału, wywićra na płyn w tymże zawarty rodzaj przyciagania, które niszczy w części wpływ ciężkosci i spowoduje tćm samćm wznoszenie się płynu nad równią, na którćjby się w innym razie zatrzymał. Po wićkszćj części naczyńia roślinne, dla swćj cienkosci są takimi rurkami włoskowatemi, i wywićrają na ciecz zawartą wpływ, w skutek którćgo takowa wstępuje do pewnćj wysokości, a przez co naturalnie zwićksza się działalnosc wnikania. Zanim to ostatnie zostało poznancćm, przyznawano wpływowi włoskowatosci najwićkszą część popędu podnoszacćgo oskolnicę, nie mogąc jednak objaśnić tym sposobem wszystkich temu towarzyszacćych zjawisk.

Zanurzwszy w wodę lub inny płyn dostatecznie rzadki, koniec gałazki swićżo odciętćj, płyn ten wchodzi przez otwory naczyń i wznosi się w skutek włoskowatosci aż do pewnego punktu. Rozumićć się, iż przytćm odbywa się także i wnikanie wskroś ścian naczyńia i komórek otaczajacćych, tak, iż ten koniec odcięty, zastępuje poniekađ wysanie korzeni. Dlatćgo przesadzajac roślinę, którćj nitki i kończyny korzonkowe zeschnięte, nie są zdadne do wysania, co tak często się zdarza przy przesadzaniu; ogrodnicy starają się odświćżyć korzenie,

to jest poucinać je przy miejscach, w których świeżość ich i żywotność zachowuje się jeszcze. Ta sama przyczyna dozwala rozmnażać rośliny przez *wtykanie* (bouture); dosyć bowiem utkwic w środku dostatecznie wilgotnym, kończynę gałązki, a ta ssa powierzchnią odciętą soki, któremi żyć może, dopóki nie wyda korzeni przybyszowych i nie znajdzie się przeto w okolicznościach rośliny wkorzenionej. Zachowanie świeżości bukieców przez włożenie ich do wody, jest zjawiskiem każdemu dobrze znajomem. Dlaczego zaś we wszystkich tych doświadczeniach, końce, które stykamy z płynem, muszą być równo ucięte, objaśnia się potrzebą ochraniać otworu naczyń, który się zatyka lub ściąga, jeśli koniec odłączonym został przez urwanie lub ukłócenie. Rurki włoskowate roślin przepuszczają z taką łatwością płyn, iż takowy snadniej się do nich dostaje, niż przez ściany komórek. Mogą zatem wciągać w siebie ciecze, posiadające w zawieszeniu istoty bardzo drobne, np. barwiące; korzystano też z tej własności przy postrzeganiu wznoszenia się oskólnicy, którą można z łatwością śledzić, skoro tym sposobem ubarwioną zostanie. Potrzeba wszakże mieć się na baczności względem wniosków jakie złąd wyprowadzają, gdyż tu rzeczy nie idą zupełnie tak samo, jak w zwykłym życiu rośliny, kiedy wsysanie odbywa się za pomocą korzeni i z jednej komórki w drugą, a zarazem i w naczyniach.

§ 256. Lecz nie samo wnikanie i włoskowatość spowodują ciągle wstępowanie oskólnicy. W rzeczy samej, łatwo jest przewidzieć, że mogłaby nadejść chwila, w której takowe wyczerpałyby cały swój wpływ, a wtedy nastąpiłaby niejako równowaga i spoczynek we wszystkich częściach płynnych rośliny, chociaż to poniekąd miéwa miejsce, gdyż po pewnym czasie trwania bardzo żywój działalności, ruch znacznie słabiej, owszem w niektórych częściach wcale znika, jednakże nie ustaje w innych, a działanie wsysające korzeni, odbywa się w tym samym stosunku. Wiadomo, że wyrwijając z ziemi roślinę, która doszła zupełnego wykształcenia, takowa krótko tylko pozostaje przy życiu; jeśli zaś zanurzymy w wodę jej korzenie czyto całe, jeśli są świeże czy też poobcinane, jeśli się już zeschły, odżyje nagle od jednego do drugiego końca; znaczna więc ilość wody została wciągnięta i przeszła od kończyny dolnej w górną, a soki zawarte w roślinie, nie były w stanie równowagi, któraby spowodowała ostateczny ich spoczynek.

§ 257. Przytoczmy tu zajmujące postrzeżenie, które się do tego przedmiotu ściąga: Pod zwrotnikami pewna liczba pnączów, mianowicie z rodzaju winobluszczu (*Cissus*), pokrewnego z winoroślą, zawiera bardzo wiele świeżej i przyjemnej w smaku oskólnicy. Woda wyciekająca obficie z uciętych końców tych roślin, może służyć za napój; dlatego też ludzie zbiegając tamtejsze lasy, ugaszają nią pragnienie: ztąd rośliny te, nazywane są pospolicie pnączami wodnistemi, lub pnączami myśliwców. Gaudichaud, który w Brazylji odkrył jeden taki gatunek i nazwał go *Cissus hydrophora*, zauważał, iż jeśli przeciąwszy pnącz raz tylko jeden, z obu powierzchni przecięcia wypłynie mała tylko ilość cieczy, która zresztą szybko zaczyna iść w górę w części wyższej, co nas przekonywa, że naczynia wypróżniają się z dołu do góry. Wstępowanie to cieczy nie może zależeć od działania korzeni, ponieważ część wyższa nie stoi już z niemi w żadnym związku, a naczynia mają zanadto wielką średnicę, aby włoskowość mogła tu wpływ jaki wywierać. Lecz przeciąwszy roślinę w dwóch różnych wysokościach, tak, iż odłączamy dość długi kawał łodygi, ujrzymy, że oskólnica wysącza się obficie na tej powierzchni przecięcia, która obróconą zostanie na dół, a przeto stosownie do praw ciężkości. Lecz widzieliśmy, że wprzód soki występowały wyżej, bardzo nawet szybko; to więc nie mogło się dziać w skutek siły działającej z dołu ani z boku, ale w skutek siły umieszczonej ponad przecięciem i przyciągającej płyn z góry.

§ 258. Nietrudno jest poznać tę nową siłę. Roślina w pewnej wysokości opatrzona jest mniejszą lub większą ilością pączków, które jak tylko zaczną się rozwijać, przyciągają z łodygi lub gałęzi do której należą, istoty przeznaczone do ich żywienia, a których ilość musi stać w stosunku z gałązką, jaka w skutek tego rozwijania się ma powstać. Tymczasem ukazują się liście, rozpościągają się w powietrzu, a na powierzchni ich przesianej maleńkimi otworkami, odbywa się silne parowanie. Wszystko, co się tym sposobem ulatnia przez liście, a obok tego i przez młodą korę gałązki, wszystko, co użytém zostaje ku tworzeniu i żywieniu tych nowych części, wszystko to wziętém jest z ogólnej ilości płynów łodygi; a w skutek tego przy powierzchni i przy nasadzie każdej gałązki, powstają próżnie, wypełniające się natychmiast odpowiednią ilością soków, które zostają odjęte łodydze i na których miejsce wstępują znowu soki

przyległych części; zład powstaje coraz dalszy bieg płynu, w kierunku wstępującym względem korzenia, którego wysysanie musi wynagrodzić tę stratę <sup>(1)</sup>. Nie ma tu potrzeby objaśniać, jaki wpływ na parowanie u roślin wywiera powietrze ciepłe lub zimne, suche lub wilgotne, obecność lub nieobecność światła słonecznego, jego działanie wprostne, lub wskrós obłoków.

§ 259. Przejrzyjmy teraz i starajmy się zarazem objaśnić rozmaite zmiany, jakie sprowadzą następstwo pór roku, właściwych naszemu klimatowi, w tym ruchu wstępującym soków. Na wiosnę, skoro tylko nadejdzie pewien stopień ciepła, konieczny dla życia większej części roślin, a co dla jednych wcześnie, dla drugich później następuje; spostrzegamy, iż pączki zostające w stanie spoczynku przez zimę powiększają się nieco, a obok tego, korzenie zaczynają także działać. Obudzenie się życia roślinnego spowodowanem jest, jak się zdaje, przez popęd, jakiego zwiększające ciepło udziela narzędziom. Jeśli gałązkę winorośli stojącej przy cieplarni wprowadzimy wewnątrz téjże, pączki i liście jęj rozwiną się niebawem, gły tymczasem gałęzie pozostałe zewnątrz, zachowają swą postać zimową. Ciepło zatem działa tu na korę i pączki, a działania tych, obudza następnie żywotność korzeni; dobrze wprzódy, zanim będą w stanie oddziaływać na gałęzie wystawione jeszcze na zimno. Działalność zatem pączków, wyprzedza, jak się zdaje, działalność korzeni, owszem, może takową pobudzić; nie

(1) Łatwo się o téj sile ssącej pączków przekonać, zanurzając niższą kończynę gałęzi w płyn, którego ilość pochłoniętą w pewnym czasie obliczymy (§ 292). Nowe postrzeżenia czynione na wielką stopę, dowodzą, że skutek téj siły jest bardzo znaczny, i przechodzi nawet oczekiwanie. Boucherie, który pragnąc nadać drzewu pewne, w zastosowaniu wartość swą mające własności, chcąc je zrobić wytrwalszém, twardszém, giętszém, lub niepalnóm, barwić je rozmaicie według upodobania; starał się wprowadzać w jego tkankę takie roztwory, któreby łącząc się czyto z samą istotą roślinną, czy téż z innemi, później wprowadzonymi roztworami, zmieniały przyrodzenie tkanki, stosownie do zamierzonego celu; powziął szczęśliwą myśl użycia ktemu siły, o której mówimy, i dowiódł, że takowa wystarcza do wciągnięcia w całe drzewo, od spodu do wierzchołka, płynu, w który wstawimy pień jego ścięty. Nie potrzebuje nawet drzewo posiadać wszystkich gałęzi i liści swoich; dosyć jest zostawić u wierzchołka pęk takowych, a wciąganie odbywać się będzie; własność ta trwa, słabiejac jednakże stopniowo, aż do piętnastu dni od ścięcia drzewa. Przez ten czas wszystkie tkanki zostaną napojone płynem, oprócz samego tylko środka, jeśli takowy jest bardzo twardym.

dziwnego, bo wszakże po skończonej zimie, powietrze prędkiej się daleko ogrzewa, niż ziemia.

Skoro tylko wsysanie korzeni się zaczęło, czyto bezpośrednio na ich kończynach, czy też że pobudzone przez pączki, doszło aż do nich, wstępowanie soku odbywa się z nadzwyczajną szybkością, czego skutki daleko dopiero później spostrzegać się dają na pączkach. Rzeczywiście w czasie tym, kiedy drzewo jest огоłocone z liści, a nowe jego latorostki osłonięte są jeszcze okrywami mało przepuszczającymi soki, wnikanie musi być siłą prawie wyłącznie działającą, choćbyśmy nawet przypuścili, że pierwszy do tego popęd dały pączki; zanim zaś posunie aż do pączków soki, któremi się takowe żywić i za pomocą których rozwijać się mają, musi wprzód odbywać się na całej drodze od korzeni, dla zmieszania i przerobienia soków, które w ruch wprawia. Cały ogół istot mniej lub więcej gęstych, lub zupełnie zsiadłych, utworzonych w poprzednim roku, i jakby złożonych na zapas w czasie zimy wewnątrz rośliny, istot, które rozmiękają lub rozpuszczają się zupełnie, w miarę jak strumień cieczy do nich dochodzi, stanowi mocną pobudkę wstępowania soków wnikających. Takowe wznoszą się też w wielkiej obfitości i z ogromną siłą, o czém się przekonywamy widząc, że woda wytryska prawie jakby z fontanny, z każdej rany roślin znajdujących się w tym stanie, który zowią pospolicie oskołą; tu należy ów wypływ soków, przy nacięciu łodygi winorośli, który zowią jej łzami (*pleurs de la vigne*). Ponieważ łzy te, płyną obficie z końca łodygi pozbawionej liści, a nawet uciętej tuż ponad ziemią, niepodobna przeto w zjawisku tém przypisywać żadnego wpływu na przyciąganie cieczy, ani ssaniu pączków, ani parowaniu liści. Zastosowawszy do obciętego końca rurkę, widzimy, że oskólnica wstępuje w nią do bardzo znacznej wysokości, którą też tym sposobem ocenić możemy. Anglik Hales, któremu winni jesteśmy wiele doświadczeń równie dokładnych, jak dowcipnych opisanych w jego *Statystyce roślinnej*, i mających za cel poznanie ruchu soków roślinnych, użył do obliczenia siły i prędkości wstępowania oskólnicy, takiego samego przyrządu, jaki Dutrochet zastosował do obliczenia siły wnikania, to jest rurki dwa razy zgiętej, której jedno ramię przymocowane jest do końca uciętej łodygi, służącej do doświadczenia; ramię zaś średnie napełnione jest rtęcią, która parta przez soki, wstępu-

jące w ramię przymocowane, wstępuje również w drugie ramię



220. c Latorośl winna ucięta pięć decymetrów od ziemi. — t Rurka szklana dwa razy zgięta, tkwiąca w kółku mosiężnym *v*, przystosowanem do uciętej kończyny latorośli i oblepionem. Kończyna ta i kółko obwiązane są ka

zewnętrznem, wskazując wysokością swego słupa ważność szukaną (fig. 220). Sam Hales widział wzniesiony tym sposobem słup rtęci przeszło na metr, co wyrównywa 14 metrom dla wody, i obliczył, że siła podnosząca oskólnicę w winorośli, jest pięć razy większą od siły, która pędzi krew w tętnicy konia.

§ 260. Skoro się pączki rozwijają i liście otwierają, działanie ich wspiera działalność wnikania, które się w części wyczerpnąć musiało, ponieważ wznoszenie się trwając ciągle, wolniej i słabiej stopniowo. Wtedy można za pomocą doświadczeń podobnych poprzednim, przekonać się o wpływie, jaki ta nowa siła, działając wspólnie z wnikaniem, wywołuje na ruch wstępujący. Tak, jeśli do końca niższego odciętej gałęzi przystosujemy rurkę długą, pełną wody i zanurzoną drugim końcem w naczynie z rtęcią, gałąź wciągnie pewną ilość wody, wskazaną przez podniesienie się równego słupa rtęci w rurce. Zmieniając stan gałęzi, która może być okryta większą lub mniejszą liczbą liści, albo być w nich z części ogołoconą, owszem zastawioną przy samych tylko pączkach; zmieniając stan

atmos  
wilgo  
godzi  
wpły  
wpły

§  
pewn  
rów,  
nazw  
tkan  
śliny.  
mówi  
zupel  
wnie  
manie  
wie z  
w nie  
nastę  
ktemu

§ 2  
dość  
zaso  
porz  
łac  
syć  
rzon  
wiar  
piją

§ 2  
wierz  
stają  
a drz  
w któ  
ustaj  
praw

walkie  
kość si  
świad

atmosfery, która może posiadać różny stopień suchości lub wilgoci: czyniąc postrzeżenia w różnych czasach, o różnych godzinach dnia lub nocy, widzimy, iż wszystkie przyczyny wpływające na stopień parowania z gałęzi, wywierają téż wpływ podobny na ilość wsysanej wody.

§ 261. Tymczasem gałązki i liście ich, rozwinęły się do pewnego stopnia, zwolna doszły one swych zupełnych wymiarów, i zbitości znamionującej ich tkankę w tym stanie, który nazwaćby można ich wiekiem dojrzałym; jednocześnie nowe tkanki ustrajały się w niektórych częściach wewnętrznych rośliny. Tym sposobem przyszło do owęj równowagi, o jakiej mówiliśmy wyżej; do równowagi, która nie prowadzi za sobą zupełnego spoczynku soków, lecz powściąga ruch ich, stosownie do potrzeb stanu, w którym idzie już tylko o jego utrzymanie, wynagradzaniem ciągłych utrat towarzyszących prawie życia, dopełnieniem tego, na czém jeszcze może zbywać w niektórych miejscach, tudzież przygotowaniem na rok następny narzędzi mających się z kolei rozwinąć i zasobów ktemu potrzebnych.

§ 262. Jeśli cała ta praca żywotna zaczęła się i ukończyła dość rychło, jeśli lato było wcześnem, może się zdarzyć iż zasoby te zostaną zupełnie wyrobione o niezbyt jeszcze późnej porze, która zarazem dostarcza im warunków zdolnych wywołać ich rozwijanie się przedwczesnie. Przytrafia się téż to dosyć często pod koniec lata; niektóre z pączków nowo utworzonych pękają, niektóre szczególne zjawiska wiosenne powtarzają się, a z nimi musi na chwilę ożywić się i ruch wstępujący oskólnicy, która się téż zowie *sierpniową*.

§ 263. Ruch ten słabiej znowu. W jesieni parowanie powierzchni zmniejsza się coraz bardziej; tkanki twardniejąc stają się suchszemi; liście obumierają zwolna lub opadają, a drzewo przechodzi w stan zupełnego prawie spoczynku, w którym życie zdaje się zawieszonem. Wtedy ruch oskólnicy ustaje wraz ze swemi przyczynami, a w zimie zatrzymuje się prawie zupełnie.

walkiem pęcherza *m*, który zarazem umacnia cały przyrząd. — *n n* Wysokość słupa merkurjuszu w dwóch ramionach zgięcia dolnego rurki, przed doświadczeniem. — *n' n'* Wysokość tegoż przy końcu doświadczenia.


§ 264. Do śledzenia różnych zmian ruchu oskólnicy, wybraliśmy przykłady, na których takowe pokazują się najwyraźniej i najzupełniej; przykłady, na których przynajmniej zmiany, są nam najlepiej znane, słowem, drzewa naszych stron umiarkowanych. To, co się dzieje w jednej z ich gałązek, musi, z małą różnicą dziać się w całej roślinie zielnej, z większą jednakże żywością, ponieważ takowa zwykle rozgałęzia się, a przeto wydaje w ciągu jednego roku wiele pokoleń pączków. Co się tyczy roślin pasów cieplejszych, tam okresy są odmienne, a pod zwrotnikami, czas spoczynku zdaje się być prawie żadnym, ruch zaś trwa ciągle. O tém jednakże wnosimy raczej z własności pór roku i ze zjawisk zewnętrznych roślin, niż ze spostrzeżeń wprostnych a gruntownych, któreby były tak zajmującemi.

§ 265. Wypada tu objaśnić jeszcze ważne jedno pytanie: Jaką drogę obiera wstępując oskólnica, wpośród różnych narzędzi prostych, składających łądogę? Oskólnica wiosenna zajmuje wszystkie tkanki, napełniając komórki, włókna, cewki, przestwory międzykomórkowe. Najwięcej wstępuje przez drzewo, o czém się łatwo przekonać spojrzawszy na gałąź świeżo uciętą. Widzimy, iż płyn wycieka na powierzchni przecięcia z całego pokładu drzewnego, jeśli gałązka jest młoda, zaś z pasa tylko zewnętrznego stanowiącego biel, jeśli gałązka jest nieco starsza. Po przejściu oskólnicy wiosennej, wiele naczyń zostaje próżnych, a przecinając je pod wodą, przekonujemy się że zawierają gazy, które w postaci małych baniek uchodzą. Wtedy więc oskólnica przechodzi po większej przynajmniej części, przez samą tylko tkankę komórkową; bieg ten jednakże jest powolny i małoznaczny, ponieważ roślina jest wtedy jakby nasycona płynami i prawie porównaiby ją można z przyrządem napełnionym wodą, i przedziurawionym maleńkimi otworkami na obu końcach, któryby z jednej strony utracił nieco wody, a natomiast zyskiwał z drugiej, odpowiednią jej ilość; przez co jednakże nie mógłby powstawać żaden widoczny strumień. Jeśli jakakolwiek przyczyna zniszczy tę równowagę, jeśli np. po dłuższej lub krótszej suszy upadnie deszcz, lub jeśli zaczną się rozwijać nowe pączki, wstępowanie soków ożywia się i pójdzie znowu w części drogami, które na jakiś czas opuściło.

§ 266. Sok zstępujący czyli przerobiony. — Oskólnica wzbogacona wszystkimi istotami jakie na drodze swęj rozpuściła i wcieliła w siebie, przybywa w młode gałęzie, następnie przebiegając je, posuwa się aż do powierzchni ich kory przez tkanę komórkową promieni i miększu korowego; a potem przychodzi do powierzchni liści przez miększ i rychléj jeszcze przez cewki. Powierzchnie te zielone, zostają przez mniej lub więcej liczne szparki, w bezpośrednim związku z powietrzem zewnętrzném, które może wchodzić małemi owemi otworkami i krążyć w siatce przerw tkanki spodniéj. Oskólnica przeto oddzielona jest od powietrza cienkimi tylko błonami téj tkanki, przez które pierwiastki obojga mogą wzajemnie na siebie działać, wymieniać się, a w skutek tego podlegać zmianom. W rozdziale o oddychaniu i żywieniu obaczmy po szczególe, na czém takowe zmiany zależą. Nateraz dosyć jest powiedzieć, że rzeczywiście zachodzą, że przeto oskólnica utracając większą część swęj wody wychodzącej na zewnątrz w postaci pary, przybióra zarazem inne przyrodzenie.

Łatwo jest przekonać się naocznie, że liście i młoda kora zawiera soki wcale różne od oskólnicy, jaką badaliśmy dotychczas. Wewnątrz komórek, zielen (§ 24) barwi je mocniéj lub słabiéj, a z naczyń lub przerw korowych, wysącza się płyn gęstszy, często barwny. Jego własności różnią się podobnie jak jego powierzchowność od własności oskólnicy. Ostromlecz wysp Kanaryjskich wydaje silną truciznę, która jest mleczem jego kory; lecz po odjęciu téj ostatniéj, mieszkańcy tamtejsi znajdują w pokładzie drzewnym napój czysty i nieszkodliwy wysysając oskólnicę, która tamtédy przechodzi. Sok ów korowy podlegał także jak oskólnica ruchowi ogólnemu? Przeciąwszy wpoprzek łodygę, w której sok jest barwnym, widzimy, iż powierzchnia niższa przecięcia wysącza w stosunku daleko mniej cieczy niż górna. Oddzieliwszy wokoło obrączkę kory, widzimy że sok wycieka i zbiera się na wyższym brzegu rany a nie na niższym. Przewiązawszy mocno łodygę, po pewnym czasie kora wzdyma się i tworzy nabrzmiałość nad wiązadłem, zaś pod témże łodygą zachowuje dawną średnicę. Sok więc korowy płynie z góry na dół, to jest w kierunku przeciwnym jak oskólnica. Dlatego téż nazywa się *zstępującym*, albo niekiedy *przerobionym* z powodu spraw ustrojowych jakim podlegać musiał, zanim nabył nowych własności.

§ 267. Widzieliśmy (§ 73), że kora składa się z miększu, włókien podłużnych (łykowych § 78) i z kanałów młeczonośnych (§ 14). Sok zawarty w tych ostatnich, czyli *sok właściwy*, bywa często barwnym, a w tym przypadku pospolicie jest znany pod imieniem *młéczu*. W innych razach też same naczynia prowadzą sok bezbarwny, lecz jak się zdaje, tegoż samego przyrodzenia, niektóre nawet postrzeżenia pokazują, że ta sama roślina, która w klimacie zimnym lub umiarkowanym, posiada sok właściwy bezbarwny, może pod zwrotnikami zawierać wyraźny młecz. W jednym i w drugim razie sok ten



221.

składa się z ziarenek nadzwyczaj drobnych, nierównych i pływających w cieczy. Obecność ziarenek i przezroczystość ścian naczyń młeczowych, dozwalają przekonać się pod szkłem o ruchu soków właściwych. Umieściwszy np. na ławce mikroskopu, pod cienkim szkiełkiem młody liść jaskółczego ziela, które tak pospolicie rośnie przy płotach i murach, i poznać się daje po ostrym pomarańczowym soku, — jeśli liść ten ile możności najcieńszy i najprzezroczystszy, nie odłączony od rośliny żyjącej, a zatem biorącej udział w jej życiu, zwilżony dla przeszkodzenia zeschnięciu, uważać będziemy za pomocą znacznych powiększeń, spostrzeżemy (fig. 221) w miąższości jego maleńkie ruchome strumyczki istoty ziarenkowanej; strumyczki, z których jedno biegną w tym, drugie w innym kierunku, często nawet w przeciwnym piérwyszemu;

221. Maleńki kawałek liścia glistniku jaskółczego ziela (*Chelidonium majus*), mocno powiększony i przedstawiający oczka siatki naczyń młeczowych. Kierunek strumyczków wskazany jest strzałkami.

jedne  
z so  
że te  
sobe  
Młéc  
się  
które  
skow  
kryci  
Ch  
zdaj  
odby  
oka  
z tk  
jaki  
§  
wiel  
zion  
za zj  
wpły  
na t  
eno  
sam  
stał  
lać  
w g  
sku  
jedy  
napr  
drug  
ważn  
dotą  
mują  
od  
koń  
gdy  
stru  
dnym  
się m  
z ot

jedne z nich są samotne, inne zbliżone, łączące i zlewające się z sobą. Patrząc od razu na znaczną przestrzeń, spostrzegamy, że te strumyki wiążą się jedne z drugimi, tworząc tym sposobem siatkę; jestto siatka naczyń młeczowych (fig. 56, 57). Młecz zstępuje jednym kanałem, a wszedłszy w drugi, wznosi się znowu, mamy więc przed oczami prawdziwe krążenie, które można porównać z krążeniem krwi w naczyniach włoskowatych u zwierząt. Schultz, któremu winni jesteśmy to odkrycie, radzi nazywać krążenie to *obieganiem* (cyclosis).

Chociaż kierunek cząstkowych strumyczków bywa różny, zdaje się jednak, iż głównie jest zstępującym, gdyż bieg ogólny odbywa się niezaprzeczenie z góry na dół, jakieś to wyżej okazali. Obieganie przedłużając i mnożąc stosunki młéca z tkankami, które tenże przechodzi, musi powiększać skutki jakie za sobą pociąga obecność soku pożywnego.

§ 268. Jakaż siła udziela młeczowi popędu? Potworzono wiele rozmaitych objaśnień, a to właśnie dlatego, że nie znaleziono ani jednego zadowalającego. Jedni uważają obieganie za zjawisko czysto fizyczne, jak Amici, który je przypisuje wpływowi ciepła, działającego na naczynia właściwe tak, jak na termometr, i okazuje, że zbliżając do nich ciało jakie mocno ogrzane, można zmienić kierunek strumyczków. Lecz jakże sam wpływ ciepła byłby w stanie wywołać ruch w kierunku stałym, kiedy takowy musi się przecież nieprawidłowo rozdzielać po powierzchniach tak rozrzuconych, jak to np. ma miejsce w gałęziach i liściach drzewa? Nie zaprzeczając bynajmniej skuteczności tego wpływu, niepodobna go jednak uważać za jedyną przyczynę. Inni fizjologowie przypuszczają działanie naprzemian przyciągające i odpychające jednych ziarenek na drugie, lub ogółu tychże na ściany naczyń, lecz chcąc zjednać ważność tym przypuszczeniom, potrzebaby dowodów, których dotąd doświadczenie nie dostarczyło. Niektórzy znowu przyjmują kurczenie się ścian, które następuje nie w całym narządzie od razu, ponieważ wtedy otworzywszy naczynie na obu końcach, płyn musiałby w całości i jednym i drugim wypłynąć, gdy tymczasem wypływa jednym tylko z nich, a to w kierunku strumienia. Kurczenie się więc, musiałoby się zaczynać na jednym końcu i postępowe zwolna ku drugiemu; lecz przekonać się można, że częstokroć ściany naczynia są ściśle zrosnięte z otaczającymi tkankami, a niekiedy nawet tak się z niemi

zlévają, iż wielu przeczy weale ich istnienia, przypuszczając że mlécz krąży w przestworach międzykomórkowych. Być zresztą może, iż wnikanie i tu się objawia; że zaczynając działać od kończyn górnych, gdzie się mlécz wytwarza, prze takowy oczywiście w stronę przeciwną, tojest ku dołowi. Cóżkolwiek bądź przyrodzenie mléczu i siła dająca mu popęd, pokryte są jeszcze grubą zasłoną, dlatego téż wymieniliśmy tu tylko różne przypuszczenia, nie uważając jednakże żadnego z nich za dostateczne.

§ 269. Ruch trwa dosyć jeszcze długo w częściach odłączonych od rośliny; i na takich téż daje się najwygodniej i najłatwiej postrzegać; tak np. na cienkich płatkach obnażonej z naskórka kory klonu jaworowego, i wielu sfigach, na przylistkach okrywających pączki wierzchołkowe tychże, szczególnie zaś w sfdze elastycznej; na koronie powoju białego i t. d. i t. d. Płatki odcięte, na których czynimy postrzeżenia, muszą być zmoczone kropelką wody, aby przeszkodzić zeschnięciu, któreby ruch wstrzymało.

Większa część naczyń mléczowych znajduje się w korze na zewnątrz, albo co częściej jeszcze, na wewnątrz łyka, i takowe dają się tu widzieć aż do kończyn korzeni. Można jednak znaleźć je rozproszone na wielu jeszcze innych miejscach, a nawet w samym rdzeniu, o czém wspomnieliśmy już wyżej (§ 60).

§ 270. Pozostaje nam jeszcze rozebrać czynność włókien łyka. Mirbel uważa włókna te za część układu naczyń właściwych, od których jednakże różnią się dostatecznie samą zewnętrzną postacią, rurki ich bowiem są pojedyncze, a nie złożone; nadto, ściany ich są podobne do ścian włókien drzewnych. Mniemanie Mirbela opiera się na przejściach kształtu, jakie się pomiędzy naczyniami właściwymi i włóknami łyka spostrzegać niekiedy dają; np. w wielu toinowatych i trojęściowatych, naczynia nawet mléczowe mogą zupełnie zastępować miejsce łyka, w wielu tych i innych jeszcze roślinach, jak np. w ostromléczach, które tak obfitują w mléce. Jednakże w większej liczbie roślin, posiadających łyko w kształtach zwyczajnych, płyn zawarty w takowém, jest bezbarwnym, a przeto różni się od płynu naczyń właściwych, tuż obok leżących. Sok zatem zstępujący musiałby posiadać odmienne nieco przyrodzenie, w dwóch rodzajach naczyń, zwykle towarzyszących sobie, podobnych wprawdzie i zastępujących się niekiedy

w potr  
stać n  
rurki  
dział  
§ 2  
(§ 58  
ności  
które  
ścienn  
kiwań  
i drze  
przez  
móre  
pączk  
wszys  
w ogol  
włókna  
się we  
po cał  
nie ro  
kroć s  
robion  
się z  
nych,  
ściwe  
wie ni  
Zaw  
nych,  
dujące  
cych o  
najczę  
dnakże  
powinn  
także p  
§ 2  
chu og  
dująca  
wchod  
skiem  
w łody

w potrzebie, ale jednak nie tożsamy. Podług tego, musiałoby stać na niższym stopniu wykształcenie we włóknach, których rurki długie nie rozgałęziające i nie zakręcające się, prowadziłyby go krótszą drogą na dół.

§ 271. Śledząc miejsca, w których się znajduje miazga (§ 58), ten pierwiastek, albo raczej początek wszelkiej ustrojności roślinnej, spostrzegamy, iż takowe są właśnie drogą, którą przechodzą naczynia właściwe. W łądogach dwuliściennych, które nam służyły za przedmiot wszystkich poszukiwań powyższych, wielki ten zasób gromadzi się między korą i drzewem wzdłuż całego walca utworzonego od zewnątrz przez naczynia właściwe i włókna łykowe. Mała kupka komórek, tworząca się w kącie każdego liścia, w celu uistoczenia pączka, leży właśnie na przejściu naczyń, które prowadząc wszystkie soki właściwe, wytworzony w liściu, ściskają się w ogonku, lub rozpierzchają w pochwie. U jednoliściennych włókna i rurki, uważane za łyko i naczynia właściwe znajdują się we wszystkich wiązkach włóknonaczynnych, rozrzuconych po całej łądydze; miazga też gromadzi się w miejscach podobnie rozrzuconych. Pączek wierzchołkowy tych roślin, częstokroć samotny, musi wtedy najpierw korzystać z soków wyrobionych w liściach pączka poprzedzającego; toż samo dzieje się z ważniejszych jeszcze powodów, w roślinach bezliściennych, opatrzonych naczyniami. Wszędzie zaś, naczynia właściwe sięgają kończyn korzeni, téj siedziby nieustannego prawie uistaczania się nowych części.

Zawieralniki wielu innych istot w wysokim stopniu wyrobionych, stoją także w związku z naczyniami właściwymi, znajdującymi się w wielkiej ilości wokoło przyrządów wydzielających owe istoty. Rozumié się zatem, iż zawieralniki te leżą najczęściej w korze; tak np. zawieralniki żywic. Można je jednakże napotkać i w innych miejscach, np. w rdzeniu, co nie powinno dziwić, jeśli zważymy że naczynia właściwe mogą także prawie wszędzie być rozrzucone.

§ 272. Zbierzmy w krótkości to wszystko, co wiemy o ruchu ogólnym płynów, w roślinach doskonalszych. Woda, znajdująca się w ziemi i zawierająca w roztworze rozmaite istoty, wchodzi w korzenie kończynami tychże; ztamtąd pod nazwiskiem oskolnicy, wstępuje w wyższą część korzeni, potem w łądygę, wskroś układu drzewnego, a to, już kanałami pro-

stemi cewek, już przez włókna i komórki, które przebywa kolejno, rozpuszczając i przywłaszczając sobie rozmaite nowe istoty. Idąc tą drogą z dołu do góry i z wewnątrz ku zewnątrz, przybywa w liście i do powierzchni kory, gdzie wchodzi w stosunki z powietrzem. Następnie, przerobiona zupełnie w skutek tej czynności oddychania, obiera kierunek przeciwny i zstępuje po największej części przez korę, czyto wprost przez rozmaite zakrety; po drodze składa w gotowe przerwy, rozliczne istoty przeznaczone po większej części dożywienia lub uistaczania tkanek; a nakoniec przybywa znowu do kończyn korzeni, gdzie się wysysanie zaczęło.

§ 273. **Ruch soków wirowy, czyli krążenie wewnątrz-komórkowe.** — Rośliny w jakich dotąd uważaliśmy ogólny ruch soków, opatrzone są różnemi wydrążeniami i kanałami, w których ten ruch się odbywa. Lecz wiemy, iż jest wiele innych roślin, posiadających budowę daleko jednostajniejszą, złożonych z samych komórek, bez cewek i naczyń właściwych. Rozumié się, że płyny mogłyby w skutek samej siły wnikania dostać się z jednego ich końca na drugi; lecz postrzeżenie uczy, że w wielu przynajmniej z nich, prócz tego fizycznego zjawiska, co innego się jeszcze odbywa. Weźmy ramienicę (*Chara*), jako przykład najbardziej znany, i na którym postrzeżenia tego rodzaju są najłatwiejsze. Jestto roślina zwyczajna w naszych wodach stojących, złożona (§ 101) z rzędu komórek obłych, zrosniętych z sobą końcami; w wielu jej gatunkach, pojedyncze komórki tworzą rodzaj międzywęzłów; w wielu innych, komórki te okryte są innemi mniejszemi i równoległemi, które stanowią jakby pochwę tamtych; dlatego téż chcąc widzieć komórkę środkową, należy oddalić zewnętrzne, zeszkobując je ostrożnie. Umieściwszy w wodzie pod mikroskopem, czyto komórkę pojedynczą, czy téż środkową po odkryciu takowej, spostrzeżemy wewnątrz niej ruch całkiem wyraźny; mnóstwo ziarenek rozmaitej wielkości pływa wśród cieczy przezroczystej, która ją wypełnia, porusza się razem wzdłuż ścian, w dwóch głównych kierunkach, wstępującym i zstępującym. Łatwo rozpoznać iż to jest skutkiem biegu jednego tylko strumyczka, który wznosząc się na jednej stronie rureczki, zwraca się na końcu wyższym tójże, zstępuje po drugiej stronie, a zwracając się następnie na końcu niższym znajduje się tam, z kąd wyszedł, i zaczyna znowu tenże sam

bieg, o  
według  
rucher  
Wycho  
cokolw  
nek ni  
od niej  
wzdłuż  
ścianę  
dnociąg  
iż w ka  
ziarenk  
To dow  
dziale  
musiałt

§ 27  
ślin wod  
niż w ra  
rzaniec  
różnem  
rzonko  
roślin,  
a prze  
Strumy  
w kier  
ukośną  
odosobr  
komórka  
jednych,


§ 272  
własnoś  
Zręczne  
cych róż  
wewnąt  
i nadzw  
klowaty  
(Trade  
uderzają  
częściac

bieg, opisując tym sposobem okrąg, mniej lub więcej podłużny, według mniejszej lub większej długości rurki. Dlatego nazwano *ruchem wirowym* (rotatio), ruch ten soku wewnątrz komórek. Wychodząc ze swęj piérwszëj młodości, komórka skręca się, cokolwiek względem swęj osi, a strumyczek przybiera kierunek nieco ukośny względem tęjże, chociaż w początku biegł od nięj równolegle. Spostrzedz można iż wtedy porusza się on wzdłuż szerokiego paska zielonych ziarenek wyścielających ścianę komórki i tworzących część takowęj. Przerwywając jednociągłość rurki przewiazaniem jęj za pomocą nitki, ujrzymy, iż w każdym z dwóch, tym sposobem powstałych wydrzeń, ziarenka krążą pomiędzy przewiazaniem a końcem komórki. To dowodzi, że ruch nie odbywa się, jak wielu sądziło, w przedziale między dwiema błonami komórki, gdyż w takim razie musiałby ustać po przewiazaniu.

§ 274. Podobny ruch odkryto w komórkach wielu jeszcze roślin wodnych, posiadających budowę prostą wprawdzie, lecz mniej niż w ramienicy, takimi są: wodziana (*Najas*), żabiściek, nurzaniec (*Valisneria*). Zjawisko to jest w nich także bardzo wyraźnym, nadewszystko w komórkach tworzących włosy korzonkowe, lecz daje się widziéć i w innych częściach tychże roślin, w komórkach zajmujących wewnątrz łodyg lub liści, a przeto nie zostających w bezpośrednim związku z wodą. Strumyczek wskazany biegiem ziarenek, opisuje tu także elipsę w kierunku osi rośliny, zwykle równoległą, lub nieco tylko ukośną względem osi komórki. Ponieważ zaś komórki nie są odosobnione, można przeto na jeden raz widziéć ruch w wielu komórkach sąsiednich, obok leżących i przekonać się, że ruch jednych, nie zależy w niczém od ruchu drugich.

§ 275. Krążenie wewnątrzkomórkowe, nie jest wyłączną własnością roślin wodnych i mających skład bardzo prosty. Zręczne poszukiwania czynione na mnóstwie roślin posiadających różne stopnie ustrojności, okazały obecność tego ruchu wewnątrz komórek, szczególniej w tkankach bogatych w soki i nadzwyczaj szybko rosnących. Rośliny z rodziny przewdziekowatych (*Commelineae*), a między niemi gatunek dobowniku (*Tradescantia virginica*), okazują zjawisko to w sposób uderzający, we włosach swych stawowatych, tudzież w różnych częściach kwiatu i łodygi (fig. 222).

§ 276. Strumyczek niezawsze bywa pojedynczym, jak w pierwszych przez nas przywiezionych przykładach. Niekiedy



222.

zjawisko to, tak jest podobnym we wszystkich tych różnych roślinach; — pomiędzy odmianami, jakie się zdarzać mogą,

222. *p* Włos wzięty z kielicha kwiatu dobowniku (*Tradescantia virginica*), z kawałkiem naskórka *e e*, na którym widać szparkę *s*. W każdej z komórek naskórka i włosa, widać jąderko *n* i strumyczki kolujące, których kierunek wskazany jest strzałkami. W każdej z komórek znajduje się wiele strumyczków, krzyżujących się zwykle przy jąderku. Są one niewyraźne w naskórku, a nawet w komórkach tworzących szparkę; bardzo zaś wyraźne w komórce *a*, która stanowi podstawę włosa; w wyższych, podłużnych komórkach narysowano pojedyncze tylko strumyczki (rzeczywiście znajdują ich się kilka).

znajduj  
a prze  
dziwac  
ków w  
szej na  
na kor  
ostate  
chowyj  
pię mus  
Schl  
(Cera  
od ko  
na jej  
gdyż  
wyląc  
które  
które  
z ziare  
stokro  
na stru  
od nieg  
rywaja  
swego  
tworz  
§ 2  
który  
niższy  
ślinach  
wie po  
ta, ka  
łałnoś  
życia;  
obiedw  
zują d  
pierws  
§ 2  
miesią  
kach s  
okreś  
mcyki

znajduje się tyle nieznanymi, przejść od jednych do drugich;— a przenikanie naczyń przez ściany komórek, jest myślą tak dziwną, że powszechnie zgodzono się na to, aby ruch soków wewnątrzkomórkowy uważać w roślinach najodmienniejszej nawet ustrojności, za tożsame. Prócz tego, patrząc długo na komórki o wielu strumyczkach, spostrzedz można, że te ostatnie ulegają dość widocznym i licznym zmianom. Nie zachowują bowiem ani dróg, ani kierunków stałych, co by nastąpić musiało, gdyby były zamknięte w osobnych rurkach.

Schleiden opisał w młodych komórkach bielwa rogatku (*Ceratophyllum*), strumyczek, który przebiegłszy oś komórki od końca do końca, rozpostarł się następnie wielu odnóżkami na jej ścianach. Jestto jedyne postrzeżenie w tym rodzaju, gdyż wszystkie inne dotąd pokazywały nam, że strumyczki wyłącznie przy ścianach się pomykają. Ściany te, w miejscach któredy strumyczki przechodzą, powleczone są płynem lepkiem, którego płateczki mniejsze lub większe, bywają niekiedy wraz z ziarenkami w ruch wprawione. Komórki te posiadają częstokroć jąderko, które jak się zdaje, wywiera pewien wpływ na strumyczki, główniejsze bowiem przynajmniej z takowych od niego się rozchodzą (fig. 222). Zdarza się nawet iż je porywają i unoszą z sobą; co do samego nawet przyrodzenia swego, jąderko zdaje się mieć wiele podobieństwa z istotą tworzącą strumyczki.

§ 277. Z tego co się powiedziało wynika, że ruch wirowy, który zrazu uważano za rodzaj krążenia właściwego roślinom niższym i wodnym, nie posiadającym krążenia jakie się w roślinach opatrzonych naczyniami znajduje, jest zjawiskiem prawie powszechnym w państwie roślinnym; powszechność zaś ta, każe się domyślać jego ważności. Rzeczywiście téż działalność jego zdaje się być w związku z działalnością samego życia; jednakowe okoliczności wywierają jednaki wpływ na obiedwie. Działacze fizyczne lub chemiczne, które, jak pokazują doświadczenia, powiększają, zmniejszają lub wstrzymują pierwszą, zmieniają w ten sam sposób i drugą.

§ 278. Wiele roślin, a mianowicie rośliny z powodu tkanki mięsistej i grubiej nazwane mięsistymi, przedstawiają w komórkach swych, zamiast wyraźnego ruchu wirowego, ruchy nieokreślone soku, od jednego punktu ściany ku drugiemu, strumyczki cząstkowe, które zaczynają się a nie kończą, lub które

tylko kończą się w jednym z kątów wydrążenia. W wielu nakoniec roślinach, napróżno szukano, choćby najmniejszego śladu krążenia komórkowego. Jednakże z faktów odjemnych, nie można wyprowadzać żadnych wniosków, w obec licznych faktów potwierdzających. Tak więc wbrew pozornemu spoczynkowi, istnieje w roślinie ruch rzeczywisty, ogólny i określony, a to zarówno w każdej z najdrobniejszych cząstek jak i w jej całości.

## ODDYCHANIE.

§ 279. Zanim przystąpimy do opisanego zjawiska oddychania roślinnego, zastanówmy się nad narzędziami przeznaczonemi do pełnienia tej czynności i nad wartością mniemań dawniej panujących i po dziś dzień w niektórych książkach odświeżanych, a które naznaczają główną rolę w oddychaniu cewkom rozkręcalnym. Pozorne podobieństwo tych cewek, z tchawicami owadów, podało oczywiście myśl do tego. Wiadomo, że na bokach ciała owadu, znajduje się szereg otworków prowadzących do tyłu naczyń, z których każde składa się z dwóch rurek, jedna w drugą włożonych; między nimi zaś znajduje się włókno w węzownicę zwinięte. Wiadomo dalej, że rurki te rozpościerają się w skutek rozgałęzień coraz drobniejszych, po całym wnętrzu ciała, że tam stykają się tym sposobem z płynem żywotnym, wewnątrz owe wypełniającym, że z jednej strony płyn, a z drugiej powietrze, które wszedłszy przez otworki, krąży w rurkach, przez cieniutkie ściany tychże wpływają wzajemnie na siebie; że tym sposobem oddychanie odbywa się bezpośrednio na wszystkich punktach. Znalazłszy w roślinach naczynia opatrzone nitką węzownicową, rozpościerające się także w całym układzie gałązek i liści, w pierwszym roku ich bytu, czyli inaczej mówiąc, we wszystkich częściach zielonych, w których się właśnie oddychanie odbywa, sądzono iż one biorą udział w tej czynności. Przypuszczano nawet niegdyś, że cewki rozkręcalne, kończą się wprost przy szparkach, a tym sposobem podobieństwo z tchawicami owadów było zupełnym i zdawałoby się prawie nakazywać przekonanie. Lecz tak nie jest wcale, owszem, wiemy dziś, że cewki rozkręcalne są oddalone od szparek; w gałązkach o całą grubość części leżących między cewą rdzeniową, a naskórką (§ 62), —

w liściach zaś o grubość miększu; że nadto w tych ostatnich cewki leżą ku powierzchni górnej mniej w szparki obfitującej (§ 125). Powietrze zatem nie wchodzi bezpośrednio w cewki przez szparki, musiałyby wprzód przebywać warstwy mniej lub bardziej grube innych części, i wchodzić w ich wydrążenie przez ściany.

Wszystko czego nas uczy anatomja ze względu na drogi, jakimi powietrze wchodzi do tkanki roślinnej (§ 127), jest, że pod powierzchnią, która dlań jest otwartą, znajduje znaczną ilość przerw, spółniczących z sobą, i że także może krażyć około komórek, które oddalając się od siebie, tworzą jakby siatkę wydrżeń wewnętrznych, zostających w związku z zewnętrznym, za pomocą szparek. Być może, iż zachodzi jeszcze nieco głębiej, tam, gdzie znajduje przestwory międzykomórkowe. Tu zaś kończą się bezpośrednio drogi, po których krażyć może.

Jakież więc jest znaczenie fizjologiczne cewek rozkręcalnych? Użytek ich jestże taki sam jak cewek innego rodzaju, a w takim razie dlaczego położenie ich i postać są odrębne? Ponieważ one wcześniej od innych naczyń się tworzą, a to w częściach jeszcze wątkich i rosnących silnie wzdłuż, a ponieważ w miarę jak wzrost ten wolnieje i ustaje, nowo powstające cewki przybierają postać odmienną, oddalającą się coraz bardziej od węzownicy; można więc wnieść, że budowa ich odrębna i sposób rozwijania się, są raczej w związku z potrzebami wzrastania wzdłuż, odbywającego się jednocześnie na całej osi gałązki, a nie na końcach tylko onej, jak w korzeniu. Przy wstępowaniu soków, cewki rozkręcalne napełnione są tym płynem, jak każda inna część, a nawet przepuszczają go daleko prędzej, od reszty naczyń. Później, mogą wprawdzie zawierać gazy, zamiast płynów; lecz że właśnie nie one same temu ulegają, nie dowodzą więc, aby to w ich tylko przyrodzeniu leżało. Jeśli dopomagają oddychaniu, to przynajmniej ani wyłącznie, ani stale. Wniosek ten stwierdza przykład roślin pozbawionych cewek rozkręcalnych, w których jednakże oddychanie doskonale się odbywa: np. w paprociach.

§ 280. Wiadomo, iż powietrze atmosferyczne jest mieszaniną dwóch gazów: kwasorodu i saletrorodu. Jedna objętość powietrza posiada na 100 częściach prawie 79 saletrorodu, a 21 kwasorodu; do czego jeszcze dodać należy maleńką ilość

innego gazu, to jest kwasu węglowego. Ten ostatni jest związkiem 8 części (co do wagi) kwasorodu, z 3 częściami węgla, ciała, które mamy w stanie stałym w węglu zwyczajnym, lecz które przechodzi w stan lotny, skoro się łączy z kwasorodem. Kosztem to właśnie owęj maleńkiej ilości kwasu węglowego, odbywa się oddychanie rośliny. Na pierwszy rzut oka dziwićby się można, że takowa wystarcza temu celowi, ponieważ rzeczony gaz tworzy zaledwie tysięczną część wagi powietrza. Lecz zdziwienie znika, jeśli sobie przypomnimy rozległość i wysokość atmosfery, która na naszą kulę ciąży, i jeśli rozważymy, iż tysięczna nawet część tego ciężaru stanowi jeszcze ogromną ilość, przewyższającą wielokroć wagę wszystkich roślin ziemi razem zebranych; wypada bowiem z tego obliczenia, że atmosfera zawiera 1,506 biljonów kilogramów węgla.

§ 281. Chemja zdołała oznaczyć zmiany zachodzące w powietrzu tak złożonem, a to za pomocą dwóch różnych sposobów postępowania: 1) Wstawia się roślinę pod dzwon napełniony powietrzem, które się nie może odnawiać; a po pewnym oznaczonym czasie, robi się rozbiór tego powietrza. Można zmieniać to doświadczenie, napełniając dzwon atmosferą sztuczną, w której pierwiastki powietrza nie stoją do siebie w swym zwykłym stosunku, albo będą zastąpione innemi; potem zaś obaczyć co z tego wynikło, tak pod względem składu tej atmosfery, jak co do samej rośliny. 2) Daje się wschodzieć ziarnu nasienia w czystym piasku, skropionym także czystą wodą, i dozwala się żyć roślinie dając jej tylko za pożywienie pewne, wiadome ilości również czystej wody; potem następuje rozbiór jej chemiczny. Znając dokładnie skład nasienia, z rozbioru innych ziarn jego posiadających też samą wagę, można się dowiedzieć co roślina wzięła z wody, którą się wyłącznie żywiła. Wszystko, co posiada więcej nad to, co było zawartem w ziarnie i co następnie wzięła z wody, musi pochodzić z powietrza. Ponieważ tu doświadczenie trwa długi czas, w powietrzu ciągle się odnawiającem, może nam przeto odkryć ilości nieznaczne, któreby były żadnemi prawie, w bardzo małej objętości powietrza i w czasie bardzo ograniczonym, a które przeto nie dały się spostrzedz przy pierwszym doświadczeniu.

§ 282. Pierwsze doświadczenie pokazało, że powietrze atmosferyczne, w którym roślina oddychała, utraciło pewną ilość węgla, a zyskało pewną ilość kwasorodu. Obie zaś ilości stoją

względ  
utwo  
dostaj  
chając  
kwas  
ten kw  
rém w  
dzie m  
tule m  
roślin  
jak n  
my ot  
zenia  
roślin  
§ 2  
tło s  
wa; g  
a mnie  
wien  
niając  
za so  
nianie  
węgl  
śliny  
mane  
dłuża  
nied  
nie w  
takie  
rośnic  
świat  
postr  
sztucz  
silone  
§ 2  
zielo  
razu  
wiele  
niane  
tych c

względem siebie w tym prawie stosunku, jakiego potrzeba do utworzenia, przez połączenia się ich, kwasu węglowego, niedostaje tylko maleńkiej ilości kwasorodu. Roślina zatem oddychając, rozkłada kwas węglowy, zatrzymuje jego węgiel i część kwasorodu, uwalniając resztę tego ostatniego. Ale pochodziż ten kwas węglowy rozłożony, z samego tylko powietrza, z którym wszedł bezpośrednio w roślinę, lub czyli w części pochodzący może z wnętrza rośliny, gdzie się gotowy znajdował? Ostatnie mniemanie jest bardzo prawdopodobnem, gdyż umieściwszy roślinę w atmosferze, pozbawionej zupełnie kwasu węglowego, jak np. w czystym saletrorodzie, po niejakiem czasie znajdujemy obok tegoż, pewną ilość kwasorodu, pochodzącą z rozłożenia kwasu węglowego, który się znajdował w samej tkance rośliny.

§ 283. Tak się dzieje kiedy roślina wystawiona jest na światło słoneczne; lecz w zupełnej ciemności co innego się odbywa; gdyż pod dzwonem znajdujemy więcej kwasu węglowego, a mniej kwasorodu. Działanie jest tu odwrotnem; części bowiem zielone rośliny wciągnęły i zatrzymały ten ostatni, uwalniając kwas węglowy. Tak więc zmiana dnia i nocy pociąga za sobą zmianę zjawisk oddychania: ustalenie węgla i uwalnianie kwasorodu w dzień, przechodzi nocą w uwalnianie kwasu węglowego i zatrzymywanie kwasorodu. Nawet we dnie, rośliny pozbawione światła, ulegają podobnym wpływom: trzymane w cieniu, wysilają się w końcu, to jest tracą barwę i przedłużają się, tracąc wiele ze swęj twardości, i pokazując przez to niedostatek węgla, który barwi i umacnia ich tkanki. Jednakże nie wszystkie są równie czułe na ten wpływ, i nie wymagają takiego samego natężenia światła, ponieważ wiele z nich silnie rośnie i w cieniu. Pomiędzy dwiema ostatecznościami, to jest światłem słonecznem a zupełną ciemnością, znajduje się wiele pośrednich stopni w natężeniu zjawisk oddychania. Światło sztuczne bardzo mocne, może z czasem zazielenić rośliny wysilone.

§ 284. Możnaż w tém wzajemnem działaniu światła i części zielonych rośliny, odkryć jeszcze coś więcej nad wypadek od razu w oko wpadający? Wiadomo, że światło rozkłada się na wiele różnobarwnych promieni, z których jedne bywają pochłaniane, drugie odbijane na powierzchni ciał, i że wypadkowa tych drugich, nadaje tymże ciałom barwę, której wrażenie przy-

bywa do naszego oka. Wiadomo dalej, że wiązka światła nie tylko oświetla, ale zarazem i ogrzewa ciała, niejednakowo jednakże każdym z różnobarwnych swych promieni; że w tych ostatnich ciepło nie jest nierozłącznie spojone ze światłem, lecz że w niektórych środkach, czynniki te oddzielają się od siebie i obierają drogi odmienne; przez co promień zostaje po raz drugi rozłożonym, a to na świecący i grzejący. Do tej dwojakiej własności, łączy się i trzecia: światło może zmieniać chemicznie ciała, na które pada, jak tego dowodzą niektóre istoty niezmiennające się w ciemności, a ulegające rozkładowi w świetle; co spowodowało do przypuszczenia promieni chemicznych, wchodzących także w skład promieni światła. Na obrazach robionych za pomocą dagierotypu (którego urządzenie zasada się na tej ostatniej własności), części zielone roślin, równie jak obrazy wszystkich w ogóle ciał zielonych, nie zostają oddane. Można więc sądzić, że promienie chemiczne zniknęły w roślinie, która je pochłonęła, i że to jest szczególniejszą własnością zielonych jej części. Co do promieni grzejących, te muszą nie wywierać wpływu na oddychanie rośliny, ponieważ ono odbywa się przy świetle, a ustaje w ciemności, przy jednakowej nawet temperaturze.

§ 285. Części niezielone roślin działają podobnie w dzień, jak zielone w ciemności, to jest łączą się z kwasorodem a oddają węgiel. Podobnie czynią korzenie i inne podziemne części; zdaje się, iż kwasoród który przyciągają, jest im potrzebny: gdyż obumierają jeśli je otoczmy atmosferą pozbawioną tegoż. Łatwy przystęp powietrza aż do nich, jest warunkiem przyjaznym rośnięciu, zakopanie zaś ich do głębokości, która ów przystęp utrudnia, jest szkodliwem.

§ 286. Tak samo dzieje się z nasieniem. Zaczynając wschodzić, wywięzuje przy świetle nawet słonecznym, kwas węglowy, a pochłania kwasoród. Pierwszy powstaje z pewnej ilości węgla zawartego w tkance ziarna, i łączącego się z pochłanianym kwasorodem, który w całości do tego bywa użytym: jeśli bowiem roślina wschodzi w czystym kwasorodzie, ilość wywięzującego się kwasu węglowego stoi w stosunku pochłoniętego kwasorodu. To trwa tak długo, aż póki w skutek wschodzenia nie rozwiną się części zielone roślinki; odtąd zaś, zjawisko staje się odwrotnem, zaczyna się bowiem wdychanie kwasu węglowego i wyziewanie kwasorodu. Ta potrzeba kwasorodu w po-

czątku wschodzenia, tłumaczy, dlaczego nasiona mogą w znacznej głębokości, tak długo pozostawać bez zmiany.

§ 287. Ciekawe doświadczenie Edwardsa i Collina, pokazuje, że przy działaniu nasienia wschodzącego na środek który je otacza, może nastąpić rozkład nie powietrza, ale czego innego. Badacze ci spostrzegli, że przy wschodzeniu ziarn bobu, umieszczonych w wodzie, wywiązują się liczne gazy, pomiędzy którymi kwas węglowy znajduje się w wielkiej bardzo ilości, przewyższającej prawie 8 razy małą ilość powietrza, jaka się zwykle w wodzie znajduje. Kwasoród więc tego powietrza, nie mógł łącząc się z węglem nasienia, wystarczyć do utworzenia wszystkiego kwasu węglowego jaki się wywiązał; nadmiar przeto tegoż musiał powstać w skutek rozkładu wody, której jeden pierwiastek, tojest kwasoród, połączył się z węglem; drugi zaś, tojest wodoród, nie znajdując się między gazami wywiązanemi, musiał zostać pochłoniętym przez nasienie. Wspomnieni pisarze wnieśli ztąd, iż woda ma przy wschodzeniu znaczenie nietylko czysto-fizyczne, gdyż może prztytem ulegać rozkładowi.

§ 288. Z drugiej strony Boussingault okazał w inny, wyżej wspomniany sposób (§ 281), tojest za pomocą rozbiuro chemicznego rośliny, która się rozwinęła kosztem czystej wody i powietrza atmosferycznego; że takowa może po pewnym czasie zyskać małą ilość saletrorodu, która wtedy oczywiście pochodzi tylko z powietrza. Ilość ta okazała się dość znaczną przy rozbiurze niektórych strąkowych, jak np. koniczyny i grochu; a nie było jej wcale przy rozbiurze zbóż, jak np. pszenicy i owsa. Pochodziż ona z saletrorodu samego powietrza, lub, co prawdopodobniej, z wyziewów ammonjakalnych, jakich nieskończenie mała cząstka znajduje się zwykle w atmosferze, podług zdania niektórych fizyków? Obaczmy niżej, że w ziemi ammonjak (związek saletrorodu z wodorem) ma wielkie znaczenie w żywieniu roślin.

§ 289. Z tego co się powiedziało, wynika, że roślina może czerpać z powietrza węgiel, kwasoród, wodoród i saletroród; a godnem zastanowienia jest, iż z pomiędzy tych pierwiastków, wybióra właśnie takie, które niejako dodatkowo tylko znajdują się przy powietrzu, w różnych, a najczęściej nieskończenie małych ilościach, tojest kwas węglowy, parę wodną i amonjak. Pochłanianie jednakże wodorodu i amonjaku z powietrza, zwy-

kle zaledwie że daje się ocenić, i znaczenie jego przy oddychaniu zdaje się być dotychczas wcale podrzędnem, względem pochłaniania węgla i kwasorodu. Zatem samo wdychanie kwasu węglowego i rozkład jego w częściach zielonych, można uważać za najważniejsze zjawisko przy oddychaniu roślin.

Niektórzy widząc, iż cała roślina zostająca jeszcze w postaci nasienia, a następnie kiedy się rozwinie, wiele jej części we dnie, a wszystkie podczas nocy, wdychają kwasoród a wywiązują kwas węglowy, — chcieli w samem tylko tém działaniu widzieć oddychanie roślinne, które wtedy byłoby zupełnie podobnem do oddychania zwierząt; rozkład zaś kwasu węglowego przy świetle, uważali tylko za czyn żywienia. Słuszność tego sposobu uważania rzeczy, zależy zupełnie od określenia, jakie zechcemy nadać oddychaniu. Jeśli je uważać będziemy za działanie, w skutek którego płyn przeznaczony do żywienia ciała ustrojnego, stykając się z powietrzem, przybiera własności usposabiające go ostatecznie do tego, pozostaniemy przy dawnéj teorii, która uważa powierzchnie zielone rośliny, będące w zetknięciu z powietrzem, to jest część kory, i co najgłośniejsza liście, za narzędzia oddychania. Ta myśl, pociąga ku sobie jeszcze ze względu na podobieństwo z oddychaniem zwierząt. Te bowiem wdychając powietrze, odejmują mu kwasoród, który krew zabięra z sobą i rozprowadza po wszystkich częściach ciała, wyprowadzając wstęczną drogą węgiel, który przy wydychaniu uchodzi w powietrze w postaci kwasu węglowego. Rośliny odbierają powietrze kwas węglowy, który wprowadzony między ich tkanki, pozostawia tam swój węgiel; kwasoród zaś powraca w powietrze. Tym sposobem oddychanie roślin, dzieje się niejako odwrotnie względem oddychania zwierząt i zacięra skutki przez toż w atmosferze sprawione; powietrze bowiem obiegłszy wnętrza narzędzi oddychania obu gromad istot ustrojnych, wraca do swego pierwotnego składu. Wprawdzie ze strony roślin, skutek wydany w nocy, musi w części niszczyć skutek wydany we dnie; lecz zważając ogrom węgla nagromadzonego w roślinach, i pomnąc, że osadzonym w nich został w skutek oddychania, przekonamy się, że znoszenie się wzajemne, nie wywarło w tym razie znacznego wpływu, że przybył dzienny węgla, przewyższa o wiele ubytek, i że wszystkie kwas węglowy wyziewany przez zwierzęta, mógł zostać uwięzionym. Ciągi powietrza atmosferycznego przywracają

bez ns  
psuta  
§ 2  
rozbie  
Brogm  
Wiado  
dnych  
tyko  
gną p  
i rozk  
ród a  
wa li  
będąc  
dnio n  
rego s  
stwor  
udziel  
wcho  
w kon  
wany.  
w zna  
się. L  
ryb,  
to z  
miar  
podo  
wart  
ulotni  
§ 2  
ziewa  
o któ  
dziel  
wniej  
wierz  
tak s  
się p  
prawi  
są nie  
liścia  
Parov

bez ustanku równowagę, któraby mogła gdziekolwiek być zespsuta w skutek skupienia wielkiej liczby zwierząt albo roślin.

§ 290. To porównanie dwóch królestw prowadzi nas do rozbioru oddychania roślin żyjących pod wodą, w którym Ad. Brogniart upatrzył pewne podobieństwo z oddychaniem ryb. Wiadomo, że u tych i u wielkiej liczby innych zwierząt wodnych, narzędzia oddychania zostają w związku z powietrzem tylko za pośrednictwem wody, która je otacza; że z nią ciągną powietrze, które się tamże w roztworze niejako znajduje, i rozkładają takowe zwykłym sposobem, zatrzymując kwasoród a oddając wodzie kwas węglowy. Znajomą nam jest budowa liści podwodnych (§ 127 *bis* [fig. 132]), które pozbawione będąc naskórka, a przeto i szparek, stykają się z wodą bezpośrednio mięksizmem swoim, zwykle niewiele warstw liczącym, a którego ściany cienkie przyciśnięte do siebie, nie zostawiają przestworów międzykomórkowych. Woda zatem może z łatwością udzielać temu mięksizowi powietrza, które zawiera a które wchodząc w roślinę, rozkłada się. Węgiel zostaje ustalonym w komórkach, które zieleńią, kwasoród zaś zostaje wyziewany. Światło wywiera zwyczajny swój wpływ na tę czynność, w znacznych bowiem głębokościach rośliny bieleją i wysilają się. Liście te wyjęte z wody, zsuchają się prędko, tak jak skrzele ryb, i stają się niezdolnemi do dalszego oddychania. Pochodzi to z niedostatku naskórka, który w roślinach powietrznych miarkuje parowanie, ochrania narzędzia oddychaniu służące od podobnego niebezpieczeństwa, i w ogóle dozwala plynom zawartym wewnątrz rośliny nadejść na miejsce tego, który się ulotnił.

§ 291. **Parowanie** (evaporatio). — Parowanie, czyli wyziewanie wody przez części roślinne wystawione na powietrze, o którym mieliśmy już sposobność mówić, jako o jednej z najdzielniejszych przyczyn wstępowania soków, dzieje się najgłówniej przez szparki, lubo odbywa się także i na reszcie powierzchni, a szczególniej na powierzchniach zielonych, lecz to tak słabo, że je można uważać za nieznaczące. Że zaś odbywa się przez szparki, przekonywa nas postrzeżenie, iż nie istnieje prawie wcale, kiedy takowych nie ma; jest małe, kiedy szparki są nieliczne, a w ogóle jest silniejszym na powierzchni dolnej liścia niż na górnej, słowem stoi zawsze w stosunku ich liczby. Parowanie zatem, które niektórzy porównali z przeziewaniem

zwierząt, powinno raczej, z powodu siedziby swój, która się właśnie znajduje na powierzchni oddechowej, być porównanem z wyziewaniem płucnem, z tém tak znacznem wydalaniem pary wodnej, która z oddechem uchodzi; dlategoż chcemy się tu nié m zajmąć. Aby porównanie uczynić podobniejszém, dodajmy jeszcze, że działalność parowania zwiększa się pod temiż samemi wpływami, co i oddychanie, to jest przy wystawieniu na działanie światła. W cieniu takiż sam, a nawet i wyższy stopień ciepła wywiera stosunkowo daleko mniejszy skutek, gdy tymczasem na przeziwianie nieznaczące, ciepło ma wpływ znakomity. W nocy wyziewanie zupełnie ustaje.

§ 292. Od ilości wody zawartéj w roślinie, zależy do pewnego stopnia ilość wody wyziewanéj. Nie obojętną było rzeczą, dojsć stosunku pomiędzy tą ostatnią, a ilością wody wessanéj w tym samym czasie. Łatwo to otrzymać można, wprowadzając niższy koniec gałęzi w szyjkę butelki zawierającéj ilość wody wiadomą, i umieszczając wszystko pod dzwonem, a po pewnym czasie ważąc wodę pozostałą w butelce, i tę, która wyparowała we wnętrze dzwonu. Aby stosunki zwyczajne rośliny tém mniej zostały naruszone, można gałąź zostawić na wolném powietrzu zanurzwszy ją w wodę, której ilość jest wiadomą, i na powierzchni której znajdować się będzie warstwa oleju, dla przeszkodzenia wyparowaniu. Po skończoném doświadczeniu waży się pozostała woda i roślina, którą zważyliśmy także i przed jego zaczęciem. Ubytek wody pokazuje ilość jéj wessaną; powiększenie się zaś wagi rośliny, ilość jaka w niéj zatrzymaną została; różnica obu daje ilość wody wyparowanéj. Stosunek ten różni się oczywiście w rozmaitych roślinach, lecz może także różnić się w jednéj i téj samej roślinie. Tak np. kępka mięty utracala przez wyziewanie w jednéj porze roku  $\frac{2}{3}$ , w innéj  $\frac{13}{18}$  wessanéj wody. Ten wpływ pór zależy od wielu przyczyn, pomiędzy któremi pierwsze miejsce zdaje się trzymać wiek rośliny; gdyż takowa w jednodkowej temperaturze i przy tém samém natężeniu światła, mniej wyziewa w lecie, niż na wiosnę i w jesieni. Woda wyziewana nie zawsze jest zupełnie czystą, lecz zawiera małą ilość istot roztworzonych, z któremi się zmieszała przechodząc przez roślinę.

§ 293. Wyziewanie powiększa się lub zmniejsza, według tego jak powietrze jest suche, lub mniej albo więcej wilgotne,

a usta  
którz  
dną,  
dlacz  
to są  
a bar  
i mog  
ka, kt  
de, po  
ściłisu  
lišmy  
wodą  
grani  
sanie  
kieru

§ 2  
bierz  
ne ut  
uisto  
zach  
ciu n  
dzac  
gają  
częs

(1)  
dlateg  
czynn  
w któ  
które  
narząd  
przech  
rajacy  
nie wi  
niczaj  
częs  
i kra  
pomie  
jest p  
celu, d

a ustaje prawie zupełnie w powietrzu nasyconém parą. Niektórzy nawet sądzili, że liście mogą czasami wciągać parę wodną, zamiast ją wyziewać, i tym sposobem chciano objaśnić, dlaczego niektóre rośliny mogą żyć długo bez korzeni. Lecz to są właśnie rośliny posiadające bardzo małą ilość szparek, a bardzo wiele soków, które przeto nadzwyczaj powoli znikają i mogą tém samém podtrzymywać żywienie. Wprawdzie, gałązka, której liście opatrzone licznymi szparkami, zanurzymy w wodę, pozostaje dość długo przy życiu; lecz tym sposobem umieściliśmy ją w podobnych powyższym warunkach, przeszkodziłszy bowiem parowaniu szparkami, które zostały otoczone wodą. Wysanie wody przez liście, musi mieć bardzo szczupłe granice, i trudno pojąć, jakimby sposobem mogło zastąpić wysanie korzeniami, gdyż wtedy oskólnica musiałaby przybrać kierunek wcale odwrotny.

ŻYWIENIE I WYDZIELANIE (1).

§ 294. Żywienie jest czynność, przez którą ciało ustrojue, bierze z istot zostających z niem w zetknięciu, pierwiastki zdolne utrzymać i wzmocnić części jego już utworzone, tudzież uistoczyć części nowe; a zatem pierwiastki, zdolne zarazem zachować je i powiększyć. Sprawa ta ustrojowa obejmuje w życiu rośliny trzy działania: 1) istoty nieprzerobione, przychodzące od zewnątrz, zostają wprowadzone w roślinę; 2) ulegają w niej pewnym przygotowaniom zawisłym po większej części od nowych, bardziej zakłanych związków pomiędzy

(1) Mówimy tu zarazem o żywieniu i wydzielaniu w jednym rozdziale, dlatego, iż trudno jest w roślinach odróżnić dokładnie od siebie te dwie czynności. Jeśli narzędziem wydzielającym nazwiemy przyrząd miejscowy, w którym wytwarza się i gromadzi istota jaka szczególna, różna od tych, które się zwykle znajdują w tkankach, trudno będzie napotkać w roślinach narzędzia usprawiedliwiająca podobne określenie. Gruczoły (§ 236, 240) przechodzą często w tkankę otaczającą; ściany wydzielające przerw, zawierających gumy lub żywice, nie przedstawiają żadnego odrębnego piętna; jedynie więc za pomocą zawartości, jesteśmy w stanie rozpoznać narzędzie, ograniczające się zresztą czasami na jednej tylko komórce. Dlatego większa część botaników, uważa prawie wszystkie istoty spoczywające, albo nawet i krążące w korze, za wydzielone. Ponieważ nie jesteśmy w stanie odróżnić pomiędzy niemi tych, które składają wyłącznie sok zstępujący, lepiej zatem jest połączyć je wszystkie pod innym względem, tojest względem wspólnego celu, do którego zdają się wszystkie służyć.

pierwiastkami wprowadzonymi; słowem, ustrajają się; 3) każda część bierze z istot tak przerobionych, pierwiastki zgodne z jej przyrodzeniem i przeznaczeniem właściwem, wiąże je i używa im własności, których dotąd nie posiadały, a któremi ona sama jest obdarzoną; słowem, przypodobnia takowe.

Pierwsze z tych działań, które rozbieraliśmy już powyżej, zdaje się odbywać pod wyłącznym prawie wpływem sił fizycznych. Drugie składa się z szeregu przeistoczeń, których objaśnienie, chemja albo już jest w stanie dać, albo przynajmniej domyślać się go może. Trzecie jest po większej części tajemnicą życia, i dlatego też siłę, która je wywołuje, nazwano żywotną. Siła ta przewodniczy jednakże i całemu ogółowi, a zarazem i następstwu zjawisk życia, które bez niej albo zupełnie ustają, albo nie odbywają się w zwykłym porządku; zawsze więc musimy uznać poza siłami mechanicznymi, fizycznymi i chemicznymi, siłę żywotną, która tamtemi kieruje i w ruch je wprawia.

§ 295. Mówiąc o wysaniu korzeni i oddychaniu, zastanawialiśmy się nad wprowadzeniem w roślinę istot zewnętrznych, a z których jedne pochodzą z ziemi, drugie z powietrza. Jedne idą na spotkanie drugich, a w miejscu gdzie się z sobą stykają, to jest przy powierzchni gałązek i liści, odbywa się działanie chemiczne, o którym świadczy odmienny skład powietrza wchodzącego i wychodzącego z rośliny. Wewnątrz niej zatem nastąpiło przeistoczenie istot z zewnątrz pochodzących, czyli jedno z działań znamionujących żywienie. Tak więc oddychanie wiąże się ściśle z żywieniem, i dlatego można je poniekąd uważać za jedną, ogólniejszą czynność.

§ 296. Rozbiór chemiczny okazuje we wszystkich częściach roślinnych, cztery tylko pierwiastki: węgiel, kwasoród, wodór i saletroród; sąto te same ciała, których jak widzieliśmy powietrze dostarcza roślinie, ziemia też nie może jej innych dostarczać. Wprawdzie, powiedzieliśmy już wyżej, że rozmaite istoty kopalne, które woda rozpuszcza w sobie, bywają także wprowadzone z nią przez korzenie, przebiegają również przez tkanki, a niektóre z nich ustalają się nawet tamże. Lecz obecność ich nie jest stałą, owszem często przypadkową tylko; znaczenie ich nie jest jeszcze dosyć wiadomem, częstokroć zdaje się, że jest żadnem, chociaż innym razem zdają się wywierać wpływy nie bezpośrednie wprawdzie, ale użyteczne; czę-

sto zachowują swe przyrodzenie, a nawet i postać krystaliczną (§ 22). Niżej przyjdzie nam jeszcze o nich mówić (§ 311, 316), teraz zaś odłożmy je na stronę i zajmijmy się istotami prawdziwie ustrojowymi, składającymi się z wymienionych powyżej pierwiastków.

§ 297. Te lubo tylko w liczbie czterech, mogą jednak utworzyć liczne związki złożone. W rzeczy samej, wiadomo, iż pierwiastki mogą się łączyć w rozmaitych stosunkach. Wyobraźmy sobie połączenie pewnego ciała A z ciałem B: ciało C powstałe z tego związku, może zawierać albo równe ilości A i B; albo 2, 3, 4, i t. d. części ciała A na jedną ciała B; albo 2, 3, 4, i t. d. części B na jedną A; słowem pewną liczbę jednych, na pewną liczbę drugich; a każdy z tych odmiennych stosunków, da nam odmienne ciało, z osobnemi piętnami i własnościami. Przypuszczamy, iż połączenie następuje pomiędzy nieskończenie drobnymi cząsteczkami jednego i drugiego ciała, cząsteczkami, które się dalej dzielić nie mogą, i które nazwano atomami: np. pomiędzy dwoma atomami ciała A i trzema atomami B, z kąd powstaje jeden atom C. Lecz łatwo pojąć, iż atomy te mogą się układać jedne względem drugich, dwoma, trzema lub więcej sposobami; ztąd też i atomy ciała C skupione zostaną dwoma, trzema, i t. d. sposobami, a przeto mogą pozostać trzy ciała, C, C' C'', odmiennych piętn i własności, lubo rozbiór chemiczny nie wykazuje żadnych różnic, gdyż wszystkie trzy składają się z dwóch części A na trzy części B. Takie to ciała różniące się od siebie, chociaż złożone z jednakowych pierwiastków i w jednakowym stosunku, nazywamy *izomerycznemi*. Po tych początkowych wiadomościach, które przytoczyliśmy dlatego, iż dobrze jest mieć je przed oczyma, ze względu na szczegóły poniżej wyłożone, łatwo jest zrozumieć jakim sposobem cztery pierwiastki, łączące się z sobą po dwa, po trzy i po cztery, a za każdym razem w rozmaitych stosunkach, mogą utworzyć wiele ciał różnych, szczególnie, jeśli niektóre z tych związków dają z swjej strony wiele istot izomerycznych.

§ 298. Ciała niestrojowe czyli kopalne, mogą się składać z jednego, dwóch lub więcej pierwiastków połączonych z sobą. Lecz zwykle stosunek tych pierwiastków jest bardzo prosty, dający się wyrazić przez liczby dosyć niskie. Jako przykład, przytoczmy związki, które nas tu najwięcej obchodzą,

ponieważ dostarczają roślinie pierwfastków, z których takowa w skutek nowych połączeń, utworzy istoty ustrojowe. Woda, składa się z jednej części (co do objętości) kwasorodu i z dwóch wodorodu; że zaś pierwszy jest szesnaście razy cięższy od drugiego, przeto woda składa się z ośmiu części, co do wagi, kwasorodu i z jednej wodorodu; kwas węglowy, co do objętości, z jednej części węgla i dwóch kwasorodu, co do wagi z trzech pierwszego i ośmiu drugiego; ammoniak co do objętości z jednej saletrorodu i trzech wodorodu, co do wagi z czternastu pierwszego i trzech drugiego.

Istoty roślinne są w porównaniu z nieustrojowemi daleko bardziej złożone. Po większej części powstają ze związku trzech przynajmniej pierwfastków: węgla, wodorodu i kwasorodu, lub z czterech jeśli do tego przybywa jeszcze saletroród. Stosunki ich są także zawsze daleko zawikławsze, wyrażające się przez liczby daleko wyższe. W istotach zwierzęcych skład staje się jeszcze bardziej zawikłany.

Nie będziemy tu przechodzili wszystkich istot roślinnych, i ograniczymy się tylko na tych, które napotykamy u wszystkich prawie roślin, postępując przytém od najprostszych do coraz bardziej złożonych. Zaczniemy przeto od najgłówniejszych związków potrójnych, tojest powstających z połączenia węgla z kwasorodem i wodorodem.

§ 299. Pomiędzy temi, nasamprzód zajmie uwagę naszą istota stanowiąca szkielet rośliny, ściłany komórek, włókien i naczyń; Payen bowiem okazał, że ona wszędzie posiada jednaki skład; że pozorne różnice, jakie się w niej napotkać dają, zależą od innych, zmiennych utworów, osadzających się na powierzchni, lub weiskających się nawet w jej miąższość (§ 20); że odłączywszy takowe i oczyściwszy należycie istotę rzeczona, a którą można nazwać *blonnikiem* (cellulose), takowa składa się: z 24 atomów węgla, 20 wodorodu, 10 kwasorodu, czyli co do wagi z 70 części węgla, 10 wodorodu i 80 kwasorodu. Pokazało się zaś, że skrobia (*amylum, amidon*) [§ 19], owa istota, która jak już mówiliśmy, znajduje się tak obficie i tak zwykle w komórkach, w postaci ziarenek twardych i nierozpuszczalnych w zimnej wodzie, posiada także ten sam skład chemiczny; podobnie ma się z inną jeszcze, równie często napotykaną istotą, lecz która rozpuszcza się w zimnej wodzie,

nie pra  
nazwa  
jednal  
pojąc  
staci,  
jedna  
wziar  
puszc  
przez  
ciagna  
lub po  
§ 2  
znajd  
najwa  
czaj  
nazwi  
i w kt  
się z  
chow  
wając  
i dext  
niew  
i jed  
wody

(1)  
twór  
polary  
nazwa  
bia; eu  
chowy  
ka win  
nych, l  
Przeko  
z jakie  
w praw  
bieniu  
(2)  
nieka  
nych p  
stajacy  
równie  
złożone

nie przybiera od jodu barwy niebieskiej, ani fioletowej, a którą nazwano *dextryną* (1). Otoż więc trzy istoty posiadające jednakowy skład, a różne piętna, a zatem izomeryczne. Łatwo pojąć, że jedna może przejść w drugą, przez odmienienie postaci, skoro tylko ułożenie atomów zostanie naruszonem, że jedna istota, może, w tkankach roślinnych, albo pozostawać w ziarenkach stałych i nierozpuszczalnych; albo stając się rozpuszczalną, przyjąc zgęstnienie syropu (2), który rozcieńczony przez oskólnicę, rozchodzi się z nią po całej roślinie; albo rozciągnąć się i zsiąść w błonę tworzącą ściany nowych komórek, lub podwajającą ściany komórek już istniejących.

§ 300. Mówiliśmy już także o cukrze, jako o istocie często znajdującej się w roślinach. Zpomiedzy wielu jego gatunków, najwięcej nas tu obchodzą, jako najpospolitsze: cukier zwyczajny czyli trzciny, i okruchowy czyli winogronny, które to nazwiska nadało mu od roślin najobficiej go posiadających i w których najdawniej jest znanym. Cukier zwyczajny składa się z 24 atomów węgla, 22 wodorodu i 11 kwasorodu. Okruchowy z 24 węgla, 28 wodorodu i 14 kwasorodu. Porównując skład ten z podanym wyżej składem błonnika, skrobi i dextryny, widzimy iż obadwa mało się od siebie różnią, ponieważ dosyć jest dodać do tamtych dwa atomy wodorodu i jeden kwasorodu, czyli co na jedno wychodzi jeden atom wody, a otrzymamy cukier zwyczajny, a z tego znowuż za do-

(1) Uważając promień światła polaryzowanego, przechodzący przez roztwór wodny dextryny, obaczmy, iż tenże zbacza *na prawo* od płaszczyzny polaryzacji; zboczenie tém jest mocniejsze, im roztwór jest gęstszy; ztąd to nazwa *dextryny*. Własność tę jednakże posiada w tym samym stopniu i skrobia; cukier zaś zwyczajny w stopniu nieco niższym. Przeciwnie cukier okruchowy i guma, sprowadzają zboczenie promienia *w lewo*. Biot, któremu fizyka winna to znakomite odkrycie, zastosował je przy badaniu soków roślinnych, których zatem przyrodzenie odgaduje za pomocą piętn optycznych. Przekonał on się tym sposobem, że soki zmieniają się według wysokości z jakiej są brane, i według pory o której się je bada; że promień zbaczający z prawo, w soku wstępującym, zbacza w lewo, skoro takowy ulegnie przerozieniu w korze i liściach.

(2) W tym stanie brano ją często za gumę, której téż pozór a nawet poniekąd skład posiada. Jednakże prawdziwe gumy, posiadają wiele odmiennych piętn tak fizycznych jak i chemicznych, i zdają się być utworem powstającym z przerobienia soków w korze, w której się téż znajdują, a nadto są równie jak inne soki tamże napotykanne § 303, istotami zwykle bardziej złożonemi.

daniem czterech atomów wodorodu i dwóch kwasorodu, czyli dwóch atomów wody, otrzymamy cukier okruczowy. Zajmującym jest spostrzeżenie, iż stopniowe ubywanie wody, które znamionuje wznoszenie się oskolnicy, daje się wykazać nawet w samych związkach, jakie takowa w sobie zawiera; widzimy bowiem, że na miejsce cukru okruczowego ukazuje się zwyczajny, w miarę tego, jak go szukamy w wyższych częściach rośliny, czyli innemi słowy, że cukier okruczowy utracą cząstkę wody w skład jego wchodzącą.

§ 301. Przejdźmy teraz do istot bardziej złożonych, lecz których obecność, równie jak poprzedzających, jest zwykłą w tkankach roślinnych. Sąto związki poczwórne, w których saletroród przystępuje do trzech innych pierwiastków. Tu należy włóknik zwierzęcy, złożony według najnowszych poszukiwań Dumasa i Cahours, co do wagi z 52,7 węgla, 6,9 wodorodu, 16,6 saletrorodu, 23,8 kwasorodu; białko i sérownik (*caseinum*), ciała izomeryczne <sup>(1)</sup>, złożone podług tychże badaczy z 53,5 węgla, 7 wodorodu, 15,7 saletrorodu, 23,8 kwasorodu. Włóknik jest nierozpuszczalny, sérownik rozpuszczalny w zimnej wodzie, białko zaś zsiada się w cieple. Istoty więc te saletrorodowe stoją pod temiż samemi warunkami co i powyżej wymienione związki potrójne, aby według potrzeb rośliny (§ 302), mogły się uruchomić lub ustalić.

§ 302. Ale jakaż siła przeistacza w roślinie te związki, odmieniając czyto sposób ułożenia ich atomów, czy téż skład ich pierwotny, przez dodanie kilku części wody? Wprawdzie w pracowniach chemicznych, można sztucznie otrzymać niektóre z tych przemian; lecz to najczęściej za pomocą działaczyw nieznajdujących się w ciele ustrojnem, które nawet nie byłoby w stanie znieść zanadto nagłego i silnego ich wpływu. Większa część zjawisk zdaje się w niem odbywać w skutek owych powolnych, lecz na znacznej przestrzeni rozrzuconych sił, które nie łatwo się wykazać dają na jednym, odosobnionym punkcie, lecz które, działając na wielu miejscach od razu, dają za wypadek tych drobnych miejscowych działań, skutek ogólny, wskazujący nam ich obecność, lecz niedozwalający zgłębić ich przyrodzenia. Jednakże chemji udaje się, rzucić światło

(1) Czwartą istotą jest klajster (*gluten*), otrzymywany ze zbóż; jest on także izomerycznym z dwoma poprzedniemi.

na niektóre z tych zagadnień. Jako przykład, dotyczący jednego z najbardziej zajmujących, przytoczmy tu przeistoczenie się w dextrynę skrobi, przez które takowa staje się rozpuszczalną, w niskim nawet stopniu ciepła, i zdolną rozchodzić się po tkankach. Payen i Persoz postrzegli, że część skrobi, nagromadzonej w ziarnach zbóż, ziemniakach, a nawet poniżej pączków niektórych drzew, znika w chwili kiedy nasiona zaczynają wschodzić, lub główki albo pączki puszczać; natomiast pojawia się nowa istota, którą oni nazwali *djastazem*, a która posiada tę szczególną własność, że zmienia stan skupienia ziarenek skrobi i przeistacza je w dextrynę; jeśli zaś działanie trwa dłużej, dextryna obraca się znowu w cukier, podobny do winogronnego. Działanie to odbywa się i w zimnie, gdyż nawet w temperaturze topniejącego lodu, 12 części djastazu, tworzą w 24 godzinach ze 100 częściami skrobi 11 cukru; w 20°, tworzą go 77. Okazuje się przeto, iż ciepło pomaga téj przemianie; w istocie, skutek wzrasta aż do temperatury 70—80°, w której djastaz rozpuszcza 5000 razy więcej skrobi, niż sam waży. Jestto silny działacz, którego sztuka, naśladować przyrodę, używa do wyrabiania syropu gumowatego dextryny i cukru skrobiowego istot, które teraz tak rozległy mają użytek.

§ 303. Zatrzymaliśmy się tu czas niejaki nad składem chemicznym związków najobficiej znajdujących się w roślinie, a które służą jakby za podstawę innym. Pożyteczną było poznać skład ten, aby się postawić w możności zrobienia sobie niejakiemu wyobrażenia o sposobach postępowania, używanych od przyrody do wykonania szeregu przeobrażeń, w skutek których powstaje ustrojność, i w których poznaliśmy proste połączenia chemiczne pierwiastków, pochodzących z wiadomego źródła połączenia, odbywające się pod wpływem przyczyn częścią dających się oznaczyć, częścią nieznanych. Teraz dosyć będzie rzucić oko, na zebrane w niewiele ogólnych oddziałów, inne istoty roślinne, które tak są liczne i rozmaite, a które powstają kosztem tych, o których mówiliśmy dotąd, a to w skutek dalszego ich przerobienia.

Nowe istoty zmieniają skład pierwszych, zmniejszając lub powiększając stosunek jednego lub dwóch ich pierwiastków; zkaąd w obudwu przypadkach wynika, iż takowe stają się w porównaniu z pierwotnym składem, bogatsze w węgiel, wodoród, saletroród lub kwasoród. Za przykład posłużmy nam tu *drze-*

*wnik* (sclerogenium); wiemy, iż to jest istota oskorupiająca w drzewie błonę komórek i dlatego przez długi czas uważana za jedno z błonnikiem (*cellulose*). Porównywając ich skład, pokazuje się, że drzewnik zawiera więcej węgla i wodorodu, przy tej samej ilości kwasorodu; dla dwóch więc przyczyn musi być ciałem daleko palniejszym: co też doświadczenie potwierdza, gdyż najlepsze drzewo opałowe zawiera stosunkowo więcej drzewnika niż błonnika. Stosunek ten bywa bardzo rozmaity i musi przeto wpływać na nieskończoną różnicę drzewa, gdyby nawet sam skład drzewnika nie był niezmiennym. Tak np. znaleziono, iż drzewo bukowe zawiera prawie równe części błonnika i drzewnika, dębowe  $\frac{2}{3}$  tego ostatniego, a hebanowe  $\frac{9}{10}$ .

Najoczywistszym skutkiem oddychania, jest osadzanie się w roślinie nadmiaru węgla, a ujmowanie jej kwasorodu; to ostatnie mogąc w części pochodzić z rozkładu wody, wchodzącej w skład oskolnicy, może spowodować w istotach nowo z tejże utworzonych, powiększenie się ilości wodorodu. W rzeczy samej, znajdujemy, iż wszystkie istoty utworzone w korze, pod wpływem światła słonecznego, posiadają więcej wodorodu, a nadewszystko węgla; tak np. zieleń i mlecz, żywice, olejki i wosk (1).

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te utwory powstają przez działanie światła, gdyż bez niego ubywa ich stopniowo, a nareszcie znikają zupełnie. Namieniliśmy już o wysileniu (*étiolement*), któremu ulega roślina zostająca dość długo

(1) Nie wspominamy tu o olejach tłustych, gdyż te znajdują się zwykle w owocach i jądrach nasion, a to kropelkami w komórkach, w których się tworzą. „Oleje te obejmują związki nierozpuszczalne w wodzie, płynne, w zwykłej temperaturze i nie mogące ulatniać się, nie ulegając rozkładowi. „Woski różnią się od nich tém tylko, iż są stałe w zwyczajnej temperaturze. „Olejki lotne podobne są do olejów tłustych, lecz różnią się zapachem słabszym lub mocniejszym, pewnym stopniem rozpuszczalności w wodzie, a na koniec własnością ulatniania się, nie ulegając rozkładowi. Żywice obejmują związki suche, mniej lub więcej kruche, dosyć łatwo rozpuszczalne w wyskoku, zmieniające się mniej więcej pod wpływem ciepła.“ Określeń tych wziętych z Chevreuila możemy tu jedynie użyć do odróżnienia rzeczonych ciał. W przyrodzie nie znajdujemy ich nigdy zupełnie czystych, co też utrudnia oznaczenie pięt ich chemicznych w sposób zarazem ogólny i dokładny. Rozbiór zaś ich szczegółowy wywiłdłby nas zbyt daleko, poza granice dzieła temu naznaczone.

w ciemności, a które każe się domyślać przemiany zieleni, tudzież istnienia okoliczności przeszkadzających jej powstawaniu. Podobny skutek wynikający z téjże samej przyczyny, daje się widzieć na sokach właściwych, żywicach i olejkach; za dowód dosyć jest przytoczyć zwykłe postępowanie ogrodników, przy uprawie niektórych roślin warzywnych, które rozwijając się na wolném świetle, nabyłyby soków ze zbyt mocnym zapachem, z przykrym smakiem, a nawet mogłyby się stać szkodliwemi, jak np. wiele baldaszkowych. Obrzucają oni ziemią niższą część rośliny, mającą służyć do użytku; przez co takowa traci barwę zieloną i bieleje, a zarazem utracą zbyt mocne własności soków, które przez to stają się przyjemnemi i nieszkodliwemi.

§ 304. Wpływaż oddychanie na zmianę stosunku saletrorodu związków roślinnych? Wiemy, iż powietrze może niekiedy dostarczać saletrorodu, lecz to nie-zawsze i w małej tylko ilości. Z drugiej strony, Saussure twierdzi, iż takowy we dnie wywięzuje się lubo nie zbyt obficie wraz z kwasorodem, jednakże i tak, wiele go się znajduje w sokach zawartych w korze, czyto, że związki saletrorodne tychże soków uległy przeistoczeniu, czy téż, że się po prostu tylko pomnożyły. Mlécz wzięty w dostatecznej ilości z rośliny, i zostawiony samemu sobie, zachowuje się jak mléko lub krew, dzieląc się na dwie części, z których jedna jest płynna i przezroczysta, druga zsiadła i nieprzezroczysta; w niektórych nawet roślinach, powieździć można, iż się staje związkiem prawie zwierzęcym. Jestto jedyny płyn roślinny, który tę własność posiada.

§ 305. W komórkach także kory, powstają jeszcze owe poczwórne związki, nazywane alkaloidami dlatego, że nakształt alkaljów łączą się z kwasami. W takim téż połączeniu, i to z niewielu tylko kwasami roślinnemi, napotykamy je w roślinach żyjących. Nowe poszukiwania pomnożyły nadzwyczaj liczbę tych istot; nazwiska ich kończymy zwykle na *ina* (np. chinina, morfina, strychnina i t. d., i t. d.). Rozumié się iż poszukiwania te czynione były na roślinach szerególniej odznaczających się swemi własnościami; każda z nich posiada swoje alkaloidy, a niektóre mają ich wiele razem. Alkaloidy otrzymane z jednéj rośliny, mają z sobą wiele wspólnego, jak to można spostrzedz na przykładzie dobrze znajomym. Kora chinu posiada ich trzy; eynchoninę, chininę i kuskoninę; wszystkie trzy mają w swym

składzie 20 atomów węgla, 24 wodorodu i 2 saletrorodu; cynchonina posiada nadto 1 atom kwasorodu, chinina 2, kuskonina 3, tak, że trzy pierwsze pierwiastki, zdają się tworzyć jedno ciało, niedokwaszące się w trzech różnych stopniach, i dające tym sposobem trzy owe gatunki alkaloidów. W tych to istotach zdają się leżeć najsilniejsze własności roślin; mała ilość przywiedzionych tu przykładów, przedstawia nam środki lekarskie i trucizny, bardzo skuteczne i głośnie.

§ 306. Wymieniliśmy tu inne związki, powstające przez ujęcie pewnej części kwasorodu. Jeśli przeciwnie stosunek jego się powiększa, tworzą się kwasy. Kwasy roślinne, których liczbę nowsza chemja znacznie także pomnożyła, rzadko się napotykają wolne w tkankach żyjących, zwykle bowiem połączone są albo z alkaloidami, albo też z zasadami alkalicznemi nieustrononemi, wprowadzonemi z oskolnicą. Jednym z najpospolitszych jest kwas szczawiowy, który jest związkiem podwójnym, zbliżonym do kwasu węglowego, ponieważ różni się od niego mniejszym tylko stosunkiem kwasorodu, zawiera go bowiem 3 części na 2 węgla. Inne kwasy są związkami potrójnemi, jak octowy, cytrynowy, pektynowy, jabłkowy, winny i t. d. i t. d.; lub, co rzadziej, poczwórnemi, z dość znaczną ilością saletrorodu, jak np. kwas szparagowy i t. d. Co się tycze kwasu pruskiego, ten nie zawiera wcale kwasorodu, a natomiast posiada nadzwyczaj wiele saletrorodu, bo więcej nawet nieco nad połowę swój wagi. Saletroród ten połączony z węglem, stanowi zasadę nazwaną cyanem, która łącząc się znowu z 3 częściami wodorodu, tworzy kwas wodorodny, znajdujący się w migdale i wielu innych drzewach tej samej rodziny.

§ 307. Wytwarzaniu się kwasów, powstających w skutek powiększenia stosunku kwasorodu, sprzyjać musi oddychanie nocne, w czasie którego pierwiastek ów obficie wchodzi w roślinę; dlatego też największa liczba i ilość kwasów, znajduje się w częściach usuniętych z pod wpływu światła, lub też w częściach rośliny nie zielonych, w których pochłanianie kwasorodu ciągle się odbywa; przykłady przedstawiają korzenie i owoce. Uważajmy iż to są właśnie też same części, w których zwykle gromadzi się wiele cukru i skrobi, istot, mających w składzie swym prawie tenże sam stosunek węgla i wody, i zmieniających się pod wpływem światła, przez przybranie większego stosunku wodorodu, a nadewszystko węgla.

Potrzeba więc było, aby takowe, w miejscach gdzie się gromadzą, albo nie zmieniały się wcale, skoro się już utworzą, albo też, aby zmieniając się, mogły się wrócić do swego pierwotnego składu, przez usunięcie nadmiaru węgla, osadzonego w częściach zielonych w skutek oddychania dziennego. Właśnie też ten skutek sprowadza drugi okres, czyli drugi sposób oddychania, i to właśnie tłumaczy jak się zdaje, potrzebę kwasorodu jaką objawiają części podziemne, i przyjazny wpływ, jaki noc wywierać może na roślinie, przez przywrócenie równowagi, po zbyt silnym działaniu dziennym.

§ 308. Ztémwszystkiem, pochłanianie kwasorodu przez części roślinne, nie jest zjawiskiem właściwem życia. Jeśli części te obumarłe zostawać będą w zetknięciu z wodą i kwasorodem, takowy znika, łącząc się z węglem istoty roślinnej, i tworzy kwas węglowy. W czasie tego powolnego palenia się, część roślinna zmienia postać i barwę, zamieniając się zwolna w proch czarniawy, znany pod imieniem ziemi czarnej, albo *próchnicy* (humus), w której znaleźć można pierwiastki istniejące w żyjącej roślinie; stosunki ich tylko zostały zmienione. Jednakże część węgla pozostaje i tu w połączeniu z pierwiastkami wody, dając związek bardzo podobny do skrobi, od której różni się tylko mniejszą ilością wody (posiada jej bowiem zamiast 10, tylko 6 części, na 24 węgla). Związek ten nazwany *ulminą*, nie jest rozpuszczalny w wodzie, ale staje się takim przez połączenie z alkaliami zwykle obecnymi w próchnicy, której powstawanie właśnie przyspieszają. Większa część fizjologów przyznaje mu wielką ważność w rośnię, gdyż połączony, z wapnem na przykład, rozpuszcza się w wodzie, zostaje wessany przez roślinę tkwiącą w próchnicy, a następnie potrzebuje tylko połączyć się chemicznie z kilku jeszcze częściami wody, a posiadać będzie skład skrobi i stanie się obfitym źródłem utworów ustrojowych. Jednakże niedawno Liebig, podał mniemanie to w wątpliwość, zarzucając: że ulmina potrzebuje do rozpuszczenia się 2500 razy więcej wody niż sama waży, a przeto, że wszystka woda wessana przez roślinę, może tylko maleńką ilość tego związku w sobie zawiierać; dalej, że woda, musi wraz z ulminą zabiierać, a po rozkładzie jej pozostawiać w tkankach istoty alkaliczne, które były z nią połączone, a jednak ogół tych istot, jak się o tém przekonać można z popiołu rośliny, wykazuje także mało

tylko znaczącą ilość ulminy. Zład wnosi on, że większa część węgla zawartego w oskólnicy, nie z tego źródła pochodzi, lecz z kwasu węglowego, wywiązanego przy rozkładzie szczątków roślinnych, rozpuszczonego w wodzie i z nią wessanego przez korzenie. Jakiegokolwiek przyjmujemy objaśnienie, zawsze pewna, że ziemia jest dla rośliny obfitým źródłem węgla, a to tém bardziej, im go więcej zawiera w stanie ułatwiającym rozpuszczanie się jego w wodzie.

§ 309. Jednakże widzieliśmy, że roślina czerpiąc znaczną ilość węgla z powietrza, mogłaby, ściśle rzecz biorąc, obejść się bez tego, który się w ziemi znajduje, i że nasienie, któremu za całą żywność dostarczalibyśmy czystej tylko wody, mogłoby się rozwinać w dość doskonałą roślinę. Wszelako, rozwijanie to ustaje na pewnym punkcie i nowe tkanki nie tworzą się dalej. Pomiedzy koniecznemi przyczynami tego zatrzymania się, które łatwo pojąć, pierwsze trzyma miejsce okoliczność, kilkakrotnie tu już wspomniana. Wszystkie nowo powstające tkanki, odznaczają się obfitością istot saletrorodnych, które zatem uważać można za jeden z warunków początkowego ich rozwijania się. Wszystek zaś saletroród zawarty w nasieniu, gdzie obecność jego wprawdzie jest stałą, musi się wyczerpnąć wskutek wzrastania rośliny, nawet pomimo dodatkowego zaopatrzenia, jakie takowa otrzymuje niekiedy z powietrza. Zatem roślina z ziemi musi czerpać resztę saletrorodu, którego niezbędnie potrzebuje, aby się mogła dalej rozwijać.

§ 310. Ilość tegoż zawarta w wodzie ziemi, pochodząca czyto z rozтворzonych w niej niektórych soli, mających w swym składzie saletroród, czy też z wyziewów ammoniakalnych, które deszcz z sobą przynosi, nie byłaby wystarczającą, gdyby nie sole gromadzące się na powierzchni szczątków roślinnych i zwierzęcych, z których szczególnież ostatnie są tak bogate w związki saletrorodne. Zładto użyteczność nawozu w miejscach, w których człowiek chce otrzymać wiele roślin, skupionych na małej przestrzeni; roślin, które będąc po większej części przeznaczone na żywność dla zwierząt, muszą w tkankach swoich wiele związków saletrorodnych osadzić; zład konieczność nawozu tam, gdzie rośliny owe, np. gatunki zbóż, nie biorą saletrorodu prosto z powietrza. Pierwiastek ten wchodzi najprzód w roślinę w ammonjaku.

§ 31  
da nam  
lestwa  
ten mo  
rozpus  
miesza  
się skł  
związki  
ślinę i  
§ 31  
żnym i  
pierwo  
wodę  
przed  
tylko r  
część  
wnątrz  
zład, z  
wna mi  
ilość w  
trzu.  
węglu  
która  
się, z  
jój wp  
dzie.  
psu i s  
laza i  
stałe,  
i rozpu  
bliżu r  
§ 31  
nych, k  
Raz w  
tęż zn  
w któr  
kają k  
odtąd  
(§ 20-  
znajduj

§ 311. Zpomiedzy istot dostarczonych przez ziemię, wypada nam jeszcze zastanowić się nad temi, które należą do królestwa kopalnego, tudzież nad wpływem ich na roślenie. Wpływ ten może być dwojaki: jeden, wywierany przez związki nierozpuszczalne w wodzie, które zatem otaczają tylko korzenie, mieszając się ze szczątkami roślinnemi i zwierzęcemi, z jakich się składa tak nazwana ziemia roślinna; drugi pochodzący od związków rozpuszczalnych, które zostają wprowadzone w roślinę i mieszają się z oskólnicą.

§ 312. Łatwo pojąć bez długich nawet objaśnień, jak ważnym jest wpływ pierwszy i jak się zmieniać może według pierwotnych własności ziemi. Gлина, która chętnie przyciąga wodę i piasek, który takową z łatwością całkowicie utracą, przedstawiają dwa przeciwne warunki, pod jakimi żyć mogą tylko rośliny wcale od siebie różne; pomnąc zaś, że większa część roślin wymaga koniecznie, z jednej strony wody wewnątrz, z drugiej przystępu powietrza do korzeni, wniesiemy zdą, że najprzyjaźniejsze stosunki roślenia przedstawia stosowna mieszanina różnorodnych części, zatrzymująca dostateczną ilość wody i zarazem dozwalająca wolnego przejścia powietrza. Istoty kopalne posiadające własność wiązania kwasu węglowego i amonjaku, mogą zgromadzić pewną część tychże, która inaczej byłaby się ulotniła, i zatrzymać ją jakby w zapasie, z którego roślina czerpać może, oprócz ilości dostarczonej jej wprost z powietrza, lub wprzód już rozpuszczonej w wodzie. Tęto przyczynie przypisuje Liebig pomyślny wpływ gipsu i soli żelaznych; gips bowiem, równie jak niedokwasy żelaza i glinka, przyciągają amonjak i tworzą z nim związki stałe, z których on powoli po każdym deszczu się oddziela i rozpuszcza w wodzie, wsysanej przez znajdujące się w pobliżu rośliny.

§ 313. Lecz więcej nas tu obchodzi znajomość istot kopalnych, które rozpuszczając się wchodzą i wcielają się w roślinę. Raz wprowadzone, mogą albo zachować stan swój ciekły, albo też zmienić się w stałe, czy to w skutek wyparowania wody, w której były rozpuszczone, czy też że na drodze swęj spotykają kwasy, z któremi tworzą sole nierozpuszczalne, zostające odtąd na miejscu, w którym powstały. Wymieniliśmy już (§ 20—22) kształty, jakie zwykle przybierają istoty kopalne, znajdujące się w tkankach rośliny, tudzież miejsca, gdzie je

najczęściej napotyamy. Ilość istot kopalnych stoi zwykle w stosunku działalności roślenia, ponieważ takowe pociąga za sobą przejście większej ilości wody, a przeto i istot w niej rozpuszczonych. Ilość istot, które powstają w roztworze, jest różna w różnych czasach; istoty zaś nierozpuszczalne mogą się tylko pomnażać z wiekiem. Ilości te łatwo można obliczyć po spaleniu rośliny. Ogień bowiem niszczy wszystkie bez wyjątku istoty ustrojowe (co także stanowi jedno z ich piętn); pozostawia zaś istoty kopalne zawarte w roślinie, a których pozostałości tworzą popiół. Ważąc zatem ciało roślinne, a potem popiół pozostały po jego spaleniu, otrzymujemy stosunek szukany.

§ 314. Z istot kopalnych, najczęściej znajduje się w roślinach potaż i soda, wapno, magnezja, krzemionka, rzadziej glinika, niekiedy cokolwiek żelaza i manganu. Ciała te mogą być już w stanie soli przez połączenie się z niektórymi kwasami kopalnymi, jak siarkowy, fosforowy i t. d.; co nam tłumaczy obecność w niektórych razach siarki i fosforu. Z kwasem węglowym połączenie nastąpić może zewnątrz lub wewnątrz rośliny. Sole przeto powstałe wewnątrz, przez połączenie z kwasami roślinnymi i zasługujące na nazwę kopalno-roślinnych, składają się najczęściej z wapna lub potażu i kwasu szczawowego, jabłkowego, cytrynowego, i t. d.

§ 315. Jasną jest rzeczą, że przyrodzenie tych związków musi zależeć od własności ziemi, w której żyje roślina. Jedna może brać w siebie to tylko, czego jęj druga dostarczy. Ale bierzeż ona co bądź bez wyboru? czyli innemi słowy, zawiera roślina dlatego te a te istoty kopalne, że takowe znajdują się w ziemi na której rośnie, lub czy właśnie dla tęg ostatniej przyczyny tam rośnie? Dla niektórych roślin, odpowiedź nie może być wątpliwą. Tak np. większa część tych, które rosną na brzegu morza, zawiera wiele sody pochodzącęj z chlorku sodu, czyli soli morskiej; i te właśnie rośliny nie rosną gdzieindziej, prócz chyba w bliskości żup solnych, położonych nawet daleko od morza, lecz które im dostarczają tęg samej soli. Takowa przeto jest im koniecznie potrzebną; nie biorą one jęj dlatego, że ją tam znajdują; lecz dlatego tam właśnie rosną, że jęj tym sposobem dostać mogą. Niektóre rodziny bardzo blisko pokrewne, tojest podobne sobie we wszystkich głównych punktach swęj ustrojności, posiadają w tkawkach swych jedna-

kowe istoty kopalne, a ztąd wnieść należy, iż obecność tychże stoi w związku z ich ustrojnością. Rodzina traw przedstawia podwójny tego przykład: nasiona ich dojrzałe (w zbożach), zawierają dosyć obficie fosforan magnezji i amonjaku; łądgi zaś, bez wyjątku prawie, krzemionkę, która oskorupia ich naskórek i węzły (§ 20). Ta właśnie krzemionka nadaje słomie własność nie ulegania długi czas gniciu, tudzież gęstość i twardość tak wielką, że szczyrbi często kosy, a powierzchni grubszych łądgy, jak np. w trzcinie rotang, dają ognia o krzesiwo.

Zdarza się jednakże często, że ta sama roślina żyjąc na różnym gruncie, nie posiada tych samych soli. To, podług Liebig'a, dlatego, że niektóre zasady, mogą się wzajemnie zastępować, a mianowicie takie, które się łączą z jednemi kwasami roślinnemi. Twierdzi on nawet, że stosunki tych kwasów w roślinie, w której się jako istoty ustrojowe znajdują, są poniekąd stałe, a przeto zasady łączące się z niemi, lubo różne podług gatunku ziemi, wchodzą jednakże w równoważnej ilości.

§ 316. Wnosić więc można, że wszystkie te istoty, lubo nieustrojowe, mają jednakże wielki wpływ na ustrojność; że ich ilość i jakość stoi w pewnym związku z potrzebami rośliny, w związku, który jest stałym dla pojedynczych roślin, albo nawet dla pewnych oddziałów tychże. Ciało więc kopalne wywierają podwójny wpływ na życie roślin: najprzód ogólny, ponieważ gromadzą w ich pobliżu znaczne zapasy pierwiastków prawdziwie pożywnych; powtóre szczególny, ponieważ wchodząc w nie, używają im związków, które mieszają się z istotami ustrojowemi, nie dając się jednak przypodobnić, pobudzają je, zamieniają w stałe, lub zobojętniają w części; które, pomimo tego, że najczęściej nie jesteśmy w stanie objaśnić sposobu ich działania, zdają się być niezbędnie potrzebnymi dla życia, chociaż go same nie posiadają, i które nakoniec nie są jednakowe w różnych roślinach. Umiejętny rolnik poprawia glebę rozmaitemi istotami nieustrojowemi (np. gipsem, marglem, popiołem i t. p.), odmienia je podług własności ziemi i płodów, których wydawaniu chce dopomódz.

§ 317. **Wydalenie** (*excretio*). — Ciało ustrojowe bierze w siebie istoty z zewnątrz pochodzące; wyciąga z nich, odkłada na stronę, *wydziela* to wszystko, co mu może służyć za pożywienie. Wtedy powstać jeszcze może pewna część nie-

zdalna na ten użytek, ciało więc stara się jęj pozbyć, i wyrzucić na zewnątrz, czyli według wyrażenia naukowego, *wydalic*. Istoty wydalone, albo zatrzymują skład jaki posiadały przed wejściem w ciało, albo téż zmieniają go w skutek związków zaszłych po ich wejściu w ciało.

U zwierząt (z wyjątkiem wszelako tych, które mniej doskonała ustrojność na najniższych stawia szczeblach), istoty wydalone znajdują gotowe drogi, któremi mogą się dostać na zewnątrz; sąto zwykle kanały przeznaczone na ten użytek i zwane wydalniczemi; dlatego po większej części badanie tych istot jest tu łatwiejszém; lecz inaczej rzecz się ma w roślinach. Wprawdzie Ad. Brogniart dostrzegł małych kanalików w gruczołach znajdujących się w głębi kwiatu niektórych liljowatych, lecz rzecz można, iż wogóle kanały takie nie istnieją, a istoty mające być wyrzucenemi, nie znajdują innych dróg otwartych nad te, które służą także do przepuszczania istot pożywnych. Jeśli więc nie wychodzą z gruczołów powierzchniowych i wprost na zewnątrz otwartych, muszą wyjść albo wskróś ścian naskórka, albo przez szparki lub inne przerwy, jakie się na powierzchni rośliny znajdują.

§ 318. Rozróżnić należy trzy oddziały istot wyrzucenych tym sposobem na zewnątrz i niesłusznie objętych pod jednym nazwiskiem istot wydalnych:

1<sup>o</sup> Takie, które rozpostarte będąc na powierzchni, służą téjże za ochronę, a przeto potrzebne są dla życia. Są to w ogóle istoty żywiczne, lub woskowe, nie przepuszczające wody i mogące zatém za pomocą tego rodzaju pokostu przeszkodzić z jednej strony wpływom zewnętrznej wilgoci na tkanki, z drugiej miarkować parowanie. Piérwszy z tych użytków, widzimy np. w łuskach pączków wielu naszych drzew, zabezpieczonych grubszą lub cieńszą takową warstwą, od zimnego i wilgotnego powietrza w zimie. Pączki topoli i kasztanowca posiadają nadzwyczaj wielką ilość tego żywicznego wysięku. Drugiego użytku owęj istoty, należy się domniemywać u większej liczby roślin, które ją w lecie posiadają, nadewszystko, jeśli rosną w gruncie piaszczystym i suchym, gdzie im często zbywa na wodzie, i gdzie przeto tak wiele na tém zależy, aby woda jak najwolniej z tkanek parowała. W wielu okolicach Chili, tudzież Andów peruwiańskich, gdzie ziemia i powietrze są długi czas suche, mnóstwo krzewów posiada to

wspóln  
żywicz  
czołko  
pnica  
smółka  
i łatw

Isto  
tworzą  
sty, i  
co zwy  
zanurz  
kszej  
bo naw  
kle na  
zjad, i  
mywa  
gdzie  
Nie za  
rzy się  
sięka  
niej w  
czone  
się ze

Wa  
dnych  
także  
wu cie  
istota,  
tém na  
utrzym  
wnątr

§ 3  
me z is  
tychże  
nie m  
odrzu  
chwile  
pokar  
miar  
sobie

wspólne piętno, że powierzchnia ich powleczone jest wysiękami żywicznymi. Obfitość włosów gruczołowych, albo małych gruczołków pokrywających powierzchnią, jest tu zwyczajną. Lepnica zwisła i lepka (*Silene nutans et viscaria*), firletka smołka (*Lychnis viscaria*), a osobliwie dyptan, dają pospolite i łatwe do znalezienia przykłady.

Istoty woskowe posiadają piętno i użytek podobny. Oneto tworzą ów pyłek białawy pokrywający wiele liści, np. kapusty, i niektóre owoce, jak sliwka, winogrona, i stanowiący to, co zwykle nazywają barwą (*pruina*; *szron*, *sadź*). Liść taki zanurzony w wodę, nie macza się wcale; a ponieważ w większej części powłoczka woskowa ukazuje się albo obficie, albo nawet wyłącznie na powierzchniach dolnych, które są zwykle najgłówniejszym siedliskiem parowania, można zatem wniesić ztąd, iż przeznaczeniem jej jest miarkować parowanie i zatrzymywać płyny wewnątrz roślin; widocznym to jest w owocach, gdzie gromadzą się soki płynniejsze i obfitsze, niż gdzieindziej. Nie znajdujemy osobnego narzędzia wydzielającego wosk, tworzy się on bowiem w komórkach najzewnętrzniejszych i wysięka ztąd na zewnątrz. Łodygi niektórych palm, a szczególnie woskopalmy andyjskiej (*Ceroxylon andicola*), są powleczone grubą warstwą tej istoty, która jak się zdaje, wysącza się ze spodu liści.

Warstwa lepka powłócząca większą część roślin podwodnych, tak morskich, jako też wód słodkich, przeznaczona jest także niewątpliwie do ochrony tkanek, które zasłania od wpływu cieczy otaczającej, w którejby inaczej wymiękły. Lecz czyli istota, która ją składa, wytwarza się w tkankach i wysięka potem na zewnątrz tak jak żywica albo wosk, nie wiadomo; Mohl utrzymuje, że to jest istota międzykomórkowa rozlana na zewnątrz (§ 15).

§ 319. 2<sup>o</sup> Istoty wyrzucone na zewnątrz, mogą być tożsame z istotami, jakie się wewnątrz znajdują. Jestto tylko część tychże występująca z tkanek na wierzch. Oczywiście przeto nie można ich uważać za istoty prawdziwie wydalone, to jest odrzucone, jako niezdatne do żywienia; stały się one takimi chwilowo jedynie, ponieważ każde ciało może pewną tylko ilość pokarmu pożywać i przechowywać w zapasie; wszelki zaś nadmiar musi sobie szukać przejścia, którymby się ze zwykłych sobie dróg mógł wy dostać. W takim przypadku często kora,

parta od wewnątrz ku zewnątrz przez ów nadmiar, rozszczepla się i toruje mu drogę. Przez takie szpary wyciekają gумы, soki właściwe, żywice, jak to można widzieć na niektórych naszych drzewach, np. gummy na wiśniach, śliwach, żywice na jodłach i innych iglastych. Zbytek tych istot sprawiający ich wypływ, bywa często połączony ze zdrowym i silnym rośnięciem, i może nawet być jego wynikiem; lecz w innych razach jest raczej chorobą rośliny, zepsuciem równowagi w czynnościach. W szeregu przemian chemicznych, jakim ulegać mają pierwiastki pożywne, może np. zbywać na którym z potrzebnych warunków, a ztąd rodzaj przeszkody. Istota wytwarzająca się, nie zostaje obieraną przez narzędzia, w których mają się dalsze jej połączenia odbywać; gromadzi się więc zanadto w jednym miejscu, i może nawet niekiedy przejść w związki nowe i niezwykłe.

Istoty, o których mówimy, wychodzą w postaci płynów i ściękają po korze; lecz niebawem gęstnieją na powietrzu, a nawet mogą utworzyć wcale twarde bryły. Niektóre wchodzą w inny jeszcze sposób, jak olejki, które ulatniając się, przenikają przez tkanki nienaruszone.

§ 320. 3<sup>o</sup> Istoty niezdatne do żywienia i wyrzucane na zewnątrz, zasługują właśnie na imię wydaleni; lecz trudno jest powiedzieć, które istoty w roślinach są prawdziwe w tym przypadku. Same nawet utwory gruczołowe, które jak widzieliśmy wpływają lub ulatniają się na zewnątrz, mogą nas pod tym względem w powątpiewaniu zostawić, ponieważ być może, iż w części zostają wessane i wcielone w ogół płynów pożywnych, a tym sposobem, część ubywająca na zewnątrz, byłaby tylko, jak w poprzedzającym razie, nadmiarem, którego się tkanki pozbywają. Ale czy istnieje droga ogólna, na której ciało roślinne, wyczerpawszy z istot pożywnych wszystkie cząsteczki, jakie tylko mogły być przypodobnione, oddala na zewnątrz inne, które się na ten użytek nie zdały? Wielu pisarzy sądziło, że podobna czynność przynależy korzeniom, a teoria zdaje się być usprawiedliwioną rozumowaniem. Oskólnica, wchodząc przez korzenie, przebiega najprzód cały układ drzewny, następnie ustraja się w korze, przez którą zstępuje, dostarczając w swym biegu wszystkim częściom pierwiastków pożywnych i przybywając tym sposobem do korzeni, na kończynach których musi być w części ogołoconą z owych pierwiastków, jakie

rozdzie  
ną byw  
nowo p  
sokiem  
korzen  
iub pla  
wodę i  
kroć m  
do koń  
Trudno  
przez  
Lee  
z czę  
świad  
tak pr  
mi poz  
roztw  
srebra  
wiane  
ztał w  
niewł  
czeni  
padki  
przed  
§ 3  
żnych  
łaby p  
żywie  
coraz  
nie ud  
mego  
suąc  
pione  
korze  
jedną  
sprzy  
mogą  
znajd  
wzaje  
roczn

rozdzielała po drodze. Pytanie teraz, czy pozostałość wydalana bywa w tém miejscu na zewnątrz, jako odchód, lub czyli na nowo powraca w roślinę mieszając się z nieprzerobionym jeszcze sokiem, tak jak krew żylna u zwierząt. To pewna, że na wielu korzeniach, dają się widzieć około kończyn małeńkie gruzełki lub płateczki istoty galaretowatej lub sluzowatej, która wsiąka wodę i wzdyma się przez to. Onato właśnie przyciąga częstokroć małe ziarenka ziemi lub piasku, które mocno przylegają do końców korzeni, pomimo wszelkich starań aby je odłączyć. Trudno przypuścić, aby to nie była jedna z istot wydalanych przez korzenie.

Lecz możnaż ztąd wnosić, że to jest pozostałość złożona z cząstek płynu pożywnego, niezdatnych do żywienia? Doświadczenia Macair'a zdawały się niewątpliwie tego dowodzić, tak przez robiór niektórych z tych istot, w porównaniu z sokami pożywnymi téjże samej rośliny, jak przez postrzeżenie, iż roztwory różnych soli trujących (occianu ołowiu, saletranu srebra, i t. d.), wessane przez roślinę, której korzenie wstawiane potem w czystą wodę, niezadługo okazały się w takowej: ztąd wniesiono, że roślinna pozbywa się na téj drodze istoty niewłaściwej, lub szkodliwej utrzymaniu życia. Lecz doświadczenia podobne, dały Ungerowi, Meyenowi i Walserowi, wypadki przeciwne. Trudno jest wnieść cokolwiek pewnego o tym przedmiocie.

§ 321. Nauka ta, raz przyjęta, mogłaby prowadzić do ważnych następstw. Gdyby była prawdziwą, roślina zgromadzałaby przeto około siebie w ziemi, związki niezdatne już do jej żywienia; coby nam tłumaczyło, dlaczego korzenie muszą się coraz dalej posuwać dla szukania żywności, i dlaczego drzewo nie udaje się na miejscach, w których rosło inne, z tegoż samego rodzaju. Są rośliny, które widocznie szkodzą innym, rosnąc w ich pobliżu; są przeciwnie i takie, które chociaż skupione, udają się jednak. To dlatego, że ponieważ wydalania korzeniowe różnią się podług roślin, istoty odrzucone przez jedną, mogłyby bardzo szkodzić drugiej, lub téż przeciwnie sprzyjać jej, tak jak widzimy, że odchody jednych zwierząt, mogą innym służyć za pożywienie: rośliny, które się unikają, znajdowałyby się w pierwszym; te zaś które się wyszukują wzajemnie, w drugim przypadku. Rolnik, uprawiając rośliny roczne, nie może zwykle spodziewać się wielce obfitych,

kolejnych zbiorów tego samego gatunku roślin; musi przeto takowe odmieniać, a doświadczenie naucza go, jakiego ma się w tém trzymać porządku, aby wytchnął, a nie zjałowił roli. Na tém zależy tak nazwana nauka płodozmianu, któraby zatem była tylko zastosowaniem poprzedzającej teorii, i czerpała objaśnienia z poszukiwań czynionych względem przyrodzenia wydalen korzeniowych.

Dodajmy jednak, że teoria ta nie jest wcale konieczną dla objaśnienia pomienionych faktów. W istocie jasną jest rzeczą, że gdy roślina, żyjąc w ziemi, odbiera jej większą lub mniejszą ilość istot pożywnych; zatem roślina tegoż samego gatunku, mająca też same potrzeby, następując po pierwszej, może nie znaleźć dostatecznej ilości owych istot; roślina zaś innego gatunku, mająca inne potrzeby, może w tém samym miejscu znaleźć związku takiego przyrodzenia i w takiej ilości, jakiej właśnie jej przyrodzenie wymaga. Nowe szczególnież doświadczenia, o których mówiliśmy wyżej, rzucają światło na to zadanie. Są rośliny, które jak zboża, ciągną wszystek swój saletroród z ziemi; inne znowu jak niektóre strąkowe, mogą go brać z powietrza. Te więc, mogą nastąpić po pierwszych, i nie ulegną przez to wycieńczeniu. I właśnie też następstwo zbóż i roślin strąkowych, jest jednem z najpospolitszych w gospodarstwie płodozmienném. Po kilku zaś umiejętnie odmienionych zasiewach, rola odzyskuje dawny swój skład, pod bezustannym wpływem działaczy powietrznych.

§ 322. Wypadałoby tu może wspomnieć o barwach i o cieple właściwém roślin; gdyż te zjawiska zależą, równie jak większa część wyżej wyłożonych, od połączeń i rozkładów chemicznych. Gdy jednak największą różnaitość i natężenie barw, napotykamy w kwiatach; gdy dalej wywięzywanie ciepła najwidoczniej objawia się przy rozwijaniu się kwiaków, odłożymy więc (§ 620 — 648) to zadanie aż dotąd, dopóki nie poznamy kwiatu w szczególności; dotychczas bowiem uważaliśmy go tylko w jego stosunkach z resztą rośliny.

#### W Z R A S T A N I E T K A N E K .

§ 323. Wypadkiem żywienia jest wzrastanie rośliny. Narzędzia jej proste rozrastając się i pomnażając, spowodowują

odpowiednie powiększenie narzędzi złożonych. Wypada nam więc rozebrać z kolei sposób rośnienia jednych i drugich.

Nie będziemy się tu zatrzymywać nad sposobem w jaki komórki, włókna i naczynia powiększają się i grubieją, o czém już w pierwszych rozdziałach dotyczących tych narzędzi była mowa, równie jak o porządku w jakim zwykle te różne narzędzia rozwijają się jedne względem drugich. Lecz dotąd nie zajmowaliśmy się sposobem ich rozmnażania się, wypada więc wyłożyć takowy w tém miejscu. Ponieważ zaś wiele roślin składa się wyłącznie z tkanki komórkowej; ponieważ wszystkie inne postaci wychodzą początkowo z komórki, zadanie przeto nasze upraszcza się do poszukiwania sposobu, w jaki się rozmnażają komórki. Pojęli to dobrze najbieglejsi fizjologowie, zwracając postrzeżenia swe na ten zasadniczy punkt, na ten początek wszystkich tkanek. Nie można się dziwić że tam, gdzie idzie o zbadanie najdrobniejszych cząstek na jakie roślina rozłożoną być może, w pierwszym ich ukazaniu się, postrzeżenia i teorje na nich uzasadnione, różnią się czasami od siebie. Przystaniemy tu na krótkim wykładzie najnowszych mniemań.

§ 324. **Wzrastanie tkanki komórkowej.** — Rozmnażanie się komórke może się odbywać w rozmaity sposób. W roślinach najprostszych, jak np. w wielu glonach (owych zielonych nitkach, znajdujących często w wodach lub na powierzchniach wilgotnych, a które składając się z komórek zrosniętych z sobą końcami, tworzą tym sposobem rurkę, w pewnych odstępach poprzegradzaną), widzieć można wyraźnie, że komórki obłe nabywszy pewnej długości, przedstawiają jedno lub co rzadziej, kilka zwężeń, tak jak gdyby ściana ich, zaginała się poprzecznie ku wewnątrz; zwężenie to staje się coraz znacniejszym, tak, że w końcu powstaje w skutek tego przegroda zupełna, która następnie rozdwa się, a wtedy otrzymujemy dwie lub więcej komórki utworzonych z podzielenia się jednej: dzieje się to najczęściej, lubo niezawsze, z komórką tworzącą kończynę rurki ogólniej. Niektóre z komórek środkowych posiadają często na wyższym końcu małą boczną wydatność, która się powoli przedłuża, a następnie, doszedłszy mniej więcej długości komórki, z której wychodzi, oddziela się od niej przy swém podstawie, przez nową utworzoną przegrodę, podobną do dopiero opisaney. Tym sposobem powstają gałązki boczne glonów.

Rurki ramiennicy dzielą się w podobny sposób, a to nawet niekiedy, nie przez poprzeczną lecz przez podłużną przegrodę, zkad oczywiście otrzymujemy z jednej komórki, dwie oboczne, nie zaś ponad sobą leżące. W różnych tych przypadkach wydrążenie komórek wypełnione było istotą ziarenkowatą, której ogół dzieli się jednocześnie i tak samo jak i komórka. Podobną jest do prawdy, że ten sposób rozmnażania się, może także istnieć w komórkach roślin wyższych, a szczególnie w tych, które ułożone są w rzędy proste.

§ 325. Inny sposób, uważany wprzód i teraz jeszcze od wielu za powszechny, jest ten, który wynika z powstania wielu komórek wewnątrz jednej dawniejszej. Raz, ściany tej macierzystej komórki tworzą wydatności na wewnątrz, które się nakoniec spotykają i przecinają przeto jedno wydrążenie na kilka; z tych każde zawiera pewną ilość istoty ziarenkowatej. Aż dotąd sposób rozwijania nie różni się od przypadku poprzedzającego; lecz później, każda z tych bryłek ziarenkowatych, powłóczy się własną okrywą, a ziąd powstaje tyleż oddzielnych komórek, objętych okrywą wspólną; a jeśli, co się często zdarza, takowa znika w skutek wessania, komórki stają się wcale samoistnymi. Częściel komórki leżą od samego początku wolne, w wydrążeniu komórki macierzystej, która w tym razie albo pozostaje, albo, co zwykłej, bywa wessaną.

§ 326. Nakoniec komórki mogą powstawać w wewnętrznym wydrążeniu rośliny, w przestworach pomiędzy komórkami dawniejszemi, jak to np. widzimy pomiędzy drzewem a korą dwuliściennych, gdzie się gromadzi miazga.

§ 327. Ale pod jakąż postacią występują w początku samym te komórki, utworzone czyto we wnętrzu dawniejszych, czy też w przerwach tkanek; przez jakie koleje przechodzą, zanim otrzymają postać komórek istniejących przed niemi?

Podług Schleiden'a tkanka komórkowa przedstawia nasamprzód roztwór gumy, który następnie gęstnieje w galarete. W takowej dają się spostrzedz liczne, ciemne i nadzwyczaj drobne punkta. Niektóre z nich służą za punkta środkowe, około których gromadzi się zbiór ziarenek stanowiący *jąderko* czyli cytoblast (§ 21). Jąderka są to zwykle ciała soczewkowate, w dwuliściennych więcéj zaokrąglone, w jednoliściennych bardziej podłużne i pospolicie większe. Skoro dojdą ostatecznych swych wymiarów, wznosi się na jednej z ich po-

wierz  
zégan  
nako  
prze  
wpra  
jącej  
około  
kształ  
w pev  
kraże  
np. c  
Za  
późn  
obec  
ich je  
móreł  
przyn  
gdzie  
macie  
§ 3  
wać,  
jący  
kie p  
które  
powi  
grube  
dotąd  
jadno  
wnać  
albo w  
ka roz  
otrzym  
komór  
w wie  
ją wie  
które  
śli się  
komór  
nia wy  
podwa

wierzchni, jakby bańka, siedząca na nich nakształt szkiełka zégarkowego; takowa wzdymając się coraz bardziej, tworzy nakoniec pęcherzyk, w którym jąderko małą tylko zajmuje przestrzeń i zostaje zagłębione, albo nawet zupełnie jakby wprawione w jeden z kątów ściany, podwajającą się i grubiejącą w tém miejscu. Najczęściej zostaje wessaném i znika około tego czasu, kiedy komórka nabywa doskonałego swego kształtu; jednakże pozostaje niekiedy, jak to można widzieć w pewnych narzędziach, np. włosach, w których spostrzegamy krążenie (fig. 222, *nn*), tudzież w niektórych rodzinach, jak np. cierńcowatych i storczykowatych.

Zarzucają Schleiden'owi, że jąderka ukazują się niekiedy później od komórki. Zresztą, chociaż on przekonał się o ich obecności w młodych tkankach wielu narzędzi, nie dostrzegł ich jednakże w dwóch głównych siedliskach powstawania komórek, tojest w miazdze i kończynach korzoneczków, gdzie przynajmniej nie jest pewnym ich obecności. Wszędzie zaś gdzie je znalazł, młode komórki tworzyły się w komórkach macierzystych.

§ 328. Według Mirbel'a, wszędzie, gdzie tkanka ma powstać, znajduje się miazga. Jestto zrazu płyn śluzowaty, gęstniejący powoli w galarete. Wtedy postrzedz w nim można maleńkie plamki, w postaci kropek; lecz to są maleńkie wydrążenia, które się z wolna powiększają (miazga komórkowa); w miarę powiększania się wydrążeń, przegrody oddzielające je, zrazu grube i miękkie, cienieją i przybierają kształtną postać, której dotąd nie miały: jestto tkanka komórkowa, dotychczas jeszcze jadnociągła, dająca się pod względem postaci i pozoru porównać z pianą mydlaną. Następnie przegrody rozdwiają się, albo w całej swój rozciągłości, albo tylko ku węglom, a tkanka rozdziela się na tyle odrębnych ciałek, ile było wydrążeń; otrzymujemy więc na miejsce tkanki we właściwém znaczeniu komórki osobne. Miazga ukazuje się prawie wszędzie, nie tylko w wielkich odstępach tkanek, gdzie przyzwyczajeni jesteśmy ją widzieć, lecz także w przestworach międzykomórkowych, które rozszerza, tudzież we wnętrzach komórek i naczyń. Jeśli się tamże rozwija, wydrążenia te mogą się zapełnić tkanką komórkową, lecz częściej jedna komórka tłumi inne, i wypęnia wydrążenie, układając się na ścianie, którą tym sposobem podwaja; następnie może z kolei sama być podwojoną podo-

bnież, przez komórkę trzecią; w ten sposób objaśnia się grubienie komórek, włókien i naczyń. Zdarza się także bardzo często, że miazga zebrana w tkankach, przestaje na pierwszych stopniach swego rozwinięcia i zostaje wessaną.

§ 329. Unger przyjmuje ten szereg widocznych przemian miazgi, lecz uważa za złudzenie jednociągłość pierwiastkową tkanki. Powiada on, iż przekonał się o odosobnieniu komórek od samego początku, chociaż grube, miękkie i ściśnione ich ściany, nie łatwo dają spostrzedz linią odgraniczającą. Ta pierwiastkowa niezależność komórek, uznawaną była powszechnie i bez sporu, dopóki takowego nie wznieciły ostatnie prace Mirbel'a.

§ 330. W jakim teraz sposób powstaje sama miazga? Zdaje się, że kosztem soków najbardziej przerobionych, jak tego dowodzą liczne i trafne doświadczenia Duhamel'a względem tworzenia się drzewa dwuliściennych. Cienka blaszka cynowa wprowadzona między drzewo i korę, dozwoliła przekonać się, że wszystka miazga pochodzi od kory. Po odłączeniu kawałka kory tak, że takowy górną tylko jeszcze częścią trzymał się rośliny, i po odjęciu wierzchnich warstw drzewa pod spodem leżących, miazga znalazła się znowu pod owym kawałkiem kory, skoro tenże powróconym został do swego dawnego położenia. Po odjęciu obrączkowem kory, i zabezpieczeniu od wysychania rany ztąd powstałej, miazga wychodziła obficie z pomiędzy kory i drzewa na brzegu rany wyższym, na niższym zaś daleko skąpiej. Wniesiono ztąd, że miazga powstaje z soków zstępujących kory, a nie z soków wstępujących, od czego mogłaby podać myśl, tożsamość składu chemicznego tych soków, ze składem błonnika, a tém samém znacznej ilości innych istot ustrojowych, znajdujących się w oskólnicy.

§ 331. Komórki rozmnażają się niekiedy z nadzwyczajną szybkością. Młode pędy niektórych drzew naszych przy sprzyjającej porze na wiosnę, mogą nam dać tego przykłady, a jednak prędkość ich rośnienia nie może iść w porównanie z prędkością tegoż, sprawioną przez wyższą temperaturę. Już w cieplarniach naszych, można widzieć że agawy, bambusy i t. p. przedłużają się niekiedy przeszło na 2 centymetry w przeciągu 24 godzin. Niektóre rośliny złożone całkowicie z tkanki komórkowej, rozwijają się nadzwyczaj prędko w naszym klimacie: tak np. grzyby, których szybki wzrost poszedł w przysłowie.

Jeden  
może  
mają  
§  
stanie  
korze  
o to,  
chodz  
które  
cia si  
czkó  
tów  
króte  
zaś w  
i cew  
który  
a kor  
grubi  
co ro  
Co  
tanic  
nien  
mnie  
miel  
doty  
§  
dotąd  
Lahir  
popa  
niezn  
poda  
sny  
boga  
jój c  
teorj  
Pa  
z zar  
dze,  
ulkw  
zua

Jeden z nich: purchawka olbrzymia (*Lycoperdon giganteum*), może w przeciągu trzech lub czterech dni, wyrosnąć w kulę mającą 3 decymetry średnicy.

§ 332. **Wzrastanie łodyg i korzeni.**— Co się tyczy wzrastania narządzi złożonych, wyłożyliśmy już mówiąc o *łodydze*, *korzeniu* i *liściu*, jak się takowe odbywa; idzie tylko jeszcze o to, aby dać poznać w jaki sposób te wszystkie zmiany zachodzą. Będziemy je śledzić na roślinach dwuliściennych, które są lepiej znane, ponieważ dochodzą wielkiego rozwinięcia się w naszym klimacie i które z powodu tworzenia się pączków bocznych, dostarczają liczniejszych i jaśniejszych punktów do rozwiązania zadania. Przypomnijmy tu najprzód pokrótce, że łodygi przedłużają się od dołu do góry, korzenie zaś w kierunku przeciwnym; że pierwsze posiadają rdzeń i cewę rdzeniową utworzoną w części z cewek rozkręcalnych, których niema w korzeniach; że następnie, pomiędzy cewą a korą, powstają nowe włókna i naczynia innego rodzaju, i że grubienie jest właśnie skutkiem tego powstawania, które się co roku powtarza.

Co do sposobu to właśnie tworzenia się tych włókien, botanicy nie zgadzają się jeszcze z sobą. Zajmując się wyłuszczeniem i roztrząśnieniem różnorodnych o tym przedmiocie mniemań i faktów, na których się takowe opierają, będziemy mieli sposobność mówić po szczególe o tém wszystkiém co dotyczy wzrastania narządzi złożonych.

§ 333. Jedna ze znakomitszych teorii, a którą przyjmuje dotąd wielu pisarzy, podaną była przez astronoma francuzkiego Lahire, w początkach XVIII wieku, lecz w krótkości tylko i bez poparcia dowodami, tak, iż została zaniedbaną, a może i wcale nieznaną. Wiekami później, inny Francuz, Dupetit-Thouars, podał ją znowu, doszedłszy do niej zapewne na drodze własnych poszukiwań; a ponieważ utrzymywał ją w pismach bogatych w fakta i rozumowania, przyznano mu więc zaszczyt jój odkrycia, jakoż znaną jest powszechnie pod nazwiskiem teorii tego badacza.

Pączki, jakeśmy to już wyżej powiedzieli, można porównać z zarodkami; każdy z nich rozwija się w gałąź podobną łodydze, która powstaje z rozwinięcia się zarodka. Lecz ten, utkwiony w ziemię, wschodząc, wydaje u dołu korzenie, przeznaczone do wsysania żywności. Pączki, które po zupełném

wykształceniu, odłączają się od łodygi, jakieśmy to widzieli na cębulach (§ 182), cębulkach, cębulczkach (§ 184), różyczkach liści łodyg czołgających się (§ 183), wypuszczają u dołu korzenie, tak jak prawdziwe zarodki. Czyliż więc pączki pozostające na łodydze, pozbawione są tych narzędzi? Dupetit-Thouars mniema, że nie, a widząc że zbiór wiązek włknoczynnych, które się tworzą pomiędzy korą a cewą rdzeniową, ukazuje się wtedy dopiero, kiedy pączki zaczęły się już rozwijać, że wiązki te z jednej strony łączą się z nasadą pączków, z drugiej zaś można je śledzić aż po kończyny korzeni, wnosi, że one są właśnie korzeniami pączków, przebiegającymi pomiędzy korą a cewą rdzeniową, aż póki nie wyjdą na zewnątrz w postaci korzeni czy to zwykłych, czy przybyszowych. Miazga jest dla niego płynem pożywym, który korzenie biorą w siebie, na tej drodze wskroś rośliny. Co rok, nowe pokolenie pączków czyli zarodków przytwierdzonych, spowoduje tym sposobem wyjście nowych odpowiednich wiązek korzeniowych, których ogół tworzy nową warstwę drewna i nowe odnogi korzeni.

§ 334. Teorja ta świeżo znowu obrobioną została przez Gaudichaud, który nie poprzestając na pączku, rozciąga ją do części go składających, do jego osi i liści, które stoją do siebie w tym samym stosunku, jaki Dupetit-Thouars naznacza pączkom względem łodygi. Zarodek jednoliścienny składa się, oprócz rostrka, z łodyżki, liścia czyli liścienia, a po wzejściu i z korzenia. Dla Gaudichaud'a, jestto wzorem osobnika roślinnego, czyli *roślikiem* (phyton), posiadającym przeto układ wstępujący (łodyżka i liść) i zstępujący (korzeń). Skoro rostek rozwijać się poczuje, ponad liścieniem, przedłuża się pierwsze międzywęzle, zakończone liściem, które jest względem niego tępem, czém była łodyżka względem liścienia. Międzywęzle to i liść, stanowią układ wstępujący drugiego roślaka, którego część zstępująca może się tylko wskroś łodyżki dostać do ziemi, przebiegając pod postacią nitki włókno-naczynnych na wewnętrznej stronie pokładu korowego. Podobnie ma się ze wszystkimi liściami następnymi; każdy z nich siedzi na swoim międzywęzlu, każdy wydaje nitki korzeniowe, przebiegające pomiędzy temi, które się niżej znajdują. Łodyga zatem powstająca z rozwinięcia się rostrka, jest szeregiem łodyżek zrosniętych z sobą końcami; każda z nich okryta jest wiązkami

korzeniowemi wszystkich łodyżek wyżej położonych, jest poniekąd zupełną gałązką, prócz tylko że w gałązce ogół wiązek korzeniowych, doszedłszy do niższej kończyny, wchodzi w gałąź z której tamta wyrosła i ciągnie dalej bieg swój wewnętrzny i zstępujący. Zarodek dwuliścienny, w którym każde międzywęzle nosi dwa naprzeciwległe liście, jest połączeniem dwóch rośliników.

§ 335. Włókna i naczynia kory biorą początek z tego samego źródła, co i wiązki włóknonaczynne drzewa, z którymi zrazu bieżą złączone. Powstają one także z pączków i należą do układu zstępującego.

§ 336. Co się tyczy tkanki komórkowej, powstawanie jej jest wszędzie miejscowem i wynika z rozmnożenia się komórek już istniejących; zatem w drewnie z przedłużenia się promieni rdzennych. Tym sposobem, przy grubieniu, czyli wzrastaniu obwodowem, tkanka ta pomnaża się w kierunku poprzecznym, włókna zaś i naczynia w kierunku pionowym: jestto zatem rodzaj tkaniny, w której tamta stanowi niejako wątek, te zaś osnowę. Kiedy wiązki wychodzą na zewnątrz dla utworzenia korzeni, zabierają z przyległej tkanki komórkowej warstwę, która im towarzyszy i która rosnąc w miarę tego jak się przedłużają, stanowi dla nich rodzaj pochwy.

§ 337. Główne fakta służące za zasadę całej tej teorii, są następujące:

Drewno korzeni należące bez zaprzeczenia do układu zstępującego, nie posiada nigdy cewek rozkręcalnych; drewno też łodygi niema ich także, i składa się z takich samych części jak tamto.

Drewno łodygi przechodzi w drewno korzeni; a ponieważ to ostatnie utworzyło się później od łodygi, można więc wnosić, że jest przedłużeniem pierwszego, jako utworzonego pierwój i że wiązki łodygi zbiegały już na dół. Lecz wiązki te przyczepione są u góry w łodydze do podstawy pączków, a w pączkach do podstawy liści: pochodzą zatem z pączków, a nasamprzód z liści.

Przy tworzeniu się korzeni powietrznych, można spostrzedz, że zachodzi pewien stały związek pomiędzy ich początkiem, a położeniem pączków lub liści; wychodzą one bowiem zwykle tuż po pod węzłami, a przeto z podstawy tego, co Gaudichaud nazywa układem wstępującym roślinika. Szczególniej też w wie-

lu jednolściennych widzimy, że pojedyncze korzenie wyrastają przy podstawie każdego międzywęzła, wprost pod nasadą liścia tamże siedzącego. W niewielkiej liczbie roślin (*Pourretia*, *Kingia*, wielu widłakach) korzenie te, zamiast wychodzić od razu na zewnątrz, zbiegają czas niejaki popod okrywą korową. Roślinki więc wydają prawdziwe korzenie, czyto wolne, czy ukryte w miąższości łądygi. Pomiędzy zaś tym sposobem urządzenia, a tym, w skutek którego wiązki zléwają się i zrastają z sobą, dla utworzenia tkanki drzewnej, znaleźć można wszystkie przejścia.

§ 338. Zstępowanie wiązek drzewnych najwyraźniej się objawia tam, gdzie właśnie znajduje zawady. Odjąwszy korę w kształt pierścienia lub przewiązawszy łądygę, spostrzegamy, że na wyższym brzegu pierścienia, lub ponad przewiązką, tkanki grubieją i tworzą wydatności; pod przewiązką zaś nie ma zgrubienia. Przeciąwszy ową wydatność, widzimy iż się składa z siatki wiązek pokrzyżowanych z sobą i rozchodzących się we wszystkie strony, ale przechodzących zawsze u góry w wiązki idące od pączków. Jeśli odejmiemy część tylko pierścienia kory, wiązki okrążą brzegi rany i pod nią przybiorą znowu kierunek pionowy. Ścisnąwszy łądygę zawiązką okręconą w węzownię (jak to często czynią na drzewach naszych niektóre pnące się krzewy, np. niektóre wiciokrzewy), utworzy się jak w powyższym przypadku, ponad zawiązką i wzdłuż takowej wydatność, w tym razie węzownicowata, a przecięcie jej okaże nam wiązki nagromadzone w tym samym kierunku. Jeśli łądyga, z której odjęliśmy pierścień kory, nie posiadała pod tymże żadnej gałęzi, lub jeżeli zniszczyliśmy gałęzie jakie się znajdować mogły, tak, że pozostawia tylko pączki siedzące wyżej od rany, i jeśli ta jest tak szeroka, że brzegi nie zdołają już połączyć się z sobą, — wtedy cała część rośliny ponad raną, grubieć będzie w skutek zwykłego powstawania warstw drzewnych, ustanie zaś wzrastanie i tworzenie się drewna w części pod raną leżącej. Wniesiono z tych wszystkich doświadczeń, że wiązki drzewne zstępują z góry na dół i zostają wydane przez pączki, których są niejako korzeniami.

§ 339. Lecz obok tych, za teorią Dupetit-Thouars'a przemawiających faktów są inne, stojące z nią w sprzeczności; wreszcie, nie ona tylko sama jest w stanie rzecz całą objaśnić.

Wypad  
ciw ni  
Gd  
winny  
swoic  
im się  
wych  
tego j  
Wpraw  
pek ni  
lecz z  
się wi  
do dr  
pokaz  
ich wi  
ko pó  
wie sp  
przyp  
wnym  
§ 3  
ków  
gam  
ciaż  
wyde  
zstę  
szcze  
posia  
rzeni  
dzoni  
właśn  
podw  
ani k  
pączk  
drew  
a prz  
kowé  
swe  
żyw  
komo  
dzoni

Wypada nam więc zastanowić się tu nad zarzutami jakie przeciw niej uczynić można.

Gdyby wiązki drzewne były prawdziwemi korzeniami, powinnyby przedłużać się na samych tylko niższych kończynach swoich; ich ustrojność powinna by stać w tém wyższym stopniu, im się ich wyżej śledzi, im są bliższe pączka, z którego wychodzą; musiałyby kończyć się wyżej lub niżej, podług tego jak rozwijanie się pączka mniej lub bardziej postąpiło. Wprawdzie, znajdujemy niekiedy poniżej pączka zbiór i jakby pęk nitek drzewnych, które się kończą w pewnej odległości; lecz zwykłej nie podobna jest śledzić postępowego rozwijania się wiązek, które prawie jednocześnie tworzą się od jednego do drugiego końca łodygi; owszem, badanie za pomocą szkła pokazuje, iż takowe są pospolicie u góry miększe, a żywyły ich włókniste i naczynne, daleko niedokładniej, a przeto daleko później utworzone. Zdaje się zatem, iż wiązki powstają prawie spólcześnie w całej długości, a w niektórych przynajmniej przypadkach, raczej od dołu do góry, niż w kierunku przeciwnym.

§ 340. Rozbierając drewno dwóch łodyg lub gałęzi gatunków odmiennych szczepionych w szparę, np. A w B, spostrzegamy, że każda zachowała przyrodzenie swego drewna, chociaż w przypuszczeniu Dupetit-Thouars'a wszystkie wiązki wydane przez A po wszczepieniu, powinny się przedłużyć zstępując po łodydze B i tworzyć jej warstwy drzewne. Jeśli szczepienie odbywało się na płonce młodej B, mało jeszcze posiadającej korzeni, to po kilku latach, wszystkie nowe korzenie musiałyby pochodzić od pączków A, a wszystkie sadzonki z nichbrane, musiałyby wydawać gatunek A, kiedy właśnie doświadczenie pokazuje, że wydają gatunek B. Na to podwójne postrzeżenie, z którego by wynikało, że ani drewno, ani korzenie nie mogą być uważane za wiązki korzeniowe pączków, stronnicy owęj teorii odpowiadają, że barwy udziela drewnu tkanka komórkowa, która mu i żywności dostarcza, a przeto drewno łodygi A, bierze barwę swą od tkanki komórkowej B, która tworząc się w miejscu, zachowała wszystkie swe piętna; że nasienie A może się także odmienić ze zmianą żywności. Na drugie doświadczenie odpowiadają, że tkanka komórkowa B, towarzysząc wiązkom drzewnym A, nadaje sadzonkom brany z korzeni B piętno gatunkowe, dlatego wła-

śnie, że sadzonki te mogły tylko powstać z pączków przyby-szowych, nistoczonych z tkanki komórkowej. Zadania te, stoją więc w zanadto blizkim związku z tajemnicą przypodobniania, aby dziś można o nich wyrzec coś zupełnie pewnego.

§ 341. Jeśli odnogi boczne korzenia ukazują się nasamprzód jak większa część innych narzędzi, w postaci małych kupek komórek, w których następnie ustrajają się naczynia (§ 124), nie będą one przeto przedłużeniami tylko wiązek zstępujących, poprzednio już utworzonych. Jestto jedno z zadań organogenji, na których rozwiązaniu wiele zależy przy roztrząsaniu teorii Dupetit-Thouars'a.

§ 342. Zpomiedzy faktów, na jakich się opiera owa teoria, najważniejsze są te, których nam dostarcza wstrzymanie się wiązek zstępujących, ponad wszelką zawadą, przyrodzoną czy sztuczną, ponad przewiązkami i obnażeniami z kory; tudzież powiększanie się także tkanki drzewnej, które przeciwnie ustaje u dołu (§ 338). Lecz czyliż takowych nie tłumaczy nam równie jasno i naturalnie bieg soków pożywnych, które dostarczają pierwiastków miazgi? Soki te zstępując przez korę, muszą się gromadzić ponad wszelką zawadą, która ich bieg tamuje, przebywać ją jeśli jest nieprzełamana, okrażać, jeśli istnieje jaka boczna, otwarta droga, a zatrzymywać się, jeżeli takiej niema; w każdym z tych przypadków, napływ istot pożywnych, musi spowodowywać obfitsze uistaczanie się tkanek, niedostatek ich musi sprawiać niedożywienie, według praw wspólnych wszystkim ciałom ustrojowym. Napływ soków poprzedza ukazanie się wiązek włókno-naczynnych, które się dopiero tu tworzą, a nie przychodzą już utworzone. Wyrastanie korzeni powietrznych przy węzłach, daje się także łatwo zrozumieć, ponieważ one rozwijają się zwykły wszędzie, gdzie istnieje nagromadzenie soków, a przeto i tkanki komórkowej (§ 113). Gdy zaś wykształcenie się pączków jest jedną z przyczyn spowodowujących wstępowanie soków (§ 258), gdy soki te przerabiają się w młodej korze, a nadewszystko w liściach (§ 266), jasną jest rzeczą, iż zniszczenie pączków i liści wstrzymać musi wstępowanie i przerobienie soków, a następnie dla niedostatku wątku i tworzenie się włókien drzewnych; oczywiście że takowe nie będą mogły powstawać w całej tej części rośliny, której związek z częścią posiadającą liście i pączki, zostanie przecięty.

Tru  
sposó  
u dok  
i rosn  
ciągl  
kimże  
moga  
§  
zwała  
łatwi  
moga  
kory  
poją  
okoł  
bywa  
dobne  
w jed  
się ty  
lubo z  
szcze  
tłuma  
z ko  
nie,  
tych  
bysz  
wna  
spraw  
winę  
razie,  
nia m  
§  
gatun  
ścieł  
pom  
lat.  
Czyr  
rym  
się p  
razie  
pła

Trudno zrozumieć podług teorii Dupetit-Thouars'a, jakim sposobem drzewo, po obłupieniu obrączkowym kory, tak, że u dołu nie mogą już powstawać warstwy drzewne, może żyć i rosnać dalej; wzrastanie bowiem dalsze każe się domyślać ciągłego tworzenia się korzeni w tym samym stosunku; a jakimże sposobem wiązki drzewne wstrzymane w swój drodze mogą je tworzyć?

§ 343. Siatkowate rozgałęzienia naczyń mlęczowych, dozwala ich kanałom zastępować się poniekąd, a mlęczowi omijać łatwiej zawady, jakie się biegowi jego zstępującemu nastreczyć mogą; a że naczynia te, lubo głównie nagromadzone wewnątrz kory, udają się jednakże często i w inne części rośliny, łatwo pojąć, że po zniszczeniu nawet kory, w pewnej różległości około łodygi, mlęcz może jeszcze chociaż mniej obficie, przybywać do części dolnych. Nie mogłoby zachodzić tu coś podobnego jak w zwierzętach, gdzie po wstrzymaniu biegu krwi w jednej z głównych tętnic jakiego członka, krążenie odbywa się tylko przez małą jaką odnogę, a jednak członek ten żyje, lubo zostaje do pewnego stopnia niedożywionym? To przypuszczenie (które potrzeba sprawdzić na drodze postrzeżeń), tłumaczyłoby nam, jakim sposobem popod miejscem obnażonem z kory, łodyga może się utrzymać przy życiu, wydawać korzenie, a nawet niekiedy i cienkie słoje drzewne. Tworzenie się tych ostatnich, starano się objaśnić obecnością pączków przybyszowych popod obłupieniem z kory, z kąd pochodziłyby pewna ilość nitek drzewnych. Lecz pączki takowe, mogłyby to sprawić tylko wtedy, kiedyby się już do pewnego stopnia rozwinęły, i to znajdując się w dość znacznej liczbie, a w takim razie, musiałyby być widocznymi. O tém więc także postrzeżenia muszą rozstrzygnąć.

§ 344. Dutrochet opisał ciekawy fakt, że pnie niektórych gatunków jodły (*Abies excelsa*, a osobliwie *A. pectinata*), ścięte na kilka stóp od ziemi, nie przestają żyć i grubieć za pomocą kolejno po sobie następujących słoików, przez wiele lat. W tym razie nie może być mowy o wiązках zstępujących. Czynność odbywa się niezaprzeczenie od dołu do góry, o którym to kierunku świadczy wydatność dosyć gruba, znajdująca się ponad słojami powstałemi po ścięciu drzewa. W tym więc razie, oskólnica musi, bez udziału liści, nabywać pewnego stopnia ustrojności, dostatecznej do utworzenia słoików rocznych,

które wszelako są nadzwyczaj cienkie, niedochodzące grubości jednego milimetra, a często nawet jego połowy.

Fakt ten, którego żadne z powyższych objaśnień nie tłumaczy, otrzymał niedawno objaśnienie bardzo prawdopodobne. Zauważano, iż pniaki, które grubieją nawet po ścięciu drzewa, rosną zwykle w pobliżu innych drzew tegoż samego gatunku, będących w całej sile rośnięcia, a odkopując ziemię, znaleziono, że niektóre z ich korzeni są z sobą zrosnięte. Widać przeto, że korzenie drzew całych, żywią owe pniaki, dostarczając im soków już przerobionych: co też potwierdza większa grubość słojuw drzewnych od tej strony pniaka, która odpowiada zrosniętym korzeniom. Takowe łączenie się korzeni drzew sąsiednich jednego gatunku, albo nawet gatunków pokrewnych, nie jest rzadkiem w rodzinie szyszkowych, a nawet jak się zdaje i w innych drzewach, np. bukach. Może ono tłumaczyć nam, dlaczego często korzenie drzew, pozostałe w ziemi, żyją długo jeszcze po ścięciu łodygi.

§ 345. Zbierzmy pokrótce to co się powiedziało o grubieniu łodyg i korzeni. Co do tworzenia się części czysto-komórkowych, zdania zgadzają się z sobą, różnią się zaś od siebie co do sposobu tworzenia się wiązek włóknonaczynnych drzewa i kory. Podano dwie teorie: jedna z nich uważa te związki za korzenie pączków, a zatém za powstające od góry ku dołowi; podług drugiej żywiły ich rozpościerają wątek od razu w postaci galarety wólpłynnej (miazgi), po całej wewnętrznej powierzchni kory, gdzie się też związki jednocześnie tworzą. Zdaje się wszelako, iż obiedwie teorie nie tak bardzo są sobie przeciwne, jakby z pierwszego wejrzenia sądzić można. Byłyby one takimi bez wątpienia, gdyby przypuszczano, że związki wstępują w górę, aby na kończynach swych wydać pączki. Ale któż dzisiaj jest tego mniemania? Widzieliśmy, że ani liście nie mają w początku żadnego naczynnego związku z gałązką (§ 147), ani pączki (§ 171) z łodygą, która je nosi; że wyrobione w tych liściach i gałązkach soki, zstępują ztamtąd aż do kończyn korzeni przez korę, na wewnętrznej powierzchni której zbiera się istota wólpłynna uistaczająca tkanki. Gandichaud ze swój strony przypuszcza, że „soki przerobione, po „części ustrojowe (miazga), tkanki jeszcze płynne, tworzą się „i twardnieją zstępując z pączków w gałązki, z gałązek w łodygę, a z łodygi w korzenie, i przedłużając się podobnie jak

„korzenie, a bodaj czy nie zupełnie tak samo.“ Możnaż pomiędzy temi tkankami zstępującymi w stanie półpłynnym, a naszymi tkankami utworzonymi w istocie półpłynnej, której dostarczają soki zstępujące, znaleźć wyraźną dosyć granicę, na którejby oprzecz można dwie przeciwne sobie teorie?

§ 346. Zajmowaliśmy się tu rozbiorem dwuliściennych, raz dla łatwości jaką przedstawia ich badanie, a potem dlatego, że grubienie drzew jednoliściennych ustaje zwykle bardzo rychło, dlatego, iż takowe nie posiadają pączków bocznych. Zresztą, nieobecność prawdziwej kory, połączenia naczyń młeczowych i włókien drzewnych w jedną wiązkę, i kręty bieg samych wiązek wewnątrz łodygi, uczyniłyby wykład faktów daleko zawikłańszym i ciemniejszym. Odsyłamy więc tylko do tego co się poprzednio rzekło o tym przedmiocie (§ 96), jako też o wzrastaniu drzew bezliściennych (§ 107).

## T R E Ś Ć.

§ 347. Wyciągając treść z tego wszystkiego, cośmy dotąd o czynnościach rośliny powiedzieli, będziemy mogli pokrótce porównać to, co się dzieje w roślinach, z tém, co się dzieje w zwierzętach. Przy porównaniu tém, musimy zostawić na stronie takie jestestwa obudwu królestw, które przedstawiają najmniej doskonałą ustrojność i w których czynności te nie są dokładne, a obok tego najczęściej bardzo ciemne.

§ 348. 1<sup>o</sup> Roślina wsysa końcami swoich korzeni, ciała, przychodzące od zewnątrz w stanie płynnym, ciała, które są czysto nieustrojowemi, jakoto: kwasoród, wodoród, węgiel i saletroród, w postaci wody, kwasu węglowego, amonjaku, tudzież kilku innych przyrodzenia kopalnego; 2<sup>o</sup> ostatnie z wymienionych zachowują przyrodzenie swoje wewnątrz tkanek; lecz inne, tworzą tamże różne połączenia, których wynikiem są ciała bardziej złożone, mogące się nazwać ustrojowemi, i mogące stać się materiałem rośliny, jak np. skrobia; 3<sup>o</sup> materiały owe ulegają także przemianom, pod wpływem oddychania i wydzielenia, tak iż mogą dać początek wszystkim utworom ustroju. Wszystkie takowe połączenia uważać należy jako zaszły nie pomiędzy owemi czterema wymienionemi pierwiastkami, lecz pomiędzy związkami ustrojowemi, powstającemi właśnie z tamtych, w roślinie pod wpływem życia. Związki te nazywają się: *pierwiastkami roślinnemi*.

§ 349. W żywieniu zwierząt, nie odbywają się te pierwsze, przygotowawcze działania na pokarmach, ponieważ takowe są zawsze istotami roślinnemi lub zwierzęcemi, a przeto mniej więcej ustrojowemi. Nowy stopień przerobienia jakiego nabywają w ciele zwierzęcém, jest dalszym ciągiem działań rośliny zaczętych w roślinach, lecz obiegają poniekąd koło; zwierzę bowiem niszczy istoty owe spożywając je, a te, które oddaje w skutek oddychania (§ 239) i wydalania (§ 310), są właśnie istotami nieustrojowemi, stanowiącemi pierwsze pożywienie rośliny.

§ 350. Roślina wsysa pokarm z ziemi, kończynami ostatnich odnóg korzeniowych; zwierzę wsysa go z kanału kiszkiowego

ostatnimi gałązkami naczyń żylnych i limfatycznych. Lecz poprzednio uległ on w kanale pokarmowym pierwszemu przygotowaniu, w skutek trawienia którego, równie jak i narzędzi ku temu celowi służących, niema wcale w roślinie (1), ponieważ wszelkie działania, w skutek których istoty mające wejść w roślinę, znajdują się już w ziemi w stanie roztworu, i mogą przeto być wssane przez korzenie, leżą poza obrębem życia.

§ 351. Zastanawiając się jednak nad działaniami następującymi po żywieniu, znajdziemy w nich pewne podobieństwo w obudwu królestwach. W zwierzęciu istoty płynne wessane przez naczynia przyległe kanałowi pokarmowemu, mieszają się ze krwią, a z nią udają się w narzędzia oddechowe, gdzie przez zetknięcie się z powietrzem, ulegają pewnym zmianom. w skutek których płyn ów staje się zdolnym do żywienia i rozchodzi się wsteczniemi drogami po wszystkich częściach ciała, gdzie się takowe odbywa. W roślinie, płyny wessane przez korzenie, udają się (2) przez części środkowe ku obwodowi, siedlisku oddychania, a stykając się z powietrzem, ulegają dalszym przemianom, przez co nabywszy nowych, istotnie żywionych własności, wracają się wstęcznym biegiem i rozdzielają po wszystkich częściach. Zatem w jednym, jak w drugim przypadku, istoty z zewnątrz pochodzące, idą najprzód ku narzędziom oddechowym, a potem ztamtąd ku wszystkim punktom ciała, dla żywienia tychże. Płyny więc idące przez korę,

(1) Niektórzy uważają wiele zjawisk opisanych tu przy żywieniu i oddychaniu, za zjawiska trawienia. Podług nich szparki i kończyny korzeni są pyszczkami, przez które wchodzi pokarmy; a przerobienie pokarmu, któremu takowe ulegają następnie w roślinie, mianowicie też związanie węgla, ma przedstawiać rodzaj trawienia; oddychanie ogranicza się na związaniu kwasorodu wziętego z powietrza i jest zupełnie podobne do oddychania zwierząt. Prawda tych teorii, jakieśmy to już powiedzieli (§ 289), zależy w zupełności od określeń, jakie przyjmijemy dla każdej z będących w mowie, czynności. Lecz w takim razie wypadałoby nadać trawieniu znaczenie daleko rozciąglejsze niż to, w jakim je bierzemy u zwierząt, to jest, uważać je za pierwsze przygotowanie pokarmów w kanale pokarmowym.

(2) W tej drodze ulegają pierwszemu przerobieniu, w skutek którego zaczynają się ustrajać, i które niema odpowiadającego w zwierzętach, gdzie cząsteczki pokarmu są już i bez tego ustrojowemi.

a szczególnie krążące w naczyniach mlęczowych, można poniekąd porównać z krwią tętnicową; te zaś, które przychodzą z korzeni przez układ drzewny, z płynem dostarczonym przez miazgę zwierzęcą (*chylus*). Prawdopodobną jest, że część płynu żywiącego, ogołocona z istot użytych do żywienia, powraca znowu w roślinę, i miesza się z sokami krążącemi, tak, jak w zwierzętach, gdzie tworzy krew żylną, a może i limfę. O tém przynajmniej zdaje się przekonywać, często dające się spostrzegać wessanie tkanek roślinnych. Wszelako niepodobna tu nic wyrzec z pewnością dla zbyt wielkiego zmieszania, jakie przedstawiają drogi krążenia soków w roślinach.

W rzeczy samej, jeśli od badania samej czynności w ogóle i jej wypadków, przejdziemy do badania narzędzi, w których się ona odbywa, całe podobieństwo niknie. Rośliny nie posiadają układów naczyń prawidłowo rozgałęzionych, które widzimy w zwierzętach, i które wyraźnie wskazują bieg płynu żywiącego; ani środka, ku któremu płyn ten idzie i który nadaje mu popęd, spowodowujący jego ruchy. Nieobecność wszelkiej kurczliwej tkanki w roślinach, stanowi istotną różnicę, w przyczynie i przyrodzeniu ich krążenia.

§ 352. Porównaliśmy już (§ 289) oddychanie w obu dwu królestwach, i okazaliśmy, iż takowe odbywa się w nich odwrotnie. Opisaliśmy w jaki sposób zmieniają się narzędzia, podług tego jak takowe oddychają w wodzie lub powietrzu, porównywając liście podwodne ze skrzelami, powietrzne z płucami, albo właściwiej jeszcze z ciałem owadów (§ 279), przerniętém tchawicami, które spólniczą z powietrzem przez otworki. Upatryliśmy podobieństwo pomiędzy szparkami a temi otworkami; jednakże w reszcie przyrzędu oddechowego zachodzi istotna różnica, ponieważ w zwierzętach, powietrze przebiega szereg kanałów oddechowych, rozgałęzionych i działa wskroś ich ścian na krew zawartą w naczyniach włoskowatych, rozpostartych na ich powierzchni; w roślinach zaś powietrze przebiega szereg wydrążeń, utworzonych przez odstępy komórek, mniej więcej od siebie oddalonych (§ 127), i działa na płyn zawarty w tych komórkach. Możliwy z tém urządzeniem porównać część przyrzędu oddechowego ptaków, rozciągającą się od płuc do wszystkich części ciała, które tym sposobem, stawia w związku z powietrzem, krążącym w sze-

regu  
także  
oddy  
w ty  
i zar  
wa si  
czne  
jąyc

§ 3  
dzieli  
bowie  
po w  
parow  
chni d  
oddy  
równa

§ 3  
tak c  
utwor  
madz  
czoły  
zwier  
opatr  
gamy  
daleń  
tego r  
niem,  
wodu  
dokład  
płyn,  
z inne  
leń i v

§ 3  
istniej  
stanow  
znika  
łania  
określ

regu wielkich przerw tkanki komórkowej. Zwróciliśmy już także uwagę, na inną zasadniczą różnicę, jaką przedstawia oddychanie roślin, w porównaniu z oddychaniem zwierząt; w tych ostatnich trwa ono bez przestanku przez całe życie, i zarówno w ciemności jak przy świetle; w roślinach zaś odbywa się tylko przy świetle (§ 283), którego promienie chemiczne biorą jak się zdaje udział w nowych związkach, powstających pod jego wpływem (§ 284).

§ 353. Co się tyczy wyziewania na powierzchni ciała, widzieliśmy, iż takowe odbywa się podwójnie w roślinach: jedno bowiem istnieje w bardzo tylko nieznacznym stopniu, i zależy po większej części od okoliczności zewnętrznych; jestto więc parowanie, dające się porównać z przeziwaniem na powierzchni ciała zwierząt; drugie jest silniejsze, które towarzyszy oddychaniu, którego siedliskiem są te same drogi, i które porównaliśmy z wyziewaniem płucnym (§ 291).

§ 354. Co do wydzielania, napotyamy podobne różnice tak częste pomiędzy narządami zwierzęcymi i roślinnymi, utworzonymi w pierwszych z siatki naczyń, w drugich z nagromadzenia komórek. Taką to budowę przedstawiały nam gruczoły roślinne, dające się zaledwie z najprostszymi gruczołami zwierzęcymi porównać, większa bowiem część tych ostatnich, opatrzona jest przewodami wydalniczymi, których nie spostrzegamy w roślinach. Nie znaleźliśmy w roślinach niektórych wydaleń stale istniejących u zwierząt, lecz wszakże wydalenia tego rodzaju, zdają się stać szczególnie w związku z trawieniem, — czynnością, na której zbywa roślinom. Zresztą, z powodu wielkiej jednostajności tkanki roślinnej, tak trudno jest dokładnie odróżnić narządzia wydzielające pewne szczególne płyny, tudzież śledzić dalszą drogę tych płynów, zmieszanych z innymi, że wielka jeszcze panuje niepewność co do wydzieleń i wydaleń roślinnych (§ 317).

§ 355. Wnieść więc wypada z tego wszystkiego, że lubo istnieje pewne podobieństwo w szeregu głównych działań, stanowiących czynność żywienia u zwierząt i u roślin, takowe znika prawie zupełnie w przyrządach ustroju, w których działania te się odbywają, w przyrządach, które są dokładnie określone u zwierząt, a bardzo niedokładnie u roślin; że siły

przewodniczące tym sprawom, są po większej części różne, że nakoniec w utworach ztąd powstających, dają się widzieć różnice tak urządzone, że oba królestwa mogą prowadzić z sobą ciągłą wymianę; i tym to właśnie sposobem zachować się może podziwu godna równowaga, wpośród nieładu, jakiby inaczej ruch życia tego nieprzeliczonego mnóstwo jestestw ustrojnych, wzniecał bez ustanku w przyrodzie.


§ :  
wypa  
ko w  
i por  
kując  
liści  
swą  
czyn  
ków,  
węc  
ście?  
przejs  
uznan  
przez  
(§ 23  
niezw  
klad  
§  
tów,  
phae  
chni  
rych  
biale.  
nie, w  
tylko  
listecz  
sze sa  
ne co  
bięraj  
chod  
w bia  
się da  
wyżs  
żne za  
czkae

## K W I A T.

§ 356. Wyżej już, przy rozbiórce kwiatostanu i kwitnienia, wypadło nam mówić o kwiecie; lecz wtedy uważaliśmy go tylko w ogóle, jako całość, której nie rozbieraliśmy na części, i porównaliśmy go z pączkiem lub różyczką liści (§ 199) wzmiankując, że te nowe liście różnią się tylko mniej lub więcej od liści łodygowych postacią, barwą, wymiarami; słowem, całą swą powierzchownością. Różnią się one dalej jeszcze swemi czynnościami, a cały ten ogół różnie skłonił dawnych botaników, do uważania ich za narzędzia wcale odrębne. Dlaczegoż więc w nowszych czasach różne części kwiatu brane są za liście? Oto dlatego, że dostrzeżono wszystkich stopniowych przejść od jednych do drugich, i ujrzano się w konieczności uznania w narzędziach tych, jednakowego przyrodzenia, a to przez zastosowanie w przypadku tym, prawideł służących (§ 235) za rękojmię w oznaczaniu narzędzi przybiierających niezwykłą, a czasami tak bardzo odmienną postać. Kilka przykładów da nam łatwiej rzecz tę zrozumieć.

§ 356 bis. Weźmy na przykład jeden z najpiękniejszych kwiatów, jakie u nas dziko rosną, kwiat grzybieniu białego (*Nymphaea alba*) [fig. 223], który tak często rozkłada na powierzchni wód stojących szerokie różyczki swych listeczków, z których zewnętrzne są zielone, wewnętrzne żółte, środkowe zaś białe. Zielone, posiadają tę barwę tylko na zewnętrznej stronie, wewnętrzna bowiem jest białą; bywa ich zwykle cztery tylko (*c c c c*), i są bardzo podługno jajowate. Liczne dalsze listeczki (*p p p p*) są białe na obu stronach, najwewnętrzniejsze są równie albo i bardziej podługne jak zielone, wewnętrzne coraz to krótsze. Bliżej środka (*e*) są coraz krótsze i przybiierają barwę żółtą; dalej, zwężają się coraz bardziej, przechodząc stopniowo z kształtu jajowatego, jakieśmy widzieli w białych, w kształt wąskiego paseczka. Obok tego spostrzedz się daje pewna zmiana, coraz to wyraźniejsza na kończyźnie ich wyższej, która przedstawia dwa zgrubienia, jakby dwa podługne zagięcia. Zagięcia te podługniejac coraz bardziej w listeczkach dalej ku wewnątrz położonych, zajmują nakoniec prze-

szło połowę ich długości (*e* 4, 5) i całą grubość téj połowy, chociaż zrazu zaledwie ich było można dostrzedz na zgrubiałym nieco końcu listeczków zewnętrzniejszych (*e* 1). Nakoniec środek kwiatu zajmuje okrąg ciałek żółtych (*s*), daleko krótszych od poprzedzających, utworzonych także przez zgrubienia, ale już pojedyncze tylko, a nie podwójne w każdym; stanowią one jakby wieniec, dla ciała środkowego znacznie grubszego, które na przecięciu poprzeczném, okazuje wewnątrz



223.

wydrążenie podzielone przegrodami ułożonemi promienisto, i równemi co do liczby ciałkom żółtym wienca. Ciało to środkowe stanowi tak nazwany *stłupek* (pistillum); pomiędzy nim a częściami opisanemi poprzednio, nie dostrzegamy żadnego widocznego podobieństwa; pomiędzy zaś tamtymi zachodzi podobieństwo niezaprzeczone, ponieważ ich następstwo, ukazuje nam wszystkie stopniowe przejścia z zewnętrznych w wewnętrzne. Najmnień wszelako rozróżniamy pomiędzy nimi główne odmiany, któreśmy wymienili: *kielichem* (calyx) nazwano ogół listeczków zielonych; *koroną* (corolla) ogół listeczków białych, z których każdy otrzymał miano *płatka* (petalumi); *pręcikami* (stamina) wszystkie części żółte, u góry zgrubiałe w mniejszej lub większej rozległości, przez podwójne zagięcia.

223. Kwiat grzybieniu (*Nymphaea alba*), widziany z góry i znacznie pomniejszony. — *c c c c* Cztery listeczki kielicha. — *p p p p* Płatki. — *s* Stłupek. — Widzieć można stopniową zmianę postaci części od zewnątrz ku wewnątrz; prócz tego umieszczono obok, oddzielnie, szereg listeczków przekształconych, począwszy od zielonego listeczka kielicha *c* i białego korony *p* 1, aż do pręcików, coraz bardziej napiętnowanych odmiennością postaci *e* 4, 5.


W większej liczbie innych kwiatów, różnice wyraźne tych wszystkich części, usprawiedliwiają poodznaczanie ich osobnemi nazwiskami. W kwiatach grzybieniu białego, różnice te są mniej wyraźne, i w szeregu kształtów pośrednich, od listeczków kielicha aż do najwewnętrzniejszego pręcika, trudno byłoby naznaczyć punkt, gdzie się jeden rodzaj narzędzi kończy, a drugi zaczyna, tak, że przykład skłania nas do uznania w listeczkach kielicha, płatkach i pręcikach, jednego i tegoż samego narzędzia, mniej tylko, albo więcej odmienionego.

§ 357. Lecz narzędzie to jestże liściem? Nie można wątpić, że przykwiatki (§ 226) są liśćmi odmienionemi; przejście bowiem jednych w drugie, jest bardzo częste i nieznaczne. Przejście zaś od przykwiatków do listeczków kielicha, jest również widocznem, a w wielu nawet razach niepodobna jednych od drugich odróżnić. Jako przykład weźmy piwonją, zarazę (*Orobanche*), i t. d., i t. d. W innych razach (np. w róży) [fig. 261 i 369 c, f], części kielicha posiadają zupełnie postać liści prawdziwych, i sama nazwa listeczków (*foliola*), którą oddawna otrzymały, dowodzi, że podobieństwo to, nie uszło uwagi naszych poprzedników.

§ 358. Tylko więc w częściach słupka nie mogliśmy dotychczas rozpoznać liści. Lecz jeśli w grzybieniu stopień ich przekształcenia utaił je całkowicie, inne przykłady przeciwnie pokażą nam, że one nie zawsze są tak bardzo zmienione, owszem częstokroć mniej nawet niż pręciki.

Weźmy kwiat bobrowniku (*Magnolia*), np. gatunku *Yulan*, hodowanego teraz dosyć często w naszych ogrodach. Wychodzi on z pokrywy uszkowatej, złożonej z dwóch zielonych, kosmatych przykwiatków, i ukazuje wtedy różyczkę o dziewięciu dużych listeczkach białych; wewnątrz na przedłużeniu osi znajduje się mnóstwo ciałek wązkich ostro zakończonych: z tych dolne, żółte, zwężone w niższej części w nitkę, górne zielone i przeciwnie rozszerzone przy podstawie, która w środku jest czczą, a której przeto nabrzmienie odpowiada wydrążeniu zamkniętemu. Porównywając kwiat ten z kwiatem grzybieniu, rozpoznamy w listeczkach białych, listeczki kielicha i płatki, które tu różnią się od siebie tylko położeniem względem w ciałkach żółtych; pręciki, które tu posiadają wszystkie postać jednakową i wcale różną od płatków. Ciałka zielone otaczające koniec osi i zajmujące środek kwiatu, odpowiadają

ze względu położenia swego słupekowi. Lecz słupek ten składa się z wielu oddzielnych części, z listeczków jakby poskładanych



224.

na sobie samych. W kwiecie rodzaju pokrewnego z bobrownikiem, tulipowcu zwyczajnego (*Lyriodendron tulipifera*), znaleźlibyśmy od zewnątrz trzy zielone listeczki kielicha; potem, w dwóch rzędach, 6 płatków zielonawo-żółtych, z plamkami czerwonymi; bardziej jeszcze ku wewnątrz znaczną ilość pręcików, zwężonych u dołu w nitkę (fig. 224 e) i zajmujących spód osi środkowej (a), która dalej okryta jest małemi zielonemi listeczkami (c c), płaskimi, na końcu zgrubiałemi, przy podstawie nabrzmiałemi wydrążonemi, i zrosniętymi z sobą u dołu, dopóki nie dojrzeją i nie odłączają się od siebie całkowicie. Sąto części składające słupek, z których każda nosi nazwisko *owocka* (carpellum). Niżej oznaczać je także będziemy nazwiskiem *listeczków owocowych*.

§ 359. W przykładach dotychczas przytoczonych, ułożenie w węzownię części składających kwiat (jakoto: listeczków kielicha, płatków, pręcików, owoczków), jest bardzo wyraźnym; w grzybieniu, gdzie oś nosząca wszystkie te części, jest nadzwyczaj skrócona; powstaje zład różyczka podobna do téj, jaką przedstawia fig. 156; w bobrowniku i tulipowcu, gdzie oś kwiatowa jest bardzo długa, widzimy ułożenie podobne do przedstawionego na fig. 158. Samo już ułożenie to części kwiatowych, wystarcza do wskazania nam pewnego podobieństwa, jakie między nimi a liśćmi zachodzi, jeśli prawdziwa wyżej podane są prawdziwe.

§ 360. W innych kwiatach, ułożenie ich części w węzownię nie jest tak widoczne, a to z wielu przyczyn, z których łatwo sobie zdać sprawę. Powierzchnia, na której siedzą, nie otacza

224. Śródkowa część kwiatu tulipowcu, złożona z owoczków c c, których ogół stanowi słupek. Siedzą one na wyższej części osi a, a pod nimi znajdują się liczne pręciki, z których kilka zostawiono e e, resztę zaś odjęto, i widać tylko małe bliźny po nich, na osi przy a. Pręciki te są podzwiazkowe i odwrócone.


tak długiej osi jak w bobrowniku i tulipowcu, albo nie jest tak szeroką jak w grzybieniu; części te więc skupione na małej przestrzeni osadzone są w punktach zanadto do siebie zbliżonych, aby można było dostatecznie ocenić ich względne położenie, albo też aby zachowywały ściśle to położenie przy nierównym często rozwijaniu się. Zdarza się tu na małą stopę to samo, co na wielką widzimy, np. w plantacjach: jeśli drzewa są dostatecznie od siebie odległe, łatwo będzie z pierwszego wejrzenia poznać ich rozkład; jeśli są skupione jak w szkółce lub w lesie, trudno go będzie dojść, choćby nawet drzewa osadzone były prawidłowo; z czasem nawet wszelka prawidłowość zniknąć może, ponieważ z pomiędzy tych drzew, szczególnie jeśli należą do różnych rodzajów, jedne przerosną, odpczną albo wcale sflumią drugie.

Wreszcie, powierzchnia, na której siedzą listeczki kwiatowe, niezawsze jest zupełnie kształtną, np. walcową, stożkową lub kulistą; to zaś może pociągnąć za sobą nieprawidłowość w stosunkach ułożenia tych części względem siebie.

W powyższych przykładach, wielka mnogość części kwiatowych siedzących na obszerniej i prawidłowo rozwiniętej powierzchni, dozwalała dostrzedz łatwo licznych wężownic powrotnych, z których można było wnosić o istnieniu jednej, pierwotnej wężownicy (§ 159). Lecz przypuśćmy, że w jednym nawet z tych samych przykładów, w kwiecie tulipowcu, chodzi nam jedynie o porównanie położenia względem siebie tylko 5 pręcików, lub 5 owoców niższych; z trudnością przyszłoby nam pochwycić małe różnice wysokości, istniejące pomiędzy punktami ich osady, i wszystkie pięć wydałyby nam się raczej jakby ułożone w jeden okrąg. Toż samo właśnie widzimy w mnóstwie kwiatów, które z mniej części się składają, niż w przykładach przywiedzionych. Owocki znajdując się w bardzo małej liczbie, zdają się wychodzić z tej samej wysokości; pręciki w podobnym razie, stoją na pozór w jednym około nich okręgu; płatki i listeczki kielicha w dwóch innych, spółśrodkowych okręgach. Raz, można jeszcze rozeznąć, za pomocą pewnych znaków, o których będziemy mówić poniżej, małe nierówności w wysokościach odnośnych listeczków jednego przyrodzenia; innym razem nierówność taka nie istnieje wcale, a części kwiatowe wchodzą w zakres liści prawdziwie okółkowych. Ponieważ zaś w jednym i drugim razie posiadają pra-

wie jednakowy pozór, uważano je za ułożone rzeczywiście w *okółki* (verticilli), i zgodzono się, aby tém imieniem oznaczać skupienia rozmaitych narzędzi, któreśmy wymienili w kwiecie. Kwiat zupełny składać się będzie z czterech-okołków: kielichowego, płatkowego, pręcikowego i owockowego, któryto ostatni stanowi słupek.

§ 361. Jeśli kwiat jest dokładnie kształtny a zarazem i zupełny, każdy z tych różnych okółków będzie posiadał równą liczbę części, i wtedy łatwo jest dostrzedz u nich owego prawa, któreśmy uważali za powszechne w stosunkach liści, dwóch ponad sobą leżących okółków; prawa naprzemianległości części jednego, względem części drugiego okółka (§ 164). Okażemy to na przykładzie. Kwiat gruboszu (np. *Crassula lucida*, *rubens* i t. d.) [fig. 225, 235], przedstawia: 1° kielich złożony z pięciu działek zielonych; równych, ułożonych w okrąg (fig. 225, *cc*); 2° koronę o pięciu płatkach *pp* różowawych i dłuższych, wychodzących z okręgu nieco bardziej wewnątrznego, w pięciu odstępach oddzielających pięć działek kielicha; 3° pięć pręcików *eee* umieszczonych w odstępach płatków, a przeto wprost naprzeciw działek; 4° pięć owocków *oo* ułożonych w gwiazdkę, naprzemianległych względem pręcików, a przeto umieszczonych naprzeciw płatków.



Dodajmy jeszcze, że owocki te mogą nam dać daleko lepsze wyobrażenie o liściowatém przyrodzeniu tych narzędzi, niż wszystkie wprzód przytoczone przykłady. Każden z nich ma postać listka zgiętego, obróconego nerwem głównym na zewnątrz, a obu brzegami na wewnątrz; brzegi te dotykają się i są połączone w czasie kwitnienia, później zaś oddzielają się od siebie. Tak więc w okółkach złożonych z równej liczby części, takowe leżą naprzemian względem części okółków sąsiednich, a naprzeciw części każdego trzeciego okółka: jestto

225. Kwiat czerwonego. — *cc* Listeczki kielicha. — *pp* Płatki. — *eee* Pręciki. — *oo* Owocki, z których każdemu odpowiada na zewnątrz małeńki przysadek *a* w postaci łuski. — Zarys przecięcia poziomego tegoż kwiatu (*diagramma*), pokazuje figura 234.

prawo  
niają

§

cy z

co d

jest

ukaz

wieni

część

w roś

może

tullip

ksze

drug

ka o

p'p'

umies

wewn

wzgl

ją ni

pręc

wzgl

dale

civil

ka,

owo

wzg

Wz

ków

dwó

§

posi

licz

szcz

22

Trzy

wnętr


nych.

o Zaw

233,

prawo właściwe liściom prawdziwym, tudzież tym, które zmieniając się, wchodzą w skład kwiatu.

§ 362. Przy zdumiewającej rozmaitości kwiatów, tylu tysięcy znanych roślin, spodziewać się można niezmiernej różnicy co do liczby części składających okółki kwiatowe; i tak też jest w rzeczy samej. Jednakże z pomiędzy tych liczb, dwie ukazują się najpospoliciej: pięć i trzy; godnym zaś zastanowienia jest, że pierwszą z tych liczb napotykamy w większej części roślin dwuliściennych, drugą daleko jeszcze zwykłej w roślinach jednoliściennych. Kwiat gruboszu opisany powyżej, może być uważany za wzór pierwszych; kwiat lilji (fig. 248), tulipanu, cebulic (fig. 226) i większej części liljowatych, za wzór drugich. Ten ostatni składa się z okółka o trzech listeczkach (fig. 226  $p' p' p'$ ), z trzech innych ( $p'' p'' p''$ ) umieszczonych na okręgu bardziej wewnętrznym, naprzemianległych względem pierwszych, z którymi mają niejaki podobieństwo, z trzech pręcików ( $e'$ ) naprzeciwległych względem listeczków pierwszych, dalej z trzech innych ( $e''$ ) naprzeciwległych względem drugiego okółka,



226.

ka, a przeto cokolwiek wewnętrznieszych; nakoniec z trzech owoców ( $o$ ) zrosniętych w środku kwiatu, naprzemianległych względem wewnętrznieszego okółka listeczków i pręcików. Wzór ten może przeto być uważanym za złożony z pięciu okółków trójkowych, to jest dwóch okółków listeczków kielicha, dwóch pręcikowych i jednego owocowego.

§ 363. Zrosnięcia części kwiatowych. — Dwa kwiaty, posiadające równą ilość okółków, złożonych także z równej liczby części, mogą wszelako różnić się od siebie w wielu jeszcze względach, jakoto: co do wielkości, postaci, barwy.

226. Kwiat cebulicy włoskiej (*Scilla italica*) widziany z góry. —  $p' p' p'$  Trzy zewnętrzne listeczki okwiatu. —  $p'' p'' p''$  Trzy listeczki tegoż wewnętrzne. —  $e'$  Pręciki naprzeciwległe względem pierwszych czyli zewnętrznych. —  $e''$  Pręciki naprzeciwległe względem drugich czyli wewnętrznych. —  $o$  Zawiązki zrosnięte w jedno. —  $s$  Trzy szyjki zlane w jedno. — Na fig. 233, 1, widzieć można plan kwiatu podobnego.

Jednym z piętn spowodowujących największą rozmaitość, jest zrosnięcie z sobą narządzi sąsiednich, w skutek czego takowe, zamiast wielu części oddzielnych, zdają się tworzyć jedną tylko. W kwiatach powyżej przytoczonych, pomimo że staraliśmy się wybrać takie, którychby wszystkie części były niezależne od siebie, tak jak liście gałązki, spotkaliśmy jednak kilka takowych złączeń, jakoto zrosnięcie owoców grzybieniu i cebulicy, tak, że słupek stanowi ciało na pozór pojedyncze; dalej zrosnięcie listeczków kielichowych gruboszu, które tworzą przy podstawie jakby miseczkę. Te rodzaje zrosnięć istnieją często, czyto na jednym punkcie, czy na dwóch, czy na wielu zarazem. Przejrzyjmy ogółowo główne odmiany, jakie ztąd powstać mogą.

§ 364. Zrosnięcie może nastąpić pomiędzy częściami jednego okółka, i to, jak się łatwo można domyśleć, w różnym stopniu, przez co części te albo się zupełnie z sobą zlewają, albo też pozostają mniej lub więcej przy swój niezależności. W ten sposób mogą się np. części kielicha lub płatki korony zrosnąć z sobą brzegami aż do pewnej wysokości. Wtedy mówimy, że kielich jest *jednolisteczkowy* (calyx monophyllus) [nazwa, której użyliśmy już wyżej w podobnym razie dla przykwiatków składających pokrywę § 231]; że korona jest *jednopłatkowa* (corolla monopetala), w przeciwie z nazwami: *wielolisteczkowy*, *wielopłatkowy* (polyphyllus, polypetalus) używanymi na oznaczenie stanu, w którym listeczki lub płatki, istniejąc w znacznej liczbie w kielichu lub koronie, są zupełnie oddzielne i niezależne. Ganiono słusznie pierwsze z tych nazwisk, które według źródłosłowa swego (*μῦνος*, sam jeden), zdają się mówić, że jeden tylko mamy listeczek, jeden płatek w tym razie. Lecz wyrazy te są tak oddawna, i tak ogólnie przyjęte, iż lepiej je zatrzymać, pomnąc tylko, że kielich lub korona, tym sposobem oznaczona, składa się nie z jednej, lecz z wielu części zrosniętych z sobą w jedno. Zalecano na miejsce powyższych, wyrazy: *zrostolisteczkowy*, *zrostopłatkowy* (gamophyllus, gamopetalus) [wyprowadzone od *γάμος*, wesele, połączenie]; lecz oprócz niedogodności podstawiania imion nowych za imiona powszechnie używane, nie uniknęlibyśmy przez to całkowicie zarzutu niedokładności, jak się o tém przekonamy, śledząc rozwijanie się tych części (§ 421). W ogóle dobrze jest zatrzymywać ile możności dawne imiona,

określając je tylko należyście, przez co zniknie wada ich niedokładności.

§ 365. Zrośnięcie może nastąpić pomiędzy pręcikami. Jeśli takowe są szerokie, nakształt płatków, mogą się łączyć z sobą podobnież brzegami swemi (fig. 272); lecz częściej bywają zwężone w nitki, które wtedy tylko mogą się zetknąć i zrosnąć z sobą, kiedy są bardzo liczne; zléwają się też często w takim razie, nie już w jeden walec, ale w wiele oddzielnych wiązek (*adelphía*, ἀδελφεία, bratni, fig. 238, 322).

§ 366. Nakoniec zrośnięcie może jeszcze istnieć pomiędzy częściami okółka najwewnętrzniejszego, to jest pomiędzy owockami; a ponieważ wtedy nie widać ich brzegów, lecz tylko same powierzchnie i ponieważ one zajmują sam środek kwiatu, przeto ciało powstające z tego złączenia, jest bryłą daleko na pozór prostszą niż przyrządy wynikające ze złączenia innych okółków.

§ 367. Jasną jest rzeczą, że wszystkie te zrośnięcia, im są zupełniejsze, tém bardziej zakrywają liściowate przyrodzenie części. Tam, gdzie części te są zupełnie wolne, łatwo jest rozpoznać liście; osobliwie jeśli umieszczone będąc w różnych wysokościach, okazują ułożenie w węzownię, przez sposób w jaki się nawzajem pokrywają; np. w listeczkach kielichowych ciemierniku (*Helleborus*) lub kamelji (fig. 248 c). Jeśli zrośnięte będąc podstawami, pozostają oddzielonemi u góry, można jeszcze, lubo z większą trudnością rozpoznać w nich liście, jak np. w kielichu ogóreczniku (*Borrago*). Wnosimy zaś o tém tylko przez analogją, skoro złączone są w większej albo w całej rozległości swych brzegów, tak, iż tworzą rurkę (kielich goździku, fig. 262, 2, c; szelązku [*Rhinanthus*]), albo rodzaj miseczki (kielich pomarańczy).

§ 368. Zrośnięcia muszą być tém częstsze, im części jednego okółka, są bardziej skupione, czyto że one same są szersze, czy też że miejsce, dla nich przeznaczone, jest szczuplejsze. Rozumié się więc, że pręciki o nitkach rozszerzonych, częściej zrastają się z sobą, niż posiadające nitki zwężone; że pręciki w ogóle rzadziej zrastają się z sobą, niż płatki, które zwykle są daleko szersze; że przeciwnie owocki zwykle grubsze od innych części, skupione nadto w okrąg znacznie mniejszy w środku kwiatu, zrastają się daleko pospoliciéj, jeśli tylko oś nie wydłuża się lub nie rozszerza dostatecznie; że im oś jest

krótsza i cieńsza, tém większą dążność zrastania się okazują okółki z niej wychodzące, przy równych zkadinał wymiarach.

§ 369. Nietylko pomiędzy częściami jednego okółka, ale i pomiędzy częściami dwóch odrębnych okółków może zająć zrośnięcie, a to pod wpływem przyczyn podobnych do tych, któreśmy właśnie wyłuszczyli. Zwykle części te zrastają się z sobą u spodu, gdzie rozwijaniu ich daleko mniejszy obręb jest zostawiony. Tym sposobem okółki kwiatowe mogą się zrazać z sobą po dwa (korona z kielichem lub pręcikami), po trzy (kielich, korona i pręciki) i po cztery. Ostatni ten przypadek musi istnieć wtedy, kiedy kielich zrośnie się ze słupkiem, ponieważ spód pręcików i płatków, leżących w podziale, jest oczywiście objęty w tém zrośnięciu. Rzadko jednakże nadzwyczaj, aby słupek wchodził do zrośnięcia, do któregooby nie należał kielich, jak np. do zrośnięcia z pręcikami (*Nymphaea alba*), albo zarazem i z płatkami (*Raspalia*), chociaż same te przykłady pokazują, że połączenie takowe może istnieć.


§ 370. Kiedy kilka odrębnych okółków łączy się z sobą, części każdego z tych okółków muszą się także zrastać nawzajem; jestto koniecznie nieledwie następstwo, prawa naprzemianległości jednego okółka, względem drugiego. Jeśli części dwóch odrębnych okółków, A i B leżą naprzemian względem siebie, przeto, którakolwiek z części B przypadając pomiędzy dwiema częściami okółka A, nie będzie mogła zrosnąć się z niemi, nie łącząc ich samych z sobą, choćby nawet nie były wprzód już bezpośrednio złączone. Łatwo jednak pojąć, że mogą tu zająć wyjątki, wtedy, jeśliby część ta B, łącząc się jedną stroną z jedną z części A, zostawała z drugiej niezrośniętą, co się wprawdzie rzadko, ale jednakże wydarza (np. w rodzinie *Olacineae*). Częściej widzieć można, że pojedyncze narzędzia jednego okółka przypadają naprzeciw narzędzi okółka sąsiedniego, czyto w skutek pozornego zboczenia od praw uszykowania, któryto punkt wyjaśnimy niżej, czy też w skutek podwojenia części jednego z okółków; w tym razie części umieszczone naprzeciw siebie, mogą się zrastać z sobą, a pozostać odosobnionemi od leżących z prawej i lewej strony. Napotykamy to często w płatkach i pręcikach przypadających naprzeciw siebie (*Statice armeria*, *Agrostemma githago* i wiele innych goździkowatych).

§ 37  
czne.  
których  
trzeba  
w wiel  
ce, utw  
zrośnię  
tych, k  
datność  
rą moż  
(fig. 2  
zrośnię  
bą czę  
dzie z  
śnie od  
się w je

§ 37  
okółki  
tkanki  
złożona  
znacza  
tworzy  
jąc bli  
kiem,  
(recep  
siedzą  
jest ta  
albo t  
okółkó  
(pomie  
wychod  
pod ty  
wyraste  
jego w  
mniej l

227.  
przedsta  
przyrośn  
mocowar  
tkanką.

§ 371. Po większej części ślady zrośnięcia pozostają widoczne. Narzędzia dają się rozoznać, lubo są złączone; w niektórych nawet przypadkach niewiele potrzeba, aby zniszczyć te złączenia. Tak, w wielu koronach jednopłatkowych, na rurce, utworzonej przez części niższe płatków zrośniętych, widać nitki pręcików przywarłych, które odbijają wyraźnie, dla swęj wydatności i barwy częstokroć odmiennęj, a którą można śledzić aż po sam koniec rurki (fig. 227, *f*; 326, *i*). Innym razem ślady zrośnięcia znikają z dwóch złączonych z sobą części, wewnątrzniejsza zdaje się wychodzić z drugieję w punkcie, w którym się właśnie od niej uwalnia, a pod którym tkanki obudwóch zlewają się w jedno.




§ 372. Ale często także na całej przestrzeni, w której dwa okółki są zrośnięte, spostrzegamy osobną tkankę różną od tkanki części obu okółków, i pospolicie gruczołową, to jest złożoną z małych, ściśniętych i gęstych komórek, jakeimi odznacza się wiele gruczołów: dość nawet często tkanka ta tworzy u góry wyniosłość lub jakby pierścień wydatny. Badając bliżej powierzchnię zawartą pomiędzy kielichem a słupkiem, — powierzchnię, którą dawnieję nazywano *osadnikiem* (receptaculum), a teraz *dnem* (torus) kwiatowem, i na której siedzą narzędzia kwiatu, — spostrzegamy, że często powleczone jest takową tkanką, tworzącą albo blaszkę powierzchnną, albo też posiadającą spóśrodkowe wyniosłości, nakształt okółków. Z wydatności tych rozmaite noszących nazwiska (pomiędzy innymi dosyć pospolite nazwisko *krążka* [discus]), wychodzą zwykle części odpowiedniego okółka; możnaby ją pod tym względem porównać z sęczkami liści. Okółki mogą wyrastać albo z brzegu wolnego krążka, albo z powierzchni jego wewnętrznej lub zewnętrznej. Może on przedłużyć się mniej lub więcej, a przeto nosić okółki w większej lub mniej-

227. Kawalek korony jednopłatkowę *p* gatunku pieszczotki (*Collomia*), przedstawiający pasek rurki *t* zakończony dwiema łatkami kraju *z*, do niego przyrośnięty jak pręcik *f*, którego nitka wolna począwszy od punktu przymocowania *i* daje się śledzić aż do sameję podstawy rurki zrośnięteję z jej tkanką.

szój odległości od powierzchni dna. Może być, mniej lub bardziej grubym, i wypełniać przestrzeń, często dość szczupłą, oddzielającą dwa okółki, stając się zarazem środkiem łączącym je najczęściej z sobą. Dlatego właśnie tkankę jego tak często można znaleźć w miejscu zrośnięcia się okółków, np. kielicha z okółkami wewnętrznymi, słupka z okółkami zewnętrznymi względem niego. Wtedy zrośnięcie zachodzi nie u spodu płatków lub pręcików, ale na krążku, który je podnosi i służy mu niejako za podstawę.

§ 373. **Osadzenie części kwiatowych.** — Poprzedzając fakta, które jak widzieliśmy, zmieniają pozorny punkt wyjścia okółków kwiatowych, jednych względem drugich, wynikają z różnic łatwych do pochwycenia, a ważnych przy rozszczęgólnianiu różnych kształtów kwiatu. Ponieważ każdy okółek zdaje się zaczynać w punkcie, w którym się odosabia od okółków sąsiednich; ponieważ kiedy go od zewnątrz uważamy, zdaje się być przytwierdzonym w wysokości odpowiedniej, na osi głównej, która nosi kwiat, nazwano więc *piętnami osadzenia* (insertio), piętna wynikające z tych rozmaitych stosunków, w jakich zostają względem siebie okółki kwiatowe, niezrośnięte, lub zrośnięte z sobą w różnym stopniu przy podstawie i w mniejszej albo większej rozległości. Szczególniej starano się oznaczyć stosunek pręcików i słupka (części, jak zaraz zobaczymy, najistotniejszych kwiatu), za pomocą nazwisk wyrażających te różne rodzaje osadzenia. Jeśli pręciki są zrośnięte z koroną, zowią się *napiatkowemi* (St. epipetala), i wtedy, osadzenie obudwu okółków uważa się za jedno, tak bowiem jest rzeczywiście, uważając je względem reszty kwiatu. Kiedy pręciki czyto złączone z koroną, czy nie, nie zrastają się obok tego ani z kielichem, ani ze słupkiem, oczywiście, że muszą być przytwierdzone na dnie kwiatowém, pod słupkiem (fig. 228), i wtedy zowią się *podzawiązkowemi* (St. hypogyna; od ὑπό, pod). Jeśli siedzą na kielichu (fig. 229), wyniesione do pewnej wysokości ponad spód słupka, a położenie ich będzie względem niego nie dolnem, ale boczném; zowią się *kołozawiązkowemi* (perigyna; od περί, około). Nakoniec jeśli przytwierdzone są na samym zawiązku (fig. 230), zowią się *nazawiązkowemi* (epigyna, od ἐπί, na). Widzieliśmy (§ 368), że w tym ostatnim przypadku, zwykle cztery okółki zrastają się w części z sobą, a przeto pręciki, osadzone są zarazem na

kielich  
dwom  
nowic  
(Caly  
przyp  
kielich  
rych  
(thala  
jedne  
zwane



§  
moga  
które  
winny  
czase  
sunkó


228  
wych  
ciki.—

228  
Płatki

229  
Słupek

230.  
ciki są  
go cal  
pokaza

kielichu i na słupku, zkad niektórzy wahają się pomiędzy temi dwoma rodzajami osadzenia, a nawet mieszają je z sobą, mianowicie też De Candolle, który nazywa *kielicho-kwiatowemi* (Calyciflorae), zarówno rośliny z kwiatami będącemi w tym przypadku i rośliny, których pręciki osadzone są wprost na kielichu; *korono-kwiatowemi* (corolliflorae), rośliny, w których pręciki osadzone są na koronie; *denno-kwiatowemi* (thalamiflorae), rośliny, których okółki kwiatowe niezależne jedno od drugich, przytwierdzone są bezpośrednio do dna, zwanego niekiedy *łożem* (thalamus).



§ 373 bis. Widzieliśmy właśnie, że rozmaite okółki kwiatu, mogą być mniej więcej od siebie oddalone, w skutek zrosnąć, które je wynoszą ponad miejsce, jakie w zwykłym stanie powinnyby zajmować na osi; jednakże mogą one oddalać się czasem od siebie przy zachowaniu nawet zwykłych z osią stosunków, a to wtedy, kiedy właśnie oś przedłuża się bardzo

228—230. Trzy kwiaty przetrzyte pionowo, dla okazania trzech głównych rodzajów przytwierdzenia pręcików. — c Kielich. — p Płatki. — e Pręciki. — Słupek złożony z zawiązka o, z szyjki i znamienia s. — t Dno.

228. Przeciecie kwiatu bodziszku śmierdzącego (*Geranium robertianum*). Płatki i pręciki są podzawiazkowe, a ostatnie są zarazem jednowiazkowe.


229. Przeciecie kwiatu migdału. Płatki i pręciki są kołozawiazkowe. Słupek wolny jak w przypadku poprzedzającym.

230. Przeciecie kwiatu dzięgielawy ciernistej (*Aralia spinosa*). Płatki i pręciki są nazawiazkowe, osadzone na obwodzie dużego krążka d, pokrywającego cały wierzch zawiązka. — Ten jest zrosły z kielichem i przecięty dla pokazania komór i zalążków wiszących, które się w tychże znajdują.

znacznie, chociaż nosi na sobie małą tylko ilość części. Okółki zostają przez to oddalone od siebie i przypadają tém wyżej, im, w zwyczajnym kwiecie, o dnie płaskiem lub mało wyniosłym przypadająby bardziej na wewnątrz. Rodzina kaparowatych (fig. 231) przedstawia uderzające przykłady takiego przedłużenia: płatki *p* stoją prawie w jednej wysokości z kielichem *c*, lecz słupek *c* siedzi na końcu długiego trzonka *ag*, który się ponad kwiat wznosi, i jest właśnie osią przedłużoną, a na którym pręciki *e* mogą także dosyć wysoko być osadzone. W goździkowatych (fig. 232), można dość często widzieć, że oś po wydaniu okółka kielichowego *c*, przedłuża się jeszcze nieco, zanim da początek okółkom następnym, które przeto są wyniesione na trzonku *g* mniejszej lub większej długości. Jasną jest rzeczą, iż piętrowe to rozłożenie okółków, w niczém



231.



232.

231. Kwiat jednej z kaparowatych (*Gynandropsis palmipes*). — *c* Kielich. — *p* Płatki. — *e* Pręciki. — *ag'* Trzonek pręcikowy (*Gonophorum*), czyli międzywęźle osi noszące u wierzchołka pręciki. — *ag''* Trzonek słupkowy (*Gynophorum*), czyli międzywęźle noszące słupek. — *s* Słupek złożony z zawiązka *o*, szyjki i znamienia *s*.

232. Kwiat jednej z goździkowatych (*Lychnis viscaria*), przecięty wzdłuż dla pokazania stosunku jego części. — *c* Kielich. — *p* Płatki o paznokciu długim *u* i o kraju *l*; przysadek *a*, który się znajduje na punkcie ich połączenia. — *e* Pręciki. — *o* Zawiązek, na którym pięć szyjek *s*, które wraz z nim stanowią słupek. — *g* Przedłużenie osi noszące na sobie płatki, pręciki i słupek (radzono nazwać je kwiatotrzonem [*antophorum*]).

nie zmienia istotnych stosunków przytwierdzenia części; czyni ono owszem wydatniejszym jeszcze osadzenie podzawiazkowe w przytoczonych przykładach.

Podawano wiele słów na oznaczenie tych międzywęzłów kwiatowych, podług tego jak takowe noszą na sobie płatki, pręciki, owocki, lub kilka tych okółków na raz. Nazwa ogólna *trzonka* (*stipes*), której niegdyś używano we wszystkich tych przypadkach; zdaje się być zupełnie wystarczającą, równie jak wyraz *os*, z dodaniem stosownego przymiotnika, podług długości, grubości, postaci lub kierunku międzywęzła. Najczęstszym jest trzonek wywyższający słupki ponad inne okółki, i on może najbardziej zasługuje na osobną nazwę (§ 483).

§ 374. **Liczba części kwiatowych.** — Wszystkie te połączenia i rozmaite stopnie, jakie każde z nich przedstawiać może, dostarczają nam już pewnej liczby piętn, za pomocą których możemy odróżnić od siebie wiele kwiatów. Jednakże dotąd przypuszczaliśmy ciągle, stałą liczbę okółków i części je składających, wspominając o jednej tylko znacznej różnicy w tym względzie, jaka zachodzi pomiędzy jednoliścinnymi, których kwiat składały się, podług tego z pięciu okółków trójkowych (fig. 226 i 233), — a dwuliścinnymi, których kwiat posiadały cztery okółki, każdy o pięciu częściach (fig. 225 i 234). Ale obok tych dwóch wzorów (typów) mogących nam za punkt wyjścia posłużyć, znajduje się nieprzeliczone mnóstwo odmian, o których nam tu właśnie mówić wypada. Można je wszystkie podzielić na dwa wielkie rzędy: albo liczby pomienione powiększają się w skutek przybycia części nowych, albo też zmniejszają się, przez ubycie kilku części. — Rozbierzmy z kolei te dwie ważne odmiany.

§ 375. **Powiększenie się liczby części kwiatowych.** — Liczba okółków może pozostać ta sama, a liczba ich części powiększa się jednakowo w każdym okółku. Tak porównyując z przykładem któryśmy wzięli za wzór kwiatu dwuliścinnych, z kwiatem gruboszu (fig. 234), kwiat rojniku (*Semprevivum*), rodzaju blisko z tamtym pokrewnego, a to w gatunku rosnącym pospolicie na murach (*Semp. tectorum*), obaczmy, że w każdym okółku, do pięciu części, które takowy posiada w gruboszu, przybywa ich tu 1 — 4 przez co ogół ich może wzrosnąć do 9. W innych gatunkach tegoż samego rodzaju, liczba ta roślinie jeszcze bardziej, znajdują się bowiem także,

w których dochodzi do dwudziestu, a przeto powiększyła się 4 razy w każdym okółku i w ogóle w całym kwiecie.



licha lub korony: mówimy w tym razie że kwiaty są *dwakroć-pręcikowe* (Fl. diplostemones; od διπλῶς, dwukrotny, στήμων, pręcik); nazwać je można *tyłoż-pręcikowemi* (Fl. isostemones; od ἴσος, równy), jeśli liczba pręcików była równa liczbie płatków.

233—236. Zarysy poziomych przecięć różnych kwiatów, czyli oznaczenie na płaszczyźnie względnej położenia części kwiatów zamkniętych jeszcze lub tylko co otworzonych. W tych i we wszystkich następnych zarysach, użyto jednakowych figur na oznaczenie jednakowych części, jakoto: 1<sup>o</sup> linii podwójnej *c* za listeczki lub działki bądź kielicha dwuliściennych (fig. 234), bądź okwiatu jednoliściennych (fig. 233); 2<sup>o</sup> linii pojedynczej *p* za płatki lub podziałki korony; 3<sup>o</sup> kółeczek pojedynczych za pręciki o pylnikach jednoworeczkowych; dwóch stykających się kółek za pręcik *e* o pylnikach dwuworeczkowych, — albo częścię połączenia tych kółek mającego postać nerki; 4<sup>o</sup> owalu obróconego węższym końcem do środka za owoc *o*, — albo dużego koła za zawiązek złożony zrosniętych z sobą owoców (fig. 250). — Małe przysadki *a* znajdują się tu i owdzie i oznaczone są punkcikami lub kręskami.

233. Zarys kwiatu z *Ornithogalum pyrenaicum*.

234. — — z *Crassula rubens*.

235. — — z *Sedum telephium*.


236. — — z *Coriaria myrtifolia*.

Liczba wszelako pręcików może się podwoić, chociaż nawet liczba okółków nie nie pomnoży się rzeczywiście. Objasnijmy to przykładami: Kwiat skąpi (*Coriaria myrtifolia*, fig. 236) posiada pięć listeczków kielichowych, pięć płateczków krótkich i grubych, naprzemianległych z tamtymi, dalej dziesięć pręcików w dwóch okółkach, z których zewnętrzny przypada naprzeciw kielicha, wewnętrzny naprzeciw płatków, nakoniec pięć owoców naprzemianległych względem tychże; przybył nam zatem jeden okółek pręcików, pomiędzy pięciu pierwszymi a owocami, które inaczej byłyby przypadły naprzeciw płatków. Prawidło ogólne nie zostało tu zmienione, okółki bowiem kolejno zachowują swoją naprzemianległość. Porównajmy z tém kwiat rozchodniku (fig. 235) podobny do kwiatu gruboszu (fig. 234); od którego różni się tylko przybyciem jednego jeszcze okręgu złożonego z pięciu pręcików, zatem przedstawia napozór też samą liczbę okółków i pojedynczych części, co kwiat skąpi. Jednakże śledząc bliżej położenie względne jego części, spostrzeżemy, że z dziesięciu pręcików, pięć zewnętrzniejszych leży wprost naprzeciw płatków, z którymi nawet zrastają się u dołu. Tym sposobem miałbyśmy dwa z kolei po sobie następujące okółki naprzeciwległe, co się przeciwi prawidłu. Musimy więc zastanowić się, czy w istocie mamy przed sobą dwa okółki, lub czyli nie powinniśmy ich raczej uważać za jeden tylko o podwojonej liczbie części, tak, że przez to, kwiat dałby się odnieść do pierwszego wzoru, który się składa z okółka pięciu listeczków kielichowych, z okółka 5 płatków, 5 pręcików i 5 owoców; tylko że w tym razie każdy płatek byłby podwojonym przez pręcik. Wniosek ten daje się usprawiedliwić, nietylko uwagą ową, którą powtórzyliśmy już nieraz, tojest: że najpewniejszym przewodnikiem przy oznaczaniu istotnego przyrodzenia części roślinnych, tak zmiennych co do swój postaci, jest właśnie oznaczenie stosunków stałych ich ułożenia; ale nadto jeszcze częstotnością zjawiska, o którym zaraz mówić będziemy, zjawiska rozdwojenia się narzędzi roślinnych.

§ 376 bis. Pomnożenie części kwiatowych w skutek powiększenia się liczby okółków, niezawsze ogranicza się na tém, iż jeden albo kilka takowych podwoi się; każdy z nich może bowiem stać się potrójnym, poczwórnym, i t. d. Najczęściej daje się to spostrzedz na pręcikach, rzadziej daleko na

kielichu i koronie, a jeszcze rzadziej na słupku. Lecz w ogóle, kiedy liczba wzrasta bardzo, części nie układają się już w okółki prawidłowo naprzemianległe względem siebie; najpospolitsze ułożenie liści okółkowych, ułożenie w wężownicę, ukazuje się na dnie, bądź rozpłaszczoném, bądź téż wydłużoném w oś. Widzieliśmy to już na płatkach i pręcikach grzybieniu, na owocach bobrowniku, i toż samo widzieć można w kwiatach wielu jaskrowatych, w kwiatach cierniów, kamelji, i t. d., i t. d.

§ 377. **Przez rozdzielenie.** — Części kwiatowe pomnażać się mogą innym jeszcze sposobem. Uważając w kwiecie jaskru spód każdego płatka od wewnątrz, spostrzeżemy, iż z niego wychodzi ciało posiadające taką samą barwę i podobną tkankę, a które jest jakby zagięciem tegoż płatka (fig. 237, a). W kwiatach gruboszu, rozchodniku, rojniku, któreśmy wyżej przytaczali, daje się spostrzedz od zewnątrz i u spodu każdego owoka, mała zielonawa łuska (fig. 225, a) przytwierdzona do jednego z nim miejsca, i jakby należąca do niego. Zdaje się, że w obudwu razach, z pomiędzy wiązek naczynnych przeznaczonych do utworzenia płatków lub owoców, niektóre odłączają się dla uistoczenia czyto na zewnątrz, czy na wewnątrz małych tych przypadkowych ciałek. Wystawmy sobie teraz, że ciała te, nie przestają na tak małych wymiarach i rozwiną się tak dalece, iż wyró-



237.

wnywają prawie częściom kwiatu, z którymi są zrosnięte, a które w skutek tego staną się niejako podwójnemi, jak np. płatki w rodzaju *Erythroxylon*. Płatki wielu mydleńcowatych, goździkowatych *Silene*, *Lychnis* [fig. 298 i 265 a], *Cucubalus*, przedstawiają coś podobnego w zagięciu, które podwaja część wewnętrzną ich powierzchni. Ten rodzaj utworów nazwano *rozdzieleniem* lub *rozszczerpieniem* (choriza; od χωρίζω, rozdzielać); zdaje się, że w wielu razach, pomnożenie się części kwiatu niezależące od przybycia nowych okółków, zależy właśnie od téj przyczyny.

W skutek podobnego rozszczerpienia, może powstać na miejscu jednej części, nietylko jak już widzieliśmy, dwie ale i więcej

237. Płatek ziarnopłonu (*Ficaria ranunculoides*), widziany od wewnątrz.  
— l Kraj. — a Mały przysadek u spodu.

daleko. Tak, w kwiatach rodzaju *Luhea* (fig. 235) zamiast pięciu pręcików, leżących naprzemian względem płatków, znajdujemy pięć wiązek, z których każda składa się z wielu pręcików; kwiaty niektórych mirtowatych mają pięć tylko



238.

pręcików, niektóre zaś np. czarnobil (*Metaleuca*), posiadają na miejscu ich pięć gęstych kupek pręcików zrosniętych przy nasadzie.

Gdyby pomnożenie to wynikało z pomnożenia się okółków, lub części ułożonych w węzownię, części te powinnyby być rozdzielone na całym pasie leżącym pomiędzy słupkiem a płatkami, nie zaś skupione na pięciu punktach, zostających w stałym stosunku z płatkami. Wniesiono więc raczej, że każda z kupek, odpowiada jednemu z pręcików, które widzieliśmy w pierwszym przypadku, i że ta ich mnogość powstaje przez rozszczepienie. Niektóre dziurawce (*Hypericum*) i niektóre szlazowate (fig. 239), dostarczają przykładów podobnych, a przytém bardziej pospolitych.



239.

238. 1. Kwiat rośliny *Luhea paniculata*. — *c c c* Kielek. — *p p* Płatki. — *s s* Pręciki osadzone kupkami naprzemianległemi względem płatków. — *s* Znamię złożone z pięciu części.

2. Jedna z takich wiązek powiększona. — Widać jak wszystkie nitki zrosnięte są w jedno ciało u spodu a odosobnione wyżej; wewnętrzniejsze *f a* są dłuższe i zakończone pylnikami; zewnętrzniejsze krótsze i płonne, nie noszą bowiem pylników.

239. Jedna z pięciu wiązek pręcików z kwiatu szlazu (*Malva miniata*).

Łatwo teraz zrozumieć dlaczego powyżej uważaliśmy płatek i pręcik tuż przed nim wyrastający, a często nawet zrosnięty z nim u spodu, za podobne rozdwojenie. Wprawdzie części podstawione tym sposobem za jedną, powinny jednakowe z nią posiadać przyrodzenie. Lecz, że ścisły związek zachodzi pomiędzy przyrodzeniem płatków a pręcików, wykaże się to zaraz, skoro takowe bliżej rozbierzemy, a nawet łatwo się tego domyślić, widząc jak nieznacznie prawie jedne w drugie przechodzą w grzybieniu (§ 356).

We wszystkich poprzednich przykładach, części rozdwojone leżały na odmiennych płaszczyznach, jedne pod drugimi; lecz mogą także wyrastać na jednej i tejże samej płaszczyźnie, to jest obok siebie. Kwiat łączniu (*Butomus umbellatus*, fig. 240) przedstawia od zewnątrz ku wewnątrz, najprzód okółek



240.

z trzech listeczków kielicha, dalej okółek z trzech innych, wewnętrznějších i barwnych; okrąg z sześciu pręcików leżących po dwa naprzeciw listeczków kielicha, drugi okrąg z trzech pręcików, naprzemianległych względem tychże listeczków, nakoniec sześć owoców. Widoznaną jest, że w okręgu złożonym z sześciu pręcików, każda para zajmuje miejsce pojedynczego pręcika w przypadkach zwyczajnych. Zamiast więc jednego, mamy ich tu dwa, leżące obok siebie, a to w skutek rozdwojenia, które możnaby nazwać boczném, a o którym przekonywamy się widząc, jak tu, okółek dokładny o liczbie części wielokrotnej, względem części innego okółka. W sitowen liczba owoców wynosi sześć zamiast trzech, jak to zwykle bywa w kwiatach jednoliściennych; lecz z tych sześciu, trzy leżą bardziej ku wewnątrz i naprzemian względem innych. Jestto więc pomnożenie w skutek przybycia nowego okółka, a nie w skutek rozdwojenia.


Trzeba wyznać, że własność rozdwojania się, jaką widzieliśmy w częściach kwiatowych, mało się objawia w liściach właściwych, z którymiśmy je porównali. Wprawdzie coś podobnego przedstawiają nam liście złożone; ponieważ zamiast jednego, ukazują ich się tym sposobem kilka; lecz listeczki jednego liścia leżą na tejże samej płaszczyźnie, a przeto najwięcej jeśli się dadzą porównać z rozdwojeniami bocznemi. Napróżno zaś szukalibyśmy wielu liści wyrastających kupkami

zamiast jednego, tak, jakśmy to widzieli w płatkach lub pręcikach rozszczepionych. Dawniej uważano by może za takie kupki, liście zwane kiedyś wiązkowemi, lecz nowsze postrzeżenia okazały, że liście te należą do całej gałązki i skupione są tylko w skutek nadzwyczajnego skrócenia osi. Niektóre przylistki, to jest tak nazwane kątowe (§ 145), ukazujące się przed liśćmi, do których należą, mogłyby ująć za rozdziwienie, a sposób ten widzenia mógłby być potwierdzonym przez postrzeżenie, iż w rodzaju krasnosoku (*Erythroxyton*) przy nasadzie każdego liścia znajduje się podobny przylistek, a zarazem każdy płatek posiada także płatkowaty przysadek. Lecz fakta te są zbyt nieliczne; zresztą, śledząc rozwijanie się przylistka kąтового, można się przekonać, że takowy powstaje ze zrośnięcia się brzegami dwóch bocznych części, a przeto należy do tej samej płaszczyzny co ogonek.

Częsta zatem obecność rozdziwień stanowi nowe piętno odróżniające części kwiatowe od prawdziwych liści: dlatego też im one bardziej do tych ostatnich są zbliżone w swém przyrodzeniu (jak listeczki kielicha i owocki), tém rzadziej się rozdzwajają; a im się bardziej od nich oddalają (jak płatki a nade-wszystko pręciki), tém przeciwnie częstszym jest ów sposób pomnażania się.

§ 378. **Zmniejszenie liczby części kwiatowych.** — Rozebrawszy różnice, jakie we wzorze kwiatu obranym za punkt ogólnego porównania, sprawić może pomnożenie się części go składających (które to pomnożenie może się dziać w rozmaity sposób), uważmy teraz różnice wynikające z przeciwnej wcale przyczyny, ze zmniejszenia się części kwiatowych.

Przy jednakowej liczbie okółków, liczba części z jakich się takowe składają, może być we wszystkich jednakowo zmniejszoną. Tak ruta zwyczajna (*Ruta graveolens*), u dołu swój jednostronną wierzchnotki, posiada kwiaty z okółkami o pięciu częściach, inne zaś mają ich tylko cztery, jakoto: okótek z 4 listeczków kielicha, okótek z 4 płatków, z których każdy zrośnięty jest z pręcikiem z 4 innych pręcików i z 4 owocków (fig. 242). Samą tylko liczbę cztery znajdujemy we wszystkich kwiatach innego rodzaju z téjże samej rodziny, w rodzaju *Zieria* (fig. 241), gdzie prócz tego wszystkich pręcików jest tylko cztery i to leżących naprzemian względem płatków, w prześlągwie (*Cneorum tricoccum*, fig. 243) liczba ta



• zmniejsza się do 3; mamy bowiem 3 listeczki kielichowe naprzemianległe względem trzech płatków, i 3 owocki, leżące podobnie względem trzech pręcików; do 2 w kwiecie czarnokwitu (*Circaea lutetiana*; fig. 244), gdzie mamy dwa listeczki kielichowe, 2 płatki, 2 pręciki, 2 owocki.

§ 379. Liczba okółków może być zawsze ta sama, liczba zaś części składających jeden lub więcej

z takowych, może się zmniejszyć. Tak, w kwiatach kłococzki (*Staphylea*, fig. 245), które posiadają 5 listeczków kielichowych, 5 płatków, 5 pręcików, a tylko 3 owocki; w kwiatach wielu goździkowatych (*Polycarpon*, *Holosteum*, fig. 246 it. p.) pręciki bywają przywiedzione, do 3 lub 4, przy 5 płatkach i tyluż listeczkach kielichowych; w niecierpku (*Impatiens*, fig. 247) obok 5 owocków, 5 pręcików i pięciu płatków, kielich ma tylko 3 listeczki. Przeciwnie w niektórych nasturecjach (*Tropaeolum pentaphyllum*, fig. 248) obok 5 listeczków kielicha, jest 2 płatki, a jeden tylko w rodzaju *Amorpha*. W jednym kwiecie może być wiele okółków zmniejszonych. Tak w tym samym rodzaju nasturecja (fig. 248), mamy 3 tylko owocki dwa okręgi pręcików, z których zewnętrzny leży naprzeciw płatków; lecz w każdym z tych okręgów niedostaje po jednym pręciku, a przeto jest wszystkich 8 zamiast 10.

§ 380. Ulegaż ta nierówność liczbowa części składających różne okółki kwiatu, pewnym prawom? Jedno przynajmniej

241—244. Zarysy przecięcia poziomego kwiatów kształtnych, w których każdy okółek zmniejszony jest o jedną lub kilka części.

241. Zarys kwiatu z *Zieria*.

242. — — z *Ruta graveolens*.

243. — — z *Oenorum tricoccum*.

244. — — z *Circaea lutetiana*.

prawo  
Im oko  
na któ  
przyw  
części  
się mn  
Oczyw  
dziej ni  
ją stłu  
szych  
leżą. W  
o rów.  
wszyst  
czaj rz  
listecz  
liczne  
wny z  
ściej s  
jeszcz  
my pre  
a nak  
bie cz  
§ 3  
okółk  
jeden  
chow  
jest d  
kwiat  
Tak n  
(*Glauc*  
z kiel  
głych  
245-  
o jedne  
245.  
246.  
247.  
248.  
249-  
których  
ma.—2


prawo odgadnąć się daje z samego już położenia tychże części. Im okółek jest wewnątrzniejszy, tém mniejsze musi być koło, na którym części onego są przytwierdzone, a przeto części te przy rozwijaniu się mniej znajdują miejsca. Oczywiście przeto tém prędzej niektóre z nich zostają stłumione, im do bliższych środka okółków należą. W kwiecie zupełnym, o równej liczbie okółków wszystkich części, nadzwyczaj rzadko się zdarza, aby listeczki kielicha były mniej liczne od płatków, przeciwny zaś przypadek częściej się nieco napotyka; jeszcze częściej mniej mamy pręcików niż płatków, a na koniec bardzo pospolicie owocki nie wyrównują w liczbie częściom okółków zewnętrzniejszych.

§ 381. Nietylko pojedyncze części jednego okółka, ale całe okółki nawet mogą być stłumione. Jeśli z dwóch zewnętrznych jeden tylko pozostaje, to zwykle kielichowy; zniknięcie całkowite korony jest dosyć częstym i wtedy mówimy, że kwiat jest *bezpłatkowy* (fl. apetalus). Tak np. mały kwiatek modrzyku (*Glaux maritima*, fig. 249) składa się z kielicha o pięciu częściach, z pięciu pręcików naprzemianległych z poprzednimi, i ze słupka, który później dzieli się na




245.

246.



247.

248.



249.

250.

245—248. Zarysy kwiatów, których pewne tylko okółki zmniejszone są o jedną lub kilka części, a przeto kwiatów mniej więcej niekształtnych.

245. Zarys kwiatu z *Staphylea pinnata*.

246. — — z *Holosteum umbellatum*.


247. — — z *Impatiens parviflora*.

248. — — z *Tropaeolum pentaphyllum*.

249 — 250. Zarysy dwóch kwiatów nieposiadających okółka korony, których zawiązek jest złożony i o łożysku środkowym — 249. *Glaux maritima*. — 250. *Chenopodium album*.

pięć części przedstawiających pojedyncze owocki. Pospoliciej jednak pręciki przypadają w kwiatkach bezpłatkowych naprzeciw listeczków kielicha, tak jak gdyby pośredni okółek płatkowy istniał rzeczywiście; np. w mączyńcu (*Chenopodium*) [fig. 250] i wielu innych łobodowatych (*Atripliceae*), i t. p. W istocie często wtedy można znaleźć pewien ślad płatków, albo też okółek ten ukazuje się znowu w roślinach bardzo blisko z tamtymi pokrewnych. Niektóre goździkowate przedstawiają takie stłumienie płatków, lubo największa ich część posiada rzeczony okółek; w rodzinie goździeńcowatych (*Paronychiaceae*) tak bardzo zbliżonej do poprzednich, połowa rodzajów opatrzona jest płatkami, druga zaś połowa nie posiada takowych.

§ 382. Innym razem niedostaje kwiatom pręcików albo słupka. Tak np. w kwiatkach obrzydlicu (*Jatropha*), wewnątrz kielicha 5listeczkowego i korony 5płatkowej, raz (fig. 251, 2) znajduje się sam tylko słupek, bez pręcików, drugi raz (fig. 251, 1) 10 pręcików bez słupka. Obaczmy dalej, że słupek, który się następnie zamienia w owoc, i który zawiera zalążki



251.

251. Kwiat meżki (1) i żeński (2) z *Jatropha curcas*. — c Kielich, — p Korona. — e Pręciki zajmujące środek kwiatu 1, z przyczyny stłumienia słupka, a których nie ma w kwiecie 2. — 2. Słupek złożony z zawiązka o, na którym siedzą trzy dwuzębne szyjki s. — a Male przysadki gruczołowe naprzemianległe względem podziałek korony. — Ponad każdym z kwiatów umieszczono jego zarys.

wykształcające się w nasiona, niejako jaja roślinne, ma znaczenie samicy, przeznaczonej podobnie i w zwierzętach do wydawania jaj; że pręciki zapładniają zalążki i mają znaczenie samców. Ztąd słupki bywają pospolicie nazywane narzędziami żeńskimi, pręciki zaś męzkimi, a ogół ich narzędziami płciowemi. Ztąd także mówimy: *kwiaty obupłciowe* (fl. hermaphroditii); to jest te, które zawierają oba rodzaje narzędzi; *k. męskie* (fl. masculi), to jest zawierające same tylko pręciki; *samcownia* (androceum; od *ανρ*, samiec, *οικια*, mieszkanie), to jest ogół pręcików; *kwiaty żeńskie* (fl. feminei), to jest kwiaty posiadające same tylko słupki. Opisaliśmy wyżej (§ 376) kwiat skąpi, jako opatrzone zarazem pręcikami i słupkiem; lecz często na jednym szczepie znajdują się kwiaty, w których słupki albo pręciki są słumione. Kiedy roślina posiada taką mieszaninę kwiatów obupłciowych, męskich i żeńskich, mówimy, że kwiaty są *mieszano-płciowe* (fl. polygami). Jeśli roślina nie posiada wcale kwiatów obupłciowych, tylko raz męskie, drugi raz żeńskie, mówimy, że kwiaty są *osobno-płciowe* (fl. dichli); wtedy samce mogą istnieć na tej samej kępcie co i samice (np. w rączniku, strzałce, i t. d., i t. d., a przeto znajdując się niejako we wspólnym mieszkaniu, dlatego mówimy, że rośliny takie posiadają kwiaty *oddzielno-płciowe* (fl. monoöci; od *μονος*, jeden, *οικια*, dom). Innym razem w konopiach lub szczyrze (*Mercurialis*), jedne kępki posiadają same tylko kwiaty męskie, inne same tylko żeńskie; kwiaty więc zajmują jakby dwa różne mieszkania i zowią się *rozdzielno-płciowemi* (fl. dioöci; od *διοικηται*, mieszkać osobno).

§ 383. Przeznaczeniem kwiatów jest rozmnażać roślinę za pomocą nasion, które są ostatnim kresem ich rozwijania się. Słupki zatem jako zawierające nasiona, są narzędziami istotnemi; lecz oddawna doświadczenie przekonało, że kiedy same tylko słupki gdzie istnieją, nasienia płonieją i roślina nie rozmnaża się wcale; że obecność pręcików i działanie ich na słupkach jest koniecznym warunkiem płodności nasion i utworzenia się zarodka, który nam służył za punkt wyjścia w historii rośliny (§ 27); pręciki więc są równie istotnemi narzędziami. Co się zaś tyczy kielicha i korony, te mają w kwiecie podrzędne tylko znaczenie, służąc pręcikom i słupkom za okrywę, w której takowe rozwijać się i wykształcać mogą. Łatwo pojąć, że niekiedy może wcale zbywać na tych okrywach, a je-


oliciej  
prze-  
k płat-  
odium)  
t. p.  
atków,  
lzo bli-  
zedsta-  
ścić po-  
h (Pa-  
wa ro-  
posiada

o słup-  
tr z kie-  
251, 2)  
az (fig.  
słupki,  
zalążki

Kielich. —  
słumienia  
wiązka o,  
czolo wate  
kwiatów

dnak kwiat nie stanie się przez to niezdolnym do spełnienia swych czynności, kiedy przeciwnie, kwiaty pozbawione pręcików i słupków zarazem, byłyby zupełnie niepłodnymi, zupełnie niezdatnymi do rozmnożenia rośliny; dlatego też nazywamy *bezpłciowemi* (fl. neutri), niektóre kwiaty ograniczające się na samych tylko okółkach kielicha i korony, które wtedy mogą się znacznie rozwinąć. Przeciwnie, kwiaty posiadające same tylko słupki i pręciki, albo jeden tylko rodzaj tych narzędzi, pozbawione wcale okryw, zowią się *bezokwiatowemi* (fl. achlamydei) [od  $\alpha$  *privativum*;  $\chi\lambda\alpha\mu\sigma$ , odzienie, suknia], albo pospoliciej *nagiemi* (fl. nudi).

§ 384. Widzieliśmy, że części kwiatowe mogą się zmniejszać co do liczby: 1<sup>o</sup> przez stłumienie niektórych części każdego okółka; 2<sup>o</sup> przez stłumienie jednego lub więcej całych okółków. Połączmy teraz z sobą obadwa te rodzaje, a dojdziemy przez stłumienia kolejne, których wszystkie przykłady znaleźć można w przyrodzie do większego jeszcze stopnia prostości, a której ostatnim kresem będzie jeden pręcik i jeden osobny owocek. Do tego stopnia są naprzykład przywiedzione kwiaty rodzaju wodziana (*Najas*), której dwa gatunki (*major* i *minor*) rosną w naszych rzekach. Sama rodzina ostromłęczowatych, przedstawia nam w szeregu bardzo nauczających przykładów (fig. 252, 256), stopniowe zmniejszanie się



252—257. Zarysy kwiatów coraz to prostszych, których widzimy: 10 kielich, jako jedyna okrywa zmniejszony do 3 części (252, 253, 254), dalej stłumiony zupełnie (255, 256, 257) i zastąpiony przykwiatkiem, z którego kłata wyrasta kwiat, najwięcej jeśli niekiedy opatrzony dwoma bardziej na wewnątrz leżącymi przykwiatkami (255, 256; 2<sup>o</sup> Kwiaty same tylko męskie, przywiedzione do 3 (252), do 2 (253 i 255), i do jednego pręcika (254, 256), nakoniec ten jedyny pręcik przywiedziony do jednej tylko klatki (257, 1), lub same tylko żeńskie (257, 2) i przywiedzione do jednego tylko owocaka.

- |      |  |
|------|--|
| 252. | Zarys kwiatu męskiego z <i>Tragia cannabina</i> .  |
| 253. | — — — z <i>Tragia volubilis</i> .  |
| 254. | — — — z <i>Anthostemma senegalense</i> .   |
| 255. | — — — z <i>Adenopeltis colliguaya</i> .  |
| 256. | — — — jednego z ostromłęczów.  |
| 257. | — — — z wodziany mniejszej ( <i>Najas minor</i> ), 1 kwiatu żeńskiego; z <i>Najas minor</i> , 2. |

liczby pręcików, które stanowią tu kwiaty męzkie, a które widzimy przywiedzione do 3, 2, a nakoniec do jednego tylko (*ostromłęcz*).

§ 385. Kiedy kwiaty przywiedzione tym sposobem do jednego tylko narzędzia, są samotne, nietrudno jest rozpoznać je; ale kiedy są skupione w kwiatostan złożony, wtedy może zachodzić w tym względzie niejaka wątpliwość. Długi czas np. uważano za jeden kwiat cały kwiatostan ostromłęczu, w którym wiele kwiatów męzkich składających się z pojedynczych pręcików, otacza kwiat żeński utworzony z jednego tylko słupka; cały kwiatostan otoczony jest okrywą nazywaną dawniej kielichem. Podobnież owoc morwy, zdaje się być na pierwszy rzut oka taki sam, jak owoc jeżyny, chociaż pierwszy zawiera słupki wielu kwiatów zbliżonych w krótki kłos, drugi zaś słupki jednego kwiatu ułożone na dnie nieco podłużném. To dlatego, że (jak wybornie dowiódł Roepër) wielkie zachodzi podobieństwo pomiędzy kwiatostanami a kwiatami takowe składającymi, a różnice zaciągają się prawie zupełnie, jeśli części kwiatostanu będą tak proste jak części kwiatu, co nastąpić musi wtedy, kiedy sam kwiat został przywiedzionym do bardzo małej liczby swych części. Jakże więc odróżnić od pojedynczego kwiatu, kwiatostan złożony z bardzo prostych kwiatów? Jeśli części tych kwiatów (pręciki lub słupki) poprzegradzane są małymi przykwiatkami, jeśli nie następują po sobie w zwyczajnym porządku, od wewnątrz ku zewnątrz, wtedy obecność tych nowych części, lub niezwykle połączenie części zwyczajnych, wskazuje, że mamy przed sobą kwiatostan. Szczególniej zaś porównanie z roślinami pokrewnymi objaśniać nas zwykło w podobnych wątpliwościach. Przytoczony powyżej rodzaj ostromłęczu, którego gatunki będąc dość pospolitemi, łatwo mogą być użyte do poszukiwań, posłuży nam i pod tym względem za przykład. Widząc, że pręciki jego są stawowate ku środkowi, i że u spodu międzywęzła niższego znajdują się małe wyrostki, możnaby już ztąd wniesić, że międzywęzła te są szypułkami opatrzonymi przykwiatkiem; ostatnia zaś nawet wątpliwość znika, kiedy się przekonamy, że wszystkie rodzaje pokrewne z ostromłęczem posiadają kwiaty osobnopłciowe i nadzwyczaj proste, przywiedzione z jednej strony do bardzo małej liczby pręcików (niekiedy do jednego lub dwóch), z drugiej do jednego tylko słupka, tudzież kiedy rozważymy, iż kilka takich pręcików,

skupionych około jednego słupek, utworzyłyby najdokładniej kwiat ostromłęczu. Jednakże wyznać trzeba, że w niektórych razach, może zbywać na tych piętnach odróżniających, a wtedy analogja z pobliskimi rodzajami rzucić będzie wątpliwe tylko światło. Tak, w rodzaju *Lilea* widzimy kłos opatrzony przykwiatkami ułożonemi w węzownię, a w kącie każdej z nich znajduje się pręcik i owoc; to stanowi cały kwiat. Wystawmy sobie 6 takich kwiatów ułożonych w okółek, a będziemy mieli kwiat błotnicy (*Tryglochis*), składający się z kielicha o 6 listeczkach, z 6 pręcików i tyłuż owoców. Nazywamy tu widocznie częściami kwiatu to, co w poprzedzającym razie nazwaliśmy kwiatem, nazywamy dalej listeczkami kielicha, co wprzód nazwaliśmy przykwiatkiem; Ztąd wnosić należy o stopniowym przejściu części roślinnych jednych w drugie, tak złożonych, jak i prostych. Mamy tu przed sobą nieznaczne przejście od kwiatostanu do kwiatu, tak jak wprzód już widzieliśmy, że gałązki przechodzą w kwiatostan; liść w przykwiatek, a dalej w listeczek kielichowy, i w inne narzędzia kwiatu. Lecz jeśli z jednej strony przejścia te ostrzegają nas, abyśmy unikali przesady w odróżnianiu pojedynczych części, jakto kiedyś miało miejsce, — z drugiej, różnice tychże części są zwykle tak wyraźne, że nie pozwalają nam połączyć ich w jedność, przez co chcąc zanadto uprościć naukę, zniszczylibyśmy ją raczej zupełnie.

§ 386. Widzieliśmy, że liczba części kwiatowych może ulegać licznym zmianom w skutek pomnożenia lub zmniejszenia się tak całych okółków, jako też żywiołów je składających. Dwie te przyczyny mogą działać zarazem. Tak np. w bobrowniku lub tulipowcu, któreśmy już wyżej przytoczyli, okółek kielichowy posiada trzy tylko listeczki, a zatem mniej niż ich zwykle bywa w dwuliściennych; płatki ułożone są również w okółki trójkowe, a zatem liczba ich podobnie jest zmniejszona; lecz za to widzimy tam większą liczbę okółków, a przeto z tego pomnożenia musi oczywiście wynikać powiększenie się liczby samych płatków. W rodzajach pobliskiej rodziny flaszowcowatych [*Anonaceae*] (jak *Hemistemma*, *Pleurandra*), jedna strona kwiatu zupełnie jest pozbawiona pręcików, za to po drugiej stronie liczba ich pomnożyła się. W sto-jańskim ziele, pręciki są pomnożone, lecz siedząc w trzech wiązkach powstałych przez rozszczepienie, a przeto okółek ich przy-

przyciem małe zboczenie jednego z pięciu listeczków, które go czyni zupełnie zewnętrznym, spowodowuje ułożenie wężownicowe, w którym jednak wszystkie listeczki znajdują się na jednym skrócie wężownicy (fig. 265) nadzwyczaj do okręgu zbliżonym.

§ 397. Każdy listeczek w paku, uważany niezależnie od drugich, może niekiedy (podobnie jak liść w pączku § 174) oprócz odmiany będącej skutkiem wzajemnego ułożenia części, przedstawiać odmianę sobie właściwą; może być złożony według swjej osi we dwie połowy, zachylone albo ku wewnątrz, albo ku zewnątrz (w którymto razie pak posiada węgły wystające, przedzielone wklęsłościami i odpowiadające albo nerwowi głównym, albo przedziałom pomiędzy listeczkami); może być *pomarszczony* (p. *corrugata*) i wtedy często jakby zwinęty w kłębek na sobie samym, jak np. płatki paka maku i t. d.

§ 398. Rozbiierając stosunki części kwiatowych, mogące istnieć w paku, uważaliśmy dotąd same tylko takie, które zachodzą pomiędzy częściami jednego tylko okółka; obaczmy teraz jakie się zdarzyć mogą w szeregu wielu okółków: Ułożenie w wężownicę może się bez przerwy ciągnąć od jednego do drugiego; spodziewać się tego można w kwiatach, w których przejście z jednego do drugiego okółka jest stopniowe, jak np. w grzybieniu białym, w kielichu i koronie bobrowniku, gdzie czasami zaledwie jesteśmy w stanie oznaczyć granice pomiędzy jednym a drugim. Lecz nawet i wtedy, kiedy okółki różne odznaczają się dostatecznie postacią i barwą odmienną, pomimo tak nagłego przejścia, wężownica może biec prawidłowo; pierwszy listeczek drugiego okółka, zajmuje miejsce prawie zupełnie sobie właściwe po ostatnim okółku pierwszego; następne zaś szykują się podług niego. Jednak często także wężownica zostaje przerwana, jak gdyby niedostawało kilku pośrednich listeczków pomiędzy najwewnętrzniejszym jednego, a najzewewnętrzniejszym drugiego okółka. Niekiedy nawet zmienia się sam kierunek wężownicy: w kielichu u. p. szła ona od prawej ku lewej, w koronie idzie od prawej ku lewej ręce.

§ 399. Bardzo się często zdarza, że dwa po sobie następujące okółki odmiennego są przedkwitnienia: zmiana ta jest stałą i odznaczającą dla wielu rodzin. Tak np. w słazowatych (fig. 262, 264). Powojowatych w wielu goździkowatych (jak

w kąkolu [*Agrostemma githago*]), przedkwitnienie korony jest skręcone, przedkwitnienie zaś kielicha jest łupinowate w pierwszych (fig. 264, c), dachówkowe w innych. Ostatni ten przykład dostatecznie dowodzi, że w jednym kwiecie części jednego okółka mogą być ułożone w wężownicę, części zaś drugiego w okółek.

§ 400. W rzeczy samej, w częściach skupionych na tak małej przestrzeni, gdzie punkta kolejnych przytwierdzeń przedzielone są odstępami bardzo małymi, a niekiedy nawet wcale nieznacznymi, niepodobna szukać tej prawidłowości stosunków, jakiej dozwala oś rozszerzona lub wydłużona, na której wszystkie części mogą rosnąć we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Dlatego, ułożenie części kwiatowych jednego okółka, lub przejście od jednego okółka do drugiego, nie jest wcale niezmiennem; doświadczenie zaś uczy, do jakiego stopnia może się zmieniać. Porządek wężownicy, częstokroć przerywany, odwracany, a nawet zupełnie wstrzymywany pomiędzy częściami dwóch po sobie następujących okółków, ulega także częstym i drobnym odmianom w częściach jednego i tegoż samego okółka. Ułożenie łupinowate lub skręcone, bywa daleko stałszem, a ponieważ jest oznaką, że części osadzone są w okrąg i że wszystkie znajdują się pod jednakowymi warunkami, przeto prawie koniecznie musi być połączone z kształtnością kwiatu. W istocie, z małym tylko wyjątkiem, wszystkie korony i kielichy o przedkwitnieniu łupinowatém lub skręconém są kształtne, tam zaś gdzie przedkwitnienie odnosi się do ułożenia w wężownicę, prawie tyle napotykamy niekształtnych, ile kształtnych.

§ 401. Przedkwitnienie wyrażnia stosunki położenia części kwiatowych i czyni łatwiejszém ich oznaczenie: z ich też ważności i jego ważność wypływa. W wielu razach otworzenie się kwiatu, oddala części jego jedne od drugich; przestają one wtedy okrywać się i dotykać wzajemnie, a stosunki ich tak wyraźne w pąku, zacierają się mniej lub więcej. Jednakże jest wiele kwiatów, w których stosunki te zachowują się ciągle do pewnego przynajmniej stopnia. Tak np. ułożenie w cynkę, można odkryć jeszcze w wielu otwartych koronach różowatych; korony toinowatych są zawsze mocno skręcone, a nierzadko także i otwarte korony słazowatych noszą na sobie ślad podobnego ułożenia w pąku. Jasną jest rzeczą, że zbliżenie

części łupinowatych nie może trwać ciągle, chybabyśmy nie-  
dozwolili pąkowi otworzyć się; zdarza się, że kielichy które  
pozostały w tym stanie, rozdzierają się, albo bocznie, przez  
oddalenie się od siebie dwóch tylko brzegów, przyczem cały  
kielich odepchnięty zostaje w bok, na podobieństwo uszka np.  
w proświrniku jadalnym; albo też okręgowo, oddzielając się  
przy podstawie swój od reszty kwiatu, który rosnąc zrzuca je  
lub z sobą unosi (np. w niektórych mirtowatych, jak *Caly-  
ptanthes*, *Eucalyptus*). Zwykle brzegi przytykające do sie-  
bie w przedkwitnieniu łupinowatém, są dosyć grube, przez co  
je też poznać można, nawet kiedy się już od siebie oddalą,  
brzegi zaś, które się wzajemnie okrywały, są zwykle mniej  
więcej zcieńczone. Można się o tém przekonać, porównyując  
kielich szakłakowatych z kielichem mokrzycowatych (*Alsineae*).

§ 402. Nie mówiliśmy tu o narzędziach płciowych, o pręcikach i słupkach, ponieważ one nie tworzą, tak jak okrywają kwiatu, znacznych bardzo rozszerzeń, i nie mogą dla swój postaci przedstawiać tych różnych sposobów wzajemnego okrywania się, z którychby można wnosić o lekkich odcieniach względnego ułożenia, jak się to właśnie skuteczniej daje przy listeczkach kielicha lub płatkach. Jednakże można niekiedy otrzymać w tym względzie niektóre wnioski, ze sposobu ułożenia tych części w pąku. Zdarza się czasami, że owocki, lub pręciki jednego okółka, lubo mogą ostatecznie dojść równych wymiarów, nie dochodzą ich wszelako jednocześnie, lecz niektóre z nich wyprzedzają nieco w rozwijaniu się inne; z tego można wniesić, że jedne znajdowały się w okolicznościach przyjaźniejszych niż drugie, podobnie jak liście zewnętrzne różyczki, względem liści bardziej na wewnątrz położonych. Jeśli idzie o porównanie pręcików nie już jednego, ale wielu okółków, to w pąku położenie względne tych okółków daleko lepiej się okazuje, niż w kwiecie otwartym; okręgi ich spółśrodkowe są tam daleko wyraźniejsze, i nie mieszają się z sobą w jeden okrag, jak później. W pąku to widzimy często, że pręciki leżące naprzeciw płatków, otaczają okółek pręcików naprzemianległych względem tychże, jakieśmy widzieli w rozchodnikach (§ 376). Pod tym względem niektóre pąki mogą nam dostarczyć przykładu potwierdzającego wniosek, któryśmy wyciągnęli z położenia zewnętrznego owych pręcików naprzeciwplatkowych. Pięć płatków kwiatu podwójno-

pręcikowego nagwiadzkowatych, okrywa się kolejno w przedkwitnieniu, naksztalt pięciu kapturek, leżących jeden na drugim. W niektórych gatunkach, odrywając płatek najzewnętrzniejszy, spostrzegamy tuż przed nim pręcik naprost niego leżący, i umieszczony między nim a płatkami następnymi; odrywając potem dalsze płatki kolejno, spostrzegamy pręciki leżące naprzeciw każdego z nich, i podobnie między niemi a resztą kwiatu (fig. 266). W jakim sposobie objaśnilibyśmy podobne zaplątanie pręcików i położenie ich zewnętrzne względem płatków, gdyby pręciki te tworzyły okółek rzeczywiście różny od okółka płatków, i wewnętrzniejszy od tegoż? Nie jestże to przypadek tego samego rodzaju, co często zdarzające się zrośnięcie podstawy płatków z podstawą naprzeciwległego pręcika (§ 376), i nie mówiz on równie jak tamten, zatém, że wtedy płatki i pręciki są częściami rozdwojonymi jednego i tegoż samego okółka?



266.

§ 403. Mówiliśmy dotąd o sposobach oznaczania (o ile stan teraźniejszy nanki tego dozwala), odnośnego położenia części kwiatowych względem siebie; wypada więc jeszcze mówić o oznaczeniu położenia ich względem reszty rośliny. Do tego potrzeba wiedzieć nasamprzód położenie kwiatu względem osi, z której wychodzi jego szypułeczka. Biorąc za punkt do którego się odnosić będziemy, jakąkolwiek część kwiatu, np. jego najzewnętrzniejszy listeczek, ten, może być obróconym albo ku osi, albo w stronę wprost przeciwną; albo ku prawej, albo ku lewej ręce. Skoro położenie to, jakiegokolwiek ono będzie, ma miejsce w jednym z kwiatów, zachowuje się téż i we wszystkich innych kwiatach téj samej rośliny; niekiedy zaś nawet jednostajność taka, rozciąga się do wszystkich roślin jednéj rodziny. Tak w trędownikowatych i innych pobliskich oddziałach, mamy dwa owocki, obrócone jeden ku osi, drugi w stronę wprost przeciwną; gdybyśmy więc znaleźli kwiat z pozoru zupełnie podobny do kwiatu trędownikowatych, lecz którego jeden owocek obróconym byłby w prawo, drugi w lewo, wnieśliśmy, że ro-

266. Zarys pąka z *Triopteris ovata*. Widać położenie różnych części kwiatu, względem przykwiatka *b*, z którego kąta właśnie kwiat wyrasta i który przeto przypada na zewnętrzną jego stronę w kwia ostanie; druga zaś strona kwiatu obrócona jest ku osi.

ślina nie należy do tej rodziny. Podobnie, jedyny pręcik kwiatów rodziny *Cannaceae* i *Maranthaceae*, obrócony u pierwszjej do góry, u drugich w bok, wystarcza do odróżnienia od siebie, na pierwszy zaraz rzut oka, dwóch tych sąsiednich rodzin.

W ogóle listeczki kielicha szykują się według przykwiatka, którym kwiat jest opatrzone, lub jeśli go nie ma, według punktu osi, z którego powinien być wychodzić; tak samo, jak liście gałązki układają się według liścia tworzącego kąt, z którego właśnie gałązka wychodzi (§ 162). Kiedy szypułowka skręca się względem swjej osi, lub jest znacznie długa, cienka lub giętka, położenie pierwotne kwiatu względem osi, z której szypułowka wychodzi, może być mniej więcej zmienione. I w tym przypadku jedynie śledzenie pąka może nas objaśnić, ponieważ im kwiat jest młodszy, tém szypułowka jest mniej skręcona, mniej długa i cienka.


§ 404. Ogół piętn branych z położenia części kwiatowych względem siebie i względem gałązki je noszącej, nazywają niektórzy umiarem kwiatu: wyraz wzięty tu w zupełnie innem znaczeniu, jak to, w jakim używaliśmy go mówiąc o kwiatach umiarowych (§ 393).

## OKRYWY KWIATOWE.

§ 405. Wiemy, że dwa okółki złożone z części zwykle odmiennjej postaci i barwy w jednym jak w drugim, to jest: kielich i korona, tworzą okrywy kwiatu zupełne. Wiemy także, że często jeden się tylko znajduje okółek, i że w takim razie prawie zawsze niedostaje korony. W rodzaju rutowatych: *Diplolaena*, w którym kwiaty zbliżone w kwiatogłówkę cisną się i zaważają sobie nawzajem, części zewnętrzne nie rozwijają się, kielich płonieje całkowicie, a płatki ukazują się w postaci cienkich tylko i krótkich łusk, czasami nawet nie ma ich wcale. Otóż więc przykład korony bez kielicha; możnaby znaleźć kilka jeszcze takich, lecz w ogóle tak są rzadkie, że niewarto jest oznaczać osobną nazwą wyjątkowego tego rozkładu. Inaczej się ma z kwiatami którym niedostaje korony; a co się dosyć często zdarza, widzieliśmy bowiem (§ 381), że takowe nazywają się *bezplatkowemi*.

§ 406. Wyraz ten o ile ściąga się do dwuliściennych, nie uległ żadnemu zarzutowi; tu bowiem, ile razy jeden tylko

istnieje okółek okryw kwiatowych, takowy posiada zupełnie postać i inne piętna kielicha. Lecz w kwiatach jednoliściennych niezawsze rzecz się ma w ten sposób. Napomknęliśmy już (§ 362), że ich okrywy składają się zazwyczaj z sześciu części, ułożonych po trzy w okręgi spółśrodkowe. Bardzo często wszystkie sześć są sobie podobne, i wtedy mogą być zielone (np. w kwiecie szparagu), lecz najczęściej bywają rozmaicie, a niekiedy bardzo nawet żywo barwne, jak w lilji (fig. 267), hijacyncie, tulipanie, i t. d. Innym razem trzy zewnętrzne różnią się od trzech wewnętrznych: pierwsze zielone i podobne do kielicha, drugie barwne i podobne do płatków, jak np. w dobowniku (*Tradescantia*), żabieńcu (*Alisma*) i t. d. Wtedy rzeczywiście zdawałoby się słusznym, nazywać okółek zewnętrzny kielichem, a wewnętrzny koroną, lecz w takim razie wypadłoby koniecznie nazwać je podobnie we



267.

wszystkich innych kwiatach jednoliściennych, chociażby żadnej pomiędzy nimi nie było różnicy. Tak też czyni wielu pisarzy. Inni, dawniejsi, biorąc za wskazówkę jedynie piętna barwy, przyjmowali w tych kwiatach raz kielich i koronę, drugi raz sam tylko kielich, to znowu samą tylko koronę, chociaż oczywistą jest rzeczą, że 6 owych części zachowujących stale stosunki swoje, musi zawsze jedną i tę samą rzecz przedstawiać. Inni nakoniec jeszcze, nazywają je w każdym razie kielichem, przywiązując do nazwy téj, znaczenie układu okrywowego, najzewewnętrzniejszego w kwiecie; nie uznają oni bowiem w kwiatach jednoliściennych, dwóch różnych układów okrywowych. Potrzeba wiedzieć o tym braku zgodności w wyra-

267. Kwiat lilji białej (*Lilium candidum*).—*p* Okwiat, którego trzy, nieco zewnętrzniejsze części *pe* leżą naprzemian względem trzech innych wewnętrzniejszych *pi*.—*e* Pręciki, których wierzchołki nitek wraz z pylnikami wahającymi się.—*s* Znamię kończące wyższą część szupka.

zownictwie różnych botaników, aby uniknąć zamieszania jakie ztąd wynikać może.

§ 407. De Candolle usiłował znieść to zamieszanie. Uderzony różnaitością pozorów, jakie przedstawia kielich lub korona niektórych jednoliściennych, widząc nawet, że niektóre kwiaty zdają się łączyć te dwoiste przyrodzenie w listeczkach zielonych od zewnątrz, od wewnątrz zaś barwnych, sądził, że każdy taki listeczek powstaje ze zrosnięcia się listeczka kielichowego z przeciwnym mu listeczkiem korony i składa się przeto z dwóch blaszek przedstawiających dwoiste owe przyrodzenie. Zbyteczną byłoby rzeczą rozstrząsać to przypuszczenie, przeciw któremu mówią zarazem i uwagi wzięte z anatomji i ze stosunków położenia części. Nie może się ono ostać, osobliwie jeśliśmy je zastosować chcieli do dwuliściennych, jak to sam jego autor uczynił; naprzeciwległość pięciu płatków względem pięciu listeczków kielicha, byłaby przeciwną przyrodzie. Cóżkolwiekbydz, De Candolle odróżniając podług tego sposobu widzenia przymiotnik *bezpłatkowy*, dla kwiatów opatrzonych jedną tylko okrywą, mianował takowe *jedno-okrywowemi* (monochlamydeae; *μόνος*, sam; *χλαμύς*, odzienie). Nazywał on z Ehrharte'm ogół okryw kwiatowych *orodnią* (perigonium), i używał tego wyrazu, zamiast kielicha i korony, ile razy takowe połączone są w jeden układ, a przeto przy opisie kwiatów wszystkich jednoliściennych.

§ 408. Wielu pisarzy idzie za tym przykładem, nie przyjmując wszelako przypuszczenia, które dało powód do owej nazwy; aby zaś nie tykać przyrodzenia pojedynczej okrywy, opisują takową pod imieniem orodni, lub częściej pod imieniem *okwiatu* (perianthum; od *περλ*, około; *ανθος*, kwiat), którego Linneusz radził używać dla kielicha, ile razy tenże styka się bezpośrednio z częściami rodnemi. Nazwa ta może być z korzyścią użyta w opisach jednoliściennych; lecz co do dwuliściennych połączona jest z pewnemi niedogodnościami, tu bowiem często jedna roślina posiada płatki, druga bardzo z nią pokrewna jest pozbawioną takowych (np. w goździkowatych, goździenicowatych [*Paronychieae*]). Z dwóch zaś kwiatów zkądiną bardzo do siebie podobnych, nie można w jednym nazwać okwiatem tego, co w drugim nazywa się kielichem. Lepiej zdaje się przeto będzie, używać stale tego ostatniego wyrazu, na oznaczenie okółka okryw, czyto zewnętrznego,

czy też jedyne, w roślinach dwuliściennych; w jednoliściennych zaś albo używać go także z dodaniem według potrzeby różnych przymiotników, albo też używać wyrazu *okwiat*. W następującym rozbiornie, nie będziemy odróżniać okwiatu od kielicha.

§ 409. **Kielich** (*calyx*). — Powiedzieliśmy, że kielich jest najzewnętrznym okółkiem okryw kwiatowych, że składa się z wielu części przedstawiających liście, a przeto zwanych listeczkami kielichowemi. Link radzi używać pojedynczego wyrazu *listeczki* (*phylla*; φύλλον, liść), którego używaliśmy już w składanych przymiotnikach *jedno* i *wielolisteczkowy* (*mono et polyphyllus*). De Candolle wprowadził powszechnie używaną nazwę *działek* (*sepala*); zkąd przymiotniki *wielodziałkowy* i *jednodziałkowy* (*poly et monosepalus*) przydawane kielichowi podług tego, jak jego listeczki albo zostają w zupełnej niezależności jedne od drugich, albo też są połączone z sobą w mniejszej, lub większej rozległości (§ 364). Tu, używać będziemy bez różnicy obu tych nazwisk: listeczki kielicha i działki.

§ 410. Uważaliśmy te części za prawdziwe liście; budowa ich usprawiedliwia ten sposób widzenia, w rzeczy samej utworzone one są wewnątrz z mięksizu, przetrzyniętego w zwykłym kierunku (z dołu do góry) wiązkami włókno-naczynnymi, złożonemi z cewek rozkręcalnych i z cienkich włókien; zewnątrz pokryte są naskórkiem opatrzonym szparkami, daleko liczniejszemi na powierzchni zewnętrznej działek, która z powodu wzniesionego położenia swego, odpowiada powierzchni dolnej liścia (§ 411). Naskórek nosi na sobie częstokroć włosy, podobne do tych, które pokrywają liście i młode pędy, a przeto częstsze i liczniejsze na powierzchni zewnętrznej niż na wewnętrznej. Dla oznaczenia nieobecności lub obecności włosów, tudzież różnych sposobów w jakie mogą odmieniać powierzchnią kielicha, używamy wyrazów już wyżej przywiedzionych (§ 244). Znajdują się też na zewnątrz kielicha gruczoły, podobne do tych, które siedzą na dolnej powierzchni liści tejże samej rośliny (np. w nagwiazdkowatych). Otoż więc mamy tyle piętn wspólnych, które dowodzą związku liści z działkami kielicha.

§ 411. Wiązki włóknonaczynne zakreślają od zewnątrz nerwy (z których jednak tylko główny jest zwykle dosyć wy-

daty  
ny m  
dwi  
chac  
w d  
u sp  
ciała  
Niek  
w od  
pow:  
liste  
nerv  
brze  
§  
w og  
mala  
broda  
nawet  
lej, ż  
nieró  
Schle  
(Lup  
dział  
nowi  
się st  
§  
-z pos  
n gór  
albo s  
chwo  
u doł  
zweże  
Rzadk  
cięcia  
[Rum  
268.  
okółków  
go ci o  
lub kruc  
opatrz

datnym), i ulegają, lubo w sposób mniej uderzający, z przyczyny małości części, tym samym prawom, jak w liściach roślin dwu i jednoliściennych, łącząc się z sobą odnogami w kielichach pierwszych, a przebiegając równolegle i bez podziału w drugich. Kiedy listeczki kielicha zlewają się w jedno ciało u spodu, nerwy główne, przedłużając się na powierzchni tego ciała mogą wskazywać środek każdego z nich (fig. 271). Niekiedy znajdujemy taką samą ilość innych nerwów, leżących w odstępach pierwszych, na samej linii spojenia listeczków; powstają one z połączenia się wiązek, należących do dwóch listeczków sąsiednich, gdyż tam gdzie listeczki rozłączają się, nerwy rozdwiają się w gałązki idące wzdłuż odpowiednich brzegów (fig. 273).

§ 412. Listeczki kielicha, równie jak liście, i wszystkie w ogóle narzędzia roślinne, ukazują się nasamprzód w postaci maleńkich komórkowych brodaweczek. Godną jest uwagi, że brodaweczki te są w początkach zawsze odosobnione, chociaż nawet później mają się zrosnąć w kielich jednodziałkowy; dalej, że są wszystkie sobie równe, chociaż później mają się nierówno rozwinąć: okoliczność ta okazaną została przez Schleidena, między innymi na bardzo młodym pąku łubinu (*Lupinus*). Lecz to tylko w samym początku wczesnie bowiem działki zaczynają zrastać się i rozwijać nierówno jeśli to stanowi jedno z piętn kwiatu. Naczynia i włókna wykształcają się stopniowo, jak w liściu (§ 147).

§ 413. Postać działek daje się w ogóle porównać raczej z postacią przykwiatków, niż liści; stanowią one płateczki u góry zwężone, i przedstawiają przeto albo samą tylko blaszkę, albo część pochwowatą liścia. Niekiedy zwężają się u dołu, rzadko jednakże nadzwyczaj zwężenie to przedłuża się w ogonek. Rzadko także brzeg jego posiada rozcięcia lub łatki (w szczawiu morskim [*Rumex maritimus*] i innych gatunkach



268. Kielich gatunku szczawiu: *Rumex uncatulus*. Składa się on z dwóch okółków zewnętrznego *ce* o częściach krótkich i całobrzegich, i wewnętrznego *ci* o częściach daleko większych porożcinanych na brzegu w strąpki proste lub kruczkowate, siatkowatych na powierzchni zewnętrznej, która u spodu opatrzona jest nabrzmiałością gruczołowatą *g* mającą postać ziarna.

tegoż samego rodzaju; fig. 268; w róży; fig. 369), pospolicie zaś jest całobrzegi. Nie będziemy tu wymieniać wszystkich możliwych postaci działek; są one najczęściej jajowate, tępe lub zaostrome na końcu. W opisie ich, oprócz ilości i postaci, namienić wypada o kierunku, idą bowiem raz w górę (*działki wzniesione; s. erecta*), drugi raz ku wewnątrz (*skłaniające się, conniventia*), częściej jeszcze na zewnątrz (*rozwarłe, otwarte, odgięte; divergentia, patula, reflexa*, podług tego jak się mniej lub bardziej ku zewnątrz nachylają, a wierzchołek ich obrócony jest ku górze, poziomo, lub na dół).

§ 414. W kielichu jednolisteczkowym, części mogą być połączone w mniejszej lub większej rozległości. Jeśli się zrastają u spodu tylko, wtedy część ta dolna kielicha zowie się jego dnem; jeśli zaś zrastają się do znacznej wysokości, część zrosnięta nosi imię rurki. W obudwu razach, część wyższa działek, czyli wolna, nazywa się *krajem* kielicha (*limbus*); a podług tego jak takowe są mniej lub więcej odosobnione, a przeto jak kraj składa się z części (*łatek; lacinae*) krótszych lub dłuższych, w stosunku do dna lub rurki; nadajemy tymże częściom nazwiska, jakich używaliśmy przy głębszych lub płytszych rozcięciach brzegu liścia (§ 133). Będziemy więc mieli podziałki lub wycinki, jeśli są zrosnięte, przeszło do połowy (fig. 270); łaty, jeśli zarazem są dość szerokie; zęby (fig. 271), lub karby (fig. 288, c) jeśli tylko u wierzchu są wolne, a przytém ostre lub tępe. Wyrazów tych używamy często w przymiotnikach złożonych, któremi opisujemy kielich, a które zarazem wskazują liczbę tych jego podziałów. Tak



269.



270.



271.

269. Kielich pięciolisteczkowy gwiazdnicy (*Stellaria holostea*).

270. Kielich pierwiosnku (*Primula elatior*).

271. Kielich lepnicy (*Silene inflata*).

np. mówimy, że kielich jest pięcio-dzielnny, lub cztero-wrębny, trój-łatowy, sześćo-zębowy, i t. p. Jeśli postać i połączenie części, są takiego rodzaju, że nie przedstawiają żadnego widocznego podziału, i że całość kielicha tworzy rurkę równie obrzeżoną kołem, mówimy, iż tenże jest *całobrzegim* (integer) lub *uciętym* (truncatus). Uważać należy, że wszystkie te wyrazy, użyte wyżej na oznaczenie części jednego liścia, zastosowane są w kielichu do połączenia listeczków, uważanych jakby za części wcale innego rodzaju całości, że zatem w użyciu tém jest tylko podobieństwo, a nie tożsamość.

Oprócz tych postaci ogólnych, wynikających z różnego stopnia połączenia części kielicha, tenże może przedstawiać wiele innych podrzędnych odmian, w skutek mniejszego lub większego przedłużenia się rurki, w skutek wydęcia jej na różnych miejscach; w skutek różności kierunku kraju względem rurki, i t. d. Mówiąc o koronie, wymienimy wyrazy używane do oznaczenia tych odmian, ukazujących się tamże daleko wyraźniej, z powodu większej zwykle rozciągliwości tego narzędzia (§ 428).

We wszystkich poprzednich przypadkach mówiliśmy o kielichu kształtnym; lecz niezawsze on jest takim. Niekształtność może zachodzić albo w rurce, która wtedy posiada w pewnych miejscach zgięcia lub wypukłości (np. w *tarczycy*, [Scutellaria]); albo w kraju, którego jedne części bardziej się od innych rozwijają. Nierzadko zdarza się, że działki czyto zrosnięte, czy wolne, przedłużają się w dół względem punktu swój osady, a to albo w blaszkę płaską (jak w *fiolkach*), albo w woreczek obrócony otworem ku środkowi kwiatu. Jeśli woreczek ten jest znacznie długi, przybiera nazwę *ostrogi* (calcar), a kielich nazwę *ostrogowego*. Odmiana ta może zachodzić albo w jednej tylko działce (jak w *nastureji*, fig. 272), albo we wszystkich (jak w *orliku*). W *muszkatelu*; ostroga zrasta się ściśle pod kwiatem z szypułką, i zdaje się tworzyć część takowej.



272.

§ 415. Kwiaty niektórych roślin otoczone są podwójnym kielichem. Z tego, cośmy powiedzieli w ogóle o pomnażaniu się części kwiatowych, sądzićby można że istnienie tego przydatkowego kielicha, zwanego niekiedy *kieliszkiem*, zależy od rozdziwienia się listeczków kielichowych, lub od przybycia okółka zewnętrznego: w pierwszym razie listeczki obu kielichów powinnyby być naprzeciwległe, w drugim naprzemianległe względem siebie. Jednakże dokładne spostrzeżenia zbijają to przypuszczenie. Tak, w rodzinie nader przyrodzonej ślazo-  
 watych, obecność kieliszka jest bardzo częstą, lecz jeśli części



273.

jego są w różnej liczbie z częściami kielicha, wtedy są względem nich naprzemianległe, nie jesto więc rozdziwienie. Z drugiej strony bywają one często mniej liczne (np. w ślazi) lub liczniejsze od części kielicha, wielokrotne względem nich, albo też nie (jak w proświrniku, fig. 273), i różnią się od siebie nawet w gatunkach jednego i tegoż samego rodzaju: nie jest to więc okółek prawidłowy, jak inne w tych samych kwiatach; jesto raczej zbiór przykwiatków skupionych w pokrywę tuż pod kwiatem (§ 322). Jestto znowu jedno z zasługujących na uwagę przejść, od liści do okryw kwiatowych. Listeczki tej pokrywy mogą się zrastać, i tworzyć przeto kieliszek jedno-listeczkowy (fig. 277 i 276 i).

Lecz w innych razach, kieliszek wcale zkadinał bierze początek. Tak liście róży opatrzone są u nasady dwoma przylistkami, odepchniętymi na płaszczyznę nieco zewnętrzną od płaszczyzny blaszki. Wystawmy sobie pięć takich liści, ułożonych w okółek i zrosniętych u spodu; przylistki utworzą okrąg części zbliżonych po dwie, naprzemianległych względem blaszek, siedzących na tej samej podstawie, lecz na płaszczyźnie nieco zewnętrzniej. Przylistki te wreszcie zamiast leżeć tylko obok siebie, mogą się zrosnąć pod brzegami i tym sposobem zamiast dziesięciu, pozostać tylko w liczbie pięciu. To właśnie znajdujemy w kielichach wielu różowatych, jak np. w pięćperstach (*Potentilla*) [fig. 274], poziomkach, i t. d., gdzie pomiędzy pięciu częściami *c* kielicha pięćcio-dzielnego,

273. Kielich *c* proświrniku (*Hibiscus*), wraz z kieliszkiem *b*.

ukazu  
kielisz  
dwa w  
sama  
sem  
mi lu  
dwoi  
słusz  
(bra  
kielic  
rzecz

Ni  
listec  
i zak  
czaj  
potyka  
z nich  
ścié p  
Z przy  
skulek  
przes

§  
i zow  
barw  
przed  
wew  
natu,  
kłos  
jąc b  
tanka  
zywam  
liści  
dnoliś  
i spos  
(ilija  
już t  
jednol

274.  
szkiem

ukazuje się zewnątrz tyleż języczków *b* tworzących razem kieliszek. Że to są przylistki zrośnięte po dwa i należące do listeczków kielichowych, sama przyroda nam wskazuje tworząc czasem niektóre z tych języczków dwuwębnymi lub dwudzielnymi, i zdradzając przeto ich dwoisty początek. Jeśli objaśnienie to jest słusznem, wtedy przymiotnik *przykwiatkowy* (*bracteolatus*), którym oznaczono podobne kielichy, jest wcale niewłaściwy, a podwójny okółek, będzie rzeczywiście jednym tylko.



274.


Nie można wyrzec podobnego mniemania o dwóch rzędach listeczków najzewewnętrzniejszych, leżących naprzeciw płatków i zakończających rurkę kielicha w kwiecie krwawnicy zwyczajnej (*Lythrum salicaria*). Ponieważ podobny rozkład napotyamy we wszystkich roślinach tej rodziny, a w żadnej z nich nie znajdujemy przylistków, przeto musimy tu przypuścić podwojenie się kielicha przez dodanie całego okółka. Z przykładów tych widno, że przyczyny różne, mogą wydać skutek, i że nie należy przy poszukiwaniu części roślinnych, przestawać na pozorach.

§ 416. Utkanie kielicha zbliża się zwykle do utkania liści i zowie się też *liściowatém* lub *zielném*. Pospolicie wtedy barwa kielicha jest zieloną; w niektórych jednak roślinach, przechodzi w inne odcienia, zbliżające się do barwy części wewnętrzniejszych; jest czerwona u wianków (*Fuchsia*), granatu, i t. d.; pomarańczowa u nasturcji; różowa u wierzbówki kłosowej (*Epilobium spicatum*). Niekiedy kielich przybierając barwę korony, przybiera i całą jej powierzchowność, tkanka jego staje się cieńszą, miększą i węższą, dlatego nazywamy go wtedy *płatkowatym* (*petaloides*); pomiędzy dwuliściennymi, orlik, hortensja, dają nam tego przykłady. W jednoliściennych, utkanie podobne jest nawet najpospolitszém, i spostrzegać się daje, już to w całym kielichu albo okwiecie (lilja biała, i l. zawojek, żonkilla, mieczyk, hijacynty, i t. d.), już też tylko w wewnętrznej jego części. W wielu jednakże jednoliściennych, utkanie jest zupełnie przeciwne, to jest suche,

274. Kielich pięćperstu (*Potentilla verna*), widziany z dołu, wraz z kieliszkiem *b*.

twarde, połączone z bardzo małymi wymiarami listeczków, i przypominając raczej utkanie przykwiatków, barwy zielonej lub brunatnej, jak np. u sitów (*Juncus*). Kielich zmieniony tym sposobem, nazywa się *łuskowatym* (squamosus), ponieważ działki jego podobne są do łusk pączka, często także zowiemy go *plewowatym* (glumaceus) od wyrazu plewa, którym oznaczamy okrywy kwiatowe traw, odznaczające się takowym utkaniem.

§ 417. Czasem niepodobna jest wcale rozpoznać kraju kielicha, w okółku lub czubie złożonym ze szczeci, albo włosów, noszących nazwę *puchu* (pappus), zkąd téż kielich zowie się *puchowym* (papposus). Wiele rodzin, jak kozłkowate, drapaczowate, złożone, przedstawia nam przejścia od zwyczajnej postaci kraju kielicha, do postaci w mowie będącej; ostatnie szczególniej pokazują nam wszelkie możliwe odmiany. Tak, w roślinie *Valerianella coronata*, widzimy już że zęby kielicha przedłużają się na końcach w ość tęgą; w kozłkach (*Valeriana*) przedłużenie to daleko jest znaczniejsze, miększe, i najeżone zewsząd drobnociuchnym meszkiem, słowem przeszło w *puch*. Podobnie we właściwych dryjakwiach (np. w dr. ogrodowej; fig. 276, *p e*) pięć krótkich, lecz wyraźnych łat



275 — 277. Przykłady kielichów, których kraj *l* przechodzi stopniowo w puch. — *c* Kielich, którego rurka *t* zrosnięta jest w jedno z zawiązkiem, i zweża się przed nim w cienki słup na fig. 276 i 277; kraj *l* o licznych podziałkach nitkowato zwięzonych u wierzchołka lub od samego spodu. — *i* Pokrywka czyli kieliszek przecięty wzdłuż.

275. Kielich z *Catananche caerulea*.

276. — z *Scabiosa atropurpurea*.

277. — z *Pterocephalus palestinus*.

kielicha, kończy się pięciu długimi ościami; w tych zaś, z których zrobiono rodzaj *Pterocarpus*, znajdujemy natomiast puch, którego gałęzie czyli promienie, podobnie jak w kolkach są bardzo liczne, tak jak gdyby nietylko pięć nerwów głównych, ale nadto i wiele innych, brało udział w tym szczególnym sposobie rozwijania się (fig. 247 l). W rodzaju złożonych: szeleścik (*Catananche*) [fig. 275, l], kraj składa się z pięciu podziałek szerokich u dołu, zwężonych stopniowo ku górze, i kończących się nareszcie cienieczną nitką, prawdziwym promieniem puchu. W wielu innych rodzajach tej samej rodziny, puch dochodzi całego swego rozwinięcia; a promienie jego częstokroć bardzo liczne, nie zawsze tworzą pojedyncze okółki, lecz całe pęki, jak gdyby wyrastały z wielu okręgów spośródkowych, co zresztą być może w istocie i co zachodziłoby także i w drapaczowatych, gdyby w nich kraj pokrywki czyli kielicha zewnętrznego, którym każdy kwiat jest opatrzony, kończył się także puchem, tak, jak w kielichu wewnętrznym. Mówimy, że puch jest *piérzasty* (p. plumosus), kiedy każdy z jego promieni okryty jest małemi, gołém okiem widzianemi włoskami (fig. 275, 277, jak w węzymbordach, ostrożniach [*Cirsium*] i t. d.); *pojedynczy* (simplex s. pilosus) kiedy każdy promień pozbawiony owego meszku, podobny jest sam do długiego równego włosa (fig. 276, l, jak w brodawniku [*Leontodon*]). Lecz i wtedy nawet patrząc nań przez szkło, dostrzedz można zwykle na powierzchni jego mnóstwo maleńkich chropowatości; jeśli te ostatnie są do tyła wydatne, że tworzą ząbki gołém okiem z łatwością widziane, puch zowie się ząbkowanym.

Mówiąc o promieniach puchu, jako o przedłużeniach nerwów, nie rozumieliśmy pod tém, aby się miały składać z wiązek włókno-naczynnych, pozbawionych miększu; zachowują one kierunek nerwów, ale nie ich tkanę, są bowiem złożone z samych komórek i przypominają włosy, nietylko postacią ale i budową swoją.

§ 418. Trwałość kielicha jest różna w różnych kwiatach. W jednych oddala się on ode dna (tak jak liść od gałązki, na której siedział [§ 138]), stawowaciejąc raz lub kilka razy; jest *odpadający* (deciduus), odpada zaś najczęściej wraz z koroną po zapłodnieniu, niekiedy jednak daleko wcześniej, bo jak tylko kwiat otwierać się zaczyna (*k. znikliwy*; c. *fugax*,

*caducus*), jak np. w maku. W innych kwiatach kielich zostaje na swoim miejscu, nawet po skończonem kwitnieniu; jest przeto *trwałym* (*persistens*), np. w wargowych, poczwarowych, ogórecznikowatych, i t. d. Lecz raz obumiéra, wędnieje i usycha, drugi raz przeciwnie nie przestaje żyć, owszem niekiedy rośnie dalej, jak w garliczce (*Physalis alkekengi*). W pierwszym razie zowie się *wędniejącym* (*marcescens*), w drugim *wzrastającym* (*accrescens*).

§ 419. **Korona** (*corolla*). — Korona jestto okrywa kwiatowa barwna, wewnętrzna względem kielicha, składająca się z części albo zachowujących bez przerwy ułożenie wężownicowe listeczków kielicha (§ 359), albo też, co częściej, leżących w okółku, naprzemian względem tychże listeczków. Wiemy już że części te zowią się *płatkami* (*petala*; od *πεταλον*, liść). Źródłostów ten i samo imię listków, nadawane w zwykłej mowie płatkom róży i wielu innych kwiatów, dowodzą, że myśl porównania ich z prawdziwemi liśćmi, nie jest wcale nową. Staraliśmy się okazać że w wielu razach przejście od działek (których liściowate przyrodzenie nie ulega wątpliwości) do płatków, dzieje się prawie nieznacznie, i że prawa, jakie się dają wyciągnąć ze stosunków położenia, zastosować się dają zarówno do jednych i do drugich. Obaczmy teraz czyli budowa anatomiczna płatków wspiera także to porównanie.

§ 420. Płatek uważany z osobna, jest blaszką różnej postaci, zwykle rozszerzoną u góry, a zwężoną u dołu; często zwężenie to jest dosyć długie, jak np. w płatkach goździku (fig. 286, 2, *o*), i wtedy zowie się *paznogciem* (*unguis*), rozszerzenie zaś górne *blaszką* albo *krajem* (*lamina*, *limbus*; fig. 286, 2, *l*). Paznogieć jest tém samém względem kraju, czém w liściu ogonek względem blaszki; wiązki włókno-naczynne przebiegają w nim zbliżone i połączone z sobą, w kraju zaś oddalają się od siebie i rozpościągają. Wiązki te są złożone z cewek rozkręcalnych i komórek wydłużonych; odstępy między niemi zajęte są przez tkankę komórkową, która albo je całkowicie zapełnia (w którym to razie płatek *całobrzęgi* opisany jest linią krzywą jednociągłą); albo też przerywa się ku brzegom, a kończyny wiązek wystają w postaci zębów, *strzępek* (*fimbriae*; fig. 286, *p*), łat mniej więcej głębszych. Różne te odmiany oznaczane bywają wyrazami któreśmy wymienił przy liściach. Płatki będąc daleko cieńszymi od liści,

nie posiadają wewnątrz rozmaitych warstw, tak jak tamte. Naskórek ich mniej się także różni od reszty tkanki; na powierzchni jednak zewnętrznej jest nieco wyraźniejszy, a nawet opatrzone niekiedy szparkami, w ogóle jednak dosyć rzadkiemi i nie tak stałe obecniemi jak w liściu. Powierzchnia wewnętrzna nie ma ich wcale, a komórki jej bywają często wydęte na zewnątrz i nadają jej przezto pozór drobnego jaszczuru albo aksamitu.

§ 421. Płatki ukazują się nasamprzód w postaci małych komórkowych brodawczek, podobnie jak listeczki kielicha; następnie rozszerzają się w krążek nieco wklęsły, lubznaczony zmarszczką podłużną od strony wewnętrznej; wtedy niczem się nie różnią od młodziuchnych liści i rosna też podług tych samych praw, co i one, to jest tylko przy nasadzie, tak, iż część dolna zawsze na samym ostatku się ukazuje, a paznokieć tworzy się dopiero po kraju. W rozwijaniu się tém, kilka okoliczności zasługuje na szczególną uwagę: 1<sup>o</sup> części korony jednopłatkowej, już o tym czasie są spojone z sobą (fig. 278, p), gdyż małe brodawczki stanowiące pierwszy początek płatków, od chwili w której ich dostrzedz można, łączą się jedne z drugimi za pomocą wydłużonej obrączki, ponad którą tylko zlekka wystają. Nie można więc powiedzieć, że się zrastają, wychodzą bowiem na jaw



278.

279.

już zrosnięte. 2<sup>o</sup> Lubo płatki jako liście niższe lub zewnętrzniejsze od pręcików na osi, powinnyby się wcześniej od tychże rozwijać, jednakże rzeczywiście przeciwnie się dzieje, rozwijają się bowiem później; w bardzo młodych pączkach, widać obok wcześniejszych i znacznie już wykształconych pręcików, płatki jeszcze w postaci małych łusk (fig. 279).

278—279. Młodziuchne pąki, w których odwinięte podziałki kielicha c dla pokazania na jakim stopniu rozwinięcia, stoją pręciki względem płatków.

278. Pąk kwiatu jednopłatkowego naparstnicy (*Digitalis purpurea*).

279. Pąk kwiatu wielopłatkowego jednego z bodziszków (*Geranium striatum*).

3<sup>o</sup> Jakakolwiek barwę posiadać będą płatki wykształcone, zawsze one w tym pierwszym okresie swego życia, są albo blade—albo nawet mocno zielone.

§ 422. W ogóle korony bardzo rzadko bywają zielone, jednakże mamy tego przykłady jak w niektórych sepotach (*Cobaea*), kilku trojeściowatych (*Hoya viridiflora*, *Gonolobus viridiflorus*, *Pentatropis spiralis*), it. d., it. d. Lec i wtedy barwa ta jest najczęściej blade, i zmieszana z innemi albo też obok niej znajdują się na płatkach prążki lub plamy różnobarwne. Obecność zaś zieleni rzadką jest w komórkach korony, które zwykle, albo są próżne, albo napełnione ziarenkami lub płynami innej barwy (§ 24).

§ 423. Mówiąc że zieleni nie znajduje się w płatkach, wyrażamy tem samem, że zjawiska chemiczne oddychania nie odbywają się u nich tak jak w liściach (§ 285). Korony i wszystkie inne nie zielone części kwiatu, pochłaniają pod wpływem światła kwasoród, a wyziewają kwas węglowy. Obecność więc znacznej liczby kwiatów, posiadających mniej więcej świetne barwy, ma we dnie wpływ wcale przeciwny na atmosferę od tego, jaki wywiera wielka ilość liści zielonych. Obok tego kwiaty wyziewają także często olejki lotne i pierwiastki wonne, nagromadzone w tych częściach rośliny.

§ 424. Utkanie płatków jest rozmaite, najczęściej miękkie i wątkie, niekiedy zaś grube i mięsiste (*Stapelia*), niekiedy suche, na podobieństwo papieru lub błony (wrzos), niekiedy twarde i tęgie (*Xylophia*).

§ 425. Ponieważ właściwe płatki znajdują się tylko w roślinach dwuliściennych, przeto nerwy ich muszą się rozgałęziać i kończyć siatką powstającą z połączenia ostatnich ich odnóżeń. Nerwy podrzędne czyli żyłki, rozchodzą się od nerwu głównego, już to w różnych wysokościach, jak w liściu pierzasto-nerwowym; już też częstokroć przy nasadzie kraju, jak w liściu dłoniasto-nerwowym; ostatni ten rozkład przypominający rozbiegające się promienie rozpostartego wachlarza, oznaczonym bywa przymiotnikiem, który się wtedy dodaje płatkowi (pł. *wachlarzowato-żyłkowy* [p. *flabellato-venosum*]). Nerw główny rozciąga się czasem aż do wierzchołka, a czasem nawet i poza wierzchołek płatka, w postaci małego ostrego końca (*cuspis*, zkad: *petalum cuspidatum*, płatek *ostrokończasty*); częściej jednak rozdwa się; jedna z połówek

jego i  
pows  
plate  
tek s  
nasa  
zowi  
od k  
moga  
ma ic  
jedna  
drugi  
zowi  
lub ni  
podob  
okreś  
średn  
wyżej  
wie;  
dziel  
dawa  
wny  
U  
ciąga  
niew  
pełn  
ksz  
niu  
Pi  
zenie  
znog  
i moż  
ele p  
n gór  
róznc  
możn  
wnie  
prze  
równ

jego idzie w prawo, druga w lewo. Ztąd na wierzchołku płątka powstaje częstokroć płytkie wcięcie lub zatoka, od której płatek przybiera nazwę *wciętego* (p. *emarginatum*), a jeśli płatek stopniowo się rozszerza, poczynając od wążluchnej swęj nasady ku wierzchołkowi dwułatowemu (z powodu wcięcia), zowie się wtedy *przewrotnie-sercowatym* (p. *obcordatum*), od kształtu przewróconego serca. Wiązki nerwu głównego mogą się dzielić nierówno, tak, że jedna połowa płątka otrzyma ich więcej niż druga, i w skutek tego mocniej się rozwija; jedna przeto strona płątka będzie większa od drugiej, a oś jego ulegnie zboczeniu; takie płatki zowią się *nierówno-bocznymi* (p. *inaequilatera*) lub ukośnemi (p. *obliqua*, *oblique obcordata*; podobnież się dodaje wszelki inny przymiotnik, określający bliżej ich postać). Podział nerwu średniego, a przeto i kraju, może się zaczynać wyżej lub niżej, niekiedy nawet tuż przy podstawie; wtedy płatek jest dwu-wrębny, lub dwudzielny, a nawet (jeśli nie posiada paznogcia), może się wydawać złożonym z dwóch płatków obocznych (fig. 280) różnych lub nierównych.




Uważać należy, że niekształtność płątka ukośnego, nie pociąga za sobą niekształtności korony, której jest częścią, ponieważ inne ją składające płatki mogą w takim razie być zupełnie do niego podobne, a ztąd wyniknie całość zupełnie kształtna: można to widzieć w-wielu koronach o przedkwitnieniu skręconém, np. w śluzowatych.

Płatki przytwierdzone są zwykle wążką nasadą, lecz zwężenie to częstokroć nie przedłuża się, płatki więc są bezpaznogciowe (p. *sessilia*). Niekiedy jednak nasada jest szeroka i może nawet dochodzić szerokości samego kraju; np. w kwiecie pomarańczy. Jeśli płatek wążki u spodu nie rozszerza się u góry, wtedy przybiera postać małej wstążeczki i nazywa się *równowązkim* (p. *lineare*). Pomiędzy tą postacią a kołem, można w płatkach napotkać wszystkie pośrednie postaci równie jak w liściach. Często się zdarza, że dwie strony kraju przedłużają się u dołu w dwie łaty tępe, albo we dwa kąty równoległe lub ukośne: wtedy płatki zowią się *sercowatemi*

280. Płatek muchotrzwiewu (*Alsine media*).—l Kraj.—o Paznogcieć.

(p. cordata fig. 281), albo *strzałkowatemi* (p. sagittata), albo *oszczepowatemi* (p. hastata).

Kraj może być płaski, często jednakże przedstawia powierzchnią krzywą, i obrócony jest stroną wklęsłą ku środkowi kwiatu. Niekiedy w takim razie nerw główny tworzy na zewnątrz dużą i ostro zakończoną wydatność, podobną do nosa czółnowego, z kądem też płatek przybiera wraz z postacią nazwę *czółenkowatego* (p. naviculare, cymbiforme). Czasami bywa także tak odchylony, że wierzchołek jego dotyka podstawy, np. u wielu baldaszkowych (fig. 282).



281.

282.

U większej części kwiatów płatki są gładkie; jednakże u wielu, okryte są meszkiem zwykle krótkim, cienkim i rzadkim, niekiedy zaś gęstszym; w ogóle meszek ten znajduje się częściej i obficie, a nawet prawie wyłącznie na powierzchni zewnętrznej, podobnie jak w liściach i działkach. Lubo na płatkach ukazuje się nie tak pospolicie i nie tak gęsto, jak na innych częściach rośliny, zresztą jednakże tego samego jest przyrodzenia. Tak np. w roślinach odznaczających się włosami gwiazdkowatemi, jak serecznikowate (*Bombaceae*), włosy korony posiadają też samą postać.

Przymiotnik, którym w opisach roślin, określamy postać płatka, stosuje się właściwie do kraju. Kiedy mówimy o płatkach paznogciowych okrągłych, ząbkowanych, wklęsłych, znaczy to samo, jak gdybyśmy powiedzieli: płatki opatrzone paznogciem, o kraju okrągłym, ząbkowanym i wklęsłym.

§ 426. Nazywamy koronę dwu-trój-cztęro-pięciopłatkową, i t. d., podług tego jak się składa z dwóch, trzech, czterech osobnych płatków. Widzieliśmy, że liczba tychże jest zwykle równa liczbie części kielicha, względem których leżą właśnie naprzemian, lecz że mogą się także znaleźć niektóre wyjątki od tego prawidła (§ 379), a to w skutek stłumienia jednej lub więcej części w okółku korony lub kielicha: tak np. w kwiecie kasztanu dzikiego, kielich jest pięcio-ząbny, gdy tymczasem

281. Płatek janowcu (*Genista candicans*).—l Kraj.—o Paznogciec.

282. Płatek wietrzniku (*Eryngium campestre*).

płatków jest tylko cztery, które leżą naprzemian względem czterech zębów kielicha; miejsce zaś piątego płatka jest próżne: w nasturcji pięciolistnej (fig. 248), mamy tylko dwa płatki, a pięć miejsc próżnych. Wyrażamy okoliczność tę mówiąc, że korona jest *czteró* lub *dwu-płatkowa w skutek płonności*: i słusznie, gdyż widzimy, że w innych kasztanach, a nawet kwiatach tego samego gatunku pojawia się piąty płatek; w niektórych gatunkach nasturcji znajduje ich się stale pięć. Prawie we wszystkich strąkowych, liczba płatków jest pięć, w rodzaju zaś *Amorpha*, znajdujemy tylko jeden płatek umieszczony pomiędzy dwiema z pięciu części kielicha, i w tym to przypadku mówimy, że korona jest *samotno-płatkową* (c. unipetala); której nie należy mieszać z *jedno-płatkową* (monopetala) [§ 364].

§ 427. W opisach wyrazić potrzeba, oprócz ilości, kierunku płatków (stojące, rozwarte, otwarte, odgięte, § 413) względem osi kwiatowej; kierunek kraju względem paznogcia, z którym niekiedy tworzy kąt, długość płatków względem kielicha, ich postać, o której odmianach mówiliśmy powyżej, i która może, równie jak wielkość, być jednakowa, lub niejednakowa, we wszystkich płatkach jednego kwiatu. W ostatnim przypadku, kiedy korona wielopłatkowa jest niekształtna, opisujemy osobno płatki różniące się od innych, oznaczając położenie ich względem osi kwiatostanu. Kiedy niekształtność jest jednakowa w kwiatkach wielu roślin, dosyć jest jednego wyrazu aby dać poznać głównejsze jej rysy. Takim jest wyraz *motylkowy*, zastosowany do koron wszystkich naszych strąkowych. Z pięciu płatków (fig. 283), jeden wyższy *e*, to jest obrócony ku osi, większy i zwykle wpół załamany, obejmuje cztery inne; zowie się on *żagielkiem* (vexillum); dwa boczne, *a*, nazwane *skrzydełkami* (alae), okrywają znowu dwa niższe, *b*, które albo są zbliżone tylko, albo też zrosnięte z sobą brzegiem, i tworzą razem *łódkę* (carina).


Niektóre odmiany koron wielopłatkowych kształtnych, które znajdujemy w wielu bardzo kwiatkach (zwykle we wszystkich



283.

283. Kwiat jednej z motylkowych (groszku wonnego, *Lathyrus odoratus*). — c Kielich. — e Żagielek — a Skrzydełka. — b Łódka.

jednej rodziny), otrzymały także osobne nazwiska. Nazywamy koronę *krzyżową* (cruciformis, fig. 284) kiedy się składa z czterech płatków w krzyż ułożonych, po dwa względem siebie naprzeciwległych; *różową* (rosacea, fig. 285), jeśli posiada pięć płatków bezpaznogciowych i otwartych, ułożonych jak w róży pojedynczej; *goździkową* (caryophyllacea; fig. 286), jeśli ma pięć płatków opatrzonych długimi paznogciami.



284. Kwiat laku (*Cheiranthus cheiri*).—c Działki kielicha, z których dwie zewnętrzne, przedłużają się u dołu w garbek.—p p Płatki.—e Najwyższe pręciki, z których widać tylko szczyt pylników.

285. Kwiat róży (*Rosa rubiginosa*).—b Przykwiatek.—ct Rurka kielicha.—cf cf Listeczki kielicha.—p p p p p Płatki.—e Pręciki.

286. 1. Kwiat goździku (*Dianthus monspessulanus*).—b Przykwiatki.—c Kielich.—p p Płatki wraz z paznogciami swemi o zbliżonemi w rurkę.—e Pręciki.—2. Oddzielny płatek kwiatu powyższego.—o Paznogieć.—l Kraj.

§ 428. Większa część szczegółów których udzieliłiśmy mówiąc o płatkach w ogóle, daje się zastosować i do tych, które w połączeniu stanowią *koronę jednopłatkową*. Rozumié się jednakże iż tu nie może być mowy o odrębnym kraju, z tego powodu nazywamy tymże samym wyrazem *kraj* (fig. 287, *l*); owe wyższe części, wolne na swym obwodzie, a postaci ich oznaczamy podobnie jak w osobnych płatkach; część dolna, w której płatki są zrosnięte brzegami, nazywa się *ruką* (tubus; fig. 287—94, *l*), posiada bowiem zwykle postać takową; wejście do rurki, czyli koło wewnętrzne, ponad którym płatki oddzielają się od siebie, jest *gardzielą* (faux).

Nazwy te zresztą, stosują się także do kielicha, i wszelkiego jednolisteczkowego okwiatu, podobnie, jak znowu wyrazy używane do oznaczenia (§ 414) rozmaitych stopni zrosnięcia się części kielicha lub okwiatu, czyli, co na jedno wychodzi do oznaczenia rozmaitej głębokości ich rozcięć, służą także i koronie jednopłatkowej.

§ 429. Za to, wiele mamy oddzielnych nazwisk wyrażających pewne postaci korony jednopłatkowej, wspólnie wielu kwiatom. Zpomiedzy kształtnych, wymienimy następujące:

*Korona rurkowata* (tubulosa), w której kraj zachowując kierunek rurki, długiej i obłej, przedłuża ją niejako (np. czerwiada fig. 287; żywokost fig. 292).

*Léjkowata* (infundibuliformis), której kraj przypomina postać léjka, rozszerzając się począwszy od wierzchu rurki w stożek przewrócony (np. w tytuniu, fig. 289).


*Tacowata* (hypocrateriformis), w której kraj mający kształt talerza bardzo wypłaszczonego, wznosi się nad rurką prostą (np. w pierwiosnkach; fig. 290).

*Kółkowa* (rotata), kiedy podziałki kraju rozłożone są na podobieństwo promieni koła, którego kłódkę przedstawia rurka bardzo krótka (np. w pacierzycze [*Myosotis*]; fig. 291).

*Gwiazdkowata* (stellata), podobna, lecz o działkach ostro zakończonych (np. w przytulji [*Galium*]).

*Dzbanuszkowata* (urceolata), kiedy kraju niema prawie wcale, rurka zaś jest wydęta w środku, a zwężona na obu końcach (np. we wrzosie popielatym; fig. 288).

*Dzwonkowata* (campanulata), której rurka rozszerzając się stopniowo, coraz bardziej aż po sam kraj, przedstawia postać dzwonka (np. w dzwonek; fig. 293).



287. Kwiat czterwiody (*Spigelia marylandica*).  
 288. — wrzосу (*Erica cinerea*).  
 289. — tytonia (*Nicotiana tabacum*).  
 290. — pierwiosnku (*Primula elatior*).—a Pylniki naprzeciwpłatkowe w gardzieli korony.  
 291. — niezapominajki (*Myosotis palustris*).—Zagięcie korony, tworzące wydatności przy wejściu do rurki, i naprzeciwnie względem łatek korony.  
 292. — żywokostu (*Symphytum officinale*).—Przy r wklęsłość zagiętych wystających na wewnątrz rurki.  
 293. — dzwonka (*Campanula rotundifolia*).  
 294. — naparstnicy (*Digitalis purpurea*).—Ostatnia ta korona jest już cokolwiek niekształtna.

*Naparstkowata* (*digitaliformis*), mająca postać naparstka, lub dzwonu wydłużonego (fig. 294).

*Koszyczkowata* (*calathiformis*), półkulista i wklęsła nakształt czarki. Postać ta właściwsza jest kielichom.

*Kieliszkowata* (*cyathiformis*), mająca kształt kieliszka, to jest: której wklęsłość przedstawia stożek przewrócony.

Zpomiędzy niekształtnych:

*Języczkowata* (*ligularis*; fig. 295); której rurka na pewnym punkcie rozszczepia się z jednej strony, i odchyła w bok w postaci płaskiego języczka (*ligula*), zakończonego kilku małymi ząbkami (*l*). Języczki można także uważać za powstałe ze zrośnięcia z sobą podziałek równowazkich kraju, a to albo we wszystkich (jak w węży-mordzie, brodawniku i innych podróżnikowych) albo też tylko w niektórych (jak w przewiertniu). Ostatnia ta odmiana ma wiele podobieństwa z następującą:

*Wargowa* (*labiata*; fig. 296), której podziałki tak są ułożone, że tworzą dwie jakby wargi otwarte; z tych wyższa składa się z dwóch podziałek, niższa zaś z trzech (np. w szalwji i wszystkich innych roślinach tej samej rodziny). Kielich bywa wtedy także dwuwargowy, lecz odwrotnie, to jest, że trzy jego części obrócone są do góry, a dwie na dół.

*Poczwarzna* (*personata*; fig. 297), o dwóch wargach jak poprzednio, lecz zbliżonych i zamkniętych przez część wydętą wargi wyższej *p*, która się zowie *podniebieniem* (*palatum*, np. w wyzlinie).

Rurka może także przedstawiać odrębną niekształtności, np. w krzywoszyju (*Lycopsis*), gdzie kształtny kraj, siedzi na zgiętej rurce.



296.



295.



297.

\* 295—297. Korony jednopłatkowe niekształtne.— *c* Kielich.— *p* Korona.— *t* Jęz. rurka.— *l* Kraj — *g* Gardziel.— *s* Znamiona i wierzchołki szyjki.

§ 430. Wymieńmy tu jeszcze niektóre niezwykle i dziwaczne postaci płatków. Czasami kraj zamiast być płaskim, lub zlekka tylko wklęsłym, zakrzywia się na podobieństwo szyszaka (*p. galeatum*: np. w tojadzie [*Aconitum*]), kapturka (*p. cuculliforme*: np. w orliku), lub trąbki (np. w ciemierniku), i t. d., i t. d. Widzimy iż w takich razach, pożyczamy nazwy jakiego pospolitego przedmiotu, którego postać przypominają płatki. Jeśli te ostatnie przedłużają się na zewnątrz lub na dół w rodzaj woreczka albo ostrogi, nazywają się *ostrogowemi* (*p. calcarata*), jak np. w fiołku lub Infiance (*Linaria*). Niekiedy zamiast ostrogi, znajdujemy tylko zagięcie krótsze lub dłuższe, mniejsze albo bardziej spłaszczone, którego wyrażenie otwiera się, albo na wewnątrz albo na zewnątrz kwiatu (jak w ogóreczniku, pacierzycze [fig. 291] i wielu innych ogórecznikowatych [fig. 292]). Zamiast wydatności wklęsłej, może istnieć wydatność mięszka, powstająca ze zgrubienia i rozciągnięcia się tkanki płatków (jak w wielu trojęściowatych; fig. 708 a). W tym ostatnim przypadku, gdzie korona jest jednopłatkowa i kształtna, wydatności owe leżą na przeciw łat i tworzą okrąg wewnętrzny, niby rodzaj korony; podług zaś różnych kształtów jakie przedstawiają, otrzymały różne nazwiska.

Widzieliśmy już (§ 377) że dosyć często mają postać blaszki, dłuższej lub krótszej, która podwaja niejako kraj, czyto od zewnątrz (jak w niektórych rezedach), czy też od wewnątrz (jak w wielu goździkowatych, np. w firletkach [fig. 298], wyżpinach [*Cucubalus*], i t. d.), i która zdaje się powstawać przez rozdwojenie. Płatki zowią się wtedy *przysadkowemi* (*appendiculata*).

295. Kwiat szeleściku (*Catananche caerulea*). — Kielich o kroju pięciowrębnym *c* jest u dołu zrosnięty z zawiązkiem *o*. Pylniki pręcików *e* zrosnięte w rurkę *a*, przez którą przechodzi szyjka zakończona znamieniem dwuwrębnym *s*.

296. Kwiat szalwii łąkowej (*Salvia pratensis*).

297. — wyżlinu większego (*Antirrhinum majus*). — Rurka korony przedłuża się u spodu w garbek *a*, gardziel zaś zamknięta jest podniebieniem *p*.

298. Płatek gatunku firletki *Lychmis fulgens*, widziany od zewnątrz. — *o* Paznogieć. — *l* Kraj. — *a* Przysadek.



298.

§ 431. Trwałość korony jest rozmaita, podobnie jak trwałość kielicha (§ 418), zwykle jednakże daleko jest krótszą. Korony opadają czasami w chwili otwarcia się kwiatu, prawie zawsze po zapłodnieniu; jeśli, zaś zostają dłużej, to tylko zeschnięte, czyli inaczej: *więdniejące* (marcescentes) np. we wrzosach, dzwonkach. Korona jednopłatkowa oddziela się zawsze w całości.

## NARZĘDZIA PŁCIOWE.


## P R Ę C I K I.

§ 432. Dotychczas mówiąc o pręcikach, uważaliśmy je tylko co do stosunków ich położenia względem innych części kwiatu. Postać zaś ich i budowa właściwa, prawie wcale nas nie zajmowała; przedstawiliśmy je tylko jako listeczki wązkie i zgrubiałe u góry we dwa ciała, z których każde ciągnie się w pewnej rozległości wzdłuż jednego z brzegów (§ 356); albo co częściej bywa zmienione w cieniuchny walec, noszący na wierzchołku swym owe dwa ciała (§ 358). Nazywamy *pylnikiem* (anthera) zgrubienie wierzchołkowe pręcika, *nitką* (filamentum) część jego niższą, z powodu postaci jaką zwykle posiada. Pylnik jest częścią trzęściwą pręcika, a kiedy albo się wcale nie rozwinię, albo tylko niedokładnie, pręcik niezdatny do spełnienia swych czynności, przybiera nazwę *płatnego* (st. abortivum, effoetum); nie jest zaś takim, jeśli samęj tylko nitki niedostaje, w którymto razie pylnik zowie się *beznitkowym*. Odkładamy na koniec tego rozdziału rozbiór budowy i sposobu rozwijania się pylnika, tudzież czynności jego, które tak się ściśle łączą z czynnościami słupek, że najstosowniej będzie, wyłożywszy rzecz o jednym, przejść zaraz do drugiego; zaczniemy tu zaś od badania piętn, zewnętrznych i ogólnych pręcika, uważając go najprzód oddzielnie, a potem w połączeniu z innymi, o ile takowe należą do tego samego kwiatu.

§ 433. *Nitka* (filamentum). — Nitka której nazwa wyraża najzwyczajszą jej postać, ukazuje się w rzeczy samęj najczęściej, jako ciało wydłużone w cieniuchny walec, lub zwięzające się nieznacznie od podstawy ku wierzchołkowi (*f. filiforme*); rzadziej daleko grubieje u góry maczugowato (*f. clavatum*).

Częstokroć jest dosyć gruba i utrzymuje się o swęj moey; jednakowo niekiedy (jak w trawach, babce, brodniku [*Littorella*], i t. d.) posiada zaledwie grubość i zbitość włosa, i nazywa się też *włoskowatą* (*capillaris*). Nie rzadko można ją widzieć spłaszczoną lub równowazką u spodu, a zwężającą się u góry (*n. szydłowata; subulatum*). Jeśli jest płaska w całej swej rozległości, tworzy niejako wstążeczkę wydłużoną, zwykle całobrzegą, rzadziej karbowaną (np. w hebdzie [*Sambucus ebulus*]) i nakoniec może się rozszerzyć w blaszkę, która w pewnych kwiatkach (w kwiatotrzcinie i innych aksamitoweowatych, w grzybieniu białym) przybiera pozór płatka.

Nitka zachowuje zwykle od końca do końca, jeden i ten sam kierunek, mamy jednakże kilka przykładów, gdzie go zmienia nagle pod kątem, mniej więcej tępym, który porównać można do kolana, zkad też nitka zowie się wtedy *kolankowatą* (*geniculatum*).



299.

300.

§ 434. Widzieliśmy dopiéro, że dosć często nitka bywa u spodu rozszerzoną; wtedy zamiast zwężać się stopniowo ku górze, może w pewnej wysokości przejść nagle w postaci blaszki w postać nitkowatą (np. w *Peganum harmala*, tamaryszku pięcio-pręcikowym, fig. 324). Rozszerzenie to dolne, które się często przedłuża mniej więcej po obu stronach w łate lub ostrze wolne, przypomina rozszerzenie jakie tworzy pochwa liści, przy nasadzie ogonka, który też można porównać do części zwężonej nitki.

§ 435. Zdarza się jednakże niekiedy, że rozszerzenie owó dolne jest raczej częścią przydatkową, zrosniętą z nitką, względem której leży albo na wewnątrz (jak w parolistniku [*Zygophyllum fabago*] fig. 300 i wielu innych parolistnikowatych, biegunciecznikowatych i t. d.), albo na zewnątrz (w ogóreczniku, fig. 299, w trój-

299. Pręcik ogórecznika (*Borrago officinalis*).—*l* Nitka siedząca na wewnątrz przysadka *a* przedłużonego ku wewnątrz w rożek.—*l* Woreczki pylnika.


300. Pręcik parolistniku (*Zygophyllum fabago*).—*f* Nitka siedząca na wewnątrz przysadka *a*.

natce [*Trichilia*] i wielu innych miedlinowatych). Te dwa przypadki w których nitka zowie się przysadkową, odpowiadają widocznie tym w których płatek nosi podobne imię (§ 429); a w drugim z nich, pręcik przyrośnięty do blaszki leżącej względem niego na zewnątrz, znajduje się w tym samym do niej stosunku, w jakim stoi do płatka, kiedy się zrasta z jego nasadą, stanowiąc część okółka bezpośrednio naprzeciwległego (§ 376, 402). Przysadek dolny nitki nosi różne nazwiska, według różnej postaci jaką przybiera, np. gruczołów, łusk i t. p., którym dodaje się przymiotnik *pręciko-nosny* (staminiferus).

§ 436. **Pylnik** (*anthera*). Przeciawszy wpoprzecz pylnik to jest zgrubienie kończące pręcik, spostrzegamy, iż ono nie jest ciałem mięszem, lecz że jest wydrążone wewnątrz (fig. 315, 318, 2) i napełnione drobnociuchnym proszkiem. We wszystkich przytoczonych przykładach, zgrubienie było podwójne, a przeto i wydrążenie także. Nazywamy *woreczkiem* (loculus v. theca) każde z wydrążeń pylnika; a kiedy ich się znajduje dwa na końcu nitki (co się najpospoliciej zdarza), mówimy że pylnik jest *dwuworeczkowym* (*anthera bilocularis* albo *ditheca*). Niekiedy bywa *jednoworeczkowym* (*unilocularis* albo *monotheca*; fig. 310, 311), lecz to daleko rzadziej. Na koniec nadzwyczaj rzadko znajdujemy go *czteroworeczkowym* (*quadrilocularis* albo *tetralheca*) po zupełnym nawet wykształceniu (fig. 314, 315). Aby się dowiedzieć ile pylnik ma woreczków, nie koniecznie go trzeba przecinać. Łatwo to można poznać od zewnątrz, ponieważ każdy woreczek, tworzy osobną wydatność, a nadto po zupełnym rozwinięciu się pylnika, każdy z nich otwiera się dobrowolnie dziurką lub częścią szparą, przy czém wysypuje się proszek je napełniający, a który zowiemy *pyłkiem* (pollen).

Woreczki więc pylnika są zrazu zupełnie zamknięte, a postać ich jest różna w różnych roślinach. Między postacią małej kulki (fig. 301), i walca długiego i cienkiego, czy to prostego (*woreczek-równowązki*; fig. 302, 1), czy też pogiętego (*woreczek-robaczkowaty*, fig. 302, 2; 312), znaleźć można wszystkie pośrednie stopnie. Najczęściej jednak woreczki bywają mniej więcej podłużno-jajowate (fig. 303, 304, *l.*); niekiedy woreczek zwęża się kończatą w wierzchu, a wtedy pylnik jest *ostrokończysty* (np. w ogóreczniku, fig. 299); jeśli

oba woreczki są zrosnięte, *dwurogi* (*bicornis*) jeśli są oddzielone od siebie (fig. 319, 307, *l*); każdy z tych rożków może się dzielić widelkowo, a zład pylnik będzie *czwororogim* (*quadricornis* fig. 321).



§ 437. Oba woreczki pylnika dwuworeczkowego stykają się niekiedy bezpośrednio z sobą, będąc zrosnięte odpowiednimi powierzchniami. Mogą one siedzieć na wierzchołku nitki, a to na stronie jej wewnętrznej albo zewnętrznej, lub też być przedzielone całą jej miąższością; we wszystkich tych przypadkach pylnik zowie się *przyrostym* (a. *adnata*) do nitki (fig. 304); najczęściej jednakże nie nitka sama leży pomiędzy woreczkami, ale ciało które ją niejako przedłuża, lecz które posiada odmienną budowę i nazywa się *zwórką* (*connectivum*), dlatego że łączy oba woreczki. Wymiary zwórki są w stosunku do wymiarów woreczków bardzo rozmaite. Raz, równej z temż długości, zwórka łączy je zupełnie, od końca do końca; drugi raz jest od nich krótszą i może przedstawiać punkcik tylko (fig. 301, 302, *c*), lub krótszą linijkę; to znowu przeciwnie, rozwija się bardzo znacznie, a w takim razie zachowuje kierunek nitki i przedłuża się ponad woreczki w krótką oś (fig. 306), lub bryłkę mniejszą lub większą, maczu-

301—312. Różne pylniki wraz z wierzchołkiem nitki *l*.—*l* Woreczki.  
*c* Zwórka.

301. Pylnik szczyru (*Mercurialis annua*).


302. — z *Acalypha alopecuroidea*.—1. W pąku.—2. W kwiecie otwartym.

303. — migdału.—1. Z przodu.—2. Z tyłu.

304. — ukośnicy (*Begonia muricata*).

305. — wykliny (*Poa compressa*).

gowatą, języczkowatą (fig. 307), lub stożkowatą (fig. 308), i t. d., i t. d., albo wreszcie w rozszerzenie błoniaste (fig. 317);



nierównie rzadziej ciągnie się prostopadłe do nitki, na podobieństwo drążka wagi, na którego kończynach siedzą woreczki (fig. 309, c).

Obaczmy poniżej, że zwórka różni się od woreczków co do budowy swojej. Na pierwszy zaś rzut oka różni się barwą, która odbija od mniej więcej ciemno-żółtej barwy woreczków.

306. Pylnik płochowcu (*Nerium oleander*).

307. — z *Byrsonima bicorniculata*. Woreczki próżne u wierzchu oddzielają się od zwórki w postaci dwóch maleńkich rożków.

308. — z *Humiria balsamifera*. Przykład nitki *f* obrzeżonej zębami gruczołowatemi.

309. — z szalwii zwyczajnej (*Salvia officinalis*).—*lf* Woreczek płodny napełniony pyłkiem.—*ls* Woreczek pusty.

310. — Jednoworeczkowy z *Styphelia laeta* (Epacrideae) widziany z przodu, otwarty '1', i z tyłu ''.

311. — topolówki lekarskiej (*Althaea officinalis*) przed pęknięciem.

312. — przestępu zwyczajnego (*Bryonia dioica*).

§ 438. Kiedy woreczki przyczepione są do zwórki w większej części swęj długości, mówimy, że są do niej przyrosłe; nazywamy je zaś wolnemi, jeśli w bardzo tylko małej rozległości z nią są zrosnięte. Punkt przyczepienia może wtedy przypadać około środka woreczków lub u spodu, w którymto razie są wzniesione; albo też u góry, a wtedy są wiszące. Jeśli przytwierdzone w całej środkowej części, są tylko wolne na obu krańcach, przybierają postać długiego  $x$ , (fig. 305); jeśli zaś przymocowane są częścią górną, dolne zaś końce oddalają się nieco od siebie, wtedy podług tego jak owe końce są ostre lub tępe, pylnik zowie się strzałkowatym (fig. 306), lub sercowatym (fig. 300, 303, 326): ostatni ten przypadek jest nadzwyczaj częsty.

§ 439. Zwórka może przedłużać nitkę, zachowując ten sam kierunek i prawie tę samą grubość; wtedy, w razie gdy woreczki są przyrosłe, pylnik nie może zmieniać położenia swego względem nitki: jest *nieruchomym* (*immobilis*; fig. 304, 306, 307, 315). Lecz najczęściej wierzchołek nitki zcieńcza się i kończy kątem ostrym przy zwórcie, czy to w środku takowej (fig. 207, *c*), czy też w bliskości jednej z kończyn, wtedy pylnik staje się ruchomym względem nitki i przybiera różne położenia, według kierunku jaki zachowują kwiaty: jest *wahającym się* (*versatilis*; fig. 310, 267).

§ 440. Kiedy pylnik jest jednoworeczkowy, nitka przyczepia się bezpośrednio do woreczka (fig. 310). Rozumié się że wtedy napróżno szukalibyśmy zwórki; niemniej jednakże bywa ona niekiedy w takim razie zastąpioną, przez ciało różne od reszty nitki, i leżące pomiędzy nią a woreczkiem; domyślać się wtedy wypada, że drugi woreczek nie rozwinął się tylko. W istocie znajdujemy czasami jego ślady, np. w szafwiji, gdzie długa, poprzecznie idąca zwórka, na jednym końcu nosi woreczek wykształcony i papełniony pyłkiem, na drugim zaś woreczek wyrodzony i nieposiadający pyłku (fig. 309): w takim razie pylnik jest jednoworeczkowym tylko w skutek płonności. Nie trzeba go także brać za jednoworeczkowy w dwóch innych, a sobie zupełnie przeciwnych przypadkach, gdzie wszakże łatwo zająć może omyłka, t. j. tam gdzie oba woreczki oddalone od siebie, mogłyby być wzięte za dwa pylniki, tudzież tam gdzie ściśle zrastając się z sobą od samego spodu, zdają się tworzyć jeden tylko woreczek.

§ 4-  
worecz  
my już  
worec  
nam na  
w stron  
lub zw  
legle l  
dy nac  
stopad  
kierun  
(longi  
(trans  
się wy  
czne z


318.

314.

315.

316.

§ 441. **Pękaniem** (*dehiscencia*) nazywamy otwieranie się woreczków, mające za cel wypróżnienie pyłku. Powiedzieliśmy już, że się to najczęściej dzieje szparą podłużną względem woreczków. Szpara ta, której miejsce i kierunek wskazuje nam najprzód prążka i rowek (fig. 303, 304), skierowana jest w stronę przeciwną względem punktu osady woreczka na nitce lub zwórcie. Po największej części woreczki bywają równoległe lub nieco nachylone względem nitki lub zwórki, lecz kiedy nachyła się bardziej i przybiorą położenie mniej więcej prostopadłe do niej (fig. 326, *ag*), linja pękania wéźmie podobny kierunek: w pierwszym razie mówimy, że pylnik pęka wzdłuż (*longitudinaliter*, fig. 319); w drugim że pęka w poprzek (*transverse*; fig. 311); w ostatnim tym przypadku pylnik może się wydawać jednoworeczkowym, jeśli obie szpary poprzeczne zdają się tworzyć jedną tylko, nieprzerwaną.



313. Pylnik gruszczyki okrągłoliścięj, wiszący u wierzchołka nitki a otwierający się u szczytu dwiema dziurkami *p*.
314. — cztetroworeczkowy z *Poranthera*. Otwierający się u wierzchołka 4 dziurkami *p*.
315. — cztetroworeczkowy z *Tetralthea juncea* otwierający się u wierzchołka jedną dziurką. — 1. Cały. — 2. Przecięty poprzecznie.
316. — gatunku lauru, *Laurus perseae*, o 4 woreczkach ułożonych po 2 nad sobą; każdy z nich otwiera się klapką *v*. Z nitką *f*, zrosnione są u dołu gruczoły *g*, które jak się zdaje, są pylnikami zplowiałemi.

Nie zawsze woreczek pęka od razu w całej swój długości. lecz wargi szpary oddzieliwszy się już u góry lub u dołu, zostają jeszcze zamknięte w reszcie swój rozległości, a wtedy pylnik otwiera się na pozór dziurką górną lub dolną (fig. 317, 319).

Innym razem niema ani szpary, ani linii zapowiadającej takową; każdy woreczek przez rozstąpienie się ścian otwiera się u wierzchołka *dziurką* (porus), jak w psiankach (*Solanum*) w rodzaju *Poranthera* (fig. 314). Niekiedy, np. w *Tetralthea juncea* (fig. 315) dziurki zléwają się w jeden otwór, wspólny wszystkim woreczkom pylnika.

Nakoniec w bardzo małej liczbie roślin, część ściany odgranicza się i następnie podnosi, na podobieństwo rami okna, która się oddziela od reszty, i przytwierdzoną bywa na jednym tylko brzegu. Pylnik wielu wawrzynów (fig. 316) posiada dwa takie okienka, jedno pod drugim, z każdej strony; pylnik zaś *oczaru* (*Hamamelis*), jedno tylko.

§ 442. Kiedy woreczek pęka, nie dziurką u wierzchołka, lecz szparą, jak się to najpospoliciej dzieje, lub innemi otworami umieszczonemi na jednej z jego powierzchni, powierzchnia ta może być skierowana albo ku osi kwiatu (*introrsum*), albo na zewnątrz (*extrorsum*), co wyrażami przymiotnikami *obrócony* (*introrsus* albo *anticus*) i *odwrócony* (*extrorsus*; albo *posticus*), które przydajemy pylnikowi. Jeśli szpary leżą na bokach, co się często zdarza, kiedy woreczki zrosnięte



317.

318.

317—321. Pylniki przysadkowe. — *a* Przysadek. — *l, p, f, c* mają to samo znaczenie co w figurach poprzedzających. — *r* Szpara.

317. Pylnik beznitkowy fijołku ogrodowego (*Viola odorata*) widziany z przodu 1 i z tyłu 2.

318. — z *Pterandra pyroidea*. — 1. Cała widziana z boku. — 2. Połowa niższa po przecięciu pylnika wpoprzecz.

są z bokami nitki lub zwórki, należy wspomnieć o tém położeniu pośredniem między dwoma poprzedniami (*anthera latera, seu rima dehiscens*). Kiedy zaś pylnik albo jest wahaający się, albo pęka u wierzchołka, wtedy aby oznaczyć jego kierunek, należy w pierwszym razie śledzić go w pęczku, gdzie nie nachyla się jeszcze ku nitce, w drugim zaś uważać na przyczepienie nitki. Ta bowiem: jeśli się przyczepia u wierzchołka, lub na środku woreczka, to albo na zewnętrznej, albo na wewnętrznej jego stronie, ztąd więc można się przekonać czy pylnik jest obrocony czy odwrócony.

§ 443. Jak inne, przez nas rozbierane narzędzia kwiatowe, tak też i pylnik może być opatrzonym przysadkami. Są to najczęściej przedłużenia części go składających. I tak woreczki mogą na jednym końcu zwać się w ostrza (fig. 321), płaszczyc w blaszkę (fig. 319; *a*), i t. p. przyczem wydrążenie kończyny tym sposobem zmienionej nie przechodzi w przysadek. Niekiedy ukazują się niezwykle narośle na powierzchni woreczków, a to w postaci kolców (fig. 320, *a*), brodawek



319.

320.

321.

lub grzebieni (fig. 318, *a*). Widzieliśmy już że zwórka może często rozwijać się znacznie ponad woreczkami, i przybierać rozmaite postaci. Czasem zaś, lubo rzadziej, przedłuża się ona w dół, lub na zewnątrz, jak np. w dwóch z pięciu pręci-

319. Pylnik wrzosu popielatego.

320. — *Vaccinium uliginosum*.

321. — z *Gaultheria procumbens*.

ków fijołku, gdzie ma postać ostrogi, wchodzącej w ostrogę korony (fig. 317, a).

§ 444. Ostatni ten stosunek płatków i pręcików jest godnym uwagi i zdaje się dowodzić wspólności ich przyrodzenia, o której już mówiliśmy powyżej i którą staraliśmy się okazać rozmaitemi dowodami i przykładami. Trzeba jednak wyznać że ze wszystkich części kwiatowych, w pręcikach, podobieństwo z liśćmi najbardziej jest zatarte, osobliwie téż w pylniku, który przedstawia blaszkę, tak jak nitka wraz z nasadą swoją, częstokroć rozszerzoną, przedstawia jakieś to już widzieli (§ 433), ogonek wraz z pochwą. Różnice ukazują się najmocniej w narzędziach zupełnie wykształconych, lubo i wtedy jeszcze można znaleźć przykłady przejść jednych w drugie, przykłady, których liczbę łatwoby można powiększyć, gdyby tego granice téj książki dozwalały. Śledząc zaś narzędzia te wcześniej, znajdujemy różnice mniej wydatne, jak to zobaczymy niżej zastanawiając się nad powstawaniem pręcika i jakby się można z drugiej strony o tém przeświadczyć, śledząc powstawanie znacznej liczby liści.

§ 445. Jak w pręciku pylnik jest częścią najistotniejszą potrzebną do zapłodnienia, tak znowu w pylniku częścią taką jest pyłek, o czém się poniżej przekonamy. Dlatego więc pręciki nie zawierające pyłku, zowią się *pustymi* (sterilia). W takim razie woreczki mogą wprawdzie istnieć, lecz są zmięte i zwiędłe. Czasami niema ich wcale, i sama tylko zwórka rozwija się jeszcze. Nie rzadko także pylnik przemienia się wtedy w kraj płatkowaty, czyto zwinięty i pomięty, czy téż rozpostarty jak prawdziwy płatek. Przekształcenie to może być zupełnym; jemuto winniśmy wiele kwiatów pełnych. Nakoniec pręcik pusty może się ograniczać na samą tylko nitkę, a i ta może jeszcze być bardzo zmniejszoną; wtedy mówimy, że pręcik jest *niewykształconym* (st. rudimentarium).


§ 446. Uważmy teraz pręciki połączone w jednym kwiecie, pod względem ich stosunków, czyto z innymi okółkami kwiatu, czy téż jednych z drugimi.

Opisaliśmy już niektóre z tych stosunków: 1<sup>o</sup> tyczące się ilości pręcików, która może być albo równa ilości listeczków kielicha, i płatków (*flores isostemonas*; § 376), albo nierówna (*f. anisostemonas*; ανισος, nierówny i στήμων, pręcik),

czyto, że jest dwa razy większa od tamtej (*fl. diplostemonēs*; § 376), czy też od niej mniejsza (*fl. meiostemones*; od μεῖον, mniej), albo przeciwnie więcej jak dwa razy większa (*fl. polystemones*; od πολὺς, mnogi). Widzieliśmy że ta ostatnia okoliczność wynikać może albo z przybycia nowych okółków pręcikowych (§ 376 bis), albo też z rozszczepienia się kilku lub wszystkich pręcików (§ 377); 2° tyżące się ich położenia względem części okółków sąsiednich naprzeciw lub naprzemianległych, albo nareszcie umieszczonych pośrednio; 3° zależące od różnego stopnia zrośnięcia się z temiż samemi okółkami, według czego zmienia się punkt ich osady, albo raczej punkt pozorny ich wyjścia, względem tyżych okółków, a szczególniej względem słupka, z kąd też wywodzi się ich podział na trzy wielkie oddziały: pręcików *pod-koło-i na-zawiazkowych* (§ 373).

§ 447. Co się tyczy stosunków ich między sobą, pręciki jednego kwiatu mogą być zupełnie niezależne jedne od drugich (*pręciki wolne, oddzielne; stamina libera, distincta*), albo też zrastać się z sobą (*pręciki połączone, zrosłe; stamina coalita, connata*). Kiedy zrośnięcie dotyczy pylników, jak to widzimy we wszystkich złożonych, w rodzaju stroiczka, pawieniec, pręciki zowią się *pylnikozrosłemi (syngenesa, albo lepiej synanthera*; od συν, z [oznaczającego w wyrazach składowanych połączenie], γένεσις, początek, i ανθηρα, pylnik). Częściej jednak jeszcze, nitki zrastają się albo w jedno ciało, albo też tworzą wiele kupek, nazywanych jak wiemy (§ 365) wiązkami (*adelphía*), z kąd mamy pręciki *jedno-dwu-trój* (fig. 322), *wielo-wiązkowe* (fig. 323, st. monadelphá, diadelphá, triadelphá, polyadelphá), podług tego, jak w skutek zrośnięcia się nitki, powstanie jedna, dwie, trzy, lub więcej takowych wiązek. Jasną jest rzeczą, iż jeżeli tylko słupek nie został stłumiony, nitki zrośnięte pręcików jednowiązkowych, zostawiać muszą otwór w środku kwiatu, i tworzyć naokoło niego rurkę lub obrączkę (fig. 324); wtedy tylko kiedy niema słupka, a zatem kwiat jest męzki, nitki mogą być połączone w wiązkę środkową (fig. 251, 1). Jeśli kwiat posiada wiele wiązek pręcików, takowe tworzą albo odcinki koła (fig. 239) albo prawdziwe pączki (fig. 322). Niekiedy nitki zrośnięte są w całej swjej długości, częściej jednakże u dołu tylko, u góry zaś są odosobnione (fig. 239, 322). W pierwszym razie wiązka posiada

postać słupa; w drugim jest gałęzista, a porównanie jęj do małego pnia, podzielonego na gałązki, z których każda zakończona jest pylnikiem, jest dosyć trafnym, osobliwie kiedy nitki nie wszystkie w jednej wysokości oddzielają się od siebie, lecz niektóre z nich są jeszcze w górze ponad innymi złączone (fig. 323, *f*). Widzieliśmy (§ 432), że nitki odosobnione, mogą być przysadkowemi; zdarza się to także niekiedy i z wiązkami, a mianowicie temi, które powstały przez rozszczepienie: tak np. w oźwi (*Loasa*), przysadki płatkowate noszące nie wielką ilość pręcików, leżą naprzemian względem prawdziwych płatków; podobnie w rodzaju lipowatych: *Luhea* (fig. 238) pręciki bardzo liczne połączone są w pięć wiązek umieszczonych w odstępach pięciu płatków, a każda z wiązek przyrośnięta jest do długiej blaszki ponacinanej u wierzchołka w liczne strzępki, które dowodzą skłonności jęj do rozszczepiania się na nitki płonne, tak jak część wiązki ku wewnątrz kwiatu leżąca, rozszczepia się w pręciki płodne.



322.



323.



324.

§ 448. Porównyując z sobą pręciki jednego kwiatu, widzimy iż mogą być równe albo nierówne, a w ostatnim przypadku mogą jeszcze zachowywać większy lub mniejszy stopień kształtności. Jeśli ich jest wiele, wtedy tém są dłuższe, im są

322. Pręciki trójwiązkowe *ee* jednego z dziurawców (*Hypericum aegyptiacum*) otaczające słupek *o*; okrywy kwiatowe zostały odjęte.

323. Kwiat męzki rącznika zwyczajnego (*Ricinus*), składający się z kielicha *c* o 5 odchylonych listeczkach i z pręcików wielowiązkowych *e*. Jedna z wiązek gałęziowych *f* powiększona, umieszczona jest obok.


324. Trzy z dziesięciu pręcików tamaryszku (*Tamarix gallica*). Nitki zróżnione z sobą tylko przy nasadzie rozszerzonej, tworzą rodzaj obrączki, której tu widać tylko kawałek.

wewn  
wają  
o pod  
naprz  
wamy  
siła,  
osadz  
oddzie  
rych l  
pięciu  
szona  
ności  
rech;  
odpow  
stronie  
sze od  
kom (  
Hipta  
pręciki  
związ  
nych  
dług  
nierc  
§  
powi  
koron  
cemi  
w nię  
i nast  
§ 4  
prosto  
325  
p Wier  
re opac  
gruczo  
326  
okazan  
dłużen  
przytw

wewnętrzniejsze (fig. 238, 2), albo też przeciwnie im są zewnętrzniejsze (jak w wielu różowatych, fig. 229). W kwiatach o podwójnej liczbie pręcików, prawie zawsze pręciki leżące naprzeciw płatków, są krótsze od naprzemianległych. Nazywamy *czworosilnemi* (tetradynama od τετρα, cztery, i δυναμις, siła, władza) pręciki krzyżowych, z których cztery większe osadzone parami, leżą naprzemian względem dwóch mniejszych oddzielnych (fig. 325); *dwusilnemi* (didynama; od δεις, dwa razy), pręciki wargowych, poczwarnych, i innych roślin, w których liczba pięciu pręcików, leżących naprzemian względem pięciu łatek korony, zmniejszona jest w skutek płonności piątego, do czterech; z tych dwa wyższe odpowiadają wyższej stronie kwiatu, dwa niższe odpowiadają jego bokom (fig. 326). W *Mango Hiptage*, z dziesięciu pręcików jeden tylko rozwija się bardziej od innych. Lecz byłoby za długo i zbyt wiele, wyliczać tu wszystkie możliwe odmiany nierówności pręcików.



325.



326.

§ 449. Co się tyczy stosunku ich do korony, o tym w opisie powinna być czyniona wzmianka. Kiedy pręciki są dłuższe od korony, a przeto takową przewyższają, nazywamy je *wystającemi* (st. exserta); kiedy przeciwnie są krótsze i zostają w niej ukryte, nazywamy je *zamkniętymi* (inclusa; fig. 287 i następne; 326).

§ 450. Zachowują one rozmaity kierunek, idą bowiem albo prosto w górę (*pr. wzniesione; st. erecta*), albo ku środkowi

325. Przyrząd pręcików czworosilnych laku (*Cheiranthus cheiri*), *p* Wierzchołek szypuleczki.—*eg* Blizny pozostałe po listeczkach kielicha, które opadły.—*ep* Dwie pary pręcików większych.—*c* Dno gruczołowate, na którym siedzą pręciki.

326. Korona naparstnicy (*Digitalis purpurea*) przecięta i rozłożona dla okazania przyrządu pręcików dwusilnych.—*t* Rurka.—*f* Nitki, których przedłużenie daje się widzieć aż do spodu korony, poczynając od punktu ich przytwierdzenia *i*.—*ag* Pylniki pręcików większych.—*ap* Mniejszych.

kwiatu (*wgięte; inflexa*), albo na zewnątrz, a to już odbiegając tylko cokolwiek od pionu, już rozpościerając się poziomo (*patula*); albo odginają się zupełnie (*reflexa*); albo wreszcie są zwisłe i zbliżają się do pionu (*pendula*). Niekiedy nachylają się i naginają wszystkie w jedną stronę kwiatu, w dół lub w górę (*declinata*, jak w kasztanie dzikim, dyptanie).

§ 451. **Budowa pręcików.** — Rozebrawszy kształty zewnętrzne pręcików, w różnych roślinach, tudzież stosunki ich względem siebie samych i względem innych części kwiatu, zastanówmy się teraz nad budową anatomiczną pręcików.

**Nitki.** — Nitka składa się: 1° z wiązki środkowej cewek przebiegającej od spodu do wierzchołka, bez rozgałęzień; 2° z warstwy tkanki komórkowej otaczającej ową wiązkę naczynną; 3° z cieniutkiego naskórka, na którym niekiedy widzieć się dają szparki, lecz to bardzo rzadko.

Wiązka cewek przedłuża się w zwórkę i w nią kończy, czasami jednakże wcześniej. Zwórka prócz tego złożona jest z kupki komórek nieco odmiennych od komórek nitki pod względem barwy i postaci. Posiadają one częstokroć zbitość tkanki gruczołowej.

§ 452. **Pylnik.** — Woreczki pylnika po zupełnym wykształceniu, zawierają wewnątrz wydrążenie napełnione pyłkiem; od zewnątrz powleczone są błoną naskórka (fig. 327 *ee*), częstokroć opatrzoną szparkami; pomiędzy wydrążeniem a naskórkiem leży pokład osobnej tkanki (*cf*), której postać i przyrodzenie łatwo sobie będzie przedstawić kiedy powiemy, że zrazu tkanka ta



327.

składała się z komórek wężownicowych (fig. 25), lub pierścieniowych (fig. 26), albo, co jeszcze częściej, siatkowatych (fig. 27), ułożonych w jedną lub kilka warstw, zwykle jednakże błona tych komórek znika zupełnie, około czasu w którym pylnik dojrzewa; pozostają przeto same tylko nitki lub wstążeczki zwinięte w wężownicę, lub części w pierścieniu, albo też tworzące siatkę (fig. 327 *cf*). Nazwano *włókno-*

327. Kawalek przecięcia poziomego ze ściany pylnika sepoty (*Cobaea scandens*) w czasie pękania. — *ee* Warstwa zewnętrzna złożona z komórek naskórka. — *cf* Komórki włóknowe tworzące warstwę wewnętrzną.

*wemi* (cellulae fibrosae) komórki te bez ściany właściwej, posiadające tylko nitki, które je wprzódy podwajały, czyli włókna, rozumiejąc pod tém nie komórkę wydłużoną, jakeśmy to czynili w całym ciągu tego dzieła, lecz nitkę lub wstążeczkę miąższą. Pokład ten staje się coraz cieńszym, im bardziej zbliża się do linii na której woreczek ma pękać, a na samej tej linii niema go wcale. Niteczki będąc bardzo sprężyste i czułe na wilgoć, nateżają się i zwalniają, przedłużają i kurezą znowu, w rozmaity sposób, podług tego jak pylnik jest suższy lub wilgotniejszy; a zmiany te zależą z jednej strony od rozwijania się pylnika, którego soki, zrazu obfite, zostają powoli wessane lub wyparowane, z drugiej od stanu powietrza. Tkanka więc tworząca ścianę pylnika, pociągana tym sposobem to w tę, to w ową stronę, musi się przerywać tam, gdzie najmniej stawia oporu, to jest na linii lub punkcie, na którym niema pokładu włóknistego; tak więc woreczek rozdziera się, ułatwiając przez to wyjście pyłku zawartego wewnątrz, wyjście, któremu dopomagają i które uzupełniają ściągania się ciągłe tkanki sprężystej.

Obaczmy teraz jakim kolejnym zmianom ulega pręcik od pierwszego ukazania się w kwiecie, aż do zupełnego wykształcenia, które poprzedza bezpośrednio, lub też nawet towarzyszy pękaniu pylnika.

Pylnik nasamprzód ukazuje się w kwiecie, w postaci małej, miąższej, komórkowej brodaweczki, podobnie jak wszystkie narzędzia liściowate. Brodaweczka ta rozrasta się następnie, i co jest godną uwagi, posiada wtedy barwę zieloną, chociaż później przybiera inną, najczęściej żółtą; potem przedłuża się, nie okazując jednak żadnej różnicy w postaci swój od innych narzędzi kwiatowych (§ 421). Przez środek jój przechodzi zwykle płytki, podłużny rowek, skazówka przyszłego rozdzielenia się na dwa woreczki; rowek ten, odpowiada wierzchołkowi nitki albo zwórcie, i zachowuje dłużej od reszty barwę zieloną. Kiedy potem ukaze się nitka, pylnik posiada już swą odznaczającą postać, wkrótce ukazują się po bokach dwa nowe rowki, zwykle równoległe względem pierwszego, i będące skazówką linii pękania.

§ 452 bis. **Rozwijanie się pręcików w ogólności.**—Nitka raz się ukazawszy, nie przestaje rosnać prędzej lub wolniej.

Niekiedy, czyto, że ma pozostać krótką, czyli też, że nie do-  
sięga w pączku całej swjej długości, a ta, ma przechodzić dłu-  
gość pączka, skręca się lub zwija, albo też zagina na samęj  
sobie; odmiany te znajdujemy stale w niektórych roślinach,  
a nawet w niektórych rodzinach. Z początku cała nitka składa  
się z tkanki komórkowej i dopiero w pewnej epoce, komórki  
środkowe zaczynają ustrajać się i przedłużać w cewki.

Uważajmy, że w całym tém rozwijaniu się istnieje nieza-  
przezone podobieństwo w rozwijaniem się liścia; pylnik, który  
przedstawia blaszkę, poprzedza rozwijanie się nitki, która od-  
powiada ogonkowi, tak, że pręcik ukształcony nasamprzód  
przy wierzchołku, przedłuża się jeszcze czas niejaki przy na-  
sadzie. Niektóre postrzeżenia pomogły do uzupełnienia tego  
podobieństwa pokazując, że w przypadkach gdzie nitka przy  
nasadzie posiada rozszerzenie odpowiadające pochwie liścio-  
wej, rozszerzenie to zdaje się rozwijać wprzód, niż część  
nitki zwężona, czyli ogonkowa, jak się to dzieje i przy pochwie  
liściowej (§ 147).

Powiedzieliśmy (§ 421), że często w pączku pręciki są w po-  
równaniu daleko więcej rozwinięte od płatków. Niemniej jednak-  
że te ostatnie ukazały się wprzód lub jednocześnie z nimi; ale  
zdarzyć się może, że w swém powolniejszym wykształcaniu  
się, wyprzedzone zostają przez pręciki, mianowicie te, które  
względem nich osadzone są naprzemianlegle, a które przeto  
nietylko są większe, ale się i pierwiej ukazują niż pręciki na-  
przeciwpłatkowe. Jestto nowy dowód ścisłego związku jaki  
zachodzi między temi ostatnimi a płatkami.


§ 453. **Rozwijanie się pylnika, a szczególniej pyłku.**—  
Najważniejszym jednak w historii rozwijania się pręcika, jest  
rozwijanie się tkanki właściwej pylnika i tworzenie się pyłku,  
który stanowi część jego najgłówniejszą i jest działaczem  
czynności, do której spełnienia pręcik jest przeznaczonym.

Widzieliśmy, że z początku tkanka pylnika jest jednorodną  
(§ 451), komórki składające ją, posiadały mniej więcej jednaki  
kształt i równe wymiary (§ 328). Nieco później tkanka ta zda  
się niszczyć na wielu miejscach położonych w pewnej odległo-  
ści od obwodu; a w skutek tego powstają przerwy zrazu małe  
i wąskie, później coraz to szersze. Takich przerw bywa w ogóle  
cztery, po dwa na każdą połowę całej miąższości pylnika,  
a któreto połowy stanowią ostatecznie woreczki. Przerwy


napeł-  
znisz-  
(fig.  
dzię-  
całą  
(loc-  
więk-  
rzyły-  
ły. N  
komó

328  
mają-  
32-  
stwa  
móre-  
napeł-  
komó-  
reczki  
33  
toż są


napełnia płyn śluzowaty, utworzony bez wątpienia kosztem zniszczonej tkanki i wkrótce sam ustrajający się w komórki (fig. 329, 330); z tych jedne są mniejsze (*cp*), położone bardziej na zewnątrz i których warstwa wyściela nakształt ściany całą powierzchnią przerwy, którą nazwiemy *pół-woreczkiem* (*locellus*); inne leżące bardziej na wewnątrz (*up*) są daleko większe, nietylko od tych, które się spólcześnie z nimi tworzyły, ale nawet od wszystkich tych, które przed nimi istniały. Nazwano je *pęcherzykami pyłkowymi* albo *komórkami macierzystymi* pyłku, ponieważ tenże w ich



328.



329.




330.

328. Przecięcie poziome pylnika dyni (*Cucurbita pepo*), wzięty z pąka, mającego zaledwie dwa milimetry długości.

329. Przecięcie poziome tegoż z pąka nieco starszego. — *ce* Warstwa zewnętrzna komórek tworzących naskórek. *ci* Warstwa pośrednia komórek wielorzędowych, z których wiele zostanie wessanych. Półworeczki napełnione tkanką o komórkach daleko większych *up* a które są wątkiem komórek pyłkowych; warstwa komórek mniejszych *cp* wyściela półworeczki.

330. Przecięcie poziome tegoż z pąka jeszcze starszego. Głoski mają toż samo znaczenie.

wydrążeniu się tworzy. W rzeczy samej, komórki te niebawem zaciemniają się w skutek obecności licznych ziarenek, gromadzących się powoli w jedną bryłkę (fig. 331, 1), która następnie dzieli się na cztery jądra poprzegradzane istotą płynną wypełniającą wnętrze pęcherzyka i zsiadającą się powoli (fig. 331, 3). Zsiadanie się postępuje zwykle od obwodu komórki



331.

macierzystej ku środkowi, a w skutek tego spostrzegamy przegrody powstające stopniowo od zewnątrz ku wewnątrz, aż póki się nie spotkają w środku, dzieląc tym sposobem na czworo, wydrążenie pęcherzyka początkowo pojedyncze (fig. 331, 2). Każde z jąder ziarenkowatych rozłączonych tym sposobem, obłoczy się właściwą błoną i nie przestaje rosnać (fig. 321, 4); w miarę tego ściany i przegrody

pęcherzyka, wprzódki grube i soczyste, cieńszeją stopniowo tak dalece, że nakoniec znikają, a jądra rozmaitych pęcherzyków jednego i tegoż samego woreczka, zostają wolnemi w jego wydrążeniu: te to jądra są właśnie *ziarnami pyłku* (fig. 331, 6). Widzimy tu ów sposób rozmnażania się tkanki komórkowej, któryśmy poprzednio (§ 325) opisali, a który zależy na kształceniu się wielu pęcherzyków nowych, w wydrążeniu komórki macierzystej. Ziarna pyłkowe są komórkami odznaczającemi się szczególnym kształtem i budową, tudzież tém, że zamiast coby miały być połączone między sobą w tkanę jednociągłą,

331. Rozwijanie się pyłku jemiely (*Viscum album*). — 1. Dwie komórki pyłkowe napełnione istotą ziarenkowatą. — 2. Cztery jąderka ukazują się wewnątrz każdej komórki. — 3. Podzielenie się na 4 bryłki, z których każda odpowiada jąderkowi, czyli na 4 komórki. — 4. Komórki pyłkowe, czyli owe komórki, wewnętrzne są już odosobione. — 5. Dwie takie komórki, czyli młode ziarna pyłku, wyjęte z komórki macierzystej. — 6. Ziarna pyłku zupełnie wykształconego.

zostają  
sposob

Wz

zdaje

który

nych

329, 3

zmniejs

stwy z

powłok

dająca

szybk

docho

się pra

Prz

nika,

zelenie

przegr

W chw

ba i st

dzie w

zagię

kiędy

tylko

rywa

się cz

jest p

więci

osobn

odmia

§ 4

rzysy

ziarne

Jestt

my śl

w pyl

dojrza

lepkie

pęche

w pyl


zostają zupełnie niezależne jedne od drugich, tworząc tym sposobem rodzaj proszku.

Wzrastanie ziarn pyłkowych, w miarę takowego rozwijania, zdaje się odbywać nie tylko kosztem pęcherzyków pierwotnych, których istota zostaje prawie wessaną, lecz także kosztem innych komórek, których warstwy z początku liczniejsze (fig. 329, 330, *cz*), w końcu skutkiem wessania wewnętrzniejszych, zmniejszają się do dwóch, trzech lub czterech, z których warstwy zewnętrzne (*ce*) stanowią naskórek pylnika, głębsze zaś, powłokę jego złożoną z komórek włóknowych. Przemiana dająca tym ostatnim ich kształt ostateczny, odbywa się bardzo szybko, prawie nagle, około téj epoki, w której ziarna pyłku dochodzą do zupełnego wykształcenia, tak, że pęknięcie odbywa się prawie w tym samym czasie.

Przy stopniowem niszczeniu tkanki komórkowej ścian pylnika, część jej znajdująca się między dwoma półworeczkami, zcieńczała także powoli i stanowi słabą tylko między nimi przegrodę, której brzeg zewnętrzny przytyka do linii pęknięcia. W chwili więc otworzenia się dwa półworeczki łączą się z sobą i stanowią przeto jeden woreczek pylnika, na którego spodzie przegroda pierwiastkowa, ukazuje się tylko jako krótkie zagięcie mniej lub więcej widoczne (fig. 310). Rozumić się że kiedy pylnik nie otwiera się w całej swój długości szparą, tylko dziurką u wierzchołka, ta przegroda może się nie przerywać i oddziela ciągle półworeczki; wtedyto pylniki zowią się czteroworeczkowemi (fig. 315). Większa część pylników jest pierwiastkowo taką, a każdy woreczek powstaje rzeczywiście z połączenia się dwóch z początku i przez długi czas osobnych. Liczba więc poczwórna woreczków jest tylko małą odmianą przypadku ogólniejszego.

§ 454. **Pyłek.** — Powiedzieliśmy, że istota komórek macierzystych zniknęła zupełnie przez wessanie, i że w skutek tego ziarna pyłku, znajdują się wolne w wydrążeniach pylnika. Jestto przypadek najpospolitszy; jednakże niekiedy napotyka my ślady mniej lub więcej wyraźne poprzedniego stanu. Tak w pylnikach niektórych wiesiołkowatych znajdujemy ziarna dojrzałe, powiązane jeszcze niedokładnie mnóstwem nitczek lepkich, będących pozostałością niezupełnie wessanej istoty *pęcherzyków pierwotnych*. Podobny stan daje się spostrzedz w pyłku wielu storczykowatych, którego ziarna są połączone

w wiele *bryłek pyłkowych*, za pomocą istoty biorącej ten sam początek, mającej stężałość lepu, a która przez lekkie ciągnięcie przedłuża się w nitki sprężyste. Rozdzielając te bryłki, znajdujemy kupki ziarn połączonej po cztery: są to też same



332. 333.

które utworzywszy się w jednym pęcherzyku, zachowały swe pierwotne spojenie. Moglibyśmy przytoczyć znaczną liczbę pyłków, których ziarna okazują się skupione tym sposobem po cztery (fig. 332), lub po ośm (fig. 333), albo nawet po szesnaście, czyto w skutek ostatecznego zebrania się w jedno ziarn dwóch lub czterech pęcherzyków, czy też że w jednym pęcherzyku utworzyła się ilość ich wielokrotna.

W trojęściowatych, wszystkie ziarna jednego worka łączą się ścianami swemi w jedną bryłkę i tworzą tym sposobem tkankę jednociągłą.

§ 455. Ale porzucmy te różne rodzaje budowy wyjątkowej i powróćmy do tej, która się zwykle napotyka, to jest, gdzie ziarna ostatecznie wolne, we wspólném wydrążeniu wypełniają takowe niby pewnym rodzajem proszku, który rozsypuje się wychodząc ztamtąd. Te ziarna jakeśmy już powiedzieli, są komórkami; mamy więc w nich do uważania dwie części: jedna zawierająca, czyli okrycie, druga zawarta.


§ 456. Okrywa ziarna pyłku dojrzałego, bywa w ogólności podwójną, składającą się z błony zewnętrznej i wewnętrznej. Pierwsza utworzyła się najprzód, druga zaś, jak się tego można było spodziewać, później. W niektórych nielicznych przypadkach znajdujemy trzecią pośrednią błonę. W innych jeszcze rzadszych razach napotykamy tylko jedną i wtedy ta ze względu swęj budowy jest podobną wewnętrznej (fig. 337).

Błona zewnętrzna nadaje ziarnu pyłkowemu kształt i barwę, które są stałe dla tegoż samego gatunku rośliny. Jest ona zwykle dość twardą i mocną, gładką, lub pokrytą małemi kropeczkami (fig. 334), a czasem nawet ziarenkowatościami (fig. 335) nadającemi jej pod mikroskopem postać jaszczuru; niekiedy najeżona jest brodaweczkami, albo nawet wydatnościami, które


332. Pyłek obojniku (*Periploca graeca*).

333. — z *Inga anomala*.

rosnąć, tworzą włoski lub kolce (fig. 346). Zdarza się niekiedy, że te wypukłości ułożone nadzwyczaj prawidłowo i połączone istotą prawie galaretowatą, tworzą niejako siatkę wystającą na powierzchni ziarn, które wtedy możnaby nazwać wytłaczaniami (fig. 336). Uważać należy, że ile razy powierzchnia zewnętrzna przedstawia takie ziarenkowatości, lub inne wypukłości bardziej jeszcze wydatne, wysącza zarazem płyn oleisty, który jej nadaje barwę jakiej nie posiada jeśli ziarno jest zupełnie gładkiem, a w którymto razie można widzieć



334.



336.

wnętrze ziarna wskroś przezroczystych pokryw. W innych przypadkach przezroczystość otrzymuje się dopiero po rozpuszczeniu powłoki oleistej w stosownych odczynnikach, jak np. w olejach lub olejkach.

§ 457. Mohl objawił o przyrodzeniu okrywy zewnętrznej zdanie, którego większość botaników nie podziela. Mniema on, że w wielu razach okrywa ta utworzoną jest przez pewien rodzaj naskórka, to jest przez warstwę komórek obokległych i wydzielających we wnętrzu swoim powłokę oleistą, że komórki te są widoczne w niektórych pyłkach o powierzchni siatkowatej (fig. 345), lecz że znajdują się i w wielu innych i że ziarenkowatości są właśnie maleńkimi komórkami, nie zupełnie tylko wykształconymi i połączonymi z sobą przez istotę między-komórkową, rozpostartą w kształcie błony na całą powierzchnię pyłku. Rzeczona przeto istota tworzyłaby sama okrywę zewnętrzną gdzie takowa jest pojedynczą.

336. Ziarno pyłku léjkowaju (*Ipomaea*).

§ 458. Co się tyczy błony wewnętrznej, ta jest zawsze jednakowa w najrozmaitszych pyłkach: gładka, bardzo cienka, przezroczysta i nadzwyczajnie rozciągliwa. W niektórych roślinach jak np. w trawach, przylega do błony zewnętrznej, w całej swej rozległości, w innych do niektórych miejsc tylko, po największej jednak części oddziela się od niej zupełnie.

§ 459. **Upłodnik.** Okrywa wewnętrzna zawiera w sobie istotę nazwaną *upłodnikiem* (fovilla), która składa się z płynu gęstawego i z mnóstwa ciałek ziarenkowatych, do których przymieszane bywają często kropelki oleju, a rzadziej zastąpione bywają ziarenkami skrobi. Ciałeczka te, są zwykle dwojakie (fig. 348 f), większa część jest nadzwyczajnie małych i kulistych, niektóre zaś (fig. 349) są daleko większe, kuliste, eliptyczne lub przedłużone w małe walczyki zwężone na końcach. Te ciałeczka, nadewszystko drugie, zajęły szczególnie uwagę fizjologów, którzy je chcieli uważać za bezpośrednie działacze zapłodnienia i dostrzegli w nich pewnych ruchów bardzo uderzających. Lecz czyli własność ta poruszania się jest własnością żywotną? R. Brown doszedł tego, że drganie bardzo zwawe tych ciałeczek, które naprzemiennie zbliżają i oddalają, się od siebie i przeto zdolne są do przenoszenia się widocznego z miejsca na miejsce, nie jest własnością im tylko wyłącznie służącą, lecz że daje się spostrzegać w odrobinach wszystkich ciał nietylko ustrojnych, ale nawet i nieustrojnych. Tu zatem nie idzie nam o ten ruch, któremu nadano nazwisko ruchu Browna, a który jak się zdaje jest własnością fizyczną i służącą w ogóle każdej istocie bardzo rozdrobnionej; lecz w ciałeczkach upłodnika dostrzeżono pewnych zjawisk ruchu daleko bardziej odznaczającego, który ustaje w płynach niezdatnych do utrzymania życia, jak np. w wysokoku, tudzież po upływie pewnego czasu od wyjścia ich z ziarna pyłkowego, i który przypomina do pewnego stopnia ruch wymoczków, szczególnie w ciałeczkach większych i podłużnych; te bowiem, jak niektórzy twierdzą kureczą się nawet i zginają (fig. 349); postrzeżenia przeto podobne wymagające wielkiej dokładności, a będące przedmiotem licznych sporów, potrzebują sprawdzenia a w razie gdyby rzeczone zjawiska, rzeczywiście ukazywały się pod drobnowidzem, należy probować, czyliby nie dały się objaśnić przez złudzenie optyczne, lub przez przyczynę czysto fizyczną. Cóżkolwiek bądź, czy część

działal  
nie,  
rzcza  
wias  
§ 4  
kazać  
jących  
jego p  
części  
obu ko  
jak mo  
na od  
Linia t  
zaną c  
no jes  
przeds  
kiej ilo  
weblo  
walec  
razem  
się by  
cinko  
posta  
kich  
głow  
ziarn  
Wted  
wion  
niekie  
bienia  
sobie,  
takier  
(p)  
(fig.  
§  
nia si

działalna zawiera się w rzeczonych ciałeczkach, czy w płynie, w którym one pływają, czy wreszcie i obudwu razem, rzeczą jest niewątpliwą, że upłodnik stanowi główny pierwiastek pyłku.

§ 460. **Okrywy i postaci pyłku.** Pozostaje nam teraz wykazać w jaki sposób upłodnik działa wskrós błon go zamykających: badanie różnych kształtów pyłku i różnych sposobów jego pęknięcia, rozwiąże nam to zadanie. Ziarna pyłku są najczęściej eliptyczne (fig. 339, 340), zwężone mniej więcej na obu końcach ( $p p$ ) mogących się nazwać biegunami, równie jak można nazwać równikiem linią kolistą ( $e$ ) równo oddaloną od obu końców, dzielącą ziarna na dwie części równe. Linia ta najczęściej myślna tylko, bywa jednakże czasami wskazaną osobnymi kropkami, jak to zaraz zobaczymy. Kiedy ziarno jest eliptyczne, lub co się rzadziej zdarza kuliste, wtedy przedstawia powierzchnią krzywą jednociągłą. W bardzo małej ilości roślin (jak webło, *Zostera marina* i wiele innych webłowatych) ziarno przedłuża się w kształtną rurkę lub walec, stanowiąc gatunek wydrążonej nitki (fig. 337). Innym razem powierzchnia nie przedstawia téj kształtności, lecz zdaje się być złożoną z zetknięcia się wielu odcinków krzywych. Dostyc zwyczajną jest postać, powstała z zetknięcia się trzech takich odcinków i wtedy to pyłek jest trójwęglowym (fig. 348, 350). Nakoniec często ziarna pyłku mają kształt wielościanów. Wtedy ściany płaskie, lub zaledwie że skrzywione, oddzielone są węglami mięszszemi niekiedy nawet wystającymi nakształt grzebienia. Ściany mogą być wszystkie podobne sobie, lecz najczęściej nie wszystkie są takimi, znajdujemy np. że ściany odpowiadające biegunom ( $p$ ) różnią się od tych, które odpowiadają równikowi  $e$  (fig. 338).

§ 461. Musimy zwrócić uwagę na to, że kształt pyłku zmienia się podług większego lub mniejszego stopnia wilgoci go



337.

337. Pyłek webła morskiego.— 1. Zbiór ziarn zawartych w jednym pyłniku, tworzący jakby motek przędzy.— 2. Dwa końce ziarn znacznie powiększonych.

przenikającej. Jeśli zostaje czas niejaki przy przystępie powietrza, zsycha się i zwęża. Bieguny jego lub węgly stają się coraz ostrzejszemi (fig. 347). Jeśli przeciwnie umieścimy go w wodzie, wzdyma się (fig. 347, 2), węgly zacierają się i wkrótce przybiera postać mniej więcej kulistą. Właściwy jego kształt musi



338.

leżeć pomiędzy temi dwiema ostatecznościami, a takowy posiada wtedy kiedy się znajduje wewnątrz pylnika jeszcze zamkniętego w środku wilgotnym, lecz nie płynnym.

§ 462. **Pęknięcie pyłku.** Pęknięcie pyłku zależy od nierównej sposobności rozciągania się dwóch jego błon, kiedy takowe zostają w zetknięciu z płynem. Zewnętrzna, posiadająca tę własność w niższym stopniu niż wewnętrzna, pęka przez tę ostatnią musi w końcu ułatwić jej przejście. To dzieje się przez otworki bądź przypadkowe, bądź znajdujące się wprzódy na powierzchni ziarna. Pierwszy przypadek zdarza się tam, gdzie powierzchnia ziarna jest zupełnie jednorodną w całej swej rozległości, jak to rzeczywiście znajdujemy w niektórych roślinach. Wtedy, jeśli wilgoć jest w zetknięciu z pewnym punktem ziarna, część odpowiednia błony wewnętrznej usiłuje rozciągnąć się bardziej od innych, gdy tymczasem rozmiękła część błony zewnętrznej, mniejszy jej stawia opór, i pęka od zewnątrz ku wewnątrz pęka na koniec.

§ 463. Lecz w większej liczbie pyłków rzeczy inaczej się mają, gdyż na powierzchni błony zewnętrznej znajdują się już naprzód miejsca słabsze od innych, czyto że błona tu jest cieńszą, czy też że napotyamy na niej istotne przerwy. Zcieńczenia ukazują się w ogóle w postaci zagięć, sterczyjących ku we wnętrzu ziarna; przerwy zaś w postaci małych okrągłych dziurek, które nazwano *otworkami* (pori), lecz które również jak jamki w ścianach komórek nazywane niekiedy tym samym wyrazem (§ 17), są najczęściej małemi przestworkami nadzwyczaj zcieńczonemi i przez to samo mogącemi się rozdzierać daleko prędzej. Ziarna jednego pyłku posiadają jużto samo tylko zagięcie bez otworków, już też otworki bez zagięć, już nakoniec jedno i drugie zarazem.

§ 464. Część zcieńczona błony, odpowiadająca zagięciom, różni się zwykle na pierwsze wejrzenie od reszty powierzchni,

338. Ziarno pyłku cykoryi (*Cichoreum intybus*).


chocia  
zatar  
mi. I  
Zag  
się od  
runkie  
obudw  
jedync.

lub w  
(fig  
kłada  
bywa  
wet i  
tylko  
oddz  
nięte  
wzde  
jąc s  
a rac  
międz  
gunom  
kowe  
dy pa  
Często  
gunom


339.  
1. Ziarn  
jego po  
340.  
toż sam  
341.

choć w niektórych razach przedstawia piętna jęj lubo nieco zatarte np. w części pokrytej ziarenkowatościami lub kropkami. Lecz najpowszechniej jest gładką i przezroczystą.

Zagięcia zajmują czasem całą długość ziarna, rozciągając się od jednego bieguna do drugiego, co jest ich zwykłym kierunkiem. W innych razach są krótsze i równo oddalone od obudwu biegunów. Ilość ich jest rozmaita: najczęściej są pojedyncze jak w większej części jednolisciennych (fig. 339),



339.



340.

lub w liczbie trzech, co się napotyka w wielu dwulisciennych (fig. 340). Dwa zagięcia znane są tylko w niewielu przykładach, cztery także rzadko się zdarzają, częściej daleko bywa ich sześć. Znaleźć ich zaś można aż do dwunastu a nawet i więcej. Zagięcia są prawie zawsze proste; w niewielu tylko razach biorą kierunek krzywy albo nawet i wężownicowy oddzielając tym sposobem dwa pasy również w wężownicę zwinięte (np. w *Mimulus moschatus* fig. 341). Skoro ziarno wzdęte jest wodą, zagięcie znika, a błona jego rozpościérając się przybiera postać jakby wrzeczona okręconego na kuli, a raczej odcinka powierzchni krzywój, zawartego między dwoma łukami, które się zbiegają ku biegunom. W niektórych pyłkach rozpostarcie takowe zagięcia, zdaje się być zwyczajnem, i wtedy pary wydają się zwężone, lecz nie zwinięte. Często one w takim razie nie są przerwane ku biegunom, lecz wzajemnie w siebie przechodzą.



341.

339. Pyłek gatunku czosnku *Allium fistulosum*. — p Biegun. — e Równik.  
1. Ziarno widziane z jednej strony. — 2. Ze strony przeciwniej. — 3. Przecięcie jego poprzeczne przy równiku.

340. Pyłek gatunku powoju (*Convolvulus tricolor*). Głoski i liczby mają toż samo znaczenie co na figurze poprzedzającej.

341. Ziarno pyłku z *Mimulus moschatus*.

§ 465. Otworki, równie jak zagięcia, różnią się co do ilości i przedstawiają pod tym względem też same odmiany, to jest, że się często znajdują pojedyncze, jak to za zwyczaj bywa w jednoliściennych np. w trawach (fig. 242), często po trzy, a to w dwuliściennych, niekiedy po dwa, to znów po cztery lub więcej. Jeśli ich jest więcej, naówczas albo mogą być uszykowane w kształtny okrąg odpowiadający równikowi (fig. 343), albo też są rozproszone po całej powierzchni bądźto prawidłowo, bądź bez widocznego porządku (fig. 344).



342.




343.



344.

Otworki rozmaicie się z zewnątrz wydają, lecz daleko są wyraźniejsze po wdzięciu ziarna przy umoczeniu go w wodzie. Widać wtedy otworek w postaci małego kółka, utworzonego przez błonę przyzroczystą, czyto zewnętrzną, znacznie zcieńszoną, czyli też wewnętrzną przegładającą przez otwartą dziurkę. Pierwsze mniemanie zda się być prawdopodobniejszym;



345.

346.

w niektórych przynajmniej przypadkach otworek widocznie pokryty jest błoną zewnętrzną, która zachowała całą swą stężłość i wszystkie swoje piętna, aż do małego obwodu opisanego linią nadzwyczaj cieżką (fig. 345, o). Koło w ten sposób określone, parte na zewnątrz jak nakrywa, odłącza się nakoniec (fig. 346, o); pyłki, którym ten rodzaj otwierania jest właściwy, zowią się *nakrykowemi*. Czasem otworek zajmuje wierzchołek wypukłości tém wydatniejszej im wilgotniejszym jest pyłek; co daje się spostrzedz szczególniej na

342. Ziarno pyłku z *Dactylis glomerata* (Gramineae).

343. — — z konopi (*Cannabis sativa*). e Równik. pp Bieguny.

344. — — z *Corydalis capreolata*.

345. — — gatunku męczennicy (*Passiflora kermesina*) przed pęknięciem. oo Nakrywki.

346. Ziarno pyłku dyni (*Cucurbita pepo*) w chwili pęknięcia. oo Nakrywki już oddzielone od błony zewnętrznej, przez wydatności t błony wewnętrznej.

ziarna  
351).

§ 4

siada

gim o

zagięc

cach j

dają si

trzy z

tylko t

zagięc

my za

bie i u

W z

lu zło:

płaszc

§ 4

wzdyn

347

sześć

trzy za

— pp

woda p

Błona

348

wnetr

kła na

dzięc

349


350

351

przed

ziarnach trójwęglowych w rodzinie wiesiołkowatych (fig. 350, 351), gdzie trzy węgly przedłużają się znacznie w wodzie.


§ 466. Nakoniec w wielu dwuliściennych ziarna pyłku posiadają zarazem zagięcia i otworki: już to tak, że jedne drugiemu odpowiadają, to jest albo otworek leży w środku każdego zagięcia, albo dwa otworki na obu końcach jednego zagięcia, już też otworki dają się spostrzedz dopiero co dwa lub trzy zagięcia, tak, że np. znajdujemy tylko trzy otworki na sześć lub dziewięć zagięć (fig. 347), już nakoniec widzimy zagięcia i otworki oddzielone od siebie i ułożone naprzemian.




347.

W ziarnach wielościennych (np. w wielu złożonych, otworki leżą albo na węglach, albo na środku płaszczyzn.

§ 467. Ziarno pyłkowe zostające czas niejaki w wodzie, wzdyma się ciągle, zapewne w skutek wnikania, ponieważ wo-



348.



349.

350.

351.

347. Ziarno pyłku krwawnicy (*Lythrum salicaria*), na którym widać sześć zagięć, z których trzy opatrzone są na środku otworami, trzy zaś inne leżą naprzemian względem pierwszych i nie mają otworków. — *pp* Bieguny. — *ee* Równik. — 1. Ziarno suche. — 2. Toż samo wzdęte wodą przez co nabrało kształtu kulistego, a zagięcia jego wyrównały się. Błona wewnętrzna zaczyna wystawać przez otworki.

348. Ziarno pyłku migdału karłowatego (*Amygdalus nana*); błona wewnętrzna zaczyna wystawać trzema otworkami w kształcie banieczek *l* i pętki na końcu jednej z takowych, wypuszczając upłodnik *f*, w którym widzieć się dają ziarenka różnej wielkości.

349. Duże ziarenka upłodnika proświnnika błotnego (*Hibiscus palustris*).

350. Ziarno pyłku wiesiołka dwurocznego (*Oenothera biennis*), całe.

351. Toż samo ziarno wypuszczające na jednym z kątów w pół otwartych przedłużenie rurkowane *t* błony wewnętrznej.

da jako mniej gęsta od upłodnika, musi przesiąknąć w znacznej ilości w wydrążenie ziarna. Tym sposobem błony rozciągają się, jeśli zewnętrzna jest wszędzie jednorodną, przerywa się w jakim bądź miejscu; jeśli posiada zagięcia, części te jako cieńsze i rozciąglejsze, biorą czas niejaki udział w zwiększeniu się objętości ziarna, tworząc wypukłości, zanim pękną. Błona wewnętrzna która posiada rozciągliwość w daleko wyższym stopniu, tworzy wypukłości wskrós przerw błony zewnętrznej, lub przez otworki, jeśli się takowe znajdowały. W tym ostatnim przypadku widać ją wychodzącą przez wszystkie otworki w postaci tyłuż pęcherzyków (fig. 344, 347, 348), i tym sposobem można najlepiej obejrzeć rozkład otworków na powierzchni ziarna: ułatwia się wyjście pęcherzyków przez dodanie do wody nieco kwasu dość mocnego, np. saletrzanego. Tak rozciągnięta na licznych punktach błona wewnętrzna, ulega nakoniec i sama; pęka na jednym z tych punktów i wypuszcza upłodnik w wytrysku krótszym, lub dłuższym (fig. 349). Dawniejsi botanicy śledząc zawsze otwierania się pyłku w wodzie, dostrzegli tego zjawiska, które jako bardzo wpadające w oko, musiało zatrzymać ich uwagę, i wnieśli ztąd, że w ten sposób i w życiu pyłek wypróżnia upłodnik, skoro się znajduje na powierzchni wilgotnej znamienia.

§ 468. Lecz jasną jest rzeczą, że w tym ostatnim przypadku ziarno zostając małą tylko przestrzenią swęj powierzchni w zetknięciu z płynem, nie jest wcale w tych samych okolicznościach, jak kiedy jest otoczone zewsząd wodą; że wzdymanie jego jest powolniejszym, że błony rozciągane przeto zwolna i tylko z jednej strony, mogą się daleko więcej przedłużać nieprzerwywając się wcale; łatwo się to daje spostrzedz na pyłku zostającym w zetknięciu czyto z samém znamieniem, czy też z jakąkolwiek powierzchnią niezbyt wilgotną. Wtedy bowiem błona wewnętrzna usiłuje wyjść na zewnątrz, nie już przez wszystkie zagięcia lub otworki, ale przez jedno, rzadziej przez dwa takowe miejsca; pęcherzyk zaś który się naprzód ukazał, przedłuża się następnie zwolna, w postaci rurki dającej spostrzedz przez swoje ściany ziarenka upłodnika, które w części wyszły razem z błoną bezpośrednio je zamykającą. Niekiedy widziano je nawet poruszające się w rurce takowej strumyczkami, a to ruchem, któryśmy nazwali *wirowym* (§ 273). Rurka, czyli *łagiewka*, jest jakeśmy rzekli, utworzona przez

błonę wewnętrzną, lecz przy podstawie swój może być jeszcze okryta błoną zewnętrzną, którą pociągnęła z sobą, nie rozrywając jej czas niejaki. Jeśli się znajduje trzecia błona, zbliżona bardziej do wewnętrznej, ta towarzyszy łagiewce nieco dalej.

§ 469. W pyłkach posiadających jedną tylko błonę, łatwo przewidzieć, że takowa przedłuży się w pomieniony sposób, na którymkolwiek punkcie swój powierzchni, skoro ten wystawionym będzie na działanie wilgoci, jak tego ciekawo daje przykład pyłek toinowatych, jeśli z wielu pisarzami nie zechcemy uważać otaczającej go tkanki komórkowej za błonę zewnętrzną (§ 454); lecz w innych razach gdzie istnienie jedynej tylko błony, jest niezaprzeczonem, pamiętać należy, że kształt pyłku bywa dokładnie rurkowatym (fig. 337).

§ 470. **Wydętki** (*antheridia*). — Posiadają rośliny bezliścienne narzędzia odpowiadające tym, któreśmy dopiero opisali, to jest pylnikowi i pyłkowi? Jedni odmawiali im narzędzi płciowych i nazywali je przeto *bezpłciowemi*, inni dając im nazwę *skrytopłciowych* wyrażali tylko tym sposobem okoliczność, iż narzędzia te jako ukryte, uniknęły dotąd spostrzeżeń, nie zaprzeczając bynajmniej możności ich istnienia. Później Hedwig odkrył w wielu skrytopłciowych dwa rodzaje narzędzi, z których jedno, nieznanie przed nim, porównane zostało do narzędzia męskiego roślin jawnopłciowych. Jestto zwykle woreczek, którego kształt i położenie różnią się podług roślin; zrazu zupełnie zamknięty, otwiera się później na jednym z punktów swój powierzchni i wypuszcza przez ten otwór istotę którą zamykał, a która jest nagromadzeniem ciałek zwykle połączonych płynem lepkiem, śluzowatym. Jeśli rzeczono ciałka zawarte są bezpośrednio w woreczku, a ten składa się z pojedynczej błony, rzeczą jest jasną że wtedy posiada wszystkie piętna ziarna pyłkowego wraz ze swym upłodnikiem, lecz ponieważ błona ta bywa w całych rodzinach utworzona z siatki komórek oddzielnych, przeto porównanie poprzednie staje się fałszywem, chybabyśmy z Mohlem przyjęli, iż okrywa zewnętrzna pyłku może być naskórkiem złożonym z wielu komórek. Tak więc mniemanie, że w skrytopłciowych narzędzie męskie istnieje, lubo przywiedzione do jednego ziarna pyłku, było ustanowionem i podtrzymywanem. Jednakże teraz powrócono dosyć powszechnie do téj idei, że narzędzie to odpowiada pylnikowi

lubo niedokładnemu, nadano mu więc osobną nazwę *antheridium* (wydętka). Damy lepiej poznać powody na jakich wspiera się ten sposób widzenia, opisując pokrótce wydętki najlepiej znane mchów i wątrobnic.

Sąto woreczki już pogrążone w pokładzie tkanki komórkowatej która je zewsząd otacza (jak w porostnicy [*Marchantia*] i innych *wątrobnicach*), już przytwierdzone końcem dolnym, a wolne wcałój reszcie swęj powierzchni (jak w mchach [fig. 352]; już zwężone na wyższym końcu w kształcie szyjki,



352.

co je czyni podobnemi do butelki, już znowu posiadające tępy koniec bez przedłużenia i zamknięty błoną przezroczystą, która gdy pęka, otwiera się woreczek (fig. 352). Reszta okrywy składa się z pojedynczej warstwy komórek o ścianach pojedynczych i jednociągłych (*a*). Nie spostrzegamy tu przeto warstwy owęj komórek włóknowych wewnętrzniejszych, na któreśmy zwrócili uwagę w pylnikach prawdziwych. Wydrążenie napełnione jest istotą wpołpłynną, w której badanie za pomocą szkieł daje rozeznac tkaninę komórkową (fig. 352, 1. *f*). Jeśli ta jest świeżą, można dostrzedz wewnątrz komórek ruchu czynnego. Ruch ten powstaje przez kołowanie małego ciała mającego kształt obręczy, zamkniętego w każdéj z komórek (fig. 352, 2). Skoro istota wydętki uwolniona jest od swęj okrywy i umieszczona w wodzie, ruch rzeczony nabięra nowęj prędkośc; komórki odłączają się jedno od drugich, ich powłoka bardzo cienka i mięka rozpłaszcza się wkrótce i wtedy widziēć można wyraźnięj ciała obręczkowate. Mają one postać nitek zwiniętych wokoło siebie, bądź raz tylko jeden, zkąd powstaje koło, bądź w wielokrotne skręty wężownicy zbliżone do siebie, nabrzmięte w jedném miejscu, a zwęzające się powoli nitkowato, od tego punktu ku drugiemu końcowi, który zamyka koło (fig. 352, 3). Nitki te


352. 1. Wydętka *a* mchu: *Hypnum triquetrum* w chwili kiedy przez wierzchołek jęj otwarty wychodzi istota w nięj zawarta *f* — 2. Cztery komórki tęj istoty z których każda zawiera ciałko obręczkowe ruchome czyli żyjatek. — 3. Jedno z tych żyjatek odosobnione.

uwolnione rozkręcają się często w linją krzywą lub wężykowatą, i wtedy zda się że mamy przed oczyma niektóre z żyłatek nazwanych wymoczkami, dlatego że je napotykaemy często w wodzie, w której moczyliśmy istotę ustrojową. Podobieństwo jest tak znaczném, że wielu badaczy nie waha się uważać je za istotne zwierzątka. Te bowiem mają wszakże pewien rodzaj łebka odpowiadający nabrzmieniu o którym mówiliśmy, i ogonek mniéj więcej długi a zwolna nitkowato zcieńczony.

Wydętki ramienicy (*Chara*), posiadała również takowe ciała, lecz te zamiast być zawarte w wydrążeniach pokładu komórkowego, zamknięte są kupkami w komórkach połączonych końcami, i stanowiących przeto rurki poprzegradzane (fig. 353).

Możnaż komórki te porównać do ziarn pyłku, a każde z żyłatek do upłodnika? Przyrodzenie tych części okryte jest jeszcze grubą ciemnością; postrzeżenie ich jest wcale niedawném, a podobieństwo ich z ustrojnością zwierzęcą zanadto uderza w oczy, abyśmy mieli tutaj o nich zamilczéć, pomimo niepewności w której jeszcze zostajemy co do znaczenia jakie mają w roślinku. Jeśli mają być pylnikami skrytopłciowych, widoczną jest, że zawartość ich jest równie jak i część zawierająca różną od tego, cośmy opisali przy pylnikach roślin jawno-płciowych.

353. 1. Część zawartości wydętki ramienicy zwyczajnej (*Chara vulgaris*). Wiele rurek poprzegradzanych *t* przytwierdzonych do komórki *b*. — Mała kupka podobnych komórek służących za podstawę wielu rurkom, napełnia po większej części wydrążenie wydętki. — 2. Kończyna jednej z rurek złożona z wielu komórek; w każdej znajduje się żyłatko. — Jedno z nich uwolniło się już do połowy ze swej komórki. — 3. Kończyna rurki z której żyłatka już wyszły z wyjątkiem komórki ostatniej. — 4. Jedno z żyłatek odosobnionych.



353.

## S Ł U P E K.

§ 471. Wspomnieliśmy już często o słupek, który zajmuje środek kwiatu, który jest otoczony w kwiecie obopiecznym i zupełnym (§ 356), okrywami i pręcikami, w kwiecie żeńskim (§ 382) tylko okrywami, a który stanowi cały kwiat, jeśli tenże jest nagim (§ 383). Widzieliśmy że słupek składa się z liści przekształconych czyli owoców, których liczba różni się według roślin i może być zmniejszoną do jednostki; że owocki albo są ciągle odosobnione jedne od drugich (§ 358, 361), albo się zrastają w jedno ciało (§ 356, 366). Pozostaje nam teraz opisać budowę i różne odmiany tego ciała, prostego lub złożonego, którego poznaliśmy wprzód stosunki położenia. Dla ułatwienia weźmiemy najprzód pod uwagę owocek odosobniony, potem zaś rozberzemy przypadki w których mamy wiele owoców połączonych z sobą, tudzież rozmaite stosunki jakie wtedy przedstawiać mogą względem innych części kwiatu.

§ 472. Zaczniemy więc od śledzenia rozwijania się pojedynczego owoka. Łatwo się to daje uskuteczyć w kwiecie rośliny pospolitej na brzegach rzek naszych, w kwiecie rośliny baldaszkowej (*Butomus umbellatus*). Otworzywszy bardzo jeszcze młody pąk tej rośliny (fig. 355), obaczmy, iż środek jego zajmuje okółek o 6 małych ciałkach *c*, albo raczej dwa okółki każdy o trzech takowych ciałkach; są to małe, zielonawe łuszczyki, nieco wklęsłe od wewnątrz, i nie różniące się od prawdziwego liścia, w pierwszym okresie rozwijania się tegoż. Każdy z tych małych liści, staje się coraz bardziej wklęsłym, w skutek stopniowego zbliżenia się jego brzegów, które nakoniec stykają się (fig. 356) i zrastają z sobą. Wtedy liść stanowi ścianę wydrążenia zupełnie zamkniętego. Uważając zaś bacznie powierzchnią wewnętrzną tego wydrążenia, odpowiadającą powierzchni górnej liścia, spostrzeżemy, że cała pokryta jest małemi jajowatemi wyrostkami, które się do niej przyczepiają (fig. 357 i 358). Nazywamy *zawiązką* (*ovarium*, dawniej *germen*) ciało to wydrążone w środku: *komorą* (*loculus*), samo wydrążenie jego (fig. 357 i 358, *l*);

szłyś  
ścian  
w na

§  
liścia  
(fig.  
kształt  
zielen  
dalsz  
czy  
jedn  
w w  
ścian

35  
zania  
zewne  
rych  
z któ  
naprz  
Owoc  
35  
który  
pows  
przez  
35  
cznie  
35  
dla p

załążkami (ovula) owe małe ciała przytwierdzone do jego ściany (fig. 357 i 358, *o*), a które później zamieniają się w nasiona.



355.

356.

357.

358.

§ 473. Wiśnia przedstawia nam w inny sposób, przejście liścia w owoc. Wziąwszy bowiem kwiat pełny tej rośliny (fig. 359), obaczmy że środek jego zajmują 2 małe listeczki, kształtne i zaledwie że zagięte, u dołu rozszerzone w kraj zielony (*l*), u góry zwężone w przedłużenie, zdające się być dalszym ciągiem nerwu głównego, *s*. Lecz w kwiecie pojedynczym zamiast tych dwóch środkowych listeczków, znajduje się jedno tylko ciało (*o*), u dołu wydęte i czepe, zawierające w wydrążeniu swoim inne mniejsze ciało, przyczepione do ściany wydrążenia; łatwo w ciałku tém poznać zawiązek o je-


355 Pęk bardzo młody rośliny (*Butomus umbellatus*) otwarty dla pokazania rozmaitych części kwiatu. 1<sup>o</sup> Okwiat o sześciu listeczkach, trzech zewnętrznych *pe*, trzech wewnętrznych *pi*. 2<sup>o</sup> Dziewięć pręcików, z których trzy *ei*, leżą naprzeciw okwiatu wewnętrznego. 3<sup>o</sup> sześć owoców z których trzy *ce* przypadających naprzeciw okwiatu zewnętrznego, trzy *ci* naprzeciw okwiatu wewnętrznego, i położone nieco bardziej ku wewnątrz. Owociki te są jeszcze małemi listeczkami, nieco wklęsłemi od wewnątrz.

356. Też same owocki nieco bardziej rozwinięte; dwa brzegi listeczka który tworzy każdy z nich, stykają się już prawie z sobą, a wydrążenie powstałe w skutek zawinięcia listeczka owocowego, spólniczy z zewnętrznem przez wązką tylko szparę.

357. Część niższa jednego z powyższych owoców, przeciętego poprzecznie dla pokazania komory *l* i załóżków *o*.

358. Owoczek daleko starszy i już zupełnie zamknięty, przecięty pionowo dla pokazania komory *l* i załóżków *o*. — *s* Wzdymki znamieniowe.

dnym zalążku, zawartym w jego komorze. Ponad wydrążeniem, zawiązek zwęża się w przedłużenie obłe (*t*), które się u góry rozszerza (*s*). Przedłużenie ówo zwężone nazywa się *szyjką* (stylus), a część rozszerzona, która je kończy, *znamieniem* (stigma). Mamy tu więc taki sam listeczek, jakiśmy widzieli w środku kwiatu pełnego, z tą tylko różnicą że blaszka jego jest zgrubiała; a w skutek zbliżenia i zrosnięcia jego brzegów, powstało wydrążenie zamknięte, czyli komórka, w której rozwinął się zalążek.



§ 474. Owocek zupełny składa się z trzech następujących części: z zawiązka czyli wydrążenia zamkniętego, zawierającego jeden lub więcej zalążków; z szyjki, czyli przedłużenia górnego, zwężonego i mięszszego, ze znamienia, które kończy szyjkę i różni się od niej zazwyczaj odmienną tkanką, a niekiedy i zgrubieniem. Czasem tkanka ta, zamiast siedzieć na

359. Owocki w stanie liści tak jak je znajdujemy w kwiatach pełnych wiśni. — *l* Krajec. — *s* Przedłużenie nerwu głównego *n* u góry wolne i przedstawiające szyjkę i zakończone zgrubieniem przedstawiającem znamię.

360. Owocek wiśni z kwiatu pojedynczego. — *o* Zalążek. — *t* Szyjka — *s* Znamię.

361. Ten sam przecięty pionowo dla pokazania wydrążenia środkowego *o* zawiązka zawierającego zalążek *g* zawieszony na jego ścianie w punkcie w którym się kończy wiązka *fn* naczyń żywiających; w szyjce *t* widać mały przewód *c* rozciągający się od znamienia *s* aż do wydrążenia zawiązka.

szyjce.  
bezpos-  
trzej  
albo t  
dną;  
sessile  
§ 4  
różny  
która  
kno-na  
z cewe  
nasada  
raz po  
mi w si  
której  
dzielne  
(§ 42  
ku we  
rozwir  
powie  
kami  
nego  
wpły  
nigdy  
§  
częst  
częśc  
kowi,  
§ 4  
przeds  
przedk  
walec  
nie sk  
jój ob  
do gó  
odzia  
Śro  
się cz  
powie  
361, c

szyjce, która ją oddala mniej lub bardziej od zawiązka, siedzi bezpośrednio lub prawie bezpośrednio na powierzchni zewnętrznej samego zawiązka; wtedy więc albo wcale niema szyjki, albo takowa jest tak dalece skrócona, że ją uważamy za żadną; znamię zaś zowie się w takim razie *bezszyjkowém* (st. sessile; fig. 358, 397).

§ 475. Przystąpmy do rozbioru budowy wewnętrznej tych różnych części. Zawiązek składa się, równie jak blaszka liścia którą przedstawia, z mięksizu przebieżonego od wiązek włókno-naczynnych, i jest okryty naskórkiem. Wiązki utworzone z cewek rozkręcalnych, idą z dołu do góry i zbiegają się ku nasadzie szyjki, bywają zaś albo nieliczne, albo bardzo liczne, raz pojedyncze, drugi raz rozgałęzione i łączące się odnózkami w siatkę mniej więcej zawikłaną. Tkanka komórkowa wskroś której przechodzą, nie posiada wprawdzie owych warstw oddzielnej budowy, jakieśmy opisali w miąższości wielu liści (§ 427), jednakże zmienia się nieco postępując od zewnątrz ku wewnątrz, a zmiana ta, tém jest wydatniejszą, im bardziej rozwinął się zawiązek. Naskórek zewnętrzny odpowiadający powierzchni dolnej liścia, jest równie jak ona opatrzony szparkami mniej więcej licznymi. Co się tyczy naskórka wewnętrznego, który wyścięła wydrążenie komory, ten usunięty zpod wpływu światła, jest zwykle bledszy lub białawy, i nie posiada nigdy szparek.

§ 476. Nie zawsze zawiązek odpowiada blaszce liścia, lecz częstokroć, a nawet podług zdania niektórych, najzwyczajniej, części jego pochwowatęj. Wtedy szyjka odpowiadałaby ogonkowi, blaszka zaś byłaby stłumioną.

§ 477. Szyjka, ze względu swęj budowy zdaje się raczej przedstawiać część wyższą liścia zwięzonego i skręconego, niż przedłużenie samego tylko nerwu głównego. Tworzy ją bowiem wałec mięksizowy, przerźnięty małemi wiązeczkami naczyń, nie skupionemi w środku, lecz owszem rozproszonemi po całym jej obwodzie w kształt niejako pochwy: idą one prosto z dołu do góry, i kończą się ku wierzchołkowi. Cały ten układ przyodziany jest naskórkiem idącym od zawiązka.

Środek walca szyjki, który na pierwsze wejście wydaje się częstokroć miąższym, badany baczniej i przy stosowném powiększeniu, ukazuje nam przewód bardzo szczupły (fig. 361, c), kończący się z jednej strony na wewnętrznej ścianie

zawiązka, z drugiej w znamieniu. Przewód ten bywa czasami widocznie czczy (fig. 362); innym razem wypełniony jest tkanką komórkową, często jednakże wietką i jakby z miejsca swego ruszoną (fig. 363, *pp*), a przeto pozostawiającą liczne próżnie pomiędzy swemi komórkami; w każdym zaś razie, nawet kiedy tkanka ta jest ściślejszą, różni się jeszcze znacznie od tkanki właściwej szyjki. Zwykle ściany przewodu najeżone są małemi wystającymi komórkami (fig. 362, *p*) czyli wzdymkami. O pewnym czasie, znajdujemy w przewodzie inne jeszcze komórki miękkie i wilgotne, które się przedłużają w jego kierunku; sąto niteczki lepkie (fig. 363, *ff*), wysięlające przewód i zapełniające go w części. Ogół tych komórek nazwano *tkanką przewodczą* (*tissu conducteur*).



362.



363.

§ 478. Ta to tkanka zdaje się tworzyć znamię, będące niejako dalszym jej ciągiem i rozpostarciem raz końcówem, kiedy

362. Przecięcie poprzeczne szyjki szachownicy (*Fritillaria imperialis*) złożonej z trzech w jedno zrosniętych. — *vv* Trzy wiązki naczynne, z których każda odpowiada jednej z trzech szyjek. — *pp* Wzdymki sterczące w wydrążenie przewodu.


363. Budowa przewodu, zajmującego środek szyjki jednego z dzwonek. — *cc* Tkanka komórkowa stano wiąca ściany przewodu, którą przebiegają wiązki cewek węzownicowych *vv*. — *pp* Komórki innego kształtu, jakby ruszone z swego miejsca, wysięlające te ściany i zapychające w części wraz z innymi wydłużonemi i nitkowatemi *ff* wnętrze przewodu.

przewo  
360 s,  
piony  
364),  
tkanka  
jedna  
się z t  
trzniej  
albo na  
indziej  
w każ  
równie  
lub wię  
nia, cz

§ 47  
zewnat

364. 2  
365. 2  
Zawiazel  
366.  
Wierzch  
powieks  
367. 2  
zek, z kt  
większo  
na dla p

przewód końcowy wypłaszcza się tylko na wierzchołku (fig. 360 s, 366 t) drugi raz bocznym, gdy tenże przewód rozszczepiony w pewnej rozległości, otwiera się bądź po jednej (fig. 364), bądź po obu stronach zarazem (fig. 365, s). Pomiędzy tkanką przewodzącą a tkanką znamienia, niema żadnej granicy; jedna przechodzi nieznacznie w drugą. Znamię przeto składa się z tkanki mniej więcej wietkłej, której komórki najzewnętrniejsze wydłużają się zazwyczaj we wdymki (fig. 366, 2), albo nawet w prawdziwe włosy (fig. 367, 3; 392, s). Kiedy indziej tkanka jest zbilsza i równiejsza od zewnątrz; lecz w każdym razie, podczas zapładniania wszystkie jej komórki równie jak tkanka przewodząca, napełniają się płynem mniej lub więcej lepkiem, który się wysącza na powierzchnię znamienia, czyniąc je wilgotnym i lepkiem.



§ 479. Skoro pylnik otwierając się sprężyste, wyrzuci na zewnątrz pyłek, który go napełniał, ziarna tegoż muszą padać


364. Znamię jednostronne s z *Asimina triloba*. — t Szyjki.

365. Znamię dwustronne s z gatunku babki (*Plantago saxatilis*). — o Związek s Szyjka.

366. 1. Znamię s z *Daphne laureola*, kończące swoje szyjkę t. — o Wierzchołek zalążka. — 2. Mała cząstka powierzchni znamienia znacznie powiększona dla pokazania wdymek.

367. 1. Wierzchołek szyjki t z *Hibiscus palustris*, podzielony na 5 gałązek, z których każda kończy się znamieniem s. — 2. Jedna z gałązek powiększona. — 3. Część powierzchni znamienia bardziej jeszcze powiększona dla pokazania komórek jej, wydłużonych w kształt włosków.

na znamię, bądź dla bliskości obudwu narzędzi u większej liczby roślin, bądź, że pyłek przeniesionym zostaje na bardziej oddalone znamię za pośrednictwem wiatru, lub przez owady, które go z sobą unoszą z jednej części kwiatu na drugą, lub z jednego kwiatu na drugi. Pyłek padłszy na znamię, zostaje przytrzymany przez jego lópką obłoczkę i tamto zaczyna się



368.

działanie jakie łatwo przewidzieć, pomnąc, co się dzieć zwykło kiedy się ziarno pyłku zetknie z powierzchnią wilgotną (§ 468). Wzdyma się ono powoli wysysając wilgoć, błona wewnętrzna rozciąga się, wychodzi wskroś zewnętrznej, na punkcie zetknięcia, wydłuża się w łagiewkę (fig. 368. *tp*), która zapuszcza się w dolki powierzchni znamienia (*te*) i w odstępy jakie ję się nastęrczają. Tym sposobem przebywa miąższość znamienia i wciska się w tkankę przewodczą, która ję ułatwia przejście pomiędzy częściami wypełnionemi cieczą. Przedłużając się ciągle, dochodzi

aż do dolnej części przewodu, i przybywa do wydrążenia zawiązka. Na ścianach zaś tego ostatniego, znajduje się tkanka przewodcza, aż po same prawie zalążki, które o tym czasie przedstawiają rodzaj woreczków otwartych na jednej z kończyn, odpowiadającj owj tkance. Łagiewka więc przebywa następnie ten otworek, zapuszcza się weń, a tym sposobem ustala się bezpośredni związek pomiędzy pyłkiem a zalążkiem, pomiędzy istotną częścią pręcika i słupek. Zatrzymajmy się na

368. Część znamienia z *Antirrhinum majus* podczas odbywającego się upłodnienia. — *ps* Komórki powierzchniowe tworzące wzdymki. — *te* Komórki głębsze wydłużone, walcowate, stanowiące tkankę przewodczą. — *gp* Ziarna pyłku przytwierdzone do powierzchni znamienia. — *tp* Łagiewki wypuszczane przez każde z ziarn pyłku i zagłębiające się w przewodach tkanki znamieniowj.

tym punkcie i zawieśmy śledzenie tego co się dalej dzieje, do rozdziału o zalążku.

§ 480. Łatwo nam teraz będzie pojąć dokładnie budowę i czynności owocika. 1<sup>o</sup> Część jego odpowiadająca liściowi, utworzona jest przez zawiązek i szyjkę, i stanowi układ żywiący: jest ona bowiem przyczepioną do rośliny i łączy się z resztą kwiatu za pomocą swych naczyń, które rozprowadzają po niej aż po sam wierzchołek, w kierunku od wewnątrz ku zewnątrz, soki potrzebne do utrzymania jej i wzrastania. 2<sup>o</sup> Druga część złożona ze znamienia i tkanki przewodzącej, stanowi układ zapłodniczy. Prowadzi ona aż we wnętrze zawiązka ciało z zewnątrz przychodzące. Niema tu więc potrzeby tłumaczyć, dlaczego podano i przyjęto nazwę tkanki *przewodzącej*.


§ 481. Czasami trudno jest dokładnie rozróżnić wielu z tych części. Przychodziłoby to łatwiej, gdybyśmy zawsze mogli używać pomocy mikroskopu. Lecz w większej części opisów botanicznych nastęrczyć się mogą wątpliwości co do oznaczenia na szyjce części stanowiącej właściwe znamię, używamy bowiem zwykle w takich razach pojedynczego tylko szkła, a nadto śledzenie tkanek wewnętrznych, zabierałoby tu zbyt wiele czasu, i byłoby zkażdym połączone z licznymi trudnościami, ponieważ częstokroć mamy przed sobą zeschnięte tylko i obumarłe rośliny; dlatego też zowiemy zwykle znamieniem, część dającą się łatwo odróżnić od reszty szyjki, położeniem, powierzchnością i kształtem. Przy dokładniejszych nieco spostrzeżeniach, pomocną nam być może obecność pyłku, którego ziarna po zapłodnieniu siedzą często przyczepione w miejscach należących do znamienia; ten jednak sposób rozpoznawania nie jest wcale nieomylnym. Chcąc w opisach oznaczyć ściśle te narzędzia, potrzeba śledzić, czy w przedłużeniu o które chodzi, znajduje się przewód, lub czyli takowe jest miąższem; w pierwszym razie będzie ono szyjką, w drugim znamieniem.

§ 482. Wyłożywszy ustrojność i czynności owocika uważanego pojedynczo, przejdźmy teraz do słupek, składającego się z wielu owocików połączonych w jednym kwiecie.

Owocki te mogą nie wszystkie być zupełnie do siebie podobne. Tak np. w niektórych nagwiazdkowatych (*Acridocarpus*, *Hiptage*), z trzech owocików tworzących słupek, dwa, albo nawet jeden tylko opatrzony jest długą szyjką, nieistniejącą w innych; czasami też owocki różnią się kształtem (*Gau-*

*dichaudia congestiflora*). Przypadki jednakże tej różnokształtności są nadzwyczaj rzadkie; między nimi zaś, te są nieco od innych częstsze, które powstają w skutek płonności niektórych owoców, najpospoliciej wszakże wszystkie owocki, przynajmniej w młodości, są zupełnie do siebie podobne, i o takich też właśnie mówić będziemy.

§ 483. Wyrastają one albo w jednej wysokości, na téjże samej płaszczyźnie, i są ułożone w okółek (fig. 374, 389); albo w różnych wysokościach, a wtedy ułożone są w węzownicę. W tym bowiem ostatnim przypadku, dno czyli osadnik, cały pokryty owocami, wydłużył się w oś obłą jak w bobrowniku lub tulipowcu (§ 359, fig. 224), stożkową (jak w malinie), lub nabrzmiałą (jak w poziomce), albo też powierzchnia jego rozszerzona zamiast pozostać płaską, zagina się w miseczkę lub dzbaneczek (jak w róży fig. 369). Niekiedy chociaż część osi nosząca owocki znacznie się w podłuż rozwija, ta-



kowe jednak siedzą tylko na jej szczytce okółkowo i na szczupłej przestrzeni. Jestto jeden z przypadków wyżej (§ 373 *bis*) wspomnianych, w których pomiędzy różnemi okółkami kwiatu napotkać można dłuższe lub krótsze międzywęzła. Jedno z takowych ukazujące się pod słupkiem (fig. 374, 375, *g*) nosi różne nazwiska podług postaci jakie przedstawia, podług rozmaitego stopnia długości lub grubości swojej, która jest bardzo zmienna w różnych roślinach. Teraz nazywają je dosyć powszechnie *pod-słupniem* (gynophorum). Linneusz nazywał w takim razie słupek *trzonkowym*, rozumiejąc przez trzonek, wszelkie podobne przedłużenie podnoszące narzędzie, które na niem siedzi, a lubo nazwa ta sama przez się może z przyczyny swój ogólności spowodować jaką niepewność, jednakże używanie jej w opisach nie pociąga za sobą żadnej nie-

369. Kwiat róży, przecięty pionowo dla pokazania położenia owoców w głębi kielicha na wklęsłej powierzchni dna *r*. — *ct* Rurka kielicha. — *cf* Kraj jego podzielony na listeczki. — *e* Pręciki. — *o* Zawiązki; ponad każdym z nich wznosi się szyjka, wystająca na zewnątrz rurki kielichowej i kończąca się znamieniem wypłaszczone *s*.

dogod  
odnos  
§ 4  
gdzie  
kę, k  
zrozu  
i zas  
siebie  
to jest  
dzie n  
w tym  
można  
lišmy  
fig. 1  
szyjki  
a szyj  
czne,  
owa, l  
albo z  
ka bę  
wiąza  
wszy  
stkie  
wier  
Osta  
malin  
to ro  
nia b  
§ 4  
do dr  
beztr  
swoje  
zdaw  
z pow  
lišmy  
(gyn  
wiąz  
włazi  
370  
371

dogodności, wiemy bowiem zawsze, do jakiego narzędzia się odnosi.

§ 484. Nie możemy tu pominąć szczególnie jednej odmiany, gdzie dno kwiatowe nosi nie tylko zawiązek ale zarazem i szyjkę, która na pozór nie należy do niego. Dla dokładniejszego zrozumienia tego, powróćmy na chwilę do szyjki i zawiązka i zastanówmy się nad położeniem jakie one mogą względem siebie przybierać. Mówiliśmy dotąd o szyjce *wierzchołkowej*, to jest przedłużającej zawiązek u góry (fig. 360), co wprawdzie najczęściej się zdarza; liść tworzący owoc, zachowuje w tym razie ciągle kierunek wstępujący. Lecz wystawić sobie można, że blaszka jego jest odgięta, podobnie jak to widzieliśmy w przedlistnieniu odchyłonym niektórych pączków (§ 174, fig. 164, 1): wtedy konieczna téż odpowiadająca początkowi szyjki; przypadać będzie mniej lub bardziej nisko i z boku, a szyjka będzie *boczną* (fig. 375). Jeśli odgięcie jest tak znaczne, że cała wyższa połowa blaszki leży na niższej kończynie owa, leżeć będzie albo prawie (fig. 370), albo zupełnie u spodu (fig. 371), a szyjka będzie *nasadową* (basilaris). Zawiązek dostarcza nam przykładów wszystkich tych stopni odgięcia, wszystkich pośrednich pomiędzy położeniem wierzchołkowym a nasadowym szyjki. Ostatnie to, widzieć można w słupku maliny (fig. 370) i wiele innych różowatych (fig. 371), która to rodzina dostarcza nam także dobrych przykładów położenia bocznego.


§ 485. Widoczną jest, że szyjka nasadowa, zbliżona jest do dna wolną swoją częścią; dotyka go jeśli zawiązek jest beztrzonkowym, a jeśli ten pograża się nieco we dnie nasadą swoją, pociąga téż za sobą początek szyjki, w skutek czego zdawać się będzie, że ta wychodzi raczej z osadnika, niż z powierzchni zawiązka. Tęto właśnie odmianę szyjki chcieliśmy dać poznać; otrzymała ona nazwę *szyjki osadnikowej* (gynobasium); zaś *ovarium gynobasicum* wyrażamy przez *zawiązek o szyjce osadnikowej*. Zwykle szyjki wielu takich zawiązków siedzących okółkami, zrastają się w jedną, która



370. Owocek poziomki. — o Zawiązek. — t Szyjka. — s Znamię.

371. Owocek z *Chrysobalanus icaco*. Głoski mają toż samo znaczenie.

tworzy rodzaj słupek środkowego, otoczonego okręgiem zawiązków na pozór nie mających szyjki. Widzieć to można



372.

373.

w rodzinie ołdzianowatych (Ochnaceae); we wszystkich prawie wargowych (fig. 372), i w większej części ogórecznikowatych. W tych ostatnich szyjka bywa częstokroć boczna raczej niż nasadową; lecz zawiązek leży stroną przednią na płaszczyźnie pochyłej, która mu za osadnik służy, a przeto początek szyjki jest w niem także zagłębiony, chociaż rzeczywiście leży wyżej od dolnej części zawiązka (fig. 373).

§ 486. Dotychczas mówiliśmy o owocach wolnych, to jest nie zależących od siebie. Wiemy jednak, że nie zawsze są takimi, i że owszem częściej się od innych narządów kwiatowych z sobą zrastają (§ 268), bądź częściowo, bądź całkowicie. Zrośnięcie to może zachodzić od góry ku dołowi. Tak, widzimy czasem wiele owoców zrośniętych z sobą znamionami tylko (np. w toinowatych i trojęściowatych, w rodzaju *Zanthoxylum* fig. 374), lub górną częścią szyjek (fig. 375), albo wreszcie całymi szyjkami. Mówiąc dopiero co o szyjce osadnikowej, wspomnieliśmy o wielu szyjkach ściśle zrośniętych, chociaż należących do odosobnionych zawiązków.

§ 487. Najpospoliciej jednakże zrośnięcie postępuje od dołu ku górze, zaczęły zawiązki łączyć się z sobą wprzód niżeli szyjki, szyjki wprzód niż znamiona. Zawiązki mogą się spajać w samej tylko dolnej części, a pozostać odosobnionemi u góry (jak np. w rucie), o czém opis ma czynić wzmiankę

372. Słupek jednej z wargowych, *Lamium album*. Część kwiatu odcięta jest pionowo, równie jak dwa z czterech zawiązków dla pokazania osady szyjki *s* na dnie *r*. — *o* Dwa pozostałe zawiązki. — *d* Krążek gruczołowaty leżący pod słupek. — *c* Część kielicha. — *p* Korona.

373. Słupek jednej z ogórecznikowatych (*Erithricium jacquemontianum*) po odjęciu zawiązka przypadającego na samym spodzie. Widać jak zawiązki *oo* osadzone są pochyło na dnie ostrosłupowem *r*, ponad którym wznosi się szyjka *s*, wypłaszczone u wierzchołka w znamię.

(*ovaria plura basi tantum coalita*), lub wyrazić to przez: *zawiązek wielołatowy*. Kiedy wiele zawiązków połączonych jest w jedno ciało, ciało to przybiera samą nazwę zawiązka.

Dawniej uważano je za narzędzie pojedyncze w rozmaity sposób wewnątrz podzielone, i stawiono zawiązek prosty albo pojedynczy (to jest albo rzeczywiście samotny, albo powstały ze zrośnięcia wielu) naprzeciw zawiązka złożonego, to jest gdzie było wiele owoców wolnych w jednym kwiecie. Dzisiaj używamy jeszcze tych samych wyrazów, lecz przzwijemy do nich wcale inne znaczenie; zawiązkiem bowiem prostym nazywamy ten tylko, który należy do owocika wolnego; złożonym zaś ten, który powstał z połączenia wielu owoców w jedno ciało. Na różnicę tę należy dawać bacność przy czytaniu książek botanicznych z różnych czasów.

Łatwo jest dowieść licznymi przykładami, że zjednoczenie wielu owoców, czyli przekształconych liści, w celu utworzenia zawiązka napozór prostego, zjednoczenie któreśmy dotychczas w teorii tylko poznali, potwierdza się postrzeżeniami na roślinach. Przystaniemy tu na przywiedzeniu kilku tylko przykładów, których nam dostarczają rośliny pospolite w naszych ogrodach. Ostróżka ogrodowa (*Delphinium ajacis*) posiada jeden owocek, którego zawiązek o ścianach cienkich i zielonych, przedstawia dosyć wyraźnie liść zgięty na sobie samym. Inne gatunki tego samego rodzaju (np. *delphinium*



374.

375.

374. Słupek z *Zanthoxylon fraxineum* złożony z pięciu oddzielnymi owoców wywyższonych na podślupniu *g*. Każdy z zawiązków *o* posiada szyjkę wierzchołkową nabrzmiałą na kończyźnie w znamię *s*. Wszystkie pięć znamion są długi czas zrośnięte z sobą bokami.

375. Część słupka dyptanu (*Dictamnus fraxinella*). Z pięciu owoców odjęto dwa, dla okazania jak szyjki *s* wychodzące ze strony wewnętrznej owoców, zrazu oddzielne, zbliżają się potem do siebie i zrastają w jedną. — *o* Zawiązki z których dwa ku przodowi leżące pokazują powierzchnią swą grzbietową *ol* i jedną z powierzchni bocznych *l*. U spodu podślupnia *g* widać bliźny *c* na punktach osady kielicha, płatków i pręcików.

*junceum*), mają trzy podobne do siebie owocki, całkowicie odosobnione w każdym kwiecie, niektóre nawet mają ich pięć. W orliku, rodzaju bardzo bliskim, słupek składa się z pięciu podobnych owocków. W trzecim rodzaju tej samej rodziny, w czarnuszce (*Nigella*) spostrzegamy także okótek pięcio-owockowy; lecz tu owocki zaczynają zrastać się między sobą: w jednych gatunkach u podstawy tylko (np. *Nigella orientalis*) w innych do większej daleko wysokości, a w niektórych nawet, aż po sam wierzchołek. Tak w czarnuszce rzymskiej (*Nigella damascena*), zawiązki są całkowicie zróżnione w ciało jajowate, ponad którym wznosi się pięć odosobnionych szyjek. Nie podobna było przypuścić, aby pięć zawiązków orlika lub czarnuszki wschodniej, stanowiło jedno narzędzie, a jednak, przejście tych pięciu zawiązków w jeden związek czarnuszki rzymskiej, jest zanadto widoczne, abyśmy się mogli wahać względem uznania w nim tegoż samego składu, to jest obecności pięciu narzędzi, których wszystkie stopnie połączenia widzieliśmy z kolei.

Każden z osobnych owocków posiada powierzchnią zewnętrzną czyli grzbietową i dwie powierzchnie boczne, zbiegające się z sobą w kąt od strony osi kwiatowej. Temi kątami i temi powierzchniami bocznymi owocki zrastają się z sobą, tworząc związek napozór mniej więcej prosty. Ztąd wynika, iż przeciąwszy taki związek wpoprzecz, znajdziemy w nim pięć wydrążeń poprzedzielanych powierzchniami bocznymi, które zrastając się z sobą po dwie, tworzą przegrody wewnętrzne. Płaszczyzny tych przegród muszą, rozumie się, być równoległe względem osi kwiatowej, a one same muszą leżeć naprzemian względem szyjek, ponieważ odpowiadają bokom liści owockowych, gdy tymczasem szyjka odpowiada środkowi tychże. Każde z wydrążeń jest komorą odpowiadającego owocika, i nosi też nazwisko *komory* (*loculus*); ztąd przymiotnik: wielokomorowy (*multilocularis*) nadawany takiemu związkowi; *dwu*,—*trzy*,—*cztero*,—*pięcio*-komorowy, podług tego jak liczba komór jest 2, 3, 4, 5, i t. d. Ilość *przegród* (*dissepimenta*), równa się ilości komór; każda zaś z nich składa się z dwóch płatów mniej więcej ściśle z sobą zjednoczonych. Ilość szyjek, jeśli takowe są odosobnione, jest taka sama, i może przeto od zewnątrz już, wskazywać ilość komór wewnątrz leżących.

§ 488. Nie trudno zatem oznaczyć ilość owoców składających zawiązek, bądź za pomocą szyjek, jeśli takowe były pojedyncze i odosobnione; bądź za pomocą przegród, jeśli te zachowały się w całości. Lecz czasem może zbywać na której z tych skazówek. Tak np. w większej części goździkowatych, przegrody znikają bardzo wczesnie, jednakże obecność wielu szyjek pokazuje nam, że zawiązek składa się rzeczywiście z wielu listeczków owocowych, np. z dwóch w goździku, z trzech w mokrzycy pospolitej, z pięciu w rogownicy (fig. 383, s). W wielu znowu innych razach, szyjki przestają wskazywać liczbę komór zrastając się z sobą, albo też przeciwnie rozgałęziając się, przez co zdają się przedstawiać więcej komór niż ich jest w istocie: w takich razach należy przeciąć zawiązek, a liczba przegród lub komór pokaże nam liczbę owoców.

Ale jakim sposobem oznaczyć takową, jeśli niema żadnego z owych dwóch pomocniczych środków? Po większej części daje się to wykonać z pomocą stosunków położenia załączków względem owoców. Wypada nam przeto rozebrać takowe w tém miejscu.

§ 489. Załączki, po ustaleniu się ich związku z łagiewką, czyli mówiąc innemi słowy, po zapłodnieniu, zaczynają się wykształcać w nasiona. Potrzeba więc do tego, z jednej strony, aby tkanka przewodcza sprowadziła aż do nich pierwiastek upładniający, z drugiej aby otrzymać mogły pierwiastki pożywne, potrzebne do dalszego ich wzrostu. Pożywienie to muszą czerpać z soków, które przybywają do nich już przerobione z reszty rośliny, a szczególnie z części pod niemi położonych. Wiązki włókno-naczynne przerzynające te części, rozdzielają się w owocach i posyłają małą gałązeczkę do każdego z załączków, które tym sposobem wiążą się z układem ogólnym rośliny. Do wiązek rzeczonych, przychodzących z dołu, przyłącza się sznurek tkanki przewodczej idący z góry. Z połączenia tych dwóch tkanek, wynika na ścianach komory wydatność mniejsza lub większa, do której przytwierdzone są załączki tamże zawarte, i która nazywa się *łożyskiem* (placenta). Niektórzy pisarze zatrzymując to imię na oznaczenie wydatności odpowiadającej osadzie każdego załączka w szczególności, mianują *łożyszcznią* (placentarium), ciało utworzone przez połączenie pojedynczych łożysk i noszące na sobie wiele załączków. Ztąd także pochodzi wyraz *ułożyszcznienie* (placen-

tatio), którym oznaczamy rozkład zalążków, a tém samém i łożysk, w zawiązku prostym lub złożonym.

Widzieliśmy w owoku roświty (§ 472, fig. 358) liczne zalążki, a przeto i łożyska, pokrywające całą ścianę komory. Lecz zalążki rzadko bywają podobnie rozrzucone, najczęściej zaś skupiają się na ścianach w podłużne i proste rzędy, a wiązki żywiące, zebrane są zwykle w jeden sznurek w każdym owoku. Łatwo ztąd wnieść, że w razie nieobecności przegród, czyli co na jedno wychodzi komór, liczba tych rzędów i sznurków, jaka się nam ukazuje po otworzeniu zawiązka, wskaże patrzącemu prawdziwą liczbę owoców składających zawiązek na pozór pojedynczy.


§ 490. Najczęściej cała linja łożysk towarzyszy brzegom liścia owocowego, a przeto kiedy tenże liść tak jest zagięty, że brzegi jego stykają się i zrastają z sobą, zamykając owocek lub komorę i tworząc tym sposobem kąt obrócony ku osi kwiatu, łożyska przypadną właśnie na tym kącie: dlatego też nazywamy je *kątnemi* (placenta axillis). Jeśli zawiązek jest wielo-komorowy, kąt ów przypadnie w każdej komorze na wewnątrz linii zetknięcia dwóch sąsiednich przegród (fig. 376, 379), które ze swój strony, mogą zawrócić się znowu od osi i wejść bliżej lub dalej we wnętrze komory (fig. 377).



§ 491. Wystawmy sobie teraz, że brzegi liści owocowych zagiętych, nie zachodzą aż po samą oś, a przeto tworzą wewnątrz zawiązka niezupełne tylko przegrody (fig. 378, 380), albo też że nie zaginają się wcale i są zrośnięte z sobą, nie już powierzchniami bocznymi, ale samymi tylko brzegami (fig. 381, 2), z kąd wypływać musi nieobecność przegród: sznurki

376. 377. 378. Przecięcia poprzeczne zawiązków złożonych z dwóch listeczków owocowych, których brzegi zagięte schodzą się z sobą przy osi *a* w 376; zawracają się wewnątrz komory po zetknięciu się z sobą przy osi w 377; nie dochodzą zaś do osi w 378.

łożyskowe, towarzyszące brzegom liści owocowych, zostaną tym sposobem oddalone mniej więcej od osi, i w pierwszym razie ukażą się wzdłuż przegród niezupełnych (fig. 380), w drugim na samych ścianach komory (fig. 381, 2); wtedy mówimy że łożyska są *ścienne* (pl. parietales).



W takich razach każda linja łożysk odpowiada brzegom dwóch oddzielnych owoców, w poprzedzającym zaś przypadku, odpowiadała dwóm brzegom jednego owoca. łożyska zaś kątnie muszą być naprzemianległe względem łożysk ściennych; prawda ta teoretyczna, potwierdza się postrzeżeniami. W zawiązkach o łożysku kątném (np. w wielu miodkowatych), przegrody oddalają się czasami nieco od osi kwiatu, a każdy rząd zalążków, który w zawiązkach prawidłowo wyształconych, zajmuje kąt wewnętrzny komory, i leży naprze-


379. Przecięcie poziome zawiązka jednej z ulanek (*F. coccinea*) c c c c ściana zawiązka, czyli 4 połączone z sobą listeczki owocowe, które takowy składają. — a Oś czworokątna zrośnięta z przegradami i łącząca je z sobą. — o Zalążki przytwierdzone do brzegu wewnętrznego przegród.

380. Przecięcie poziome zawiązka tysiączniku (*Erythraea centaurium*). — c Ściana zawiązka czyli listeczek owocowy. — p Brzeg jego, który tworzy łożysko i nosi zalążki o. — l Wnętrze czyli komora.

381. 1. Słupek bratku (*Viola tricolor*) przecięty pionowo dla pokazania przytwierdzenia zalążków o do ścian. Widać dwa rzędy tych zalążków, jeden z przodu drugi z boku; ostatniemu odpowiada linja zgrubiałej ściany czyli łożysko p. — c Kielich. — cl Zawiązek. — s Znamię kończące krótką szyjkę. — 2. Przecięcie poziome tegoż. — p łożysko. — o Zalążki. — s Szew.

mian względem przegrody, rozdziela się na dwa rzędy podłużne, z których każdy przyrasta do podobnego rzędu komory sąsiedniej, tworząc z nim sznurek łożyskowy na brzegu przegrody niezupełnej w tym razie. Jasną jest rzeczą, że w każdym podobnym przypadku sznurki łożyskowe powstają istotnie z dwóch części.

§ 492. Wystawmy sobie znowu, że obok łożysk kątnych jak w pierwszym przypadku, część przegród leżąca między temiż,



382.



383.

a ścianami zawiązka, rychłej przestaje się rozwijac od innych części, i niebawem rozrywa się i znika; w takim razie łożyska wraz z zalążkami, utworzą ciało nie zostające w widocznym związku ze ścianami (fig. 382, 383); komory, nie będąc podzielane przegrodami, utworzą jedno wydrążenie, w pośrodku którego wznosić się będzie łożysko *p*, pokryte zalążkami *o*; jestto łożysko środkowe (placenta centralis).

Trzy więc są główne rodzaje łożysk: kątnie, środkowe i ściennie, z których drugie różni się od pierwszego zniknięciem przegród, trzecie zaś niezupełnym ich wykształceniem.

§ 493. Ostatnie wszakże dwa rodzaje, nie zawsze powstają w sposób dotąd podany, a podług którego łożyska towarzyszyłyby zawsze dwóm brzegom liścia owocowego. W niektórych przypadkach, wprawdzie bardzo rzadkich, zdają się one odpowiadać raczej nerwowi głównemu, niż brzegom liścia; a już w roświecie (fig. 358) widzieliśmy je rozrzucone na całej powierzchni komory. Otóż więc mamy dwie odmiany łożyska ściennego, które nie dają się podciągnąć pod prawa powyższej wyrzeczone.

382. Słupek z *Cerastium hirsutum*, przecięty pionowo. — *o* Zawiązek. *p* łożyszcznia. — *g* Zalążki. — *s* Szyjki.

383. Ten sam przecięty poziomo. Oddzielone tym sposobem połówki, oddalone zostały od siebie dla pokazania wnętrza komory wraz z łożyszcznią środkową *p*, obsadzoną zewsząd zalążkami *g*.

Łatwo pojąć że i łożysko środkowe może inaczej jeszcze powstawać, jak w sposób dopiero opisany. Wystawmy sobie bowiem, że się rozwija zupełnie niezależnie od liścia owocowego, z którym je zawsze dotąd widzieliśmy złączonem; że dalej wiele takowych liści, siedzących okółkiem wokoło łożyska przedłużającego i kończącego oś kwiatu, zachyla się około niego, zrastając się brzegami z sobą i okrywa je, nie stykając się z niem jednakże. W tym razie będziemy mieli łożysko środkowe właściwsze jeszcze od powyżej opisanego, gdyż 1<sup>o</sup> jest środkowem od samego początku, tamto zaś zostało takiem, dopiero w skutek nierównego rozwinięcia się części, i idącego za tém zniknięcia przegród, których nawet czasami znajdujemy jeszcze ślady w dolnej części zawiązka (np. w wielu goździkowatych); 2<sup>o</sup> może istnieć nawet w owocu prostym, gdy tymczasem tamto, aby się mogło utworzyć, wymaga zrośnięcia się wielu owoców.

§ 494. Schleiden utrzymuje, że łożysko jest zawsze kończyną osi kwiatowej, zalążki zaś pączkami téjże przekształconemi. Podług niego oś ta różni się, podobnie jak w kwiatostanie, co do postaci i sposobu rozdzielania; raz bywa pojedynczą, drugi raz rozmaicie rozgałęzioną; liście owocowe leżące około niej, raz oddalają się i nie stykają z nią wcale (*t. środkowe*), drugi raz są z rozbiegającemi się jej odnogami (*t. ścienne*); to znowu zaginają się, obejmując część osi pojedynczej, lub jedną z jej odnóg, wraz z zalążkami na niej siedzącemi, a które wtedy zdają się wyrastać z kąta wewnętrznegο (*t. kątnę*). Teorja ta może być prawdziwa w wielu razach i tłumaczy wiele przypadków trudnych zkądinąd do objaśnienia, w sposób bardzo zadowalający. Jednakże są przypadki, w których śledząc rozwijanie się owoców i zalążków od pierwszego ich ukazania się, tak wyraźnie widzieć można że ostatnie powstają na brzegach pierwszych, iż trudno jest oprzeć się wnioskowi wypływającym z tych wprostnych postrzeżeń.

§ 495. Cóżkolwiek bądź łożysko uważane w zawiązku zupełnie wykształconym, dostarcza wybornych piętn przy oznaczaniu roślin; a jeśli jest zmiennem w niektórych rodzinach, to w większej ich liczbie ukazuje się stale jednakowem: tak np. jest kątnem w ślazowatych, ostromlęczowatych, dzwonkowatych; ściennem w sijołkowatych, makowatych, kaparowatych, porzeczkowatych, zarazowatych i t. d., i t. d.; środkowem


w goździkowatych, kurzonogowatych i t. d., i t. d. W pierwiosnkowatych, sandałowcowatych, przemięźłowatych, i t. d., i t. d., jest właściwiej jeszcze środkowóm.

§ 496. Powiedzieliśmy, że połączenie wielu owoców w jeden zawiązek, zachodzi pomiędzy owocami osadzonemi w okółki na jednéj płaszczyźnie, w skutek czego oś zawiązka i przegrody jego są równoległe. Łatwo sobie jednakże wystawić można połączenie wielu owoców osadzonych na różnych wysokościach, lecz zbliżonych do siebie; w takich razach owocki nie zrastają się już powierzchniami zewnętrznemi, lecz powierzchnia górna każdego z nich złączy się z powierzchnią dolną owocu tuż nad nim leżącego; przegrody zaś będą poziome lub ukośne. Przypadek ten nadzwyczaj rzadki zdaje się istnieć w granacie, którego zawiązek podzielony jest dość niekształtnie na wiele ponad sobą stojących warstw komór. Najczęściéj owocki ułożone na osi wydłużonej w wężownicę, zrastają się z sobą nasadami tylko, w większej zaś części swéj powierzchni, są wolne, tak, że niéma żadnéj wątpliwości, iż ich jest wiele, jak to np. widziéć można w wielu flaszowcowatych (*Anonaceae*).

§ 497. Widzieliśmy już (§ 369), że owocki mogą się zraszczać nie tylko z sobą, ale także z innymi okółkami kwiatu, zazwyczaj zaś z kielichem; tak, iż okółki pośrednie objęte są w tém zrośnięciu, a przeto wszystkie części kwiatu zlewają się u spodu w jedno ciało. Nazwiska: *kielich* lub *zawiązek przyrosty*, wyrażają zarówno tę okoliczność; dawniej wyrażano ją przez: *kielich nad-zawiązkowy* lub *zawiązek pod-kwiatowy* (*calyx superus; ovarium inferum*); gdyż w takich razach kraj kielicha (fig. 384, *l*), który stanowi część jego wolną, zdaje się wyrastać z ponad zawiązka (*o*), z którym część jego niższa czyli rurka jest zrośnięta. Tkanka zawiązka i kielicha jest wtedy jednociała, chociaż często wyraźne dosyć różnice odznaczają jedną od drugiey; w opisach liczymy je obie do zawiązka pomimo tego, że naskórek i warstwa tuż pod nim leżąca, należą rzeczywiście do kielicha. Niekiedy zrośnięcie istnieje tylko w dolnéj części kielicha i zawiązka, u góry zaś jeden od drugiego się oddziela, co wyrażamy przez *kielich*, lub zawiązek *wpół-przyrosty* (fig. 386, 387). Przeciwnie, kiedy jeden od drugiego wcale jest niezależny, zowiemy je *wolnemi*; dawniej mówiono *kielich pod-zawiązkowy*, *zawiązek*



388  
dajac  
licha  
383  
mém  
nietr  
mi w  
jeszcz  
zająk  
lu z z  
chołka  
gúzie  
kszych  
czoné  
384  
dla p  
—e P  
387  
pionó  
w jed  
z Zna  
Nasa



384. Kwiat melonu (*Cucumis melo*). — o Nabrzmiałość dolna odpowiadająca zawiązkowi zroslemu z kielichem. — l Kraj czyli część górna kielicha przewyższająca zawiązek. — p Korona.

385. Kwiat z *Fuchsia coccinea*, podzielony na dwie części cięciem poziomym poprowadzonym przez środek zawiązka o. — Część niższa dna została nietknięta, dla pokazania czterech komór wraz z zalążkami przytwierdzonymi w kątach ich wewnętrznych: fig. 380 przedstawia przecięcie to mocniej jeszcze powiększone. — Część wyższa i przecięta jest pionowo dla pokazania zalążków g ułożonych rzędami w każdej komorze; kielicha, zrosniętego u dołu z zawiązkiem, przedłużającego się nad nim w rurkę t i rozciętego u wierzchołka na wiele podziałek l; płatków p osadzonych na tej rurce w miejscu gdzie takowa się dzieli; pręcików e osadzonych podobnie naprzemian większych i mniejszych; szyjki wznoszącej się z wierzchołka zawiązka i zakończonej znamieniem jajowatym s.

386. Kwiat jednego z łomikamiemi (*Saxifraga geum*), przecięty pionowo dla pokazania zawiązka o zrosniętego aż do połowy z kielichem c. — p Płatki. — e Pręciki. — s Szyjki i znamiona.

387. Słupek innej rośliny tej samej rodziny (*Hoteia japonica*), przecięty pionowo dla pokazania wnętrza obudwu komór. — o Dwa zawiązki zrosnięte w jeden i spojone aż do połowy swęj wysokości z kielichem c. — t Szyjki. — s Znamiona — p Łożyska kątnie i wystające zewsząd okryte zalążkami. — pe Nasada płatków.

*nad-kwiatowy* (calyx inferus, ovarium superum). W ogóle stosunek kielicha do zawiązka, stanowi bardzo ważne piętno, tém bardziej że pociąga za sobą przytwierdzenie pręcików kołożawiazkowe lub nazawiazkowe; dlatego badając jakąkolwiek roślinę, potrzeba najprzód uważać na niego. Zawiązek przyrosły daje się częstokroć łatwo rozpoznać po nabrzmieniu jakie się znajduje popod działkami kielicha (fig. 384 i 385, o). Przecięcie podłużne tej nabrzmiałości przekonywa, czy w istocie mamy przed sobą ciało wydrążone jedną lub wielu komorami zamkniętymi, jak np. w kwiecie jabłoni. Przecinając podobnie kwiat róży, gdzie nabrzmiałość owa tak jest uderzającą, znajdujemy przeciwnie, wydrążenie otwarte u góry i wypełnione osobnymi owocami (fig. 369). Mówimy zatem, że w jabłoni zawiązek jest przyrosły, w róży zaś znajduje się wiele zawiązków wolnych.

§ 498. Postać zawiązka bądź wolnego, bądź zrosłego z kielichem, jest bardzo rozmaita, najczęściej jednak bywa kulista lub jajowata. Jeśli jest wiele komór, obecność ich objawia się na zewnątrz przez brózdki mniej więcej głębokie, ciągnące się od nasady zawiązka, aż do początku szyjki, wskazujące linje na których owocki są z sobą zrosnięte, a przeto naprzemianległe względem komór. Niekiedy środek powierzchni grzbietowej każdego z owoców, lub każdej z komór, nosi na sobie także bróздkę, płytszą od poprzedniej, albo też przeciwnie, krawędź wystającą. Innym razem cała powierzchnia zawiązka jest zupełnie równa i nie zapowiada podziałów wewnętrznych. Kiedy strony grzbietowe owoców bardzo kobliste, pooddzielane są bróздkami bardzo głębokimi, mówimy że zawiązek jest łatowym (*ovarium uni-bi-tri-quadrinquinq-lobum*, etc.).

Powierzchnia jego może być gładka lub w różny sposób włosami pokryta. Wyrazy, któremi oznaczamy różne stopnie i sposoby takiego pokrycia, zostały już powyżej określone (§ 205). Częstokroć widzimy że w jednej roślinie dość znaczne zachodzi podobieństwo pod względem przyrodzenia i rozkładu włosów, pomiędzy temi, które pokrywają zawiązek, a temi, które się znajdują na liściach i młodych pędach.

§ 499. Nazwisko łacińskie szyjki (*stylus*), pochodzi z greckiego *στυλος*, słup, albo sztylet, ponieważ w istocie posiada często postać, przypominającą te przedmioty; jest to zwykle

walec  
bądź,  
góry  
owoc  
dzielen  
widel  
dy za  
się ta  
Kie  
wy,  
mogą  
ści w  
zywa  
385)  
pojed  
łączą  
szyjk  
mniej  
ki są  
liczba  
wręb  
i sze  
ne w  
znaj  
4, i  
poło  
med  
Nak  
zrosł  
387,  
nych  
mult  
czyli  
98  
Kielic  
a nad  
389  
zrosł  
utwor  
się oc  
znam

walec dłuższy lub krótszy, częstokroć stopniowo zcieńczony, bądź, co najpospoliciej, od dołu ku górze, bądź przeciwnie od góry ku dołowi. Szyjka należąca do owoka prostego, bywa często niepodzielona, lecz często także dzieli się widełkowato (fig. 251, 2, s), niekiedy zaś każda odnoga widełek dzieli się także z kolei (fig. 388, s).


Kiedy zawiązek jest wielo-komorowy, szyjki odpowiadające komorom, mogą się zrastać w całej swej długości w jedną, którą w takim razie nazywamy *pojedynczą* (st. simplex; (fig. 385), równie jak szyjkę niepodzielną pojedynczego owoka. Innym razem

łączą się tylko częściowo, zwykle u dołu, a wtedy mówimy że szyjka jest wielodzielna lub wielowrębną (fig. 389), podług mniejszej lub większej wysokości, do jakiej szyjki są zrosnięte. Ilość ich oznaczamy wyrazem lub liczbą położoną przed zakończeniem *dzielny*, lub *wrębny* (dwuwrębny, trójdzielny, czterowrębny i sześciodelny, i t. d.); sąto wyrażenia używane w najdawniejszych nawet opisach, w nowszych znajdujemy okoliczność tę wyrażaną przez: 2, 3, 4, i t. d., szyjki zrosnięte do połowy, przeszło do połowy, lub blisko do połowy (*styli usque ad medium, supra medium, infra medium coaliti*).

Nakoniec chociaż owoki w całości są z sobą zrosnięte, szyjki jednak mogą być zupełnie wolne (fig. 383, 387, 388), a wtedy opisujemy 2—3—4—5 wiele szyjek wolnych, albo też zawiązek o wielu szyjkach (*ovarium 2—3 multi-stylum*). Szyjki zawiązka złożonego, czyto oddzielne, czyli też zrosnięte u spodu, mogą być pojedynczemi (fig. 383),



388.



389.

388. Kwiat żeński jednej z ostroślęczowatych (*Emblica officinalis*). — c Kielich. — p p Płatki. — t Rurka błoniasta otaczająca zawiązek. — o Zawiązek a nad nim trzy szyjki s, z których każda dwa razy widełkowato rozszczepiona.

389. Słupek jednego ze ślazów (*Malva alcea*). — o Dziewięć zawiązków zrosniętych w jeden, na którym spostrzegać się daje tyleż brzódek. — t Słup utworzony przez 9 szyjek zrosniętych z sobą aż po sam wierzchołek, gdzie się oddzielają od siebie rozbiegając się i odginając, każda z nich kończy się znamieniem.

lub podzielonemi (fig. 388). Powiedzieliśmy już że ilość ich, zapowiada zwykle od zewnątrz ilość owoczków lub komór, a przeto są naprzemianległe względem przegród.

Szyjki różnią się od siebie co do postaci, która częstokroć wcale jest odmienna od téj, jakąśmy za najpospolitszą podali: w kosaćcu przybierają pozór płatka. Różnią się one także długością i kierunkiem (który zwykle porównujemy z kierunkiem innych części kwiatu, a osobliwie pręcików), gładkością lub włosistością powierzchni. Czasami okryte są włosami wcale różnemi od tych jakie się znajdują na innych powierzchniach; nazwano takowe *czepnemi* (p. collectores), ponieważ zdają się być przeznaczonemi do zatrzymywania pyłku. W wielkiej rodzinie złożonych, włosy



390.

391.

te dość tęgie, pokrywają powierzchnię szyjki do pewnej wysokości i w większej lub mniejszej rozległości (fig. 390 *pc*); a ponieważ szyjka rozwijając się później od pręcików, wznosi się wpośród pylników, które ją bezpośrednio otaczają, włosy te przeto podnosząc się, działają na woreczki nakształt szczotek, i zabiierają tym sposobem na siebie ziarna pyłku. W stroiczkowatych (*Lobeliaceae*), nasłatkowatych (*Goodeniaceae*) siedzą one bezpośrednio pod znamieniem tworząc rodzaj okręgu lub kołnierzyka, które się zowie *zasłonką* (indusium fig. 391 *i*).

**Znamię.** § 500. Widzieliśmy że w owocku pojedynczym znamię może być bezszyjkowém, to jest siedzieć bezpośrednio na zawiązku (§ 474), albo téż siedzieć na szyjce (§ 478), bądź na bokach takowej (fig. 365) bądź nakoniec po jednej tylko stronie (fig. 364), w którym to razie może być obróconém, lub odwróconém względem kwiatu. Widzieliśmy dalej że komórki z których się składa, albo tworzą powierzchnią równą, albo téż wydłużają się w mniejsze lub większe wydatności,

390. Wierzchołek szyjki *t* jednego z gwiazdoszów (*Aster*), podzielony na dwie gałęzie kończące się stożkami pokrytymi włosami czepnemi *pc*. — Znamię *s* leży u dołu na wewnętrznej powierzchni gałęzi, w kształcie małej wstążeczki.

391. Wierzchołek szyjki z *Leschenaultia formosa*. — *t* Część szyjki. — *s* Znamię. — *i* Zasłonka.

w pro  
czas  
rozr  
piórk  
Kie  
dzieli  
z tych  
znami  
skłon  
na ł  
żony  
tylko  
Na  
dobn  
my do  
owoc  
razac

udzia  
ciałk

392  
miona  
393  
na któ  
393  
394  
395  
396  
stalon  
od sie

w proste wzdymki, lub w prawdziwe włosy. Włosy te bywają czasami skupione w rodzaj pędzelka lub kropidełka, albo też rozrzucone w ten sposób że przypominają piérze (*znamię piórkowate*), jak w wielu trawach (fig. 392, *s*).

Kiedy szyjka jest podzielona, znamię musi dzielić się także skoro ma kończyć każdą z tych odnóg; zdaje się nawet, że samo tylko znamię stanowi te odnogi. W rzeczy samej skłonne ono jest do dzielenia się widełkowato na łaty, jak to można widzieć w trawach, złożonych, gdzie znamię jest podwójne przy jednej tylko komorze.

Najczęściej jednak podziały znamienia, podobnie jak podziały szyjki zapowiadają, że mamy do czynienia ze słupkiem złożonym z wielu owocków zrosniętych tak jak ich szyjki w jedno. W takich razach może się zdarzyć że same tylko znamiona nie biorą



392.



393.

394.

395.

396.

udziału w zrosnięciu, i tworzą na końcu szyjki pojedynczej, ciało złożone z tych łat; ile jest komór w zawiązku. Tak

392. Słupek jednej z traw (*Cynodon dactylum*).— o Zawiązek. — *s* Znamiona.

393—396. Znamiona *s* różnych kwiatów, wraz z wierzchołkiem szyjki *t*, na której są oparte.

393. Znamię *s* jednego z dzwonek (*Campanula rotundifolia*).

394. Znamię *s* jednej z mącznic (*Arbutus andrachne*).

395. Znamię *s* dziwaczki (*Mirabilis jalappa*).

396. Znamię *s* jednej z surmi (*Bignonia pandorea*). Dwie jego blaszki stalone są w przyrodzie jak na fig. 1. Na figurze 2 oddalone są sztucznie od siebie.

trójłatowe lub pięciowrębne znamię dzwonek (fig. 393) odpowiada trzem lub pięciu komorom; znamię dwułatowe trędownikowatych, cierńcowatych, surmiowatych, odpowiada dwóm komorom, i t. d., i t. d. Łaty te posiadają różne postaci; zachowują swą nazwę jeśli są grube i tępe, przybierają zaś imię podziałek (z. *dwuwębne*) jak w wargowych, złożonych; fig. 295 s; *trzywębne* jak w wielosile (*Polemonium*); wielowębne i t. d.), kiedy są dłuższe i ostre, blaszeczek (z. *dwublaszeczkowe*, jak w miliślepku [*Mimulus*], w surmiach [*Bignonia lactiflora*, *pandorea*, etc.]; fig. 396) jeśli są spłaszczone w deseczkę. Innym razem znamiona zrastają się także w jedno ciało, albo zupełnie równe na swój powierzchni; albo też jak często bywa, poorane tyłu płytkami i promienisto ułożonymi brózdkami, z ilu cząstkowych znamion się składa. Zowiemy je znamieniem *głowiastém* (s. *capitatum*), kiedy jest tępe i szersze od szyjki na której siedzi; może być kulistém (np. w dziwaczku [*Mirabilis*], fig. 395, 366 s), półkulistém, jajowatém (fig. 385 s), wielościenném, maczugowatém i t. d., często jest płaskie na wierzchu (jak w kwaśnicy), albo nawet rozszerzone w krążek siedzący środkiem na wierzchu szyjki (*s. peltatum*, jak w saraceni, mącznicy [*Arbutus andrachne*], i t. d., fig. 394, s). Znamie tarczowate i bezszyjkowe



397.

maków (fig. 397, s) składa się z dwóch części: jedna utworzona przez promienie tkanki wzdymkowatej stanowi właściwą część znamienia; druga przedstawia rodzaj tarczy, której brzeg jest karbowany, a powierzchnia górna gładka, nosi owe promienie. Tarcza ta więc zdaje się być połączeniem szyjek rozplaszczonych, noszących znamiona wzdłuż całej jednej swój strony.

Znamiona kończące szyjki prawdziwie pojedyncze, to jest odpowiadające jednemu owokowi, lub jednej tylko komorze, muszą przypadać, jeśli same są również niepodzielone, naprzeciw komór z przegrodami; jeśli zaś są dwułatowe, wtedy łaty przypadną naprzeciw tychże.

397. Słupek maku (*Papaver somniferum*). o Zawiązek. — s Tarcza nosząca znamiona promieniste.

## O W O C.

§ 501. Po odbytem zapłodnieniu, narzędzia które w niem udział brały, obumierają i znikają pręcej lub później. Narzędzia te są dwojakiego rodzaju: 1<sup>o</sup> istotne: z jednej strony pylnik, z drugiej znamię i tkanka przewodcza; 2<sup>o</sup> przydatkowe: nitki które nosiły na sobie pylniki, szyjki, które nosiły znamiona, i wskrós których przechodziła tkanka przewodcza; nakoniec okrywy ochraniające cały ten przyrząd t. j. płatki, których oczywiste podobieństwo z pręcikami wykazaliśmy już nieraz, i kielich różniący się od tych ostatnich daleko bardziej, ponieważ składa się z liści daleko mniej odmienionych. Im bliższy udział biorą narzędzia w zapłodnieniu, tém krótsze jest ich trwanie; i tak znamię, tkanka przewodcza, pylniki, więdną i znikają wkrótce zaraz po zapłodnieniu; szyjki, nitki, płatki, mogą trwać nieco dłużej, zwykle jednakże obumierają rychło, opadają lub pozostają przytwierdzone jak wprzódy: sam nawet kielich, lubo nieco później, i z wyjątkiem niewielu przypadków, w których nie przestaje rościć, a niekiedy nawet i wzrastać (§ 418), zatrzymuje się w swém rozwijaniu, i obumiera, bądź to, że odpada, bądź że trzyma się w swoim miejscu, na podobieństwo liści więdnących. Nazwano *szupinkami* (induviae) szczątki te kielicha, korony, nitek, które mogą istnieć dłuższy lub krótszy czas przy owocu i które wtedy dostarczają pewnych piętn bądź ze względu samej trwałości, bądź dlatego że w nich rozpoznać jeszcze można części kwiatowe i ich stonunki, których nie mogliśmy widzieć w stanie doskonałym i wcześniejszym. Szyjka trwa także niekiedy, a to zwykle w postaci kolca umieszczonego na wierzchołku owocu, który się wtedy zowie *kończastym* (apiculatus).

§ 502. W tym razie całe życie skupia się w zalążku, do którego zapłodnienia się ściągało, tudzież w zawiązku który ochrania zalążki w niem zawarte. Odtąd oba te narzędzia nie przestają rosnać przybierając nową powierzchowność, nowe piętna, a zarazem i nowe imiona: zalążek staje się *nasieniem*, zawiązek nasieniem (*pericarpium*: od περί, około; καρπος, owoc; zatem część tworząca powłokę owocu), a ogół ich stanowi *owoc*. W ogóle ich życie i rozwijanie się są ściśle

z sobą połączone, kiedy nasiona płonieją, nasiennik nie rozwija się także, kiedy zaś nasiennik płonie, nasiona wędnieją. Można jednakże znaleźć kilka przykładów wyjątkowych, w których albo nasiona dojrzewają bez nasiennika, albo przeciwnie, płonność nasion zamiast wstrzymywać rozwijanie się nasiennika, zdaje się mu owszem sprzyjać, jak w bananach, chlebowcu, i t. d. Odmiany tych roślin, dające owoce jadalne, tak mięsiste i soczyste nie wydają nasion płodnych; a kiedy te się rozwijają, mięswo owocu traci na objętości i smaku. Coś podobnego także spostrzegamy na owocach naszych sadów; dziczki zaś posiadają zwykle nasiona daleko bardziej od nasienników wykształcone.

§ 503. Zajmijmy się wszelako przypadkiem zwyczajnym i prawidłowym, to jest w którym nasiennik i nasienie zarówno się rozwijają, i uważmy nasamprzód zmiany zachodzące w związku, potem zmiany jakim ulega zalążek i jego budowa.

Przypomnijmy najprzód budowę owoca; takowy składa się z liścia zagiętego lub skróconego na sobie samym, którego brzegi zrastają się z sobą tak, że liść posiada powierzchnią



398.

wewnętrzną odpowiadającą wydrążeniu i zewnętrzną, przyodzianą równie jak tamta właściwym naskórkem, pomiędzy zaś obiema warstwami naskórka znajduje się miękkisz przerznięty od dołu ku górze wiązkami włóknonaczynnymi. Można więc rozróżnić tu trzy pokłady: naskórek zewnętrzny (fig. 398 e) czyli *obowocnia* (epicarpium, od επι, na); miękkisz pośredni (fig. 398 n) czyli *śródownia* (mesocarpium od μεσος, środkowy); naskórek wewnętrzny (fig. 398 m) czyli *wowocnia* (endocarpium; od ενδον wewnątrz). Użyteczność tych nazwisk wywodzi się od różnego częstokroć rozwijania się rzeczonych części w owocu.

§ 504. Nasiennik wykształcając się, może zatrzymać podobieństwo z liściem jak np. w znanym owocu truszczeliny (*Colu-*

398. Niższa część owocu czyli strąka bobu (*Faba sativa*), przeciętego poprzecznie dla pokazania składu nasiennika. — e Onasiennia czyli naskórek zewnętrzny. — m Śródownia. — n Wowocnia. — sv Szew brzuszny. — g Nasienie położone na wysokości przecięcia i także poprzecznie przecięte.

*tea*) w takim razie nazywamy go liściowatym lub zielnym. Podobieństwo to zawiera jednakże mniej więcej zupełnie, gdy jeden, lub więcej z owych trzech pokładów, przybiera inną barwę lub inną zbitość. Pokład zewnętrzny (*obowocnia*), stanowiący to, co się pospolicie nazywa skórka owocu, zachowuje zwykle postać naskórka, chociaż częstokroć grubieje w skutek przybycia pewnej liczby warstw komórkowych. Śródowocnia, rozwija się zazwyczaj wcale odmiennie od miększu liścia i zmienia się w mięsivo mniej więcej soczyste, mniej więcej grube, co skłoniło Richarda do nadania pokładowi temu nazwiska: *sarcocarpium* (mięsowocnia; od *σαρξ*, *σαρξος*, mięso, miększ), nazwiska, które według swego źródłosłowu nie jest stosowne dla owoców liściowatych; dlatego też stosowniej jest albo je wcale zarzucić, albo używać tylko przy owocach mięsistych. Wowocnia powstaje niekiedy w stanie cienkiej błony, wyściełającej ściany komory; lecz kiedyindziej, komórki jej oskorupiają się istotą drzewną, a wtedy częstokroć i komórki przyległej części śródowocni ulegają podobnej zmianie, tak, że ztąd powstaje naokoło wydrążenia nasiennika okrywa, mniej więcej gruba i twarda; tęto okrywę nazywają pospolicie w wielu owocach *pestką* (*putamen*).

§ 505. Objaśnijmy opis powyższy kilku znanymi przykładami. W wiśni, moreli, brzoskwini, skórka jest obowocnią, część jadalna śródowocnią lub mięsowocnią, pestka wowocnią. Otwierając pestkę, znajdujemy w niej jądro, które jest nasieniem. Wowocu migdału znajdujemy na zewnątrz od jądra wowocnią w postaci skorupy cienkiej i kruchej, którą okrywa śródowocnia o mięsiwie korowatém, zieloném i cienkiém. W owocu orzechu jądro jest nasieniem, obleczoném wowocnią; okrywa zielonkowata i włóknista, której się pozbywamy rozłupując orzech, a która znaną jest pod imieniem łupiny, jest śródowocnią wraz z naskórkiem. Z dwóch przeto ostatnich owoców, częścią jadalną jest nasienie, nasiennik zaś zostaje odrzuconym; w pierwszych zaś jadalną jest część nasiennika, odrzucamy zaś wowocnią i nasienie. Wszystkie te owoce powstają z pojedynczego owoca. Przeciwnie gruszka, jabłko powstają z zawiązka złożonego i przyrosłego; skórka ich więc czyli obowocnia, stanowiła naskórek kielicha zrosłego z zawiązkiem; ich mięsivo jest śródowocnią, a środek zajmuje pięć małych wydrążeń, zawierających ziarnka czyli nasiona

i wysłanych warstwą łuskowatą, która jest wowocnią. Ta ostatnia rozwija się w niespliku (*Mespilus*) daleko bardziej, bo w pestkę. Dlatego znajdujemy tam pięć pestek odpowiadających tyluż komórkom. W innych owocach granice pokładów nie są tak wyraźne: w melonie np. część zewnętrzna, zielona i przykra w smaku, tudzież wewnętrzna posiadająca inną barwę i smak słodkawy, jest środowocnią, z obowocni zaś i wowocni ślady zaledwie postrzegać się dają. Skórka pomarańczy jest połączeniem jej obowocni i wowocni, cienka błona powłócząca ćwiarteczki i same ćwiarteczki, stanowią komory wypełnione tkanką dodatkową, która jest właśnie częścią jadainą, właściwy zaś nasiennik bywa odrzucony. Różne przykłady jakie przytoczymy poniżej, posłużą zaraz z dopięro co wymienionemi, do okazania jak rozmaite są części, które owocom nadają smak, własności i dla których one różne znajdują zastosowanie.

§ 506. Zrośnięcie się dwóch brzegów liścia owocowego, bywa często wskazane linią zewnętrzną lub brózdką, jeśli brzegi te zachyliłyby się nieco ku wydrążeniu komory. Brózdkę tę można widzieć w wielu owocach powstałych z owocoka pojedynczego, np. na owocu truszczeliny, na moreli, śliwce i t. d., i to nie tylko na powierzchni ich zewnętrznej, ale nawet na pestce, której cały odpowiadający brzeg jest wyżłobiony rowkiem mniej więcej głębokim. Nazwisko *szwu* (sutura) którym oznaczamy te ślady, dowodzi, że oddawna poznano prawdziwy ich początek, jakoż nazwisko to wyraża, że dwie oddzielne powierzchnie zostały połączone, jakby zszyte z sobą. Lecz liść zagięty w owoc, może oprócz tej linii odpowiadającej połączeniu jego brzegów, a przeto jak one obróconej zawsze ku osi kwiatu, posiadać inną jeszcze odpowiadającą nerwowi głównemu i odwróconą przeciwnie ku zewnątrz. Drugiej tej linii nadano to samo imię szwu, a ponieważ w owocu i nasieniu, nazywamy grzbietem lub powierzchnią grzbietową, stronę zwróconą na zewnątrz, brzuszkiem zaś lub stroną brzuszną, stronę obróconą ku wewnątrz, przeto też odróżniono szew grzbietowy od brzuszego.

§ 507. Jasną jest rzeczą, że na powierzchni owoców wielokomórkowych o łożyskach kątnych, same tylko szwy grzbietowe mogą się ukazywać, brzuszne bowiem są ukryte i zmienione w środku samego owocu. Lecz gdzie łożyska są ścienne

(§ 404)  
lone są  
przeto

§ 5  
jest z  
można  
niutką  
przez  
bądź i  
go nas  
musi b  
lub też  
pinan  
trzy-n

§ 5  
ulegają  
wiąc o  
jąją się  
części  
znać je  
wraz z  
przeds  
jest w

Z o  
pek,  
znajdu  
wości  
np. za  
po dwa  
lązki je  
cają si  
(fig. 4  
komor  
żenie,  
owocu  
o trzec  
przytw  
ślada  
Przest  
jednak

(§ 491), lub środkowe (§ 492—93), brzegi owoców oddalone są na obwód owocu wraz ze szwami brzuszniemi, które przeto dają się widzieć od zewnątrz.

§ 508. Uważając bacznie szew, spostrzeżemy iż utworzony jest z połączenia dwóch wiązek obok leżących, które łatwo można odłączyć, wkładając pomiędzy nie i przesuwając cieniutką blaszkę. W wielu owocach odłączenie to następuje samo przez się o pewnym czasie, a to bądź na szwie brzuszonym, bądź na grzbietowym, bądź na obudwu zarazem. Skutkiem tego nasiennik podzielony zostaje na wiele części, których ilość musi być w przypadkach prawidłowych, równą ilości komór, lub też podwójną względem takowej. Części te zowią się *tupinami* (valvae), a podług liczby ich owoc jest *jedno-dwutrzy-wielotupinowym* (uni-bi-tri-multivalvis, etc.).

§ 509. Widzieliśmy powyżej wiele z tych zmian, którym ulegają części zawiązka, przechodzące w nasiennik, lecz mówiąc o nich, przypuszczaliśmy, że wszystkie te części rozwijają się kształtnie, co jednak nie zawsze ma miejsce. Różne części zawiązka mogą tak się odmieniać, że trudno jest rozpoznać je w dojrzałym owocu. Komory, nasiona w nich zawarte wraz ze swemi łożyskami, przegrody oddzielające je od siebie, przedstawiają częstokroć zmiany, których poznanie nie małej jest wagi.

Z owoców bądź wolnych, bądź zrosłych, składających się z słupek, wiele częstokroć płonieje, tak, że w owocu mniej ich znajdujemy. Płonienie odbywa się czasami z wielką jednakowością i prawie zawsze zalążki płonieją przytém także; tak np. zawiązek jesionu składa się z dwóch komór zawierających po dwa zalążki o łożysku kątném; zwykle jednakże dwa zalążki jednej, i jeden z zalążków drugiej komory, nie wykształcają się wcale; jedyny, który się rozwija, odpycha przegrodę (fig. 414) i przytłacza ją do jednej ze ścian, przez co druga komora znika, tak, że w końcu znajdujemy jedno tylko wydrążenie, zamykające jedno ziarno przytwierdzone nie już do osi owocu, ale do jego boku. Kasztan dziki posiada zawiązek o trzech komorach, z których każda obejmuje dwa zalążki przytwierdzone do osi; w skutek zaś płonności owoc jego posiada na pozór jedną tylko komorę i jedno duże nasienie. Przystaniemy tu na tych dwóch przykładach, których liczbę jednakże łatwo można pomnożyć. W innych razach nie do-

strzegamy takiej jednakowości w płonieniu, a pomiędzy owocami jednej i téjże samej rośliny, nie wszystkie posiadają tę samą ilość komór i nasion podług tego jak ten lub ów załazek, został lub nie został zapłodnionym. W zawiązku to więc należy śledzić rozkładu i liczby owoców i załazków, później bowiem mogą się zmieniać w skutek nierównego lub niekształtnego rozwinięcia się i zakryć przez to prawdziwe stosunki ułożenia części kwiatowych.

§ 510. Przegrody okazują także w dojrzałych owocach zmiany, mniej więcej uderzające. Po sposobie powstawania ich spodziewać się można, iż składać się będą z dwóch blaszek przylegających do siebie, a każda z tych blaszek powinna się składać podobnie jak nasiennik z trzech pokładów takich, jakie znajdujemy na brzegach owoców wolnych. Tymczasem blaszki te w owocu wielokomorowym partę ku sobie z jednej strony w skutek samego zrastania się owoców, z drugiej przez nasioną zapewniające komory, nie mogą wolno rozwijać swoich pokładów, dlatego téż jeden lub dwa z takowych zostają w części zanurzone. Najwewnętrzniejszy z nich (wowocnia) sam się tylko najczęściej rozwija, a nawet zrasta się z odpowiadającym mu pokładem drugiej blaszki, tak, że z dwóch jedna tylko się tworzy. Niekiedy jednakże obie blaszki są wyraźne, a nawet cienka warstewka śródowni rozwija się pomiędzy niemi; obowocnia zaś znika, istniejąc tylko na wolnej grzbietowej stronie owoca i odziewając przeto zewnętrzną tylko część owocu: łatwo się o tém przekonać na owocach rączniku, ostromlęczu lub ślazu. Przegrody przywiedzione czasami do postaci cienkiej błony, mogą nawet zniszczyć zupełnie lub częściowo przed dojrzaniem owoców, widzieliśmy zaś już (§ 492), że zniszczenie to przydarzając się w zawiązkach bardzo jeszcze młodych, spowodowuje w wielu z nich ułożyszcznienie środkowe, jak np. w goździkowatych.

§ 511. W niewielkiej liczbie owoców, postrzegamy zmiany wcale przeciwne, w skutek szczególnego rozwinięcia się przegród. Zawiązek buzdyganku posiada pięć komór, a w każdej z takowych, ściana tworzy małeńkie zagięcia (fig. 399 c), które zachodzą nieco pomiędzy trzy lub cztery załazki tamże zawarte. Zagięcia te posuwają się coraz dalej z tyłu ku przodowi, w miarę dojrzewania owocu, a w końcu dosięgają przeciwnej ściany komory, i oddzielają od siebie nasiona nakształt

prze-  
ostate  
(fig. 4  
szcza  
bnych  
o nie  
ścicy  
znac  
położ  
tychz  
Rozu  
podob  
wać  
to na  
rych  
Niewł  
zuania  
ich w  
szą n  
dości.  
§ 5  
(pulp  
dula  
draż  
jest  
udać  
nawc  
widz  
mora  
do k  
ścian  
dłużo  
legaj  
się s

395  
nowo  
wnatr  
400  
pokaz  
rześl

przegród poprzecznych, każda więc komora podzielona jest ostatecznie na komory podrzędne umieszczone jedna pod drugą (fig. 400). W owocach wielu strąkowych (np. w kassji puszczalkowatej [*Cassia fistula*]), znajduje się mnóstwo podobnych podziałów; w takim razie mówimy o *niewłaściwych komorach* lub *niewłaściwych przegrodach*; łatwo je zaś poznać w tych przypadkach po poziomym położeniu przegród, i po tworzeniu się tychże w zapłodnionych już zawiązkach. Rozumię się wszelako, że przedłużenia podobne, czyli zagięcia w owocni powstawać także mogą równoległe od prawdziwych przegród, jak się to na przykład widzieć daje w tragankach (*Astragalus*), których każdy owocek podzielony jest tym sposobem na dwa. Niewłaściwe te poziome przegrody, trudniejsze są do rozpoznania, dopomagają nam jednakże do tego stosunki położenia ich względem szyjek, tudzież ta okoliczność, iż nigdy nie noszą na sobie nasion, nadewszystko zaś badanie słupek w młodości.

§ 512. Komory napełniają się niekiedy istotą miążdżową (*pulpa*), która otacza nasiona w niej pograżone (*semina nidulantia*); wydają się więc w takim razie miąższem, a wydrążenie zacięra się podobnie jak przegrody; nie łatwo więc jest przekonać się o rozkładzie części. W takim przypadku udać się znów wypada do zawiązka, a tym sposobem musimy nawet widzieć powstawanie miążdżu. Tak w obrazkowatych widzimy, że sama tkanka przewodcza tworzy takowy w komorach. W zawiązku pomarańczy zalążki przytwierdzone są do kąta wewnętrznego każdej komory; cała zaś przeciwna ściana jest pokryta małymi pęcherzykami czyli komórkami wydłużonemi, i zielonkowatemi, które pomnażając się powoli, zalegają w końcu całe wydrążenie, zmieniają barwę, napełniają się sokami przyjemnego smaku, i stanowią tkankę jadalną po-



400.

399.

399. Komora zawiązka buzdyganku (*Tribulus terrestris*) przecięta pionowo dla pokazania wydatności c ściany, które zaczynają wchodzić od zewnątrz pomiędzy zalążki o.

400. Komora dojrzałego owocu tejże rośliny, przecięta podobnie dla pokazania, że jest podzieloną przegrodami poprzecznymi c na komory podrzędne; w jednej z tych zostawiono nasiono g.

marańczy. We wszystkich owocach miążdżystych, komory wypełnione są podobnemi, soczystymi pęcherzykami, lecz te, raz należą do nasiennika, jak w przypadku poprzedzającym, drugi raz do nasion, jak w porzeczkach i granacie.

§ 513. Nakoniec i łożyska także ulegają rozmaitym zmianom przy rozwijaniu się owocu; zależy to, rozumie się, od wykształcania się naczyń i tkanki komórkowej, które stanowią układ żywiący nasion. Jedna część łożyska jest przytwierdzona do ścian komory, tworząc czasami dość znaczne wydatności; druga oddala się od tychże ścian, stanowiąc tyle przedłużeń, ile jest nasion, które do nich są poprzyczepiane. Przedłużenia te mają niekiedy postać małego sznurka, dlatego nazwano je *sznureczkami* (funiculi). Radzono także oznaczyć je imieniem *ziarnostopki* (podospermium; od πους, ποδος, noga, i σπερμα, nasienie, ziarno), które też używane jest od wielu pisarzy; ci sami mianują łożysko *ziarnożywem* (trophospermium).

§ 514. Takieto są główne zmiany zachodzące w zawiązku od chwili zapłodnienia, aż do dojrzałości owocu. Zastanowiwszy się teraz nad różnorością odmian, jakie przedstawia zawiązek w nadzwyczajnym mnóstwie roślin, i widząc, że one łączą się z daleko jeszcze liczniejszymi odmianami, jakie spowodowuje dalsze rozwijanie się zawiązka; widząc że teuzę, zachowuje raz prawie swoją objętość i utkanie, drugi raz nabyla postaci, objętości i utkania, zupełnie różnych od tych, jakie w samym początku posiadał; wspomniawszy np. że porzeczka i dynia powstają z zawiązków prawie równych i podobnych, łatwo pojmemy jak mnogie i jak wyraźne różnice przedstawiać muszą owoce pod względem postaci swęj i budowy, dlatego też rozróżniono wiele ich gatunków i wynaleziono wiele imion na oznaczenie takowych. Lecz chcąc nawet zatrzymać wszystkie te imiona, i wtedy jeszcze mnóstwo odmian nie da się podciągnąć pod nie, ani pod ich określenia; ciągle wypadnie dodawać nowe objaśnienia i omówienia, jeśli zechcemy dokładnie dać poznać owoc o którym mówimy. Ponieważ zaś w ogóle imiona, przyjęte są tylko dla zniknięcia opisów, za pomocą jednego, poprzednio dokładnie określonego wyrazu, tu zaś i tak bez przywiedzenia tychże opisów, po większej części obejść się nie można, zdaje się więc, że stosowniej byłoby nie pomnażać zbyt wiele imion, lecz ograniczyć się


na tych tylko, które oznaczają odmiany owoców najpospolitsze i najstarsze. Tak przynajmniej uczynimy w następującem rozszególnieniu.

§ 515. Wiemy już, że owoce, równie jak zawiązki, powstają z owoczków, albo niezależnych od siebie, albo też połączonych w jedno ciało. Ztądto pierwszy podział owoców, na *oddzielno-owocowe* (fructus apocarpi; od απο, co oznacza oddzielenie) i *zrosło-owocowe* (fructus syncarpi; od συν, co oznacza połączenie). Wiemy dalej, że nasiennik może zachować utkanie cienkie i liściowate, lub rozrastać się w ciało mniej więcej grube i mięsiste. W tym ostatnim przypadku okrywa ta zgrubiała, nie dzieli się w owocu dojrzałym, i tylko niszczejąc, łupiąc się niekształtnie, gnijąc lub więdnąc, uwalnia nasiona w niej zawarte. Nawet wtedy, kiedy jest liściowatą, może pozostać zamkniętą; lecz w takim razie, częścię nasiennik wypuszcza na zewnątrz nasiona otwierając się po dojrzeniu, bądź przez rozstąpienie się szwów, o czém wspomnieliśmy już powyżej (§ 508), bądź w skutek pęknięcia na innym jakim punkcie swęj powierzchni, co jednak rzadziej się daleko zdarza, i nie tak kształtnie jak w przypadku poprzedzającym. Mamy więc znów owoce, które się nie otwierają, czyli owoce *niepękające* (fr. indehiscentes), bądź mięsiste, bądź suche; tudzież otwierające się dobrowolnie po dojrzeniu, czyli *pękające* (fr. dehiscentes). Pęknięcie, jeśli zachodzi wzdłuż szwów, to albo na dwóch zarazem szwach, albo na jednym tylko, a ztąd owocek rozszczepionym zostaje na dwie, lub na jedną tylko łupinę. Nakoniec każdy owocek, albo komora, może być *jedno-ziarnowa* (loculamentum monospermum), kiedy zawiera jedno tylko nasiono; *kilko-ziarnowa* (l. oligospermum), kiedy kilka tylko takowych zawiera; *wielo-ziarnowa* (f. polyspermum), kiedy ich zawiera znaczną liczbę. Oto są różne owe piętna, których połączenia posłużyły do określenia szczególnych gromad owoców, przyjętych przez botaników. Jedni używali ich w tym, drudzy w innym porządku, tu przyjmujemy porządek, w jakim zostały wymienione.

## A. OWOCE ODDZIELNO-OWOCKOWE.

## a. Niepekające.

§ 516. Jedne z nich posiadają nasiennik mięsisty z wówocnią stwardniałą w pestkę, i są zazwyczaj jednoziarnowe, bądź że już w zawiązku jeden tylko znajdował się zalążek, bądź że jeden z dwóch zalążków spłoniał. Taki owoc nazywa się *pestkowcem* lub *pestczakiem* (drupa); wiśnia, śliwka, i t. p., przedstawiają przykłady dobrze znajome. Owoce migdału, orzechu włoskiego, są tylko małemi odmianami tego rodzaju, i stanowią przejście do owoców, których nasiennik jest daleko cieńszy i suchy, a w utkaniu wówocni i środowocni niema tak uderzającej różnicy. Komora podobnych owoców zawiera jedno tylko ziarno, które ze ścianami jej w różnych może stać stosunkach. W rzeczy samej, najczęściej styka się z niemi tylko punktem przytwierdzenia swego, a zatem sznureczkiem, i wtedy mamy *niełupkę* (achenium od  $\alpha$  privativum, i  $\chi\alpha\iota\tau\epsilon\tau\nu$ , otwierać się [fig. 401]). W innych jednakże razach nasiono rozwijając się, do tego stopnia zrasta się ze ścianami zawiązka, który je otacza, że nasiennik stanowiąc niejako część właści-




401. Jedna z niełupek stanowiących owoc jaskru (*Ranunculus muricatus*). — 1 Cały. — 2 Przecięta poprzecznie dla pokazania nasienia *g* niespojonego ze ścianami.

402. Ziarnczak żyta (*Secale cereale*). — 1 Cały. — 2 Przecięty dla pokazania nasienia spojonego ze ścianami.

wych  
czak  
tego  
że ś  
rzecz  
albo  
ko do  
w cza  
odosc  
(jak  
licie  
ściśł  
czą,  
otręb  
owoc  
żnie  
nieco  
śnięty  
żać z  
miejsz

403.  
a Częś  
dająca  
404  
odpow

wych jego okryw, znika napozór. Owoc ten, nazwany *ziarn-czakiem* (cariopsis), nosił przez długi czas imię *ziarna go-łtego*, którym oznaczono także wiele niełupek, w mniemaniu, że ściany owocu, okrywające bezpośrednio nasiona, do nich rzeczywiście należą. O prawdzie jednakże, przekonywa nas albo obecność szyjki, która z tych ścian wychodzi, a która tyl-ko do zawiązka należeć może, albo też badanie tego ostatniego w czasie, kiedy jeszcze załączki wyraźnie od ścian komory są odosobnione. Przytoczmy za przykład ziarnczaków, owoc traw (jak zboża: owies, żyto [fig. 402] kukuruza), znajomy pospo-licie pod imieniem ziarna. Nasiennik bardzo cienki zrosnięty ściśle z błoną nasienną, tworzy tu okrywę napozór pojedyn-czą, która oddzielając się i rozdzierając przy mieleniu, stanowi otręby. Owocki ogóreczniku i innych ogórecznikowatych, owocki jaskrów, róż są niełupkami, w różnych roślinach róż-nie ułożonemi. Owocki złożonych są także niełupkami, lecz nieco od poprzednich odmiennemi, gdyż nasiennik ich jest zro-snięty z kielichem, nie zaś wolny. Niektóre z nich można uwa-żać za przejście do ziarnczaka, gdyż nasiono ich zrasta się miejscami ze ścianą komory. (Niełupkę o ścianach cienkich



403.



404.


403. Owoc klonu (*Acer pseudoplatanus*) złożony z dwóch skrzydlaków.—  
a Część wyższa tworząca skrzydło grzbietowe. — b Część niższa odpowia-  
dająca komorze.

404. Skrzydlak odosobniony od owocu *Hirsi*.—s Szyjka trwała.—l Część  
odpowiadająca komorze.—aa Skrzydło brzeżne.

i jakby błoniastych, niektórzy nazywają *worcakiem* (utriculus). Przypuścimy, że nasiennik cieńsze poza komorą w błaszkę błoniastą, która jest niejako zagięciem samej tylko obovocni; w takim razie będziemy mieli *skrzydlak* (samara). Zagięcie to, raz zdaje się być przedłużeniem samego nerwu głównego liści owocowych, drugi raz przedłużeniem nerwów bocznych tychże liści, a przeto raz tworzy skrzydełko grzbietowe (fig. 403), drugi raz brzeżne (fig. 404).

b. Pękające.

§ 517. Owocek pękający według samego tylko szwu brzuszego, najlepiej usprawiedliwia postacią swoją początek jakiszy mu naznaczyli, to jest liść zgięty na sobie samym: nazwa



405. Owocek odosobniony ciemiernika smrodliwego (*Helleborus foetidus*) pęknięty. — *sd* Szew grzbietowy. — *sv* Szew brzuszny.

406. Strąk grochu zwyczajnego (*Pisum sativum*), otworzony. — *lv* Łupiny utworzone z dwóch części nasiennika, na których widać od strony zewnętrznej obovocnią *p*, od wewnątrz wocnią *p'*. — *g* Nasiona ponad sobą leżące, przytwierdzone krótkimi sznureczkami *ff* do łożyska, które w postaci nitki idzie wzdłuż brzegu wewnętrznego łupin, i odpowiada szwowi brzuszemu *sv*. — Brzeg ich zewnętrzny, któremu odpowiada szew grzbietowy *sd*.

407. Owoc przewięzisty gatunku sparcetty (*Hedysarum coronarium*). — 1 Cały; członek wyższy prawie oddzielony od innych. — 2 Dwa członki przecięte podłużnie, dla pokazania dwóch komór niewłaściwych, zawierających pojedyncze nasiona.

tęż łacińska *folliculus* (mieszek), przypomina liść, a jednak przyjęto ją daleko wprzód, zanim pomyślano o tej teorii. Liczne przykłady *mieszka* znajdujemy w owocach jaskrowatych (jak w ciemierniku [fig. 405], orliku, ostróżce, i t. p.), trojęściowatych, toinowatych (jak w barwinku), i t. d. Owocek pękający według obudwu szwów, grzbietowego i brzuszego, i rozdzielający się przeto na dwie łupiny, jest *guzikiem* (*cocccum*), jeżeli zawiera bardzo tylko małą ilość nasion (zwykle jedno lub dwa); w owocu jego jest pospolicie drzewiasta lub skorupowata (np. w dyptanie). Jeśli zaś zawiera większą ilość ziarn, przytwierdzonych wzdłuż szwu wewnętrznego, zowie się *strąkiem* (*legumen*), od którego wzięta nazwisko wielka rodzina strąkowych (przykłady: owoc fasoli, bobu, grochu [fig. 406], i t. d.), rodzina, przedstawiająca jednakże wyjątki, w których nasiennik zamiast dzielić się na dwie łupiny, pozostaje zamknięty. Niektóre także z nich, posiadają szczególniejszą budowę strąka, który zamiast otwierać się w całej swjej długości, zwęża się w pewnych odiegłościach, a w końcu dzieli się na członki, z których każdy zamyka jedno ziarno. Taki owoc, poprzedzielany przegrodami poprzecznymi, które rozdwiają się stawowaciejąc, należy do liczby tych, któreśmy nazwali owocami o niewłaściwych przegrodach (§ 511), i zowie się *przewięzistym* (*lomentaceus*, lub jako rzeczownik: *lomentum*, *przewięziak*; przykłady siekiernica [fig. 407], cieciorka, i t. d.).

§ 518. Przypomnijmy, że w owocu oddzielno-owockowym, równie jak w kwiecie, gdzie takowy był w stanie zawiązka, może się znajdować jeden tylko (jak w strąkowych, w śliwie, wiśni, i t. d.), lub więcej owoców, i że w tym ostatnim przypadku, owocki mogą być ułożone, albo w okrąg czyli okółek, na jednej płaszczyźnie (np. w dyptanie, parzydło, ciemierniku, i t. d.), albo w różnych wysokościach, na dnie to rozszerzonym, to wydrążonym (jak w róży, kielichowcu [*Calycanthus*], i t. d.), to przeciwnie, wydłużonym w oś (jak w ukwapie [*Myosurus*], jaskrze, poziomce, bobrowniku, i t. d.). W ostatnim tym przypadku, daje się dość wyraźnie dostrzedz ułożenie owoców w węzownię, przypominające ułożenie kwiatów w kłos lub kwiatogłówkę. Można przeto wspomnieć o tém w krótkości, mówiąc np. pestkowce, niełupki, guziki, lub ogólniej: owocki ułożone w kłos, główkę (*carpella capitularia*,

*spicata*). Podobne oznaczenia za pomocą niewielu wyrazów, zastosowanych do szczególnych przypadków, są lepsze od imion pojedynczych jakich radzono używać dla niektórych z tych odmian.

#### B. OWOCE ZROŚO-OWOCKOWE.

§ 519. W owocach tych, powstałych ze zrośnięcia się w jedno wielu owoców, szczególną należy dawać bacność na ułożyszcznienie, którego tu różne, przy zawiązku (§ 491) już opisane odmiany spostrzegać się dają, jakoto ułożyszcznienie kątné, środkowe, lub ściennie.

Ściany boczne komor, czyli owoców, które idąc od zewnątrz ku wewnątrz tworzą przegrody, mogą zmieniać kierunek i zaginać się w bok, lub od wewnątrz ku zewnątrz. Zład powstaje wydatność wewnątrz komory, łożysko zaś które leży na brzegach owych ścian, zowie się *wystającym* (*prominens*), a to tém bardziej, że w przypadkach tych bywa ono dość grubém i przyczepia się do ścian komory blaszką mniej więcej szeroką. Przegroda, zawracając się, musi się rozdzielić; każda z dwóch ścian owocowych, czyli blaszek, których połączenie stanowi przegrodę, zawraca się ku komorze, do której właściwie należy, tak, że tym sposobem, każde łożysko może się częstokroć wydawać podwójném, albo *dwublaszkowém* (p. *bilamellata*). Jeśli przegrody rozchodzą się tym sposobem przed dojściem do osi owocu (fig. 378), łożyska muszą być ściennemi; lecz częstokroć dochodzą one aż do osi, i ztamtąd zawracają się w przeciwną stronę, unosząc tym sposobem z sobą łożysko, które je obrzeża, na miejsce mniej więcej od osi odległe (fig. 420); lecz ponieważ tu łożysko oddala się od osi dlatego właśnie, że spojone jest zresztą nasiennika, przeto należy je zawsze uważać za kątné. Dwie ściany jednego owoca zaginając w ten sposób, muszą przybliżyć się nawzajem ku sobie, zwykle nawet stykają się i zrastają z sobą. Jeśli części zawrócone zrosną się zupełnie, łożysko będzie pojedynczém; jeśli zaś zrosną się w małej tylko rozległości, a następnie rozbiegają się znowu, łożysko będzie podwójném, lub dwublaszkowém.

§ 520. Oś jest częstokroć idealną tylko linią, na której schodzą się i stykają wewnętrzne kąty owoców; w innych

jednakże razach istnieje ona rzeczywiście, przedłużając i kończąc oś kwiatu ponad punktem przytwierdzenia owoców, i włącza się pomiędzy kąły tychże, wiążąc je pomiędzy sobą. Wtedy utworzona jest z tkanki komórkowej, przerzniętej wiązkami naczynnymi, które przechodzą tak w nasienne jak i w łóżyka. Tym sposobem oś zmniejsza się ku górze i kończy się zwykle pod osadą szyjek; jednakże, w niektórych lubo rzadkich przypadkach, przedłuża się dalej jeszcze i włącza się pomiędzy szyjki, tak, jak się włączyła pomiędzy owocki;



408.



409.



410.

widzimy to np. w bodziszkach, których owoc (fig. 410) dojrzały ukazuje pięć swych owoców wraz z szyjkami, odłączającymi się z dołu do góry wzdłuż osi ostrosłupowej, do której były przytwierdzone. Ślazowate (fig. 408), ostromłęczowate (fig. 409), i t. d., dostarczają przykładów osi znacznie rozwiniętej, lecz kończącej się popod osadą szyjek.

408. Owoce jednego ze ślazów (*Malva rotundifolia*), po zdjęciu połowy owoców, dla pokazania osi między nimi leżącej, kończącej się tam, z kądem wychodzą szyjki *s*. — *cc* Pozostałe owocki przytwierdzone do osi okółkowo. — Dwa z nich leżące na przodzie, ukazują ściany swe boczne.

409. Torebka rącznika (*Ricinus communis*) przecięta pionowo dla pokazania części *a*, przedłużonej pomiędzy owocami i kończącej się przy każdym z nich krótką nitką *f*, stanowiącą sznureczek. — *gg* Nasiona leżące w komorze odkryte w skutek przecięcia; na każdym z nich przyrostek mięsisty *c* — *pp* Nasiennik.

410. Owoce z *Geranium sanguineum*. — *c* Kielich trwałe. — *a* Oś. — *t* Szyjki, które z początku przytwierdzone były do osi, potem zaś oddzieliły się od niej, unosząc z sobą owoce *c*. — *s* Znamiona.


§ 521. Przejdźmy teraz do wyszczególnienia głównych gatunków owoców zrosło-owoczkowych, dzieląc je podobnie jak oddzielno-owoczkowe na dwa oddziały, podług tego jak albo się nie otwierają, albo się dzielą dobrowolnie w stanie dojrzałym na wiele części. Pierwsze znowu mogą być także mięsiste lub suche.

a. Niepękające.

Oznaczone bywają ogólną nazwą *jagody* (bacca): przestajemy na samym tylko tym wyrazie, kiedy nasiennik jest mięsisty; dodajemy zaś przymiotnik *suchy*, jeśli nasiennik posiada utkanie liściowate lub drzewne.

Jagoda może powstawać z zawiązka wolnego (np. w psiance [*Solanum*], lub zrosłego np. w porzeczce); może posiadać łożysko kątnie, jak w pierwszych, lub ścienne, jak w drugich, albo też środkowe jak w rodzaju *Ardisia*. Wiele odmian otrzymało osobne nazwiska. Mówiliśmy już (§ 505) o *jablczaku* (pomum), owocu jabłoni, gruszy i innych różowatych; ma on mięsivo grube, okryty jest przyrośniętym kielichem i uwieńczony zeschniętym krajem tegoż, w miejscu, które się zowie oczkiem; mówiliśmy dalej o *pomarańczaku* (hesperidium), owocu pomarańczy, cytryny i innych drzew tej samej rodziny; jest on wolny, komory jego wypełnione są pęcherzykami soczystymi, w owocnia jest błoniasta, a wszystko okrywa kora, albo raczej skóra mniej więcej gruba. *Dyniakiem* (pepo), nazywamy owoc melonu, dyni, tykwy i innych ogórkowatych. W środku grubego mięsiva dyniaka, znajduje się wydrążenie, na którego ścianach umieszczone są nasiona. *Wielopestczakiem* (nuculanum), nazywamy owoc powstały z połączenia wielu pestkowców, a przeto zawierający wewnątrz wiele *pestek* (pyrenae); może on powstawać z zawiązka wolnego, jak w ostokrzewiu, lub zrosłego jak w niespliku (fig. 411). Niektórzy nazywają ostatnią tę odmianę jablczakiem *pestkowym*, właściwy zaś jablczak *ziarnkowy*. Zamiast: *wielopestkowiec*, można poprostu powiedzieć: pestczak o wielu pestkach, i wymienić ilość tychże. Łatwo pojąć, że pestki wielopestkowca mogą się zrastać z sobą, tak, że znajdujemy jedną tylko środkową, a przeto owoc nie różni się na pozór od powyższej określonego pestczaka. Jednakże należy go starannie odróżniać, ponieważ powstaje z zawiązka złożonego, a nie z pojedynczego

owocka; wyrażamy to właśnie, opisując w takim razie pestczak o pestce złożonej (np. w dereniu, fig. 412).



### b. Pękające.


§ 522. Odróżnić należy dwa stopnie pęknięcia owoców zrosło-owoczkowych: 1<sup>o</sup> oddzielenie się od siebie owoczków; 2<sup>o</sup> rozszczepienie się każdego owoczek w szczególności.

§ 523. Piérwszy stopień, przez który owocki czas niejaki mniej więcej zupełnie z sobą połączone, po dojrzeniu oddzielają się od siebie i stają się niezależnymi jedne od drugich (*carpella a se invicem solubilia*), stanowi oczywiste przejście od owoców oddzielno-owoczkowych do zrosło-owoczkowych, tak dalece, iż częstokroć trudno jest oznaczyć, do której z tych gromad owoc rzeczywiście należy; jestto nowy dowód, że w zastosowaniu, nie należy przywiyzywać zbyt wiele wagi do wszystkich tych imion. Owocki tym sposobem oddzielone, mogą pozostać zamknięte, jakto widzimy w ślazach, nasturcyi, baldaszkowych, i t. d. W tych ostatnich (fig. 413), owocki zamiast odosobniać się zupełnie, pozostają zawieszzone na osi, która rozdziela się na tyle nitek, ile było komór; szczególny ten rozkład skłonił do nazwania podobnych owoców *wiszonkami* (cremocarpia; od κρεμαειν, wisić). We wszystkich

411. Owoc niespliku (*Mespilus germanica*), po odjęciu przecięciem poprzecznym części wyższej połowy mięsiva, dla pokazania pestek *n*, ułożonych we środku w okrąg. — *e* Obowocnia. — *s* Mięsowocnia.

412. 1. Owoc dereniu właściwego (*Cornus mas*), po odjęciu przecięciem poprzecznym połowy górnej mięsiva *s*, dla pokazania pestki środkowej *n*. — 2. Przecięcie przechodzące przez pestkę środkową *n*, dla pokazania, iż takowa zawiera dwie komory. Jedna z tych *l* jest prózna, drugą wypełnia ziarno *g*.

takowych przypadkach, jeśli komora jest jednoziarnowa, można powiedzieć że przedstawia niełupkę, równie jak przedstawiac będzie skrzydlak, jeśli się przedłuży w skrzydełko; dwie skrzydlate komory takiego owocu, oddzielają się od siebie po dojzeniu w klonie (fig. 403), w jesionie zaś (fig. 414) i wiązcie,



413.

414.

pozostają zrosnięte; wszystkie te owoce mieszano z sobą pod nazwą skrzydlaka, którą stosowniej podobno byłoby zachować dla pojedynczego, piętno rzeczono posiadającego owocka, a uważać w powyższych przypadkach owoce za złożone z wielu skrzydlaków oddzielających się, lub nieoddzielających ostatecznie od siebie.

§ 524. Właściwe pękające owoce, nazywane ogólnem imieniem *torebki* (capsula), są te, których owocki same się otwierają. Niekiedy jednakże szwy nie ustępują, a nasiennik przeżywa się na pewnym stałym miejscu, bądź u góry (np. w wyżlinie; fig. 415 *t*), bądź u podstawy lub ku środkowi

413. Owoc jednej z baldaszkowych (*Prangos uloptera*) po pęknięciu, które rozłączyło dwa owocki *ce* i rozdzieliło ós *a* na dwie niteczki, na których owocki są zawieszane. — *ss* Szyjki trwałe.

414. Owoc jednego z jesionów (*Fraxinus oxyphylla*).— 1. Cały ze skrzydłem *a*.— 2. Część niższa po przecięciu go poprzecznie, dla pokazania, iż zawiera dwie komory, z których jedna *l* spleśniała, ukazuje się jako szczuple wydrążenie; druga jest bardzo rozwinięta i wypełniona ziarnem *g*.

(w dzwonekach, fig. 416 *t*). Otwór taki mniej więcej niekształtny na obwodzie ma postać dziurki, o nasienniku mówimy w takim razie, że jest *zbiegającym* (hlans). W niektórych owocach (np. w kurzyśladzie; fig. 417, lulkę [*Hyoscy-*



415.



416.



417.

*mus*], i t. d.), nazwanych *kubczakami* (pyxidium v. capsula circumscissa) nasiennik łupie się poprzecznie na dwie połowy, z tych niższa zostaje wraz z łożyskiem przy dnie kwiatowym; wyższa zaś oddziela się na podobieństwo ruchomej nakrywki (operculum). Powstajeż ten szczególniejszy sposób pęknięcia (circumscissio) w skutek utworzenia się poprzecznego stawu podobnie jak w owocach przewięziakowych? Widać że llni, tej poprzecznej odpowiada albo większe natężenie, w tém miejscu wywarte; albo mniejszy tamże stawiony opór. Tak w rodzinie krzyżcowatych (Lecythideae), tam właśnie pęka


415. Torebka wyżlinu (*Antirrhinum majus*) po pęknięciu. — *cc* Kielich trwałe. — *p* Nasiennik przeszyty trzema dziurkami *tt*, z których dwie odpowiadają jednej komorze, a jedna drugiej ku wierzchołkowi ostro zakończonemu resztą szyjki trwałej *s*.

416. Torebka jednego z dzwonek (*Campanula persicaefolia*), otwierająca się dwiema dziurkami *tt*. — *c* Kielich trwałe zrosnięty u dołu z nasiennikiem *p*, u góry zaś podzielony na sześć paseczków, wpośród których widać koronę zwiedłłą i zmiętą, stanowiącą część szupinek *e*.

417. Kubczak kurzyślądu (*Anagallis arvensis*). — *c* Kielich trwałe. — *p* Nasiennik, który się podzielił na dwie połowy; z tych wyższa odłącza się w kształcie nakrywki *o*; na obu połowach nasiennika widać trzy linie ciągnące się od podstawy do wierzchołka, i oznaczające szwy, a tém samém prawdziwe łupiny. — *g* Nasiona skupione w kulkę około łożyska środkowego.

okolisto nasiennik, gdzie przestaje być podwojonym przez przyrośnięty kielich.

§ 525. W innych razach pęknięcie odbywa się na szwach, które jednakże niezupełnie tylko się rozstępują; w ogóle dzieje się to w górnej ich części, a tym sposobem powstaje na wierzchołku owocu otwór obrzeżony końcami łupin, tworzącemi zęby (np. w rogownicy, fig. 418, mokrzycy i innych goździkowatych).



418.


§ 526. Przychodzimy do przypadku najpospolitszego, w którym szwy rozchodzą się zupełnie, tak, że nasiennik w całej, lub prawie w całej swjej rozległości dzieli się od wierzchołka do podstawy, lub co rzadziej, od podstawy do wierzchołka, na liczne części, czyli łupiny. Może się zdarzyć, że przed rozjęciem się owoców, owocki, czyli komory, które takowe przedstawiają, odłączają się od siebie; dzieje się to przez rozdwojenie przegród wiążących je z sobą (fig. 419). Mówimy wtedy, że pęknięcie jest *przegrodowe* (deh. septicida) przegrody tworzą tu boki łupiny, która odpowiada całemu owocowi (valvae septis contrariae). Gdzieindziej przegrody opierają się odłączeniu, szew zaś grzbietowy ustępuje, przez co komora otwiera się środkiem, zostając na bokach zamkniętą (fig. 420). Jestto pęknięcie *komorowe* (deh. loculicida): nasiennik zostaje podzielony na pewną ilość łupin, z których każda składa się z dwóch połówek należących do owoców sąsiednich, zrośniętych tak, że przegrody przypadają na środku każdej z łupin (valvae septi oppositae). Niekiedy przegrody rozstępują się tylko wzdłuż wewnętrznego brzegu, i oddzielają się przeto od łupin (fig. 123): jest to pęknięcie *szwowe* (deh. septifraga).

§ 527. W tym ostatnim przypadku przegrody nie odłączają się ani od siebie, ani od osi, która mniej lub bardziej rozwinięta, pozostaje w środku owocu nosząc na sobie tyle pionowych blaszek, ile było przegród i wchodząc w kąty zajmujące odstępy pomiędzy przegrodami, wysłane łożyskami, do których przytwierdzone są nasiona. W torebkach w łożysku

418. Torebka z *Cerastium viscosum* po pęknięciu. — *p* Nasiennik podzielony u góry na dziesięć zębów będących wierzchołkami tyłuż łupin, które niżej pozostały zrośnięte. — *o* Kielich trwały.



419.




420.



421.



422.



423.

419. Torebka naparstnicy (*Digitalis purpurea*) w chwili pękania, które rozdwa ją przegrodę *d* pomiędzy komorami *cc*, odzyskującymi tym sposobem postać osobnych owoców. U góry widać wewnątrz komór i nasiona *g*.


420. Część niższa téjże odcięta poprzecznie dla pokazania składu przegrody *d*, utworzonej przez zrośnięcie się dwóch powierzchni wewnętrznych owoców *c*. — *p* Łożyszczyce wystające na wewnątrz komór. — *g* Nasiona.

421. Torebka proświnniku (*Hibiscus esculentus*) w chwili pękania. — *vvv* Łupiny. — *c* Przegroda. — *g* Nasiona.

422. Torebka z *Cedrela angustifolia*, której łupiny *vvv* oddzieliły się od przegrod *cc* od góry do dołu, tak, że oś *a* pozostała w środku, przedstawiając pięć kątów wypukłych odpowiadających przegrodom, i oddzielających od siebie tyleż kątów wklęsłych, które odpowiadają komorom i noszą nasiona *g*.

423. Torebka mahoniowcu (*Swietenia mahagoni*) otwierająca się odwrotnie jak poprzednia, to jest z dołu do góry. — Głoski mają też samo znaczenie.

środkowém, ciało obsadzone nasionami, zajmujące środek komory, utworzone jest przez oś, zupełnie podobną do dopięro opisanéj, tylko bez przegród, bądź że takowe zniknęły w skutek wczesnego rozerwania się, bądź że wcale nie istniały. Tam gdzie przegrody nie oddzielają się od łupin, to jest przy pękaniu komorowém, a szczególnie przy przegrodowém, muszą się za to oddzielać od osi, która jest dość rozwinięta, pozostaje w kształcie pionowo stojącego ostrosłupa lub stożka, graniastosłupa lub walca; z przyczyny podobieństwa do maleńkiego słupa, oznaczoną



424.

częstokroć bywa wyrazem *cohumella* (pieniek). Łożyska raz pozostają przy osi, która przeto nosi na sobie nasiona (np. w ostromłęczu i innych roślinach do tej samej należącej rodziny fig. 424 *a*); drugi raz nie odstępują wraz z nasionami brzegów owoców, oś zaś zostaje naga (np. w wielu ślazowatych).

Oczywistą jest, że oś nie może istnieć tam, gdzie łożyska są ściennie, ponieważ wtedy komórki i naczynia, z których ona powstaje, rozdzieliły się od samego spodu komory, dla utworzenia łożysk idących wzdłuż ścian téjże.

§ 528. Powiedzieliśmy (§ 508) że pęknięcie prawidłowe odbywa się zwykle na środku szwów, utworzonych z dwóch zrosniętych z sobą wiązek, które po dojrzeniu oddzielają się od siebie. Niekiedy wszelako połączenie tych wiązek z sobą, jest silniejsze niż z resztą ściany, z którą wtedy dzieje się to, co częstokroć widzimy na tkaninie odzieży, rozdzierającej się raczej wzdłuż, obok szwu, niż rozparającej w tymże. Tak i nasiennik może rozedrzeć się po obu stronach szwu odpowiadającego łożyskowi, który wtedy tworzy jakby pasek mniej więcej gruby, obsadzony nasionami: niektórzy nazywają go *oddzierką* (replum). Chociaż znajdujemy przykłady podobnego pęknięcia w torebkach o łożyskach kątnych, częstszém ono

424. Torebka rącznika (*Ricinus communis*) w chwili pęknięcia. — Trzy owocki czyli guziki *c* oddalają się od osi *a*, która je wprzódy z sobą łączyła (obacz fig. 409) i która trwa w postaci małego wzniesionego słupczka. — Guziki te zaczynają się otwierać szwem grzbietowym *sd*.

jest wszelako w torebkach posiadających łożyska ścienne. Tak, w owocach storczykowatych (fig. 425), w których nasiona ułożone są na ścianach we trzy podłużne rzędy, nasiennik po dojrzeniu dzieli się na 6 części: z tych trzy odcińki *v*, szersze i cieńsze, oddzielają się w całym swym obwodzie i odpadają jak łupiny; trzy zaś łuki *p*, naprzemianległe względem swych łupin grubsze i prostsze, pozostają połączone u góry i u dołu, tworząc tym sposobem nasiennik dziurawy. Łuki te od wewnątrz pokryte są drobnymi nasionkami, odpowiadają zaś szwom noszącym na sobie łożyska.



425.

*Łuszczyna* (siliqua) jest torebką (fig. 426) podobną do poprzedzającej, lecz zamiast trzech posiada dwie tylko linie łożyskowe; ztąd, po dojrzeniu, kiedy dwie łupiny *v* odpadną, oddzierka *r* pozostaje w postaci ramki krótszej lub dłuższej, obrzeżonej nasionami *g* na całym wewnętrznym obwodzie. Zazwyczaj cienka blaszka zapełnia przestwór ramki, stanowiąc tym sposobem przegrodę błoniastą, która dzieli wewnątrz owocu na dwie komory; jest to wyjątkiem, gdyż zwykle przegrody kończą się przy łożyskach, a przeto ułożyszcznienie ścienne pociąga za sobą pojedynczość komory. Łuszczyny bywają często-kroć wazkie i znacznie wydłużone; kiedy długość ich nie o wiele przenosi szerokość, nazywamy je zdrobniałe *łuszczynkami* (siliculae). W różnych rodzajach wielkiej rodziny krzyżowych, można znaleźć wszelkie odmiany tego owocu.



426.

§ 529. W przypadku najpospolitszym gdzie pęknięcie dzieje się rozdzieleniem przegród lub szwów, może się ono odbyć na obudwu tych miejscach; będzie więc przegrodowe i komorowe zarazem. Tak widzimy na torebkach małego gatunku

425. Torebka jednej ze storczykowatych (*Orchis maculata*) w chwili pęknięcia. — *c* Szczytka kraju kielicha wieńczące owoc. — *vv* Podziałki nasiennika oddzielające się w łupiny. — *pp* Podziałki, które pozostają i noszą nasiona.

426. Łuszczyna laku (*Cheiranthus cheiri*). — *vv* Łupiny. — *r* Oddzierka. — *g* Nasiona.

linu, rosnącego na łąkach (*Linum catharticum*), że szwy grzbietowe rozłączają się nasamprzód, a każda komora otwiera się przeto środkiem, tak, iż wtedy mamy pęknięcie komorowe. Nieco później jednakże, przegrody rozdwarzając się z kolei, spowodowują rozłączenie komór na oddzielne owocki, czyli guziki dwułupinowe, a przeto pęknięcie staje się przegrodowém.

Po rozdzieleniu się torebki, przez rozdwojenie się przegród, na wiele owocków, takowe przedstawiają mieszki, jeśli otwierają się na obudwu swych szwach zarazem, i dzielą się przeto na dwie łupiny, przedstawiają albo strąki jeśli zawierają szereg pionowy nasion, albo guziki, kiedy małą tylko takowych liczbę posiadają. Ostatnia ta nazwa używana jest zarówno dla owoców oddzielno-owocowych (§ 517) i zrosło-owocowych; mówimy że torebka jest dwu-trzy-wielo-guzikowa.

§ 530. **Owoce kwiatozrosłe.** Oprócz okrywy jaką tworzy nasiennik, owoc może posiadać inne jeszcze, przydatkowe okrywy, powstające nie z zawiązku, lecz z innej jeszcze części kwiatu (*ἀνθος*). Wprawdzie widzieliśmy już w wielu przypadkach że kielich przyłącza się do owocu, lecz on zrosnięty



427. Owoce dziwaczku (*Mirabilis jalappa*).—1. Cały.—2. Przecięty wzdłuż dla pokazania części go składających. — *oc* Część dolna i stwardniała kielicha tworząca okrywę zewnętrzną. — *f* Owoce prawdziwy okryty przez poprzednią. — Powłoki jego zrosnięte są z powłokami nasienia, które także zostało pocięte. Można go jednakże łatwo rozeznąć po reszcie szyjki *s* siedzącej na jego wierzchołku.

428. Owoce cisu (*Taxus baccata*).—*b* Przykwiatki dachówkowato ułożone przy jego nasadzie. — *ic* Okrywa mięsista zastępująca miejsce nasiennika, i dozwalająca widzieć wierzchołek nasienia nagiego *g*, który w części otacza.

był od  
części  
się ma  
od za  
szczę  
bieńst  
wnętrz  
łupkę  
428) n  
§ 53  
mienio  
tylko  
wią je  
tów.  
sea w  
zblizon  
zlewaja  
wiście  
kłosac  
stępują  
ców po  
go ow  
i wsz  
oka o  
się by  
się, z  
zrosni  
niezale  
które s  
ostatnia  
kwiatu  
ków ca  
tę u s  
pod ow  
się z n  
niekąd  
jeszcze

429,  
bą w jed

był od samego początku z zawiązkiem, i zlewał się z nim po części w jedno. W owocach zaś o których mówimy, rzecz się ma inaczej. Tu bowiem okólek pierwiastkowo niezależny od zawiązka, zwykle kielich wolny, lub pokrywa, nie niszczyjąc, lecz owszem grubiejąc, lub twardniejąc na podobieństwo nasiennika, tworzy nakoniec dla tegoż okrywę zewnętrzną. Takowa jest sucha i przedstawia prawdziwą niełupkę w dziwaczku (fig. 427), zaś w rokitniku, cisie (fig. 428) i t. d. jest mięsista.

§ 531. **Owoce skupione.** We wszystkich dotychczas wymienionych odmianach, owoce były utworem słupka jednego tylko kwiatu. Znajdują się jednakże i takie, które lubo stanowią jedno ciało, powstają jednakże z wielu oddzielnych kwiatów. Tak w różnych gatunkach wiciokrzewu, z jednego miejsca wychodzą dwa kwiaty, a zawiązki ich tym sposobem zbliżone, zrastają się, a nawet niekiedy zupełnie się w jedno zlewają, tak, że w końcu mamy jeden tylko owoc, rzeczywście z dwóch złożony. W niektórych kwiatogłówkach lub kłosach, jeśli kwiaty są bardzo zbliżone, owoce po nich następujące nie okazują żadnej powierzchownej różnicy od owoców powstających z jednego kwiatu, którego owocki siedzą na osi znacznie wzdłuż i w szérz rozwiniętej. Tak, na pierwszy rzut oka owoce morwy i jeżyny lub maliny zdają się być jednakowemi; a nawet zdawałoby się, że małeńkie soczyste owocki morwy zrosnięte nasadami w jedno ciało, są mniej niezależne od siebie, niż owocki maliny, które są od siebie odosobnione; a jednak ta ostatnia powstała ze słupka jednego tylko kwiatu, morwa zaś jest połączeniem słupków całego małego kłosa kwiatów: dlatego też u spodu maliny znajdujemy kielich, którego niema wcale pod owocem morwy, gdzie liczne kielichy, zgrubiały i zrosły się z nasadą nasiennika. Ananas (fig. 429) przedstawia poniekąd morwę na wielką stopę, a owoc chlebowcu na daleko jeszcze większą. W obudwóch słupki kwiatów ścięśnionych



429. Ananas.—*a* Oś obsadzona owocami *c* zbliżonemi i zrosniętymi z sobą w jedno ciało, uwieczniona czubem liści *f*.

ułożonych w kłosa zrastają się z sobą, a kielichy, przykwiatki, osi nawet kwiatowe, wypełnione sokami, powiększają ciało w które się zlały. Figa przedstawia coś podobnego, z tą jednak różnicą, że tu, oś rozszerzona otacza mnóstwo małych owoców i tworzy tym sposobem okrywę owocu ogólnego (§ 209 fig. 190). We wszystkich tych owocach widzimy, że nasiennik powiększa się pewnymi przydatkowymi częściami, i z tego względu należą one do owoców kwiatowozrostłych.

§ 532. Z podobnego skupienia powstaje szyszka (strobilus v. conus), owoc sosny, jodły, cedru i t. d., od którego wzięła nazwisko *szyszkowych*, rodzina drzew iglastych, obejmująca dopióroco wymienione rodzaje. Jestto prawdziwy kłosa dłuższy lub krótszy i opatrzony łuskami grubszymi lub cieńszymi, z których każda nosi na sobie dwa zalążki, a przeto



430.



431.



432.

daje się porównać do liścia owocowego niezagiętego. W szyszkach jodły łuski są wyraźnie od siebie niezależne, w innych zaś spojone są z sobą do tyła, że ogółem swoim tworzą napozór jedno ciało. Ciało to, pomimo swój nazwy (conus), nie posiada w różnych rodzinach tej rodziny kształtu stożkowego, owszem jeśli łuski jego są bardzo nieliczne, przy-

430. Szyszka sosny (*Pinus sylvestris*)

431. — cyprysu (*Cupressus sempervirens*).

432. — jednego z jałowców (*Juniperus macrocarpa*).

biera raczej postać kulistą jak w cyprysie; fig. 431); w jałowcu nawet (fig. 432), łuski ułożone kulisto, będąc mięsistymi, zrastają się z sobą i udają jagodę, której téż imię, lubo niewłaściwie, lecz pospolicie owoc ten nosi.

§ 533. **Dojrzewanie nasiennika.** — Pozostaje nam teraz zastanowić się nad zmianami jakie zachodzą w istocie stanowiącej nasiennik, od chwili w której takowy przeszedł z wiązki w owoc, aż do zupełnej jego dojrzałości. Przy tych poszukiwaniach musimy zosobna wziąć pod uwagę nasienniki, które aż do końca zachowują utkanie liściowate, i te które je tracą stając się mięsistymi.

Podobieństwo pierwszych z liśćmi, ukazuje się zarówno w ich żywieniu jak w piętnach zewnętrznych. Biorą one przy wpływie światła, z powietrza otaczającego, podobnie jak liście (§ 282, 383), lubo w mniejszej ilości kwas węglowy. Życie ich przedstawia też same pojawy, i ich tkanki, zrazu miękkie i obfitujące w soki, twardnieją stopniowo, a po jakim czasie zaczynają wysychać, tracić zieloność, i przybierać bądźto barwę zwiędłego liścia, bądź inną, podobną do tych, jaką niektóre liście przyjmują w jesieni; nasiennik zwiędły pozostaje w związku z rośliną, lub stawowacieje i opada. Rozłączenie, które się odbywa w zrośnięciach ścian owocowych tworzących przegrody, i w wiązkach stanowiących szwy, a które spowodowuje pęknięcie nasiennika, jest zjawiskiem stawowacenia. W niektórych nasiennikach grubych i niepękających, dojrzałość sprowadza zjawiska dające się raczej porównać do tych, jakie widzimy na korze; warstwy zewnętrzne odpadają rozszczepiając się niekształtnie; jestto więc rodzaj dobrowolnego obłupywania się z kory.

§ 534. W życiu nasienników mięsistych odróżniamy dwa okresy: pierwszy dopóki się zachowują jak większa część poprzedzających, są zielone, wywiązują kwasoród w dzień, a kwas węglowy w noc; drugi, kiedy przestają wywiązywać kwasoród; dzieje się to zaś w czasie dojrzałości i nieco przedtém. Owoce rośnie w skutek znacznego rozwijania się komórek; wiązki naczynne nie pomnażają się wcale, albo przynajmniej nieznacznie tylko; jeśli się zaś obficie tworzą, mięsisto włókniste nie nabędzie własności, jakich w niem szukamy. Woda przybywająca z oskolnicą stoi w tém większym stosunku do objętości owocu, im ten jest niedojrzalszym, cho-

ciaż parowanie zmniejsza się stopniowo. Przyczyną tego jest, że część owej wody ustala się, przez połączenie z innymi związkami. Jeśli pozostaje w stanie płynnym i przybywa ciągle w znacznej ilości, owoc rośnie wprawdzie daleko więcej, lecz za to daleko mniej nabywa smaku, jak się to daje widzieć podczas bardzo mokrych lat, na bardzo wilgotnej ziemi. Stosunek drzewniku do objętości owocu zmniejsza się także przy dojrzewaniu; stosunek zaś cukru powiększa się stopniowo. Oprócz wody, drzewnika i cukru, znajdujemy w mięsowie owoców gummę, kwas jabłkowy, cytrynowy, winny (ostatni zawsze, inne zaś czasami tylko połączone z istotami niestrojowymi, jako to z wapnem, a nawet i z potażem), białko roślinne, a nakoniec istotę wonną, właściwą każdemu owocowi. Takie to związki napotyamy w ogóle w owocach naszych, na których rozumić się czyniono pod tym względem poszukiwania; związki te jednakże w rozmaitych owocach rozmaicie są pomieszane, i w różnych znajdują się ilościach.

§ 535. Drzewnik, który niekiedy gromadzi się w tak znacznej ilości w komórkach woceni, ukazuje się także bardzo rozwinięty w mięsowocni pewnych nasienników, np. w gruszkach, mianowicie też w pewnych odmianach (jak Saint-Germain, berry angielskie, Cresane, i t. d.), których mięsowo zawiera mnóstwo małych gruzełków, twardych i jakby kamienistych. Są to komórki oskorupione drzewnikiem, i rozrzucone kupkami wśród innych komórek napełnionych sokami mniej więcej płynnymi. Lecz widzieliśmy że stosunek drzewniku, zwykle znajdującego się w zbytku w owocach młodych, zmniejsza się powoli; to dlatego, że istota ta przestaje się tworzyć, mięsowo zaś wzrasta ciągle; bez wątpienia nawet część jej może zmienić swe przyrodzenie. Przypomnijmy sobie że skrobia łącząc się z jednym lub z trzema atomami wody, staje się cukrem (§ 300); a łącząc się jeszcze z małą ilością węgla i wodorodu, przechodzi w drzewnik (§ 303); łatwo więc pojąć jakim sposobem ten ostatni może przejść znowu w cukier. Gummą która posiada skład skrobi, łatwiej jeszcze może uleść tej przemianie. Wnieść wypada, że w skutek podobnych zmian jednej części tych pierwiastków, owoc staje się tak obfitym w cukier, nie cała bowiem jego ilość

może przyjść z sokami, ponieważ owoc zdjęty z drzewa, a przeto nieotrzymujący już soków, dojrzewa i staje się słodkim, a nawet zyskuje większą ilość cukru przez te odosobnienia.

Chemia pokazuje że przemiany te odbywają się pod wpływem kwasów, widzieliśmy zaś iż w owocu znajduje się takowych mniej lub więcej; dalej, że czynność ta wspierana jest przez wpływ ciepła, a wiemy że ciepło przyspiesza nadzwyczajnie dojrzałość, jak tego dowodzą wszelkie sposoby ogrzania, a szczególnież zastosowanie szpalerów. Skutek ten ciepła ukazuje się nawet poza zakresem życia, ponieważ owoce w gotowaniu stają się słodkimi. Kwasy zatem zdają się mieć dwojaki wpływ na smak owocu: raz pośrednio, ponieważ sprzyjają wytwarzaniu się pierwiastków cukrowych, drugi raz bezpośrednio, mieszając się z temiż w pewnym stosunku, który wszakże stopniowo zmniejsza się przez napływ pierwiastków alkalicznych, zubożających po części kwasy w owocach dojrzałych. Jako przykład możemy przytoczyć winogrono; w miarę jak dojrzewa. kwas winny, który się w niem obficie znajdował, odbiera potaż związkom z którymi to alkali weszło w owoc, a tworzenie się winianu potażu, przypada jednocześnie ze zmniejszaniem się kwaśnego smaku, znikającego w końcu prawie zupełnie. Własności przeciwszczające niektórych owoców, przypisać należy obecności soli roślinno-kopalnych, nagromadzonych w ich tkankach.

Zmiany, które jakeśmy widzieli, zachodzą podczas dojrzewania w stosunkach owocu do atmosfery, a które zależą na stopniowem ubywaniu węgla i przybywaniu kwasorodu, tudzież ustaniu parowania wody, zebranej w nasienniku i mogącej przeto brać udział w nowych, tamże odbywających się połączeniach; zgadzają się z wymienionemi powyżej zmianami, zachodzącemi wewnątrz tkanek.

§ 536. Jest jeszcze jeden pierwiastek; o którym nie mówiliśmy dotąd, a który jednakże zdaje się mieć wielkie znaczenie w wielu czynnościach dojrzewania; jestto pierwiastek stanowiący tak zwaną galaretę roślinną albo kwas pektynowy. Frémy który się tą istotą szczególnież zajmował, robi uwagę, że w owocu jeszcze zielonym, kiedy zjawiska żywotne są w całej swój działalności, a przeto są bardzo ruchome, trudno jest oznaczyć dokładnie ślad istoty miazdżowej, która

ulega ciągłym odmianom, i nie ustala się weale. Jeśli oddzieliwszy tę istotę wystawimy ją na działanie kwasów, otrzymamy związek rozpuszczalny w wodzie (w której się wprzódy nie rozpuszczał) i złożony z 24 atomów węgla, 34 wodorodu, 22 kwasorodu i 1 wody: jestto *pektyna*, istota owa gumo-galaretowata, którą niektóre owoce, jak gruszki, jabłka, porzeczki, maliny i t. d., zawierają w wielkiej ilości. Pektyna w zetknięciu z białkiem, zmienia piętna swe, nie zmieniając składu i przechodzi w *kwas pektynowy*, nierozpuszczalny w wodzie, lecz wysysający takową i zamieniający się w galaretę. Jestto ciało izomeryczne z pektyną, od której różni się tylko pozbyciem 1 atomu wody (posiada bowiem 2 atomy zamiast 1). Rozumię się że przemiany te następują same przez się w owocu; że istota miążdzowa staje się pod wpływem kwasów także wytworzonych pektyną; zaś pektyna staje się kwasem pektynowym pod wpływem białka, które się tam również znajduje. Sposoby przyrządzenia galaret roślinnych, zgadzają się z powyższemi pojęciami.

§ 537. Obfitość skrobi w owocach, zależy prawie zawsze od znacznego rozwijania się jęj w nasionach, dlatego odłączwszy takowe od nasiennika, skrobia zniknie a przynajmniej ukaże się daleko skąpiej. Według opisów jednakoże ma się znajdować w znacznej ilości w bananie, a osobliwie w owocu chlebowcu, ale to właśnie w odmianach, których mięsivo rozwija się kosztem plonających nasion.

§ 538. W niewielu owocach, nasiennik zawiera dosyć dużo oleju. Niema potrzeby przytaczać za przykład oliwek. Olej tworzy się wewnątrz komórek, podobnie jak olejki lotne, które się daleko częściej znajdują w nasiennikach, mianowicie w nasiennikach roślin, których liście zawierają je także. Lecz w jednych jak w drugich (§ 251) olejki wydzielają i zbierają się w komórkach odrębnego kształtu, rozmaicie ułożonych, słowem w gruczołkach pęcherzykowatych. Pod tym względem nasienniki pomarańczy, cytryny, ruty, dyptanu, i t. d., dadzą się porównać z liśćmi tychże roślin. Widzimy iż w owocach wymienionych, nasiennik jest mało mięsisty, a nawet liściowaty.

§ 539. Jak oznaczyć dokładnie czas dojrzałości nasiennika? W nasiennikach liściowatych lub pękających dojrzałość odpowiada dosyć dokładnie czasowi bezpośrednio poprzedzającemu pęknięcie; lecz w nasiennikach mięsistych, oznaczenie to jest

daleko  
zmian  
dnej r  
się ni  
dem n  
na to,  
różny  
najpr  
w róż  
mu sa  
szcze  
jabłko  
jest w  
§ 5  
my wi  
że pal  
czenie  
wywie  
węgl  
sienn  
stnicz  
złożo  
woln

§ 5  
sto sp  
a któr  
podob  
wyksz  
z roślin  
w roś  
lišmy  
wiązk  
trza ze  
się spo  
przejs  
ków.

daleko mniej pewne, ponieważ każdy dzień sprowadza nowe zmiany w składzie owocu, i takowy nie przechodzi w stan żadnej równowagi, w którejby związki utoczone utrzymywały się nienaruszenie przez pewien przeciąg czasu. Pod względem użytku owoców, i co do owoców jadalnych, zgodzono się na to, aby dojrzałością nazywać chwilę, w której połączenia różnych pierwiastków, słodkich, kwaśnych i innych, dają smak najprzyjemniejszy, a po której takowy pogorsza się tylko. Lecz w różnych owocach to maximum nie odpowiada widocznie temu samemu stopniowi, ponieważ np. gruszka uleżała jest jeszcze jadalną, lubo straciła większą część swych własności, jabłko w tym stanie jest już nagnilem; niesplik zaś przeciwnie jest wtedy najzdawniejszym do jedzenia.

§ 539 *bis*. Cóżkolwiek bądź w owocach odbywa się to, cośmy widzieli w innych tkankach obumierających (§ 308), to jest że palenie się prędsze lub powolniejsze, powstające przez łączenie się kwasorodu powietrza z węglem rośliny, spowodowuje wywięzowanie się kwasu węglowego, a niekiedy innych gazów węglowych i wody, tudzież zjawiska kiśnienia lub gnicia. Nasiennik mięknie i rozpuszcza się, a nasienie, które nie uczestniczy wcale w tym rozkładzie, zyskuje na tej atmosferze złożonej z kwasu węglowego i wody, i nakoniec znajduje się wolnym, pozbawionem okrywy wiążących je w owocu.

#### ZALĄŻEK I NASIENIE.

§ 540. Zastanawiając się nad zawiązkiem, mieliśmy już często sposobność mówienia o ciałkach zawartych w jego wnętrzu a które noszą imię *zalążków* albo *jajek* (ovula), z przyczyny podobieństwa ich z jajami zwierząt, ponieważ równie jak te, wykształcają się do pewnego stopnia zostając w połączeniu z rośliną macierzystą; później oddzielają się od niej i rozwijają w roślinę podobną do tej, od której wzięły początek. Widzieliśmy iż one siedzą na pewnych miejscach ścian wnętrza zawiązkowego, czyli komory, i że na tych miejscach daje się spostrzedz szczególna odmiana tkanki ścienniej, ułatwiająca przejście żywności od nasady zawiązka, aż we wnętrze zalążków. Układ ten żywiący składa się zwykle z małej wiązki

cewek, otoczonej podłużnymi komórkami; wszystko to okrywają zwykle komórki krótsze i podobniejsze do reszty miększu ścian zawiązkowych. Ztąd powstaje wydatność mniej lub bardziej znaczna, nazwana *łożyskiem* jeśli odpowiada jednemu tylko zalążkowi, a *łożyszcznią* jeśli odpowiada ogółowi wielu zalążków. Zalążek albo wychodzi bezpośrednio z łożyska, i jest bezsznureczkowy, albo też łączy się z nią przedłużeniem, najczęściej wązkiem, które posiada też samą budowę i nazywa się *sznureczkiem*. Miejsce mniej więcej rozległe, na którym sznureczek zrosnięty jest z zalążkiem, otrzymało imię *znaczka* (hilum), a dawniej pepka. Obaczymy wkrótce, że na powierzchni zalążka znajduje się wiele innych zewnętrznych punktów, które stoją w związku z częściami wewnętrznymi, a których przeto znajomość jest ważną.

§ 541. Nasamprzód wypada oznaczyć położenie zalążków względem komory w której są zawarte. Zaczniemy od przypadku najprostszego, to jest takiego, w którym komora zawiera jeden tylko zalążek (*komora jedno-zalążkowa*); przypuśćmy zarazem, iż tenże posiada kształt swój najpospolitszy, kształt jajowaty, mniej więcej podłużny, i jest przytwierdzony na sznureczku dość krótkim, zachowującym prawie tenże sam kierunek, co i zalążek. Łożysko może przypadać na samym spodzie komory, a sznureczek wraz z zalążkiem może się wznosić w kierunku prawie pionowym (fig. 433); wtedy zalążek nazywa się *wzniesionym* (ov. erectum). Kiedy przeciwnie łożysko znajduje się u wierzchołka komory, a sznureczek i zalążek zwieszony jest w wydrążenie, wtedy ten ostatni zowie się *przewróconym* (o. inversum) [fig. 434]. Najczęściej, jakżeśmy powiedzieli, łożysko znajduje się na boku komory i odpowiada albo nerwowi grzbietowemu tójże, albo co zwykłej nerwowi brzuszemu; jeśli przypada w górze, zalążek jest *zawieszony* (o. appensum; fig. 436, pendulum); jeśli u dołu, zalążek jest *wstępujący* (ascendens, fig. 435); jeśli ku środkowi, zalążek może się zwracać końcem albo w górę albo na dół, a podług tego, dodaje mu się jeden z powyższych przymiotników. W niektórych razach bierze kierunek także poziomy, i oznaczony też bywa tym przymiotnikiem.

§ 542. Niekiedy, lubo dosyć rzadko, sznureczek bardzo długi idzie w stronę wcale przeciwną jak zalążek; podnosi się bowiem z dołu do góry, zalążek zaś przyczepiony na jego



433


433-  
rozmaite  
wek.433.  
434.

435.

436.

437-  
wną zaw-  
jących.  
437.ka wznio-  
438.ręczka z  
kończyn-  
439.

żku skra-



433—436. Owocki różnych kwiatów przecięte wzdłuż dla pokazania rozmaitych kierunków zalążka *o* w nich zawartego.—*f* Sznureczek.—*r* Szepek.—*c* Osadka.—*s* Spód szyjki.

433. Owocek storczyku o zalążku wstecznym, wzniesionym.

434. — prząstki (*Hippuris vulgaris*) o zalążku przewróconym, wstecznym.

435. — pomurniku (*Parietaria officinalis*) o zalążku wstępującym, prostym.

436. — wawrzynku wilczegolyka (*Daphne mezereum*) o zalążku zawieszonym, wstecznym.

437—438. Owocki których samotny zalążek zwraca się w stronę przeciwną zawiązka.— Głoski mają też samo znaczenie co na figurach poprzedzających.

437. Owocek z *Statice armeria* o zalążku zwieszonym z końca sznureczka wzniesionego.


438. Owocek z *Zygophyllum album* o zalążku wstępującym z końca sznureczka zwieszzonego. Znaczek przypada wraz z osadką *c*, okienko zaś *m* na końcu przyczepie przeciwniej.

439. Owocek jednego z miesięczników (*Menispermum canadense*) o zalążku skrzywionym.

końcu zawiesza się z góry na dół (np. w zawciągu; fig. 437), albo też przeciwnie, sznureczek zwiesza się w dół, załączek zaś zwraca koniec swój w górę (jak w większej liczbie gatunków parolistniku; fig. 438). Zwykle oznacza się podwójną tę okoliczność krótkim wyrażeniem, mówiąc: że załączek jest zawieszony na wzniesionym sznureczku, lub wstępujący, względem sznureczka zwieszonogo (*ovulum funiculo erecto appensum, e pendulo ascendens*).

§ 542 bis. Niejakie zakrzywienie powstać może, jeśli załączek zamiast być prostym, zakrzywia się na sobie samym. Kiedy zakrzywienie jest niewielkie, nie zwraca się nań uwagi, i oznacza się kierunek załączka, jak gdyby on był prostym. Kiedy zaś zakrzywienie jest bardzo znaczne, tak, że dwie kończyny załączka zbliżają się do siebie i zwrócone są ku jednemu punktowi komory (fig. 439), oznaczamy takowe ukształcenie, dodając przymiotnik *krzywy* (*campulitropus*; od  $\kappa\alpha\mu\pi\omega\lambda\omicron\varsigma$ , skrzywiony,  $\tau\rho\omicron\pi\omicron\varsigma$ , kształt).

§ 543. Weźmy teraz przypadek nieco bardziej złożony, kiedy w jednej komorze znajdują się dwa załączki (*komora dwuzalążkowa*). Takowe mogą albo być osadzone jeden obok drugiego i mieć jeden kierunek, a wtedy zowiemy je *obokległemi* (*ov. juxta posita*), lub *obocznemi* (*collateralia*) [fig. 440]; albo, co rzadziej, mieć kierunek przeciwny, tak, że naprzykład jeden z nich będzie zwieszonym, drugi wstępującym (jak w niektórych tawułach [*Spiraea*] w kasztanie gorzkim [fig. 441]). Mogą być także osadzone na różnych wysokościach, tak, iż jeden przypadnie ponad drugim (*ovula superposita*), a w takim razie najczęściej zachowują jednakowy kierunek.



440. Owocek jednej z różowatych (*Nuttalia cerasoides*) o dwóch załączkach bocznych zawieszonych.—Głoski mają toż samo znaczenie.

441. Komora z zawiązka jednego z kasztanowców (*Aesculus hybrida*), otworzona, dla pokazania dwóch załączków osadzonych w jednej wysokości,

sokoś  
bieraj  
trzeci  
jąym  
wie k  
kiedy  
mory.

§ 5  
w mie  
wielo  
dzone  
padku  
jać si  
tojes  
sze z  
w kie  
442).

się je  
sobie  
nabyw  
i z ja  
ścien  
podku  
sobą  
dy ni  
raja

§  
wymie  
widzi  
nia ko  
załącz  
Ty  
względ  
stręc

lecz sk  
cholek  
442.  
nych m  
443  
kach m

sokości jednakowej. W ostatnim tym przypadku zalażki przybierają rozmaity kierunek; jeden idzie w górę, drugi na dół, trzeci zachowuje położenie pośrednie, pierwszy jest występującym, drugi zwieszonym, trzeci poziomym. Zawisło to prawie koniecznie od przestrzeni zostawionej ich rozwijaniu się, kiedy łożysko znajduje się prawie w połowie wysokości komory.

§ 543 *bis*. Kierunek zalażków staje się coraz mniej stałym w miarę, im ich się więcej w jednej komorze znajduje (komora wielozalażkowa), tudzież im na mniejszej przestrzeni są osadzone; oczywiście bowiem jest rzeczą, iż równie jak w przypadku poprzedzającym, a nawet tém bardziej jeszcze, rozwijając się one muszą według przestrzeni jaka im jest zostawiona: to jest niższe z góry na dół, wyższe z dołu do góry, średnie zaś w kierunkach pośrednich (fig. 442). Częstokroć wtedy cisnąc się jedne na drugie i zawadzając sobie wzajemnie w rozwijaniu, nabywają powierzchni kątowatej i z jajowatych stają się wielościennymi. Lecz jeśli komora jest podłużna, a zalażki leżą ponad sobą (jak np. w strąkowych lub krzyżowych, fig. 443), wtedy nie zawadzają sobie wzajemnie i wszystkie zwykle przybierają jeden kierunek.

§ 544. We wszystkich tych przypadkach używamy powyżej wymienionych wyrazów na oznaczenie kierunków, które, jak widzimy zależą po większej części od kształtu komór i położenia łożysk. Podług tego jak znaczek leży u góry lub u dołu zalażka, ten ostatni będzie wstępującym lub zwieszonym.

Tym jednak sposobem poznaliśmy tylko położenie zalażka względem komory, która go zawiera, a i w tém mogą się nastąpić niejakie trudności: np. jeżeli znaczek przypada ku

lecz skierowanych w strony przeciwnie.—*m* Okienko, które wskazuje wierzchołek zalażków. Zresztą znaczenie głosek jak na figurach poprzedzających.

442. Komora zawiązka z *Peganum harmala* o wielu zalażkach osadzonych na łożysku wystającym *p*, i skierowanych w różne strony.

443. Owocek jednej ze strąkowych (*Ononis rotundifolia*) o wielu zalażkach nad sobą leżących i skrzywionych.



środkowi załączka, a nie na jednej z jego kończyn. Postępowalibyśmy z daleko większą pewnością, gdybyśmy w każdym przypadku mogli za pomocą zmian stałych, rozpoznać w załączku spód i wierzchołek, a przez oznaczenie tych dwóch punktów dojść do oznaczenia bezwzględnie jego kierunku. Postępowanie zaś może nam odkryć owe dwa punkta: poznajemy je, rozbijając głębiej budowę załączka, któryśmy dotąd w ogólności tylko brali pod uwagę, w stosunku jego do innych części, a nie pod względem części, które go same składają. Najlepszym sposobem postępowania przy tém badaniu, jest śledzić rozwijanie się załączka, od czasu w którym takowy się ukaże, aż do chwili w której dojdzie zupełnego swego wykształcenia.

§ 545. Jemiola dostarcza nam przykładu, w którym załączek przedstawia najwyższy stopień prostości. Ukazuje on się na dnie komory w postaci małej brodaweczki, złożonej z komórek jednokształtnych; następnie przedłuża się w bryłkę jajowatą, która powoli grubieje, zawsze jeszcze złożona z tkanki jednorodnej. O pewnym czasie, bryłka ta wydraża się w środku (fig. 445, c); a nakoniec po odbytem zapłodnieniu spostrzegamy u góry wydrążenia wystające nowe ciało, zawieszane na nitce, utworzonej przez połączenie się wielu komórek. Ciało to, którego zarys coraz bardziej się wykształcają jest wątkiem nowej roślinki, zarodkiem. Całość bryłki komórkowej (fig. 444, 445, s), która w podobnych przypadkach sama



444.

445.

stanowi załączek, nazwano *jądrem załączka* (nucleus); *wieszadelkiem* (suspensor) zaś niteczkę, która zarodek przytwierdza do wierzchołka załączka. Wydrążenie, jakie się utworzyło wewnątrz jądra, można nazwać *zarodkowym*.

§ 546. W innych roślinach, przed ukazaniem się zarodka wydrążenie wewnętrzne wyścieła się błoną zazwyczaj pojedynczą jakby woreczkiem, który poczynając od wierzchołka, rozciąga się powoli aż do spodu; dwoma końcami swemi zrasza

444. Załączek jemioli, cały.

445. Tenże, przecięty, dla pokazania wydrążenia zarodkowego c i całej reszty n ciała utworzonego z tkanki jednokształtnej i stanowiącego przeto jądro bez powłoczek.

się z tk  
tylko  
czek z  
chodzi  
za pom  
nych z

§ 54  
zawiaz  
ta uka  
wypol  
spód  
owa w  
ponad  
niejak  
446, 2  
okrywa  
kształt  
tego w  
samym  
odpow  
kiem  
te zmia  
skiego

§ 5  
wa, ;  
druga  
czasie  
dzące  
czas n  
często  
wyższ  
daje s  
dwa o  
trznęj  
(exost  
odpow

446.  
dro. — 1  
dra. — 2

się z tkanką otaczającą, wreszcie zaś swej powierzchni słabo tylko, lub prawie nieznacznie z nią jest spojony: jest to *woreczek zarodkowy* (sacculus embryonalis). Niekiedy nie dochodzi on do samego spodu jądra, lub rozciąga się tamże tylko za pomocą szeregu kilku przypadkowych komórek, połączonych z sobą końcami.


§ 547. Częściej daleko, jądro nie leży nagie w komorze zawiązka, lecz przyodziewa się okrywą zewnętrzną. Okrywa ta ukazuje się później od jądra w postaci małej obrączkowej wypukłości, otaczającej jego spód (fig. 446, 1, t). Wypukłość owa wydłuża się powoli w pochwę ponad którą wystaje jeszcze czas niejaki wierzchołek jądra (fig. 446, 2, t), lecz która w końcu t okrywa takowe zupełnie nakształt woreczka. Otwór górny tego woreczka zwęża się w tym samym stosunku i staje się wreszcie maleńką tylko dziurką, odpowiadającą zawsze wierzchołkowi jądra, nazwaną *okienkiem* (micropyle; od μικρος, mały, πύλη, drzwi). Wszystkie te zmiany dają się dosyć łatwo śledzić na zalążku orzecha włoskiego.



§ 548. Jednakże pospoliciiej jeszcze tworzy się druga okrywa, a wtedy, ponad pierwszą wypukłością daje się widzieć druga, która wzrasta podobnie jak pierwsza i w jednym z nią czasie, tak, iż jądro otoczone jest dwiema pochewkami, siedzącą jedna w drugiej, z których wewnętrzna przewyższa czas niejaki zewnętrzną (fig. 447, 3); ta jednakże ostatnia, częstokroć w końcu wyrównywa jęj, a nawet z kolei ją przewyższa. Jeśli obie okrywają całkowicie jądro, ponad témże daje się także widzieć okienko, utworzone w tym razie przez dwa otworki; jeden z nich, *ex*, odpowiada powłoce zewnętrznej i nazwany został przez Mirbela *otworkiem zewnętrznym* (exostoma, od έξω, zewnątrz; στόμα, usta, otwór); drugi, *ed*, odpowiada powłoce wewnętrznej i nazwany został przez tegoż

446. Zalążek orzechu (*Juglans regia*).—*t* Powłoczka pojedyncza.—*n* Jądro.—1. Okres pierwszy, w którym powłoczka okrywa sam tylko spód jądra.—2. Okres drugi, w którym jądro prawie całkowicie jest pokryte.

otworem wewnętrznym (endostoma; od ἔνδον, wewnątrz).  
Dwa te otwory mogą sobie dokładnie odpowiadać i tworzyć



447.

przeto mały przewód, lub też nie odpowiadać sobie, jeśli jedna z dwóch powłoczek przechodzi mniej więcej drugą.

§ 549. Załazek zatem zupełny, składa się z jądra komórkowego, posiadającego wewnątrz wydrążenie, wysłane woreczkiem zarodkowym, okrytego od zewnątrz dwoma innymi woreczkami czyli powłoczkami, wewnętrzną i zewnętrzną, które zróżnione są z nim u spodu tylko, na przeciwniej zaś kończyźnie są w pół-otwarte. Utkanie ich jest komórkowe; postrzeżono, że ich komórki ułożone są na grubość we dwa rzędy, tudzież że komórki powłoki wewnętrznej posiadają zazwyczaj też samą postać co komórki tworzące nakształt naskórka zewnętrzną warstwę jądra: ztąd niektórzy wniesli, że powłoczka ta powstaje z zagięcia jądra.

§ 550. Różne te części otrzymały różne nazwiska. R. Brown, który pierwszy z pisarzy nowoczesnych dokładnie wyjaśnił całą tę budowę, nazywa powłoki: *testa* (skórka), *membrana interna* (błona wewnętrzna); jądro, *nucleus* woreczek zarodkowy: *ammios* (wodobłonka). U Ad. Brogniarta, jądro (*amygdala*) otoczone jest *skórką* (*testa*); *obłóczką* (*tegmen*). Niektórzy z pomiędzy dawniejszych botaników badali należycie załazek, ponieważ już w dawnych pismach Malpighiego i Grewa, znajdujemy wcale rzetelne wiadomości dotyczące się jego


447. Załazek z *Polygonum cymosum* w różnych okresach. — *n* Jądro. — *te* Powłoczka zewnętrzna. — *ti* Powłoczka wewnętrzna. — *ed* Otworek wewnętrzny. — 1. Pierwszy okres, jądro jeszcze nagie. — 2. Drugi okres, jądro okryte u spodu obłóczką wewnętrzną jeszcze samotną. — 3. Trzeci okres, obiedwie powłoczki tworzą podwójną pochwę, ponad wierzchołkiem której wystaje jeszcze.

bdowy; lecz pisarze ci brali zawsze za jedno obiedwie okrywy zewnętrzne. Mirbel, któremu winniśmy najdokładniejsze prace, w nietkniętej przed nim historii rozwijania się, radzi nazywać wszystkie te woreczki, tkwiące jedne w drugich, podług porządku w jakim leżą idąc od zewnątrz ku wewnątrz *powłóczką pierwszą, drugą, trzecią* czyli jądrem, *czwartą, piątą*. Ostatnia jest woreczkiem zarodkowym. Powłóczka czwarta jest warstwą tworzącą się niekiedy około woreczka zarodkowego, później od niego; istnienie jej zdaje się być rzadkiem i czasowem tylko, tak iż większa część pisarzy nie wspomina wcale o niej. Jeszcze inne nazwiska były podawane na oznaczenie wymienionych powłok. Tu używać będziemy imion które nam służyły w powyższem wyszczególnieniu, to jest powłóczki pojedynczej lub podwójnej, z których jedna zewnętrzna, druga wewnętrzna; jądra i woreczka zarodkowego.

§ 551. W zalażku opisanym przez nas, miejsce, na którym jądro łączy się ku środkowi z łożyskiem, ku zewnątrz zaś z własnemi powłóczkami, zajęte jest przez tkankę odrębną, zbitszą i zazwyczaj ciemniejszej barwy od reszty; utworzoną częstokroć z komórek wydłużonych, przyciśniętych równolegle jedne do drugich; tu to kończy się rozpościerając się wiązka włókno-naczynna idąca od łożyska i przeznaczona do żywienia zalażka. Tkanka ta tworzy krążek dość wyraźnie odgraniczony, któremu nadano nazwisko *osadki* (chalaza). Jasną jest rzeczą, że osadka odpowiada tu dokładnie znaczkowi, to jest miejscu, w którym wiązka idąca od ścian zawiązka, przyłącza się do ścian zalażka. Jeśli ten ostatni rozwija się jednostajnie w całym swym obwodzie, wymienione tu punkta: znaczek wraz z osadką i okienko leżąc na przeciwnych kończynach zalażka, zachowują swoje pierwotne stosunki; zalażek taki jest *prosty*, czyli według wyrazownictwa Mirbela *bezwrotny* (ov. orthotropum; od ὀρθος, prosty).

Lecz bardzo często się zdarza, że rozwijanie się nie jest ze wszystkich stron równe; że na jednej z nich jest bardzo wydatnem, na przeciwniej zaś prawie wcale nie postępuje. Dlatego wierzchołek zalażka obrócony wraz z okienkiem swém w górę, kieruje się na bok (fig. 448, 3 n), następnie nieco później ku zewnątrz, a na koniec całkiem na dół (4 n), zrobiwszy tym sposobem pół obrotu. Osadka téż idąc zawraz z powłóczkami

które się rozciągają i zachowując stosunek swój względem okienka, odbywa podobny obrót, lecz w kierunku przeciwnym, idzie bowiem z dołu do góry; tak, że coraz więcej oddala się od znaczką, do którego przeciwnie okienko zbliża się coraz



448.

449.

bardziej. Można rzec wtedy iż załazek jest *wsteczny*, czyli podług Mirbela, *wsteczno-zwrotny* (o. anatropum od ἀνατροπή, przewrócenie). Wiązka naczynna kończąca się przy osadce, towarzyszy téjże w obrocie przedłużając się, a przedłużenie takowe, tworzy wewnątrz powłoczek (w powłoczce zewnętrznej jeśli ich jest dwie) mały sznurek albo wstążeczkę, która idąc od znaczką, kończy się przy osadce i nazwaną została *szewkiem* (raphe; ράφή, linia podobna do szwu).

§ 552. Innemi razy załazek rozwijając się zakrzywia, lub zagina się na sobie samym, tak, że połowa jego wyższa zwraca się w stronę prawie przeciwną względem połowy niższej, a wierzchołek jego ustrojowy, czyli okienko, zbliża się jak w poprzedzającym razie do znaczką. W takim *skrzywionym* załazku, albo obadwa boki rozwijają się prawie jednakowo (załazek *zgięty*; v. camptotropum, Schleidena: od κάμπτω,

448. Różne okresy rozwinięcia załazka jaskółczego ziela (*Chelidonium majus*).—*h* Znaczek.—*ch* Osadka.—*f* Sznureczek.—*r* Szewek.—*n* Jądro.—*te* Powłoczka zewnętrzna.—*ti* Powłoczka wewnętrzna.—*ex* Otworek zewnętrzny.—*ed* Otworek wewnętrzny.—1. Pierwszy okres; jądro jeszcze nagie.—2. Drugi okres; jądro pokryte u spodu powłoczką wewnętrzną.—3. Trzeci okres; powłoczka zewnętrzna rozwinęła się już i pokryła spód wewnętrzną. Załazek w skutek silniejszego rozwinięcia się jednego boku, zaczyna zwracać się, a wierzchołek jego skierowany jest na bok.—4. Czwarty okres; załazek zawrócił się zupełnie, wierzchołek jego skierowany jest ku dołowi.

449. Ten sam załazek przecięty wzdłuż, dla pokazania stosunku różnych jego części.

zakrzyw  
téz bok  
się dal  
wnętrz  
zwrotn  
pum;  
osadka  
dalona  
czku,  
między  
dzo zb  
się zd  
skrzyw

§ 5.  
skrzyw  
niec ja  
rozwi  
Lecz ja  
nierów  
się téz  
zapłod

§ 5.  
potrze  
uważa  
uważa  
czaj te  
przeci  
trzebne  
baczym  
giczne  
otwór  
aż do  
i wejś  
§ 5.  
łażkien  
wieńcz

450.  
czenie g

zakrzywiający się); albo też bok zewnętrzny rozwija się daleko bardziej niż wewnętrzny (zal. *krzywoszrotny*; ov. *campulitropum*; fig. 450), a wtedy osadka *c* zostaje nieco oddaloną na zewnątrz od znaczkę, który się znajduje



450.

między nią a okienkiem; wszystkie te trzy punkta są tu bardzo zbliżone do siebie i zwrócone w jedną stronę. Często zdarza się, iż dwie powierzchnie odpowiadające wklęsłości skrzywienia, stykają a nawet zrastają się z sobą.

§ 553. Wydrążenie załązka jest krzywe, skoro tenże jest skrzywiony, proste zaś jeśli on jest prosty lub wsteczny. Koniec jądra odpowiada zazwyczaj ciągle okienku, ponieważ rozwijanie się jego postępuje zarówno z rozwijaniem się okryw. Lecz jasną jest rzeczą, że jeśli dwa te rozwijania się były nierówne, i odpowiedniość owa przestałaby być dokładną, co się też zdarza niekiedy, lubo rzadko, i to dopiero po odbytym zapłodnieniu.


§ 554. Widzimy, iż dla bezwzględnego kierunku załązka, potrzebujemy rozemnić trzy punkta: znaczek, osadkę, którą uważać można za podstawę ustrojową załązka, i okienko, które uważać można za jego koniec. Dwa pierwsze dają się zazwyczaj tym wyraźniej postrzedz, im starszym jest załązek; trzeci przeciwnie zacięra się coraz bardziej. Dlatego też bardzo potrzebnym jest wysledzenie jego położenia, od którego, jak zobaczymy, zależy położenie zarodka; a jego znaczenie fizjologiczne jest niezmiernie ważnym, ponieważ przez ten właśnie otwór łągiwka przybywszy wskroś tkanki przewodzącej szyjki, aż do wnętrza zawiązka, może się wcisnąć aż w sam załązek, i wejść w bezpośredni związek z jądrem.

§ 555. Niekiedy ukazuje się na ścianach komory, ponad załążkiem, mała, mięsista nabrzmiałość, która o pewnym czasie wieńczy niejako jego wierzchołek, a nawet wciska się małym

450. Załązek skrzywiony laku.—1. Cały.—2. Przecięty w podłuż.—Znaczenie głosek jak na figurach poprzedzających.

kończykiem w okienko i stoi bez wątplenia w związku z zapłodnieniem. Taki jest początek niektórych *przyrostków* (*carunculæ*), jakie się później na pewnych nasionach spozstrzegają dają.

§ 556. Innym razem początek ich jest wcale odmienny, sam bowiem sznureczek nabrzmiwa bezpośrednio przy nasieniu, tworząc tym sposobem małą wydatność na jego powierzchni. Rozszerzenie takowe, może się wcale inaczej rozwinąć, i rozciągając się na powierzchni załączka, okryć go mniej więcej zupełnie, stanowiąc tym sposobem *osnówkę* (*arillus*). Osnówka



451.

zaczęła się, jak w przypadkach poprzedzających, nabrzmiłością sznureczka, która się powoli rozpościęra w rodzaj czapeczki (fig. 451, 1, *a*), a następnie w woreczek okrywający część lub całość załączka (2, 3, 4, *a*), i mniej więcej lekko z nim spojony, szerzej lub wężiej na drugiej swój kończynie otwarty, czasami zaś całkowicie nawet zamknięty (jak w grzybieniu). Rozwijanie się zatem osnówki, które łatwo śledzić można na trzmielinie (fig. 451), odbywa się w podobny sposób, jak w innych powłoczkach, jednakże okrywa ta łatwo się daje odróżnić, ponieważ nie tylko, że się tworzy później od innych, nie tylko, że poczyna się zawsze od znaczku, a przeto częstokroć zwraca się w stronę przeciwną od tamtych, jako wychodzących

451. Rozwijanie się osnówki *a* około załączka *o* trzmieliny (*Evonymus europæus*), w czterech kolejnych okresach 1, 2, 3, 4. W 4ym osnówka posuniętą została wpodłuż dla pokazania stosunku jęj do załączka, który całkowicie odzięwa.

od osadki, ale nadto odznacza się swém utkaniem i całą postacią. Często jest mięsistą, posiada mniej więcej świetną barwę, brzegi jej bywają kształtnie wystrzępione (jak w rodzaju *Urania*, w niektórych gatunkach *Hedychium*); w muszkatowcu jest poprzedziurawiana i stanowi tak nazwany kwiat muszkatołowy.

§ 556 *bis*. Widzieliśmy, że łagiewki wypuszczone przez zatrzymane na znamieniu ziarna pyłku, przedłużają się wskroś przestworów tkanki przewodczej, która wyścieła kanał szyjki, i wchodzą tym sposobem aż wewnątrz komory tuż przy łożyskach; że tam napotykają zalążki, które im przedstawiają otwarki swych okienek, że łagiewki wciskają się w takowe, i że po otworzeniu się tym sposobem związku pomiędzy kończyną łagiewki z jednéj, a kończyną jądra z drugiejsz strony, ukazuje się wkrótce w wierzchu wydrążenia tegoż jądra, nowe ciało, — zarodek. Jednakże zdarzyć się może dość często, że związek ten nie przychodzi do skutku, że zalążki nie otrzymują łagiewek, a wtedy zatrzymują się w dalszém rozwijaniu, płoniją; i dlatego częstość pomiędzy zalążków jednéj komory niektóre tylko dojrzewają. Kiedy zalążki są liczne, płonność pewnej ich części jest rzeczą dosyć zwyczajną. Nierzadko nawet zdarza się, że wszystkie zalążki komory nie będą upłodnione, a w takim razie takowa zamorzoną zostaje stopniowo i znika mniej więcej zupełnie. Inne przeciwnie komory i zalążki upłodnione rosną, i to tém silniejsze, ponieważ użytkują z soków, któreby zostały zużyte przez ową komorę i płonne zalążki.

§ 557. **Nasienie.** — Obaczymy teraz kolejne zmiany, jakie się spostrzedz dają w zalążkach zapłodnionych przybierających nazwę nasion (*semina*). Przypuszczamy tu zalążek jak można najzupełniejszy, to jest jądro podwojone wewnątrz przez woreczek zarodkowy i odziane zewnątrz podwójną powłóczką. Niekiedy wszystkie te jedne w drugich leżące woreczki trwają i rosną razem, jedne mniej, drugie bardziej, tak, iż je znajdujemy w nasieniu dojrzałym (fig. 452). Częściej jednakże jedne zacierają się powoli i nikną w końcu, inne zaś przeciwuie, rozwijają się znacznie w swych wymiarach. Tak, najpospolić obię powłóczki zlewają się w jednę, bądź, że ściśle zra- stają się z sobą, bądź, że jedna z nich, najczęściej wewnętrzną, cieńszeje i zostaje zamorzoną. Dość także częstym przypad-

kiem jest zniknięcie jądra, partego na zewnątrz przez woreczek zarodkowy i przez nowe ciało, które takowy wypełnia, powiększając się ciągle. Odpychane tym sposobem jądro, może cieńszając rozciągnąć się w postaci błony; może także, czyli to, że się spoi i zrośnie z powłóczkami, czyli téż, że zostaje zupełnie wessaném, pozostawić o pewnym czasie, słabe tylko ślady swój poprzedniej bytności, lub nawet nie pozostawić wcale takowych. Co się tyczy woreczka zarodkowego, ten najczęściej utrzymuje się, lecz zmienia swoje przyrodzenie; siateczka bowiem komórkowa ustraja się na powierzchni jego wewnętrznej, jakby na wzorze, a wtedy mamy woreczek utworzony, nie już z jednej komórki, lecz z warstwy komórek połączonych z sobą. Dlatego to znajdujemy w dojrzalém nasieniu powłóczki zarodka zmniejszone najczęściej do dwóch, zamiast pierwiastkowych czterech: jedna, zewnętrzna, obejmuje dwie powłóczki załączka złane w jedno; druga wewnętrzna, której pochodzenie jest różne, ponieważ może powstawać albo ze zcieńczonego jądra, albo z woreczka zarodkowego, albo téż z obwodu złanych w jedno, albo nakoniec, w niektórych razach, także z powłóczki wewnętrznej, która się nie zrosła z zewnętrzną. W nasionach, których całe to rozwijanie się nie było najściślej śledzone, niepodobna prawie powiedzieć, której części załączka odpowiadają okrywy, jakie mamy przed oczyma, które z tamtych zostały wessane lub zamorzone, które z nich zrosły i zlały się w jedno. Wtedy więc musimy przestać na opisanu istotnego stanu rzeczy, to jest, jakieśmy to właśnie powiedzieli, obecności dwóch najpospolićj okryw; zewnętrznej z nich dajemy zwykle imię *skórki* (*testa*); wewnętrznej zaś imię błony wewnętrznej (*membr. interna*).

§ 558. Lecz inne jeszcze zmiany zachodzą w tym samym czasie wewnątrz wzrastającego załączka. Po okazaniu się zarodka, woreczek zarodkowy, napełnia się płynem śluzowatym, który zazwyczaj wkrótce ustraja się w tkankę komórkową, zrazu miękką i wietką. Ustrajanie się to postępuje od zewnątrz ku wewnątrz; komórki z początku miękkie i pływające, osiadają wkrótce na ścianach woreczka, potem inne osadzają się na tej warstwie, która tym sposobem coraz bardziej grubieje. Podobne wytwarzanie się może mieć miejsce zewnątrz woreczka zarodkowego, a przeto w woreczku który stanowi jądro, i który grubieje w skutek niściania się komórek. Przypadek ten jest


wprost przeciwny owemu, w którym jądro zniknęło odpychane, i stopniowo wysysane.

§ 559. Soki rzeczzone, zrazu wółpłynne, następnie ustrojone w tkankę jednociągłą, przeznaczone są do żywienia młodego zarodka, który też powiększać się nie przestaje (fig. 474); nieraz wsysa on je zanim tkanka stwardnieje, a wzrastając ciągle, zajmuje prawie całe wnętrze nasienia i wypełnia takowe, pokrytym będąc bezpośrednio przez powyżej opisane powłoki.

§ 560. Innym razem zajmuje daleko mniej miejsca, resztę zaś wypełnia owa tkanka, utworzona na ostatku, bądź to w jądrze, bądź, co częściej, w woreczku zarodkowym, bądź nakoniec w obudwu zarazem (fig. 452). Tkanka ta, składa wtedy bryłkę zbitą, której nadano imię *bielma* (perispermum). Richard nazywał ją *endospermum*, a przed nim Gärtner białkiem (*albumen*). Ostatnia ta nazwa zasadała się na porównaniu załązka z jajem ptaków; porównanie które lubo w niektórych punktach niewłaściwe, jest jednakże dość dogodne dla pojęcia tej budowy. Wiemy w istocie, że w jajku, młode zwierzątko, rozwijające się na jednym z punktów powierzchni żółtka, wsysa takowe jako pożywienie, następnie wsysa i białko, które tamto otacza, a zamknięte jest skorupką, którą podwaja błona. Łatwo było porównać ze zwierzątkiem tém zarodek, czyli młodą roślinkę, położoną podobnie wewnątrz dwóch spółrodkowych składów rozmaitych nagromadzonych istot, z których zewnętrzny znajduje się w jądrze, wewnętrzny w woreczku zarodkowym, i które przeto dają się co do stosunków swych porównać z białkiem i żółtkiem; Gärtner też posunął porównanie ile można najdalej, dając ostatnie to nazwisko bielmu wewnętrznemu, w przypadkach, bardzo zresztą rzadkich, kiedy w dojrzałym nasieniu dwa się ich znajduje.

Taki przypadek widzimy np. w nasionach grzybieniu (fig. 452), gdzie rozwinięcie wszystkich w załązku istniejących części, odbywa się bardzo wyraźnie. Pod cienką osnowką *a*, pokrywającą nasienie, pod skórką *t* dość grubą i pod cienką błonką *mi*, przedstawiającemi obie obłoczki załązka, znajdujemy duże ciało mączyste *n*, które wypełnia prawie całe ziarno, lecz którego oś zajmuje długa rurka przyczepiona u dołu do plamki, u góry zaś rozszerzona w mały woreczek *se* o ścianach grubych, wewnątrz którego znajduje się zarodek *e*.

Trudno nie poznać w rurce owęj woreczka zarodkowego, zgrubiałego w skutek uistoczenia się komórek u wierzchołka jego, tam, gdzie się właśnie kończy zarodek; trudno nie poznać w ciałku mączystym jądra, daleko jeszcze bardziej rozwiniętego.



452.

tych, które pod okiem naszym rosną, badania podobne wymagające wielkiej wyprawy i długich drobiazgowych postrzeżeń, czynione były na małej tylko liczbie. W stanie więc istotnym nauki, musimy jak to dotychczas czyniono, poprzestać na jednej nazwie *bielma*, której samęj przez się używać można w większej części przypadków wątpliwych, a którą, w razach, gdzie początek bielma dostatecznie został zbadany, udokładnić można dodaniem przymiotnika: *wewnętrzne* i *zewewnętrzne*.

§ 562. Podług Schleiden'a niektóre z bielm, biorą inny od wszystkich wymienionych początek. Tak w kwiatotrzcinie (*Canna*), ciało jajowate załączka okazuje tylko w wyższej swęj połowie wyraźne jądro okryte swą powłóczką. Cała zaś niższa połowa utworzona jest przez bryłkę jednostajną, która zdaje się w całości należeć do osadki. Woreczek zarodkowy ciągnie się powoli od wierzchołka jądra z dołu do góry i zagłębia się w ową bryłkę, która nie przestaje rosnąć i otacza

452. Młode nasiono z *Nymphaea alba* przecięte pionowo. — *f* Sznurczek. — *a* Osnówka. — *r* Szewek. — *c* Osadka. — *h* Znaczek. — *m* Okienko. — *t* Skórka. — *mi* Błona wewnętrzna. — *n* Bielmo mączyste powstałe z woreczka zarodkowego. — *e* Zarodek.

nakon  
rodka  
bielm  
da się  
walcz  
rodka  
§ 5  
dzenia  
do oz  
napel  
mącz  
nasio  
no, z  
a za  
nabie

miekk  
przypa  
cznik  
Komó  
dości  
zowie  
Wtedy  
można

453.  
rezka  
454.  
w nich  
455

nakoniec większą część woreczka zarodkowego i samego zarodka, rozwiniętego w jego wnętrzu. Ona to zatem stanowi bielmo, które w tym razie możnaby nazwać *osadkowém*. Składa się zaś z komórek, po większej części wydłużonych w małe walczyki i skierowanych od powłoczek ku powierzchni zarodka.

§ 562 *bis*. Cóżkolwiek bądź bielmo różni się co do przyrodzenia i zbitości swój, a przez to dostarcza wygodnych piętn do oznaczenia nasion. 1<sup>o</sup> Komórki jego bywają dość często napełnione ziarenkami skrobi, i wtedy mówimy, że bielmo jest *mączyste* (fig. 453). Temuto przyrodzeniu bielma winno wiele nasion, jak np. ziarna zbóż swoje pożywne własności. Sądzone, że odmiana ta odpowiada zazwyczaj rozwijaniu się jądra, a zatem bielmu zewnętrznemu. 2<sup>o</sup> Innym razem komórki te nabierają dość znacznej grubości, zachowując przytém pewną



453.



454.



455.

miękkość; mówimy wtedy że bielmo jest *mięsiste*. W tymto przypadku wytwarza się niekiedy w komórkach olej (np. w rączniku), a takie bielmo nazywa się *oleistém* (fig. 454). 3<sup>o</sup> Komórki mogą nabyć wraz z grubością, dość znacznej twardości, zbliżając się prawie do twardości rogu, bielmo takie zowie się *rogowém* (np. w daktylu; fig. 455; kawie i kosaćcu). Wtedy zwykle na cieniutko odkrojonym płateczku, widziéć można bardzo wyraźnie pod drobnowidzem komórki, których

453. Przecięcie małego kawałka bielma kukurydzy. — c Komórki. — f Ziareczka skrobi w nich zawartéj.

454. Przecięcie bielma z *Croton tiglium*. — c Komórki. — h Kropelki oleju w nich zawarte.

455. Przecięcie bielma daktylu.

wydrążenie jest małe, ściany grube złożone z wielu warstw spółośrodkowych i przetrnięte jamkami ułatwiającymi spólniczenie jednej komórki z drugą. Roztwór jodu jest bardzo użyteczny przy rozpoznawaniu przyrodzenia bielma. Odkrywa on najmniejsze ślady skrobi użycząc jej niebieskiej barwy. Istoty zaś saletrorodne, których obecność tak jest pospolitą w nasionach i tak potrzebną w początku rozwijania się tkanek, jod daje poznać w postaci małych bryłek na wpeł zsiadłych, które barwi żółto. Na istotach tych składających wyłącznie prawie zawartość bielma rogowego, nie zbywa i innym jego gatunkom, a w bielmie mączystem towarzyszą one skrobi. To stanowi klój (*klajster*) zbóż.

Jasną jest rzeczą, że znamion tych szukać należy w nasieniu zupełnie dojrzałem. Tworzą się one tylko stopniowo, a w czasie kiedy bielmo zaczęło się ustrajać w zalążku upłodnionym, tkanka komórkowa, która je składa, mogła posiadać niektóre różnice pod względem swoich kształtów, lecz nie ukazywała ich ani pod względem zbitości swych ścian, ani pod względem istot utworzonych w ich wnętrzu.

§ 563. **Zarodek.** — Podczas kiedy wszystkie te zmiany odbywają się w okrywach nasienia, zachodzą także zmiany w zarodku, części tegoż najistotniejszej, i względem której wszystkie inne są podrzędne. Obaczymy przeto teraz rozwijanie się

1 2 3



456.

zarodka, poczynając od pierwszego ukazania się jego w chwili upłodnienia, to jest w chwili odpowiadającej zająsci bezpośredniego związku pomiędzy łagiewką a wierzchołkiem jądra. W miejscu odpowiadającym wydrążeniu tego ostatniego, podwojonemu najczęściej woreczkiem zarodkowym, ukazuje się pęcherzyk pojedynczy (fig. 456,

1, *v*), napełniony z początku istotą wpełpłynną ziarenkową, 456. Początek rozwijania się zarodka z *Draba verna*. — *s* Wieszadelko. — *v* Pęcherzyk zarodkowy. — *c* Zarodek. — 1. Pierwszy okres, w którym widać sam tylko pęcherzyk zarodkowy. — 2. Drugi okres, kiedy wiele komórek utworzyło się już w tym pęcherzyku. — 3. Trzeci okres; zarodek jest wyraźniejszy, w skutek utworzenia się i skupienia większej liczby komórek.

w której wkrótce tworzy się jedna, później zaś wiele innych komórek (fig. 456, 2, e), zawierających jąderka (§ 24, 327) zazwyczaj bardzo wyraźne. Komórki rzeczone zrastają się zwykle końcami w szereg, którego cała wyższa część stanowi *wieszadełko* (suspensor), niższa zaś kończyzna tworzy zarodek, ograniczający się zrazu na jednej komórce, wkrótce zaś złożony z wielu komórek połączonych w małą bryłkę (fig. 256, 3, e). W rozwijaniu tém, pęcherzyk macierzysty czyli zarodkowy prędko znika. Wieszadełko zachowuje częstokroć swą cienkość; innym razem przedłuża się i wzmaga w skutek przybycia nowych komórek; niemniej jednakże znika ono prawie zawsze, skoro zarodek, zawieszony na nim czas niejaki u wierzchołka woreczka, nabędzie pewnej objętości.

§ 564. Opisałiśmy już (§§ 28, 29) kolejne zmiany, części składające i główne odmiany zarodka. Widzieliśmy, że mała ta bryłka komórkowa, zrazu niepodzielona, ukazuje później pewne ślady podziału, zapowiadającego odszczególnienie się wielu części; że rozróżniamy w niej oś i małe boczne wyrostki, wątek pierwszych liści; że dalej, jeden lub dwa z tych pierwszych liści, które zwiemy liścieniami, przedstawiają postać i budowę szczególną, i że podług tego jak liczba liścieni jest jeden lub kilka, powstaje odtąd pomiędzy roślinami różnica zasadnicza, która w miarę ich rozwijania się, staje się coraz wydatniejszą. Lecz dotąd uważaliśmy zarodek tylko w niezależności od nasienia, a zresztą braliśmy rzecz zanadto ogólnie, dlatego zając się tu nim musimy daleko szczegółowiej.

Oś tworzy się nasamprzód, zwracając się jedną kończyzną ku wieszadełku, drugą zaś w stronę przeciwną. Pierwsza z nich wydaje później korzeń, dlatego też i w zarodku nosi imię *korzoneczka* (kiełek); druga przedłuży się w łodygę i okryje liśćmi, a zaczyna od wydania liścieni. Odróżniamy więc kończynę korzonkową i liścieniową. Korzonkowa przechodząc bezpośrednio w wieszadełko, zwrócona jest tém samym ku wierzchołkowi jądra i ku okienku, które jęj odpowiada; liścieniowa będąc wprost przeciwną, skierowaną być musi ku nasadzie jądra, to jest ku osadce. Pierwsze te stosunki pozostają prawie na zawsze, tak, iż oglądając nasiono, dosyć jest znaleźć osadkę i okienko, aby być w stanie oznaczyć z dość wielką pewnością dwie odpowiadające kończyzny zarodka, ukrytego jeszcze w powłokach.

Uważmy, że kierunek ten zarodka czyli nowój rośliny, jest wprost przeciwny kierunkowi rośliny macierzystej, ponieważ jądro uważać można za punkt wierzchołkowy tejże, a zarodek jest właśnie przewrócony względem jądra, obraca bowiem w górę koniec swój, który kiedyś rozwinię się w korzeń, na dół zaś koniec mający się rozwinąć w łodygę. Okoliczność ta stanowi istotną różnicę między nim a pączkami zwyczajnymi, które możnaby z nim porównać, lecz które zachowują stale kierunek rośliny, na której powstały.

§ 565. W nasieniu niewielkiej liczby roślin, mianowicie wielu pasorzytnych, zarodek posiada samą tylko oś niepodzielną, jak to można widzieć w kianiance (*Cuscuta*) [fig. 457]; lub też jeśli istnieją liścienie, to tylko w stanie zawiązkowym, i często



457.

458.

są tak małe, że zaledwie ich dostrzedz można (np. w *Pekea*, fig. 458), i to niekiedy tylko za pomocą szkieł (jak w storczykowatych). Przypadki te jednak są rzadkie, zwykle zaś w dojrzałym zarodku ukazują się oprócz liścieni mniejszej lub większej objętości, liście następne, skupione w pierwszy, nadzwyczaj małe pączki, nazwany *pączuszką*.

Rozmaite te części przedstawiają dosyć wydatne różnice, podług tego jak liście jest pojedynczy, lub jeśli takowych jest dwa. Obaczmy je kolejno w jednym i w drugim przypadku.

§ 566. **Zarodek jednoliścienny.**— Najpospolitszym kształtem zarodków jednoliściennych jest walec zaokrąglony na obu kończynach, lub owal mniej więcej podłużny (fig. 460). Od zewnątrz trudno jest rozeznąć w nim rozmaite części, lecz przecinając go pionowo przez środek, spostrzegamy wyżej lub niżej małą brodaweczkę pogrążoną w wydrążeniu tuż pod powierzchnią; jestto pączuszek, górne zakończenie osi, do której należy cała część niżej leżąca, część, którą prawie całą stanowi *łodyżka* tej małej roślinki, lecz którą nazywamy


457. Zarodek kianianki.

458. — z *Pekea butyrosa*. — *t* Gruba łodyżka stanowiąca prawie całe ciało, na końcu zagięta w zwienie, leżące w bruzdce *s*, oddalone tu nieco ze swego miejsca, dla pokazania go wyraźniej wraz ze śladem liścieni leżących na końcu.

zwyk  
przed  
nad p  
c). E  
cony,  
powię  
cinan  
ce, i  
male  
która  
mn p  
pukło  
pozn  
kowa  
ścien  
wydra  
i roz  
śmy,  
zbior  
punkt  
stopn  
powy  
która  
liście  
liście  
część  
tę cz  
nas w  
który  
przed  
zacz  
wolny  
wając  
w tém

459.  
siemik  
czek.  
460.  
czuszk

zwykle korzoneczkiem (kielkiem) [fig. 460, *r*], ponieważ przedłuży się kiedyś u dołu w korzeń. Cała część leżąca ponad pączuszką jest liścieniem (fig. 460, *c*). Badając zarodek świeży lub zwilgotniony, z wielką uwagą i przy dostatecznym powiększeniu, jesteśmy w stanie bez przecinania go nawet, oznaczyć te różne okolice, gdyż prawie zawsze można odkryć maleńką szparę (fig. 460, *f*) zewnętrzną, która odpowiada pączuszkowi wskazanemu prócz tego najczęściej przez lekką wypukłość na powierzchni zarodka, a wtedy poznamy granicę pomiędzy częścią korzonekową, obróconą ku okienku i częścią liścieniową zwróconą ku osadce. Lecz czemuż odpowiada owo wydrążenie zawierające pączuszek, i owa warstewka cienka i rozszerepiona w podłuż, która takowy okrywa? Powiedzieliśmy, że liścień jest pierwszym liściem roślinki, a pączuszek zbiorem liści następnych. Jeśli zaś zechcemy porównać z tym zbiór liści zwyczajnych nadzwyczaj młodych, i weźmiemy za punkt wyjścia jeden z tych liści, wykształcony już do tego stopnia, że w nim rozeznać można małą pochwę przechodzącą powyżej w blaszkę, ujrzymy że inne liście okryte są tą pochwą, którą zaledwie że przewyższają. Otóż liście te stoją względem liścia pierwszego w tym samym stosunku co pączuszek względem liścienia. Część wklęsła, którą widzimy u spodu liścienia, jest częścią pochwową tegoż; szpara zaś zetknięciem się brzegów tej części, zbliżonych, lub pokrywających się nawet. Utwierdza nas w tym mniemaniu śledzenie całego rozwijania się liścienia, który w początku ukazuje się w postaci małej brodaweczki, przedłuża się nieco, następnie rozszerza się u nasady, gdzie zaczyna wystawać inna brodaweczka, to jest pączuszek, zrazu wolny, potem stopniowo pokrywany przez dwie blaszki posuwające się od brzegów rzeczonoego rozszerzenia. Widzimy w tym wszystkiemu rozwijanie się liścia (§ 147), którego blaszka



459.

460.

459. Przecięcie pionowe owoka błotnicy (*Triglochin Barrelieri*). — *p* Nasiennik uwieczony znamieniem bezszyjkowym *s*. — *g* Nasiono. — *f* Sznureczek. — *r* Szewek. — *c* Osadka.

460. Zarodek téjże oddzielony. — *r* Kielik. — *f* Szpara odpowiadająca pączuszkowi. — *c* Osadka.

ukazuje się nasamprzód, potem zaś część pochwowata, zapowiedziana zrazu prostą tylko wklęsłością, i zwolna tylko obejmująca inne, bardziej ku wewnątrz leżące liście.

Wszystko to bardzo jest wyraźnem w pewnych zarodkach (np. w zarodku pochrzynu [*Dioscorea*] i innych roślin téjże rodziny; fig. 461), których liścień *c* posiada blaszkę rozszerzoną i zcieńczoną tak, jak mały prawdziwy liść, tudzież pochwę *g*, która otacza pączuszek, lecz nie okrywa go całkowiec. Zwykłej jednakże liścień posiada kształt wcale różny od kształtu innych, zwyczajnych liści, bywa bowiem zgrubiały w walec, stożek lub maczugę.



461.

Niekiedy pączuszek ukazuje się mniej więcej wolny na zewnątrz, bądź że brzegi pochwy nie łączą się z sobą, bądź że cieniejąc w błonę, nie przedłużają się jednakże. Częstoć jeden w nim tylko rozeznac można liść obrócony w stronę przeciwną względem liścienia, inne zaś są bardzo maleńkie, innym razem odkrywamy jeden lub dwa jeszcze liście, rzadko więcej, i te coraz są mniejsze.


Kiełek w niektórych zarodkach bywa tak długi jak liścień, albo i dłuższy jeszcze (fig. 76, *t*); takie zarodki nazywamy *grubokiełkowemi* (e. macropodi; od *μακρος*, duży; *πους*, *ποδος*, noga). Niekiedy zarodek rozszerza się w bok tworząc przez to gatunek wyrostka mogącego nawet stanowić większą część istoty zarodkowej. Lecz zwykłej kiełek, krótszym bywa daleko od liścienia, tudzież zazwyczaj grubszym i złożonym ze zbitszej tkanki. Często zaostża on się w mały kończyc, tam, gdzie przytykało wieszadełko i gdzie później ukaże się pierwszy korzeń. Jednakże nie kończycyna sama przedłuży się dla utworzenia tegoż, widzieliśmy już owszem (§ 111), że to pewien rodzaj wewnętrznej brodaweczki przebijając warstwę zewnętrzną rozwinię się w korzeń.

§ 567. **Zarodek dwuliścienny.** — Kształt zarodków dwuliściennych jest zanadto rozmaity, aby go można określić w sposób ogólny. Czasami mają postać walca lub owalu bardzo podłużnego i przypominają przeto zarodki jednuliścienne, od

461. Zarodek jednej z pochrzynowatych (*Rajania cordata*). — *r* Kiełek. — *c* Liścień. — *g* Pochwa ukrywająca pączuszek.

których jednakże różnią się zawsze podziałem kończyny liściowej na dwie łaty. Podział ten jest mniej więcej głębszy, podług tego jak liścienie są mniej albo więcej rozwinięte w stosunku do osi czyli łodyżki, na której siedzą. Bardzo zwykłą jest postać, którą mieliśmy już sposobność opisać i przedstawić (§ 77) z migdału, gdzie dwa jajowate liścienie *cc*, przyłożone do siebie, stanowią większą część zarodka, os zaś, jest ciałkiem daleko węższem i krótszem, które na zewnątrz widzieć się tylko daje w postaci małego stożka *r* wystającego popod liścieniami; ta część niższa względem liścieni jest kiełkiem, którego kończyna jakęśmy już powiedzieli (§ 111) przedłuży się bezpośrednio w korzeń. Druga część osi, wyższa względem osady liścieni, jest pączuszkiem, mniej lub więcej, niekiedy zaś zaledwie że cokolwiek rozwiniętym i ukrytym pomiędzy niemi; daje się więc dopiero po sztucznem ich oddaleniu widzieć. Pączuszek kończy się częstokroć dwiema małemi łatkami, niekiedy zaś posiada więcej takich bocznych łatek, które są wątkiem liści, innym razem wydają się weale jeszcze niepodzieloną.

§ 568. Po największej części liścienie bywają równe. Jednakże nierzadko można spostrzedz pomiędzy niemi nierówność, chociaż ta za nadto jest małą, aby na nią zwracać uwagę. Wszakże w niektórych razach staje się ona bardzo wydatną i może nią nawet być do tego stopnia, że jeden z liścieni zdaje się zupełnie nie istnieć. Wprawdzie śledząc bacznie, odkrywamy go prawie zawsze, ale tylko w zarodzie (np. w Kotewce [*Trapa*], niektórych gatunkach *Hiraea*; fig. 462, i t. d.).



462.

§ 569. Innym razem pozorna pojedynczość liścieni od innej zależy przyczyny, to jest: że oba zrosły się mniej więcej ściśle w jedno ciało (fig. 463). Lecz wtedy pączuszek *g* nie leży jak w prawdziwych jednoliściennych zarodkach przy powierzchni, ani też spólniczy z zewnętrznem przez małą szparkę. Zajmuje on wydrążenie zupełnie wewnętrzne i przypadające na przedłużeniu osi. Zresztą prawie zawsze rozeznac

462. Zarodek z *Hiraea salzmanniana* przecięty pionowo, dla pokazania nierówności dwóch jego liścieni, z których jeden *c* tworzy prawie całe ciało zarodkowe.—*c* Liścień mniejszy.—*g* Pączuszek.—*r* Kiełek.



463.

można podwójność ciała liścieniowego, po śladach, jakie zrośnięcie *c* pozostawia na całych spojonych z sobą powierzchniach; i jeśli śladów tych niema, rozbierając zarodek młodszy, przed czasem w którym liścienie tak dalece się zbliżyły, połączyły, lub w jedno zwały (np. w nasturcy).

§ 570. Ale porzućmy to urządzenie wyjątkowe a weźmy najzwyczajniejsze, to jest: w którym oba liścienie są równe i tylko stykają się z sobą. Dochodzą one znacznej grubości (jak w migdale, grochu, dębie i t. d.), i wtedy mówimy że są mięsiste; w takim razie powierzchnie stykające się, czyli wewnętrzne, są zwykle płaskie, powierzchnie zaś wolne czyli zewnętrzne są mniej więcej wypukłe. Albo też oba liścienie są ściśnione w kształt cienkich blaszek i wtedy zowiemy je liściowatemi (jak w rączniku, trzmielinie i t. d.). Prawdziwe przyrodzenie liścieni, jako pierwszych liści nowo powstających rośliny, ukryte w pierwszym razie, objawia się mniej więcej wyraźnie w drugim. Zazwyczaj brzegi ich są całe, nawet w roślinach, których późniejsze liście przedstawiają rozcięcia mniej więcej głębokie, jednakże zdarzają się liścienia z brzegiem podzielonym na płaty, (jak w orzechu włoskim, dębie, lipie, fig. 464).

Przyrodzenie liściowate objawia się jeszcze w nerwach, mniej więcej wyraźnych; mało wprawdzie znacznych w liścieniach mięsistych, lecz tém widoczniejszych im te liścienie są cieńsze. Często nawet na powierzchni tych ostatnich spozstrzegać się dają szparki. Nakoniec liścienie mogą posiadać ogonki (fig. 465), to jest: mogą być oddzielone od osi je noszącej, przez zwężenie krótsze lub dłuższe. Częściej są bezogonkowe, utworzone przez same tylko rozszerzenie czyli blaszkę siedzącą bezpośrednio na osi. Nie rzadko widzieć można, że wykrojona ich nasada przedłuża się po jednej i po drugiej stronie w łaty popod punktem przymocowania; jeśli dwie te łaty są dość duże i szerokie, liścień będzie sercowaty: jeśli są krótkie i wąskie, jakby dwa małe różki, liścień zowie się dwu-rożkowym (fig. 466).

463. Zarodek z *Carapa guianensis* przecięty pionowo, dla pokazania zrośnięcia liścieni, odznaczonych słabą tylko linią *c*. — *r* Kielek. — *g* Pączuszek.

§ 5  
nawet

praw  
dobn  
dem s  
jątkow  
Lec  
nych  
dwa,  
cie w  
wiele  
15 li  
tutek  
niejs  
te s  
praw  
zecz  
kład  
drzew  
§ 5  
stawi  
ślin  
najwi  
przyj

464  
465  
do nie  
466  
467  
lek—

§ 571. Niekiedy znajdujemy więcej niż dwa liścienie. To nawet może się zdarzyć w nasionach roślin, w których liczba



464.



465.



466.

prawidłowa liścieni jest dwa; sąto przypadki wyjątkowe: podobnie jak z roślin posiadających w ogóle liście po dwa względem siebie naprzeciwległe, niektóre mogą przedstawiać wyjątkowo okółki trójlistne.

Lecz są rośliny, w których liczba liścieni okółkowo ułożonych jest prawidłowa i stale wyższa nad dwa, jak w wielu szyszkowych, a mianowicie w sosnach (Bg. 467) i jodłach, których wiele gatunków posiada do 6, 9 a nawet do 15 liścieni. W takim razie kształt tych ostatnich jest równowązki, tak jak kształt późniejszych liści. Uwagi godnym jest, iż liście te skupione w wiązki na skróconych, lub prawie żadnej długości nie mających gałązeczkach, przedstawiają z kolei podobny rozkład, jak to widzicie można na sosnach, modrzewiu i t. d.



467.

§ 572. Ta wielość liścieni była powodem, że radzono podstawić za nazwę ogólną *roślin dwuliściennych*, nazwę: *roślin wieloliściennych*. Lecz pierwsza z nich ściąga się do największej części, albo raczej do całego prawie ogółu roślin; przyjęto ją oddawna i powszechnie, dlatego też może być

464. Zarodek lipy.—r Kielek.—c Jeden z liścieni.

465. Zarodek z *Geranium molle*.—r Kielek.—c Liścienie przytwierdzone do niego za pośrednictwem trzoneczka czyli ogonka p.

466. Zarodek wiąz.—r Kielek.—c Liścień.—oo Jego rożki.

467. — sosny.—1. Wyjęty z nasienia.—2. Wschodzący.—r Kielek—c Liścienie.

zatrzymaną. Musimy tylko przypomnieć sobie, że istotna różnica zarodków w dwóch wielkich gromadach roślin, zależy na tém, iż pierwsze owe liście wychodzą zawsze naprzemian na jednych (jednoliścienne), w drugich zaś (dwuliścienne) są zawsze okółkowe, bądź, co zwykłej, po dwa, bądź też, co się bardzo rzadko zdarza, po więcej.

§ 573. Powiedzieliśmy, iż dwa liścienie bywają często przyłożone do siebie powierzchniami płaskimi; często jednakże ułożone są inaczej, podobnie jak liście właściwe przed zupełnym rozwinięciem się, kiedy ściśnione w pęczku znajdują się jeszcze w stanie przedlistnienia, o którym mówiliśmy powyżej (§ 174). Tak, mogą one być złożone w pół, *odchy-*



468.



469.

*lone* (fig. 164, 1) lub *zdwojone* (fig. 164, 2; 469), albo też *zwinięte* (fig. 164, 4; 468), lub *ślimakowate* (fig. 164, 7; 470). Najczęściej oba liścienie są złożone i zwracają się równoległe i w jedną stronę, jak to bywa jeśli są *okraczające* (fig. 164, 9) lub *wpół-okraczające* (fig. 164, 8). Niekiedy

bywają oprócz tego pomięte. Rozumię się że same tylko liścienie liściowate mogą być pozaginane lub pozwijane w te różne częstokroć bardzo zawiślane kształty; co też nie da się wyrazić jednym słowem, lecz wymaga krótkiego, a dokładnego opisu.

§ 574. Poznawszy różne położenia, jakie przybierać mogą dwa liścienie jednego zarodka względem siebie samych, obaczmy teraz położenia jakie przybierają względem innej, zasadniczej części tegoż zarodka, to jest względem kiełka. Bardzo często kiełek zachowuje jeden z liścieniami kierunek prosty jeśli zarodek jest prosty, krzywy, jeśli tenże jest skrzywiony. Linja krzywa, jaką zarodek zakreśla, przedstawia zwykle łuk mniejszy lub większy, niekiedy jednakże staje się prawdziwą wężownicą o wielu skrętach, przypadających bądź na jednej

468. Zarodek granatu (*Punica granatum*) przecięty napół; część wyższa oddalona, dla pokazania zwinienia liścieni c.—r Kielich.

469. Zarodek kapusty (*Brassica oleracea*).—r Kielik.—c Liścienie.—1. Cały.—2. Na przecięciu poziomym.

plasz  
plasz  
iuny  
ostroy


ścien  
uloży  
W pie  
cumb  
bente  
ścien  
samy

§  
wzg  
wzg  
W

wies  
drze.  
sto v  
wszy  
okry  
stkie

47  
471  
kazan  
472  
472  
ziomé  
473  
przec

płaszczyźnie (fig. 470), bądź też jedne przed drugimi na wielu płaszczyznach (fig. 457). Innym razem kierunek kielka jest inny jak liścieni, i tworzy z nim kąt rozwarty, prosty, lub ostry; albo też zaginając się zupełnie, idzie równoległe z li-



ścieniami, lecz w stronę przeciwną. Tak zgięty kielek, może ułożyć się bądź na powierzchni liścieni, bądź na ich brzegu. W pierwszym razie zwiemy liścienie *na-kielkowemi* (cot. incumbentes) [fig. 472]; w drugim *przy-kielkowemi* (accumbentes) [fig. 471, 473]. Te pozaginania kielka, względem liścieni, mogą istnieć wraz z pozaginaniem liścieni względem samych siebie (fig. 469).

§ 575. Zwróćmy teraz uwagę na różne stosunki zarodka względem części nasienia, które go zamyka, a nasamprzód względem bielma, kiedy takowe się rozwija.

Widzieliśmy, że zarodek jest zrazu małym tylko ciałkiem, zawieszonym u wierzchołka wydrążenia znajdującego się w jądrze. Widzieliśmy, iż powiększa się stopniowo (fig. 474) i często wypełnia w końcu wydrążenie owo w całości, wsysając wszystkie soki jakie się tamże nagromadziły, a nawet część okryw istniejących w samym początku. Wystawmy sobie wszystkie pośrednie stopnie, pomiędzy owym pierwszym a ostatnim

470. Zarodek z *Bunias orientalis*.


471. Zarodek grochu przecięty na dwoje; część wyższa oddalona, dla pokazania granicy pomiędzy liścieniami c mięsistemi i przykielkowemi.

472—473. Zarodki krzyżowych.— *r* Kielek.— *c* Liścienie.

472. Zarodek urzetu (*Isatis tinctoria*).— 1. Cały. — 2. Na przecięciu poziomym.

473. Zarodek laku pospolitego (*Cheiranthus cheiri*).— 1. Cały. — 2. Na przecięciu poziomym.

stanem zarodka, wystawmy sobie zarodek zatrzymany na każdym z tych stopni, a w każdym z tych przypadków, miejsce, którego



474.

nie zabiera zarodek, zajęte przez bielmo: łatwo nam będzie pojąć wszystkie możebne stosunki wielkości, zachodzące pomiędzy jednym, a drugim, stosunki nieskończenie rozmaite, na co wszystko przykładów dostarcza nam przyrodzenie (fig. 475, 476, 477).



475.

476.

477.

474. Nasionie trzmieliny (*Evonymus europaeus* przecięte pionowo i przedstawione w 4ch różnych okresach, dla pokazania rozwinięcia odnośnego zarodka *e* względem bielma *p*. Osnówka została odjęta. — *h* Znaczek. — *c* Osadka. — 1. Pierwszy okres, w którym zarodek ma postać kulki jeszcze niepodzielonej, zagłębionej w wierzchołku bielma. — 2. Drugi okres; liścienie zaczynają się ukazywać. — 3. Trzeci okres; zarodek jest nieco dłuższy, a część jego wyraźniejsza. — 4. Czwarty okres; zarodek wydłużając się przeszedł połowę długości bielma.

475—477. Nasiona dojrzałe przecięte pionowo dla pokazania różnych stosunków wielkości zarodka *e* względem bielma *p*. — *t* Powłoka. — *c* Osadka. — *h* Znaczek. — *f* Sznureczek.

475. Nasiono jednej z jaskrowatych (*Helleborus niger*).

476. — — — — — jednej z kwaśnicowatych (*Dyphyllia peltata*).

477. — — — — — kwaśnicy (*Berberis vulgaris*).

Tak  
u wie  
tegoż  
być o  
stać  
pokła

§  
i zow  
rzyć  
się z  
czyli  
w mi  
stkie  
końc  
ta zra  
zapew


§ 5  
runku  
osade  
wszyc  
z jedn  
wnają  
dujen  
z za  
na w  
ny o  
i zda  
być o  
no ni  
w sto  
na je  
w tra  
§  
padk  
wać

478.

479.  
sienier  
Powł

Tak np. zarodek może zajmować maleńką tylko przestrzeń u wierzchołka bielma, sięgać mniej lub więcej aż do połowy tegoż, albo nakoniec wyrównywać mu co do długości. Może być cieńszym lub grubszym, a miąższość jego musi koniecznie stać w stosunku odwrotnym do miąższości bielma, którego pokład coraz się bardziej powiększa.

§ 576. Zarodek może zachowywać kierunek osi nasienia, i zowie się *osiowym*. Wtedy dwa przypadki zdarzyć się mogą: albo odpycha pod sobą bielmo i styka się z takowem częścią tylko swęj kończyny niższej czyli liścieniowej (fig. 478); albo też zagłębia się w miąższość samego bielma, które wtedy ze wszystkich stron go otacza, z wyjątkiem samej tylko kończyny kielkowej (fig. 477). Rzadko kończyna ta zrasta się z bielmem (np. w wielu szyszkowych), zapewne za pomocą zgrubiałego wieszadelka.



478.

§ 577. Innym razem zarodek rozwijając się, nie idzie w kierunku osi nasienia, lecz zbacza na stronę zwykle przeciwną osadce. I w tym nawet przypadku może być otoczonym wsząd przez bielmo, którego pokład daleko będzie grubszym z jednej, niż z drugiej strony. Gdzieindziej leży całkiem zewnątrz bielma i bezpośrednio pod okrywami. Rozkład ten znajdujemy szczególnie w nasionach pokrzywionych, powstających z zalążków zgiętych; i wtedy osadka przypada na wypukłości skrzywienia, a zarodek, nazwany *obwodowym*, układa się podług skrzywienia i zdaje się otaczać bielmo, zamiast coby miał być od niego otoczonym (fig. 479); kiedy nasiono nie jest skrzywione, a zarodek jest mały w stosunku do bielma, wtedy zostaje odsuniętym na jeden z punktów jego powierzchni, jak np. w trawach.




479.

§ 578. Nakoniec w niewielkiej liczbie przypadków, rozwijanie się powłok może się odbywać niezupełnie jednostajnie, tak, że okienko nie przypada

478. — z *Carex depauperata* przecięte pionowo. — t Powłoki.— p Bielmo.— e Zarodek.

479. Owoczek dziwaczku (*Mirabilis jalappa*) przecięty pionowo wraz z nasieniem, które zawiera. — a Nasiennik, na którym widać ostatek szyjki s.— Powłoki nasienne.— e Zarodek wraz z kielkiem r i liścieniami c.— p Bielmo.




480.

(fig. 480 i t. d.).

§ 579. Widzieliśmy dopiero, że zarodek, któremu towarzyszy bielmo, najeźściej otoczonym bywa od tegoż; lecz że czasami znajduje się na zewnątrz, bądź to na jednej z kończyn, bądź na boku. Richard nazywa go w pierwszym przypadku *wewnętrznym* (e. intrarius), w drugim *zewnątrznym* (e. extrarius).

§ 580. Uważmy teraz stosunki zarodka do powłok nasennych, czyli do trzech głównych punktów: okienka, osadki



481.

482.

więc zachodzić mogą tylko względem znaczk. Ten zaś, przypada zowraz z osadką w zalążkach prostych, czyli bezzwro-

480. Jądro czyli pestka daktylu. — p Bielmo. — e Zarodek. — 1. Cały. — 2. Przecięty poprzecznie przez zarodek.

481. Nasiono z *Sterculia balanghas*, przecięte podłużnie wraz z częścią nasiennika *pc*, do której jest przytwierdzone. — *f* Sznureczek. — *ch* Osadka i znaczek przypadające razem. — *t* Powłoki nasienne. — *ps* Bielmo, którego wierzchołek tylko widać. — *c* Jeden z liścieni; drugi został odjęty dla pokazania pączuszka *g*. — *r* Kielek.

482. Nasiono z *Erysimum cheiranthoides* przecięte wpodłuż. — *m* Okienko. — *ch* Osadka przypadająca blisko znaczk *h*. — *t* Skórka. — *mi* Błonka wewnętrzna. — *r* Kielek. — *c* Liścienie. — *g* Pączuszek.

tnych.  
wstec  
zwróc  
contr  
(rad  
rodek  
przec  
opus,  
(amp  
które  
jak w  
oneg  
twor  
rodek  
tym;  
tym (  
§ 5  
sunka  
Moga  
ten je  
no, n  
łożen  
Nasio  
wstęp  
bądź  
runk  
i skrz

(1) I  
łatwo  
zupel  
ją do  
szem  
nych  
chowu  
jest  
przew  
kiedy  
do n  
przym  
Mirbel  
samém

nych, a koniecznie przeciwniej w załączkach wstecznych, czyli wsteczno-zwrotnych. W pierwszym przeto przypadku kiełek zwrócony jest w stronę przeciwną znaczkowi (*radicula hilo contraria*) [fig. 481]; w drugim skierowany jest ku niemu (*radicula hilum spectans*) [fig. 482]. Richard nazywał zarodek *wsteczległym* (antitropus, od τροπή zwracanie się, αντί przeciw), w pierwszym, *jednakoległym* (homotropus; od ὁμος, taki sam) w drugim przypadku. W *okrągległym* zaś (amphitropus; od ἀμφί, około) nazywał zarodek zakrzywiony, którego obie kończyny zbliżają się ku sobie (fig. 482), i który jak widzieliśmy otacza zwykle całe bielmo lub tylko część onego (fig. 479). Jasną jest rzeczą, iż zarodek wsteczległy, tworzyć się musi w załączku prostym, czyli bezzwrotnym; zarodek wprostległy w załączku wstecznym czyli wstecznozwrrotnym; wokrągległy zaś w załączku skrzywionym czyli zgiętym <sup>(1)</sup>.

§ 581. Widzieliśmy (§ 539) jakie różnice zachodzą w stosunkach załączka względem zamykającej go komory zawiązka. Mogą one ulegać odmianom w skutek rozwijania się załączka; ten jednakże zamienwszy się w zupełnie wykształcone nasiono, nie może co do kierunku swego innych przedstawiać położzeń, prócz tych jakie się widzieć dają w samych załączkach. Nasiono bowiem może być albo wzniesione (fig. 459), albo wstępujące, albo przewrócone, albo zawieszona (fig. 484), bądź w tym samym kierunku co sznureczek, bądź też w kierunku odwrotnym; może dalej być przytwierdzone środkiem, i skrzywione, lub złożone na sobie samém. Figury 433—443,

(1) Podobne brzmienie wszystkich tych nazwisk, w języku łacińskim łatwo może stać się przyczyną niejednego zamieszania, jeśli ktoś nie jest zupełnie z niemi oswojonym i nie odróżnia dokładnie tych, które się ściągają do załączka, od tych, które się tyczą zarodka. Zamieszanie staje się większem jeszcze daleko, jeśli zatrzymamy wiele innych przez Richarda podanych nazwisk, np. *heterotropus* (zdrożnoległy) dla zarodka, który nie zachowuje kierunku nasienia, *orthotropus* (prostoległy) dla zarodka, który jest zarazem jednakoległy, prosty, albowiem ten ostatni należy do załączka przewróconego, a przeto zarodek wtedy właśnie zwałby się *orthotropus*, kiedy załączek nie byłby takim. To spowodowało autora wraz z p. Brongniart do użycia przymiotników *prosty*, *wsteczny* i *skrzywiony*, które odpowiadają przymiotnikom *orthotropus*, *anatropus* i *campulitropus*, wprowadzonym przez Mirbela daleko później od czasu użycia wszystkich innych wyrazów z tém samém zakończeniem.

któremi staraliśmy się uwyraźnić rozmaite położenia załązka, dają się zastosować także do nasion dojrzałych, równie jak wyrazy użyte do oznaczenia tych położeni.

§ 582. Lecz tożsamość kierunku względem komory, uważana w dwóch nasionach, należących do różnych od siebie roślin, nie prowadzi za sobą tożsamości kierunku zarodków. Załazek bowiem wzniesiony, mógł być prostym lub wstecznym, jego okienko mogło być zwrócone w górę lub ku dołowi komory. Kielłek który prawie zawsze odpowiada dokładnie okienku, musi w pierwszym razie być także zwróconym w górę, w drugim na dół. Oznacza się to pewnemi przymiotnikami dodanemi kielkowi; tak np. nazywamy go *górnym*, kiedy jest zwrócony w górę (fig. 483, *er*); *dołnym* kiedy na dół (fig. 460);



483.



484.

*brzusznym* czyli *dośrodkowym* (rad. ventralis v. centripeta) kiedy jest obrócony ku wewnątrz: *grzbietnym* czyli *odśrodkowym* (dorsalis v. centrifuga) [fig. 481, *r*], kiedy jest odwrócony na zewnątrz. Jasną jest rzeczą iż porównyując kierunek ten zarodka, z kierunkiem nasion, można

wnieść o kierunku bezwzględny załązka, równie jak naodwrot z bezwzględnego z kierunku załązka można było wnieść o późniejszym kierunku zarodka. Załazek wzniesiony i prosty, czyli bezzwrotny, zapowiada najprzód że załazek będzie wsteczny, o kielku górnym; podobnie jak znalazłszy w dojrzałym nasieniu kielłek górny, wnosimy z pewnością jakim był poprzednio załazek. Ponieważ nie zawsze można widzieć te części we wszystkich okresach ich rozwijania się, ponieważ większa część roślin znajomych, dostarczanych nam przez po-

483. Przecięcie pionowe owoka rącznika (*Ricinus communis*) i ziarna w tymże zawartego. — *a* Nasiennik. — *l* Komora. — *f* Sznureczek. — *t* Powłoki nasienne; na zewnętrznej widać przyrostek *c*, przez który przechodzi mały kanałek od otworka zewnętrznego, który teraz nie odpowiada dokładnie otworkowi wewnętrznemu, przypadającemu wprost ponad kielkiem. — *r* Szepek. — *ch* Osadka. — *p* Bielmo, którego samą tylko część wyższą widać. — *e* Zarodek z kielkiem *er* i liścieniami *ec*.


484. Zarodek odłączony przecięty poprzecznie; części jego oddalone nieco zostały, dla pokazania dwóch liścieni *c* przyłożonych do siebie. — *r* Kielłek.

drózników i zachowywanych po zielnikach, przedstawia się nam ograniczoną na jednym jakimkolwiek szczeblu rozwinięcia, a nie w wielu kolejnych stanach; łatwo pojąć całą ważność tych piętn, z których jedno może zastąpić drugie, i z których jedno odosobnione, pozwala odgadnąć inne, tak poprzednie, jak mające nastąpić.

§ 583. Okienko bywa zupełnie wyraźnem w wielu nasionach, jak np. w kosaćcu, bobie, fasoli, grochu i innych strąkowych gdzie pozostaje w postaci małej komórki. Lecz w największej części znika, a wtedy dosyć jest przeciąć ziarno i obaczyć gdzie się kończy kielek, aby oznaczyć miejsce, gdzie znajdowało się okienko.

Co się tyczy znaczką i osadki, te zwykle w nasieniu wyraźniejsze są niż w zalążku. Piérwszy daje się łatwo poznać po miejscu do którego przyczepia się sznureczek, albo też, jeśli związek ten jest przerwany i ziarno odłączyło się, po bliźnie która pozostaje na powierzchni powłok. Osadkę zaś poznać można częstokroć po odmiennéj barwie bledszej, lub też co zwykłej, ciemniejszej od reszty powłok; innym razem barwa jego jest taka sama jak na powłokach i wtedy trudniej jest rozpoznać ją, a nawet niepodobna, aż dopiero na przecięciu ziarna, na którym pomiędzy powłokami, w miejscu odpowiadajacém osadce, pokazuje się część grubsza, złożona z tkanki nieco odmiennéj. Zresztą osadka odpowiada zawsze kończyźnie liścieniowej zarodka. Co do postaci téż swéj, bywa rozmaita, raz równowążka, drugi raz i to częściej, ma kształt krążka mniej więcej zaokrąglonego, to znowu środkuje pomiędzy dwiema temi ostatecznościami. Jeśli znaczek leży bezpośrednio na zewnątrz względem osadki (w nasionach prostych, czyli posiadający zarodek wsteczległy), oba te punkta zlewają się od zewnątrz w jedno. Jeśli znaczek oddala się od osadki, wiązka naczynna przybywająca wraz ze sznurkiem do piérwszego i kończy się w drugiej przebiegając wskróś powłok i odznacza się pod niemi, jako linia lub pasek, zwykle ciemniejszy od zewnątrz, a który poznaliśmy już pod imieniem szwaku. Przedłużenie to sznureczka można uważać za część jego różną jednak od sznureczka właściwego, ponieważ zamiast być wolną, zrasta się z powłokami. Kiedy zalążek lub nasienie biorą kierunek przeciwny względem sznureczka, kiedy np. mamy zalążek wzniesiony na sznureczku zawieszonym (fig. 438),

lub zawieszony na sznureczku wzniesionym (437, 486), sznureczek jest niejako szewkiem wolnym. Wystawmy sobie bo-



wiem że się zrosł z nasieniem, a takowe przybierze jeden z najpospolitszych swych kierunków: stanie się zawieszonem i wsteczniem. Rozmaite gatunki parolistniku (*Zygophyllum*) przedstawiają nam wszystkie przejścia z jednego stanu do drugiego (fig. 487).

W dojrzałym owocu guazumy, szewek bardzo gruby, oddziela się od odpadającego ziarna *g* i pozostaje przyczepiony do łożyska w postaci niteczki tęgiej, zupełnie podobnej do sznureczka. Oczywiście jest rzeczą iż długość szewka mierzy się zawsze odległością znaczką od osadki, tak, iż jest żadną prawie w nasionach skrzywionych czyli zgiętych, a w nasionach wstecznych dochodzi całej swęj długości. Szewek odpowiada prawie zawsze powierzchni brzusznej ziarna, to jest obróconej ku łożysku. W małej tylko liczbie nasion przypada na stronie przeciwniej, czyli grzbietowej (fig. 486).

Łatwo pojąć, że za pomocą pojęć powyżęj skreślonych, można po obejrzeniu zewnątrz nasion i oznaczeniu różnych jego punktów lub części, jakoto: znaczką, osadki, okienka

485. Nasiono leszczyny. — *f* Sznureczek. — *r* Szewek. — *c* Osadka. — *n* Nerwy, które z niej wychodzą i rozbiegają się promienisto, wszedłszy w połowi zarodka.

486. Przecięcie pionowe owoca z *Fagonia cretica*. — *p* Nasiennik. — *f* Sznureczek, którego większą część można uważać za szewek odłączony od nasienia. — *g* Nasiono. — *c* Osadka. — *m* Okienko.

487. Przecięcie poprzeczne jednego owoca z owocu *Guazuma ulmifolia*. — *p* Nasiennik. — *gg* Nasiona. Z jednym z nich szewek *r* jest jeszcze zrosnięty; w drugim takowy odłączył się w postaci małego haczyka *r* wolnego i wystającego wewnątrz komory.

i sznurka, wnieść o kierunku zarodka nie widząc go wcale. Lecz odwrotnie postąpić nie możemy, gdyż lubo zarodek pomocnym jest do rozpoznania tych punktów na powłokach, nie wystarcza jednakże do tego sam jeden, ponieważ nie stoi w koniecznych stosunkach ze znaczkiem, którego położenie zmienić się może.

§ 584. Pozostaje nam tylko teraz dodać jeszcze kilka szczegółów do tych, któreśmy już wyżej przywiedli (§ 557) pod względem okryw dojrzałego nasienia. Widzieliśmy, że liczba tych okryw może niekiedy wynosić do trzech lub czterech jak w załączku, lub co zwykłej, zmniejszyć się do dwóch, z których jedna jest zewnętrzna czyli skórka, druga wewnętrzna czyli błonka wewnętrzna (*endopleura Decandolla*). Zarodek czyto bez bielma, czy też otoczony od tego późniejszego utworu, lub obok niego leżący, tworzy ciało nazywane jądrem (*amygdala*), obleczone całkowicie błonką wewnętrzną. Skórka towarzyszy mu także czasami, wszędzie układając się na jądrze i błonie wewnętrznej; dzieje się to zazwyczaj wtedy, kiedy nasienie jest proste lub zaledwie że skrzywione. Lecz jeśli linia krzywa jaką zakreśla nasienie, zamyka się lub zagina, wtedy najczęściej błonka wewnętrzna wchodzi w to zagłębienie, skórka zaś zagłębienia się w nie mało tylko, albo nic wcale. Niekiedy nawet, zamiast rozciągać się kształtnie i jednociągłe na powierzchni wewnętrznej tkanki, tworzy marszczki czyli zagięcia liczne, które się zawracają ku wewnątrz, i dzielą tym sposobem całą powierzchnią jądra mniej więcej głęboko na wiele zagródek. Bielmo więc wypełniające wnętrze takich okryw, zostaje wyżłobionem na swój powierzchni i do pewnej głębokości zmarszczkami czyli raczej rowkami odpowiadającymi owym zagięciom; bielmo takie zowiemy *pomarszczonem* (alb. *ruminatum*) jak w wielu flaszowcowatych, w sago, arece i wielu innych palmach (fig. 539).

Innym zaś razem skórka znowu może posiadać wydatności na zewnątrz gdzie nie dochodzi błonka wewnętrzna. Są to małe mięsiste wyrostki, które najczęściej otaczają okienko (fig. 483, c); albo też zagięcia, błonki czyli skrzydełka, które, równie jak w skrzydlakach, raz ciągną się od jednej do drugiej kończyny, drugi raz wychodzą z obwodu nasienia, bądź po jednej tylko, bądź po obudwu stronach i są pojedyncze lub w liczbie kilku; nasienie nazywa się wtedy *skrzydlatem*,

Błonka wewnętrzna winna swą nazwę tkance, najczęściej cienkiej i giętkiej. Niekiedy jednakże grubieje, tak dalece nawet, że się zdaje być warstwą bielma, do którego tkanka jej naówczas mięsista, stanowi przejście mniej więcej nie znaczne. Nie zawsze zaś nabrzmiwa jednostajnie, lecz może grubieć miejscami tylko, zachowując na innych miejscach przyrodzenie swoje błoniaste. Najczęściej bywa białawą lub wółprzezroczystą.

Co do skórki, ta może posiadać tenże sam pozór i barwę; zwykłej jednakże odznacza się barwą ciemniejszą, tudzież tkanką bardziej zbitą i większą daleko grubością. Co do utkania, bywa niekiedy mięka, mięsista, niekiedy korowata, często prawie tak twarda jak drzewo, a wtedy, jeśli cienka, staje się kruchą. Lecz często także tworzy warstwę dość grubą, zdolną ochraniać i zachowywać zawarte w niej jądro; zazwyczaj składa się wtedy z małych włókienek, skierowanych poprzecznie od zewnątrz ku wewnątrz, przyciśniętych do siebie i ułożonych częstokroć we dwie warstwy: wewnętrzną, składającą się z komórek zcieńczonych, włóknistych, i zewnętrzną stanowiącą rodzaj naskórka, o komórkach szerokich z wydrążeniami obszerniejszemi, które niekiedy wydzielają istoty właściwe. Powierzchnia tego naskórka jest równa lub nierówna, pokryta różnemi wydatnościami, tępemi lub ostremi, kształtnemi lub niekształtnemi, albo też posiadająca dołki w kształ-



488.

cie dołków, rowków, marszczek, a nawet zagródek tworzących rodzaj siatki. Bywa gładką lub pokrytą rozmaitemi włosami, podobnemi do tych jakieśmy widzieli na innych częściach; lecz są pomiędzy niemi takie, które posiadają szczególną i godną uwagi postać: są to pęcherzyki mniej więcej wydłużone, zdwojone od wewnątrz nitką węzowni-

cowatą (np. w żabiścieku, pięknotce, fig. 488).  
 § 585. Powiedziałismy że szewek znajduje się w powłoczce zewnętrznej zalążka. Ponieważ zaś powłoczka ta, bądź sama, bądź zrosnięta z innymi wewnętrznymi, stanowi skórkę

488. Komórki warstwy zewnętrznej nasienia z *Collomia grandiflora*, mocno powiększone i uważane w wodzie.

nasienia, przeto też napotykamy szewek zazwyczaj w skórce i to albo odpowiadający rynience wyżłobionej na powierzchni ziarna, albo też leżący w kanale jaki się znajduje w miąższości skórki. Wiązka naczynna szewku rozpościera się przy osadce, zwracając się ku wewnątrz, a przechodząc ze skórki w błonkę wewnętrzną, posyła niekiedy gałązeczki, które się rozpraszają na tę ostatnią (fig. 485, n). W całej przestrzeni, która odpowiada owemu rozpostarciu, obie okrywy grubieją, a tkanka ich odmienia się w sposób mniej lub bardziej uderzający.

§ 586. **Rozsiewanie.**—Dojrzałość nasion przypada zwykle zawraz z dojrzałością owocu. Wtedy zaczyna się rozsiewanie (*disseminatio*), to jest działanie w skutek którego nasiona, odłączywszy się od rośliny na której powstały, rozpraszają się dalej lub bliżej, aby zacząć żyć same przez się. Częstokroć owoc odpada wraz z niemi w skutek odczłonkowania się szypułki; opadają więc razem, obejmując jeszcze jedno drugie. Co do sznureczka, ten odczłonkowuje się przy samym znaczku, a przeto nasiona zostają wolne w komorze. Jeśli nasiennik jest pękający, nasiona wychodzą z niego przy poruszeniach, jakie odebrać może owoc zeschnięty, częstokroć przez samo ciśnienie łupin, które oddzielając się od siebie, kurczą się, ponieważ są sprężystemi; jeśli zaś owoc jest niepękający, wyjście nasion z nasiennika odbywa się powoli, albowiem tenże pozbawionym już będąc życia, rozkłada się powoli i oddziela w kawałkach.

Liczne przyczyny dopomagają rozsiewaniu: ciężkość, która powiększa się stosunkowo, w miarę jak siła spójności się zmniejsza; wstrząśnienie zrządzone przez deszcz lub wiatr. Prócz tego zwierzęta przenoszą, a niekiedy nawet zakopują nasiona, bądź niechcący, bądź umyślnie w celu żywienia się niemi; a chociaż nawet owoc spożyty od nich zostanie, często się zdarza iż jądro chronione przez pestkę lub skórkę drzewiastą i grubą, opiera się trawieniu i w całości zwracane zostaje ziemi z odchodami. Niektóre nasiona wystawione są szczególnie na wpływ tych zewnętrznych działaczy, jak np. wszystkie opatrzone puchem, który im służy za rodzaj spadochronu, utrzymując je w powietrzu, i dozwalając wiatrom unosić je daleko.

§ 587. Są nasiona, które puszczają, nie oddzieliwszy się nawet jeszcze od rośliny. W drzewach dosyć wyniosłych (np. w srożyplącie [*Rhizophora mangle*]), kiełek przebijając skór-

kę i nasiennik, przedłuża się tak dalece, że dosięga ziemi. W roślinach leżących na ziemi, nasienie zagrzebuje się samo, nie opuszczając kończyny swjej gałązki, która nawet często dopomaga temu, zakrzywiając się ku ziemi (np. w *Trifolium subterraneum*).

§ 588. Wiele ziarn nie puszcza wcale, lecz zsyca się w powietrzu, gnije w wodzie, lub bywa spożyte od zwierząt; jednakże zawsze pewna ich liczba, tym lub owym sposobem przechowuje się na powierzchni ziemi, albo też zagrzebuje do pewnej głębokości. Przyroda zabezpieczyła trwanie gatunków roślinnych, przez mnogość nasion powstających na tychże, mnogość, która przechodzi wszelki stosunek, w porównaniu z liczbą osobników mających istotnie żyć. Tak naprzykład przytaczanym bywa mak, którego każdy owoc zawiera tyle nasion, iż w przeciągu niewielu lat, możnaby obsiać makiem całą powierzchnią kuli ziemskiej, gdyby przez kilka po sobie następujących pokoleń wszystkie ziarna się rozwijały.

§ 589. **Wschodzenie.** — Pewien stopień ciepła i wilgoci, koniecznym jest do dalszego życia zarodka w nasieniu oddzieloném, czyto wraz z nasiennikiem, czy bez tegoż. Widzieliśmy także (§ 286), że potrzeba do tego pewnej ilości kwasorodu, a przeto wolnego przystępu powietrza. W wielu nasionach, kiedy takowe pozbawione są tych warunków, życie zostaje zawieszoném nie wygasając jednakże; nasiona te można przechowywać długie lata, zabezpieczywszy je tylko od powietrza i wody. Ztądto zwyczaj zakopywania nasion głęboko, w wydrążeniach stosownie przyrządzonych, czyli w tak nazwanych dołach. Często można widzieć w przyrodzie ziarna przypadkowo zachowane. Rola odświeżona, brzegi rowów mniej więcej głębokich, kopanych w ziemi długi czas nietkniętęj, okrywają się prawie zawsze roślinami różnemi od tych, które poprzednio istniały; nie rzadko też można ujrzeć rośliny, które oddawna znikły w kraju, lecz o których wiadomo, że dawniej tamże rosły. Ukazanie się ich dowodzi, że nasiona zagrzebane w odległym owym czasie, zachowały się przy życiu: długo usunięte z pod wpływu powietrza, zaczynają puszczać, skoro takowe znów do nich otrzyma przystęp.

§ 590. Wystawmy sobie ziarno we wszystkich okolicznościach sprzyjających jego rozwinięciu, i obaczmy zmiany jakim ulega. Zmiany te albo następują po sobie z niewypowiedzianą

szybkością, albo bardzo powoli. Rzeżucha ogrodowa wschodzi w przeciągu jednego dnia, są zaś nasiona, które na to potrzebują lat. Prawda, że nasiona takie są zwykle otoczone powłokami, które je zabezpieczają od wpływu działaczy zewnętrznych i same długo mu się opierają, tak, iż właściwie mówiąc wschodzenie zaczyna się po długim dopiero czasie.

§ 591. Można odróżnić dwa okresy wschodzenia. Pierwszy, w którym zarodek rośnie wewnątrz oddzielnego ziarna; drugi, w którym wyszedłszy z okryw, lecz nie odłączony jeszcze od nich, rozwija się na zewnątrz ziarna. Posuwając dalej porównanie o którym jużśmy namienili (§ 560), porównanie zająłką z jajem ptaków, łatwo pojmujemy, że pierwszy okres odpowiada zmianom zachodzącym w jaju w czasie wysiadywania, drugi zaś wykluciu.


§ 592. Obaczmy nasamprzód co się dzieje w pierwszym okresie. Mogą tu zajść dwa przypadki, podług tego jak zarodek albo ma przy sobie bielmo, albo go jest pozbawionym.

Jeśli bielmo istnieje, rozmięka przy wspólnem działaniu ciepła i wilgoci, przyrodzenie jego chemiczne, zmienia się kosztem związków, które się tworzą przy przystępie kwasorodu powietrza i wody (§ 286, 286). Zarodek zostając z bielmem w zetknięciu, bądź cały, bądź w części swego obwodu, wsysa istoty owe, mogące wchodzić w niego, ponieważ są płynnymi i żywić go w skutek odmian jakim uległy. Żywiony tym sposobem, rośnie w tym samym stosunku w jakim się bielmo zmniejsza, i w końcu wypełnia całe wnętrze ziarna, w którym zrazu zajmował tylko przestrzeń, mniej więcej ograniczoną. Naówczas bielmo znika już zupełnie, a zarodek nie może więcej rosnąć nie przebiwszy powłok, które zresztą będąc rozmiękłe, stawiają coraz to mniejszy opór.

§ 593. Jeśli niema bielma, a zarodek już w chwili rozsiania wypełnia całe wnętrze nasienia, jasną jest rzeczą iż czas wschodzenia będzie znacznie skróconym, ponieważ wtedy części zarodka posiadają już daleko wyższy stopień rozwinięcia, niż w przypadku poprzedzającym. W ogóle największą część istoty zarodka stanowią wtedy liścienie, a baczyć potrzeba, iż one w takich razach podobne są, pod względem swego przyrodzenia do bielma: sąto ciała komórkowe, których komórki są mięsiste, tojest zawierają skrobią (fasola, groch, i t. d.), a częstokroć i kropelki oleju (orzech włoski, rzepak, i t. d.).

Ciała te grają względem zarodka rolę bielma, ulegają zmianom, które jakieśmy powyżej widzieli zachodzą w ténże, i dostarczają żywności kiełkowi i pączkowi, narzędziom, na które zwraca się cała siła rozwijania.

§ 594. Wzmógłszy się bądź kosztem bielma, bądź kosztem swych własnych liścieni, zarodek rosnąc dalej ciśnie swoje powłoki, które się rozrywają i otwierają mu przejście. Prawie zawsze kiełek pierwszy wychodzi na zewnątrz (fig. 489, 1), jak się tego łatwo można było spodziewać, gdyż zawsze kończyna jego najbliższą była powłok i prawie nagą pod niemi



489.

odpowiadając przerwie przyrodzonej, to jest okienku. Kiełek zatem zaczyna wystawać na zewnątrz. Lecz to cośmy nazwali kiełkiem, składa się prawie w całości z łodyżki, zakończony u wierzchu pączuszką, który z kolei ukazuje się także na zewnątrz,—jego oś, dotychczas ściągnięta i jakby żadna, przedłuża się; jego małe łatki boczne, wążek liści, rozwijają się, i cały ten układ zwraca się pionowo z dołu do góry ku niebu. Ale podczas wschodzenia, część prawdziwie korzoneczkowa, ograniczająca się dotychczas na samej kończynie kiełka, zaczyna się także przedłużać (fig. 489, 2), i to w kierunku przeciwnym, z góry na dół, ku środkowi ziemi. Liścień pojedynczy lub podwójny, sam tylko jeszcze trzyma się ziarna, następnie zaś, albo nie uwalnia się wcale od niego i więdnie z nim razem, albo też pozbywa go się z kolei i zostawszy wolnym, rozpościęra się (fig. 489, 3) w liść, przy tym punkcie młodej łodygi, który oddziela część należącą pierwiastkowo do kiełka od pączuszka. Podówczas wszystkie te części zaczynają zielenieć pod wpływem powietrza i światła.

489. Wschodzenie nasienia dwuliściennego bezbielmowego z *Acacia julibrissin*.—e Okrywa nasiennea.—r Kiełek zarodka.—t Łodyżka.—c Liścień. — g Pączuszek. — 1. Pierwszy okres, w którym kiełek ukazuje się na zewnątrz wskrós przebitę okrywy.—2. Drugi okres, w którym części rozwijające się i już wcale wyraźne, pozbyły się okrywy obejmującej tylko jeszcze wierzchołek liścieni.—3. Trzeci okres, w którym zarodek pozbył się w całości okrywy, a liścień wzniezione i oddalone od siebie, dozwolają widzieć pączuszek.

§ 595. Uważać jednakże należy, że wiele zarodków już w nasieniu posiada zieloną barwę, połączoną z innem odcieniem niekiedy bladém lub żółtawém, lecz niekiedy nawet bardzo ciemną. Tak naprzykład przywiedziemy z nasion opatrzonych bielmem, zarodki trzmieliny, szakłaku, i t. d., z pomiędzy nasion bezbielmowych, zarodki pistacyi, klonu i wielu krzyżowych. Najczęściej jednakże zarodek zawarty w nasieniu jest białawy, równie jak bielmo: w jemiolu tylko i bielmo jest zielonawe. Tożsamość barwy zarodka i bielma, mieszając na pierwsze wejrzzenie dwa te ciała w jedno ciało, utrudnia postrzeganie. Ułatwić sobie można odróżnienie ich, zanurzając przecięte ziarno we wrzącą wodę, która niejednakowo działając na dwie odmienne tkanki, sprawia, iż białość jednego odbija od mocniejszej białości drugiego.

§ 596. Dodajmy tu niektóre szczegóły względem różnic, o jakich nie mówiliśmy jeszcze, a jakie zachodzą pomiędzy wschodzeniem nasion jednoliściennych a dwuliściennych.



490.

490. Wschodzenie nasienia jednoliściennego kwiatotrzyciny (*Canna indica*). Ziarno zostało przecięte, dla pokazania stosunków bielma stopniowo zmniejszającego się, względem wzrastającego zarodka. — *e* Okrywa nasienna. — *o* Część wyższa takowej oddzielająca się nakształt nakrywki, dla przepuszczenia kielka. — *p* Bielmo — *c* Liścień. — *r* Kieldek. — *r'* Korzoneczki boczne. — *co* Pochewka kielkowa. — *f* Szpara odpowiadająca pączuszkowi, tworząca później otwór w pochwie wydłużonej *v*. — *pc* Część zwięzła liścienia (odpowiadająca ogonkowi), pośrednicząca pomiędzy częścią jego rozszerzoną *c* (odpowiadającą blaszce), i częścią pochwowatą *v*. — *t* Łodyżka. — *g* Pączuszek. — 1. Pierwszy okres, w którym kieldek zaczyna pokazywać się zewnątrz wkróś powłok. — 2. Drugi okres, w którym szpara *s* ukazuje się także na zewnątrz. — Kieldek *r* przebił naskórek, który go otacza (pochewka kielkowa), który pozostał przy jego nasadzie w postaci małego podartego kołnierzyka. Widać także jeden z korzoneczków bocznych *r'* okryty także pochewką. — 3. Trzeci okres, w którym wszystkie te części już się bardzo wykształciły, a pączuszek *g* wystaje ponad szparą, której obwód przedłużył się w pochwie *v*.

Pierwsze są po większej części opatrzone bielmem, zazwyczaj dość dużym; w każdym z tych przypadków liścień nie odłącza się od ziarna: niekiedy tylko wydaje on na zewnątrz mniej więcej długie, i mniej więcej cienkie przedłużenie (np. dobownik, czosnek, kwiatotrzcin [fig. 490, 3]), za pomocą którego przytwierdzony jest do osi: przedłużenie to uistoczone podczas wschodzenia, porównać można do ogonka, część zaś c uwieczniona w środku, jest blaszką liścienia, poprzednio już wyształconą. Niekiedy liścień bywa bezogonkowym, a wtedy oś roślinki jest bezpośrednio styczną względem ziarna. We wszystkich tych przypadkach pochwa otaczająca pączuszek, a którą zapowiadała w zarodku mała boczna szpara (fig. 490, 2, f) poszła na zewnątrz wraz z pączuszką, i idzie z nim ciągle w górę, przedłużając się jednocześnie. Szpara jej staje się coraz wyraźniejszą, a wargi téjże oddalając się od siebie, przepuszczają najpierwsze liście (fig. 490, 3, g), a potem oś, która je nosi. Liścień przeto pokazuje nam w rozwijaniu się też same powawy co liść; nasamprzód tworzy się blaszka, potem pochwa, potem niekiedy ogonek oddalający jedną od drugiej. Cała różnica zależy na tém, że w liścieniu blaszka zatrzymuje się w rozwijaniu, ponieważ przeszkadza jej w tém ziarno, obejmując ją ciągle, i nadając jej przez to kierunek różny od kierunku pochwy podnoszącej się i rosnącej przez czas niejaki.

W niewielu nasionach jednoliściennych pozbawionych bielma (zabieńcowate, rdestnicowate, i t. d.), rzeczy mają się nieco inaczej; liścień uwalnia się zwykle z swych powłok, i wznosi pionowo wraz z pączuszką (fig. 79). Mówiliśmy już (§ 111) o szczególnym sposobie powstawania korzeni w roślinach okrytokielkowych, niema więc potrzeby rozwozić się tu nad tym przedmiotem.

§ 597. Co się tyczy zarodków dwuliściennych, liścienie ich pozostają także niekiedy zamknięte w ziarnie, lub nawet mniej więcej zrosnięte z sobą, a wtedy wyjście pączuszką musi się odbywać nieco podobnie jak w zarodkach jednoliściennych. Podobieństwo to jednakże jest tylko pozornym, ponieważ tu pączuszek wychodzi z odstępu liścieni przy ich nasadzie, a nie z wnętrza pochwy. Najczęściej oba liścienie oddalają się od siebie, a pączuszek przedłuża się wolny w swoim kierunku, nagi zaś rostek (§ 111) w kierunku przeciwnym.

§ 598. Czasami liścienie zostają ukryte pod ziemią (*Ara-chis*) i zowią się *podziemnymi* (*c. hypogaeae*; ὑπό pod; γῆ ziemia). Zazwyczaj jednakże wznoszą się ponad jej powierzchnię wyżej lub niżej podług tego jak łądyżka mniej lub bardziej się przedłuża: nazywamy je wtedy *nadziemnymi* (*epigeae*; ἐπί, na).

§ 599. Liścienie wyczerpując się same stopniowo, dostarczają młodej roślinie żywności, którą ta zaczyna potem brać prosto z ziemi. Następnie więdną i opadają, wschodzenie kończy się a roślina żyjąc odtąd sama przez się, rozpoczyna szereg owych działań, któreśmy usiłovali objaśnić, ile możności najdokładniej. Tak więc przebiegliśmy cały okrąg rośnienia, i stanęliśmy znowu przy punkcie z któregośmy wyszli.

§ 600. **Zarodniki roślin bezliściennych.** Dotąd jednakże mówiliśmy o zawiązku, który przechodzi w owoc, o załączku, który się staje nasieniem w samych tylko roślinach jawнопłciowych, których upłodnienie dzieje się widocznie w skutek działania łagiewki, czyli części najistotniejszej pręcika, na jądro załączka, czyli część najistotniejszą słupek; obadwa zaś te narzędzia poznaliśmy jako posiadające zupełnie odmienne przyrodzenie. Ponieważ wynikiem upłodnienia jest wydanie zarodka opatrzonego z wyjątkiem kilku przypadków nadzwyczaj rzadkich) jednym lub kilku liśćkami szczególnej budowy, czyli liścieniami, przeto rośliny te nazywamy także liścieniami.

Wiemy zaś, że są inne rośliny nie posiadające tych dwóch rodzajów narzędzi, których wzajemne działanie spowoduje nistoczenie się ciałek odrodczych, ukazujących się w tym drugim dziale roślin jako ciała jednorodne, bez różnicy części, a przeto bez liścieni. Ztąd nazwiska roślin *skrytopłciowych* lub *bezliściennych*, jakimi je zarówno oznaczamy. Upatrywaliśmy już w nich narzędzi odpowiadających pręcikom (§ 476) i widzieliśmy, że ciała, które uważano za takowe i nazwano *antheridia*, różnią się zupełnie i istotnie od prawdziwych pylników, ponieważ nie zawierają pyłku, ani nawet upłodnika. Obaczmy teraz z drugiej strony, czyli znajduje się w skrytopłciowych ciało, któreby można uważać za podobnik zawiązka, albo przynajmniej załączka.

§ 601. Wielu badaczy sądziło, że odkryli takowe. Ponieważ ze wszystkich tych roślin podobieństwo rzeczonych narzędzi najmniej zdaje się ulegać zaprzeczeniu w mchach i w

trznicech, przeto też od nich tu zaczniemy. W wątrobnicach w miąższości samej tkanki, której rozszerzenie stanowi roślinę (*Riccia*; fig. 493); lub na jej powierzchni, albo też na innych rozszerzeniach, różnych co do postaci i położenia (*Marchantia*) w mchach zaś na kończynach gałązek, lub w kątach liści, widzieć się dają małe wydrążone ciała, których kształt (fig. 491) najprędzej da się porównać z kształtem butelki. Ściany tych ciał utworzone są z warstwy komórkowej, a wewnątrz wypełnione jest ziarenkami, które zwiemy zarodnikami (*spora*e od *σπόρα*, nasienie), i z których każde rozwija się w roślinkę podobną do tej, na której samo pozostało. Zarodniki więc są podobnikami nasion, zatem też prostą było rzeczą porównać ciało, które je zamyka, a które nazwano *purchatką* (*Sporangium*; od *ἀγγεῖον*, naczynie) do zawiązka, przedłużenie zaś wznoszącą się ponad tęp ciałem do szyjki.



491.

Ta zachowuje się w istocie jak szyjka prawdziwa, wędnieje bowiem w miarę jak zarodniki zbliżają się do dojrzałości, a znika prawie zupełnie, skoro mały ten owoc dojdzie do niej zupełnie.

§ 602. Roztrzaskając jednakże ściśle powyższe porównanie, spostrzegamy obok podobieństw, ważne także różnice. Zarodniki leżą wolne w wydrążeniu je zamykającym i o żadnej porze nie są przytwierdzone do ścian jego. Przy wschodzeniu rozwijają się bezpośrednio, przedłużając się na jednym z punktów obwodu (fig. 492), nie otwierają się wcale dla wypuszczenia nowego ciała, utworzonego w ich wnętrzu. Możliwe jest zatem porównać z zarodkami nagimi, ale nigdy z nasionami. Zresztą nic w budowie nie znajdujemy, co by przypominało złożoną budowę zalążków, ten poczet woreczków zamkniętych jeden w drugim (fig. 492), w najwewnętrz-



492.

491. Purchatka porostnicy (*Marchantia polymorpha*).—Nabrzmiłość dolna wydrążona, zawierająca zarodniki, a którą porównywano z zawiązkiem.— *t* Część wyższa zwięzła, którą porównywano do szyjki.— *s* Wypłaszczenie wierzchołkowe porównywane ze znamieniem.— *c* Rurka komórkowa otaczająca purchatkę nakształt kielicha.

492. Zarodniki porostnicy wschodzące; jeden bardziej rozwinięty od drugiego.

trznice  
to ow  
podw  
żne  
i wsz  
ny zw  
ciało  
w sa  
rozw  
mórk  
ziare  
w ko  
każd  
dno  
w ty  
rej te  
wesse  
komó  
zarod  
niu w  
rzone  
mieni  
Te  
zamy  
nych  
kieś  
wych  
wstaj  
siadaj  
§ 455  
go teg  
się py  
§ 6  
(np.  
493  
pograż  
ctwem  
purchar  
macier  
z kome  
doczne

trzniejszym z których, ukazuje się nakoniec zarodek. Są to owszem proste komórki, które pod błoną pojedynczą lub podwójną, zawierają istotę płynną, gęstości oleju. Śledząc różne zmiany jakim podlegają, zanim przyjdą do tego stanu, i wszystkie pojawy ich wykształcania się, widzimy, że mniemany związek nie był w początkach wydrążonym, lecz zawierał ciało komórkowe jednociągłe; że później komórki leżące w samym środku u wątrobnic, zaś około środka u mchów, rozwijają się daleko bardziej niż zewnętrzne, że też same komórki wypełniają się istotą wólpłynną i ziarenkowatą; że ziarenka z początku rozrzucone, potem skupione, dzielą się w końcu na cztery małe osobne ciała (fig. 493); że nakoniec każde z tych ciałek zamienia się w jedno z ziarn o których mówiliśmy, i że w tym samym czasie komórka, w której te ziarna powstały, zostaje powoli wessaną i znika, równie jak wszystkie komórki podobne, tak, że wszystkie zarodki znajdują się wolne w wydrążeniu wspólném, którego ściany utworzone są z komórek zewnętrznych i odmiennych.

Ten zatem woreczek komórkowy, zamykający mnóstwo komórek wolnych, nie przedstawia nam piętn, jakiegoś opisali w zawiązku jawнопłciowych; równie jak komórki owe powstające po 4 w innych, macierzystych komórkach, nie posiadają znamion załączka. Lecz przywiódłszy sobie na pamięć § 453, uderzy nas tu inne podobieństwo: podobieństwo całego tego tworzenia się zarodników i purchatki, z rozwijaniem się pyłku i pylnika.

§ 603. W korzenioziarnych, innéj rodzinie skrytopłciowych (np. w rodzaju *Pilularia*, *Marsileae*) znajdujemy owoce na-



493.

493. 1. Przecięcie prostopadle listówia *f* z *Riccia glauca* i purchatki *o*, pograżonej w jego miąższości — *s* Część zwężona czyli szyjka, za pośrednictwem której purchatka spółniczy z zewnątrz. — *l* Wnętrze czyli komora purchatki. — *s* Młode zarodniki połączone jeszcze po cztery w komórkach macierzystych. — *t* Komórki wydłużone na podobieństwo korzeni. — 2 Jedna z komórek macierzystych, zawierająca cztery zarodniki; z tych trzy są widoczne, czwarty ukryty za niemi.

pozór prawdziwe, noszące do ścian swoich przytwierdzone ciała; lecz ciała te sąto woreczki komórkowe, napelnione zarodnikami, których tworzenie się przedstawia w pojawach swych wszystkie zmiany jakieśmy dopiero opisali. W paprociach pod liśćcami, w widłakowatych przy nasadzie liści, znajdujemy małe woreczki: w pierwszych rozmaicie skupione, w drugich pojedyncze, lecz w obu dwu wypełnione zarodnikami wolnymi, które w taki sam sposób powstały. Woreczki te, daleko jeszcze mniej mają podobieństwa, co do postaci z zawiązkiem, i pozbawione są zupełnie owego przedłużenia, które w mchach i wątrobnicach porównano do szyki. Przeciwnie, w niektórych paprociach i widłakach daleko są podobniejsze do pylników.

§ 604. Zstępując do roślin, w których niema już różnicy liści i łodyg, widzimy, iż przyrząd ten jest jeszcze prostszym. Znajdujemy tam wszędzie zarodniki wolne w wydrążeniu; które jednakże zdaje się być wydrążeniem samej komórki macierzystej, nie znikającej w skutek wessania, lecz owszem zachowującej się, i której ściany, nazwane naówczas *puszką* (*theca*) [fig. 494] stanowią ściany woreczka zawierającego zarodniki. Istota wóplpłynna i ziarenkowata, wypełnia z początku owo wydrążenie, i dzieli się następnie na pewną ilość zarodników, które jednakże zamiast leżeć obok siebie, leżą na



494.

495.

sobie i bywają niekiedy zrośnięte z sobą końcami po dwa (fig. 495), po cztery, lub po więcej jeszcze, zawsze jednakże w ilości wielokrotnej z dwóch, tak, iż każda puszka zawiera jeden lub więcej odosobnionych zarodników, albo téż wiele szeregów zarodników, leżących niekiedy w innej jeszcze okrywie, czyli w puszcze wspólnej. Puszki te bywają nagromadzone kupkami, bądź na powierzchni rozszerzenia, które stanowi roślinę, bądź w jego miąższości: taki rozkład widzimy w liszajcach i niektórych grzybach. Lecz pomiędzy temi ostatniemi znajduje się

494. Puszka jednego z porostów (*Solorina saecata*), zawierająca ośm zarodników połączonych z sobą po dwa.

495. Dwie pary zarodników mocniej powiększonych.

wiele innych, których zarodniki zostają wolnemi w jednem lub wielu wydrążeniach wewnętrznych, a to w skutek wessania komórek, w których się utworzyły, bądź to w połączeniu po cztery, bądź przeciwnie po jednemu w każdej komórce.

§ 605. W wodorostach (*Algae*) zarodniki znajdują się podobnie pojedynczo lub po cztery. Komórki macierzyste, które je ciągle w sobie zawierają, są rozrzucone w miąższości tkanki, albo skupione w pewnych miejscach wyraźnych lub wystających, bądź na samej powierzchni, bądź w wydrążeniach, których otwory znajdują się na téjże powierzchni. Lecz im prostszą jest budowa tych roślin, tém komórki wydające zarodki mniej się różnią od komórek stanowiących resztę tkanki, do tego stopnia, że nakoniec znajdujemy rośliny, których każda komórka zawiera ziarenka mogące je odrodzić, i że przeto narzędzia odrodzce zléwają się z narzędziami rośnienia.

§ 606. Godném zastanowienia jest zjawisko jakie się widzieć daje na zarodnikach tych najprostszycy roślin, to jest ruch jakim one są obdarzone, o pewnym czasie swego istnienia, a mianowicie zaraz po wyjściu ich z komórki macierzystej. Poruszenia owe porównać się dadzą do tych, jakie wykonywają żyjątko zwane wymoczkami, a niedawno właśnie odkryto, iż odbywają się za pomocą podobnych narzędzi. Temi zaś są rzęsy drgające, czyli małe niteczki wychodzące z jednej części ciała i poruszające się w wodzie nakształt płetw. Wyobraziliśmy już dwie takie rzęsy znajdujące się na kończyńce niteczki stanowiącej żyjątko w wydętcie ramienicy (fig. 353). Thuret, któremu winni jesteśmy to spostrzeżenie, odkrył podobne rzęsy w zarodnikach niektórych wodorostów wód słodkich, jakoto: dwie, leżące na jednej z kończyń zarodnika glonów (fig. 496); cztery w *Chaetophora* (497); cały okrąg takowych w zarodnikach oddziału *Proliferae* (fig. 498), a nakoniec mnóstwo rozrzuconych po całej powierzchni zarodników zrośnic *Vaucheria* (fig. 499). Ta własność poruszania się jest czasową, i co jest również ciekawém spostrzeżeniem, daje się widzieć tylko w pierwszych godzinach dnia. Później zaś ruchy ustają, zarodnik przecho-

496. 497.



498. 499.

dzi z życia zwierzęcego do roślinnego i wtedy właśnie może zacząć wschodzić.

607. Wszystkie szczegóły w jakieśmy tu weszli, pokazują coraz bardziej do jakiego stopnia narzędzia odrodcze skrytopłciowych i jawнопłciowych różnią się od siebie, tudzież, iż nie można pierwszym przyznać zawiązka, chyba, że nazwiemy nim każde wydrążenie zawierające ciało zdolne rozwinąć się w roślinę taką samą jak ta, na której powstały: podobne zaś określenie byłoby tak ogólnem, iż musielibyśmy obejmować niemi wiele części najrozmaitszych i niestojących w żadnym związku pomiędzy sobą.

§ 608. **Teorya Schleiden'a.** — Historia tworzenia się, którąśmy dopiero skreślili, i w której widzimy oczywiste podobieństwo z tworzeniem się pyłku w pylnikach roślin jawнопłciowych, musiała poprzedzić wyłożenie teoryi, która od niej pożycza części swych dowodów, a która niedawno zjawiała się w Niemczech, podana z jednej strony przez Schleiden'a, z drugiej przez Endlicher'a. Powszechnie znana jest pod nazwiskiem pierwszego, gdyż ogłosił ją pierwój, rozwinął daleko bardziej i poparł postrzeżeniami i licznymi rysunkami. Jednakże wątek jej dawno zapomniany znajduje się w jednym z pismarzy francuzkich. A. J. Geoffroy, w samym początku XVIII wieku, w rozprawie o budowie i użytku głównych części kwiatowych, zawierającej bardzo dokładne wiadomości o pyłku i nasieniu wraz ze wzmianką o okienku i jego przeznaczeniu, wnosił: „że pyłki kwiatowe są pierwszymi zarodkami roślin, i do rozwinięcia się potrzebują soków, które napotykalają wchodząc w nasiona, tak jak zwierzęta potrzebują jaja, aby przyjść na świat.” Okazywał on biorąc za przykład strąkowe, że przed wysypaniem się pyłku, nie znajduje się w nasionach nic, oprócz okryw ich czyli kory, zaś po wysypaniu pyłku, można spostrzedz wewnątrz nasion mały punkcik czyli kulkę, która roślinie zwolna pochłaniając płyn, jakim wydrążenie ich jest napełnione. Uważał on okienko za otwór, którym wchodzić musi małe owo nowe, ciało, to jest zarodek, i opisywał już stały kierunek kiełka względem tego otworu, przez który później przy wschodzeniu wychodzi. Przypuszczał zaś, że całe ziarno pyłku wchodzi w nasienie, aby się tamże rozwinąć w zarodek.

Wiemy, iż ostatecznie to przypuszczenie jest fałszywe; że ziarno pyłku pozostaje przytwierdzonem do znamienia, i że to rurka powstała z przydłużenia się jednej z jego błon (łagiewka) weiska się przez szyjkę, aż do jądra zalążka, i przynosi z sobą upłodnik, czyli istotę zawartą wewnątrz ziarna pyłku.

§ 609. Schleiden śledzi łagiewkę dalej jeszcze; twierdzi on, że jej koniec dostaje się do wydrążenia zarodkowego, cisnąc przed sobą błonę stanowiącą wierzchołek woreczka zarodkowego, i że ta część błony zawrócona tym sposobem w małą kieszonkę, stanowi pęcherzyk zarodkowy; że istota zawarta w kończyźnie łagiewki, wydaje zarodek; że reszta wciśniętej łagiewki stanowi wieszadółko. Podług tego zalążek dostarczałby tylko środka, w którym zarodek się rozwija, tudzież żywności do tego potrzebnej i zastosowanej do jego przyrodzenia, a której on gdzieindziej nie znajduje. Schleiden tłumaczy łatwo tym sposobem dość częstą obecność kilku zarodków w jednym nasieniu (jak to widzieć naprzykład można prawie stale w nasionach pomarańczy), ponieważ w takich razach kilka łagiewek na raz wchodzi w jeden zalążek. Rośliny skrytopłciowe różniłyby się tém tylko od jawnopłciowych, że zarodniki ich, będące rzeczywście ziarnami pyłku, mogą dojść zupełnego wykształcenia w tém samym miejscu gdzie powstały i nie potrzebują ulegać odmianom przez pobyt przygotowawczy w zalążku, aby nabyć zdolności wschodzenia.

Postrzeganie tych faktów jest trudnem, ponieważ dzieją się w częściach nieskończenie małych, a brak przejrzystości jaki zwykle istnieje około okienka i wierzchołka jądra, z trudnością tylko dozwala przekonać się, czyli małe ciało, które wisi u góry wydrążenia zarodkowego, w istocie jest dalszym ciągiem łagiewki, wchodzącej w otwór powłoczek zalążka. Schleiden jednakże przytacza niektóre zalążki, np. storczykowatych, jako nie przedstawiające téj niedogodności, i dające się wygodnie użyć do postrzeżeń tego rodzaju.

§ 610. Z drugiej strony, Mirbel i Brongniart twierdzą, że się wielokrotnie przekonali o istnieniu pęcherzyka zarodkowego wraz z wątkiem samego zarodka tamże zawartego, przed przybyciem łagiewki. Kończyna więc téjże nie tworzy go, lecz znajduje już gotowym, i służy tylko do nadania mu popędu żywotnego, w skutek którego będzie się mógł rozwinać.

Zarzut byłby silniejszym jeszcze, gdyby można znaleźć nasiona, któreby się wykształcały bez przyczynienia się pylników. Nieraz mniemano, iż się takowe znalazły, lecz prawie zawsze przytém odkryto w końcu, obok upłodnionego załączka pylniki, wprawdzie w zarodzie tylko, i ograniczające się na kilku ziarnach pyłku, lecz i tych obecność była wystarczająca, aby zjawisko podprowadzić pod warunki zwyczajne. *Caelebogyne*, rodzaj ostromlęczowatych, niezbyt dawno opisany, lecz od wielu lat hodowany w szklarniach angielskich, owocował tamże po wiele razy, i nasiona jego były oczywiście doskonałe, ponieważ nie tylko że w nich znajdowano zarodki zupełnie wykształcone, ale nawet po zasianiu ich zarodek rozwijał się w roślinę podobną. Kwiaty rzeczonej rośliny są rozdzielnopłciowe; nikt zaś nie zna i nie posiada szczepów męskich, a śledzenia najbardziej szczegółowe, czynione przez najlepszych postrzegaczy, nie mogły dotąd odkryć najmniejszego śladu pylników ani pyłku. Zarodek więc nie mógł pochodzić z pyłku, ponieważ go niema wcale: musiał więc powstać w samym tylko załączku.

§ 611. Cóżkolwiek bądź, ostatni ten fakt i inne tegoż rodzaju, któreby można przytoczyć, są dotąd niewytłumaczone, ponieważ, przypuszczając nawet że pyłek nie dostarcza wprost zarodka, potrzebnym jest jednakże, pośrednio przynajmniej, do przywołania go do życia w roślinach jawnopłciowych. Konieczności tej dowodzi mnóstwo doświadczeń, z których kilka znanych było już w starożytności: już wtedy wiedziano, że aby palma daktylowa rodziła owoce, potrzeba zbliżyć drzewa wydające same tylko zawiązki, do drzew, na których same tylko pręciki powstają, i umiano w razie niemożności zbliżenia drzew tych do siebie, zastąpić je potrząsaniem pierwszych pyłkiem kwiatów męskich, które brano z drzew oddalonych i przynoszono ku temu celowi. We wszystkich roślinach rozdzielnopłciowych, usunąwszy szczepy noszące pręciki, zawiązki krzaczków żeńskich nie rozwinią się; ten sam wypadek postrzega się w oddzielnopłciowych, jeśli wszystkie kwiaty pręcikonośne przed ich otworzeniem się odejmiemy.

W przyrodzie wiatry, owady i wiele innych działaczy dopomaga przeniesieniu pyłku; lecz w szklarniach naszych, zabezpieczonych od wiatru i owadów, przeniesienie to nie może częstość samo przez się nastąpić, i wtedy ogrodnicy starają

sie do  
su, ja  
(mian  
dzie,  
§  
nego  
ze w  
cych  
się t  
odmi  
nasie  
ra ni  
razem  
szan  
ciki,  
wyw  
czali  
zarod  
gim,  
przez  
które  
kowe

§  
ani p  
z tyc  
stecz  
zwan  
dziele  
kwiat  
cenia  
ca m  
wzgl  
dem  
nemi  
(§ 3  
cenia

sę dopomóżd temu; przenoszą sami pyłek na znamię, i od czasu, jak ostrożność ta bywa zachowaną, wiele roślin owocuje (mianowicie storczykowate), które wprzód kwitnęły wprawdzie, lecz nie wydawały owocu.

§ 612. Niemniej stanowczym dowodem upłodnienia roślinnego jest istnienie mieszańców. W rzeczy samej zauważono: że w ogóle pyłek upłodnić tylko może zawiązki roślin należących do jednego gatunku, lecz że jednak możność ta rozciąga się także do załączków gatunków pobliskich. Jeśli dwa gatunki odmienne zostaną tym sposobem upłodnione jeden przez drugi, nasienie powstałe w skutek tego upłodnienia, daje roślinę, która nie jest ściśle podobna ani do jednego, ani do drugiego zrazem; taka właśnie roślina zowie się mieszańcem. To pomieszanie piętn, z których jedne należały do rośliny noszącej pręciki, drugie do rośliny wydającej załączki, dowodzi, że i druga wywiera tu swoje działanie i zbija naukę tych, którzy zaprzeczali upłodnienia usiłując objaśnić powstanie i rozwijanie się zarodka, za pomocą teoryj, których wykład byłby tu za długim, lecz podług których zresztą nie możnaby zrozumieć ani przeznaczenia owych przyrządów tak złożonych i tak wątych, któreśmy dali poznać, ani następstwa działań, których cel takowe zabezpieczają i zapewniają.

## M I O D N I K I.

§ 613. W wielu kwiatach znajdują się części niepodobne, ani pod względem budowy, ani pod względem postaci, do żadnej z tych, których rozbiorem zajmowaliśmy się dotąd, jakoto: listeczków kielicha, płatków, pręcików, owoców. Części te nazywano *przydatkowemi*. Mówiliśmy już o nich (§ 387), i widzieliśmy, że to są zwykle niektóre z owych istotnych części kwiatu, przeistoczone w skutek wyrodzenia się i przekształcenia, lecz że pomimo tego można jeszcze oznaczyć je za pomocą miejsca jakie w kwiecie zajmują i ze stosunków położenia względem okółków sąsiednich: jeśli leżą naprzemian względem części tychże okółków, będą narzędziami przekształconemi, jeśli zaś leżą naprzeciw, są prostemi rozdwojeniami (§ 377). Nadewszystko też pręciki ulegają takim przekształceniom, i pomnażają liczbę części przydatkowych.

Części te posiadają kształty bardzo rozmaite, jakoto: nitki, paseczków, blaszek zielonych lub barwnych, grubych lub błoniastych, łusk i t. d., dlatego też opisywane bywają często pod temi różnemi imionami, wyrażającemi ich postać. Lecz często bardzo przybierają pozór gruczołów, i odbywają mniej więcej wyraźnie ich czynności, stają się siedliskiem wydzielania, którego utwory miodowate noszą nazwisko cieczy miodnikowej (*nectar*). Ztąd nazwisko *miodnika (nectarium)*, którym je wielu oznacza. A ponieważ podobieństwo ich z częściami przydatkowemi inną nawet budowy, jest niezaprzeczane, przeto podciągano częstokroć z Linneuszem pod nazwę miodników nawet takie części, które nie są bynajmniej narządami wydzielającemi ciecz miodnikową.

Z drugiej znowu strony taki sam rodzaj wydzieleni daje się często znaleźć na różnych miejscach części kwiatowych zkadinań zupełnie prawidłowych, jak np. na prawdziwych płatkach lub pręcikach. Linneusz też nazywa miodnikami siedliska tych wydzieleni, tak, że przyjmując jego słownictwo, widzimy się zmuszonymi oznaczać tem imieniem części, które nie mają żadnego związku z sobą; np. jaką część gruczołowatą płatka, dlatego, iż takowa jest wydzielającą, tudzież ogół kilku niteczek lub łusk, chociaż takowe nie wydzielają.

§ 614. Zdaje się więc, że stosowniej jest trzymać się źródłosłowu i zatrzymać nazwę miodników dla miejsc na których wytwarzanie cieczy owęj się odbywa, jakiegokolwiek byłoby ich położenie i początek. W temto ściślejszem znaczeniu bierze je większa część pisarzy, a nawet i sam Linneusz mówiąc: *Nectarium pars mellifera flori propria*.

Wytwarzanie się owego słodkiego wysięku jest rzeczą nadzwyczaj częstą w kwiatach, z których go pszczoły zbierają dla robienia zeń miodu. W istocie przyptyw cukru zdaje się być potrzebnym do rozwijania się części kwiatowych; i chociaż istota ta tworzy się w wielu innych częściach roślinnych, jednakże zdaje się, iż szczególniej dąży ku kwiatom. Tak np. spostrzeżono niedawno, że soki kukuruzy zawierają wiele cukru, lecz tylko przed kwitnieniem, później przechodzi on prawie zupełnie w kwiaty, znika zaś w reszcie rośliny.

§ 615. Wiemy, iż odmienione owe liście, które stanowią różne części kwiatu, przedstawiają w budowie swęj różnice

dość  
niekt  
które  
powi  
częst  
szcze  
rzędz  
nawc  
a na  
nia b  
ją na  
któr  
o jak  
w w  
włóc  
przyn  
i przy  
tem a  
§ 6  
żą oc  
punkt  
sady  
kielec  
także  
pow  
poni  
gdzi  
przy  
jakie  
znajd  
wrzyn  
niku  
się za  
kształ  
ce i  
ciki  
żą ok

dość znaczne od liści prawdziwych. Różnice te ukazują się nietylko w ich własnej tkance, ale nawet na powierzchni, na której powstają, i która stanowi dno czyli łożo kwiatu (§ 372); powierzchnia ta zamiast być podobną do kory, odziewa się częstokroć pokładem gruczołowatym, mniej więcej grubym, szczególniej miejscami: otoż właśnie przy samej nasadzie narzędzi, zgrubienia takie widzieć się często dają, a chociaż nawet narzędzie samo spłonieje, zgrubienie może pozostać, a nawet tém bardziej się powiększyć; ztądto bez wątplenia bierze się postać gruczołów, jaką tak często przedstawiają narzędzia spłoniałe. Pokład gruczołowaty dna kwiatowego, który powiększa się nietylko za pomocą onych wydatności, o jakich wspomnieliśmy dopiéro, lecz także rozpościerając się w wielu kwiatach na powierzchni pewnych części, które powłócząc od spodu podwaja niejako, stanowi bezwątpienia przyrząd, zdolny odmieniac soki przechodzące z rośliny w kwiat, i przyczynia się do wytwarzania cieczy miodnikowej, zwykle tém obfitszej im przyrząd ów bardziej jest rozwinięty.

§ 616. Jednakże nie wszystkie przyrządy gruczołowe zależą od dna kwiatowego; napotykamy je bowiem na innych punktach części kwiatowych mniej więcej oddalonych od nasady tychże: tak na powierzchni wewnętrznej okwiatu lub kielicha, na płatkach lub u ich wierzchołka, a częstokroć także na kończynach pręcików (jak w wielu rutowatych). Nie powiemy tu więcej o szczegółach kształtu tych miodników, ponieważ one należą do gruczołów, któreśmy gdzieindziej opisali (§ 249). Przystaniemy na przywiedzeniu kilku nauczających przykładów, jakie nam przedstawiają miodniki trzonkowe znajdujące się przy nasadzie pręcików w warzynie (fig. 316, *gg*) lub miodniki dziewięciorniku (*Parnassia*) [fig. 500, *n*], które zdają się zastępować pylniki, siedząc na nitkach tak kształtnie porozczepianych, gruczoły wystające i beztrzonkowe, z których wychodzą pręciki krzyżowych (fig. 325, *t*) lub te, które leżą około słupka i pod nim w większej części wargowych, te



500.

500. Miodnik *n* (*Parnassia palustris*) wraz z płatkami *p* przed którym w kwiecie jest umieszczony.

które wieńczą załazek baldaszkowych; te które tworzą u spodu powierzchni wewnętrznej listeczków okwiatu szachownicy (*Fritillaria imperialis*; fig. 501) szerokie dołki odmiennéj barwy, it. d. it. d.



501.

Często znajdujemy miodniki w wydrążeniach narzędzi przydatkowych, osobliwie w ostrogach, wydrążenia te stają się niejako odbieralnikami, w których się zbiera ciecz wydzielona (*Melianthus*, nastureya, muszkatele).

Nakoniec nierzadko zdarzy się napotkać wysięk słodki, bez obecności nawet powierzchni gruczołowej, wydzielony np. na powierzchni płatków, która zresztą nie zdaje się być szczególnie odmieniona. Przekonać się o tém można dotykając wielu kwiatów w czasie kwi-

tnienia; większa ich część oznajmia dotykaniu obecność płynu bezbarwnego, który uchodzi wzroku.

§ 617. Uważmy, iż wysiękanie to towarzyszy pojawom kwitnienia, że zaczyna się, zmniejsza i kończy wraz z tém ostatniem; że rzadko poprzedza pęknięcie pylników i otwarcie się kwiatu; że maximum jego przypada w czasie wysypiania się pyłku, że ustaje skoro pręciki zwiędną i owoc się zwiąże. Miodniki ukazują się nadewszystko około najistotniejszych narzędzi odrodczych (około pręcików i słupków), i nie ulega wątpliwości, iż biorą udział w czynności odradzania się, a to zapewne niewyłącznie w czynnościach pręcika lub słupka, lecz w obudwu zarazem, ponieważ w niektórych roślinach osobnopłciowych, kwiaty męzkie posiadają miodniki równie jak kwiaty żeńskie. Z drugiej strony działania miodników i narzędzi kwiatowych, jeśli mają jaki wpływ na siebie, to nie zdają się przynajmniej być koniecznie z sobą związane. Można bowiem odjąć płatki, słupki, a jednak miodniki wydzielać będą ciągle, jeśli tylko nie naruszymy ich samych; i znowu można odjąć miodniki, lub przynajmniej ich wyroby, nie przeszkadzając przez to upłodnieniu i nie opóźniając dojrzałości owocu.

501. Listeczek s okwiatu korony cesarskiej (*Fritillaria imperialis*), wyłobiony u nasady w miodnik n w postaci wkłęsłości inaczéj barwnéj od reszty listeczka.

Zważywszy w jakiej ilości ciecz miodnikowa wysącza się na zewnątrz i zbieraną bywa przez owady podczas kwitnienia, zważywszy wreszcie, iż wysiękanie to wstrzymuje się kiedy związany już owoc potrzebuje wiele soków, możnaby uważać miodniki za narzędzia równie wydalające jak wydzielające, które spowoduje przyływ soków przez spotrzebowywanie takowych i oddalają na zewnątrz ich nadmiar szkodliwy dla kwiatu; skoro zaś owoc rozwijając się potrzebuje większej ilości soków, te przybývają drogami, ku temu celowi otwartymi, a nie znajdując już dróg, któremi wychodząc na zewnątrz mogły ginąć, przyczyniają się w całości do dojrzewania owocu. Widzieliśmy jednakże, iż cukier po części przynajmniej, nie przybywa do owocu już uistoczony, lecz powstaje w nim samym i to szczególnie w późniejszym czasie.

§ 618. Jakakolwiek zaś jest czynność miodników, one same dostarczają wybornych pięt do odróżnienia roślin przedstawiając w pojedynczych gatunkach wielką stałość liczby, kształtu i t. d. Uważać jeszcze należy, iż rozwijanie się ich na pewnych punktach kwiatu, połączone częstokroć bywa z niekształtnością tegoż, tudzież, że zdaje się pociągać za sobą silniejsze rozwijanie się tej strony na której miodnik ma swe siedlisko.

NIKTÓRE OGÓLNE ZJAWISKA ROŚLENIA.

§ 619. Dotąd zastanawialiśmy się nad życiem roślin w ogóle, tudzież nad narzędziami za pomocą których takowe się odbywa i przelęwa; z kolei wypada nam poznać sposób, w jaki przychodzimy do odróżnienia i uporządkowania tychże roślin, tak licznych, a to za pośrednictwem odmian właściwych owym narzędziom. Zanim jednak przejdziemy do tego długiego a ważnego rozdziału, dotknijmy jeszcze kilku przedmiotów, któreśmy umyślnie opuścili (§ 322), odkładając je do tego miejsca, aby nie przerywać ciągu rzeczy.

UBARWIENIE ROŚLIN (Coloratio).

§ 620. Zewnętrzne części roślin żyjących, przedstawiają różne barwy, pomiędzy którymi przeważa zielona: i tak, zielonemi są młode kory, liście i inne narzędzia najwięcej do uich

zbliżone, jakoto: kielichy, owocki i młode owoce. Często już mieliśmy sposobność mówienia o *zieleni* (§ 24), pierwiastku, od którego zależy zielona barwa; zajmując się zaś oddychaniem roślin, widzieliśmy, iż pierwiastek ten powstaje najpoliciej w skutek połączonego działania powietrza atmosferycznego i światła, z kąd wynika nagromadzenie węgla i ubytek kwasorodu w roślinie. Jednakże ten sam wypadek wypływać może i z innéj przyczyny; części roślinne mogą zielenić, będąc usunięte zpod wpływu światła, lecz wtedy muszą być umieszczone nie w powietrzu, ale w innym środku. Itak, Humboldt przekonał się, że rośliny przeniesione w podziemia zupełnie ciemne, zostając wpośród atmosfery nieoddychalnej i mocno wodorodem przesyconej, nietylko zachowują zieloną barwę w częściach poprzednio już rozwiniętych, lecz ją posiadają i w młodych pędach, które się ciągle rozwijają. Tam bezwątpienia, zmiana zależąca od nieobecności światła, różnoważy się nowemi warunkami zmiany powietrza otaczającego, w którym niema kwasorodu utrawnego przez roślinę, a która zawiera istoty, mogące dać początek zieleni. Być może, iż podobne uwagi mogłyby nam objaśnić zieloną barwę części położonych głębiej wewnątrz rośliny, jakoto rdzenia (§ 55), niektórych nasion i zarodków (§ 595) i t. p. i t. p. W każdym razie barwa ta właściwa jest tylko częściom młodym, których życie jest bardzo czynne.

§ 621. Wszelako liście i narzędzia najbardziej do nich zbliżone, nie zawsze bywają zielone. Niektóre z nich posiadają stale inne barwy, bądź na całej powierzchni, bądź na pewnych tylko punktach (w którymto razie nazywamy je *upstrzonymi* (*variegata*), bądź wreszcie na jednej zazwyczaj na dolnej powierzchni. W pierwszym przypadku młoda kora przybiera zwykle takąż samą barwę, jak się to daje widzieć na czerwonej odmianie muku, buraku, łobody ogrodowej. Rodzaj *Aucuba* posiada liście nakrapiane żółto; obraźnica dwubarwna (*Caladium bicolor*) liście upstrzone czerwono, w niektórych gatunkach łomikamienia, gduły, dobowniku, górna powierzchnia liścia jest zielona, dolna zaś czerwona lub brunatna. Łatwo byłoby, lecz bez korzyści, przytoczyć więcej podobnych przykładów.

§ 622. Wiele liści zielonych przybiera w pewnym okresie swego istnienia nowe barwy: jakoto czerwoną, mniej lub wię-

cęj świetną, niekiedy zaś brunatną nabiegającą, żółtą mniej lub bardziej bladą; a wszystkie te zmiany powtarzają się zawsze w jednym i tymże samym gatunku. W jesienito zazwyczaj, w okresie życia poprzedzającym bezpośrednio opadanie liści, narzędzia te tracą barwę zieloną i przywdziewają inną; tak np. liście topoli, wiązu, brzozy żółknieją; liście sumaku przybierają świetną barwę czerwoną; liście derenu, kaliny barwę czerwoną więcej przyćmioną; liście winorośli nakrapiają się żółto lub szkarłatnie, i t. p. i t. p. Godnym jest uwagi, że po większej części nowe te barwy liści odpowiadają barwom, jakie są właściwe dojrzałym owocom téjże samej rośliny. I tak, w szcepach winnych noszących grona białe, nakrapiania liści są żółte, w tych zaś, których grona są czerwone, nakrapiania są szkarłatne.

§ 623. Zmiany powyższe jednak, nie są konieczną oznaką blizkiej śmierci. Wiele naszych roślin zielnych, rozwiniętych w późnej porze roku, zachowuje swe liście przy życiu przez całą zimę, a u wielu z nich widzimy, że od końca lata liście zamieniają się mniej lub więcej, lubo aż na przyszłą wiosnę opadną. Oglądając uważnie w czasie zimy rośliny zwane zawsze zielonemi, z powodu, iż nie tracą w téj porze liści, spostrzeżemy na wielu (na liściach np. sosen, jodeł, bluszczu, rojniku, rozchodniku i t. p.) barwę brudno-żółtą, lub co zwykłej, nieco brunatną albo czerwoną, weale różną od téj, jaką miały w czasie przeszłego lata, i jaką w przyszłym roku przybiorą znowu.

Postrzeżenie to prowadzi nas do następującego prostego wniosku; że zmiana barwy nie zależy od zmian spowodowanych w tkance i jej żywieniu przez starość i zgrzybiałość, będącą poprzednikiem śmierci. Zdaje się raczej, iż ona stoi w związku ze zmianami jakie sprawia w czynnościach żywotnych pora roku, która wpływa wprawdzie na odbywanie się życia w narzędziach, lecz go sama nie wygasza całkowicie.

§ 624. Nadto, wiele roślin przedstawia podobne zmiany, nie w końcu roku dopióro, lecz w chwili najsilniejszego rośnięcia, pod wpływami, które uważamy za najstosowniejsze do pobudzenia go, np. przy długim i mocnym działaniu światła. Porównywając trawy rozsiane na murach, lub trawnikach wystawionych przez część dnia na słońce, z trawami, które ulegają nie tak wprostnemu, lub mniej stałemu jego działaniu,

jak np. na łąkach, gdzie rośliny ściśnione nawzajem, jedne zastaniają drugie, ujrzymy że pierwsze bywają często rdzawe lub czerwone, drugie zaś są ciągle zielone. Na wysokich górach, przedwczesne to zzerwienie liści jest częstym w wielkiej liczbie roślin; przekonać się o tém można na Alpach, porównyując też same gatunki z miejsc wzniosłych i z dolin. Uważać należy, że z powodu różnego stanowiska, rośliny z gór, będąc przez dłuższy czas wystawione na działanie światła i ciepła słonecznego we dnie, w nocy ulegają znacznemu oziębieniu wskutek promieniowania ciepła; zdaje się, że ta okoliczność nie jest także bez wpływu na zjawisko, o którym mowa.

§ 625. U wielu roślin, liście zaczynające się rozwijać z nasienia lub pączka, mają barwę czerwoną lub brunatną, którą poprzedza zieloność liści późniejszych. Jest to nowy dowód, że nie należy szukać przyczyny okazywania się tych barw, w zmianie sprawionej obumieraniem czynności żywotnych, blizkich zupełnego wygaśnięcia.

§ 626. Zieloność liści bywa najczęściej zastąpioną przez inne świetniejsze barwy w pobliżu kwiatostanu; dzieje się to zazwyczaj stopiowo, lub też nagle przejściem w barwy samego kwiatu. Liście te albo ściągają się w przykwiatki, albo też zatrzymują zwyczajną swoją postać (np. w rodzaju *Poinsettia*). Ilekroć posiadają barwę korony, kielich uczestniczy w tém także.

§ 627. W koronie i okwiecie barwnym wielu jednoliścienych, barwa zielona wyjątkowo się napotyka (§ 422); natomiast znajdujemy w nich przykłady barw innych, najrozmaitszych i najświetniejszych, tak dalece, iż takowe stały się szczególnym przedmiotem badań pisarzy rozbierających przedmiot o którym mówimy. Najczęściej napotykamy barwę białą, żółtą, czerwoną, fioletową i niebieską, a to w nieskończenie różnym stopniu natężenia, lub też w połączeniu jednej z drugą, z kąd powstają pośrednie, również liczne odcienia. Spostrzeżono, że w ogóle, kwiaty żółte mogą przechodzić w czerwone lub białe, lecz nigdy w niebieskie; niebieskie zaś zarówno w czerwone i białe, ale nigdy w żółte; że dalej w wielu rodzajach, a nawet rodzinach, bardzo do siebie zbliżonych, wszystkie kwiaty posiadają barwę niebieską albo żółtą lub od nich pochodne, lecz nigdy nie mają jednej i drugiej zarazem. To było powodem do przyjęcia dwóch oddzielnych szeregów bar-

dzo kw  
nique  
[od żyw  
skiej i  
obiedw  
bą. Ote

Czer-

Barw  
tek nie  
wyżej  
wnętrz  
gromad

§ 62  
wnątrz,  
wienia,

wywoł  
nym lub  
przezro  
łych za  
w rzecz

wydaje  
loną,  
barwna  
lub wie  
barwa.  
nie biał  
stą, gd  
wymien  
pierze z  
lekkim

Istot  
bięj po  
stwach  
Jeśli w  
wa spra  
barwa z  
odcienia  
towa je

dzo kwiatowych; takimi są: szereg  *błękitów* (série cyanique [od *κυανός*, niebieski]), i szereg  *żółtni* (série xanthique [od *ξανθός*, żółty]). Barwa zielona, składająca się z niebieskiej i żółtej, łączy między niemi, i jest niejako obojętną; obiedwie zaś przechodząc w czerwoną, zdają się zlewać z sobą. Oto obadwa szeregi, wyrażone jak można najtreściwiej:

*Czerwona-pomarańczowa-żółta. — Zielona-niebieska-fioletowa-czerwona.*

Barwa biała, jak to niżej obaczmy, powstaje tylko w skutek nieobecności, lub nadzwyczajnego rozwiedzenia barw powyżej wymienionych; brunatna zaś lub czarna, ostatnia w zewnętrznych częściach rośliny, zawsze nieczysta, jest tylko nagromadzeniem i skupieniem wielkiej ilości innych barwników.

§ 628. Nie przestając na poznaniu samego zjawiska od zewnątrz, zajrzyjmy wewnątrz rośliny i obaczmy siedlisko ubarwienia, a zarazem sposób, w jaki powstają związki, które wywołują wrażenie w naszym oku. Barwnik w stanie płynnym lub wpołylnym osadza się w komórkach, i przez ich przezroczyste ściany jest widzialnym. Doszedłszy do tych małych zawieraleń barwy, przekonywamy się, że takowa w rzeczy samej daleko mniej jest rozmaita, niż się od zewnątrz wydaje. Jest ona zawsze żółta, fioletową, czerwoną lub zieloną, bądź czystą, bądź wpadającą w żółte lub białe. Istota barwna zawieszoną jest w płynie bezbarwnym, a od mniejszej lub większej ilości takowej, zależy jaśniejsza lub ciemniejsza barwa. Jeśli jej wcale niema, płyn bezbarwny sprawia wrażenie białości, która jednak bardzo rzadko bywa zupełnie czystą, gdyż zawsze miesza się z nią mała ilość jednej z barw wymienionych; dlatego też położywszy kwiat biały na papierze zupełnie białym, widzimy, że zawsze odbija od niego lekkim odcieniem żółtawym lub niebieskawym.

Istoty barwne żółte i zielone, znajdujemy w komórkach głębiej położonych, błękitne zaś, czerwone i fioletowe w warstwach bardziej powierzchniowych, albo nawet w naskórku. Jeśli wskróś warstw czerwonych przebija spodnia żółta, takowa sprawia wrażenie barwy pomarańczowej, jeśli zaś przebija barwa zielona, odbieramy wrażenie barwy brunatnej w różnych odcieniach. Jeśli istota zielona, błękitna, czerwona lub fioletowa jest nagromadzona i w niezmiernie małej ilości rozpro-

wadzona po komórkach ściśniętych, w liczne warstwy, widzimy napozór barwę zbliżającą się do czarnej, lecz wpatrzywszy się bliżej, rozeznajemy zawsze jeden z owych odcieni. Obecność kilku rzędów komórek bezbarwnych, pomiędzy okiem a głębszemi warstwami komórek barwnych, osłabia natężenie barwy tych ostatnich i zdaje się pokrywać je warstwą białawą; jeśli komórki głębsze są zielone lub błękitne, powstaje zład barwa modra.

§ 629. Zazwyczaj w jednej komórce, jedną tylko spostrzegamy barwę. Jednakże nie jest to ani stałym, ani koniecznym: i tak w liściach, których zieloność zmienia się w zimie, znajdujemy niekiedy ziarenka zieleni i sok czerwony w jednej i tej samej komórce.

§ 630. Widzieliśmy już, że barwa liści może się zmieniać w różnych okresach ich istnienia. Podobnie dzieje się i z koroną: w pączku najprzód mniej więcej zielona, przybióra, rozwijając się dalej, barwy coraz świetniejsze i uderzające, które zazwyczaj w czasie zapłodnienia dosięgają najwyższego punktu, a następnie słabieją i przyćmiewają się stopniowo. W niektórych jednakże koronach spostrzegamy zmiany innego rodzaju, jakoto: tworzenie się prawidłowe plam, które nie istniały przed rozkwitnieniem lub zupełna zmiana zasadniczej barwy; przejście jednej barwy w inną, zupełnie odrębną, np. czerwonej w czysto błękitną, jak w wielu ogórecznikowatych; białej w czerwoną, jak w wielu wiesiołkach; żółtej w pomarańczową, czerwoną, fioletową, jak w niektórych gatunkach rodzaju *Lantana*; w laku prątkowym (*Cheiranthus scoparius*); nakoniec, co daleko jest rzadszem i napozór szczególnem, przejście barwy żółtej w zupełnie przeciwną, np. w błękitną, jak w pacierzycze różnobarwniej (*Myosotis versicolor*). Zachodzi wtedy pytanie, jakim sposobem to się dzieje? czy powstają nowe komórki, gdzie się nowy barwnik wydziela, lub czyli ten sam barwnik zmienia się w komórkach już istniejących i rozrosłych? a jeśli zmiana ta ma miejsce, w jakich ona granicach jest możliwą? Czy barwniki są liczne, lub czyli jest tylko jeden, mogący przechodzić we wszystkie odmiany, któreśmy dotąd uważali za istoty odrębne? Nakoniec jakie są przyczyny, pod których wpływem, wedle tego ostatniego przypuszczenia odbywają się owe zmiany?

§ 631. Wielu badaczy przyjmuje to przypuszczenie, opierając się na tak ogólnej obecności barwy zielonej w roślinach, którą prawie zawsze widzimy w liściach, a zważając dalej, że inne narzędzia są tylko zmienionemi liśćmi, i w samym początku swego istnienia, prawie zawsze posiadają też samą zieloną barwę, mniej lub więcej wyraźną, sądzą, że właśnie ta zielona barwa, odmieniając się daje nowe barwy, spostrzeżane na wielu liściach w pewnym okresie życia, a we wszystkich kwiatach, przez cały prawie przeciąg ich istnienia.

Wiadomo, z jaką łatwością i jak nagle barwy roślinne zmieniają się za zetknięciem z kwasami lub alkaliami, do tego stopnia, iż z powodu tych zmian dostarczają chemikowi najczulszej próby przy ocenianiu alkalicznego lub kwaśnego przyrośnięcia ciał. Widzimy, iż kwiaty czerwone błękitnieją, zieleń nieją lub żółkną nawet przy zetknięciu z alkaliami; że w skutek działania kwasów, też same barwy zmieniają się w odwrotnym porządku. Nie zatém dziwnego, że usiłowano objaśnić tworzenie się barw różnych części roślinnych, początkowo zazwyczaj zielonych, przez wpływ kwasów i alkaliów, które w czasie życia albo zostały wprowadzone, albo się utworzyły wewnątrz rośliny.

Później posunięto badanie nieco dalej, i przyjęto dosyć powszechnie, że zmiany rzeczzone zawisły od kwasorodu, przybywającego lub ubywającego w częściach tę lub ową barwę posiadających. Schübler nazwał nawet owe dwa szeregi barw (błękitów i żółtni Decandoll'a), szeregiem *odkwaszonym* i *ukwaszonym*. Według niego zieleń, łącząc się z nową ilością kwasorodu, przechodzi w barwnik żółty, następnie w pomarańczowy i czerwony; tracąc zaś część kwasorodu, który w pierwiastkowym składzie zawiera, zamienia się w błękit, fiolet lub czerwień. Kwasy działająby więc, ustępując kwasorodu, alkalia zaś zabierając go; tym sposobem, kiedy te ostatnie zieleńią syrop fiołkowy, odkwaszają go, i ukwaszają się same w nadmiarze.

§ 632. Teoryą tę zdaje się potwierdzać następujące spostrzeżenie Dutrochet'a: Zanurzwszy dróty stosa Volty w soku liści z wierzchu zielonych ze spodu zaś czerwonych, ujrzał on, iż istota zielona zgromadza się przy biegunie odjemnym, czerwona zaś przy biegunie dodatnim; pierwsza przeto musi być alkaliczną, druga kwaśną. Z tego postrzeżenia, i z innych

czynionych na liściach lub płatkach jednobarwnych, Dutrochet wyciągnął wnioski, różne nieco od powyżej wymienionych; sądzi bowiem, że wszelki barwnik składa się z dwóch, z elektro-odjemnego, i elektro-dodatniego; że dalej, każdy liść, lub inne liściowate narzędzie, np. płatek, jest podobnikiem jednej pary krążków stosa, powierzchnia bowiem górna jest odkwaszająca, dolna zaś ukwaszająca.

§ 633. Najdokładniejsza i najświeższa praca Marquart'a o barwach kwiatowych, wytknęła słabe punkta teorii Schübler'a, podstawiając natomiast inną. Marquart wychodzi także od zieleni, którą starał się oddzielić za pomocą wysokoku; ten bowiem rozpuszcza ją w sobie, i dlatego liście moczone w nim przez kilka dni, dają płyn zielony, same zaś tracą barwę. Reszta, pozostająca po wyparowaniu, oddziela się za pomocą eteru siarkowego od pierwiastków wyciągowych, które się przy niej znajdowały a które rozpuszczają się w eterze. Oczyszczoną w ten sposób pozostałość, Marquart uważa za zieleni. Takowa, za dodaniem wody żółknieje, zapewne w skutek chemicznego z nią połączenia; za dodaniem zaś mocnego kwasu siarkowego, błękitnieje. Marquart sądzi, iż kwas działa tu, zabierając wodę, do której ma wielkie powinowactwo; wnosi przeto, że zmiany którym ulega zieleni i które przypisywano kwasorodowi, zależą rzeczywiście od wody; że zatem, nowa ilość wody zmienia ją w istotę, nazwaną przez niego *anthoxanthin* (żółcień kwiatowa), zaś ubytek pewnej ilości wody w istotę błękitną, którą mianuje *anthocyane* (błękit kwiatowy). Istota zielona, jest według niego obojętną względem tamtych; pierwiastkami jej są: woda i kwas węglowy, które dla utworzenia jej łączą się z sobą, tracąc kwasoród zawarty przez jedno z nich. Saletrorodu niema w zieleni ani śladu.

Błękit kwiatowy (*anthocyan*) rozpuszcza się w wodzie i wysokoku rozcieńczonym wodą; roztwór takowy kwasy czerwieni, alkalia zaś zieleni. Tento pierwiastek w stanie czystym nadaje barwę kwiatom błękitnym, zmieniony nieco przez słabe kwasy, nadaje im barwę fioletową, a przy mocniejszym kwasie, robi je czerwonymi. Żółcień kwiatowa (*anthoxanthin*) barwi kwiaty żółte; mały na nią wpływ wywierają kwasy i alkalia, i tylko mocny wyskok tudzież eter siarkowy rozpuszcza ją, chociaż w niektórych roślinach, wyskok rozcień-

czony.  
także.  
następ  
wody,  
ustępu  
Te róż  
wy je  
istotą  
kach  
przyn  
żółta  
średn  
sok k  
sama  
sob ir  
zenia  
Łatwo  
przybi  
niac  
dzają  
nej z  
łajają  
sob p  
tniają  
prze  
kwas  
§  
rozmi  
nej,  
w wa  
wnik  
on po  
kach  
niek  
lecz  
znajd  
stępu  
ona t  
re w

czony wodą, a nawet sama woda jest w stanie rozpuścić ją także. Silny kwas siarkowy zmienia barwę jęj w indygową, następnie w szkarłatną, a to bezwątpienia zabierając część wody, gdyż w miarę, jak żółcień biorąc takową zkądiną, ustępuje część jęj kwasowi, barwy rzeczony słabną i nikną. Te różne własności zdają się mówić za tém, że błękit kwiatowy jest jedną z istot nazwanych wyciągowemi; żółcień zaś istotą żywiczną. Jednakże obok nich znajdują się w komórkach inne jeszcze istoty, które usiłują poniekąd zakryć to przyrodzenie. I tak, obok błękitu, bywa żywica biała, bladożółtawa, lub zielonawa, którą Marquart uważa za stopień pośredni zieleni; obok żółtni zaś bywa sok bezbarwny, zapewne sok komórkowy. W kwiatach białych sam tylko ów sok lub sama tylko żywica się znajduje. Widzieliśmy już, w jaki sposób inne barwy mogą powstawać z powodu względnego położenia komórek zawierających pierwiastki barwne zasadnicze. Łatwo jest pojąć, jakim sposobem kwiat, z początku zielony, przybiera następnie inne barwy, i jak takowe mogą się odmienić w pewnym porządku; sprawy bowiem żywotne sprowadzają powiększenie się lub zmniejszenie ilości wody połączonej z barwnikami; spowodowują tworzenie się kwasów, działających z tém mniejszym nateżeniem, im są słabsze, i w sposób przemijający lub stały według tego jak są lotne lub nieulatniające się; nakoniec tworzenie się alkaliów, które działają przeciwnie, bądź same przez się, bądź przez zobojętnienie kwasów.

§ 634. Przeciwno teoryom tym jednakże, według których rozmaite barwy powstają z jednéj tylko istoty, różnie zmieniając, ważne uczynić można zarzuty. Zieleni nie znajduje się w warstwach komórek najzewnętrznějších, a mianowicie w naskórku, a właśnie w takich komórkach znajdujemy barwnik błękitny, fioletoowy i czerwony; jakimże sposobem mógł on powstać z istoty, której tam niéma? Prawda, że w komórkach głębiej leżących i napełnionych zielenią (w komórkach miększu liścia) tworzy się o pewnym czasie istota czerwona, lecz postrzeżenia mikroskopieczne przekonywają, że w ogóle znajduje się ona wraz z istotą zieloną, i nie tę ostatnią zastępuje, ale tylko sok, wprzódy bezbarwny; że dalej, zakrywa ona tylko niekiedy zieleni, otaczając pojedyncze ziarenka, które w innych razach są zupełnie wyraźne. Sok komórkowy

bezbarny, czerwienieje zwolna przy ciągłym działaniu słabych kwasów, nie błękitnieje jednakże, co by musiało nastąpić, gdyby powstawał z błękitu kwiatowego. Żółcień i zielen przybierają w mocnym kwasie siarkowym barwę ciemno-błękitną, co Marquart przypisuje przejście ich w błękit; lecz w takim razie, przy ciągłym działaniu kwasu w nadmiarze, powinnyby nakoniec przyjąć barwę czerwoną, co się wszakże nie zdarza. W jakież zresztą sposób liście i kwiaty żółte z powodu obecności żółtni, przechodzą bezpośrednio w czerwone? Marquart przypuszcza sam, że się to dzieje w skutek nowo powstających na powierzchni komórek, które zawierają błękit czerwieniony kwasami; lecz nie widzimy tam barwy zielonej ani niebieskiej, która według tego przypuszczenia powinna by poprzedzać czerwoną. Te różne uwagi każą nam o tém wątpić, aby zielen, błękit i barwnik czerwony, mogły być rozmaitemi stanami jednej i tej samej istoty, a powątpiewanie to popiera znakomita powaga Berzelius'a, który odrzuca powyższe przypuszczenie, i uważa barwnik czerwony za istotę oddzielną, którą nazywa *czerwienią liściową* (*Erythrophyllum* [od  $\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\delta\varsigma$  czerwony i  $\varphi\upsilon\lambda\lambda\omicron\nu$ , liść]). Z drugiej strony otrzymał on z liści istotę żółtą, którą nazwał *żółtnią liściową* (*xanthophyllum*), a która zdaje się, że jest różną od żółtni kwiatowej; jestto bowiem związek tłusty osobnego przyrodzenia, zaledwie rozpuszczalny w wyskoku. Tento związek, połączony w zieleni z innym, raczej błękitnym niż zielonym, skoro go zostanie pozbawiony, nadaje liściom barwę żółtą, którą one tak często przybierają.

Zdaje się więc, że części barwne roślin zawierają wiele różnych istot; owszem, wnosząc z odmiennych własności wielu takowych, które jednak budzą w nas uczucie jednej i tej samej barwy, możnaby sądzić, że ich jest więcej, niżesmy powyżej wymienili. Do chemii to należy rozstrzygnąć te zadania, i życzyć wypada, ażeby od niej nauka o barwach otrzymała stałą zasadę, przez oznaczenie pierwiastkowego składu barwników, poczynając od zieleni, tak jak to miało miejsce z wielu innymi bezpośrednio pierwiastkami, o których mówiliśmy w rozdziale o żywieniu.

§ 635. Widzieliśmy, że odcienia brunatne zależą od położenia zwierzechnego komórek napełnionych sokiem odmiennéj barwy (§ 628). Niekiedy jednak wewnątrz komórek wypełnionych jest istotą rzeczywiście brunatną, która przedstawia zia-

renka dosyć podobne z postaci do ziarenek zieleni. Berzelius mniema, iż dwie te istoty są zupełnie odmiennego przyrodzenia, albowiem ziarenka brunatne tworzą się w wyciągu początkowo bezbarwnym, w skutek działania kwasorodu.

§ 636. Częstość także siedliskiem owęj brunatnej barwy nie jest wewnątrz komórek, lecz same ściany takowych, które barwnik, przechodzący według rozmaitości roślin lub ich części, od żółtego do najciemniej brunatnego, przenika i przyjmuje nakszałt drzewniku (§ 20). Niekiedy obok tego znajdują się i ziarenka brunatne; być więc może, iż w takim razie mamy ten sam pierwiastek poczęści wolny wewnątrz komórki, poczęści zaś wcielony w jej ściany. Najrzadziej się zdarza barwa brunatna w komórkach blizkich powierzchni, jak np. w niektórych sprężycach lub w rodzaju *Azolla*; częściej zaś w komórkach głębiej położonych, w częściach rośliny któremi nie zajmowaliśmy się jeszcze pod tym względem, np. w drewnie. Komórki te są daleko trwalsze od komórek liści a szczególnie kwiatów; ściany ich są zgrubiałe, w skutek utworzenia się licznych słojuw kolejno jeden na drugim osadzonych; jasną jest rzeczą, iż ogół tych słojuw, musi w miarę powiększania się ich liczby, przybierać barwę coraz ciemniejszą, chociaż każdy z nich pojedynczo wzięty, posiada ją w daleko niższym stopniu.

§ 637. Drewno paproci i palm winno swą barwę ścianom komórek w ten sposób napojonych; toż samo zdarza się w niektórych dwuliściennych, jak w olszy i morwie; jednakże w tej gromadzie roślin najczęstiej istota komórkowa przyjmuje barwę sobie właściwą, bądźto we włóknach drzewnych, bądź w komórkach tworzących promienie rdzenne (np. hebanie).

§ 638. Widzieliśmy już gdzieindziej (§ 67) podział drewna na biel i twardeziel; wiemy, że w bielu, jako młodszym, znajdują się obficie płyny, i że w nim najżywiej odbywają się czynności żywotne, które słabieją albo nawet ustają zupełnie w twardezielu, jako części stwardniałej i wysuszonej, zestarzałej i jakby umarłej, a zarazem posiadającej oddzielną barwę. Tu więc ubarwienie zdaje się nie zależeć od życia, i podlega całkowicie prawom chemicznym; do chemii więc znowu należy szukać i tu, jak w kwiatach, według tak rozlicznych barw rozmaitych gatunków drewna, rozlicznych barwników i badać zmiany jakim takowe ulegają. Zmiany te odby-

wają się zwolna i bez przystępu powietrza, ponieważ twardziel oddzielony jest od niego całą miąższością bielu i kory. Ta ostatnia, wystawiona na działanie powietrza, znajduje się pod zupełnie innymi warunkami, ulega też zupełnie innym, daleko prędszym zmianom ubarwienia. Wpływ powietrza objawia się zresztą i na drewnie, które zwykle ciemnieje, skoro nań zostanie wystawionem; za przykład dosyć jest przytoczyć mahoń.

§ 639. Często się zdarza, iż połączenie pierwiastków zawartych w atmosferze z pierwiastkami barwiącemi części roślinne, odbywa się daleko prędzej a nawet w mgnieniu oka. Tak np. komórki korzenia marzany napełnione są w żyjącej roślinie sokiem żółtym; wyrwane z ziemi, przybierają po wierzchu, za zeiknięciem się z powietrzem, barwę czerwoną powszechnie znaną; zranione lub przekrajane, przyjmują natychmiast tę barwę na częściach w ten sposób osłoniętych. W czystym kwasorodzie nie zmieniają swęj barwy, lecz czynią to za domieszaniem małej ilości pary wodnej. W lasach naszych znajdujemy wiele grzybów z gatunku huba (*Boletus*), których mięsivo jest zupełnie białe, za nacięciem zaś przybiera inne barwy: w jednych barwę winną, w innych błękitnozieloną w grzybie piaskowym (*Boletus cyanescens*) ciemno-indygową. Czysto białe kwiaty wielu storczyków (*Calanthe veratrifolia*, *Bletia Tankervilleae*, etc.), błękitnieją także mocno na wszystkich punktach, gdzie się je zrani, lub nagniecie; schnąc przybierają też samą barwę, która aż w czarne przechodzi. Wiele roślin téjże rodziny, czernieje przy zaschnięciu na całej powierzchni; podobnież dzieje się i z roślinami innych rodzin, a szczególnież szelązkowatych (*Rhizanthaceae*); ktokolwiek układał zielnik, miał sposobność przekonania się o téj własności, która stanowi prawie piętno całej rodziny. Zmiana ta zależy niekiedy od obecności pierwiastku indygowego, który w żyjącej roślinie jest szarym lub białawym, a przy wysychaniu jęj, łącząc się z kwasorodem przybiera barwę, od której zwykliśmy go nazywać. Nie można wątpić, że garbnik, tak zwykły w niektórych częściach rośliny, że kwas galasowy, który się w nich także znajduje, tudzież sole żelazne, znalezione w nich w ilości niekiedy dosyć znacznej, a które łącząc się z tym kwasem tworzą atrament, wpływają często na zmianę barwy tam, gdzie ją spostrzegamy w obumarłej roślinie. Lecz tym sposobem oznaczenie tych istot,

odmiany i związki nowe, jakim ulegać mogą, są przedmiotem innej nauki.

## CIEPŁO WŁAŚCIWE ROŚLIN.

§ 640. Mająz rośliny tak jak zwierzęta, ciepło właściwe, a t $\acute{e}$ m sam $\acute{e}$ m niezawisłe od atmosfery je otaczającej? Ciepło t $\acute{o}$  jest $\acute{e}$  stał $\acute{e}$ m lub tylko przepuszczającym? W jakich przypadkach dochodzi ono największego natężenia? Samo rozumowanie wystarcza do pewnego stopnia na rozwiązanie tych pytań, albowiem znamy przyczynę ciepła zwierzęcego. Wiemy że ona leży w pewnych chemicznych połączeniach, którym zawsze towarzyszy wywiązywanie się ciepłika, mianowicie zaś w połączeniach węgla z kwasorodem; wiemy tak $\acute{z}$ e, iż podobne połączenia zachodzą i w roślinach, lecz tu działanie to odbywa się słabiej i wolniej, a prócz tego niejednostajnie; inaczej bowiem pod wpływem światła dziennego i w ciemności, inaczej w różnych porach roku, inaczej nawet w rozmaitych częściach jednej rośliny. Wnosimy ztąd, że rośliny muszą rzeczywiście posiadać ciepło będące wypływem życia, lecz że takowe musi być w ogóle bardzo słabem; że dalej, w niektórych tylko pojawach roślenia może się podnosić, i pewnych tylko częściach rośliny może być silniejszym, w innych zaś wcale nie istnieje. O t $\acute{e}$ m wszystki $\acute{e}$ m przekonywa nas w rzeczy samej doświadczenie.

§ 641. Szczególne wywiązywanie się ciepła postrzeżon $\acute{e}$ m zostało w kwiatach i w ogóle w czasie kwitnienia. W rodzinie obrazkowatych jest ono pod $\acute{o}$ wczas tak siln $\acute{e}$ m, iż się za dotknięciem daje nczuć; sam t $\acute{e}$ ż rozkład kwiatów w t $\acute{e}$ j rodzinie, jest bardzo wygodny do podobnych postrzeżeń. W rzeczy samej siedzą one gromadnie na grub $\acute{e}$ j i dłu $\acute{g$ iej osi, otoczonej du $\acute{z$ ą pochwą (*spatha*) mającą postać trąbki (fig. 185), w której zgromadza się ciepło, wydane przez wszystkie kwiaty razem, i w którą łatwo wstawić termometr. Słupki, z których każdy stanowi kwiat żeński, oddzielone są od pręcików, stanowiących pojedyncze kwiaty m $\acute{e}$ zkie; tym sposobem można, odcinając naprzemian jedne i drugie, oznaczyć, o ile dwa te rodzaje narządzi wpływają na wydanie całkowitej ilości ciepła.

Buławka po dojściu zupełnego rozwinięcia ulega przez kilka dni jakoby gorączce, która spowodowuje mniejszą lub wię-

kszą różnicę ciepła w tém narzędziu, a powietrzu otaczającym. Gorączka ta jest poniekąd przepuszczającą i codzienną, codziennie bowiem ciepło wzrasta coraz bardziej, poczem, dosięgnąwszy najwyższego punktu zmniejsza się, dopóki nie zejdzie na dawny stopień, który cokolwiek tylko jest wyższym od stopnia ciepła atmosfery otaczającej. Napad codzienny w początku kwitnienia słaby, wzmagą się dni następnych, poczem znowu słabieje a po niejakiem czasie wcale ustaje. Zwyczajnie nie przypada codziennie o zupełnie tym samym czasie, lecz albo wcześniej albo później niż dnia poprzedniego. W obrazkach plamistych (*Arum maculatum*) najwyższy stopień ciepła w ten sposób rozwiniętego, to jest przewyżka stopni ciepła atmosfery wynosi 8° do 10°: więcej stopni postrzeżono w gatunkach *Arum italicum* i *A. dracunculus* zamieszkujących kraje cieplejsze, tudzież w *Colocasia odora* i *Catadium pinnatifidum* hodowanych w cieplarniach. Zdaje się jednak, iż zjawisko to dochodzi zupełnie innego stopnia natężenia w krajach gdzie rośliny te dziko rosną, albowiem według jednego z najdawniejszych spostrzeżeń w tym względzie, czynionych na wyspie Burbon, pięć buławek obrazków sercolistnych (*Arum cordifolium*) związanych około termometru, podniosły w nim merkurysz do 25°; dwanaście zaś takowych, podniosły go przeszło do 30°.

§ 642. Buławka różnych obrazkowatych, na których spostrzeżenia te były czynione, składa się z osi otoczonej ku dołowi pewną liczbą słupków, powyżej pylnikami doskonałemi, u samej zaś góry pylnikami mniej więcej płonnemi; wszystko to otoczone jest pochwą trąbkowatą; ciepło wywiązane podczas kwitnienia jest wypadkiem ogólnym temperatury, do jakiej podniosły się pojedynczo te różne części kwiatu. Dochodząc zaś, co właściwie przynależy każdej z nich w szczególności, przekonywamy się, że ciepło rozdzielone jest pomiędzy nie, bardzo niejednostajnie; że najwięcej go wydają w ogóle pylniki doskonałe; że dalej pylniki płonne wyrównują im niekiedy, albo je nawet przewyższają w tym względzie, wyjąwszy wtedy, kiedy płonność ich i przeobrażenie są zupełne; że nakoniec temperatura słupków jest w porównaniu daleko niższą, najniższą zaś temperatura pochwy kwiatowej.

§ 643. W ogóle w czasie kwitnienia, kwiaty biorą pewną ilość kwasorodu z powietrza otaczającego, wyziewają zaś

pewną ilość kwasu węglowego, a tém samém odpowiednia ilość węgla kwiatów zostaje spaloną. Już Saussure dostrzegł, że stosunek ten jest bardzo znaczny w obrazkowatych, w czasie wywiązywania się ciepła, wiele zaś wyższy od tego, jaki dostrzegamy w kwiatach zimnych, a nadto że jest wcale różny w rozmaitych oddzielnie wziętych częściach buławki. Tak np. w *Arum maculatum* i *dracunculus*, podczas, gdy pylniki pochłaniają przeszło 130 razy wziętą własną objętość kwasorodu, wierzchnia część buławki, utworzona z pylników płonnych, pochłania go tylko 30 razy wziętą własną objętość, cały zaś ogół słupeków nie więcej nad 10 razy, a pochwa zaledwie 5, lub  $5\frac{1}{2}$ . Ponieważ zaś ciepło wywiązujące się z tych rozmaitych części, stoi mniej więcej w stosunku z temi liczbami, wnosić więc musimy, iż zależy od owego palenia się, tak żywego w czasie niektórych pojawów kwitnienia.

§ 644. Słusznie wnosić można, że zjawisko pomienione, tak wyraźne w obrazkowatych, musi do pewnego stopnia istnieć i w innych kwiatach, które jakeśmy dopiero powiedzieli, zachowują się podobnie względem powietrza, łącząc część swego węgla z jego kwasorodem. W rzeczy samej, staranne doświadczenia okazały, że w niektórych kwiatach, ciepło wywiązuje się w czasie kwitnienia, lecz zawsze w bardzo małej ilości; w jednych wynosiło najwięcej jeden stopień, nad temperaturę atmosferyczną, w wielu innych było daleko mniej znaczném a po największej części nie daje się wcale ocenić. Wprawdzie kwiat, jakeśmy to widzieli, bywa podówczas często źródłem wyziewów, a tém samém parowania, które w skutek ziębienia, jakie sprawia, może do pewnego stopnia zrównoważyć wywiązujące się ciepło. Porównywając ilość kwasorodu pochłoniętą przez kwiat pojedynczy, to jest opatrzony pręcikami, tudzież przez ten sam kwiat pełny, to jest, którego pręciki zamieniły się w płatki; porównywając dalej ilość tegoż gazu pochłoniętą przez kwiaty męzkie gatunku osobnopciowego, tudzież przez kwiaty żeńskie tegoż samego gatunku, przekonujemy się, że i tu, podobnie jak w obrazkowatych, pylniki zużywają go więcej niż płatki i słupek; śmiało więc możemy i tu ten sam skutek, przez tę samą objaśnić przyczynę. Uważać jednak należy, że palenie się nie jest wyłączną przyczyną słabego ciepła wywiązującego się w kwiatach, ponieważ stopień ciepła nie stoi w stałym stosunku z ilością

zużytego kwasorodu; niektóre kwiaty pochłaniają go więcej, nie okazując wszakże żadnego podwyższenia temperatury, które w innych jest bardzo widoczném.

§ 645. Wiemy, że przy wschodzeniu, nasienie pochłania kwasoród powietrza i wydaje dość znaczną ilość kwasu węglowego. Można ztąd wnieść, że przy tym akcie żywotnym ciepło wywiązuje się, podobnie jak przy kwitnieniu. W rzeczy samej, przekonywamy się o tém, włożywszy termometr w kupę nasion kiełkujących, jak np. pomiędzy ziarną jęczmienia, w którym pobudzamy kiełkowanie, przy robieniu piwa. Dutrochet wszelako twierdzi, że ogrzanie to, nie jest zjawiskiem żywotném, lecz, że zależy od przyczyn, które sprawiają znaczne podwyższenie temperatury w kupach siana wilgotnego, lub innych jakiegokolwiek istot roślinnych bądź żyjących, bądź obumarłych; czyli, wyraźniej mówiąc, od połączeń chemicznych, jakie zachodzą pomiędzy wyziewami ustrojowemi, wydobywającemi się z tych istot i zgęszczającemi się w próżniach pomiędzy temi istniejących, a w końcu ulegającymi szybszemu lub wolniejszemu rozkładowi.

§ 646. Tenże sam badacz zajmował się oznaczeniem ciepła, wywiązującego się w innych częściach rośliny, i zastosował do tych poszukiwań przyrząd termo-elektryczny, tojest mierzący ciepło przez stopień elektryczności, która się łącznie z nim wywiązuje. Przyrząd taki ma tę podwójną wyższość, iż najprzód najmniejsza ilość ciepła zostaje wskazaną daleko wyraźniej, niż za pomocą najczulszych termoskopów, powtóre, że za pomocą niego możemy z łatwością badać każdą część roślinną, albowiem dosyć jest zatknąć w nią dwie ostre kończyny stanowiące część tego prostego i wygodnego przyrządu.

Już dawniej spostrzeżono różnicę temperatury roślin i powietrza otaczającego. Postrzeżenia te ścierały się szczególnie do pniów drzew, w które łatwo jest za pomocą nawiercenia, wprowadzić termometr do głębokości, której temperaturę chcemy zbadać. Takowa zaś była raz wyższą od temperatury powietrza, drugi raz, przeciwnie, nieco niższą. Jednakże łatwo można wytłumaczyć sobie tę różnicę, nie uciekając się nawet do ciepła żywotnego, właściwego roślinie. Drzewo, będąc daleko gorszym przewodnikiem ciepła niż powietrze, a tém samém oziębiając się i ogrzewając daleko wolniej, dąży

ciągłe  
bardz  
tura  
gle s  
Roślin  
i wsk  
szcie.  
da si  
cym,  
wietr  
kiej  
która  
mne  
ma m  
się pa  
o któr  
ku śr  
re się  
Ten  
młode  
są dla  
tém w  
jakk  
sił w  
chod  
różni  
żenie  
ściach  
żywot  
kiedy  
tylko  
wet,  
niesko  
wnetr  
stopni  
§ 6  
postr  
cych z  
to póź  
tach z

ciągle do zrównoważenia się z niemi, co jednak, rzadko się bardzo zdarzyć może, ponieważ w naszym klimacie temperatura nigdy długo na jednym stopniu nie stoi, ale owszem ciągle się zmienia, stosownie do pór roku, dni a nawet godzin. Roślina idzie w ślad za temi zmianami, lecz zdaleka tylko, i wskazuje raczej poprzedni stan atmosfery, niż obecny. Wreszcie, w doświadczeniach tego rodzaju, część, w którą wkłada się bańka termometru, przenikniona jest sokiem wstępującym, a ten, będąc w drodze swęj zasłoniętym od wpływu powietrza, zachowuje temperaturę téj głębokości ziemi, w jakiej został wessany przez kończyny korzeni, temperatury, która jest niższą od powietrza ogrzanego, a wyższą od zimnego. Nakoniec jeśli wywiązywanie się ciepła żywotnego ma miejsce rzeczywiście, to rozumie się, że je ma tam, gdzie się pod wpływem życia odbywają czynnie związki chemiczne, o których mówiliśmy gdzieindziej, to jest ku obwodowi, a nie ku środkowi rośliny, w częściach młodych, a nie w tych, które się już zestarzały.

Temito uwagami powodował się Dutrochet. Ponieważ zaś młode gałązki, nieprzystępne dla termometru, przystępnemi są dla kończyn jego przyrządu termo-elektrycznego, był zatem w stanie przekonania się, iż w nich wywiązuje się ciepło, jakkolwiek bardzo słabe, albowiem najwyższy punkt jego, wynosił w niektórych roślinach  $0,3^{\circ}$  lub  $0,4^{\circ}$ , w innych zaś nie przechodził kilku setnych części jednego stopnia. Ciepło to zresztą różni się według przyczyn, które podwyższają lub niżają natężenie zjawisk żywotnych; dlatego wyraźniejszem jest w częściach silnie roślących, tudzież w godzinach, w których zjawiska żywotne są najżywsze; w nocy zaś słabnie stopniowo, a niekiedy zupełnie znika, chociaż ciemność sztuczna, przez długi tylko czas działając, niszczy je całkowicie. Same liście nawet, przynajmniej w tych roślinach, w których parowanie jest nieskończenie słabem, tudzież owoce, pokazują że w ich wnętrzu wywiązuje się ciepło, aczkolwiek w bardzo niskim stopniu.

§ 647. **Wywiązywanie się światła.** — Córka Linneusza postrzegła pierwsza ciekawe zjawisko światelek wytryskujących z kwiatu nasturcyi. Postrzeżenie to stwierdzonem zostało później przez innych, i gdzieindziej, a mianowicie w kwiatach żółtych lub pomarańczowych z odcieniami świetnemi i zło-

cistemi, jak słonecznik, nogietek, goździk, aksamitka i t. p., i t. p. Światelka te mają szczególnież ukazywać się w czasie wieczorów następujących po ciepłych i burzliwych dniach, i wtedyto bywają daleko żywsze; nigdy zaś nie dają się widzieć przy wilgotném powietrzu. Według opowiadania jednego z podróźników, rośnie w Afryce gatunek pochutniku (*Pandanus*) w którym pęknięcie pochwy otaczającej kwiaty, połączone jest z trzaskiem i wystrzeleniem strumienia światła. Mówią także o grzybach przyświecających. W podskórnikach (*Rhizomorpha*), roślinach mających kształt korzeni czarniawych, pnących się wskróś tkanek drzew obumarłych, i zamieszkujących miejsca chłodne i cieniste, kończyny białawe i wietkie, szczególnież w odrostkach młodszych i silnych, wydają światło, niekiedy bardzo mocne. Delile postrzegł na bedłce oliwniku: 1° że powierzchnia dolna kapelusza, na której siedzą zarodniki, częstokroć przyświeca; 2° że to ma miejsce w początku, a zarazem w czasie najsilniejszego wzrastania zarodników; 3° że zjawisko nie okazuje się w dzień, nawet chociaż grzyb umieścimy w zupełnej ciemności.

We wszystkich poprzednich postrzeżeniach, wywiązywaniu się światła towarzyszy najsilniejsze odbywanie się czynności żywotnych, i to w częściach pochłaniających kwasoród a wydzielających kwas węglowy. Jestto zupełnie tak samo, jak z ciepłem; ztąd też możnaby wniesć, że obadwa zjawiska zależą od jednakowej przyczyny, tojest od dosyć silnego palenia się. Przypuszczenie to zresztą poparte jest doświadczeniami, czynionemi na podskórnikach, których światło gaśnie w gazach nieoddychalnych, a wzmaga się w czystym kwasorodzie. Chcąc jednak cokolwiek wyrzec o tym przedmiocie, potrzeba pomnożyć i uwielostronnić dokładne nad nim postrzeżenia.

§ 648. Znamy jeszcze wiele innych przykładów przyświecania (*phosphorescentia*) w istotach roślinnych, ulegających lub już całkowicie uległych rozkładowi, jakoto: w grzybach, drzewie które zostaje w wilgoci, a było ścięte w sile rośnięcia, i t. p., i t. p. Przypadki te należą całkowicie do chemii, albowiem te tkanki roślinne rozstrajając się i idąc za powinowactwem chemiczném, nabywają nowych własności, równie, jak się to często dzieje w podobnych okolicznościach z istotami zwierzęcemi. Ogniskiem przyświecania zdaje się być

Istota a  
a która

§ 6.  
się sta  
dąży o  
liście  
czenia  
nie da  
do zet  
zne sp  
w przy  
gotuy,  
będzie  
kielek  
trze; E  
są pod  
Umieści  
znacza  
wo wz  
dalej r  
dwóch  
dzenie  
tą wła  
stopniu  
dowodz  
położen

(1) E  
rzemieni  
przedsta  
jemioły P  
mocowan  
galezi, r  
łożenie m  
szybie ob  
ku wnetr  
do światł

istota galaretowata, która powłóczy powierzchnie świecące, a którą tarcie rozprzewadza i ożywia, -na podobieństwo fosforu.

## KIERUNKI I RUCHY ROŚLIN.

§ 649. Widzieliśmy, że rozmaite części roślinne rozwijają się stale w jednym i tym samym kierunku (<sup>1</sup>): i tak, korzeń dąży do środka ziemi, łodyga w stronę przeciwną, ku niebu, liście zaś ku światłu. Niektóre, bardzo nawet proste doświadczenia, przekonują, że to kierowanie się stale i konieczne, nie da się wytłumaczyć przez samą tylko dążność tych części do zetknięcia się ze środkiem, który posiada warunki przyjazne spełnieniu się ich czynności. Każąc wschodzić nasieniu w przyrządzie tak przysposobionym, że środek ciemny i wilgotny, np. ziemia lub gąbka nasiąknięta wodą, znajdować się będzie powyżej, zamiast, jak się zwykle dzieje, poniżej ziarna, kielek nie zagłębi się wewnątrz, lecz opuści się na dół, w powietrze; łodyżka nie zwróci się do światła i powietrza, które są pod spodem, lecz będzie się wznosić i utkwii w ziemi. Umieściwszy w bliskości kielka zstępującego tym sposobem, zmoczoną gąbkę, tak, aby jedna jej powierzchnia stała pionowo względem ziemi, kielek nie zboczy do niej, lecz pójdzie dalej równolegle w powietrze. Ta przeto dążność przeciwna dwóch części osi roślinnej, najściślej wiąże się z ich przyrodzeniem. Wiemy wszelako, że tylko oś główna obdarzona jest tą własnością; osi powtórne, posiadają ją w niższym daleko stopniu, a nawet mogą jej być wcale pozbawione, jak tego dowodzi coraz pochylszy ich kierunek, a częstokroć nawet położenie zupełnie poziome, jak np. w korzeniach.

(<sup>1</sup>) Niektóre rośliny pasorzytne rosnące na drzewach, jak np. z rodziny rzemiennikowatych (*Loranthaceae*), a szczególnie jemiola, która u nas jest przedstawicielką tej rodziny, stanowią wyjątek od tego prawidła. Nasiona jemioli przyczepiają się do gałęzi za pomocą otaczającego je kleju; przymocowane w ten sposób, wschodzą, i zwracają zawsze kielek ku środkowi gałęzi, rostek zaś w stronę przeciwną. Nasiona posiane na kuli, której położenie możemy zmieniać, zwracają podobnie kielek swój ku środkowi. Na szybko okna bądź od zewnątrz bądź od wewnątrz, kielek obraca się zawsze ku wnętrzu pomieszczenia. Krótko mówiąc, rostek zdaje się zawsze dążyć do światła, kielek zaś do ciemności.

§ 650. Jeśli będziemy usiłowali zmienić ten przyrodzony kierunek części, one odzyskają go znowu same. Gałąź gwałtem zatrzymywana w kierunku poziomym, zwraca się znowu w górę końcem; w podobnych okolicznościach korzeń zakrzywia się i obraca na dół. Knight usiłował objaśnić zjawisko to w dosyć prosty sposób, zwracając na to uwagę, że soki roślinne, w skutek ciężkości, gromadzą się na całej niższej powierzchni gałęzi, przywiedzionej do poziomego położenia; nagromadzenie soków sprawia żywsze rozwijanie się w całej tej części, a tém samym włókna części niższej daleko prędkiej się wydłużają od włókien niższej połowy; ztąd zaś wynika, iż gałąź musi się zginać, obracając się wypukłością ku dołowi, a tém samym wznosząc swą kończynę. Co się tyczy korzenia, który na końcu tylko się wydłuża, Knight widzi również całą przyczynę w ciężkości, gromadzącej soki na dół i pozwalającej przeto samemu tylko końcowi się rozwijać. Teorii tej jednakże nie możemy zastosować w przypadku, w którym kierunek korzenia zostaje całkowicie przewróconym, jak niemniej tam, gdzie osi powtórne zachowują same z siebie kierunek bardzo ukośny, poziomy, albo nawet zstępujący, jak np. w wielu drzewach tak zwanych płaczących.

§ 651. Dutrochet usiłował w samej budowie części, znaleźć przyczynę, od której zależy ich kierunek. Jeśli w miąższości tkanki komórkowej, komórki zmniejszają średnicę swą w pewnym kierunku, tak, że jeden lub więcej pokładów płaskich, złożonych z komórek mniejszych, dotyka jednego lub kilku pokładów komórek większych; jeśli dalej, w skutek wnikanania komórki zaczęta nabrzmiewać, wtedy większe z nich nabrzmieją więcej i prędkiej niż mniejsze, pokład ich stanie się rozleglejszym od pokładu komórek mniejszych, a ponieważ obadwa ściśle są z sobą połączone, przeto muszą się koniecznie skrzywić; pokład większy będzie zajmował wypukłość łuku, mniejszy zaś jego wklęsłość. Jeśli zatem w osi jakowej, komórki zmniejszając się idą od zewnątrz ku wewnątrz, powstanie ztąd skłonność do zakrzywiania się na wewnątrz i odwrotnie. W łodygach całych i równie silnych w całym swym obwodzie, skłonność do zakrzywiania się nie tyle jest widoczną, ponieważ wszystkie ich strony, będąc jednakowo oddalone od środka i usiłując zakrzywiać się jednakowo względem niego, wzajemnie się równoważą. Lecz jeśli przetniemy

łodygę  
szym  
przet  
kania  
zakrzy  
troche  
komór  
w kon  
cych  
środk  
narzę  
naów  
a tém  
jest zw  
leżący  
łuku z  
zaś w  
będzie  
Jaka  
trudnie  
znać j  
chet, n  
ków r  
krzyw  
wnika  
płynó  
w ruc  
wania  
we ws  
to jesz  
runku  
nowyc  
sprow  
§ 6  
towar  
często  
gający  
bywa  
wyżej  
budow

Łodygę wpodłuż na dwie połowy, lub jeśli jeden z boków słabszym jest od drugiego, równowaga upada, i zakrzywienie przychodzi do skutku. Położenie poziome zmniejsza siłę wnikania w części zwróconej na dół, a tém samém spowodowuje zakrzywienie w tym lub owym kierunku. Owóż według Dutrochet'a, w łodygach opatrzonych dużym rdzeniem, rozmiary komórek zmniejszają się ogółem od środka ku obwodowi; w korzeniach zaś, jako pozbawionych rdzenia a posiadających układ korowy daleko silniej rozwinięty, od obwodu ku środkowi. Jeśli przeszkodzimy przyrodzonej dążności tych narzędzi, i takowe przybiorą położenie mniej więcej poziome, naówczas siła wnikania osłabi się w części na dół zwróconej, a tém samém przestanie równoważyć dążność strony, która jest zwróconą ku górze i która zakrzywi się w kierunku, załączającym od przyrodzenia pokładów komórkowych; wklęsłość łuku ztąd wynikłego obróci się ku górze w łodydze, na dół zaś w korzeniu; w pierwszym razie kończyzna wolna sterczyć będzie do góry, w drugim opuści się na dół.

Jakakolwiekbaż może być wartość tego objaśnienia w tak trudnem zadaniu, jakim jest kierunek osi roślinnych, przyznać jednakże musimy, że zasada, z jakiej wychodzi Dutrochet, może dopomóc w rozwiązaniu znacznej liczby przypadków mniej złożonych, w których ruchy powstają przez zakrzywienie, a to za pośrednictwem znajomej nam już siły wnikania; widzieliśmy, jak ważną rolę gra ta siła w ruchu płynów, a teraz widzimy, że równie wielką zdaje się mieć w ruchu części stałych, a to w skutek nierównego nabrzmiewania części obok siebie leżących. Wypadało nam przeto wejść we wszystkie poprzedzające szczegóły, chociaż dotąd nie było jeszcze mowy o ruchu właściwym, albowiem zmiany kierunku zachodzą jedynie w skutek wzrastania, przez dodanie nowych części do poprzednio utworzonych, a bynajmniej nie sprowadzają w nich zmiany miejsca.

§ 652. **Rozmaite ruchy.** — Pękaniu pylników i nasienników, towarzyszy zmiana kształtu tychże narzędzi. Zmiana ta bywa częstokroć tak powolną i stopniową, iż nie budzi w postrzegającym wyobrażenia ruchu, jak to czyni wtedy, kiedy się odbywa prędko i prawie w jednej chwili. Wyłożyliśmy już powyżej (§ 451, 508) mechanizm tego ruchu, który zależy od budowy części: niektóre punkta lub linie stawiają mniej oporu

od reszty ścian, te zaś rozszérazają się lub ściągają, bądźto przez samo roślenie, którego skutkiem jest stopniowe rozrastanie się tkanek, napływ soków w jednej, a ich ubytek w innej porze, bądź przez działanie przyczyn fizycznych zewnętrznych, jakoto: zmian temperatury, stanu wilgoci powietrza i t. d. Nagłe pęknięcie połączone być musi z pewnym stopniem wyężenia, które w ogóle zależy od rozkładu tkanek, o jakim mówiliśmy przy osiach (§ 651), tojest od nierównej rozciągłości obokległych pokładów włókna lub komórek, które w skutek wnikania napełniają się lub wypróżniają, tracąc stopniowo części płynne. Łupiny pozostają w stosunkach swych, aż do czasu dojrzałości, w skutek wzajemnego antagonizmu; lecz skoro tylko równowaga zostanie zniszczoną, każda z nich oddzieliwszy się ulega własnej skłonności, prostuje się, zakrzywia, lub zawią w rozmaity sposób. Widzieć to można na łupinach ostroléczowatych (szczególniej w łoskotnicy głosnej [*Hura crepitans*]) i wonnokrzewowatych. W tych nawet ostatnich, w skutek nierównych wyężeń różne warstwy nasiennika, jakoto: śródownia i wówocnia oddzielają się jedna od drugiej, przybierając kształt i położenie odmienne; pierwsza pozostaje wzniesiona, druga zagina się gwałtownie.

Każdemu znaną jest dojrzała torebka balsaminy, dzieląca się na 5 łupin, z których każda zwią się w węzownię ku wewnątrz. Dutrochet okazał, że ruch ten powiększa się, jeśli zanurzymy łupinę w czystej wodzie, a następuje w kierunku przeciwnym, jeśli ją zanurzymy w gęstym roztworze cukru; że dalej łupina ta składa się z komórek coraz mniejszych, idąc od zewnątrz ku wewnątrz, a tém samém, że zakrzywienie zależy tu rzeczywiście od wnikania; komórki bowiem napełnione są sokami gęstszymi od wody a zarazem od zgęstnionego roztworu cukru.

Owoc przepękli (*Momordica elaterium*) oddziela się w dojrzałości od swjej szypułki, w skutek czego powstaje przy nasadzie otwór, przez który nasiona i płyn gęsty wewnątrz komory zawarty, wyrzucenym zostaje z gwałtownością na zewnątrz. Jednocześnie spostrzegamy, że nasiennik wydłuża się nieco, zmniejszając średnicę poprzeczną. Przyczyną tego zjawiska jest, że tkanka nasiennika drobnieje, podobnie jak w balsaminie od zewnątrz ku wewnątrz, a płyn w nim zawarty, i tém gęstszy im owoc bliższy dojrzałości, działa tak, jak

w pow  
wac  
i ody  
spraw  
Ru  
prze  
w któ  
niewi  
dział  
§  
ją dw  
i niż  
że liś  
zwy  
może  
wogo  
żna ze  
albow  
rodzo  
skreca  
Odwra  
gaśnie  
na liś  
porze  
należ  
dowa  
albow  
§ 6  
zawis  
postrz  
tychże  
ła roś  
stroni  
ku da  
na br  
prosta  
duje  
tychże  
Idzie  
w cel

w powyższym przypadku syrop cukrowy, usiłując wyprostować łupiny, które ze swęj strony cisnąć zawartość owoców i odpychając wierchołek szypułki zastępującej miejsce korka, sprawiają ten szczególny rodzaj pęknięcia.

Ruchy o których dotąd była mowa dając się objaśnić przez przyczyny fizyczne i mechaniczne. Przejdźmy teraz do innych, w których działanie przyczyn jest mniej jasnym, przez co, niewiedomośc nasza musi się często ucieka do tajemniczego działania życia.

§ 653. Wiemy, iż po największej części liście przedstawiają dwie powierzchnie (§ 123): wyższą, zwróconą ku słońcu, i niższą obróconą ku ziemi. Zmieńmy ten kierunek, a ujrzymy, że liść będzie usiłował odzyskać przyrodzone swe położenie, zwyciężając zawady mu stawione, czego jeśli dokazać nie może, więdnije i obumiera. Odwrócenie to uskutecznia się wogonku, lub, gdy tego niema, przy nasadzie liścia; nie można zaś przypisywać go sprężystości włókien przekręconych, albowiem, jeśli przewrócenie liścia nastąpiło z przyczyn przyrodzonych, jak np. w gałęziach wiszących, ogonek sam się skręca, zwracając tym sposobem powierzchnią górną ku niebu. Odwrócenie takowe odbywa się dopóty, dopóki życie nie wygaśnie, i tak widzimy je na gałęziach odłączonych od rośliny, na liściach a nawet na kawałkach liści zawieszonych na podporze dostatecznie ruchomęj. Ze przyczyny tego zjawiska nie należy szukać w stosunkach liścia ze światłem i powietrzem, dowodzą liście zanurzone w wodę i postawione w ciemności, albowiem i one odwracają się także.

§ 654. **Sen rośliny.** — Cóżkolwiekby, położenie liści zawisło niewątpliwie i od światła, czego dowodzi najprostsze postrzeganie, równie jak zastanawianie się nad czynnościami tychże narzędzi. Nie mówimy tu o dążności, jaką okazuje cała roślina od samego początku, nachylając się i zwracając ku stronie najbardziej oświetlonęj, i rozwijając w tymże kierunku daleko większą ilość gałęzi i liści, jak to widzieć można na brzegach lasu, na polankach i t. p., i t. p.; rzecz bardzo prosta, że roślina rozwija się bujniej ze strony, w której znajduje najprzyzajniejsze warunki do spełniania się czynności tychże części, a tém samém do ich zwrotu i rozmnażania. Idzie tu o ruchy wykonywane przez liście uważane zosobna, w celu zetknięcia się ze światłem. Ruchy te zmieniają do pe-

wnego stopnia owo przyrodzone położenie liścia, w którym jedna powierzchnia ku niebu, druga ku ziemi jest obrócona, a to w sposób rozmaity, według tego jak dzień jest jaśniejszy lub ciemniejszy, lub według wcześniejszej albo późniejszej jego pory. Najlepiej jest badać zawsze zjawisko przy warunkach zupełnie przeciwnych, to jest przy świetle i bez niego, w dzień i w nocy. Ktokolwiek zechce zwrócić uwagę na pewną liczbę roślin, podczas ciemności, pozwalającej wszakże rozróżniać przedmioty, albo wreszcie w czasie zmierzchu tylko, uderzy go różnica jaka w wielu z nich zachodzi pod względem ogólnego pozoru, a która zależy od zupełnie innego położenia liści.

Nowy ten stan zwiemy snem roślinnym; jednakże liście niejednakowo śpią w różnych roślinach. Mogą one, zrobiwszy czwartą część obrotu w punkcie przymocowania, zwrócić wierzchołki na dół (*Impatiens noli-tangere*), lub do góry (*Atriplex hortensis*); w pierwszym razie, powierzchnia górna wystawiona jest na zewnątrz, w drugim zaś dolna. Częstokroć jednakże nie wznoszą się wcale, albo też odwracają się bardzo niedokładnie.

Najczęściej widzimy sen w liściach złożonych, które nadto, używają go w najrozmaitszych położeniach; w nich albowiem nie tylko ogonki mogą się poruszać względem gałązki, która je nosi, ale jeszcze ogoneczki względem ogonka wspólnego, listki względem osadki. Zład trzy rodzaje ruchów, które mogą się różnie z sobą łączyć. W liściach posiadających jeden tylko rodzaj, to jest ruch listków, te podczas nocy, albo się podnoszą, (jak w bobie, komonicy [*Lotus*], koniczyńce, i t. d.) albo wprost schylają (szczawiku, lukrecyi i t. d.), albo też nachylają tylko na głównym ogonku, zwracając wierzchołki bądź naprzód (w czułkach i prawdziwych akacyach), bądź ku tyłowi (*Tephrosia caribaea*). W ostatnich dwóch przypadkach listki układają się dachówkowato z tyłu naprzód, i przeciwnie. Jeśli oprócz tego, ogonek wspólny odbywa ruch sobie właściwy, to albo się wznosi (*Cassia*), albo pochyla (*Amorpha*), tworząc przeto z wyższą częścią osi go noszącej, kąt większy lub mniejszy, od tego jaki jest we dnie. Jeśli nakoniec w liściu wielokrotnie złożonym, ogonki różnego rzędu odbywają i poruszają się razem, jedne względem drugich (np. w czułku zwyczajnym: *Mimosa sensitiva*), wtedy

ogonki cząstkowe skłaniają się od tyłu ku przodowi, usiłując przybrać kierunek równoległy względem ogonka głównego, który znowu, skłania się z góry na dół względem gałęzi. Rozumię się, że zdarzają się kierunki pośrednie, względem dopięro wymienionych, jak np. w liściach, których listki zwracają się zarazem w górę i naprzód, lub których ogonki tworzą z osią je noszącą kąty niejednostajnego wymiaru. Sen rozmaitych roślin odznacza się różnicami istotnymi, obok których istnieją inne, podrzędne, mogące zachodzić w jednej i téjże samej roślinie, według mniejszego lub większego natężenia jej snu. I tak, w czułku zwyczajnym, ogonki główne niezawsze w nocy zwieszają się całkowicie, a cząstkowe nachylają się dopięro po odwinieciu się listków; można przeto z tych różnych położeń wniesć, czyli ta dziwna roślina śpi głęboko, lub czyli zlekka tylko.

§ 655. Położenie liści w czasie snu, ma wielki związek z położeniem ich w czasie przedlistnienia, tak, że sam sen, jest poniekąd powtórzeniem tego stanu. Dlatego téż oprócz już wymienionych odmian położenia, spostrzegamy niekiedy zaginanie się samej blaszki liścia; tu np. należą listki zdwojone szczawików. Im liście bliższe są czasu przedlistnienia, z tém większą łatwością wracają do położeń, jakie w tym okresie życia przedstawiały i tém bardziej usposobione są do snu; z wiekiem zaś tracą coraz bardziej to usposobienie. Za wskazówkę mniejszej lub większej skłonności do snu, uważać można: miękkość tkanek, właściwą narzędziom młodym, i twardość tychże, powiększającą się z wiekiem. Liście grube, korowate lub tęgie, nie pokazują tego zjawiska; wszystkie owszem, w których ono się spostrzedz daje, są miękkie i cienkie. Najczęściej także liście takie opatrzone są stawami, ułatwiającymi bardzo ruch, i posiadają przy nasadzie ogonków głównych i cząstkowych szczególną budowę, jak to widzieć można w czułkach i wielu innych strąkowych.

§ 656. W dni posępne, liście albo nie przebudzają się wcale, albo téż usypiają daleko wcześniej; na rośliny zaś nadzwyczajnie wrażliwe, wywiera wpływ przejście z jasności do ciemności w czasie zasępienia się nieba przed burzą. Usunąwszy rośliny z pod wpływu światła, przykrywając je lub wstawiając je do izby zupełnie ciemnej, spostrzegamy, iż przybierają położenie senne, a to jedne wcześniej, drugie później. Wpu-

szczając następnie znaczną ilość światła, do téjże izby, widzimy, iż budzą się i podnoszą zwolna. Decandolle, któremu winni jesteśmy wiele nauczających doświadczeń, w tym względzie, potrafił oszukać poniekąd czułki tudzież kilka innych roślin i zmienić porządek czasu dla tychże, każąc im we dnie spać w ciemności sztucznej, a budząc je w nocy światłem lampy. Nie można przeto wątpić o wpływie, jaki światło wywiera na sen rośliny.

§ 657. Pomimo to jednakże, jak pod względem kierunku przyrodzonego liści (§ 653), tak i tu dają się znaleźć fakta, które dowodzą, że nie samo tylko światło jest działaczem przy tém zjawisku. Jeśli bowiem są rośliny które zmieniają zwyczaj swe, według tego jak zmieniamy działanie światła, to z drugiej strony, znajdują się i takie, które, mniej będąc powolne, zachowują je, i w zupełnej nawet ciemności śpią w nocy tylko a czuwają we dnie. Sam czułek nawet, będąc pozbawionym wszelkiego światła, tak przyrodzonego, jak i sztucznego, pokazuje przejścia ze snu do czuwania, lubo te stają się coraz bardziej nieprawidłowemi. Rośliny krain międzyzwrotnikowych, zachowują w cieplarniach naszych, pomimo nierówności dni i nocy, też same zwyczaj pod względem snu, jakie mają w swych rodzinnych miejscach, gdzie dni są równe nocom. Nakoniec, różne rośliny, w różnych godzinach do snu się udają, nie stosując się wcale do dnia; wstają one lub usypiają niezależnie od wschodu do zachodu słońca.

§ 658. Podobnie działa światło i na kwiaty, z różnicą tylko jaka zależy od ich budowy i czynności. Niektóre kwiaty w różnych godzinach dnia przybierają różne położenie względem swych szypułek, tak, iż zawsze zwrócone są ku słońcu; dlategogo nazwano je *słońco-zwrotnemi* (*heliotropi*; od *ἥλιος*, słońce *τροπή* zwrócenie. Z pomiędzy takich najczęściej przytaczanym bywa słonecznik zwyczajny (*Helianthus annuus*), na którym łatwo jest robić spostrzeżenia, z powodu wielkości koszyczka, stanowiącego kwiat złożony téj rośliny; gdy jednakże nieraz widzieć można kilka kwiatów, obroconych jednocześnie w różne strony, przeto rzeczona własność zdaje się być wątpliwą.

§ 659. Bardziej stały fakt stanowi otwieranie się i zamykanie niektórych kwiatów w pewnych godzinach. Mówimy o nich także, iż pierwszy ich stan jest przebudzeniem, drugi

zaś s  
tów  
ten ic  
przej  
zegar  
powie  
mo je  
zegar  
przew  
nie s  
wet  
świat  
narze  
§  
chow  
liśny  
dy kw  
zwrac  
kwiat  
w kie  
więc  
sie s  
w prz  
§  
cej t  
objaw  
jeder  
które  
się na  
re się  
tule d  
częśc  
zank  
Na  
że wi  
ska:  
nadan  
cowi  
ty są  
tylko

zaś snem; że zaś otwieranie się lub zamykanie różnych kwiatów, przypada w różnych godzinach, przeto raz poznawszy ten ich zwyczaj, możemy oznaczyć porę dnia, za pomocą przejścia ich z jednego stanu w drugi. Linneusz nazywał to *zegarem flory*, a tablice, które w tym względzie urządził, powiększyły się później w skutek nowych postrzeżeń. Pomimo jednak wszelkiej dokładności, jaką im starano się nadać, zegar flory nie jest wcale doskonałym, co zresztą łatwo było przewidzieć, pomnąc, że w naszym szczególnie klimacie, dni nie są jednostajne, że niektóre rośliny, kwitną długo, a nawet kilkakrotnie, i to w różnych porach roku, tudzież, że światło raz słabsze drugi raz silniejsze, musi częstokroć psuć narzędzie, właśnie z powodu nadzwyczajnej jego czułości.

§ 660. Płatki, lub poddziałki zastępujące ich miejsce; zachowują względem siebie pewne położenie, które jak widzieliśmy najwydatniejszym jest w przedkwitnieniu (§ 394). Kiedy kwiat się otwiera, części te oddalają się jedne od drugich, zwracając kończyny wolne ku zewnątrz, i na dół; każdy zaś kwiat się zamyka, one stulają się znowu, odbywając obroty w kierunku przeciwnym, i usiłując przybrać znowu mniej więcej pierwotne położenie, podobnie jak liście, które w czasie snu układają się i przykrywają wzajemnie, tak, jak były w przedlistnieniu.

§ 661. Ponieważ jednak życie kwiatów, nieskończenie krócej trwa od życia liści, przeto i przemiany snu i czuwania objawiają się w nich małą liczbą razy, a najczęściej raz tylko jeden. Nazywamy *jednodziennemi* (*flores ephemeræ*), kwiaty, które przez jeden tylko dzień są otwarte, a potem zamykają się na zawsze; *wielodziennemi* (*aequinoctiales*) zaś te, które się otwierają i zamykają przez wiele dni z rzędu. Te ostatnie dzielą także na *dzienne* i *nocne*; chociaż bowiem większa część otwiera się we dnie, jednak są i takie, które w dzień są zamknięte, a w nocy tylko otwarte.

Nazwiska pospolite nadane niektórym kwiatom, pokazują, że wiele podobnych zjawisk oddawna było znajomych. Nazwiska: *Belle de jour* lub *Belle de nuit*, tudzież *Reine des nuits* nadano we Francyi dziwaczkowi (*Mirabilis jalapa*) i cietlicowi wielkowiutowemu (*Cactus grandiflorus*), których kwiaty są jednodzienne i w pierwszym we dnie, w drugim w nocy tylko otwarte; *Dame d'onze heures* nazywają tamże gatunek

śniedku (*Ornithogalum*), którego kwiaty otwierają się około jedenastej godziny zrana przez kilka dni z rzędu.

§ 662. Otwieranie się kwiatów podczas nocy zdaje się na pozór być wprost przeciwnem zwyczajowi liści, których sen spowodowany jest zawsze przez nieobecność światła. Zważywszy jednak, że niektóre liście wznoszą się we śnie, inne zaś się skłaniają, przekonywamy się tylko, że i w kwiatkach istnieje ten sam ruch podwójny, a cała różnica na tém tylko zależy, iż w obudwu tych rodzajach narządzi sen niezupełnie jednakowo jest urządzony.

Zmiany światła dziennego, wpływają zresztą na kwiaty zupełnie tak jak na liście; za pomocą doświadczeń czynionych w ciemności lub w sztucznem cieple, zdołano nawet zmienić również ich zwyczaje, odwrócić porządek snu i czuwania. Zdaje się przeto, iż zjawiska tak podobne, muszą mieć jedną przyczynę, i że wszystkie te ruchy muszą odbywać się za pomocą podobnego mechanizmu. Ponieważ zaś ruchy te zależą na zakrzywianiu się zaginaniu lub wyprostowaniu, przeto Dutrochet, zastosował do nich swoją, powyżej wyłożoną (§ 651) teorią nierówniej rozciągłości warstw obokległych tej samej tkanki. Widzieliśmy już, że według niego napływ soków w skutek wnikania jest główną sprężyną tychże ruchów; nadto jeszcze Dutrochet, przyjmuje napływ jednego z gazów, to jest kwasorodu, na inną drogę, bo przez cewki i włókna; działanie jego jest przeciwnem działaniu komórek napełnionych sokami, a że odbywa się w nocy, gdy tamto ma miejsce we dnie, przeto tym sposobem tłumaczy się następstwo snu i czuwania.

§ 663. Badając pomienione ruchy codzienne kwiatów, nie należy przypisywać ich wyłącznie wpływowi światła; ze ciepło wywiera także niewątpliwie pewien wpływ, przekonywa nas o tém położenie, jakie kwiaty przybierają w dni bardzo gorące. Zachodzi tylko pytanie, czyli się to dzieje przez samo ciepło, lub przez zależące od niego zmianę w stopniu wilgoci powietrza. I tak bowiem ważną jest dla niektórych roślin, zwanych zjad *meteorycznemi*, a które kierunkiem i zakrzywieniami płatków wskazują suchość lub wilgoć powietrza, dającą się uczuć w ich tkance. Nogietek dęszczowy (*Calendula pluvialis*) winien nazwisko swe własności zamykania się w czas

dżdżys  
ra się  
chus  
się w  
dów,  
dnak  
stkich  
żnym  
z pow  
naprz  
trze,  
gocia  
§ 6  
szcze,  
łączon  
do sieł  
samej  
żnie w  
tu; w  
i ani w  
zblizaj  
to moż  
pręch  
płatk  
nieco  
więcej  
się na  
zacho  
dnego  
nież,  
Nie  
ctkom  
cach,  
widzi  
kom i  
sonia  
Nie  
razem  
tek je

dżdżysty: w podobnym razie wiele cykoryowatych nie otwiera się wcale od samego rana; łoczyga zaś syberyjska (*Sonchus sibiricus*) zapowiada deszcz w wilią, nie zamykając się wcale wieczorem, przeciw zwyczajowi. Z tych powodów, starano się utworzyć także i hygrometr flory, który jednak mniej jeszcze jest dokładnym od jęj zegara. Ze wszystkich atoli powyższych postrzeżeń pokazuje się jak ostrożnym być należy we wnioskach, jakie z nich wyciągamy, a to z powodu nadzwyczajnego zawikłania przyczyn. Sam deszcz naprzykład, może działać trojako: raz zaciemniając powietrze, drugi raz, oziębiając je, nakoniec nasycając je wilgocią.

§ 664. Ruchy spostrzeżone w pręcikach i słupkach musiały szczególniej zwrócić na siebie uwagę badaczów, ponieważ połączone są z aktem zapładniania, które ułatwiają, zbliżając do siebie narzędzia piciowe i rozpraszając pyłek. W rzeczy samej, w wielu kwiatach ruchy te odbywają się bardzo wyraźnie w czasie tego aktu, tojest w czasie otworzenia się kwiatu; w początku zaś nie mają miejsca, a po okwitnieniu ustają, i ani wprzód, ani potem nie można ich już wywołać. Pręciki zbliżają pylniki do znamienia, zakrzywiając swe nitki. Widzieć to można w wielu kwiatach, naprzykład w rucie, z ośmiu jęj pręcików, ułożonych we dwa rzędy, zewnętrzne naprzeciw płatków leżące nasamprzód się zachylają, wewnętrzne zaś nieco później. Najwyraźniej zjawisko to daje się widzieć w dziewięciorniku (*Parnassia*); pięć bowiem jęj pręcików zachyla się na wewnątrz i dotyka znamienia, jeden po drugim, jak gdyby zachowując porządek swego osadzenia; dziesięć pręcików jednego z łomikamieni (*Saxifraga tridactylites*) czyni podobnie, zachylając się po parze na raz.

Niekiedy znowu sama szyjka zachyla się ku ruchomym pręcikom, jak w męczennicach, niektórych wiesiołkach i ciernicach, w czarnuszce zwyczajnej i t. p. Czasem nawet daje się widzieć znaczne zбочzenie szyjki, która skłania się ku pręcikom innego kwiatu, up. w jednym z gatunków rodzaju *Collinsonia*.

Niekiedy nakoniec obadwa te ruchy mogą się odbywać razem; znamię i pylnik zbliżają się wzajemnie ku sobie, w skutek jednoczesnego lub niejednoczesnego zachylenia szyjki i ni-

tek; np. w ślazach i innych kwiatach z rodziny ślazowatych, w wiesiołkach, i t. p.

Najczęściej ruch rzeczony raz tylko w życiu kwiatów się odbywa, rzadziej daleko zdarzy się widzieć aby się ponawiał kilkakrotnie. Czyliby przeto można porównać go z ruchem liści i płatków? *Medicus* spostrzegł, iż w *Boerhavia diandra*, ruchy te zmieniały się w różnych porach dnia i w nocy, tak, że słupek leżący z rana na brzegu kwiatów, wznosił się około 10 lub 11 godziny ku środkowi, dopóki znamię nie napotkało którego z pylników; wieczorem zaś przeciwnie, pręciki, leżące z boku, wznosiły się, idąc na spotkanie słupka. W tym więc razie zachodzi pewien związek pomiędzy ruchem narzędzi kwiatowych, a światłem, które wywiera na nie wpływ swój, tak ważny dla większej części zjawisk życia roślinnego.

§ 665. Jednakowoż i inne działacze mogą wywołać ruchy, o które nam tu idzie, i to właśnie stanowi jedno z najbardziej zadziwiających a zarazem najmniej dotychczas objaśnionych zjawisk. Mówimy tu o ruchach mniej więcej nagłych, wywołanych dotknięciem ciała zupełnie obcego. Od wielu wieków, znanym jest ruch nitki pomurniku (*Parietaria*), który powstaje za ich dotknięciem, i w skutek którego pylniki pękają. Dotknawszy, choćby najbliższej nasady nitki kwaśnicy (*Berberis*), takowe zachylają się natychmiast ku środkowi, jak gdyby po spuszczeniu sprężyny; pylniki dotykają znamienia, poczem cały pręcik przybiera znowu zwolna dawne położenie; doświadczenie to można kilka razy na jednym kwiecie powtórzyć. W czystkowatych (*Cistineae*) i w rodzaju *Sparmannia*, zadrażnienie nasady nitki, wywiera skutek zupełnie przeciwny, albowiem pręciki odskakują od wewnątrz na zewnątrz, oddalając się tym sposobem od słupka; później jednakże wracają doń z tém większą siłą, tak jak sprężyna, którą odgięto w stronę przeciwną jej kierunkowi. W stroiczkach (*Lobelia*), konitrudzie, goryczkach, znamiona zadrażnione obcym bodźcem poruszają się, a dwie blaszki znamienia wielu trąbek (*Bignonia*) (fig. 396), oddzielone w czasie kwitnienia, zbliżają się w takim razie do siebie. Znamię rośliny *Ruellia anisophylla* zgięte w jednym kierunku, po zadrażnieniu prostuje się, a potem zakrzywia w kierunku odwrotnym, i styka się przeto z włosami zbieraczami korony, obciążonemi pyłkiem. W słupkach nitki zrosnięte ze szyjką tworzą słupek, zwykle zagię-

ty na zewnątrz kwiatu, lecz który się podnosi nagle, skoro go tylko dotknijemy w zgięciu. Kwiateczki ostów i innych roślin do tej samej rodziny należących, przedstawiają za dotknięciem rodzaj wahania, które zawisło od ściągania się włókna nitek osadzonych na wprawionej tém samém w ruch koronie.

Pobudzenie to, wywołane w powyższych przypadkach sztuką, objawia się częstokroć w przyrodzie przy poruszeniu powietrza, lub za uderzeniem przez drobne, w niém unoszące się ciała, szczególnie zaś w skutek zadrażnienia przez owady siadające na kwiatach i poruszające się w nich, celem wyssania soków pylników i znamion. Niekiedy nawet ruch powstaje bez widocznego zadrażnienia, np. w słupięcie, około południa w czasie znacznych upałów; wtedy jednakże jest daleko wolniejszy i więcej prawidłowy.

§ 666. W liściachto szczególnie badano ruchy, wywołane bodźcami zewnętrznymi; powszechnie znany czulek zwyczajny (*Mimosa sensitiva*), trzyma niezawodnie pod tym względem pierwszeństwo. Dwa razy pierzaste jego liście, składają się z ogonka głównego, prawie wzniesionego, tudzież czterech ogonków drugiego rzędu, z których dwa nachylone ku sobie są osadzone na kończyńie pierwszego, dwa zaś inne leżą nieco niżej i rozchodzą się prawie pod kątem prostym; kaźden z nich nosi na sobie przeszło 20 par listków maleńkich, prawie poziomych. Nasada ogonków i listków jest stawowata i nabrzmiewa w ciałko komórkowe, ku obwodowi którego rozrzucone są wiązki naczynne. W ten sposób ułożone są części wystawione na działanie światła. Poruszywszy dość mocno roślinę, spostrzeżemy, iż natychmiast listki wzniosą się nieco na ukos, tak, iż powierzchnie górne kaźdej pary zetkną się z sobą, a wszystkie listki leżące w jednym rzędzie, układają się dachówkowato jeden na drugim od dołu do góry; następnie ogonek wspólny opuszcza się na dół, a nakoniec cztery ogonki cząstkowe nachylają się ku sobie, i przybierają tém samém kierunek mniej więcej równoległy względem ogonka głównego, na którego kończyńie są jakby zawieszzone. Jestto właśnie położenie, jakie liście przybierają we śnie. Jeśli zamiast poruszenia rośliny, dotknijemy jednego tylko listka, albo co lepiej jeszcze, nabrzmiałości jego nasady, listek wzniesie się, jakby do snu; następnie listki sąsiednie, czynią też samo, jeden po drugim. Jeśli to był jeden z listków par niż-

szych, wznoszenie się postępuje z dołu do góry, jeśli z wyższych, z góry na dół. Drażliwość jest tém większa, im młodszą i silniejszą jest roślina, im piękniejsza pogoda, tudzież mi powietrze jest cieplejsze, przy pewnym jednak stopniu wilgoci. Przy połączeniu tych wszystkich warunków, najłżejsze trącenie, podmuch, obecność najmniejszego owadu, wywołują rzeczne zjawiska, a to zawsze w stosunku zadrażnienia; jeśli wtedy zadrażnienie jest dosyć mocne, ruch udziela się nie tylko listkom sąsiednim względem tego, który został dotkniętym, lecz od ogonka cząstkowego tychże, przechodzi do trzech innych ogonków, dalej do ogonka głównego, a częstokroć nawet z dołu do góry, do innych liści téj samej gałązki. Przyrodzenie ciała wstrząsającego, zdaje się być bez wpływu. Nie samo jednak mechaniczne zadrażnienie wywołuje ruchy, podobny bowiem skutek ma i zadrażnienie chemiczne, jak się o tém przekonać można, umieściwszy kropelkę mocnego kwasu na listku tak daleko, aby się tenże nie poruszył, lub téż sknipywszy za pomocą szkła w jeden punkt promienie słoneczne. Z łatwością naówczas będziemy mogli śledzić szereg zmian, następujących po sobie z wolna, lecz ogółowo. Nie wszystkie punkta są jednakowemi przewodnikami zadrażnienia, jakieśmy o tém już wspomnieli, zalecając pod tym względem szczególniej nabrzmiałości stawów, chociaż i w tych ostatnich, nie wszystkie punkta są równie czułe. I tak, dotykając nasady ogonka w części wyższej, nie spostrzegamy żadnego ruchu; dotykając jej zaś u samego dołu, widzimy iż ogonek natychmiast się pochyla.

§ 667. Przytoczyliśmy czułek zwyczajny, jako najbardziej uderzający przykład ciekawej własności, o której mowa. Inne rośliny do tego samego rodzaju (*Mimosa*) lub do téj samej rodziny (strąkowych) należące, posiadają téż własność w wysokim także stopniu chociaż mniej od tamtej. Podobnież ma się z wielu roślinami należącemi do rodzin wcale różnych, jak np. z wielu szczawikowatemi (*Oxalideae*), tudzież szczególniejszą rośliną zwaną *muchołówką* (*Dionaea muscipula*), której liść zaginając się za dotknięciem, w nerwie środkowym, więzi tym sposobem owady siadające na nim. Zdaje się zresztą, iż drażliwość ta daleko jest powszechniejszą w roślinach, niż dawniej sądzono i że dlatego tylko w wielu roślinach, nawet najpospolitszych uchodzi naszej baczności, że jest daleko po-

wolniejszą i słabszą, tudzież, że zadrażnienie daleko silniejsze nawet, może w nich wydać skutek daleko mniej uderzający. Liście gatunków szczawiku rosnących w średniej Europie (*Oxalis stricta, corniculata*); w daleko zaś niższym stopniu w naszym szczawiku pospolitym (*Oxalis acetosella*) uderzane zlekka, lecz wielokrotnie, przybierają w ciągu jednej lub dwóch minut położenie senne: ogonki bowiem cząstkowe zwieszają się, a każdy z listków, odgina się nieco, po bokach, a składa wzdłuż nerwu głównego. W grochowniku amerykańskim (*Robinia pseudo-acacia*) liście mocno poruszone przybierają po jakimś czasie takie położenie, jakie mieć zwykły w porze nocnej. Być może, iż szczególnie pozór, jaki wiele z roślin naszych przybiera w czasie wielkich wiatrów, zależy od podobnych zmian, wywołanych gwałtownymi i licznymi wstrząśnieniami, których roślina podówczas doświadcza.

§ 668. Wszystkie ruchy dotąd wspomniane, są przepuszczone, to jest objawiają się w pewnych tylko chwilach, czyli to dnia, czyli życia rośliny, albo też wywołane zostają przez przyczynę obcą i wiadomą. Są jednakże, jakkolwiek w bardzo tylko szczupłej liczbie roślin, ruchy, które, jako zupełnie dowolne i ciągłe, zasługują na oddzielną wzmiankę i wymagają osobnego badania. Sposprzegamy je w niektórych zwrotnikowych gatunkach rodzaju *Desmodium* (połączone dawniej z rodzajem *Hedysarum*), a szczególnie w sparcecie ruchawej (*Desmodium gyrans*). Liście tej ostatniej składają się z trzech listków: z tych końcowy, duży, ulega tylko zmianom snu i czuwania; dwa zaś boczne, maleńkie, są, w czasie ciepłej pogody, w ciągłym ruchu, nieustannie bowiem zbliżają się do ogonka głównego i oddalają od niego, wznosząc się i nachylając naprzemiany. Ruch ten nie przerywa się i w nocy. Przyglądając się uważniej sposprzegamy, iż listki osadzone są na nabrzmiałych ogonkach, które właśnie zakrzywiają się w tę i w ową stronę naprzemiany, skręcając się nieco, zaginając ku wewnątrz, potem prostując się i znowu zaginając ku zewnątrz, w któreńto położeniu najczęściej zatrzymywac się zwykły. Sama blaszka nie porusza się wcale, lecz ciężąc na dół własnym ciężarem, robi wyraźniejszym ruch ogonka, na którego kończynie się kołysze. Widzimy tu przeto nowy skutek zakrzywiania się, które jak

się zdaje zależy od wpływu światła, od oddychania i parowania listków. W rzeczy samej nie ulega wątpliwości, iż ruchy listków wolniej widocznie, a nawet częstokroć zatrzymują się w ciemności; że dalej, ożywają się i podnoszą przy świetle, bądź sztuczném, bądź przyrodzoném. Pociągając powierzchnią blaszki cienką warstewką gummy, która tamuje czynność listków, bo je czyni nieprzepuszczającymi, zawieszamy owe ruchy; jeśli zaś po jakimś czasie rozpuścimy gumę w wodzie, ruchy częstokroć wracają. Uciawszy blaszkę tak, iż mała tylko jej część u dołu pozostanie, ta poruszać się będzie dość długo, później jednak ustaje; ruch zaś listka naprzeciwległego trwać będzie ciągle. Przeciawszy blaszkę wzdłuż na dwie połowy, obiedwie ruszać się będą, dopóki nie poschną. Całe więc zjawisko nie różni się tak bardzo, jak się na pierwszy rzut oka zdawało, od ruchów dziennych innych roślin; być może iż sama małość blaszek w stosunku do ogonków, sprzyja tu widoczniejszemu objawieniu się ruchu, który nie może być tak uderzającym w roślinach, przedstawiających przy podobnej budowie, inne stosunki wielkości.

§ 669. Spostrzeżono także ruch ciągły w niektórych kwiatach, jak np. w kilku storczykowatych (*Pterostylis*, *Megacelinium falcatum*), a mianowicie w jednej z sześciu podziałek ich okwiatu, odznaczającej się odrębnym kształtem i zwanej warzką (*labellum*). Podziałka ta łączy się z resztą kwiatu za pośrednictwem stawowatego zwężenia, odpowiadającego poniekał ogoneczkowi w listkach sparcecy ruchawej. W rzeczy samej, zwężenie to nitkowate, wznosząc się i zniżając naprzemian w pewnych prawidłowych przestankach, sprawia poruszanie się blaszki na niem siedzącej.

§ 670. Przytoczyliśmy powyżej wszystkie główne przypadki ruchów roślinnych. Widzieliśmy, iż większa ich część zależy od zakrzywiania się, którego mechanizm, da się pojąć i objaśnić do pewnego stopnia. Lecz cóż nadaje popęd temu mechanizmowi? Nie ulega wątpliwości, iż zmiany światła, wydając inne, odpowiednie zmiany w sposobie odbywania się czynności części młodych, giętkich i soczystych, mogą wpływać o rozmaitej porze dnia, na stosunek płynów w komórkach; ponieważ zaś napełnianie się tychże sokami, wraz z różnym stosunkiem wielkości pojedynczych komórek, spowodowują zakrzywianie się tkanek w tę lub ową stronę, nietrudno za-

tém zdać sobie sprawę ze zjawisk snu i czuwania roślin. Łątwo także pojąć, jakim sposobem zadrażnienie silne i pewien przeciąg czasu trwające, może spowodować przyływ soków, napełnienie komórek i zakrzywienie, które za nim idzie.

§ 671. Niemniej jednakże wiele jeszcze innych faktów nie jesteśmy w stanie objaśnić. Rośliny czułe, umieszczone w zupełnej i ciągłej ciemności, powinnyby pozostać w stanie równowagi i spoczynku, w stanie snu, lub przynajmniej pół-snu, ponieważ czynności ich, jeśli nie zupełnie wtedy są przerwane, przynajmniej odbywają się bardziej jednostajnie. A przecież, rośliny chociaż otoczone warunkami niezmiennymi, któreby winny sprowadzić stan również nieulegający zmianom, odzyskują wkrótce swoje zwyczaje, ulegając im tylko z mniejszą prawidłowością (§ 657). Z drugiej strony, widzieliśmy, że są ruchy, powstające w skutek wpływu bodźców zewnętrznych, a to tak szybko, iż nie można przypisywać ich napływowi soków, bo takowy wymagałby więcej czasu, aby mógł sprowadzić tak uderzające zmiany położenia, jak np. w czułku zyczajnym. Wprawdzie zmiany te, mogłyby prędzej nastąpić przez równoważenie się gazów, do którego téż ucieka się Dutrochet przy objaśnieniu niektórych zjawisk zakrzywiania się części roślinnych; w takim atoli razie, musielibyśmy nasamprzód dowieść i ciągłej obecności gazów na drogach, jakie im przyznajemy, i możności nagłego ich wywiązywania się w skutek zewnętrznego zadrażnienia.

§ 672. Niektórzy badacze przyrody, uderzeni niedostatecznością objaśnień mechanicznych i fizycznych we względzie ruchów roślinnych, przyjmują w roślinach pierwiastek odpowiadający poniekąd pobudzalności zwierzęcej. Opierają oni się na szybkości, z jaką zadrażnienie przenosi się niekiedy z jednego punktu rośliny na drugi mniej lub bardziej od niego oddalony, jakby przez rodzaj sympatyji; na tém, że pobudzalność daleko jest większą w częściach młodych i pełnych życia, a łepiej z wiekiem i znika w częściach starych; że będąc wywołaną silnie i wielokrotnie raz po raz, słabiej i znika, i dopiero po dostatecznym przestanku zjawia się znowu i ożywia; opierają się dalej na koniecznej potrzebie następstwa snu po czuwaniu, snu który przywracając równowagę w czynnościach, daleko jest potrzebniejszy, a zarazem głębszy w młodości części roślinnych, z wiekiem zaś traci na długości i na-

tężeniu i zamienia się w starość w rodzaj pół-snu ciągłego: na instynkcie nakoniec niejako, z jakim części roślinne przybiérają położenia lub kierunki sprzyjające wygodnemu odbywaniu się czynności przyrodzonych, tudzież zadosyć uczynieniu potrzebom tychże części, które nawet, dla dopięcia swego celu, przewyciężają zawady im stawione. Badacze ci sądzą, że we względzie dopiéro co wymienionych okoliczności, rośliny zachowują się zupełnie tak jak zwierzęta niższego rzędu; oprócz więc sił mechanicznych i fizycznych, jako tylko wykonawczych, przyjmują jeszcze siłę żywotną, która tamte w ruch wprawia. Na poparcie swego mniemania, przytaczają oni także działanie środków narkotycznych, które wessane przez roślinę, zwalniają a nawet zawieszają jej ruchy, podobnie jak u zwierząt. Lecz ostatni ten dowód traci swą siłę w skutek innych doświadczeń, przekonywających, że i inne istoty wyciągowe, zupełnie niewinne, wprowadzone w roślinę, tłumią w niej również pobudzalność, a tém samém, że przerywają zjawiska życia nie jako trucizny, lecz wprost jako związki obce. Inny znowu zarzut stanowi ta okoliczność, że sen rośliny nie sprowadza stanu ogólnego zwolnienia, jak się to dzieje w zwierzętach, ale owszem stan wytężenia, przeciwnego wprawdzie temu, jaki widzimy w czasie czuwania, ale równie, a czasem bardziej jeszcze wydatnego, jak np. w liściach, które wznoszą się podczas nocy. Części roślinne w tym stanie opierają się wpływowi usiłującym zmienić nowe ich położenie, i nawet łamią się niekiedy, a nie przyjmują innego.

§ 673. W jakiz zresztą sposób udzielałby się mogło zadrażnienie? Jedni sądzą, że przez włókna, inni że przez tkankę komórkową, inni nakoniec, że przez zawartość komórek, włókien lub naczyń. Lecz doświadczenia mające dowodzić, że się to dzieje na téj lub owéj drodze, przeciwią się jedne drugim; nadto w roślinach najczulszych znajdujemy też same żywioły i zupełnie tak samo ułożone, jak w roślinach wcale nieczulszych; zawartość ich wydrzeń jest także ta sama; a przypuściwszy że w pewnych okolicznościach, skrobia, zielen, lub inne istoty równie powszechnie w roślinach znajdujące się, mogą być przewodnikiem zadrażnienia, musielibyśmy znów dochodzić, dłaczego wtedy posiadają własności zupełnie nowe, na którym im zazwyczaj zbywa i które zmieniałyby je

w ciała zupełnie innego przyrodzenia. W zwierzętach wiadomo, która tkanka odbiera wrażenia i takowe przenosi, która kurczy się odbierając je i wydaje tym sposobem ruchy; w roślinach skutek tylko nam jest znajomy i niektóre z przyczyn podrzędnych.

§ 674. Wprawdzie, przyrodzenie niektórych istot umieszczonych na ostatnim szczeblu państwa zwierzęcego jest dla nas także wątpliwé; lecz cóż można wyczerpać z jednej zagadki dla rozwiązania tém drugiej? Zresztą, wyznać musimy, iż niepodobna uchwycić różnicy obudwu państw pomiędzy sobą. Opisaliśmy powyżej (§ 470) ciała napelniające komórki wydatek, tudzież punkt niektórych wodorostów (§ 606), ciała z postaci i ruchów podobne do wymoczków. Widzieliśmy, że zarodniki poruszają się za pomocą rżęs drgających, a które są również narzędziami ruchu tych żyjatek. A jednak w tych nawet przypadkach światło zdaje się wywierać wpływ na objawienie się życia, ponieważ w pewnych tylko godzinach dnia dostrzedz można ruchów owych, zupełnie zwierzęcych, w innych zaś rzeczony ciała są nieruchome, zachowują się jak roślina, z których zresztą piętnami się rozwinęły. Wspomnijmy tu jeszcze o wodorostach zwanych węznicami (*Oscillatoriae*): wietkie nitki, które je tworzą, złożone z komórek końcami z sobą zrośniętych, krótkie i wydęte, zginają się w jedną i w drugą stronę jak palec. Drganie to, powolne lub niekiedy nagłe i z peryodycznymi wstrząśnieniami połączone, odbywa się na wolnym ich końcu, opatrzonych częstokroć wiązczką maleńkich, niekształtnych, śluzowatych nitczek. Drugim końcem zlepione są w wielkiej liczbie z sobą, tworząc ciało wspólne, z którego wychodzą promienisto kończyny ruchome (§ 674). Przybywszy do granicy na której obadwa państwa zdają się łączyć z sobą, ujrzemy niedostateczność określeń, które nam służyły za punkt wyjścia przy odróżnieniu roślin i zwierząt, i które zasadzały się na niedostatku uczucia i ruchu w jednych a obecności tychże w drugich (§ 1). Możnaż z pojęć obszerniejszych, wyłożonych w ciągu niniejszego dzieła, wyciągnąć określenie ściślejsze?

§ 675. Niegdyś znajdowano je w chemicznym składzie tkanek, potrójnym u roślin, poczwórnym zaś u zwierząt, gdzie obok kwasorodu, wodorodu i węgla znajdował się jeszcze saletroród. Widzieliśmy jednak powyżej (§ 296—305),

iż saletroród istnieje i w związkach roślinnych. Jeśli wszelako ograniczymy się na samym wątku tkanek, różnica powyższa utrzyma się w rzeczy samej. Istota bowiem, która pod postacią komórek, włókien lub naczyń stanowi niejako zasadę rośliny, która tworzy okrywę a poniekąd laboratorium dla wszelkich innych wytworów, jest zawsze jednakową, jest związkiem potrójnym, któryśmy poznali pod imieniem błonnika roślinnego (§ 299). Przeciwnie, włókno zwierzęce, najstaranniej oczyszczone, zawiera zawsze pewną ilość saletrorodu. Na tym odmiennym składzie zasadza się większa część piętn odróżniających błonę roślinną od zwierzęcej. Pierwsza, rozkładając się, daje związki i pozostałości kwaśne, spalona zaś, daje kwas octowy i resztę węglistą, nie tracącą kształtu; roztwór wodny jodu nie barwi jej wcale; rozcieńczony roztwór sody i potażu mało, a kwas solny, octowy i garbnikowy wcale na nią nie działa. Druga przy rozkładzie daje związki i pozostałości kwaśne i ammoniakalne, spalona daje węgiel ammoniakowy i resztę węglistą ponadymaną; barwi się na żółto od jodu; roztwarza się w sodzie, potażu i ammoniak, w kwasie solnym i octowym; kureczy zaś od kwasu garbnikowego łącząc się z nim ściśle. Oto są piętna odróżniające, uzasadnione należycie licznymi pracami Payen'a.

Jeżeli jednak, zamiast badania błon roślinnych i zwierzęcych po odłączeniu od innych istot napełniających ich wnętrza i przestwory, tudzież przenikających je najczęściej, zechcemy uważać je razem z temi związkami, tak jak tworzą całość ciała ustrojnego, szczególnież za życia; naówczas skład i własności chemiczne nie dostarczą nam już ogólnych piętn odróżniających. Z jednej bowiem strony, w komórkach roślinnych znajdujemy związki poczwórne, podobne do istot zwierzęcych, a niekiedy tożsame, z drugiej zaś niektóre twory czysto kruszcowe (§ 314).

§ 676. Inną znowu różnicę zasadzano na sposobie żywienia się. Zwierzę żywi się samemi cząstkami ustrojowemi, roślina samemi nieustrojowemi.

Wyznać jednak należy, iż jakkolwiek piętna powyższe nie tylu ulegają wyjątkom, jak te, których użyliśmy na początku dzieła, ztémwszystkiem, równie są niepewne jak tamte, ilekroć zastosować je chcemy do jestestw położonych na granicy obu królestw. Payen przekonał, że ciała roślinne,

obdarz  
zaplo  
skład  
zwier  
domys  
dy kie  
tylko  
Co  
czyw  
posia  
ostat  
jają v  
mi us  
§ 6  
z dos  
cza w  
na wie  
samyc  
się nie  
mi. T  
nia pra  
stwa  
wzglę

obdarzone ruchem jak się zdaje dowolnym, jakoto: ziarenka zapłodniku (*fovilla*), bryłki zawarte w rurkach ramienicy, it. p. składają się ze związków poczwórnych, tak samo jak istoty zwierzęce. Tego samego składu można się przez podobieństwo domyślać w zarodnikach wodorostów, które wszakże już wtedy kiedy się poruszają, stanowią całe roślinki, rozwijające się tylko w dalszym ciągu.

Co się tyczy żywienia się tych drobnych jestestw, tego rzeczywiście nie znamy dokładnie. Nie wiemy, czyli zarodniki posiadające pozór wymoczków, inaczej się zachowują od tych ostatnich; i czyli woda w której wszystkie te ciała się rozwijają wchodzi w jedne czystą, a w drugie nasyconą cząsteczkami ustrojowemi?

§ 677. Wynika ztąd, że porównyując doskonale rośliny z doskonałemi zwierzętami, ilość różnic jest wielką i dostarcza wątku do otworzenia określeń dokładnych, zasadzonych na wielu piętnach. Zstępując do tworów różnych, a nawet do samych tylko części roślin i zwierząt, określenia owe stają się niedokładnemi, przypuszczalnemi tylko, lub wcale błędnemi. Tak więc, niemożność zakreślenia granicy, i ustanowienia prawidła bez wyjątków, zdaje się dowodzić jedności państwa ustrojowego, tudzież potwierdza, w tym przynajmniej względzie, ów pewnik Linneuszowski: *Natura non facit saltus*.

## UKŁADNICTWO I RODZINY.

§ 678. Rzuciwszy okiem na rośliny nas otaczające, widzimy w każdej z nich *osobnik (individuum)*. Sama ta nazwa oznacza całość osobną, złożoną z części powiązanych z sobą bez żadnej przerwy. Pozór może nas częstokroć ludzić ukazując nam od zewnątrz rośliny wrzкомо oddzielne, gdy tymczasem one należą do wspólnego, pod ziemią ukrytego szczeput. Tak np. korzeniaki turzycy piaskowej (*Carex arenaria*) przebiegają dość znaczne odległości, wypuszczając w pewnych odstępach łodygi, które się wznoszą ponad ziemią i zdają się być tyłuż oddzielnemi osobnikami, chociaż rzeczywicie są tylko częściami jednego i tegoż samego osobnika. Jasną jest rzeczą, iż wszystkie te wypustki podobne są bardzo do siebie, tak dalece, iż uważając je nawet błędnie za tyleż oddzielnych szczeputów, nie wahamy się jednak uznać w nich téjże samej rośliny i nazwać jedném imieniem.

§ 679. **Gatunki** (*Species*). Konieczne owo podobieństwo pojedynczych odrósłi jednego osobnika, może istnieć także pomiędzy wielu osobnikami rzeczywicie oddzielnemi. Niwa żyta lub owsa przedstawia nam tysiące osobników, które z łatwością możemy oddzielić, lecz których nie zdołalibyśmy odróżnić od siebie. Na polu, w ogrodach, napotykamy tu i owdzie rośliny, które bez wahania się oznaczamy tém samém nazwiskiem. Zbiór wszystkich osobników tak do siebie podobnych, otrzymał w naukach przyrodzonych nazwę *gatunku*; wspólne ich piętna, których ogół odróżnia je od innych, zowią się *gatunkowemi*. Wiemy nadto, iż oddzielając odrósłe jednego osobnika, lub zasiewając jego nasiona, otrzymamy tyleż osobników podobnych do pierwszego. Wiadomość ta uzupełnia określenie gatunku, będącego zbiorem wszystkich osobników bardziej podobnych do siebie niż do innych, i które rozradzając się wydają takie same rośliny; tak, iż sądząc wedle podobieństwa, uważać je można za pochodzące pierwotkowo od jednego osobnika.

§ 680. **Odmiany** (*Varietates*). Jednakże to bratnie podobieństwo, może mieć różne stopnie. Jeśli dwa nasiona, wzięte z jednego owocu, zasiane zostaną w różnej ziemi, w różnym klimacie, w różnych porach; dwa szczepy rozwijające się pod odmiennymi okolicznościami, wskażą ową różnicę warunków ich żywienia, niejakiem podobieństwem do siebie, które tém będzie wydatniejsze, im przyczyny jego były liczniejsze i silniejsze. Niepodobna tu rozbiierać wszystkich odmian, jakim gatunki ulegać mogą pod wpływem różnych przyczyn, a które jednak przewidzieć można do pewnego stopnia, znając budowę, rozwijanie się i sposób żywienia różnych narzędzi. Uważmy tylko, że odmiany te są tém częstsze im do mniej ważnego narzędzia się ściągają, tudzież im mniej są ważne same przez się. Tak np. zmiany barwy, a szczególnie przejście jednej w drugą, obecność lub nieobecność włosów, tkanka zbita lub wietrza daje się dość pospolicie spostrzegać w jednym i tym samym gatunku, a nawet, co większa, w jednym i tym samym osobniku, jeśli warunki pod jakimi się znajduje zostaną zmienione: sato wtedy proste *zbożenia* (*variationes*). Kiedy zaś zmiany są głębsze i trwalsze, biorą imię prawdziwych *odmian* (*varietates*). Odmiany utrzymują się stale niejako w pewnej liczbie osobników i mogą posłużyć do odróżnienia ogółu tychże, od innych osobników tegoż samego gatunku, lubo nie tak wyraźnie jak się jeden gatunek od drugiego odróżnić daje.

Widzieliśmy dopióro, że zboczenie przypadkowe i osobnicze, może zniknąć w tym samym nawet osobniku, który mu uległ, wraz z przyczyną, która je spowodowała. Niekiedy zaś skutek trwa nawet po usunięciu przyczyny, i osobnik zachowuje przez całe życie piętna zboczenia. Zboczenie to może nawet być jeszcze trwalszém i odradzać się we wszystkich osobnikach, otrzymanych z pierwszego, przez zrazy, sadzonki, lub oślaki. Lecz posiadwszy nasiona jego, nowe ztąd powstałe osobniki nie posiadają już tych piętn i są zupełnie podobne do osobników gatunku pierwotnego.

Nakoniec bywają odmiany, których zarodki zachowują i odradzają piętna osobnika na którym powstały. Takie dziedziczne odmiany zowią się często *podgatunkami* (*rasami*).

Ważną przyczyną powstania odmian, jest mieszanie się z sobą gatunków, czyli upłodnienie osobnika jednego, przez oso-

bnika innego gatunku, które następuje wtedy, kiedy pyłek jednego padnie na znamię drugiego. Mieszanie się to nie może przyjsć do skutku, jeśli rośliny są bardzo różne od siebie, lecz jest niezaprzeczonem pomiędzy roślinami gatunków bardzo blizkich lub różnych od siebie; nasiona, chociaż zazwyczaj w takich razach płonieją, niekiedy jednakże są płodne. Roślina powstająca z nich musi rozumie się przedstawiać piętna pośrednie pomiędzy owemi dwiema, które jej dały początek, i znowu w porównaniu bądź z jedną, bądź z drugą musi przedstawiać różnice, które jej nadają postać odmiany. Lecz do której z tych roślin liczyć ją należy? Jeśli do jednej mniej jest podobna niż do drugiej, przyłączmy ją do téj z którą ma więcej wspólnego; jeśli zaś nie, oznaczmy ją wprost tylko jako mieszańca. Lecz po kilku pokoleniach, rysy jednej z roślin macierzystych stają się coraz wydatniejsze, szczególnie, jeśli mieszaniec upłodnionym zostanie przez jeden z gatunków pierwotnych; łatwo pojąć, że tym sposobem, dojść można do odmiany dokładnie oznaczonej. Jednakże mieszańce są bardzo rzadkie w przyrodzie, gdzie gatunki najbliższe pod względem piętn, rzadko w bliskości siebie rosną. W ogrodach zaś, szczególnie botanicznych, gdzie przeciwnie idzie o to, aby posiadać zbiór gatunków najbardziej do siebie podobnych, mieszania się są daleko częstsze i liczniejsze.

W hodowaniu roślin korzystamy z tych wszystkich okoliczności, w celu otrzymania licznych odmian, a to zmieniając warunki żywienia roślin, zachowując i pomnażając płody ztąd powstałe, rozsiewając ich nasiona, ulepszając je przez nowe mieszanie. Ztądto owa zadziwiająca ilość odmian niektórych kwiatów i owoców poszukiwanych od człowieka. Gatunek obrobiony tym sposobem przez wiele pokoleń, przedstawia się nam w szeregu odmian, w których pierwotne jego rysy zmienione stopniowo i z różnemi odcieniami, niełatwo dają się poznać, tém bardziej, że wiele z tych rysów bywa pożyczanych od innych gatunków: wypadek ten nieoszacowany dla uprawiaczy, dla botaników jest bardzo niedogodnym. Lecz, jeżeli niektóre domowe rośliny wymagają tak zawikłanych badań, to liczba ich nie jest wielka, a największa część gatunków dziko rosnących zachowuje stale nietknięte swe piętna pierwotne, które odmieniają się tylko w tak szczupłych granicach, że je łatwo możemy pochwyć i skreślić; przeto obraz

każdę z takich roślin, obraz tak podobny, iż ją będziemy mogli poznać wpośród licznych. Tam to odszukać można wzorów pierwotnych, niektórych roślin przekształconych i zeszcpeconych niezliczonymi ogrodowymi odmianami, a z pomiędzy których dosyć jest przytoczyć georginy, babiskęsy (*Calceolaria*), pelargonie i t. d. Badanie ich przedstawia prawdziwy odmęt i mało jest zajmującym pod względem botanicznym. Byłoby ono ważniejszem dla fizjologii, gdyby uprawiać mógł dociec jakim sposobem przypadek przywiódł go do celu o którym nie wiedział naprzód.

§ 681. **Rodzaje (*genera*).** Gdyby liczba gatunków była bardzo tylko szczupłą, moglibyśmy bez wielkiej trudności spamiętać opis i nazwisko, jakie każdemu z nich nadanem zostało. Tak też bywa rzeczywiście w owych czasach i u tych ludów, gdzie badania botaniczne ograniczają się na odróżnieniu główniejszych roślin w jakim niewielkim kraju rosnących, z zaniechaniem tych, które nie zwracają na siebie uwagi wymiarami swemi, kształtem, świetnością, użytkowaniem, lub inną uderzającą własnością, równie jak tych, które zamieszkują obce okolice. W takim stanie rzeczy nazwiska roślin poznają się podobnie jak inne wyrazy mowy pospolitej, bez stałego porządku tak, jak je przedstawia przypadek lub potrzeba; określania ich dzieją się za pośrednictwem piętn rzeczywistych lub urojonych, które na nie zwracają uwagę. Dlatego w najdawniejszych pismach o historii przyrodzonej, widzimy przedstawioną pewną liczbę gatunków, których uporządkowanie i opisy, nie opierają się na żadnej stałej zasadzie, i których raczej własności i użytki, niż piętn rozpoznawcze przez pisarzy były kręślone; te ostatnie uważano zapewne za zbyt czne, ponieważ samo imię upowszechnione owych roślin, dostatecznym zazwyczaj było do ich poznania.

W czasie odradzania się nauk, badanie pisarzy greckich i łacińskich, w których sądzono, iż można znaleźć wszystko, zajmowało wszelkie usiłowania uczonych; botanika ograniczała się zrazu na długich i mozolnych objaśnieniach Teofrasta, Pliniusza i Dioskorydesa. W końcu poznano, że do zrozumienia dzieł tych pisarzy o historii przyrodzonej, ważnej pomocy dodałoby badanie samych istot przyrodzonych; rozbiéranu więc takowe obok dzieł owych, starano się objaśnić je nietylko piśmem, ale później nieco i rysunkiem. Upór z jakim usiłowano

odnosić do owych podań ojców botaniki, rośliny znajdujące w krajach po największej części różnych od tych, które im dostarczały materiału, stał się bez wątpienia przyczyną wielu błędów; wszelako pociągnął on za sobą poznawanie samychże roślin, lubo często błędnie ponazywanych; odróżniono ich daleko więcej, niż wzmiankowała starożytność, co poznawszy, podwojono poszukiwania, i pomnożono przez to ilość roślin znanych, tak dalece, iż nakoniec dał się uczuć ciężar tego natłoku nowych bogactw. Rozmaitość przedmiotów i nazwisk zaczęła przechodzić siły pamięci ludzkiej.

§ 682. Potrzeba natenczas było przyjść jej w pomoc, ustanowieniem pewnego porządku w tym odmęcie; a jak zrazu łączono wszystkie podobne do siebie osobniki w jeden gatunek, tak starano się teraz, wszystkie gatunki posiadające niejakie między sobą podobieństwo, a na którym innym zbywało, podciągnąć pod jedno nazwisko i wspólne określenie. Tym sposobem z wielu takich jedności, nazwanych gatunkami, tworzone jedności wyższego rzędu, którym dano imię *rodzajów*. To łączenie wielu gatunków w jeden ogół, jest wrodzonym działaniem umysłu, lubo w niższym stopniu niż łączenie z sobą osobników. Dawni pisarze przedstawiają gdzieniegdzie przykłady tego, a imiona, jakie ludy nieoświecone, a nawet w pół dzikie nadają roślinom, dla których język ich posiada wyrazy, dowodzą częstokroć wspólnym zakończeniem niektórych z tychże; uczuwania związku pomiędzy przedmiotami przez nie oznaczonemi. Podobne rodzaje sprzeciwiają się bez wątpienia często naszym istotnym zasadom, równie jak rodzaje ustanowione przez pierwszych botaników. Lecz to już znaczy wiele, ustanowić jakiegokolwiek prawidła, dopatrzeć związku i z pomiędzy piętn gatunkowych, podnieść niektóre do wyższego rzędu, jako wspólne pewnej liczbie gatunków, czyli *rodzajowe*.

§ 683. **Układy i metody.** — Liczba rodzajów musiała się powiększać wraz z liczbą gatunków, a ztąd dała się uczuć potrzeba nowych podziałów, z których każdy obejmowałby pewną, określoną ilość rodzajów posiadających niektóre wspólne, a zatem ogólniejsze piętna. Nowe to działanie zakreślając obręb poszukiwaniom, zmniejsza znacznie ich niedogodności i trudności. Jeśli np. idzie bądź o znalezienie rodzaju już znanego, bądź o naznaczenie miejsca dla rodzaju nowego, nie

potrzeba już porównywać go ze wszystkimi roślinami, lecz większa ich część wyłączoną zostaje od porównywania, skoro się tylko pozna piętna ogólne, dla których roślina badana należy do téj lub owéj grupy; a działanie tym sposobem podzielone, ogranicza się tylko na rozebraniu pewnej daleko mniejszej liczby rodzajów, staje się prostszém a zarazem i pewniejszém. Oczywisty pożytek tych podziałów spowodował pomnożenie ich liczby; najogólniejsze z nich zostały znowu z kolei podzielone, a te rozdrobnione na podziały; tym sposobem otrzymano szereg grup postawionych ponad rodzajami i gatunkami, tym ostatnim kresem układnictwa.

Uporządkowanie to porównywano częstokroć z urządzeniem wojska: mała gromadka może iść bez dowódcy i porządku, którego potrzeba czuć się daje jeśli liczba żołnierzy się powiększy; naówczas dzielą ich na oddziały, kompanie, bataliony; wielkie wojska mają swoje korpusy, dywizye, pułki; kadry rozszerzają się w stosunku ich wzrastania, i tym sposobem ogromne ilości mogą poruszać się porządnie, mogą łatwo być zarządzane, a należycie oznaczone miejsce każdego żołnierza, pozwala trafić do niego, kiedy inaczej bez tego uporządkowania nie mógłby być znalezionym.

Tym sposobem powstały układy i metody w historii przyrodzonej. Trudno jest określić wyraźnie różnicę pomiędzy uporządkowaniami, oznaczonymi przez te dwa odmiennie wyrazy. Wprawdzie zwykliśmy mówić, że w układach używa się wyłącznie tylko piętn wziętych z jednego narzędzia, w metodach zaś piętn branych z wielu zarazem narzędzi. Lecz rozbiierając większą część układów, widzimy, iż do utworzenia ich użyto równie jak w metodach wielu narzędzi; z drugiej strony w metodach piętna brane z jednych narzędzi przeważają zwykle nad innymi. Tu więc używać będziemy obu tych wyrazów prawie bez różnicy.

§ 684. Najdawniejsi roślinopisarze, dzielili już małą liczbę wzmiankowanych przez nich roślin, na wiele oddziałów, lecz tylko według ich ogólnego pozoru, a szczególnieję według ich własności. W miarę zaś jak powiększano liczbę roślin znanych, i zapuszczano się głębiej w ich badanie, zaczęto w piętnach ich szukać zasady podziału; pod tym względem przytoczyć należy Cezalpina, który od końca XVI wieku używał w układzie swoim piętn branych z owoców i nasienia. Nie

będziemy tu zatrzymywać się nad temi podobnemi, a dosyć licznemi usiłowaniami, ponieważ żaden z tych pisarzy, tworzących własny układ i zastosowujących go do małej tylko liczby roślin, nie znalazł stronników, i ponieważ chcieć kręślić pojedynczo wszystkie te układy, byłoby to rozbiierać wszystkie dzieła ogłoszone w przeciągu długiego szeregu lat. Zresztą, ktoby chciał powziąć o nich wyobrażenie, znajdzie je treściwie zebrane w dziełach nieco późniejszych, mianowicie „w *Introduction des familles des plantes*” Adanson'a, i w *Classes plantarum* Linneusza; zrozumienie zaś ich nie przedstawi żadnej trudności, z wiadomości jakieśmy tu podali o różnych narzędziach i o ich głównych odmianach.

Jednakże nie od rzeczy będzie przytoczyć nieco szczegółów więcej zpomiędzy wszystkich tych układów, dwa, które największej wpływu wywarły, które obejmują cały ogół roślin znanych w czasie ich ogłoszenia, i które były używane nie tylko przez własnych swych tworców: Raj'a i Tournefort'a, ale i przez kilku jeszcze innych pisarzy.

§ 685. **Metoda Raja.** — Raj, botanik angielski, ogłosił ku końcowi XVII wieku swoją metodę, w której rozbięra przeszło 18,000 roślin; liczba ogromna na owe czasy, lecz przesadzona, z powodu mnóstwa odmian, jakie badacz ten przyjmuje. Dzieli on nasamprzód rośliny na drzewa i zioła, różni już pomiędzy nimi bezliścienne (które nazywa niedoskonałemi) i liścienne (które nazywa doskonałemi); następnie pomiędzy temi ostatniemi: jednoliścienne i dwuliścienne, które dzieli według piętn branych z kwiatu, złożonego lub pojedynczego, bezpłatkowego lub płatkowego, i według owoców oddzielno-owocowych (nasiona nagie), lub zrosło-owocowych (nasiona otoczone miazdżem). Odróżnia on także w drzewach owoce zrosnięte (które zowie opatrzonemi pepkiem) od niezrosniętych. Rodzaje pogromadzone są u niego częstokroć bardzo trafnie, chociaż z drugiej strony wiele jest innych niewłaściwie zbliżonych, tak z powodu koniecznej niedoskonałości samej metody, jak z powodu niedokładnej lub nawet błędnej znajomości narzędzi wielu tych rodzajów.

§ 686. **Tournefort'a.** — Około tegoż samego czasu Tournefort botanik francuzki, ogłosił swą sławną metodę, która jeśli do daleko mniejszej ilości roślin, bo tylko około do 10,000 była zastosowana, to dlatego, że twórca jej nie wy-

Łączając zupełnie odmian, mniej jednakże powiększał ich liczbę, ściśle opisując gatunki. Dzielił on rośliny podobnie jak Raj na drzewa i zioła, a podzielił je według piętn branych z okryw kwiatowych, z obecności lub nieobecności korony, z którą miesza okwiaty barwne. Słusznie stawia on w pierwszym rzędzie piętna różnic korony jedno i wielo-płatkowej, potem piętna kształtności jej i niekształtności, dalej zaś postaci jej szczególne, któreśmy wyżej poznali (§ 427—429). Kwiaty złożone stanowią część płatkowych, lecz są należycie odróżnione od pojedynczych. Skrytopłciowe stanowią oddział bezpłatkowych. Trafna ta metoda służyła aż do końca XVIII wieku za zasadę wykładu botaniki we Francji i założenia ogrodu paryzkiego, który według głównego jej podziału, posiadał osobną szkółkę ziół i drzew. Jeszcze przed niewielką laty istniały ślady téj szkółki; było to wiele drzew stuletnich, rozrzuconych po małym lasku w miejscu, gdzie teraz urządzone są galerie botaniczne i mineralogiczne. Teraz jeszcze pozostała niewielka ich ilość, mianowicie pierwsza z akacyj hodowanych we Francji. Lecz zwrócić tu należy uwagę, że jeśli oddzielenie drzew i roślin zielnych, ma niektóre dogodności przy założeniu ogrodu, stanowi ono jednakże, w każdej metodzie, która je bierze za podstawę, błąd zasadniczy, ponieważż jeden i ten sam rodzaj (np. cieciorczka [*coronilla*]) posiadać może gatunki zielne obok drzewnych, a co większa gatunek (np. rącznik) zielny w jednych okolicach, może pod przyjazniejszém niebem, zrobić się drzewnym.

§ 687. **Linneusz.** Układ Linneusza ogłoszony w 1734, zagłuszył wszystkie inne, które go poprzedziły. Przedstawiał on wiele powabu nowości, opierając się na narzędziach upłodnienia wprzód wcale zaniedbanych, a których znaczenie w życiu roślinném, daleko wyższe od znaczenia wszystkich innych części kwiatowych, uchodziło wtedy za nowe jeszcze odkrycie. Prócz tego Linneusz umiał połączyć tę nowość z wielu innymi, podobnie wielkiej wagi: zniósł zamieszanie jakie wynikało z mnóstwa odmian, wielając takowe, wraz z gatunkami wątpliwymi do gatunków ściśle przez niego opisanych; tym więc sposobem pomimo przydania znacznej liczby roślin nieznanych jego poprzednikom, sprowadził cały ogół gatunków roślinnych do siedmiu około tysięcy. Zmniejszył także liczbę rodzajów, lubo tak dobrze ustanowionych

przez Tournefort'a, i uzupełnił sposób opisywania ich użyciem piętn branych z pręcików i pewnych części słupka. Lecz nadewszystko, dzięki prawom, które dotąd trwają, i które jak się zdaje pozostaną przy swój mocy, wprowadził zadziwiającą reformę w języku i słownictwie botaniczném, określając ściśle każdy z wyrazów użytych do oznaczenia wszelkich odmian narzędzi, branych za piętna, i przywodząc nazwanie każdej rośliny do dwóch tylko wyrazów, z których piérwszy, *rzeczownik*, oznacza rodzaj; drugi, *przymiotnik*, oznacza gatunek rośliny. Przed nim każdy rodzaj nazywany był wprawdzie jednym wyrazem, lecz do oznaczenia gatunku, używano całego omówienia, obejmującego wszystkie piętna rozpoznawcze. Im więcéj było gatunków w rodzaju, tém więcéj potrzeba było piętn, aby odróżyć jeden od drugiego; tym sposobem omówienia, powiększając się w miarę postępu saméj botaniki, obciążały za nadto pamięć i utrudniały rozmowę, w której wzmiankowanie jakiegokolwiek rośliny wymagało wtrącenia całych omówień. Nie sprowadziłoby to zamieszania w towarzystwie i w mowie, gdybyśmy zamiast nazywać każdego po nazwisku i imieniu, zarzucali drugie i wstawili natomiast wyliczanie wielu własności osobistych? Język więc naukowy Linneusza ulżył pamięci z pożytkiem innych władz i ułatwił tok mowy botanicznój. Dzieła przeto w których poczet roślin wyszczególnionym został według nowego jego układu, przedstawiając wszystkie te korzyści zarazem, mogły od samego ukazania się zjednać sobie powszechną prawie wziętość. Tak téż się stało. Reforma została przyjętą wszędzie i w całości: układ Linneusza obalił wszystkie inne, i utrzymywał się aż do końca XVIII wieku prawie bez sporu, prócz tylko ze strony kilku umysłów pozostałych w tyle, lub przeciwnie wyprzedzających wyobrażenia ogółu. Naznaczono w nim miejsce wszelkim nowym roślinom, w miarę ich odkrywania, a lubo obraz królestwa roślinnego powiększał się ciągle, nie chciano jednakże zmienić ram jego. Ponieważ wiele dzieł zostało wydanych podług układu Linneusza, nawet za naszych dni jeszcze; ponieważ często i z łatwością przychodzi zasięgać ich pomocy z powodu dwuwyrazowych nazwisk roślinnych; ponieważ przeciwnie większa część dzieł dawniejszych, pisanych w języku mniej używanym, rzadko tylko przyda się ku temu, i zazwyczaj obudza tylko zajęcie historyczne; przeto opuścili-

śmy  
który  
osw  
szcz  
§  
ukła  
słusa  
wny  
jest  
nych  
na s  
śnie  
czba  
szós  
piérw

śmy, lub w krótkości tylko wspomnieliśmy o innych układach, których uczący się niema potrzeby poznawać. Że zaś powinien oswoić się z układem Linneusza, przeto wyłożymy go tu więcej szczegółowo.

§ 688. **Układ Linneusza.** — Przywykliśmy mówić o tym układzie, że jest zasadzony na liczbie pręcików, lecz to nieśluszenie, gdyż Linneusz wyszukując w narzędziach piętn głównych, nasamprzód na co innego zwrócił swoją uwagę, to jest na stosunki ich do słupka, oddzielonego od pręcików innych, lub też zbliżonego do nich w tym samym kwiecie; dalej na stosunki pręcików pomiędzy sobą, bądźto na stosunek zrosnięcia nitki lub pylników, bądź na stosunek ich wielkości. Liczba bezwzględna idzie na samym końcu, to jest w piątym lub szóstym rzędzie; następująca tablica da nam to poznać od pierwszego rzutu oka.

Precyki i słupki	widział- ne	zawsze po- łączone w jednym kwiecie	niezno- śnięte z sobą	Precyki wolne	równie pomię- dzy so- bą
					1. Jednoprecikowe ( <i>Monandria</i> ), 2. Dwuprecikowe ( <i>Dianandria</i> ) f. 244. 3. Trójprecikowe ( <i>Triaandria</i> ) f. 243. 4. Cztóroprecikowe ( <i>Tetraandria</i> ) f. 241. 5. Pięcioprecikowe ( <i>Pentandria</i> ) f. 225. 6. Szścioprecikowe ( <i>Hexandria</i> ) f. 226. 7. Siedmioprecikowe ( <i>Heptandria</i> ) f. 247. 8. Ośmioprecikowe ( <i>Octandria</i> ) f. 248. 9. Dziewięcioprecikowe ( <i>Enneandria</i> ) f. 240. 10. Dziesięcioprecikowe ( <i>Decandria</i> ) f. 235. od 12 do 19..... 11. Dwunastoprecikowe ( <i>Dodecandria</i> ), 20 lub więcej osa- dzone   na kielichu 12. Dwudziestoprecikowe ( <i>icosandria</i> ) f. 359. na dnie .. 13. Wieloprecikowe ( <i>Polyandria</i> ) f. 634. 6 z których 2 dłuższe..... 14. Dwusilne ( <i>Didynamia</i> ) f. 326. 6 z których 4 dłuższe..... 15. Czworosilne ( <i>Tetradynamia</i> ) f. 325. nitkami tworzącemi: jedną wiązkę..... 16. Jednowiązkowe ( <i>Monadelphia</i> ) f. 328. dwie wiązki..... 17. Dwuwiazkowe ( <i>Diadelphia</i> ) f. 658. wiele wiązek..... 18. Wielowiazkowe ( <i>Polyadelphia</i> ) f. 322—338. pylnikami tworzącemi: rurkę..... 19. Zrosłopylnikowe ( <i>Syngenesia</i> ) f. 728; na jednym osobniku..... 20. Słupkoppylnikowe ( <i>Gynandria</i> ) f. 551. na różnych osobnikach..... 21. Oddzielноплоіowe ( <i>Monocita</i> ) f. 251. i obopólne na jednym lub wię- cej osobnikach..... 22. Rozdzielноплоіowe ( <i>Diocitia</i> ) f. 534—537. 23. Wielozenne ( <i>Polygamia</i> ). 24. Strytoploіowe ( <i>Cryptogamia</i> ) 513—516.
					nierówne
					zrosnięte z sobą
					siedzące na drugich..... niepołączone z sobą w jednym kwiecie. Kwiaty męzkie i żeńs.
					niewidzialne.....

Da  
stki  
state  
Ka  
znow  
cikóv  
madz  
wię  
prec  
scio  
roza  
ty o  
się w  
nym  
du tr  
lub tr  
no-p  
mada  
wiąz  
kich.  
łoz  
liczb  
uciek  
w 12  
mia  
mia  
któ  
jedn  
roph  
dziel  
stupa  
§  
mad  
na pi  
ilość  
powi  
do in  
Licz  
tylko  
bądź

Daliśmy już poznać w rozdziale o kwiecie i pręcikach wszystkie te nazwiska, które zresztą tablica powyższa sama dostatecznie objaśnia.

Każda z otrzymanych tym sposobem 24 gromad, dzieli się znowu na rzędy, według innych zasad, czerpanych bądź z pręcików, bądź ze słupków. Tak, w 16, 17, 18, 20, 21, 22<sup>ej</sup> gromadzie, liczba bezwzględna pręcików daje rzędy, np. *jednowięzskowe dziesięcipręcikowe* obejmują rośliny mające 10 pręcików zrosniętych z sobą nitkami; *słupko-pyłnikowe sześćcipręcikowe* rośliny mające 6 pręcików siedzących na słupku; *rozdzielno-płciowe pięćcipręcikowe*, rośliny, których kwiaty o pięciu pręcikach, pozbawione są słupków, znajdujących się w innych kwiatkach bezpręcikowych, umieszczonych na innym osobniku. Gromada 23<sup>cia</sup> dzieli się znowu według rozkładu trzech rodzajów kwiatów umieszczonych na jednym, dwóch, lub trzech oddzielnych osobnikach, na *wielozenne, oddzielno-płciowe, rozdzielno-płciowe, rozrzucono-płciowe*. Gromada 19<sup>ta</sup>, której kwiaty zebrane w kwiatogłówkę, przedstawiają pięć możliwych połączeń kwiatów obupłciowych, męskich, żeńskich i nijakich, dzieli się na kilka rzędów roślin *wielozennych*. W piętnastu zaś pierwszych gromadach, w których liczba bezwzględna pręcików już była użyta, twórca układu uciekł się do piętnu branych z owocu, krótkiego lub długiego w 15<sup>tej</sup>, jednoziarnowego (*nagoziarnowego* [*gymnospermia*]), lub wieloziarnowego (*okrytoziarnowe* [*angiospermia*]) w 14<sup>tej</sup>, a we wszystkich innych, z liczby słupków, których może być jeden, dwa, trzy, lub więcej, a ztąd też rząd *jedno, dwu, trój...*, *wielosłupkowych*: np. *trzebula* (*Chaerophyllum*), która posiada pięć pręcików wolnych i dwie oddzielne szyjki, należeć będzie do *pięćcipręcikowych dwusłupkowych*.

§ 689. Oczywiście jest rzeczą, iż nie wszystkie z tych gromad mają jednakową wartość, ponieważ jedne zasadzają się na piętnach, które w drugich są tylko podrzędnymi, jak np. ilość bezwzględna pręcików. Ilość ta jednakże bezwzględna powinna daleko mniej mieć znaczenia od ilości względnej do innych części kwiatu, na której zależy ogólny jego umiar. Liczba szyjek stanowi słabsze jeszcze piętno, ponieważ jest tylko pozorną, rzeczywista zaś, bywa częstokroć utajoną, bądź przez zrosnięcie, bądź przez rozdwojenia, tak, że ogół

szyjek nie wskazuje ogółu owoców, który byłby ważniejszym do poznania, i bardzo zgodnym ze źródłosłowem nazwy używaną do oznaczania liczby narządzi żeńskich. Tak np. *pięciopręcikowe jednolupkowe* obejmują barwinek (*Vinca*) posiadający dwa owocki; rodzaj *Diosma*, który ich ma trzy, do pięciu; do *pięciosłupkowych* zaś należy zawciąg (*Statice*), której związek jest jednokomorowy.

Wprawdzie można zapomnieć o tych wadach, jeśli zechcemy uważać układ Linneusza, za dogodny tylko i pewny środek przy oznaczaniu roślin. Lecz używanie przekonywa, iż on nie jest tak dogodnym, jak utrzymują jego wyłączni stronnicy; a jeśli wychodząc z rąk swego twórcy, dał się wygodnie zastosować do niewielkiej liczby rodzajów, dla których był zbudowany, to otrzymawszy liczne dodatki od następców Linneusza, nie posiada już więcej tej zalety. Różnice liczbowe narządzi w kwiatach jednej i téjże saméj rośliny, różnice spowodowane zrośnięciami różnego stopnia tychże narządzi, lub ich płonnością, obudzają na każdym kroku wątpliwość względem miejsca, jakie roślina w układzie zajmować powinna. Liczba wyjątków urosła; gatunki najbardziej przyrodzonych rodzajów musiałyby należeć do wcale różnych gromad, a czasami spotkaćby to mogło różne kwiaty jednego i tegoż samego gatunku.

§ 690. **Metoda dwudzielna.** — Lamarck utrzymywał pewnego razu, że do rozwiązania zadania, mającego za cel wyszukać imię nieznanéj jakiej rośliny, możnaby znaleźć daleko dogodniejszy i pewniejszy sposób postępowania, niż w układzie Linneusza. Przyjął on wyzwanie jakie mu względem tego zrobiono, i wkrótce za odpowiedź przyniósł plan i próbę metody, która się pospolicie zowie rozbiorową (analityczną) albo lepiej *dwudzielną* (*m. dichotomica*). W rzeczy saméj, zależy ona na zrobieniu uczącemu się pierwszego pytania, dzielącego rośliny na dwie gromady między któremi on musi wybierać, podług piętna rośliny, które ją mieści w jednéj z tych gromad, wyłączając drugą; następnie na zrobieniu drugiego pytania, które dzieli wybraną owę gromadę na dwie inne, a roślina musi należeć do jednéj z takowych, potem idzie pytanie trzecie, czwarte i t. d. i t. d.; że za każdym z nich obręb się zmniejsza, aż dopóki ostatnie nie doprowadzi nas przez szereg kolejnych wyłączeń, do jedności

której  
innych  
żnicy  
porzą  
lub ty  
i częs  
droga  
skreś  
wyłoz  
razem  
celu,  
klade  
dząc  
pytań  
ką ka  
liczbę  
kowyc  
ną okr  
siada  
4te Cz  
koron  
tych na  
6te Cz  
rosły?  
wych  
posiad  
ków,  
lub nie  
11te Je  
mianleg  
kształt  
lich kw  
czków?  
wewna  
tak jest  
tunku n  
Widz  
wzięł  
do inne

której szukamy. Sposób ten postępowania, tém się różni od innych układów, że będąc zupełnie sztucznym, używa bez różnicy wszystkich piętn, a nie przywiązuje się do koniecznego porządku. Jeśli się znajdzie przedmiot wyjątkowy, wątpliwy, lub tylko trudny do dostrzeżenia, układ zwraca się do innego, i często nawet prowadzi nas do jednego celu dwiema różnemi drogami. Ztąd wynika, że metoda dwudzielna, nie da się wcale skreślić na tablicy, jak inne, któreśmy wyżej wspomnieli lub wyłożyli, gdyż ona ma w sobie coś ze wszystkich innych zarazem, a podziały jej nie mając nic stałego, różnią się według celu, jaki sobie obieramy. Możemy tu tylko objaśnić ją przykładem: Dajmy na to, że trzymamy w ręku jaskier, nie wiedząc z jakim rodzajem mamy do czynienia: oto jest szereg pytań, które musimy rozwiązać, prowadzeni odpowiedzialną, jaką każde z nich daje, do pytania następnego, wskazującego liczbę odsyłającą. 1<sup>da</sup> Czy roślina ta ma kwiaty, lub czyli takich nie posiada? 2<sup>re</sup> Czy kwiaty połączone są jedną wspólną okrywą, lub czy są oddzielne? 3<sup>cie</sup> Czy kwiat oddzielny posiada słupki i pręciki zarazem, lub tylko jedno albo drugie? 4<sup>te</sup> Czyli posiadając jedno i drugie zarazem, opatrzony jest koroną i kielichem, lub czyli niedostaje jednego albo obudwu tych narzędzi? 5<sup>te</sup> Czy korona jest jedno-, czy wielopłatkowa? 6<sup>te</sup> Czy kwiat wielopłatkowy posiada zawiązek wolny lub przyrosły? 7<sup>me</sup> Czy zawiązek wolny jest pojedynczy, lub czy takich jest wiele? 8<sup>me</sup> Jeśli jest wiele zawiązków, czy liście posiadają przylistki lub nie? 9<sup>te</sup> W drugim z tych przypadków, czy istnieje wewnątrz każdego zawiązka gruczołek lub nie? 10<sup>te</sup> Jeśli go niema, czy owoc jest mięsisty lub nie? 11<sup>te</sup> Jeśli nie jest mięsisty, czy liście są naprzeciw lub naprzemianległe? 12<sup>te</sup> W tym ostatnim przypadku, czy kwiat jest kształtny lub niekształtny i opatrzony ostrogą? 13<sup>te</sup> Czy kielich kwiatu kształtnego składa się z trzech czy z pięciu listeczków? 14<sup>te</sup> Jeśli ich jest pięć, czy każdego z płatków jest od wewnątrz przy nasadzie podwojony przez małą łuskę? Jeśli tak jest, roślina niewiadoma należy do rodzaju jaskru. Do gatunku następnie można przyjść za pomocą nowych pytań.

Widzimy jak różne piętna musieliśmy przejrzeć, jak raz, wzięliśmy jakie narzędzie, a następnie opuścili, aby przejść do innego, a niekiedy powrócić w końcu do pierwszego.

Metoda ta jest bardzo dogodna dla początkujących, których prowadzi jakby za rękę, aż do celu zwykłych ich poszukiwań; aby jej używać, nie potrzeba wielu wiadomości, lecz dokładnych i pewnych, ponieważ każda pomyłka sprowadza na błędną drogę, która oddala coraz bardziej od celu, zamiast zbliżać do niego. Ma ona tę niedogodność, że nie zbiera pokrótce w pewnych odstępach piętn, których używa, jak się to dzieje przy gromadach i innych kolejnych podziałach w układzie; tak, iż przybywszy raz do jednego punktu, trudno jest zdać sobie sprawę z punktów pośrednich, któreśmy przechodzili, a pamięć nie zatrzymuje nic prócz samego imienia rośliny, co rzeczywiście jest bardzo mało. Nakoniec metoda ta zastosowaną była dotychczas tylko do roślin niektórych niezbyt rozległych krain, mianowicie Francyi i okolic Paryża, zatem może tylko w tym zakresie być użyta; nie można zaś oznaczać podług niej, jakiegokolwiek rośliny nieznanej.

Wprawdzie Meisner, opisując w wielkiem i blizkiem teraz ukończenia dziele, wszystkie znane rodzaje jawnopłciowych, stara się ułatwić wyszukanie ich za pomocą szeregu podziałów czynionych w duchu metody dwudzielnej, przedstawiających piętna, jeśli nie zawsze łatwe, to przynajmniej tak ułożone, że czytelnikowi pozostają tylko dwie drogi, przy każdym rozgałęzieniu. Lecz chcąc używać tej książki, potrzeba posiadać już znaczną znajomość botaniki; potrzeba być oswojonym z rodzinami, które tam brane są za punkt wyjścia, a o których nam teraz mówić wypada.

§ 691. **Metoda przyrodzona.** — Widzieliśmy, że wszystkie osobniki roślinne rozproszone w przyrodzie, dają się gromadzić w gatunki, czyli zbiór osobników podobnych do siebie (§ 620); dalej, że gatunki dają się gromadzić w rodzaje, czyli zbiór gatunków podobnych (§ 622). Drugie łączenie daleko jest dowolniejszem od pierwszego, ponieważ gatunek dany jest przez samo przyrodzenie, i ponieważ, pomimo wątpliwości, których powodem mogą się stać jego odmiany, mając pewną liczbę dostatecznych piętn, mając sposobność postrzegania wielu pokoleń pod wielu różnemi warunkami, możemy go przyjąć lub odrzucić. Przy zbieraniu zaś wielu takowych jedności (*gatunków*), w celu utworzenia jedności wyższego rzędu (*rodzaju*), sam tylko umysł nasz oznacza granice, wybiera ilość podobieństw mniejszą lub większą, potrzebną do określenia

rodzaju; ten zatem nie istnieje w przyrodzie, nawet kiedy zmienimy jego granice. W rzeczy samej wystawmy sobie cztery gatunki  $a, b, c, d$ , połączone w jeden rodzaj  $m$ , dlatego, że są podobniejsze do siebie, niż do wszystkich innych; niemniej jednakże istnieją pomiędzy nimi różnice, które je od siebie odznaczają: przypuśćmy, że te różnice są tego rodzaju, iż  $a$  podobniejsze jest do  $b$  niż do  $c$  i  $d$ , a  $c$  podobniejsze jest do  $d$  niż do  $a$  i  $b$ ; według tego można będzie ustanowić dwa rodzaje: jeden  $n$ , obejmujący  $a$  i  $b$ ; drugi  $p$  obejmujący  $c$  i  $d$ ; lecz zmiana wprowadzona tym sposobem, nie zmieni zgoła istotnego stosunku, jaki zachodzi pomiędzy gatunkami, jeśli takowe od razu należycie były określone, a ponieważ wszystkie cztery pozostaną zawsze jednakowo do siebie zbliżone, przeto, jakkolwiek pomiędzy nimi zakreśliemy granicę, zawsze stanowiąc będą całość jednakowo przyrodzoną. Czy zrobimy  $m = a + b + c + d$ , czy  $n = a + b$ , i  $p = c + d$ ; oczywistą jest rzeczą, że zawsze otrzymamy jedną ważność. Pomnażanie zatem liczby rodzajów, będące koniecznym wpływem pomnażania liczby gatunków, których odkrycia podrózników ciągle dostarczają, nie dowodzi wcale, aby one nie były zgodne z przyrodzeniem, lecz dowodzi tylko, że są tęp zgodniejsze, im je bardziej w ten sposób dzielimy, albowiem przez to zbliżają się coraz bardziej do gatunków. Zresztą dosyć jest wyrzec nazwisko niektórych rodzajów dobrze znanych, aby się przekonać, do jakiego one stopnia są połączeniem przyrodzonym. Potrzebaż być botanikiem, aby zbliżyć rozmaite gatunki róży, wierzb, lub koniczyny, i t. p.? Podobieństwo bywa czasami tak daleko posunięte, że właśnie rozłączenie na gatunki staje się trudniejszém, niż połączenie we wspólny rodzaj: aby odróżnić jedną różę od drugiej, potrzeba do tego pewnej nauki; nie potrzeba zaś żadnej, aby wyrzec że obiedwie są róże.

§ 692. *Tournefort* umiał lepiej niż którykolwiek z jego poprzedników określać rodzaje tak, że większa ich część łączyła w sobie rzeczywiście podobne gatunki, i tworzyła przeto jedności przyrodzone. *Linneusz* zmniejszył ich liczbę, lecz zmniejszenia jego ściągają się do rodzajów w ogóle podobnych sobie, były tylko działaniem odwrotném, względem tego któreśmy powyżej przypuścili, a przeto nie zmieniało tak dalece przyrodzenia rodzajów, gdyż łącząc  $n$  i  $p$  w  $m$ ,  $a$  i  $b$ ,  $c$  i  $d$

zachowywały zawsze toż samo miejsce, jedno względem drugiego. Lecz rozbiierając dalej układy dwóch tych wielkich botaników, ujrzymy, że idąc za przyrodą aż do rodzajów właściwie, zбочyli mniej więcej zupełnie z tej drogi w dalszym ciągu szykowania, skoro przyszło ułożyć rodzaje według pewnego porządku. Weźmy kilka przykładów z układu Linneusza: mamy roślinę o sześciu pręcikach równych i o jednym słupku; należy więc ona do *sześciopręcikowych jednostupkowych*, które przeto obejmować będą równie sit (*Juncus*) jak kwaśnicę (*Berberis*). Lecz pomiędzy temi rodzajami niema najmniejszego związku, podobnie jak go niema pomiędzy ryżem (*Oryza*) i racieżnicą (*Atraphaxis*), które zarazem należą do *dwustupkowych*; pomiędzy szczawiem (*Rumex*), zimowitem (*Colchicum*) i miesiącznikiem (*Menispermum*), które należą do *trójstupkowych*; pomiędzy winoroślą i barwinkiem, w *pięciopręcikowych jednostupkowych*; pomiędzy marchwią i porzeczką, w *pięciopręcikowych dwustupkowych*, i t. d. Zkądże to pochodzi? Oto ztąd, że Linneusz przy połączeniu z sobą wszystkich porzeczek (*Ribes*) miał wzgląd na ogół piętn, branych ze wszystkich części rośliny, gdy tymczasem przy wcieleniu ich do jednej gromady z marchwią (*Daucus*), uważał tylko na obecność pięciu pręcików i dwóch szyjek, któryto stosunek nie wiąże się z żadnym innym, i może się znajdować w mnóstwie roślin istotnie od siebie różnych.

§ 693. **Rodziny.** — Wypadało więc dla skupienia rodzajów pomiędzy sobą, uciec się do działania podobnego jak przy skupieniu gatunków w wyższe jedności; wypadało wyszukać ich związków, i zbliżyć do siebie rodzaje posiadające największą ilość takowych, a tym sposobem z jedności tych nazwanych rodzajami, łącząc z sobą podobniejsze do siebie niż do innych, utworzyć nowe jedności wyższego jeszcze rzędu. Takiemi zaś są owe zbiory przyrodzone rodzajów, nazwane *rodzinami (familiae)*, wyraz szczęśliwy, wyszukany przez *Magnol'a* jednego z botaników francuzkich; metoda zaś gromadząca tym sposobem rośliny według przyrodzonych związków pomiędzy roślinami, zowie się *metodą przyrodzoną*. Lecz wyszukanie tych związków łączących wiele rodzajów w jedną wspólną rodzinę, przedstawiało wiele trudności. Podobieństwo osobników należących do jednego gatunku, uderza na pierwszy rzut oka; podobieństwo gatunków jednego

rodzaju, jest już daleko mniej widoczne, a często nawet zwo-  
dzące, wymaga dłuższego i głębszego badania, tak, iż wieków  
potrzeba było na to, aby nauka rozjaśniła odmet gatunków.  
Podobieństwo zaś rodzajów uchodząc daleko jeszcze bardziej  
wzroku, wymagało, aby postrzeganie dalej jeszcze postąpiło,  
aby wyszukano innych zasad jak te, których użyto do zbud-  
owania gatunków i rodzajów. Doświadczenie przekonywa, iż  
w ogóle ciała przyrodzone, zupełnie do siebie podobne z po-  
wierzchności, podobne są także i w istocie swojej; a prze-  
to wniesiono, iż związek piętn zewnętrznych, według których  
ustanowiono gatunki i rodzaje, pociąga za sobą związek po-  
dobny pomiędzy piętnami wewnętrznymi. Potrzeba było teraz  
badać porównawczo jedno i drugie, aby dojść czy są pomiędzy  
nimi takie, które w stałej od siebie zależności zostają, i aby  
takie właśnie położyć za zasadę układu, w którymby rodzaje  
zbliżone były do siebie według piętn wskazujących konieczną  
obecność wielu innych, i rządzących tym sposobem za rzeczy-  
wiste i ściśle podobieństwo.

§ 694. **Rodziny Linneusza.** — Linneusz zanadto zdrowo  
sądził o rzeczach i zanadto posiadał roztropności w postępo-  
waniu, aby nie czuł wad swego własnego układu; dowiódł  
on tego wydając pod tytułem *ułomków metody przyrodzonej*  
usiłek uporządkowania, w którym rodzaje wcale inaczej uło-  
żone były. Pomimo tego całe szeregi rodzajów znajdują się  
te same w układzie i w ułomkach metody. W takich przeto  
razach, piętno użyte w układzie dla połączenia rodzajów, mu-  
siało się łączyć z wielu innymi ważnymi piętnami, w przypad-  
kach zaś przeciwnych nie łączyło się z takowymi. Tak np.  
większa część rodzajów 12<sup>tej</sup> gromady, była skupioną we  
dwie pobliskie rodziny; wszystkie czworosilne połączone zo-  
stały w jedną; przeciwnie pięciopęcikowe, sześciopęcikowe,  
wielopęcikowe, i t. d., i t. d., rozpadły się na wiele rozmaitych  
rodzin. Ilość zatem bezwzględna pęcików nie pociągała ty-  
le za sobą w oczach Linneusza prawdziwych związków po-  
między roślinami, ile osadzenie ich na kielichu lub ich wzglę-  
dna wielkość. Nie dał on jednakże poznać zasad, które go  
prowadziły w ułożeniu rodzajów swoich w rodziny; i zdaje się  
że szedł przyciem raczej za natchnieniem swego geniuszu i wy-  
trawnego doświadczenia, niż za przepisem praw należyście

określonych, chociaż w wielu jego pismach, niektóre z tych praw znajdują się wyrzeczone w kształcie pewników.

§ 695. — **Bernarda de Jussieu.** — Bernard de Jussieu, botanik francuzki, którego imię przywiązane jest do imienia metody przyrodzonej, przyjmował odwiedzającego Paryż Linneusza wtedy, kiedy tenże nie był jeszcze ogłosił ani swego układu, ani swych „*ułomków*,” lecz już był znany jako uczony, ze znakomitych dzieł. Zawiązały się ztąd przyjazne stosunki między niemi i listowne znoszenia się, którego niektóre ustępy dowodzą, iż rozmowy dwóch tych botaników, zwracały się często do wielkiego owego zadania, względem metody przyrodzonej, i że obadwa nad nią pracowali. We 20 lat później, w 1759 r., Bernard de Jussieu usiłował, w założonym przez Ludwika XV w Trianon ogrodzie botanicznym, zaprowadzić uporządkowanie przyrodzone rodzajów, które było owocem jego zastanawiania się i długich badań. Równie jak Linneusz, nie ogłosił on zasad, które go w tém prowadziły; nie wydał nawet spisu, podobnego do „*ułomków*” Współcześni jednak botanicy mogli iść do Trianon rozważać tę uczoną zagadkę; lecz jeśli to nawet czynili, zdaje się wszakże, iż jój weale nie odgadli.

§ 696. — **Adansona.** — W istocie widzimy, że w kilka lat później (w r. 1763), ukazały się rodziny roślinne Adansona, który wyłożył zasady swe względem ich tworzenia i porobił określenia ich w podobny sposób, jak dotąd określano rodzaje. Poznał on, że aby uporządkować rodzaje w rodziny, potrzeba mieć wzgląd na ogół ich piętn, a nie na pojedyncze tylko piętna, że zatem układ poprzedzony być musi obszerną pracą, w której badane być winny wszystkie narzędzia roślin, jakie chcemy uporządkować, nie zaniedbując żadnego z nich, a wszelkie ich odmiany takowych powinny być wyszukane we wszystkich rodzajach. Każdy zosobna punkt ustrojności roślin, może być wzięty za zasadę oddzielnego układu, który je wszystkie obejmie według pewnego porządku. Jeśli we wszystkich tych układach cząstkowych, tym sposobem otrzymanych, dwa jakiegokolwiek rodzaje stałe są do siebie zbliżone, oczywiście jest rzeczą, iż takowe muszą być podobne do siebie we wszystkich punktach swój ustrojności, i że będą składały część tej samej rodziny; jeśli przeciwnie stałe są od siebie oddalone, różnią się we wszystkich tych punktach, i nie mogą składać

jednej rodziny. Zasada ta jest niezaprzeczoną, a twórca jej wywodzi z niej prawidło: że tym sposobem można obliczyć przedziały, jakie w porządku ogólnym i przyrodzonym przegradzają od siebie różne rodzaje, przedziały tém mniejsze, w im większej liczbie cząstkowych układów rodzaje te zbliżone do siebie będą. W skutek tego zbudował on 65 układów, w których wyczerpał wszystkie zasady, podług których, jak sądził można badać i szykować rośliny: jedne ogólne, jak kształt, wielkość, grubość, trwałość, klimat i t. d., i t. d.; inne brane w narzędzi ogólnych jak korzenie, gałęzie, liście, kwiaty, lub szczególnych, jak kielich, korona, pręciki, słupek, owoce i t. d., albo wreszcie z części składających takowe, jak pylniki, pyłek, nasiona i t. d.; równie jak z odmian jakie części te mogą przedstawiać co do ilości, położenia, i t. d. Zastosował nakoniec do tych 65 połączeń, rachunek wyżej spomniony, zbliżając lub oddalając od siebie rodzaje, podług tego, jak większa lub mniejsza liczba tych układów pokazywała je zbliżeniami lub oddaleniami. Pewna ilość podobieństw pewnej liczby rodzajów stanowiła piętna jednej rodziny; ilość ich mniejsza wskazywała mniejszy lub większy odstęp, jaki jedne od drugich dzieli. Otrzymał on tym sposobem 58 rodzin uszykowanych w pewnym porządku, który nazywał przyrodzonym.

Lecz uważając te zasady za prawdziwe, zachodzi teraz pytanie, czyli się one dadzą zastosować? Sposób postępowania Adansona był po prostu rachunkiem arytmetycznym, w którym każdy błąd liczbowy niszczył cały wypadek, każda wada układów cząstkowych, powiększała się w układzie ogólnym. Odkrycie zaś nowych roślin musiało spowodować zmiany w liczbach; postęp organografii musiał wprowadzić odmiany w większej części tych układów: tak się też stało w istocie, ponieważ znamy dziś pięć razy więcej roślin niż znano naówczas, i wiele prawd, o których nie wiedziano: prawdziwość zatem zasady nie mogła przeszkodzić fałszywości wypadków. Lecz zresztą i sama ta zasada nie jest prawdziwą. Przyznawać równą prawie ważność wszystkim narzędziom i piętnom jakie z nich są brane, dla utworzenia tym sposobem jedności jednego rzędu, które wejdą w rachunek stosunku roślin pomiędzy sobą, jest to jedno, co chcieć nadać równą wartość sztukom monety robionym z różnego kruszcu i posiadającym różną ciężkość; jedno, co robić liczmany zupełnie urojonej wartości:

niepodobna więc nie pojąć, że sposób postępowania Adansona był zupełnie sztucznym; i podziwiając zawsze olbrzymią pracę i rozmaitość wiadomości jakich zastosowanie jej wymagało, można jednak było spodziewać się, że ona nie doprowadzi do założonego celu. Dlatego też rodziny jego będące nagromadzeniem rodzajów najczęściej bez ścisłych i rzeczywistych związków, nie były przyjęte od żadnego z jego następców, i są daleko mniej przyrodzone od rodzin jego poprzedników, Linneusza i B. de Jussieu.

§ 697. **Metoda Antoniego Wawrzyńca de Jussieu.**— Około tegoż samego czasu Antoni Wawrzyniec de Jussieu zaczynał obznajmiać się z nauką o roślinach przy swym stryju Bernardzie, i ani wątpić, że młodzieniec znalazł w poufałym udzielaniu się starca, i w jego uczonych wykładach, zaród, który potem umiał tak dobrze upłodnić i rozwinąć. W dziesięć lat później przedstawił Akademii nauk, i zastosował do założenia ogrodu botanicznego w Paryżu, nową metodę, która po 16 latach (w 1789), dojrawszy ciągłym rozważaniem i badaniem, przyjęła swój ostateczny kształt i wyrażenie, rozciągając się do wszystkich podówczas znanych roślin, w zasadniczym dziele: *Genera plantarum*. Na czele książki umieścił Jussieu nieogłoszony dotychczas spis rodzajów ogrodu w Trianon, według porządku ustanowionego przez Bernarda; jestto szacowny pomnik w dziejach nauki, ponieważ pozwala przekonać się do jakiego punktu doszedł stryj, i od jakiego zaczął synowiec. Ponieważ ten ostatni wyłożył należyście zasady, które mu przewodniczyły przy wprowadzeniu układu, można więc, porównyując dzieło jego z dziełami poprzedników; można dojść, które z tych zasad były już przez nich przyjęte lub przewidziane, a które im były wcale nieznanne. Nie będziemy tu jednakże usiłovali oznaczyć udziału, jaki każdy z nich brał w tém wielkiem dziele; roztrząsanie to czysto historyczne i mało stosowne dla początkujących, nie wchodzi w zakres niniejszego dzieła, mającego za cel wyłożyć tylko prawa, nie zajmując się wcale prawodawcami.

§ 698. A. W. Jussieu sądził równie jak Adanson, że rozbiór wszystkich części rośliny potrzebnym jest do umieszczenia jej w układzie; lecz zajmując się tym zupełnym rozbiorem, nie starał się wyprowadzać z niego teoretycznie uporządkowania rodzajów, a co się tyczy gromadzenia ich w rodziny, naśla-

dowa  
mych  
bieńś  
ki, p  
go p  
się z  
mie  
posta  
zmie  
czys  
kow  
niesi  
przy  
w kt  
wiele  
w poj  
się w  
uderz  
ogóln  
wych  
sposo  
da w  
cąż  
lecz  
sey  
czali  
znac  
który  
stwen  
trzeba  
sów  
są lu  
każde  
Te to  
dzaje  
cznie  
nych  
czeni  
do m  
dnej

dował sposób postępowania używany przy ustanawianiu samychże rodzajów. Botanicy uderzeni stałem i zupełnem podobieństwem niektórych osobników, połączyli takowe w gatunki, potem według również stałego, lubo daleko mniej zupełnego podobieństwa, połączyli gatunki w rodzaje. Piętna mogące się zmieniać w jednym gatunku, muszą zależeć od przyczyn umieszczonych zewnątrz rośliny, a nie w niej samej; tak np. postawa jej, utkanie, niektóre odmiany kształtu i barwy i t. d., zmieniają się wraz z ziemią, klimatem, tudzież pod innemi, czysto okolicznościowemi wpływami. Przeciwnie piętna gatunkowe, które każdy osobnik musi posiadać, aby mógł być odniesionym do pewnego gatunku, muszą zawsze zależeć od przyrodzenia samej rośliny, jakiegokolwiek byłyby okoliczności, w których takowa się znajduje. Pomiędzy temi piętnami jest wiele trwalszych jeszcze nad inne, mniej ulegających zmianom w pojedynczych roślinach; sąto właśnie te, które znajdując się w pewnej liczbie gatunków, nadają im podobieństwo tak uderzające, iż z nich ustanowić można rodzaj. Te więc, dla ogólności swiej więcej będą miały wartości od piętn gatunkowych; gatunkowe zaś więcej od osobniczych. Lecz jakim sposobem zdołano ocenić te rozmaite wartości? Sama przyroda wskazała oku naszemu gatunki i wiele rodzajów, za pomocą rysów podobieństwa, jakimi naznaczyła niektóre rośliny; lecz poza rodzajami zbywało na tej nitce przewodczej: wszyscy bowiem botanicy zgadzając się mniej więcej dotąd, rozłączali się dalej i każdy z nich osobną poszedł drogą. Jednakże znaczna także jest liczba dość obszernych grup roślinnych, których gatunki powiązane są z sobą tak widocznem podobieństwem, że takowe nie ujdzie przed nieczyjém okiem, i że nie trzeba być nawet botanikiem, aby je poznać. Oprócz tych rysów wspólnych wszystkim gatunkom jednej z podobnych grup, są inne, wspólne pewnej tylko liczbie ich gatunków; tak, iż każda grupa da się podzielić na wiele innych, podrzędnych. Te to właśnie ostatnie uznane zostały przez botaników za rodzaje. Miano już zatem niektóre skupienia rodzajów, widocznie podobniejszych do siebie niż do rodzajów wszelkich innych grup, czyli innemi słowy, niektóre rodziny niezaprzeczenie przyrodzone. Jussieu sądził, że to był właśnie klucz do metody przyrodzonej, ponieważ porównywając piętna jednej z takich rodzin z piętnami rodzajów ją składających,

otrzymać można stosunek jednych do drugich; ponieważ, porównując wiele rodzaju z sobą, można obaczyć, które z piętn wspólnych wszystkim rodzajom jednej rodziny, zmieniają się w innych; ponieważ tym sposobem ocenić można wartość każdego piętna, i ponieważ raz otrzymawszy tę wartość, w rodzinach tak wyraźnie od przyrody zakreślonych, można ją zastosować z kolei do oznaczenia tych, na których znamię rodziny nie jest tak wyraźnie wyciśnięte i które były wyrazami niewiadomymi w tém wielkiem zadaniu. Wybrał on więc siedm rodzin powszechnie przyjętych, a mianowicie: trawy, liliowate, wargowe, złożone, baldaszkowe, krzyżowe i strąkowe. Widział on, że budowa zarodka jest jednakowa we wszystkich roślinach każdej z tych rodzin; że tenże jest jednoliściennym w trawach i liliowatych, dwuliściennym zaś w pięciu innych; że budowa nasiona jest również ta sama: zarodek jednoliścienny umieszczony w osi bielma mięsistego u liliowatych, na boku bielma mączystego u traw; dwuliścienny zaś w wierzchołku bielma twardego i rogowego w baldaszkowych, pozbawiony bielma w złożonych, krzyżowych i strąkowych; że przeciki których liczba może się zmieniać w jednej i tej samej rodzinie, np. w trawach, nie zmieniają się w ogóle co do osady swojej, są bowiem podzwiązkowe w trawach, krzyżowych; przytwierdzone do korony w wargowych, złożonych; osadzone na krążku nazawiazkowym w baldaszkowych. Otrzymał on tym sposobem wartość pewnych piętn, które nie powinny się zmieniać w jednej rodzinie przyrodzonej. Lecz obok tych, znajdowało się wiele innych, bardziej zmiennych, które starał się podobnie ocenić, bądźto przez badanie innych rodzin wskazanych przez samą przyrodę, bądź w rodzinach utworzonych przez niego z pomocą pierwszych owych prawideł, tudzież wielu innych, również na postrzeżeniach zasadzonych. Niepodobna nam tu śledzić go w szczegółach tej długiej pracy, której owocem było utworzenie 100 rodzin obejmujących wszystkie naówczas znajome rośliny.

§ 699. W tém wszystkiém co się rzekło widać zastosowanie zasady, która uszła przed okiem Adansona: to jest zasady *podrzędności piętn*, które w metodzie Jussieu'go są według jego własnego wyrażenia ważone, nie zaś obliczane. Uważał on je za mające niejednakową wartość: tak, że piętno pierwszego rzędu równoważy się z wielu piętnami trzeciego rzędu,

i tak następnie. Wartości téj dochodzi się przez postrzeganie i doświadczenie; a w miarę swojego zniżania się, bywa też coraz mniej stałą. Podług tego, (że użyjemy tu dostępnego porównania, wzmiankowanego już powyżej, porównania z pieniądźmi bitemi z różnych kruszców i posiadającemi różne piętna, których ogół wyraża nam tu pewną summę związków pomiędzy roślinami jakiej rodziny), sztuki złote miałyby wartość bardziej niezmienną od sztuk srebrnych; sztuki zaś miedziane znałyby raz mniej, drugi raz więcej, będąc niejako przeznaczonemi do uzupełnienia summy, w której pieniądze z kruszu droższego stanowią rzecz główną i same tylko na większą zasługują baczość.

§ 700. Ważność podrzędności piętn wynika szczególnież z uwag o których nie mówiliśmy jeszcze dotychczas, lecz które są koniecznym wypadkiem połączenia wielu piętn w każdej rodzinie, a mianowicie: że piętno wyższego rzędu poclaga za sobą obecność pewnej ilości piętn innego rzędu, wyłącza zaś pewną ilość innych; tak, że wymieniwszy samo tylko pierwsze, dajemy poznać, czyli inne znajdują się albo nie, i że część ustrojności rośliny oznajmioną być może naprzód, przez jeden jej punkt należyte zbadany, co rozumié się, musi dziwnie skracać i upraszczać poszukiwania i język naukowy. Tak np. widzieliśmy prawie w każdym rozdziale téj książki, że obecność lub nieobecność liścieni, ich pojedynczość lub wielość, objawiają się prawie we wszystkich częściach rośliny, które przedstawiają różnie głębokie i nderzające, podług tego jak zarodki ich różnice pod tym względem są ukształcone. Mówiąc zatem, że roślina jest jedno lub dwuliścienna, wyrażamy przez to nie pojedynczy tylko fakt, ale zbiór wielu faktów; otrzymujemy wyobrażenia o ogólném uszykowaniu narzędzi prostych w tkankach téj rośliny, o sposobie jej wschodzenia i rozgałęziania się, o budowie i rozkładzie nerwów jej liści, o umiarze jej kwiatów, i t. d., i t. d. Z tego lub owego piętna podrzędnego, możemy wyprowadzić podobnież wiele innych, wyższego, równego, lub niższego rzędu: mówiąc np. iż korona jest jednopłatkowa, wyrażamy tém samém, że roślina opatrzona takową jest dwuliścienna, że pręciki osadzone są na koronie w liczbie oznaczonej, równiej lub mniejszej od jej podziałów. Znajomość wszystkich tych stałych stosunków pomiędzy różnemi częściami, pozwalająca wnosić z części o ca-

łości i z całości o częściach, jest podstawą metody przyrodzonej, jest samą nauką, ponieważ miejsce jakie oznacza roślinie, wyraża całą ustrojność takowej, od ustrojności zaś zależy cały sposób życia; dlatego też widzimy, że zazwyczaj w rodzinie prawdziwie przyrodzonej, panuje wielka zgodność własności technicznych lub lekarskich pomiędzy roślinami, które takową składają: co nie jest rzeczą dziwną, ponieważ podobieństwo narzędzi musi pociągać za sobą podobieństwo ich wytworów. Prawda ta nadaje metodzie przyrodzonej wielką korzyść, pod względem użyteczności jej w zastosowaniu.

§ 701. **Gromady.** — Po utworzeniu rodzin, szło następnie o uporządkowanie ich w taki sposób, aby zbliżyć do siebie najpodobniejsze z pomiędzy nich, a oddalić od siebie mniej podobne. Rozumię się, iż sposób postępowania używany przy porządkowaniu rodzajów, sam się tu znowu nastreczał. Piętna wspólnie wielu rodzinom zarazem, dozwalały łączyć takowe w grupy wyższego rzędu, a ustanowiona już podrzędność piętn wskazywała, w jakim porządku używać ich należało. Piętna brane z zarodka szły, rozumię się, nasamprzód i dzieliły państwo roślinne na trzy wielkie gałęzie: bezliściennych, jednoliściennych i dwuliściennych. Po tém zasadniczym piętnie użył A. W. de Jussieu, lubo daleko niżej, osadzenia pręcików, podzawiazkowego, kołozawiazkowego i nazawiazkowego. Lecz w dwuliściennych pręciki te zrastają się z koroną, jeśli takowa jest jednopłatkową, tak, że w tym razie, osada ich nie przypada bezpośrednio na dnę kielicha lub zawiązka, lecz za pośrednictwem korony, wychodzącej z jednego z tych trzech punktów. Piętna więc wzięte z korony, związane tym sposobem z piętnami osadzenia, idą wraz z niemi. Osadzenie jest tylko wyrażeniem względnego położenia dwóch rodzajów narzędzi kwiatowych, to jest pręcików względem słupka, w tej samej okrywie. Lecz jeśli narzędzia te są rozłączone na różnych kwiatach, stosunek ten nie ma miejsca; potrzeba tu więc wyrazić samą okoliczność rozłączenia. Oto są główne zasady według jakich rodziny ułożone zostały w 15 gromadach, wyszczególnionych poniżej na tablicy, która je sama łatwo objaśnia. Wyrazy użyte w pierwszych dwóch kolumnach, były już poprzednio określone (§ 373, 381, 382); wyrazy zaś ostatniej kolumny podane były nieco później, dla tém dogodniejszego oznaczenia każdej gromady.

BEZLIŚ

JEDNO

DWULIŚCIENNE

§  
 todzie  
 rządk  
 sam te  
 szęj t  
 pod i  
 częśc  
 komit  
 było  
 śnie w  
 czył r  
 oznaj  
 dług  
 secur

KLUCZ METODY A. W. DE JUSSIEU.

BEZLIŚCIENNE . . . . .		1. Bezliścienne ( <i>Acotylédonie</i> ) f. 502—526.	
JEDNOLIŚCIENNE Pręciki	podzawiążkowe . . . . .	2. Jedno-podzawiążkowe ( <i>Monohypogynie</i> ) f. 531.	
	kołozawiążkowe . . . . .	3. Jedno-kołozawiążkowe ( <i>Monopéryginie</i> ) f. 546.	
	nazawiążkowe . . . . .	4. Jedno-nazawiążkowe ( <i>Monopigynie</i> ) f. 551—555.	
DWULIŚCIENNE	bezpłatkowe ,,	nazawiążkowe . . . . .	5. Pręciko-nazawiążkowe ( <i>Epistaminie</i> ) f. 599.
		kołozawiążkowe . . . . .	6. Pręciko-kołozawiążkowe ( <i>Péristaminie</i> ) f. 607—612.
		podzawiążkowe . . . . .	7. Pręciko-podzawiążkowe ( <i>Hypostaminie</i> ) f. 616.
	jednopłatkowe	podzawiążkowe . . . . .	8. Korono-podzawiążkowe ( <i>Hypocorollie</i> ) f. 678.
		kołozawiążkowe . . . . .	9. Korono-kołozawiążkowe ( <i>Péricorollie</i> ) f. 722.
		naza- wiąż- kowe	} zrosnięte } 10. Kor.-nazawiaz. zrosłopyln. ( <i>Epicor. synanther.</i> ) f. 730.
		pylniki	
		nazawiążkowe . . . . .	12. Płatko-nazawiążkowe ( <i>Epipetalie</i> ) f. 674.
		wielopłatkowe	podzawiążkowe . . . . .
kołozawiążkowe . . . . .	14. Płatko-kołozawiążkowe ( <i>Péripetalie</i> ) f. 665.		
osobnopłciowe . . . . .	15. Osobno-płciowe ( <i>Diclinie</i> ) f. 558—562.		

§ 702. Dwie zatem oddzielne części uważać należy w metodzie Jussieu'go: 1<sup>o</sup>d skupienie rodzajów w rodziny; 2<sup>re</sup> uporządkowanie rodzin w gromady i ich rzędy. Prawie zawsze sam ten podział na gromady, tak jak go widzimy na powyższej tablicy, bywa przedstawionym w dziełach początkowych, pod imieniem metody Jussieu'go, chociaż on właściwie jest częścią tylko i to najmniej ważną owęj wielkiej pracy. Znakomitym szczeblem do ustanowienia układu przyrodzonego, było utworzenie rodzin, które zasługują na to imię, a to właśnie wykonał A.W. de Jussieu. Sam on, jak się zdaje, oznaczył różnicę o jakiej mówimy, przez tytuł swego dzieła, które oznajmia nam: rodzaje ułożone w rodziny przyrodzone, według metody użytej w ogrodzie paryzkim (*Genera plantarum secuncum ordines naturales juxta methodum in horto regio*

*Parisiensi exaratum*). Zastosował on więc przymiotnik przyrodzony do rodzin, a nie do całej metody. Lecz ponieważ on był pierwszym, który wykladał wielkie zasady mające przewodniczyć uporządkowaniu nie tylko roślin, ale wszystkich jestestw ustrojnych; ponieważ w rodzinach podług których podzielił wszystkie rośliny, dał zarazem stałą podstawę i wzór dla nauki; dosyć przeto zdziałał, aby do tej chwili odnosić założenie metody przyrodzonej, która następnie nie potrzebowała już być odkrytą, lecz tylko udoskonaloną.

Wszystkie rodziny przez niego ustanowione, zatrzymane zostały, przy zaprowadzeniu tych tylko zmian, jakie spowodowały koniecznie postęp nauki, bądźto dając głębiej poznać rośliny, wprzód niedokładnie tylko znane, bądź odkrywając wiele nowych, dla których albo trzeba dać nowe ramy, albo rozszerzyć dawne. Lecz w takich razach chociaż granice od umowy zależące zmieniają się, stosunki rzeczywiste pozostaną też same, podobnie, jak np. nie zmienia się odległość różnych miejsc w pewnej przestrzeni kraju, który będąc zrazu jedną prowincją, zostałby następnie podzielonym na wiele okręgów.

Co się tyczy uporządkowania samych rodzin, to było często zaczepianiem i odmienianiem, nie w zasadniczym swoim podziale, który powszechnie przyjęto, lecz w podziałach podrzędnych, wziętych ze sposobu osadzenia pręcików. Zarzucano im, że przyjmują wiele wyjątków, że zaprzeczają wiele zbliżeń przyrodzonych, a tworzą inne wcale nieprzyrodzone. Wyrzuty te są częstokroć słuszne; jednakże, chociaż już całe pół wieku upłynęło od ustanowienia tego układu, i chociaż wiele było usiłowań zastąpienia go innym poprawniejszym, nie widzimy jednakże, aby dotąd znalazł się jaki, o wiele lepszy od niego, a przynajmniej żadnego z nich nie usprawiedliwia w tym względzie przyjęcie powszechne przez botaników.

§ 703. De Candolle, który pierwszy zastosował metodę przyrodzoną do wszystkich roślin rozległego kraju, jakim jest Francja, a później do ogółu wszystkich znanych gatunków roślinnych, ułożył rodziny według porządku, który w istocie swój nie oddala się wcale od metody Jussieu'go. W rzeczy samej, dzieląc rośliny dwuliścienne na *dennokwiatowe* (*thalamiflorae*), które odpowiadają dokładnie płatko-podzwiazkowym; *kielichokwiatowe* (*calyciflorae*), które odpowiadają

płatko-kołozawiazkowym; *koronokwiatowe* (*corolliflorae*), które odpowiadają jednopłatkowym; i *jednokryncowe* (*monochlamydeae*), które odpowiadają bezpłatkowym. postępował według zasad wziętych z korony i jęj oznaczenia, i tēm się tylko odróżnia, że dwie ostatnie z jęgo wielkich gromad. obejmują w sobie kilka innych.

§ 704. Angielski botanik, — którego imię, gdyby zakres tęg książki nie wzbraniał nam objaśnień historycznych, powtarzałoby się na wielu stronicach, ponieważ mało jest ważnych punktów ustrojności roślinnej, na któreby on nie rzucił nowego światła, — Robert Brown, jest jednym z tych, którzy się najwięcej przyłożyli do udoskonalenia rodzin, a obok tego, wskazał on, co czynić należy aby przyjść do porządku przyrodzonego. „Uporządkowanie metodyczne,” mówi on, „a zarazem przyrodzone rodziny, jest w rzeczywistym stanie naszych wiadomości, może nawet wcale niepodobne do osiągnięcia. Zdaje się, że środkiem do pozyskania go kiedyś, byłoby nie kusić się teraz o jęgo całość, a zwrócić swą bacność na powiązanie rodzin w gromady podobnie przyrodzone, i któreby się różnie dały określać. Istnienie wielu takich przyrodzonych gromad zostało już uznanem.”

Tą drogą poszło wielu botaników, zajmujących się rozwiązaniem ważnego tego zadania. Nadawali oni imię gromad skupieniom, daleko mniejszym od tych, które A. W. de Jussieu gromadami nazywał, a nawet wielu takim, z których tenże utworzył proste tylko rodziny, a które nadzwyczajnie się powiększyły, w skutek nowych odkryć. W istocie, liczba gatunków znanych za jęgo czasów, i na których rozbiórze zasadzoną być mogła jęgo metoda, nie przechodziła 20,000, a niewiele się chybi, jeśli liczbę dzisiaj znanych roślin ocenimy na 100,000. Można więc liczyć w przecięciu, że rodziny jęgo obejmują dzisiaj oddziały roślin pięć razy większe niż w początkach, musiały tęg więc przybrać wcale inne znaczenie. Rodziny takie jak jęgo różowate, strąkowe, słazowate, wiesiołkowate, ostromłęczowate, pokrzywowate, i t. d., i t. d., stanowią dziś same gromady; innych musimy po kilka razem ściągać, dla utworzenia oddziałów odpowiedniej wartości. Lindley radził nadać gromadom nową nazwę *zjednoceń* (*aliances*), zatrzymując wyraz *gromada* przy dawném znaczeniu, to jest używając go do oznaczenia podziałów głównych

i mniej licznych, trzech wielkich rozgałęzień państwa roślinnego. Ułożył on wszystkie rodziny w dość znaczną liczbę zjednoczeń, z których każde zawierało ich po kilka. W najdokładniejszym dziele jakie dziś o rodzajach posiadamy, Endlicher usiłował także ułożyć rodziny w wyższe gromadki. W ostatnich zaś czasach, przy nowém zakładaniu ogrodu botanicznego w Paryżu, Adolf Brogniart uszykował 296 rodzin w 68 gromad, których piętna opisał. Spodzićwać się można, iż podobne uczone usiłki i udoskonalenia jakich dozna nauka ustrojności, posunięta już dzisiaj znacznie dalej, niż była w początkach tego wieku, zakończą się układem o tyle przynajmniej przyrodzonym, o ile tego dokazać można wpośród mnóstwa stosunków wiążących z sobą rośliny, a nadewszystko przy konieczności spajania w jednociągły łańcuch ogniw, które krzyżując się w różnych kierunkach, nie dadzą się połączyć w jednym z nich, bez zerwania się w drugim. Aby więc ustalić ostatecznie tyle szukany porządek, potrzeba czekać tych udoskaleń i uświęcenia przez czas; potrzeba ażeby skupienia te, gromady czy zjednoczenia, jak je nazwać zechcemy, uprawnione zostały powszechném przyzwoleniem, i aby piętna ich były należycie skręślone, iżby z porównania ich między sobą, wprowadzić można układ ogólny.

§ 705. Z drugiej strony, pomimo pomnożenia rodzin, ilość ich nie jest tak wielka, ażeby nie można objąć pamięcią rysów, które je od siebie odróżniają, szczególniej przy pomocy pierwszego podziału na trzy wielkie gałęzie. Oczywistym celem metody jest ułatwienie dokładnego poznania różnych roślin, przez podstawienie za owe przyrodzone jednostki, które się zowią gatunkami lub rodzajami, a które dla wielości swój nie mogą być wszystkie na raz przedstawione najszczęśliwszej nawet pamięci, innych jednostek wyższego rzędu, i mniej licznych, aby tym sposobem jednoczesna ich znajomość, nie przechodziła sił naszego umysłu. Tego właśnie dokazało ustanowienie rodzin. Wiedząc, że roślina należy do téj lub owéj rodziny, mamy już pojęcie o wszystkich głównych punktach jej ustrojności i o stosunkach jej do reszty roślin. Ile zaś razy potrzebujemy mieć bliższe o niej wyobrażenie, poszukiwania nasze ograniczone tym sposobem w szerszym zakresie, stają się prędzemi i łatwiejszemi. Ztąd niezaprzeczone owe postępy które zrobiła botanika od czasu jak rodziny za-

stały miejsce innych układów, których podziały łącząc z sobą rośliny, według jednego jakiego punktu ich ustrojności, przedstawiały pojedyncze tylko ich rysy, częstokroć wcale niewiele znaczące. Ztąd owo twierdzenie, któreśmy powyżej wyrzekli, że ustanowienie rodzin prawdziwie na to imię zasługujących, tudzież zasad podrzędności piętn, jest znakomitym szczeblem do znalezienia metody przyrodzonej.

Usiłując tu dowieść zasługi imienia, które sam mam zaszczyt nosić, powodowałem się również uczuciem sprawiedliwości jak przywiązania synowskiego. Zresztą należało dobrze wrazić w umysły uczących się tę prawdę, iż zasługi Jussieu'go nie leżą w krótkiej owej tablicy, która im przedstawiana bywa za treść jego dzieła; że owszem pozostałyby nienaruszonymi, gdybyśmy nawet tablicę ową zmienili, lub wcale odrzucili; tudzież, że lubo oswojenie się z nią jest potrzebnym, potrzeba iść dalej chcąc nabyć dokładnego pojęcia o metodzie przyrodzonej. Znajomość rodzin jest bez wątpienia za bardzo rozciąglą i wymaga za nadto wielu badań, aby uczeń mógł jęj nabyć zupełnie; lecz dobrze byłoby, gdyby zgłębił starannie choć kilka rodzin, i przejął się należycie ogółem piętn, które takowe stanowią. Wtedy będzie mógł przez podobieństwo sądzić o innych i pojąć należycie co rozumieć potrzeba przez rodziny.

§ 706. Granice niniejszego dzieła nie pozwalają nam, wkrótkości nawet wyłożyć wszystkich rodzin. Przystaniemy więc na dołączeniu tablic, dających poznać ich główne piętna. Z pomiędzy jednakże wszystkich wybierzemy niektóre i opiszemy je nieco szczegółowiej, chociaż ile możności najzwężlejš. Będą to rodziny najważniejsze, czyli takie, które przedstawiając jakiś niezwykły lub wyjątkowy punkt ustrojności, dadzą nam sposobność do uzupełnienia opisem ich, pojęć najogólniejszych, na których musieliśmy się ograniczyć w ciągu powyższego wykładu. Wdamy się w niektóre szczegóły dotyczące rodziny odznaczających się uderzającymi własnościami, lub wytworami, bądź użytecznymi w przemyśle, gospodarstwie lub medycynie, bądź też przeciwnie szkodliwymi.

§ 707. Z powodu wszystkich tych uwag, któreśmy powyżej wyłożyli, zachowamy przy wyszczególnieniu rodzin państwa roślinnego wielkie owe podziały ustanowione przez A. W. de Jussieu, dając im pierwszeństwo nad podziałami świeżo

utworzonemi dlatego, że te ostatnie nie spoczywają jeszcze na prawidłach stałych, tudzież dlatego, że pomimo całej wartości jaką one mieć mogą, jeśli je uważamy pojedynczo, ogółowi ich jednakże zbywa jeszcze na owym związku ukłádniczym, za pomocą którego początkujący mogliby łatwo je pojąć i zatrzymać w pamięci. Obok tego jednakże nie uważamy za rzecz konieczną zachować ściśle porządek w jakim rodziny pierwiastkowo były uszykowane; najprzód zaś wyłożymy nowe uwagi, według których porządek ten jak sądzimy, winien być przeznaczonym w niektórych swych częściach.

Jussieu wykładając swoje rodziny, postępował z roztropnością od rzeczy prostych do bardziej złożonych, zaczynając od bezliściennych i kończąc na dwuliściennych. Słuszność tego stopniowania została powszechnie uznana, nie dlatego, iżby sama podwójność liścieni miała być bardziej złożoną od ich pojedynczości, a pojedynczość od zupełnej ich nieobecności, lecz dlatego, że rośliny bezliścienne są oczywiście pod każdym względem prostsze od liściennych, a jednoliścienne od dwuliściennych: wynika to z badania wszystkich narządzi, i nie mamy tu wcale potrzeby dawać nowych na to dowodów, które byłyby tylko powtórzeniem tego, cośmy już powiedzieli przy każdym narzędziu. Porządek ten przeto nie ulega po dziś dzień żadnemu zarzutowi. Dwuliścienne podzielone dalej zostały na bezpłatkowe i jednopłatkowe, wielopłatkowe i osobnopłatkowe; otóż sądzimy, że za ten właśnie szereg podstawić należy następujący: 1<sup>o</sup>d osobnopłatkowe; 2<sup>re</sup> bezpłatkowe; 3<sup>cie</sup> wielopłatkowe; 4<sup>te</sup> jednopłatkowe. Obaczmy zaraz w czym te ostatnie zdają się przedstawiać wyższy stopień złożenia od poprzedzających, i czém przeto zasługują na to nowe miejsce, które im przeznaczamy.

§ 708. Każde jestestwo ustrojne tém jest bardziej złożone, im życie jego jest wypadkiem większej liczby czynności, i im same narzędzia do tychże przeznaczone przedstawiają wyższy stopień złożenia. Z pomiędzy czynności ogólnych, jedne są wyższe od drugich, a mianowicie te, które nie są wspólne wszystkim jestestwom, lecz stanowią wyłączną własność pewnej tylko ich liczby. Jestestwa takie muszą rzeczywiście mieć wyższość nad innemi, ponieważ oprócz działań wszystkim wspólnych, wykonywają jeszcze pewną ilość oddzielnych, a zdolność do wykonywania tych, każe się dorozu-

miów.  
wana  
pospe  
nić s  
widła  
§  
jedna  
staw  
odby  
czyr  
Nara  
ją si  
§  
staw  
musi  
szem  
dem  
dzia  
szem  
lecz  
stestw  
jakieś  
§  
dziel  
nie.  
w tém  
niew  
silna  
ograr  
nia,  
rzedz  
tych  
lecz  
nieie  
który  
wie r  
kiedy  
§  
rzedz  
najpi

miéwać pierwszych. Za pomocą przeto zdolności do wykonywania działań przewyżkowych, to jest za pomocą tego co się pospolicie zowie godnością czynności, jesteśmy w stanie ocenić stopień ustrojności; правило to dołączyć należy do pravidła wyciągniętego powyżej z samej tylko liczby czynności.

§ 709. Łatwo byłoby okazać podobnym rozumowaniem, że jedna i ta sama czynność, może w różnych jestestwach, przedstawiać różny stopień godności, ponieważ nie we wszystkich odbywa się w jednakowy sposób, lecz tu za pomocą jednych czynności, tam za pomocą innych, dodanych do pierwszych. Narzędzia więc będące działaczami tych czynności, pomnażają się i udoskonalają w takim samym stosunku.

§ 710. Ponieważ zaś układ przyrodzony ma za cel przedstawić różne stopnie ustrojności w porządku wstępującym, musi zatem dojść tego, co w jestestwie jakim jest najwyższem, najprzód pod względem czynności, potem pod względem narzędzi wykonywających takowe; i te to właśnie narzędzia będą najważniejsze, nie żeby miały być najpotrzebniejszemi dla życia, które częstokroć może się bez nich obejść, lecz dlatego, że one właśnie stanowią prawdziwą istotę jestestwa niemi opatrzonego, że one właśnie czynią je takim, jakim jest, a nie jakimkolwiek innym.

§ 711. Zastosujmy teraz правило powyższe do roślin. Wdzieliśmy w nich dwie wielkie czynności: żywienie i odradzanie. Druga z tych czynności jest bez zaprzeczenia ważniejszą, w tém rozumieniu, jakieśmy do wyrazu tego przywiązali; ponieważ roślina ogranicza się przez część swego życia, i może nawet ograniczać się przez całe życie na samych narzędziach roślinia, lecz staje się zupełną, dopiero przez rozwinięcie się narzędzi odrodczych. Według stopniowego zatem udoskonalenia tych ostatnich narzędzi, chcemy uszykować państwo roślinne; lecz dla pozyskania tém obszerniejszej podstawy, możemy się uciec jeszcze do porównawczego badania narzędzi roślinia, których stopniowanie, jak okazał de Candolle, postępuje prawie równoodlegle względem narzędzi odrodczych, przynajmniej kiedy uważamy rzeczy w sposób zupełnie ogólny.

§ 712. Roślina tém jest doskonalszą, im więcej różnych narzędzi bierze udział w jéj odradzaniu. Lecz gdzież umieścimy najpierwszy, najprostszy stopień, to jest ten, który nam ma

służyć za punkt wyjścia? Pokazaliśmy wyżej, że narzędzia jedne są proste, inne złożone. Z pomiędzy pierwszych oczywiście najprostszą jest komórka, ponieważ ona jest pierwiastkowym stanem każdego innego narzędzia. I roślina też najprostszą będzie ta, która jest sprowadzoną do jednej lub niewiele tylko zupełnie jednakowych komórek; taki stopień sprowadzenia widzimy w niektórych wodorostach, które przeto zajmować winny pierwsze miejsce w szeregu postępującym od jestestw prostych do złożonych. Każda komórka, oddzielając się od innych, zdolna tu jest zarówno rozmnażać roślinę; narzędzia roślenia i odradzania są zupełnie pomieszane.

§ 713. Następnie znajdujemy w tej samej gromadzie inne rośliny, których tkanka, lubo nie przedstawia jeszcze wcale odłączenia narzędzi nazwanych przez nas zasadniczymi, jednakże nie jest tak jednorodna jak w poprzednich. Niektóre komórki różnią się od innych szczególną postacią i szczególnym wytworem, tak, iż rozwijając się oddzielnie zdolniejsze są od innych do odrodzenia rośliny podobnej do tej, której część stanowiły. Części te tkanki, obdarzone własnością szczególną, lecz rozrzucone i jakby znikające wpośród niej, mogą być w innych roślinach wydawniej umieszczone, mogą zajmować pewne, bardziej w oko wpadające położenie: wtedy, powstać ogólna wydawać się będzie kształtniejszą, a osobność rośliny będzie wyraźniejszą; na niższych bowiem stopniach zaledwie ją można było rozpoznać.

§ 714. W miarę jak owe części na których się ogranicza władza odradzania, odróżniają i oddzielają się coraz bardziej od reszty tkanki, takowa przybiera kształty bardziej okrągłone i zaczyna sama także przedstawiać różnicę części, zaczyna przedstawiać pierwsze ślady narzędzi zasadniczych: jedno z tych, środkowe jest osi, inne boczne, liśćmi: widzimy to np. w sprężycach (*Jungermannia*) i mchach. Następnie udoskonalają się łodygi i liście, a wtedy zwykle te ostatnie, bądźto w swój prawdziwej, bądź w mniej więcej zmienionej postaci, noszą na sobie narzędzia rozmnażania (np. w paprociach). Lecz we wszystkich tych przypadkach narzędzia rozmnażania składają się tylko w części tkanki komórkowej, w szczególny sposób odmienionej, tak, iż w niektórych jej komórkach pozostaje się wiele innych, nazwanych zarodnikami. Niekiedy tworzą się, zawsze kosztem téjże tkanki, inne je-

szcze komórki, których znaczenie niedość jeszcze wyjaśnione, ma, wedle wielu pisarzy, przykładać się wraz z pierwszym do odrodzenia rośliny.

§ 715. Z powyższego krótkiego rozbioru skrytopłciowych wniesć można, że stopień pomieszanania narzędzi rośliny z narzędziami rozmnażania, jest miarą prostości całej rośliny; że odróżnianie się ich coraz wyraźniejsze zapowiada w roślinie ustrojność coraz bardziej złożoną, jak tego dowodzi udoskonalanie się narzędzi zasadniczych, które postępuje w tym samym stosunku.

§ 716. Przychodząc do roślin liściennych czyli jawnopłciowych, widzimy że narzędzia odradzania przybierają nową i dwoistą postać, mianowicie: pylnika i załączka, a do odbywania się samej czynności potrzebnym jest wzajemne działanie tych obudwu narzędzi. Konieczność ta wspólnego ich udziału, dowodzi wyższego stopnia godności samej czynności, która bierze nowe imię: upłodnienia. Stanowi ona związek pomiędzy państwem roślinnym a zwierzęcem, które bez zaprzeczenia posiada ustrojność daleko wyższą. Nie podlega więc wątpliwości, że rośliny jednopłciowe są w wyższym stopniu ustrojne niż skrytopłciowe. Pozostaje nam teraz zastanowić się nad tym, w jaki sposób w jawnopłciowych ustanowić możnaowo stopniowanie, któreśmy dali poznać w skrytopłciowych.

§ 717. Narzędzia rośliny jawnopłciowych są takie same jak w najwyższych skrytopłciowych, to jest osi i liście; narzędzia odradzania objęte są ogólnym imieniem kwiatu, a widzieliśmy już, że dzisiaj zgodzono się powszechnie na to, aby różne części kwiatu uważać za liście mniej lub więcej odmienione. Im zupełniejszym będzie przeobrażenie się jednego w drugie, i im znaczniejszą, a zarazem wyraźniejszą będzie różnica narzędzi rośliny od narzędzi odradzania, tym mniej prostą będzie roślina, jeśli zasada powyżej założona jest prawdziwą.

§ 718. Odmiana jest zawsze wielką i zupełną w narzędziach najistotniejszych upłodnienia, to jest w pylniku i załączku. Pylnik, którego wewnętrzne komórki wytwarzają w sobie inne komórki szczególnego przyrodzenia, będące bezpośrednimi działaczami upłodnienia (ziarna pyłku), okazuje tym samym oczywisty związek z liśćmi noszącymi zarodniki w skrytopłciowych; lecz w tych liściach jest niezupełnie przeobrażonym, i odbywa jeszcze w mniejszej lub większej części swój rozle-

głości, czynności rośnienia; w pylniku zaś liść w skutek zupełnego przeobrażenia, przeznaczony jest wyłącznie do czynności odrodczej, i samą już tą wyraźną różnicą postaci i czynności, dowodzi wyższej daleko ustrojności. Załączek przy swiej tak złożonej budowie, zdaje się być nie tak jednym liściem, jak raczej zbiorem kilku liści, lecz samo tylko wyrozumowanie i podobieństwo poprowadziło do przyznania mu takiego początku. Jeśli to w istocie mają być liście, to przynajmniej są wcale nie do poznania, a zresztą wykonywają wcale inne czynności. Nadto załączki bywają zazwyczaj ukryte pod okrywą, jaką tworzy inny liść także odmieniony, lub nie do tak wysokiego stopnia (owocek); tak, iż możnaby powiedzieć, że w załączku przeobrażenie podniesione jest do swiej drugiej potęgi. W skrytoplciowych nie znajdujemy nic podobnego.

§ 719. Lecz widzieliśmy, że bardzo często inne przyległe liście porzucając postać i czynności swoje, biorą udział w przeobrażeniu i tworzą okrywy kwiatowe: odosobniają one tém bardziej jeszcze pręciki i owocki do narzędzi rośnienia, i tworzą wraz z niemi układ daleko bardziej złożony i wcale odrębny. Przyłączenie się tych nowych części do narzędzi odrażdzenia, zdaje się być oznaką nowego stopnia ustrojności.

§ 720. Wszelako różne te części kwiatu zatrzymują jeszcze częstokroć niejaki ślady swego liściowego przyrodzenia, bez czego nie zostałyby zapewne rozpoznane: szczególniej téż zdarza się to wtedy, kiedy nie będąc z sobą zrosnięte, zachowują na skróconej swjej osi położenie względne, jakie przywykliśmy widzieć w liściach. To piętno położenia daleko trwalsze od piętna postaci, budowy, a tém samém i czynności, najpóźniej się zaciera; lecz kiedy i ono się zatrze, można rzec, iż przeobrażenie doszło swego szczytu. Zdarza się to zaś w skutek zrastania się z sobą różnych narzędzi kwiatowych. Jasną jest rzeczą, że w kielichu lub koronie o pięciu zębach, w rurce utworzonej przez zrosnięcie się pięciu pylników, w związku pięciokomorowym, nad którym wznosi się jedna tylko szyjka, daleko trudniej jest rozpoznać pięć liści, niż w tyłu działkach, płatkach, pręcikach i owockach zupełnie odosobnionych; że w pręcikach prawidłowo osadzonych w węzownię na dnie spłaszczonej, a szczególniej téż na walcowatém (jak w bobrownikowatych), prędzej można domyslić się liści odmienionych, niż w pręcikach wychodzących z rurki

kielich  
wiel  
zem,  
częśc  
domy  
przóc  
o tyle  
traca  
§  
jedn  
jowi  
wsze  
łości  
łącz  
leko  
ny w  
zawie  
okaz  
wione  
radzi  
tak n  
rzedy  
wych  
muj  
§  
stwa  
wiąz  
jąc  
czy  
zwyk  
się t  
znana  
wszy  
łość  
na r  
i na  
wszy  
ntek  
[My  
dzaj

kielicha lub korony, a szczególnie z krążka, który pokrywa wierzchołek zawiązka zrosniętego z kielichem. Połączmy razem, w jeden kwiat, te różne stopnie zrosnąć rozmaitych części, a otrzymamy całość, w której nikt nie będzie mógł ani domyślać się nawet porządnego następstwa liści, chybaby naprzód o tém wiedział, i w której narzędzia odrodcze będą o tyle różne od narzędzi roślenia, o ile tylko niemi być mogą; tracą bowiem ostatnie swe stosunki, stosunki położenia.

§ 721. Łatwo teraz pojąć, dlaczego umieściliśmy tu rośliny jednopłatkowe wyżej od wielopłatkowych, przeciw zwyczajowi powszechnie przyjętemu. Zresztą, jeśli według innej powszechnie uznanej zasady, oceniamy wartość piętn z ich stałości, ujrzymy, że piętna brane z korony jednopłatkowej, połączonej szczególnie z pośredniem osadzeniem pręcików, daleko mniej przypuszczają wyjątków, niż piętna brane z korony wielopłatkowej. Większa część rodzin wielopłatkowych zawiera w sobie nie jeden rodzaj bezpłatkowy, a wiele z nich okazuje oczywiste powinowactwo z rodzinami zupełnie pozbawionemi korony. Jest to punkt tak znany, że wielu pisarzy radzi zebrać wszystkie takie rodziny w jedną wielką gromadę; tak np. uczynił Brogniart, który podzielił dwuliścienne na dwa rzędy: jeden zrosłopłatkowych (§ 364), drugi wolnopłatkowych (*dialypetalae*; od *διαλυετω*, rozłączać, oddzielać), obejmujących rośliny o płatkach wolnych, lub żadnych.

§ 722. Wielu pisarzy stawia na najwyższym szczeblu państwa roślinnego dennokwiatowe, czyli wielopłatkowe podzawiazkowe, a pomiędzy nich rodzinę jaskrowatych, uważając kwiat tychże za doskonalszy od innych, dla wielkiej liczby narzędzi najistotniejszych (pręcików i owoców), jaką zwykle zawiera. Ta wartość przyznana liczbie, nie zdaje nam się tu zasługiwać na większą wagę od téj, jaka jej przyznana była w sądzie o układzie Linneusza, wydanym przez wszystkich stronników metody przyrodzonej. Owszem wielość części kwiatowych pociąga często za sobą ukazanie się na nowo stosunków ułożenia ich w węzownię jednociąglą, i nadaje im przez to pozór kwiatostanu, chociaż właściwie wszystkie należą do jednego tylko kwiatu. Tak np. owocki niektórych jaskrowatych (jak w miłku [*Adonis*], ukwapie [*Myosurus*] i t. d.), biorą postać prawdziwego kłosa, i zdradzają tym sposobem liściowate swe przyrodzenie. Nadto zwią-

zek narzędzi kwiatowych z lłściami bywa niekiedy tak oczywisty, że właśnie jedna z jaskrowatych (ciemniernik) podsunęła geniuszowi Goetego jego sławną teorią przeobrażeń. Kwiatostan pokazuje nam przejście od narzędzi roślenia, do narzędzi upładniania, a przegradzając jedne drugimi, bierze udział tak w jednej jak i w drugiej czynności. Im mniej znacznym jest przejście, a widzieliśmy (§ 385), że niekiedy bywa wcale nawet nieznacznym, tym mniej wyraźnie odznacza się układ kwiatowy; jest to prostszą budowa kwiatu, i tym niższe miejsce mu się należy według zasad przez nas wyłożonych. Znaczna zatem liczba części jednego kwiatu, której wynikiem bywa częstokroć podobieństwo jego z kwiatostanem, nie oznacza wcale najwyższego stopnia ustrojności, owszem sądzimy, że tegoż szukać raczej wypada w rozkładzie wprost przeciwnym, to jest tam, gdzie cały kwiatostan podobnym jest do jednego kwiatu, jak np. w złożonych. Zresztą, uważając z osobna każdy kwiat z téjże rodziny, w którym kielich zrosnięty z zawiązkiem przybiera nową postać, w którym korona jednopłatkowa osadzona jest na krążku nazawiazkowym i nosi pręciki zrosnięte w rurkę pylnikami, znajdujemy w nim prawie maximum zrosnięć, i narzędzia kwiatowe powstałe z liści tak przeobrażonych jak sobie tylko wystawić można.

§ 723. Jednoliścienne mogą równie jak dwuliścienne, przedstawiać różne stopnie złożoności swych kwiatów, a nawet dojść w skutek zrosnięć ich części pomiędzy sobą, prawie do tak zawiąkanego stanu, jak ten, któryśmy dopiero skróśli; storczykowate dają tego przykład. Nie wiemy więc, dla czego roślina rzezone miały być uważane pod względem narzędzi odrodczych za niższe co do ustrojności; jeśli bowiem okrywy ich ograniczają się zawsze na pojedynczym tylko okwiecie, to wszakże w tym samym przypadku znajduje się wiele kwiatów dwuliściennych, a nawet między temi znaleźć można takie, które nie posiadając nic prócz nagiego załączka, przedstawiają daleko jeszcze większy stopień prostości. Dwie więc te wielkie gałęzie, uważane pod względem narzędzi upładniania, idą raczej równolegle względem siebie niż po jednej linii jedna za drugą. Lecz odwołując się wtedy do porównania narzędzi roślenia, podobieństwo znika: jednoliścienne bowiem przedstawiają budowę daleko prostszą, tkankę daleko jednostajniejszą.

§ 7  
żyć n  
szyc  
nam  
powi  
ścić  
Zwią  
Kaźd  
zbliz  
lub p  
wém  
i nas  
kroć  
pańs  
kraj  
dziw  
dzie  
pozos  
własn  
stkie  
ich p  
śliwie  
racze  
Tr  
roślin  
gość  
zupel  
sobem  
z sob  
gałęz  
kaźda  
i moż  
przew

(1)  
turales  
dam se  
quam c  
dlišny  
cośny  
łów, j

§ 724. Staraliśmy się wyszukać zasad, według jakich łożyc można szereg roślin, w postępie od prostych do złożonych; lecz samo różnienie się w zdaniach botaników pokazując nam trudność znalezienia takiej zasady, któraby należycie odpowiadała swemu celowi, i przy pomocy której możnaby umieścić rośliny w ich prawdziwych związkach pomiędzy sobą. Związki te są rzeczywiście bardzo rozliczne w przyrodzie. Każdy gatunek, lub każdy inny zbiór roślin (rodzaj, rodzina i t. d.) zbliża się do wielu innych na raz, a to przez związki równej lub prawie równej wartości; w uporządkowaniu zaś łańcuchowym, może się zbliżać tylko do dwóch, to jest do poprzedniej i następnej, co rozumie się musi zrywać inne związki, częstokroć bardzo ściśle. Linneusz dowcipnie bardzo porównał obraz państwa roślinnego do karty geograficznej, na której każdy kraj styka się z wielu innymi z nim graniczącymi: poprowadziwszy linią jednociągłą od jednego do drugiego kraju, przejdzie ona tylko przez pewną ich liczbę, większa zaś część pozostanie po lewej i po prawej ręce. Łańcuch rodzin jest właśnie taką linią; nie możemy więc umieścić w nim wszystkich rodzin, tylko przenosząc wiele z nich daleko od miejsca ich przyrodzonego. R. Brown wyraził tę prawdę bardzo szczęśliwie, mówiąc, że jestestwa ustrojne powiązane są w siatkę raczej niż w łańcuch (1).

Trzecie porównanie, które weźmiemy z samego państwa roślinnego, pomoże do zrozumienia, jakim sposobem ta mnogość związków pomiędzy rodzinami, nie przeciwi się jednakże zupełnie myśli o uszykowaniu ich w jeden szereg, jakim sposobem linie owe skierowane w różne strony i pokrzyżowane z sobą, mogą ułożyć się w linią jednociągłą. Rodziny są jak gałęzie wielkiego drzewa, wychodzące ze wspólnego pnia; każda z tych gałęzi rozwijając dotyka wielu innych od razu, i może się nawet z nimi krzyżować; niektóre z nich mogą przewyższać gałęzie ponad nimi wyrastające; lecz pomimo

(1) *Jussacianam methodum secutus sua, cujus ordines plerique verè naturales... nec pro illà aliam substituere tentavi, nec de ordinum serie admodum sollicitus fui. Ipsa natura enim corpora organica reticulatim potius quam catenatim connectens, talem viz agnoverit. Flor. Nov. Holl.* Przywieśliśmy tu cały okres dla stwierdzenia świadectwem wyższej powagi tego cośmy powyżej potwierdzili, tudzież (§ 702) dla usprawiedliwienia podziałów, jakieśmy w dalszym ciągu wykładu tego przyjęli (§ 707).

tego rozbioru i tego pozornego zawikłania, zbiegają one się wszystkie przy pniu, i wyrastają z niego, jedna po drugiej od dołu do góry, według jednej linii skręconej. Łatwo pojąć bez wdawania się w dalsze szczegóły, jak przenośnią tę można dalej posunąć, i jak rozgałęzienie, rozmaicie odmieniane, obejmując w sobie odnogi różnego rzędu i różnej wielkości, może przedstawiać wszelkie podziały używane w układach.

§ 725. Gałązki wyrastające z gałęzi, które nam przedstawiają rodziny, zastępują miejsce rodzajów. Mogą zaś one wyrastać z pojedynczej gałęzi kolejno jedna po drugiej, albo też po kilka od razu w jednej wysokości i to z gałęzi także już podzielonej; w pierwszym więc razie utworzą szereg, w drugim grupę. Dwojako ta odmiana zdarza się także w ułożeniu rodzajów jednej rodziny. Bywają rodziny przedstawiające grupę, to jest których rodzaje są bardzo do siebie podobne, a każdy z nich może stykać się z wielu innymi; wszystkie przeto dają się skupiać w pewien niejako spłot. Bywają znów rodziny, przedstawiające łańcuch, to jest, których każdy rodzaj łączy rodzaj przed nim leżący z leżącym za nim; ztąd powstaje prawdziwy łańcuch, w którym ostatni rodzaj wiąże się z pierwszym, jedynie za pomocą ogniw pośrednich i może niekiedy mało tylko być do niego podobnym. Pierwsze z tych rodzin są daleko bardziej przyrodzone, niż drugie.

Zanim zaczniemy obraz i wykład rodzin, wypada jeszcze skreślić niektóre pojęcia.

§ 726. *1sze Co do nazwisk.* — Wiele najdawniej i najpowszechniej przyjętych rodzi wywodzi nazwiska swoje od pewnych rysów najbardziej nderzających: tak, *baldaszkowe* i *baldaszkogronowe*, od swego kwiatostanu; *strąkowe* i *szyszkowe* od owocu; *wargowe* i *krzyżowe*, od kształtu korony; *palmowy* i *trawowy* od ogółu roślin je składających, i t. p., i t. p. Co się zaś tyczy innych, zgodzono się w ogóle na to, aby oznaczać każdą rodzinę imieniem jednego z głównych jej rodzajów, który uważać można za wzór niejako około którego kupią się wszystkie inne. Zakończenie imienia łacińskiego tego rodzaju zmienia się na inne, jakoto: *aceae* (np. *Rubiaceae*), *ineae* (np. *Laurineae*), *ideae* (np. *Capparideae*), *arieae* (np. *Onagrarięae*). Pierwsze z tych zakończeń (na *aceae*) jest najużywaniszym, a niektórzy pisarze może nie bez słuszności, zatrzymują je wyłącznie. Zgodzono się aby proste

zakończeniu *cae*, które dawniej wiele nazwisk rodzinnych nosiło (*Junceae*, *Polygoneae*, i t. d.), zachować w ogóle na oznaczenie podziałów niższego rzędu. W rzeczy samej niektóre rośliny dają się dzielić na wiele grup podrzędnych, określonych piętnami, które nie są tak ważne, aby je mogły podnieść do godności rodzin: grupy takie zowiemy *plemionami* (*tribus*). Tak np. *miedlinowate* (*Meliaceae*) stanowią rodzinę, której wszystkie rodzaje skupione są około rodzaju *miedlin* (*Melia*) dla pewnych, wspólnych piętn; lecz są tam i inne, nie wszystkim rodzajom tej rodziny właściwe; piętna te przedstawiają dwa połączenia, jedno, które znajdujemy w *miedlinie* i kilku innych rodzajach; drugie, które widzieć można w reszcie takowych, a szczególnie w rodzaju *trójnatki* (*Trichillia*). Można więc podzielić *miedlinowate* (*Meliaceae*) na dwa plemiona *miedlinowatych* (*Melicae*) i *trójnatkowatych* (*Trichilliae*). Plemiona powinny składać gromadki przyrodzone; sąto więc jakby małe rodziny, mogące niegdyś być podniesionemi do tej godności, jeśli rodzina której część stanowią, nabędzie, w skutek odkrycia znacznej ilości nowych roślin, takiej rozległości i tyle znaczenia, że rozczłonkowanie podobne da się usprawiedliwić. Po większej części plemiona ustanowione naprzód przez Jussieu'go pod imieniem *oddziałów* (*sectio*), w jego rodzinach, stały się później same rodzinami. Mało więc zależy na tem, czy grupa jaka jest rodziną czy plemieniem, jeśli tylko jest w istocie przyrodzoną, tem bardziej, że nie wszystkie rodziny mają jednakową wartość, bądźto pod względem liczby roślin do nich należących, bądź pod względem ważności piętn je odznaczających. W poniższym wyliczeniu rodzin, za mało będziemy mieli miejsca, aby zstępować aż do plemion, które w takich tylko razach wymienimy, kiedy piętna użyte w tablicach naszych, oddalając nieco jedno plemię tej samej rodziny od drugiego, oddzielnie nas do nich przy prowadzą. Używać także będziemy wszystkich zarówno zakończeń, któreśmy dopiero wymienili, wybierając szczególnie dla każdej rodziny zakończenie nazwiska pod którym takowa najpospolicięj jest znana. Dla chcących badać niektóre rośliny w przyrodzie samej, dodajemy radę, aby wybierali zawsze gatunek autentyczny, z rodzaju od którego rodzina bierze nazwisko. Wtedy mogą być pewni, że nie napatkają żadnego z wyjątków, które sprowadzają uczącego się

z drogi. Jakiemkolwiek bowiem zmiany zaprowadzoneby być mogły w uszykowaniu gromadek, rozumié się wszakże, iż np. *miedliniek gładki (Melia azedarach)*, wzór rodzaju *Melia*, będzie zawsze jedną z *miedlinowatych*.

§ 727. 2<sup>re</sup> **O ich piętnach.** — W pierwszym rzędzie idą piętna odrodece (*character fructificationis*), i służą istotnie do określenia rodziny. Lecz dołączają się zawsze do nich piętna roślin, które jakęśm powieździeli przedstawiają najczęściej w każdej rodzinie jakiś rys szczególny, a tćm samćm umacniają pierwsze, w niektórych zaś razach ułatwiają bardzo poszukiwania. Tak np. liście proste naprzeciwległe z przyliskami międzyogonkowemi, pomagają poznać na pierwszy rzut oka rośliny marzanowate. Przy opisanu rodzajów używamy podobnieź piętn, branych zarazem z narzędzi odradzania i roślin. Linneusz używał tylko pierwszych, zachowując drugie do odróżniania gatunków.

Opisuje się rodzinę albo z najdrobniejszych szczegółami, nie opuszczając żadnego rysu, i to się nazywa *piętnem jćj przyrodzonćm (character naturalis)*; albo tćż, przestaje się na samych rysach odznaczających, których ogół odróżnia ją od wszystkich innych, i to jest *piętnem jćj istotnćm (character essentialis)*. Tu ograniczyć się tylko musimy na tćm ostatnićm.

§ 728. Lecz piętno istotne, jakęśm dopięro powieździeli, nie powstaje z jednego tylko, lecz z połączenia wielu. Nie należy więc przestawać nigdy na jednćm tylko piętnie, chociaźby takowe było wyłącznie własnością jakiej rodziny: jak np. pięćki czworosilne w krzyźowych. Byłoby to jedno co chiećć zrobić czyj obraz przedstawiając jeden tylko rys iwarzy. Obaczmy przy tablicach, że aby być w stanie ich używać, potrzeba mieć dobrze w pamięci obok wyrazów tamże zastosowanych, pojęcia organograficzne rozrzucone w całym ciągu niniejszćj książki, nadewszystko zaś pojęcia któreśm wyłozyli o kwiecie, o umiarze czćści i ich osadzeniu, o położeniu nasion, a szczególnić o ich budowie, której różne odmiany dostarczają piętn najważniejszych różnego stopnia.

§ 629. Przypomnijmy nakoniec jeszcze o całej niedostateczności tych tablic, których celem jest tylko odznaczyć rodziny za pomocą głównych punktów ich ustrojności, nie zaś dać poznać w całości takową. Urządzone w duchu metody roz-

biorow  
zawsz  
glów  
niekt  
mowa  
w po  
zac  
wino  
wod  
rych  
któr  
przy  
Ni  
ły pa  
żnych

§ 2  
nia (§  
Pozos  
żnie  
tćj g  
złoz  
tego  
le ró  
w dru  
ści ta  
pełni

§  
jak r  
te, d  
rzędu  
tu śle  
prost  
drob  
stwa

biorowej (631); muszą one być mniej więcej układowe, i nie zawsze mogły zachowywać porządek przyrodzony, ponieważ głównie szło o dane podziałów wyraźnych i jasnych. Dlatego niektóre rodziny nie przypadają ściśle w miejsca, jakie zajmować powinny. Staraliśmy się jednakże oddalić je od nich w podobnych przypadkach, najmniej o ile tylko można, i ukazać je przynajmniej obok rodzin, z którymi najwięcej są spowinowaczone, lubo i to nie zawsze się dało wykonać, z powodu owych ustapiień, jakich wymagało ustanowienie niektórych wielkich podziałów np. osobnopłciowych. Zresztą niektóre uwagi wskażą podobne zboczenia w miarę jak takowe przypadną.

Nie powtarzamy tu piętn odznaczających trzy wielkie działy państwa roślinnego, ponieważ te wyłożone zostały w różnych rozdziałach tej książki.

## ROŚLINY BEZLIŚCIENNE.

§ 730. Rozbieraliśmy już w ogólności narzędzia ich roślinia (§§ 101—109, 120, 152) i odradzania (§§ 470, 600, 607). Pozostaje nam tylko obaczyć w jaki sposób narzędzia te, różnie odmieniane, pozwalają ustanowienia licznych podziałów tej gromady. Przypomnijmy sobie, że jedne z nich, prostsze, złożone są z samych tylko komórek, inne zaś posiadają prócz tego związki włókno-naczynne; że jedne nie przedstawiają wcale różnicy narzędzi zasadniczych (łodygi i liści), istniejących w drugich. Pierwsze te pojęcia wystarczą do zrozumienia w części tablicy następującej, niektóre zaś dalsze szczegóły uzupełnią jej objaśnienie.

(Tablica I. pag. 570).

§ 531. Większa część tych skupień, jest nie tak rodzinami, jak raczej gromadami, ponieważ liczne rośliny w nich zawarte, dają się dzielić na grupy drugiego, a te na grupy trzeciego rzędu, któreby odpowiadały tyłuż rodzinom. Nie będziemy ich tu śledzić aż do tych ostatnich podziałów, tém bardziej, że prosta ustrojność tych roślin, wymagałaby dla odcieniowania drobnych piętn stanowiących różnice pomiędzy rodzinami, mnóstwa szczegółów przechodzących zakres niniejszego dzieła.


## RODZINY. Tablica I.

## ROŚLINY BEZLIŚCIENNE.

Budowa	całkowicie ko- mórkowa	Oś żądna	bez liści lub listowia liściowatego	Rośliny wodne ..... Rośliny ziemne .....	WODOROŚTY ( <i>Algae</i> ), GZYZY (Fungi), POROŚTY ( <i>Lichenes</i> ), WĄTROBNICE ( <i>Hepaticae</i> ).
		Oś	Liście lub listowia liściowate, Liście lub listowia liściowate   Puszki bez nakryw. osi, Sprężyki — znakryw. osi, Spr. żądna	Bez plechy .. Plecha i puszki	MORY (Musci), RAMIENNICOWATE ( <i>Characeae</i> ), SREZYPOWATE ( <i>Equisetaceae</i> ), WIDELAKOWATE ( <i>Lycopodiaceae</i> ), PAPROCHE ( <i>Filices</i> ), KORZENIO-ZIARNE ( <i>Rhizocarpaceae</i> ).
	włókno-naczywna, odradzania	Liście lub listowia żądne pod liuskami tworzącami szyszki wierzchołkowe.	Pochewki około łodyg..... samotne przy nasadzie liści..... kupkami na powierzchni liści..... w zawieralnikach mających kształt owocu, umie- szczonych w bliskości nasady korzeni.....		

Przestaniemy więc na niektórych objaśnieniach, dotyczących się głównych gromad i ich znaczniejszych podziałów.

§ 732. **Wodorosty (Algae).** — Wodorosty potrzebują zawsze do życia swego wody: niektóre z nich wprawdzie znajdują się na powierzchni ziemi, lecz to wtedy tylko, kiedy takowa jest nadzwyczaj wilgotną, prócz tego wszystkie żyją w wodzie. Znany pod ogólném nazwiskiem *zielenic (Conservae)* te, które żyją w wodach słodkich; pod nazwiskiem zaś



*morszczyzn (Fuci)*, te, które zamieszkują wody słone i obfitują na brzegach morza. Lecz nad podział ten utrzymujący się przez długi czas, przenosimy podział zasadzony na badaniu ich budowy i owocowania, a mianowicie podany przez DeCaisn'a.

502. Obraz jednego z wodorostów pojedynczo zarodnikowych *Fucus serratus*. — Roślina cała pomniejszona. — *f* Listowie. — *cc* Zawieralniki rozrzucane na powierzchni kończyn.

503. Kończyna listowia nosząca zawieralniki.

504. Przecięcie pionowe zawieralnika *c*, którego powierzchnia wewnętrzna pokryta jest zarodnikami. — *t* Część tkanki powierzchniowej, w której pograżony jest zawieralnik. — *o* Otworek, którym takowy spółniczy z zewnątrz.

505. Zarodniki; jeden z nich *sp* okryty jeszcze swoim kołozarodnikiem, drugi, którego kołozarodnik *p* pozbył się swego zarodnika odrysowanego osobna na boku. — *f* Soczniki.

Niektóre z wodorostów, jakieśmy już powiedzieli, przedstawiają najprostszy stopień ustrojności, jaki sobie tylko wystawić można; składają się bowiem z pojedynczych komórek; w innych, liczne komórki łącząc się z sobą końcami, stanowią nitki bądź odosobnione, bądź zbliżone i jakby zawikłane, niekiedy nawet z pewną kształtnością, tak, iż zdają się wychodzić promienisto ze wspólnego środka. Widzieliśmy (§ 318), że nitki te otoczone są zazwyczaj obłóczką śluzową; która często stanowi okrywę wspólną dla całego układu nitek zwikłanych, tak, iż skupienie ich zdaje się poniekąd przedstawiać osobnik. Komórki te odosobnione lub połączone końcami, zawierają istotę zieloną, której ziarenka w komórkach wolnych, mogą stać się ciałami odrodczemi. W niektórych komórkach nitek złożniejszych, istota zielona dzieli się o pewnym czasie na kilka (zwykle cztery) części, z których każda stanowi zarodek. Te to właśnie zarodniki roślin tak prostych, wyszedłszy z komórek, które je wydały, odbywają niejaki przeciąg czasu ruchy podobne zwierzęcym (§ 606, fig. 496—499). Możnaby te wodorosty nazwać *zwierzozarodnikami* (*Zoosporeae*) (od ζῷον, zwierzę).

W innych daleko mniej licznych i złożonych podobnie z nitkami, które powstały przez zrośnięcie się końcami komórek wypełnionych istotą zieloną, komórki te o pewnym czasie wydłużają się bokami swemi w rodzaj kieszonki. Przedłużenia takowe należące do dwóch różnych nitek, spajają się z sobą końcami, a potem przedziurawiają, tak, iż przez to jedna komórka spółniczy z drugą, a istota zielona przechodzi z jednej do drugiej, łączy się ze znajdującą się tam podobną istotą i tworzy ciało, które stanowić będzie zarodek. Mamy tu więc wyższy stopień złożoności, ponieważ dwie różne nitki uczestniczą razem w uistoczeniu zarodnika; wodorosty takie oddzielić można pod imieniem *łącznozarodnikowych* (*Synsporeae*) (od συν oznaczającego połączenie).

Następnie napotykamy wodorosty powstałe z tkanki daleko złożniejszej: wprawdzie niektóre z nich utworzone są jeszcze z nitek pojedynczych; lecz w innych komórkach i nitki łączą się z sobą dla uistoczenia ciał zawikłanych, które wydłużają się na podobieństwo łodyg, lub wypłaszczają w blaszki; rozszerzenia te, zaokrąglone lub płaskie, nazwane *listowiami* (*frons*; [fig. 502]) mogą się kilkakrotnie rozgałęziać, cza-

sami  
wna  
istota  
kowa  
który  
episp  
wtedy  
zwa  
pojed  
wier  
tojes  
z któ  
504)  
Na  
razow  
oddzie  
który  
rzędzi  
wysta  
poprze  
ném i  
dzie p  
szych  
czter  
we w  
tego  
podob  
posta  
ną, m  
na wp  
dyncz  
zaś ba  
Naj  
pione  
w poc  
ne są  
korzer  
sania,  
wierze  
często

sami widelkowato. Niektóre z ich komórek wystają na zewnątrz, siedząc często na rodzaju szypuleczki; zawarta w nich istota ustraja się w zarodnik, względem którego błona komórkowa tworzy okrywę (*kołozarodnik*, *perisporium*), lecz który prócz tego odziany jest błoną właściwą (*nazarodnik*, *episporium*) ściśle z nim złączoną i okrywającą go nawet wtedy, kiedy wyjdzie z kołozarodnika. Wodorosty te można nazwać *pojedynczo-zarodnikowemi* (*aplosporeae*) (od ἀπλόσπος, pojedynczy). Nie zawsze jednak zarodniki ukazują się na powierzchni listowia, często owszem ukryte są w zawieralnikach, to jest wydrążeniach rozrzuconych przy powierzchni (fig. 503) z którą się łączą za pomocą małego przewodu lub dziurki (fig. 504) jaką się na zewnątrz otwierają.

Nazwisko powyższej grupy jest poniekąd przeciwnem w razorowi *podzielnozardnikowe* (*Choristosporeae*; od χωριστός, oddzielny), użytemu na oznaczenie oddziału następującego, który obejmuje wodorosty najwyższej ustrojności. W tych narzędziu odrodcze są podwójne: jedne składają się z ciała wystającego na zewnątrz, i dosyć podobnego do zarodnika poprzedzających oddziałów, prócz że jest zupełnie jednostajnym i nie leży wkoło zarodnika, z którego musiałoby wychodzić przy wschodzeniu. Drugie powstają w komórkach głębszych, z bryłki zrazu pojedynczej, następnie dzielącej się na cztery zarodniki. Od tychto właśnie zarodników, istniejących we wszystkich dzielnozardnikowych, wywodzi się nazwisko tego oddziału; pierwsze bowiem lubo mogą także wschodzić, podobne są raczej do cebuleczek. Cała roślina przedstawia postać gałązek lub blaszek, i posiada zawsze barwę czerwoną, niekiedy bardzo świetną; jeżeli zaś wystawioną zostanie na wpływ powietrza, barwa jej przechodzi w zieloną. Pojedynczozarodnikowe przeciwnie, są zielone w wodzie, tracą zaś barwę i bieleją w powietrzu.

Największe wodorosty pływają nie będąc wcale przyzcpione do ziemi, wyższe zaś, mogą wprawdzie żyć także w podobnych okolicznościach, zwykłej jednakże przyzcpione są do dna i do skał za pomocą przedłużeń podobnych do korzeni; lecz sąto raczej proste haczyki niż narzędzia wysysania, gdyż wszystkie te rośliny wysysają na całej swój powierzchni wodę, która im pożywnie przynosi, i zawierają częstokroć w swym układzie pierwiastki nieustrojowe, jakie

się w tejże wodzie znajdują. Tak np. soda i jod obfitują w roślinach morskich, które też w celu otrzymania tych istot zbierane bywają. Wodorosty wydzielają śluz, używany z pewnych gatunków na pożywienie dla ludzi. Gniazda niektórych jaskółek, poszukiwane w Chinach jako wyborna potrawa, winny tę wartość morskazynom, z których je ptaki lepią.

§ 733. **Grzyby (Fungi).** — Jak wodorosty w wodzie, tak grzyby żyją w ziemi, lub na jej powierzchni, obfitując szczególnie na rozkładających się istotach zwierzęcych i roślinnych.



506.

506. Kępka pieczarek (*Agaricus campestris*) w różnym stopniu wykształconych. — *p* Trzon — *c* Kapelusz. — *v* Poprzeczka, która zrazu łączy trzon z kapeluszem, a później przerywając się tworzy pierścień *a*. — *h* Błaszki promieniste, siedzące pod spodem kapelusza, przyodziane błonką.

507. Błonka (*Hymenium*) widziana z góry; na niej spostrzedz można zarodniki *s* zbliżone do siebie po cztery.

508. Maleńka cząsteczka błonki mocno powiększona i widziana z boku. — *h* Tkanka jej. — *b* Podstawki wraz z zarodnikami. Na boku przedstawiona została jedna z podstawek, nosząca większą liczbę zarodników. — *c* Pęcherzówki.

509. Maleńka cząsteczka kapelusza kratkowego z *Clathrus cancellatus*, wraz z błonką, która pokrywa powierzchnię jego wewnętrzną i widzieć się daje na obwodzie przerw. — *l* Kraty.

510. Błonka mocniej powiększona, dla pokazania szczególnego kształtu podstawek *b*. — *s* Zarodniki.

507.

509.



508.



510



Lubo n  
do wid  
jednak  
ści, ja  
Léveill

W i  
dynczy  
cu od  
na jej  
cała w  
rodez  
dziam

dniko

Inne

chosp

nitkow

tworzy

wcale

kiedy p

kę koia

niec ro

Inny

te są

wate,

ne. T

które

czasie

łatwo

chery

Nast

nitka l

jajowa

Lecz w

dna, l

łóżko,

rodni

rozcią

wystaj

niasta

sposo

Lubo ustrojność wznosi się w pewnych oddziałach téj rodziny do widocznie wyższego stopnia niż w wodorostach, w innych jednakże zstępuje znowu do ostatniego prawie stopnia prostości, jak to pokaże następujący podział tych roślin podług Dr. Léveillé, którego prace tyle światła rzuciły na ich znajomość.

W istocie znajdujemy grzyby składające się z nitki pojedynczych lub gałęzistych, złożonych z członków, które w końcu oddzielają się, bądź w całej odległości nitki, bądź tylko na jéj kończyźnie. Każden z tych członków jest zarodnikiem, cała więc roślina zdaje się być złożoną z samych narzędzi odrodznych, które tym sposobem zlewają się w jedno z narzędziami roślenia. Takie grzyby można nazwać *członkozarodnikowemi* (*Arthrosporae*; od *ἄρθρον*, członek).

Inne, które można nazwać *włoskozarodnikowemi* (*Trichosporae*; od *θρίξ, θρίξ*, włos), posiadają téż samą postać nitkowatą pojedynczą lub gałęzistą; lecz ich zarodniki zamiast tworzyć nitkę w skutek łączenia się końcami, są od takowej wcale różne i osadzone bądź na jéj kończyźnie, bądź niżej, niekiedy pojedynczo, częściej po wiele razem, ułożone w wiązkę końcową lub w okółki kształtnie popiętrzone, albo nakolnec rozrzucone po całej powierzchni od dołu do góry.

Innym razem zarodniki nie leżą na zewnątrz, lecz zamknięte są w pęcherzykach błoniastych, kończących nitki włoskowate, pojedyncze lub gałęziste, jednociągłe lub poprzegradzane. Te więc pęcherzyki są istotnemi purchatkami (§ 601), które są znakiem wyższego już stopnia złożoności; o pewnym czasie otwierają się one i wypuszczają zarodniki. Można to łatwo widzieć na pleśni zwyczajnej. Grzyby te nazwiemy *pęcherzykozarodnikowemi* (*Cystosporae*, od *κύστις*, pęcherz).

Następnie napotykamy nitki pojedyncze lub gałęziste; każda nitka lub gałązeczka zakończona jest zarodnikiem samotnym, jajowatym, lub okrągłym, jednociągłym lub poprzegradzanym. Lecz wszystkie nitki przyczepione są do wspólnego ciała, czyli dna, któremu nadano imię *podkładki* (*stroma*; od *στρομν*, łożko, poduszka), a zład grzyby te zowią się *podkładkozarodnikowemi* (*Stomatosporae*). Podkładka raz mięsista, rozciąga się w powierzchnią płaską lub wklęsłą, ponad którą wystają na zewnątrz zarodniki; drugi raz korowata lub błoniasta, zachyla się i zamyka nad nimi, zawierając je tym sposobem w wydrążeniu, które się u góry otwiera dziurką.

Niekiedy dziurki wielu podkładek ułożonych w okrąg, zbiegają się w jednym punkcie, który wtedy zdaje się być otworem wspólnym ich wszystkich. Czasami podkładka wywyższona jest na trzonku węższym od niej samej, zwykle jednakże bywa beztrzonkową.

Wystawmy sobie zamiast nitki noszących zarodniki, woreczek bądź kulisty bądź wydłużony w pałeczkę lub walec i zawierający 4 lub 8 zarodników wolnych, czyli krótko mówiąc to cośmy oznaczyli (§ 604, fig. 494) imieniem puszki; wystawmy sobie dalej puszki te osadzone na wspólnem dnie, które jak w przypadku poprzedzającym, albo je na sobie nosi, albo całkowicie okrywa, a będziemy mieli grzyby *puszkozarodnikowe* (*Thecasporae*). Dno zazwyczaj bardziej rozwinięte, nie nosi tu już imienia podkładki. Przedstawia ono w stosunkach swoich do puszki taki sam szereg odmian, jakimiś wyżej (§ 209) skróślił przy kwiatostanie jawnopłciowych, pomiędzy kwiatami i osiłą, na której takowe siedzą. Tak np. dno puszkazarodnikowych może być osadzone puszkami na całej powierzchni zewnętrznej (jak w *Geoglossum*), albo tylko przy wierzchołku, zazwyczaj nabrzmiałym (jak w smardzu; *Morchella*); albo na powierzchni górnej tej samej kończyny wypłaszczonej w miseczkę (jak w kustrzebce *Peziza*); albo też miseczka owa zamyka się ponad puszkami, które przeto objęte zostają wydrążeniem, bądź wypuszczającem o pewnym czasie zarodniki przez otworek u wierzchołku będący, bądź (jak w trufli) zamkniętym ciągle i tylko w skutek gnicia uwalniającem zarodniki. W puszkach znajdują się często także komórki wydłużone i próżne czyli *soczynki* (*paraphyses*).

Nakoniec znajdujemy grzyby najdoskonalsze, a pomiędzy niemi i te, których postaci są nam najznajomsze, a które zwykle znamy pod tym nazwiskiem. Jednakże napotykamy tu jeszcze kształty podobne do poprzedzających, np. kształt maczugi, bryłek jajowatych lub kulistych, miseczek; jednym z najpospolitszych i najbardziej odznaczających się (fig 506) jest kształt kopuły lub kapelusza (*c*), wywyższonego na podporze czyli trzonku (*p*) mniej więcej wężkim i długim. Lecz najbardziej odznacza te grzyby kształt narzędzi odrodczych. Sąto małe, okrągłe ciała, u wierzchołku wybiegające we dwa, lub częścię cztery kończyki, z których każdy nosi u góry po je-

dnym zarodniku. Ciałka te nazwano *podstawkami* (*basidia*) (fig. 508), a grzyby niemi opatrzone *podstawkozarodnikowemi* (*Basidiosporae*). Dostyc często, lubo niezawsze, obok podstawek znajdujemy przymieszane w mniejszej ilości inne ciałka pęcherzykowate, zazwyczaj większe, przezroczyste, wypełnione jak się zdaje płynem, nie noszące ani kończyków, ani zarodników; nazwano je *pęcherzówkami* (*Cystidia*) (fig. 508 c). Niektórzy sądzą, że ciałka te są przeznaczone do upładniania zarodników, zastępując niejako pręciki, lecz w takim razie musiałyby się znajdować we wszystkich podstawkozarodnikowych, tymczasem tak nie jest. Zdaje się raczej, iż to są podobniki soczników. Podstawki i pęcherzówki leżą podobnie jak puszek w poprzedzającym razie zewnątrz lub wewnątrz. Leżąc wewnątrz, bywają albo pomieszane (jak w tegoskórce [*Scleroderma*]) z komórkami, do ścian których się przyczepiają, albo wyściełają powierzchnią przerw daleko znaczniejszych (jak w purchawce [*Lycoperdon*]); leżąc zaś zewnątrz, bywają niekiedy pokryte warstwą śluzowatą (jak w sromotniku [*Phallus*]); częściej jednakże są wolne, i rozrzucone po całej powierzchni dna wydłużonego bryłkowato, lub rozgałęzionego nakształt drzewa (jak w rodzaju *Clavaria*), albo też tylko na powierzchni dolnej. W tym ostatnim przypadku dno przedstawia zazwyczaj kształt parasola lub kapelusza, pod którym znajdują się blaszki rozchodzące się promienisto (jak w bedłkach [*Agaricus*]), żyłki (jak w stroczkach; *Merulius cantarellus*), rurki (jak w hubach [*Boletus*]), zęby (jak w kolczaku [*Hydnum*]), albo nakoniec powierzchnia bądź gładka, bądź najeżona małemi brodawczkami (jak w pleśniakach [*Thelephora*]). Podstawki więc siedzą na tych powierzchniach, zębach, żyłkach, blaszkach, lub wewnątrz rurek.

Oprócz wymienionych wyrazów, wiele jeszcze innych przyjęto na oznaczenie tych różnych części, w celu skrócenia opisu grzybów. Tak, warstwa złożona z ciałek odrodczych, bądź to podstawek, bądź puszek, zowie się *blonką* (*Hymenium*). Widzimy, iż najprostsze grzyby, jakieśmy powyżej opisali składają się prawie wyłącznie z takiej błonki, albo nawet z ułomków takowej; że w grzybach wyższych zjawia się oprócz tego warstwa innej tkanki, należącej do układu narzędzi roślenia, tworzy wraz z tamtą dno, które rosnąc

coraz bardziej, może przybierać różne postacie. Jeśli jest zupełnie zamkniętym, zowie się *zawijką* (*peridium*). Lecz nawet w grzybach mających kształt parasola, kapelusz (*pileus*) tworzy w początkach czas niejaki wydrążenie zamknięte, za pomocą zasłony (*velum* fig. 507, v), która od brzegu kapelusza rozciąga się aż do trzonka, a która później rozdzierając się, tworzy około trzonka rodzaj kołnierzyka, lub tylko bliźnię obrączkowatą (*a*) (*pierścień*, *annulus*); prócz tego, niekiedy w młodości worek komórkowy (*opona*, *volta*), okrywa cały grzyb, poczynając od samego spodu przy którym się poczyna; następnie rozdziela się niekształtnie, w skutek rozwijania się trzonu (np. w muchomorze (*Amanita muscaria*).

To cośmy dotąd opisali, nie stanowi jeszcze całego grzyba, lecz jest poniekąd tylko jego kwiatostanem. Zanim ta część się rozwinię, widzimy nitki wychodzące promienisto z jednego punktu (zapewne ze wschodzącego zarodnika) powikłane z sobą we wszystkich kierunkach; w końcu skupiają się szczególnie na pewnych miejscach, z których później wychodzą przyrządy dopiero opisane. Owe ciało niciaste nazwane *grzybnią* (*mycelium*); bywa najczęściej ukryte pod ziemią i uchodzi przed okiem naszym równie z przyczyny swego położenia, jak z przyczyny swój kruchej tkaniny. Nie rzadko można je spostrzedz w miejscach wilgotnych i ciemnych, np. na ścianach piwnic. Grzybnia więc jest rodzajem drzewka podziemnego, które wysyła na wierzch same tylko kończyny swe, obciążone narzędziami odrodczemi, tak, że zazwyczaj wszystkie grzyby rosnące w bliskości siebie, należą rzeczywiście do jednego osobnika: ztąd to pochodzi ułożenie okrągowe, jak w wielu napotykamy; grzybnia rozwija się tu kształtnie w środku jednorodnym, i wysyła wszystkie swe promienie do równej odległości.

Tkanka grzybów jest rodzajem pilsći, powstałej z komórek okrągławych lub wydłużonych i połączonych z sobą końcami w rurki. Błonka (*hymenium*) powstaje często z samych kończyn tych rurek, których część nosi na sobie puszki, podstawki lub pęcherzówki, tak, iż nitki owe pojedynczo brane stanowią rzeczywiście grzyby prostsze, pęcherzykozarodnikowe lub włosko-zarodnikowe.

Błona tych komórek jest tego samego przyrodzenia, co wszystkie inne ściany roślinne, składa się bowiem z błonniku.

Dawni  
rębne  
bniki  
ścian  
nikają  
leko  
białk  
szcz  
Ze s  
prze  
zjaw  
się v  
O  
bard  
tego  
i dzie  
niezie  
jego l  
kwas  
stym  
łącze  
wym,  
nim,  
wted  
troro  
pierv  
jak s  
zaws  
Po  
syc p  
wych  
znaby  
ich, n  
dzycz  
w ist  
tki ja  
gatun  
w oco  
padka


Dawniej mniemano, że tkanka grzybów powstaje z wcale odrębnej istoty, zawierającej wiele saletrorodu, i nazwanej *grzybnikiem* (*funginum*). Lecz skład podobny nie jest właściwy ścianom i przynależy raczej istotom wypełniającym lub przenikającym takowe. Pod względem wydzielen grzyby stoją daleko wyżej od wodorostów; wytwarzają one szczególniej białko, cukier, istotę tłustą i różne kwasy, prócz wielu innych szczególnych związków nadających im ich znane własności. Ze składu ich wynika, że rosną nadzwyczaj prędko, a po przenikającym prędko istnieniu, rozkładają się przy podobnych zjawiskach, i przy wytwarzaniu podobnych związków, jakie się widzieć dają w psujących się istotach zwierzęcych.

Odziewają się one barwami bardzo rozmaitemi, a niekiedy bardzo świetnymi, prawie nigdy jednakże nie są zielone. Dlatego też żyją i barwią się zarówno w ciemności jak w świetle, i działają na atmosferę, podobnie jak wszelkie inne części niezielone. Psują bardzo prędko powietrze, pochłaniając jego kwasoród, w celu tworzenia i wyliewania równej ilości kwasu węglowego. Uwagi godnym jest, iż umieszczone w czystym kwasorodzie, pochłaniają go i w części używają do połączenia z węglem, oddając go następnie w kwasie węglowym, w części zaś zatrzymują go w swęj tkance, zastępując nim, jak się zdaje, dość znaczną ilość saletrorodu, który wtedy wyliewają na zewnątrz. Umieszczone w samym saletrorodzie, nie wpływają prawie wcale na niego. Muszą więc pierwiastek ten tak w nich obfitujący otrzymywać z ziemi, jak się tego domyślać było można, widząc je żyjące prawie zawsze na rozkładających się istotach ustrojowych.

Powszechnie wiadomo, iż grzyby, obok poszukiwanych do syć potraw, dostarczają także trucizn nadzwyczaj szkodliwych. Niestety nie mamy pięt, za pomocą których można by grzyby jadowite od nieszkodliwych rozeznąć. Używając ich, potrzeba zachować roztropność, tém większą, że na cudzych doświadczeniach nie zawsze polegać można. Zdaje się w istocie, że sposób ich przyrządzania wpływa wiele na skutki jakie wydawać mogą. Szkodliwe własności niektórych gatunków niszczy gotowaniem, soleniem, lub moczeniem w occie; co zdaje się dowodzić, iż strzedz się należy w przypadkach zatrucia, używania soli i octu, które rozpuściwszy

w sobie pierwiastek jadowity, mogłyby rozszerzyć takowy daleko prędzej po całym ciełe.

§ 734. **Porosty** (*Lichenes*). Porosty tworzą owe rozszerzenia roślinne, zazwyczaj suche, które powłóczą powierzchnią kamieni, ziemi, kory, drzew, używając jej różnych barw jakie im są właściwe. Rozszerzenia te, noszące nazwę plechy (*thallus*) porostu, składają się niekiedy jakby z drobnego proszku i w takim przypadku nie mają stałej, ani wyraźnie określonej postaci. Innym razem tworzą rodzaj skorupy już nieco kształtniejszej, i posiadającej zbitość podobną jak podkładki niektórych grzybów. Nakoniec mogą albo tworzyć blaszki, których obwód jest należycie określony, często-



króć łatkami dzielącemi się w dalszym rozwijaniu widełkowato, albo też nitki bądź proste, bądź gałęziste. W tkance ich rozróżnić można dwa gatunki komórek: jedne z tych są krót-

511. Porost o otoczeniu otwartym (*Parmelia acetabulum*). — *t* Plecha. — *s* Pleszki tarczowate w różnych stopniach rozwinięcia.

512. Pleszka przecięta pionowo i znacznie powiększona dla uwyrażnienia warstwy *tp*, składającej się z puszek i soczników.

513. Mała cząsteczka pleszki bardziej powiększona. — *cm* Warstwa rdzeniowa. — *cc* Warstwa korowa. — *tt* Puszeki w różnym stopniu rozwinięcia. — *p* Soczniki.

kie, o ścianach grubych i zazwyczaj ściśle z sobą połączonych; drugie wydłużone w niteczki wietko z sobą splecione. Same pierwsze znajdują się w porostach proskowatych lub skorupkowatych; w innych tworzą one tylko *pokład* środkowy, czyli *rdzeniowy* (fig. 513 *c m*), na których z obu stron leży *pokład korowy* (*c c*), złożony z komórek nitkowatych. Niektóre z tych ostatnich idąc w dół od powierzchni spodniej, w postaci małych niteczek, służą do przytwierdzenia porostu do ciała noszących go na sobie i stanowią przeto rodzaj korzeni, nie pełniąc jednakże ich czynności.

Pod względem narzędzi odrodczych, porosty zbliżają się bardzo do grzybow puszkozaródnikowych, ponieważ narzędzia te są także puszkami zawierającemi zarodniki najczęściej w liczbie 2, lub wielokrotnej z tego: 4, 8, niekiedy zaś w liczbie 12, lub 16.

Puszki bywają zebrane w kupki, leżące albo bezpośrednio na plese, która wtedy tworzy miejscami dno, albo też na oddzielnj i pośredniczającj tkance (fig 512 *a*). Dno wznosi się naokoło kuppek brzegiem wystającym, utworzonym także z plechy lub tkanki odrębnej, albo też z obudwu zarazem, i stanowi, albo prostą tylko obrączkę, albo przewyższając puszki, zamyka się ponad niemi i obejmuje je tym sposobem w swém wyrażeniu, przybierając nazwę *otocznia* (*perithecium*). Częstokroć w młodości tylko zupełnie je okrywa, potem zaś rozdziela się i rozkłada. Pomiedzy puszkami (fig 513 *t*) leżą nitki płonne czyli soczniki *p*, które ponieważ są dłuższe i połączone wierzchołkami, wiążą cały ten układ w jedno niejako ciało. Ciało to wraz z dnem swoim podobne jest do owego, jakieśmy widzieli w grzybach, wraz z błoną, nazywa się zaś tu *pleszką* (*apothecium*; fig. 512). Reszta plechy jako nie znajdujaca nic podobnego sobie w grzybach, prócz chyba *grzybni*, stanowi istotną różnicę pomiedzy obiema gromadami.

Porosty, których dno utworzone jest z plechy, podzielić można na: proskowate (*coniothalami*); skorupkowe (*idiothalami*), to jest te, których duo składa się z warstwy odrębnej; na opatrzone otoczniem zamkniętym (*gasterothalami*), tudzież na posiadające otoczeń otwarty (*hymenothalami*). Pleszka oznaczoną bywa częstokroć różnemi nazwiskami wedlug różnej postaci jaką przybiera; np. krążka, tarczki, guziczka, kulki, wyrazy te nie potrzebują objaśnienia; zowie się

także *paskiem* (*tirella*), jeśli będąc równowązką i falistą, otwiera się szparą podłużną.

Porosty różnią się jeszcze tém od grzybów, że trwają dość długi czas, a powłócząc ciała nieustrojowe, żyjące, albo i nieżyjące lecz niegnijące, zdają się szukać powietrza i światła. Rzadko jednakże bywają zielone, lubo będąc zmoczone, lub zwilgocone, przybierają tę barwę wszystkie bez różnicy; tkanka ich sucha, krucha lub korowata, staje się wtedy miękką, giętką i łatwo się daje rozdzierać.

Tkanka wielu porostów używaną bywa w niektórych przypadkach za pożywienie dla ludzi, a w niektórych krajach dla zwierząt; tak np. gatunek chrobotku (*Cenomyce rangiferina*) służy w Laponii podczas zimy za strawę dla reniferów. *Cetraria islandica* (mech islandzki), *Sticta pulmonacea* i inne, dostarczają galarety zdrowej i pożywniej, której używanie jest korzystnym w pewnym stanie zdrowia. Błonnik tworzący ściany warstwy rdzeniowej, izomerycznej, jak wiadomo (§ 599) ze skrobia, zbliża się do téjże w porostach własnościami swemi o ile można najbardziej, barwi się bowiem nawet niebiesko od jodyny. On to właśnie rozcieńczony pewną ilością wody w galaretę i zaprawiony przymieszaniami pierwiastku gorzkawego, zawartego w komórkach, dostarcza przyjemnego i nieco wzmacniającego pożywienia. Wiele gatunków odznacza się obfitością pewnego barwniku, który jednakże dopiero po osobnym przyrządzeniu staje się widocznym. Rzeczywiście w przyrodzie jest on szarawy; lecz każąc roślinie drożdżać, przy dodaniu alkaliów (np. potażu lub uryny, tak obficie wywięzującej amoniak) otrzymujemy barwę czerwoną; następnie za dodaniem jeszcze potażu, niebieską. Porost biały (*Lichen parellus* L.), a osobliwie rześienica (*Roccella*), używane są szczególniej do tego. Wiele innych porostów dostarczyłoby mogło tegoż samego pierwiastku, ale w mniejszej ilości.

§ 735. **Wątrobnice** (*Hepaticae*). Wątrobnice tworzą wraz z mchami gromadę przyrodzoną, różniącą się od wszystkich poprzednich przyrodzeniem swęj tkanki, w której komórkach znajdujemy zielen: powierzchnia także tych roślin poprzyszczona jest otworami czyli szparkami, ułatwiającemi związek z powietrzem atmosferycznym. Ta to budowa całkiem różna odznacza listowie wątrobnic od porostów. Listowie nosi na-

rzędz



komó  
Na  
jakot  
o któ  
Opró  
to cia  
wier  
cie p  
W  
dniki  
rych  
i któ  
dojr  
e dal  
wiele  
gła,  
wójn

514  
liścian  
nosi p  
niastę  
515  
jeden  
zarod

rzędzia odrodcze, albo pogrążone w jego miąższości, jednakże blisko powierzchni, jakieśmy to widzieli we wgłębce (*Riccia*) (§ 602 fig. 493), albo wystające na zewnątrz; innym razem narzędzia te wywyższone są (np. w porostnicy [*Marchantia*]) na szypułce stanowiącej jakby watek osi, lecz nie noszącej jeszcze liści. Na koniec w wielu sprżycach (*Jungermannia*) widzimy oś obsadzoną małymi listkami całkowicie komórkowemi; lecz przez środek każdego listka idzie rząd innych, wydłużonych komórek, tworzący pierwsze ślady nerwu głównego.

Narzędzia odrodcze tych roślin bywają częstokroć podwójne, jakoto: wydetki, któreśmy wyżej opisali (§ 470) i purchatki, o których daliśmy wyobrażenie w §§ 601, 602, (fig. 491; 493). Oprócz tego może jeszcze być obecnym trzeci ich rodzaj: są to ciała zielone, komórkowe, przytwierdzone ogonkami do powierzchni listowia, które się wznosi około ich kupek w kształcie pokrywy; ciała te porównać można z cebuleczkami.

Wewnątrz woreczków czyli purchatek, zawierających zarodniki, znajdujemy dwa rodzaje komórek: jedne krótsze w których się tworzą zarodniki zupełnie tak jak ziarna pyłku (§ 602) i które znikają powoli w skutek wessania, tak, iż zarodniki dojrzawszy, zostają wolne (fig 515 *s*) w wydrążeniu; drugie *e* daleko dłuższe, wrzecionowato zcieńczone, zawierające niewiele małych ziarenek zielonych; ściana ich zrazu jednociałą, rozpada się później w paseczek węzownicowaty, podwójny, zupełnie podobny do nitki cewek węzownicowych.


514. Kawalek sprżycy (*Jungermannia tamaris*). — *f* Gałązki pokryte liśćmi dachówkowato ułożonemi dwurzędowemi; każda z dwóch bocznych nosi puszkę na nitce otoczonej u nasady pokrywą, utworzoną z powłoki błoniastej zawiązka czyli purchatki. — *c* Puszka zamknięta. — *c'* Puszka otwarta.

515. Punkt *r* dna, do którego przyczepionych jest kilka sprżyków *e*; jeden z nich rozpadł się w podwójną nitkę węzownicową. Naokoło widać zarodniki wolne *s*.



W takim stanie przybierają one imię *sprężyków* (*elateres*); a przez ruchy, jakie owęj nitce w wysokim stopniu hygrometrycznej, nadają zmiany powietrza, pomagają rozsiewaniu się zarodników naokoło nich leżących. Purchatka albo więdnije, albo też pękając, dzieli się na kilka łupin (fig. 514 c), jak to się dzieje w sprężycach, w których, rozwinąwszy się najprzód w innym woreczku, rozdziera takowy podnosząc się na szypułce dłuższej lub krótszej.

§ 736. **Mchy** (*Musci*).—Każdemu znajome są te ładne ro-



516. Skrętek (*Funaria hygrometrica*) nieco powiększony. — *f* Liście. — *u* Puszka siedząca na długiej nitce czyli szypułce *p*. — *o* Nakrywka. — *c* Czepek pozostały na jednej z dwóch puszek, z drugiej opadł.

517. Puszka opończyku (*Encalypta vulgaris*). — *u* Puszka. — *o* Nakrywka. — *s* Wierzchołek szypułki. — 1. Przed pęknięciem i otoczona jeszcze czepek *o*, przez który przegląda. — 2. Po pęknięciu, kiedy odpadła nakrywka, odsłoniła kołotworze *p*, obsadzone 16 rzesami czyli zębami.

518. Puszka bardzo jeszcze młoda podsadniku (*Splachnum*) przecięta wzdłuż. — *a* Podsada. — *o* Os. — *s* Wydrążenie czyli komora rozciągająca się wokół osi i napelniona zarodnikami. — Powłoka puszek składa się od zewnątrz do wewnątrz z kilku różnych warstw komórkowych: pierwsza *c* stanowi naskórek i jest zgrubiała u wierzchołka, gdzie stanowi nakrywkę *o*, a dwie pośrednie, które rozpadną się później u wierzchołka, dla utworzenia zębów kołotworza; wewnętrzna *s* stanowi ścianę komory czyli woreczek zarodnikowy.

slinki, tak obfite na powierzchni ziemi, skał, kory, którą przyrodziewają nakształt zielonego kobierca. Niekiedy rosną one i pod wodą. Przyglądając im się zbliższa spostrzegamy, że składają się z łodyg cieniutkich, pojedynczych lub gałęzistych, pokrytych drobnymi listkami takiej samej budowy jak te, któreśmy opisali w wątrobnicach. Narzędzia ich odrodcze są także dwojakie: 1<sup>sz</sup>e wydętki (§ 470; fig. 352) skupione w różyczkach wierzchołkowych liści, lub leżące w kątach tychże zazwyczaj pomieszane z nitkami płonnymi, czyli socznikami; 2<sup>re</sup> purchatki szczególnej postaci, które, w młodości odosobnione, lub skupione po kilka, raz oddzielone od wydętek na osobnych szczepach, lub na różnych miejscach jednego szczepu, drugi raz otoczone niemi, stanowią bezszypułkowe woreczki mające kształt butelki. Z wielu skupionych w ten sposób purchatek, jedna tylko zazwyczaj się rozwija, inne więdnijęją. Ta zaś jedna, przedłużając się przerywa woreczek zewnętrzny, który ją okrywał, i unosi go na swym wierzchołku, nakształt czapeczki, z kąd też nadano mu nazwisko *czepka* (*calyptra*; fig. 516, c; 517 c). Odróżniamy naówczas dwie części w rozwiniętej purchatce: *szypułkę*, część niższą cienką, nazywaną niekiedy *szczecinką* (*seta*; fig. 516 p); tudzież nabrzimienie górne, kuliste lub jajowate, albo też mające postać urny, nazwane torebką lub puszką (*theca*; fig. 516 u). Puszka zawiera wewnątrz wydrążenie, przez środek którego przechodzi rodzaj słupeczka mięjszego, czyli *oś* (*columella*, fig. 518 c); naokoło osi leży mnóstwo małych zarodników, wolnych w skutek wessania komórek macierzystych, których tkanka łączyła wprzód oś ze ścianami puszek. Ta ostatnia, po dojrzaniu, otwiera się na podobieństwo kubczaka, przez oddzielenie się *nakrywki* o, stożkowatej, ukrytej długi czas pod czepkiem, lecz po opadnięciu tegoż wyraźnie od reszty puszek oddzielonej, za pomocą obrączkowej brzojki. Kiedy nakrywka się oddzieli, puszka zostaje u wierzchołka otwartą, a otwór ten otoczony jest brzegiem, który się zowie *kołootworzem* (*peristoma*). Kołootworze jest albo *nagie*, albo obsadzone małemi ząbkami (fig. 517 p), częstokroć wydłużonemi we włoski proste lub skręcone. Zęby ułożone są w jeden lub dwa okręgi, ztąd też mówi się, iż kołootworze jest pojedyncze lub podwójne; dwa te rzędy zębów kończą dwie warstwy komórek, które pod cienkim naskórkim tworzą

ścianę puszek. Uwagi godną jest, że liczba zębów bywa stałą w jednym i tym samym gatunku, i jest zawsze wielokrotną względem 4, to jest 4, 8, 16, 32, 64. Sądząc z budowy ich i ruchów hygrometrycznych, jakie odbywają, zdaje się, iż mają takie samo znaczenie, jak sprężyki wątrobnic; na których mchom zupełnie zrywa. Rzadziej kołotoworze składa się z błony poziomo rozciągniętej, czyli *poprzeczki* (*epiphragma*). Wydrążenie zawierające zarodniki nie zawsze zajmują całą puszkę, której część niższa, częstokroć mięjsza, zowie się *podсадą* (*apophysis*).

Mchy podobnie jak wątrobnice nie wydzielają żadnego szczególnego wytworn, i nie znajdują żadnego tak szczególnego zastosowania, aby tu warto było o niemi namienić.

§ 737. **Ramienicowate** (*Characeae*). — Nie będziemy się tu rozwodzili nad tą rodziną, której narzędzia roślenia, godne uwagi ze względu wysokiego stopnia prostości, zbliżającej je do wodorostów, tudzież ze względu nadzwyczaj wyraźnego ruchu wirowego, soków zawartych w ich komórkach, daliśmy już poznać wyżej (§ 273). Zarodnik składa się z mnóstwa ziarenek, otoczonych wielu rurkami skręconymi w węzownicę i kończącemi się u góry pięciu małemi ząbkami; wydętka zaś siedząca u spodu, składa się z rureczek ułożonych w wiązki (§ 470, fig. 353) połączonych wewnątrz małą, wydrążoną kulką.

§ 738. **Skrzypy** (*Equisetaceae*). Skrzypy oddalają się



520. Łuska e oddzielona z szyszki wierzchołkowej jednego ze skrzypów, z okółkiem puszek c osadzonych pod spodem, i zwężeniem p, za pomocą którego przyczepia się do wspólnej osi.

521. c Puszka oddzielona, widziana od strony wewnętrznej, na której otwiera się szpara.

522. s Zarodnik wraz z czterema swemi nitkami zwiniętymi około niego w węzownicę. — s' Tenże z nitkami skręconymi.


znacznie od wszystkich innych bezliściennych, budową łodygi (§ 109), ułożeniem gałązek zewnętrznych względem pochwy otaczającej każdy staw, z którego gałązki owe okółkowo wychodzą, tudzież ułożeniem narzędzi odrodczych. Łodyga kończy się gatunkiem szyszki, powstałej z połączenia wielu łusk gwoździowatych (fig. 520), prostopadłych względem osi. Pod łebkiem każdego z tych gwoździ osadzone są w okrąg małe woreczki (torebki, albo puszki), z których każdy (fig. 521) rozszechając się po dojrzaniu wpodłuż, wypuszcza mnóstwo zarodników. Te składają się z ciałek komórkowych, od spodu których wychodzą 4 nitki sprężyste (fig. 521) ułatwiające ruchami swemi rozsiewanie. Zrazu woreczki są napełnione tkanką komórkową, jednociągłą; następnie komórki oddzielają się od siebie, rozpadają się w węzownice, i nie pozostają w zetknięciu z istotą ziarenkowatą, którą zawierały, oprócz na jednym tylko punkcie, tak, iż tworzą owe powyżej wspomniane 4 nitki. Mamy tu więc znowu przypadek wyjątkowy: powstanie jednego tylko zarodnika, w komórce macierzystej, której ściany, zamiast być wessane, pozostają w postaci sprężyków.

§ 739. **Paprocie** (*Filices*). — Rozbieraliśmy już piętna roślenia tego znacznego oddziału roślin bezliściennych; widzieliśmy ich łodygi (§§ 103—108), które w gatunkach naszych umiarkowanych krain czołgają się pod ziemią, lecz które w wielu gatunkach okolic zwrotnikowych, wznoszą się w pnie prostopadłe (fig. 117); ich korzenie, bez wyjątku przybyszowe (§ 120); ich liście (§ 152) niekiedy całkobrzegie, często są wielokrotnie złożone. Liście te zanim się otworzą, bywają zawsze ślimakowato na zewnątrz zwinięte; nie sama zaś tylko główna blaszka zwija się na ogonku głównym, lecz także wszystkie łaty (*pinnulae*), na ogonkach częściowych, tak, że tym sposobem, w młodym liściu cała powierzchnia dolna jest ukryta. Nakoniec wspomnieliśmy o szczególnych włosach suchych (§ 242), rozszerzonych w łuski lub błoneczki i rozszerzonych obficie na powierzchni różnych części: włosy te dostarczają także piętn przydatnych do odróżniania rodzajów i gatunków.

Co do narzędzi odrodczych, sąto małe komórkowe woreczki, czyli puszki, napełnione zarodnikami i osadzone zawsze na dolnej powierzchni liścia. Liście noszące puszki, albo za-

chowną zwykłą swą postać, albo też przybierają inną, nieco odmienną, miększą bowiem liściowy daleko się mniej w nich rozwija, a nawet znika prawie zupełnie, pozostawiając same tylko nerwy odkryte zewsząd puszkami.

Puszki te posiadają zazwyczaj ściany, złożone z jednego rzędu komórek daleko większych i grubszych niż inne, ułożonych końcami ku sobie w pierścień, który otacza niekiedy całą puszkę, idąc raz pionowo (w paprotkowych, *Polypodiaceae*, fig. 526), drugi raz poziomo lub ukośnie (w liściobłonnych, *Hymenophylleae*). Innym razem bywa niezupełnym i sta-



523. Kępka stonogowca (*Scolopendrium officinale*) z kilku liśćmi *f*, *f'*, *f''*, *f'''*, w różnym stopniu rozwiniętemi. Na powierzchni dolnej liścia *f'''*, widać kupki (*sori*), tworzące linie poprzeczne czarniawe.

524. Kawalki listowia innej paproci (*Nephrodium angulare*), widziane zpod spodu. Dwie podziałki opatrzone kupkami *s*. — *r* Ogonek na którym osadzone są podziałki.

525. Jedna z kupek przecięta pionowo. — *n* Nerw na którym takowa siedzi. — *i* Zawijka czyli zagięcie ją pokrywające. — *c* Puszki.

526. Jedna z puszek odłączona w chwili pęknięcia. — *s* Zarodniki wychodzące z niej. — *a* Pierścień komórkowy.

nowi tylko część pierścienia ukośnego (*Parkeiaceae*). Zdaje się, że jego fizyologiczne znaczenie podobne jest jak sprężyków, będąc bowiem tęższym od reszty ścian, tudzież rozszerzając się lub ściągając, bądźto w skutek wzrastania, bądź w skutek zmian hygrometrycznych, spowodowuje niekształtne pęknięcie tychże ścian na inném miejscu, a przez ruchy owe wyrzuca na zewnątrz zarodniki. Pęknięcie jednakże niezawsze tym sposobem się odbywa, czasami bowiem puszka otwiera się szparą kształtną, bądź po jednej tylko stronie, bądź w całym swym obwodzie, dzieląc się na dwie łupiny. W tym ostatnim razie pierścień albo bywa niezupełnym, (w podeźrzonych, *Osmundaceae*), albo go wcale niema (w jęczycznikowych, *Ophioglosseae*, gdzie niekiedy puszki te dwułupinowe zrastają się z sobą bokami w szeregi). Nakoniec puszki mogą być korowate, osadzone w okrąg, ku środkowi którego się otwierają (*Marattiaceae*).

Puszki nie siedzą odosobnione na dolnej powierzchni liści, lecz zebrane są w *kupki* (*sori*; fig. 523, *f* 0), różnokształtne, jak też i zaokrąglone, (jak w paprotkach, [*Polypodium*]), mniej więcej podłużne jak (w zanokcicy, [*Asplenium*]; fig. 523, *f* s); oddalone jedne od drugich, lub zbliżone wrzędy podłużne. Położenie ich różni się względem liścia, na którym są rozrzucone mniej więcej prawidłowo, bądźto na samej powierzchni, bądź wzdłuż brzegu (jak w złotowłosowych [*Adiantheae*]), którego zakrętom rząd puszek może towarzyszyć (jak w orlicy [*Pteris*]), bądź nakoniec wzdłuż nerwów (jak w *Blechnum*).

Niekiedy kupki siedzą nagie na powierzchni liścia (jak w paprotce) lecz częściej pokryte są cieniutką błoną, która się zdaje być zagięciem naskórka, i nazwaną została *zawijką* (*Indusium*). Zawijka tworzy czasami rodzaj kołnierzyka lub miseczki otaczającej *kupkę* (np. w *Cyatheae*), częściej jednakże leży na niej nakszałt jakby nakrywki na zawiasce (fig. 525 *i*), a przechodząc z jednej strony w naskórek, skierowana jest brzegiem wolnym bądź ku środkowi, bądź ku obwodowi liścia (fig 524). Przytwierdza się zaś do liścia albo w jednym tylko punkcie (jak w *Nephrodium*), albo na linii mniej więcej długiej (jak w *Athyrium*). Wszystkie te piętna brane z postaci kupek, zawijki, lub punktu przytwier-

dzenia téj ostatniej i jej kierunku, służą do odróżnienia od siebie rodzajów.

Puszki uważane same przez się, bywają bezszypułkowe, lub téż siedzą na szypułce mniej więcej wydłużonej (fig. 526). Zarodniki powstają w ich wnętrzu podobnie jak w powyżej rozbiéranych skrytopłciowych, tojest po cztery w każdej z komórek macierzystych, które zrazu zrosnięte w tkankę jednociąglą, zostają później wessane, i pozostawiają zarodniki wolne w wydrążeniu puszki.

Zarodniki wschodząc wydłużają się w nitkę złożoną z komórek zrosniętych z sobą końcami, która wkrótce w skutek tworzenia się komórek po bokach, rozszerza się liściowato i może dojść znacznych wymiarów. Rozszerzenie to wypuszcza w bliskości punktu, od którego się zaczyna, włókna korzeniowe na dół, w górę zaś oś z liśćcami. Zład porównane zostało do liścienia od wielu botaników, którzy oddzielali dlaprocie od wielkiego działu, tu nas zajmującego, a to pod imieniem skrytopłciowych jednoliściennych. Jednakże rozwijanie się owego ciała, nie jest w stanie wytrzymać ścisłego porównania z budową i wschodzeniem prawdziwego jednoliściennego zarodka, owszem podobnym jest zupełnie do wschodzenia innych bezliściennych, o których mówiliśmy wyżej, a mianowicie wątrobnie.

Starano się wyszukać w paprociach wydętek, lecz zdania nie zgadzają się ani co do ich przyrodzenia, ani co do ich obecności. Jedni dają to nazwisko włoskom, rozrzuconym po różnych miejscach bardzo młodych liści, włoskom zgrubiałym u wierzchołka i wypełnionym istotą ziarenkowatą; inni ciałkom znajdującym się niekiedy pomiędzy puszkami wpośród kupek, a najczęściej siedzących na szypułkach samychże puszek. Kształt ich jest soczewkowaty, a ziarenka istoty w nich zawartéj, po wrzuceniu w wodę okazują żwawe ruchy; lecz nie na wszystkich paprociach odkryto je, musiałyby się zaś u wszystkich znajdować, gdyby były narządami koniecznymi upłodnienia.

W wielu paprociach ciepłych krajów, pnie zawierają pierwiastek pożywny używany na pokarm; w naszych jednakże, klój roślinny ma przy sobie inny jeszcze pierwiastek gorzki, niekiedy pobudzający, a nawet czyszczący, który je czyni niezdatnymi na pokarm, a przeciwnie użytecznymi w medycynie;

wiele  
czyli ś  
bieje l  
łączają  
§ 7  
kują  
swych  
z cał  
gi wi  
są m  
liści.  
komó  
macie  
(ooph  
daleko  
widzim  
skrytop  
widłak  
§ 7  
obejm  
szka (  
lea), o  
dziura  
Jedna  
makow  
papro  
jedne,  
napeln  
ki. W  
drugich  
albo té  
przy  
albo p  
korzer  
owoc)  
je daw  
je moż

wiele bowiem gatunków dostarcza środków antelmintycznych, czyli środków przeciw robakom wewnętrznym. Własność ta słabiej lub znika w liściach, w których pierwiastek aromatyczny łącząc się z klejem roślinnym, użycza mu nowych własności.

§ 740. **Widłakowate** (*Lycopodiaceae*). — Rośliny te środkują niejako pomiędzy mchami, do których podobne są z liści swych, budowy komórkowej bardzo prostej, a częstokroć z całej powierzchowności, i paprociami, do których ich łodygi więcej się zbliżają (§ 102). Narzędziami ich odrodczemi są małe żółtawe woreczki, siedzące samotnie przy nasadzie liści. Są one dwojakie: jedne, wypełnione licznymi małymi komóreczkami, które pozostają po cztery w każdej z komórek macierzystych, tworzących zrazu tkankę jednociągłą; drugie (*oophoridia*) są puszkami zawierającymi cztery tylko ciążka daleko większe. Pierwsze porównywano z wydętymi, lecz widzimy, że budowa ich jest taka sama jak purchatek innych skrytoplciowych; zresztą znajdują się one same tylko w wielu widłakach, nierozmnażających się drugim sposobem.

§ 741. **Korzenioziarne** (*Rhizocarpeae*). — Rodzina ta obejmuje rośliny dość różnej postaci, jakoto rodzaje: gałuszka (*Pihularia*), o liściach nitkowatych; zeczwórnik (*Marsilea*), o długich ogonkach, zakończonych czterema listeczkami; dziurawka (*Salvinia*), o liściach bezogonkowych jajowatych. Jednakże liście te wychodzące z łodygi czołgającej się są ślimakowato zwinięte podczas przedlistnienia, podobnie jak liście paproci. Narzędzia odrodcze stanowią woreczki, z których jedne, uważane za wydętki zawierają drobne ziarna; drugie napełnione są ciążkami większemi, które uważano za zarodniki. Woreczki te bywają rozmaicie ułożone jedno względem drugich, we wspólnej okrywie czyli puszcze (*Marsileaceae*), albo też w oddzielnych puszkach (*Salviniaeeae*); puszki te, przypominają małe owoce i pękają na wiele łupin; siedzą zaś albo przy nasadzie liści, albo poniżej, a zawsze w bliskości korzeni; stąd poszło nazwisko rodziny (od *ρίζα*, korzeń; *καρπός*, owoc). Rośliny te różnią się wyraźnie od paproci, z którymi je dawniej mieszano, zbliżają się jednakże do nich o tyle, że je można uważać za należące do jednej z nimi gromady.

## ROŚLINY JEDNOLIŚCIENNE.

§ 742. Rozbieraliśmy już w ogóle ich łodygi (§ 91—100), korzenie (§ 119), liście (§ 150), umiar kwiatów (§ 566) i sposób wschodzenia (§ 596); opisaliśmy także na wielu innych miejscach rozmaite szczegóły ich ustrojności, którymi się różnią od bezliściennych z jednej, a dwuliściennych z drugiej strony; dla krótkości więc odsyłamy tam czytelnika. Inne zaś punkta, które opisać wypada, będą wypadkiem szczegółowego rozbioru pojedynczych rodzin. Jusieu dzielił te rośliny na podzawiazkowe, kołożawiazkowe i nazawiazkowe. Nie będziemy tu trzymać się tego podziału, ponieważ różnica pomiędzy pierwszym i drugim sposobem osadzenia pręcików, w wielu rodzinach jednoliściennych nie jest bardzo wyraźną, jak np. w liliowatych. Budowa nasienia dostarczy nam piętno do pierwszego stalszego i ważniejszego podziału. W rzeczy samej większa daleko liczba tych rodzin posiada nasiona opatrzone bielmem zazwyczaj bardzo grubym; inne zaś wcale go nie mają, i te przedstawiają zkądinąd znowu ważne stosunki pomiędzy sobą. Jednym z tych stosunków jest życie ich wodne, którym się różnią od innych jednoliściennych, także bezbielmowych, lecz należących jeszcze do pierwszego oddziału, np. do storczykowatych. Te bowiem żyją na ziemi lub na drzewach. Pierwszy więc podział będzie następujący:

Nasiona	}	pozabawione bielma. Rośliny wodne.....	Tab. II.
		opatrzone bielmem z wyjątkiem niektórych roślin żyją-	
		cych na ziemi .....	Tab. III.

Uważać należy, iż dwa te oddziały nie idą po sobie w jednym szeregu przyrodzonym, lecz raczej równoległe od siebie; w jednym jak w drugim postępujemy stopniowo od kwiatu najprostszego (to jest przywiedzionego do jednego pręcika, lub do jednego owocaka), aż do kwiatów najzłożniejszych, to jest: których wszystkie okółki narzędzi są z sobą zrośnięte.

(Tablica II, pag. 593).

§ 743. Określiłiśmy już gdzieindziej (§§ 580, 566) różne przymiotniki zastosowane na tablicy powyższej do zarodka. Zarodek ten, grubokielkowy, to jest którego kieltek w stosunku

RODZINY. Tablica II ROŚLINY JEDNOLIŚCIENNE  
wodne, o nasieniu bezbielmowém.

Okwiat	zaden, luskowaty albo zielony.*	o 6 podziałkach należycie rozwiniętych, częstokrotkoć (3) wewnętrznych przynajmniej) płatkowatych.**
* Zarodek	wprostległy, grubokielkowy.—Okwiat zaden.—Owoczek 1..... wokrągległy, grubokielkowy.—Okwiat zaden (Owoczek 1 lub wiele) lub złożony z 4 łusk. wprostległy, grubokielkowy, od wewnętrznej opatrzonej brzołką.—Okwiat zaden. wsteczległy, grubokielkowy, o łodyżce bezcz. nie rozwiniętej.—Okwiat zaden.	Rosliny wód słodkich. Wodzianowate (Najdiace). Ręsnicowate (Potamoceae). Rzęsnowate (Lemnaceae). Wstręźnicowate (Zosteraceae). Rosliny wód słodkich. Brotnicowate (Juncaginaceae).
** Zalążki	zaden przytwierdzony do dna komory, krzywy.— Zawiązki wolne i oddzielne..... Liczne o łodyżkach ścian prostych.— Zawiązki połączone w jeden, przysyły do kielicha.....	Zarnkowate (Alismaceae). Kącznicowate (Bismaceae). Zarnkowate (Hydrocharitaceae).

00),  
566)  
wieln  
któ-  
cien-  
tam  
wy-  
Jus-  
i na-  
po-  
osa-  
jest  
do  
po-  
po-  
bém;  
zno-  
ków  
cien-  
pier-  
żyją  
e na-  
b. II.  
b. III.  
w je-  
ebie;  
naj-  
leb  
ojest:  
rózne  
a. Za-  
sunku

do liścienia bardzo jest rozwinięty, stanowi, jak widzimy, piętno prawie stałe w całym tym oddziale rodzin o nasionach bezbielmowych; znajdujemy go bowiem i w trzech ostatnich. Kielek albo raczej lodyżka wydłużona i nabrzmiała w ten sposób, przedstawia zazwyczaj tkanę bardzo obfitującą w skrobia i może przeto w żywieniu młodego zarodka mieć znaczenie fizyologiczne, do jakiego zazwyczaj przeznaczone są albo liścienie stosunkowo daleko bardziej rozwinięte, albo bielmo. Osobliwie też w rodzinie wstężnicowatych (*Zosteraceae*) lodyżka dochodzi bardzo znacznych wymiarów, tworząc nawet najczęściej wyrostek boczny, który stanowi największą część ciała zarodkowego. Toż samo zdaje się mieć miejsce w rzęśowatych, gdzie ciało to otacza zewsząd liścień ukryty w głębi kanału wewnętrznego jaki się w nim znajduje.



527.

Widzimy że kwiat większej części tych rodzin nie posiada okryw; takowe zaczynają ukazywać się w błotnicowatych (*Juncagineae*) i tam właśnie można widzieć przejście od kwiatostanu do kwiatu, jakieśmy to okazali (§ 385) na dwóch rodzajach téjże rodziny: *Lilaea* i *Triglochin*. W téj samej rodzinie części zarodka zaczynają przedstawiać swe zwykłe stosunki wielkości, kielek bowiem jest znacznie krótszy od liścieni (fig. 460). Tkanka tych roślin jest (jak w ogóle we wszystkich roślinach wodnych) bardzo prosta; część jej komórkowa zajmuje wiele miejsca i jest poprzerzynana przerwaniami zawierającymi powietrze lub inne gazy, które zmniejszając ciężkość gatunkową rośliny, pozwalają jej wznosić się w wodzie aż do samej powierzchni, lub nieco jeszcze wyżej. Przeciwnie naczynia są daleko rzadsze, a niekiedy nawet wcale ich nie ma. Urządzenie to pociąga za sobą małą działalność wydzielania, a tém samym brak własności szczególnych i użytków w zastosowaniu. Ze wszystkich tych roślin najczęściej wspomnianą bywa jedna z żabiściekowatych: rozkrętka (*Vallisneria spiralis*) zamieszkująca niektóre odnogi Rodanu, i wiele kanałów i rowów południowej Europy. Mamy wiele opisów wierszem i prozą sposobem w jaki kwiaty męzkie i żeńskie

527. Zarodek gatunku *Ruppia maritima*. — c Liścień, — r Kielek, — f Szpara odpowiadająca pączuszkowi. — b Wyrostek boczny lodyżki.

RODZINY. Tablica III.

ROŚLINY JEDNOLIŚCIENNE

o nasionach opatrzonych bielmem, o kwiatach bezokwiatowych.

Zarodek | o kielku krótkim, nieprzechodzącym reszty. Przykwiatak znacznie rozwinięty przy nasadzie kłosa wierzchołkowego..... --BUŁAWKOWE (*Spadiceae*).  
 | o kielku grubym, bocznie rozwiniętym. Przykwiatki krótkie, łuskowate, odpowiadające kłosom bocznym..... --PLEWIASTE (*Glumaceae*).

Buławkowe.

Kwiaty	nagie; samce złożone z pojedynczych pręcików. Uszko	obejmujące kwiatostan, trwałe.	Zarodek	wierzchołkowy, wsteczległy.....	--GRZEŹNICOWATE ( <i>Pistiaceae</i> ).	
				osiowy, wsteczległy. Liście o nerwach rozgałęzionych.....	--OBRAZKOWATE ( <i>Aroideae</i> ).	
}	}	}	Zarodek	krótki, osiowy. Komory liczne 1-zawiazkowe lub pojedyncze o łożyskach ściennych. Kwiaty rozdzielno-płciowe.....	} POCHUTNIKOWATE ( <i>Pandaneae</i> ).	
				krótki osiowy. Komora 1, o łożyskach ściennych. Kwiaty oddzielno-płciowe, na jednym i tym samym kłosie.....		} OKOLNICOWATE ( <i>Cyclantheae</i> ).
				osiowy, wprostległy. Komora 1, o 1 zawieszonym zalążku, kwiaty oddzielno-płciowe na osobnych kłosach.....	} OŻYPAŁKOWATE ( <i>Typhineae</i> ).	
otoczone łuskami mającymi pozór okwiatu, lecz prawie zawsze trójkowemi.....		Uszko	krótkie i opadające.....	Zarodek	osiowy. Zawiązek o wielu komorach. Zalążek wpoławsteczny.....	--SMOCZNIOWATE ( <i>Orontiaceae</i> ).

Plewiaste.

Nasiono	wzniesione. Zarodek zewnętrzny	wierzchołkowy.—W każdym kwiecie	po jednej łusce....	Łodygi mięsiste i kątowne....	Liście trójrzędowe.....	--TURZYCOWATE ( <i>Cyperaceae</i> ).
		boczny.....	po dwie łuski....	Żdźbło.....	dwurzędowe.....	--TRAWY ( <i>Gramineae</i> ).

ROŚLINY JEDNOLIŚCIENNE

o nasionach opatrzonych bielmem, o kwiatach opatrzonych okwiatem.

Zawiązek wolny .....	zrosnięty z kielichem .....																						
1. Zarodek	mimośrodkowy, wsteczległy lub wprostległy, wewnętrzny... wsteczległy, zewnętrzny.....	Kwiaty obupłciowe lub ostropłciowe ułożone w rosochatki..... nienależący w zagięciu powłoki	3 komory 1-ziarnowe	Łożyska osiowe... 1 komora wieloziarnowa..... Łożyska ściennie... 3 komory 2-ziarnowe	Okwiat złożony z 6 podziałek kielichowatych, koronowatych.....	Liście rozszczerzone dloniaste lub pierzaste.....	}	PALMY ( <i>Palmae</i> ).															
									leżący w zagięciu powłoki.....	3 komory 2-ziarnowe	Nasiona tarczowate	Okwiat złożony z 2-6 podziałek kielichowatych.....	Liście trawiaste.....	}	RZĘŚCIOWATE ( <i>Restiaceae</i> ).								
																wprostległy	zewnętrzny.....	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	Wewnętrzne podziałki okwiatu płatkowate.....	Liście mieczowate lub trawiast.....	}	ŁOSITNOWATE ( <i>Xyrideae</i> ).	
																							wewnętrzny
									wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	Liście wstążkowate lub mieczowate.....	}	OPLATWOWATE ( <i>Tillandsiaceae</i> ).								
	wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	Liście trawiaste.....	}	SITOWATE ( <i>Juncaceae</i> ).																
								wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	5-6 dzieln. — Pręciki osadzone na rurce. — Zarodek krzywy. — Liście trawiaste.....	}	UBOGLOWATE ( <i>Gillesiaceae</i> ).									
	wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	rurkowaty. — Rurka pręcikowa 0. — Zarodek prosty. — Blaszka liściowa rozszerzona.....	}	ROSPŁAWOWATE ( <i>Pontederiaceae</i> ).																
								wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	Okwiat kształtny. — Szyjka niepodzielona. — Znamiona połączone lub oddzielne. — Liście o nerwach równoległych.....	}	LILIOWATE ( <i>Liliaceae</i> ).									
	wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	podzielona. — Pręciki odwrócone. — Torebka. — Liście o nerwach równoległych. obrócone. — Jagoda. — Liście o nerwach rozgałęzion.	}	CZEERNILCOWATE ( <i>Melanthiaceae</i> ).																
wewnętrzny								Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	Okwiat kształtny. — Szyjka niepodzielona. — Znamiona połączone lub oddzielne. — Liście o nerwach równoległych.....	}	KOLCOWOWATE ( <i>Smilacineae</i> ).										
	wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	Rośliny pnące.....	}	POCHRZYNOWATE ( <i>Dioscoreaceae</i> ).																
wewnętrzny								Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	3 naprzeciwległe względem podziałek zewnętrznych, pękają podłużnie.....	}	KOSAĆCOWATE ( <i>Iridaceae</i> ).										
	wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	3 naprzeciwległe względem podziałek zewnętrznych, pękają poprzecznie.....	}	TRÓJŻEŃCOWATE ( <i>Burmanniaceae</i> ).																
wewnętrzny								Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	Okwiat barwny podziałki zewnętrzne skrzydlate.....	}	ZAKRWAWKOWATE ( <i>Haemodorraceae</i> ).										
	wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	6 okwiat rurkowaty, o podziałkach płaskich, płatkowatych.	}	PRZYKŁĘKOWATE ( <i>Hypoxirideae</i> ).																
wewnętrzny								Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	Nasiona o skórcie korowatej.....	}	AMARYLKOWATE ( <i>Amaryllideae</i> ).										
	wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	Kształty o podziałkach okraczających płatkowatych	}	BANANOWATE ( <i>Musaceae</i> ).																
wewnętrzny								Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	Nasiona o skórcie korowatej, polyskującej.....	}	ZAPYLKOWATE ( <i>Bromeliaceae</i> ).										
	wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	6-5 okwiat niekształtny, płatkowaty. — Liście o nerwach poprzecznych.....	}	KWIAOTRZCINOWATE ( <i>Cannaceae</i> ).																
wewnętrzny								Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	zewnętrzny. — Pręcików obróconych 6. — Okwiat o podziałkach zewnętrznych, kielichowatych, wewnętrznych, płatków. — Liście o nerwach podłużnych.....	}	ZDZIEBLCOWATE ( <i>Scitamineae</i> ).										
	wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	pojedyncze. — Łożyska osiowe. Komór 3. — Nitki płatkowate, jedna z nich nosi pylnik 1-woreczkowy. — Liście o nerwach poprzecznych.....	}	WYDZIWKOWATE ( <i>Apostasiaceae</i> ).																
wewnętrzny								Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	podwójne. — Łożyska osiowe. Komór 3. — Nitki płatkowate lub ploniejące, jedna z nich nosi pylnik 2-woreczkowy. — Liście o nerwach poprzecznych.....	}	STORCZYKOWATE ( <i>Orchideae</i> ).										
	wewnętrzny	Okwiat o 6 podziałkach podobnych... Podziałki kielichowate lub płatkowate.	Łożyska osiowe... 8 komory wieloziar.	}	żadne. Liścień prawie niewidzialny. Łożyska osiowe. Komór 3. — 1-3 pylników nazawiazkowych. — Liście o nerwach podłużnych.....	}																	

rozdzielone na osobnych szczepach, łączą się z sobą podczas kwitnienia; jak naówczas pierwsze oddzielają się w skutek zerwania się swych szypulek, jak pływają utrzymując się na wodzie przy pomocy małej muszelki jaką tworzy ich okwiat wydeły, i jak zbliżają się do kwiatów żeńskich przytwierdzonych do samego szczepu za pomocą długiej nitki, której węzownica się rozkręca; jak nakoniec po nastąpieném zbliżeniu, węzownica ściągając znowu swoje skręty, pograża kwiat upłodniony, którego nasienie dojrzewa pod wodą.

§ 744. Zpomiedzy jednoliściennych, których nasiona (z małym wyjątkiem) opatrzone są bielmem, jedne posiadają kwiat bardzo prosty, bez prawdziwego okwiatu; okrywy, jakie u nich znajdujemy nie przedstawiają wcale piętn zwykłych okwiatu, ani co do liczby, ani co do budowy jego części zastąpionych tu łuskami lub przykwiatami; kwiat zaś drugich posiada prawdziwy okwiat, o okółkach trójlisteczkowych. Ztąd pierwszy podział na: *bezokwiatowe* i *okwiatowe*.

## ROŚLINY JEDNOLIŚCIENNE

opatrzone bielmem, bezokwiatowe.

(Tablica III).

§ 745. Pierwsze podzielić można na *buławkowe* i *plewowe*. Nazwisko pierwszego z tych oddziałów pochodzi od kwiatostanu, który jest buławką (*spadix*), chociaż czasami bywa trudnym do poznania z przyczyny małego rozwinięcia i rychłego opadnięcia przykwiatka ogólnego, mającego stanowić uszko; drugi nazwanym został od okryw kwiatowych, które noszą oddzielne miano *plew* (*glumae*) i stanowią małe łuskowate przykwiatki.

Z pomiędzy wszystkich na powyższej tablicy wyliczonych rodzajów, zastanowimy się tylko nad dwiema ostatnimi, z których nadewszystko jedna, rodzina traw, zasługuje na żywą uwagę, z powodu ważności swój pod względem tak gospodarskim jak i botanicznym.

§ 746. *Cyborowate* (*Cyperaceae*). — W pospolitej mowie obejmujemy pod imieniem traw, rośliny jednoliścienne, zazwyczaj zielone we wszystkich swych częściach, nawet o kwiatach téjże barwy, o łodygach zielnych, o liściach całobrze-

gich, wydłużonych w wązkie wstęgi i przerziętych nerwami podłużnemi, równoległemi; lecz trawy takie należą rzeczywiście do wielu różnych rodzin, a szczególnie do niniejszej i następnej.

Ciborowate dają się łatwo odróżnić od traw (*Graminae*) za pomocą łądygi miększej, nieposiadającej nabrzmień w miejscach z których wychodzą liście, przedstawiającej często kształt graniastosłupa trójkątnego, który to kształt połączony jest z trójrzędowem ułożeniem liści. Część pochwowata liści obejmuje łądygę, nie rozszczepiając się aż do początku blaszki, czyli innemi słowy pochwa jest cała; wyższe zaś liście posiadają samą tylko blaszkę bez pochwy. Kwiaty ułożone są ku wierzchołkowi rośliny w kłosa, które niekiedy dla krótkości zowią się *kłoskami*, i bywają wtedy skupione w rozmaity sposób. Kłoski składają się z szeregu przykwiatków łuskowatych, w kątach których siedzi albo kilka pręcików około jednego słupka, albo same tylko pręciki lub słupki. Narzędzi tych niema częstokroć przy dolnych łuskach kłoska. Rozmaite takowe połączenia kwiatów obupłciowych, lub osobnopłciowych, tudzież rozmaity rozkład przykwiatków i osi na której takowe siedzą, służą do odróżnienia wielu plemion. Tak, przykwiatki dwurzędowe obok kwiatów obupłciowych, znamionują *ciborowe* (*Cypereae*); przykwiatki ułożone dachówkowato ze wszystkich stron, *sitowiowe* (*Scirpeae*). Jeśli pręciki odłączone są od słupków, zawiązek może być ukryty w powłoce szczególnej czyli woreczku, który otwiera się u wierzchu, dla zrobienia przejścia szyjce, a za pomocą dwóch ząbków, albo podziałek u brzegu tego otworka, wskazuje iż powstał z dwóch przykwiatków naprzeciwległych i zrosniętych z sobą prócz u wierzchołka. Widzimy to w *turzcycowych* (*Carricineae*); w plemieniu zaś *Seleriae*, równie osobnopłciowem, zawiązek nie jest zamkniętym. Pręciki są w liczbie 1—12, najczęściej w liczbie 3, a cienkie ich nitki, noszące na sobie pylniki dwuworeczkowe osadzone są pod zawiązkiem, jeśli takowy jest obecnym. W tym ostatnim razie, znajdujemy jeszcze niekiedy inne nitki płonne szczecinkowate lub łuskowate w różnej lub większej ilości. Zawiązek uwieczniony szyjką dwuwębną lub trójwębną, zawiera jedną komorę z załączkiem wzniesionym. Następnie nasiennik staje się skorupkowatym lub kościstym, *kościkowe* (*Seleriae*). Nasienie (fig. 478) składa

się z woreczka błonistego, wypełnionego dużym mączystym bielmem przez kończyny dolnej, w której zagłębia się małeńki zarodek, zwrócony tém samém do znacзка. Zarodek ten (fig. 527) ma zwykle kształt gruszki i posiada na boku małe nabrzmienie *cr*, odpowiadające liścieniu i kiełkowi, jak się to później pokazuje przy wschodzeniu; resztę ciała zarodkowego *a* tworzy łodyżka nadzwyczajnie rozszerzona.

Mówiąc o łodydze, rozbieraliśmy tylko tę, która ukazuje się ponad ziemią, a która częstokroć jest rzeczywiście gałązką wyrastającą z poziomego korzeniaku.

§ 747. **Trawy** (*Gramineae*).— Rośliny te są zwykle zielne; niekiedy jednakże dochodzą wymiarów, które się nie zgadzają z tém nazwaniem. Trzcina włoska (*Arundo donax*) rosnąca w południowej Europie, przewyższa już o wiele wzrost człowieka, a pod zwrotnikami bambusy wyrastają w prawdziwe drzewa. Trawy mają częstokroć równie jak ciborowate, łodygę podziemną, z której wyrastają łodygi wznoszące się ponad ziemią nazywane *źdźbłami* (*culmi*). Żdźbło odznacza się nabrzmieniami, które powstają na każdym węzle, czyli przy początku każdego liścia, tudzież tém, że w środku jest wydrążoném. W rzeczy samej, wiązki włókno-naczynne, zbliżają się i ścieśniają ku zewnątrz, pozostawiając w środku próżnię, prócz samych węzłów, w których wiązki zaginają się poziomo, krzyżują się z sobą, a siatka ich wypełniona nadto tkanką komórkową stanowi rodzaj sklepienia. Żdźbło zatem jest walcem wydrążonym, którego kanał poprzerwany jest szeregiem przegród odpowiadających początkowi liści. Liście otaczają łodygę pochwą, której osada obejmuje węzeł, i która na pewnej stronie rozszczepiona jest w większej części swjej długości; ponad pochwą zaś liść wydłuża się w blaszkę lub pasek wązki. Przedział pomiędzy pochwą i blaszką oznaczonym bywa częstokroć małym, błoniastym przedłużeniem, uciętym lub kończącym, albo też dwuwębnym a nawet wystrzępionym i przywiedzionym niekiedy do kupki włosów; jestto *języczek* (*ligula*,




528.

528. Zarodek odłączony gatunku turzycy (*Carex depauperata*).— *r* Kiełek.— *c* Liścień.— *f* Szpara odpowiadająca pączuszkowi.— *a* Nabrzmiałość boczna łodyżki.

§ 150, fig. 151). Liście bywają zazwyczaj dwurzędowe, a z kątów ich wychodzą częstokroć pęczki od których rozwinięcia zależą rozgałęzienie się rośliny.

Ułożenie tu dwurzędowe napotykaemy często, szczególniej przy kwiatach kwiatostanu, który się składa z *kłosków* (*spiculae*), czyli kłosów tak nadzwyczajnie krótkich, że je długi czas brano za kwiaty. Kłoski tak uważane, układają się w kiści (np. w owsie) lub w kłosy, a w tym ostatnim przypadku zdarza się często, że oś na której siedzą, nabywa wklęsłości naprzemian po jednej i drugiej stronie, w których kłoski są osadzone. Tęto kłosy (np. w jęczmieniu, życie) wzięto za wzór najczęściej przywodzony tego rodzaju kwiatostanu, chociaż one w rzeczy samej są złożone, gdyż każdy kłosek jest zbiorem kwiatów. Aż dotąd znajdujemy wielkie podobieństwo pomiędzy kłosem ciborowatych i traw. Dwa dolne przykwiatki, które tu podobnież nie mają w swych kątach, tworzą niejako okrywę ogólną dla innych i zowią się *plewami*, *glumae*; fig. 529, 530, *ge, gi*). Następne przykwiatki nietylko że mają w kątach swych narzędzia odrodne, lecz także (czem się właśnie różnią trawy od ciborowatych) naprzeciw każdego z nich siedzi drugi przykwiatek nieco wyżej i bardziej ku wewnątrz. Przykwiatki te nazwane *plewkami* (*paleae*; fig. 530, *pe, pi*) stanowią, biorąc po dwa naprzeciw siebie leżące, tyleż okryw, pomiędzy którymi osadzone są pręciki i słupek; a każdy z tych małych układów jest prawdziwym kwiatem. Takich układów może być ponad plewami 1, 2, 3, lub więcej, a podług tego nazywamy kłosek jedno-, dwu-, trój-, wielokwiatowym. Pręciki niekiedy w liczbie 6 lub więcej, niekiedy zaś przywiedzione do 1 lub nawet do 1 tylko, lecz najpospolicij w liczbie 3, osadzone są pod słupkiem środkowym (fig. 530, 531), na którym w rzadszych daleko przypadkach zbywa w tych kwiatach, i który wtedy znajduje się sam na kwiatach oddzielnych. Zazwyczaj znajdują się prócz tego po obu stronach, i nieco na zewnątrz względem najzewnętrznego pręcika, dwa małe ciała błoniaste lub łuskowate, które nazwano *pleweczkami* (*paleolae* v. *lodiculae*; fig. 530 bis II, 531 p). Ponieważ plewka zewnętrzna opatrzona jest nerwem głównym, zewnętrzna zaś przeciwnie pozbawiona jest często takowego i posiada natomiast dwa nerwy boczne po obu stronach, prze-



529. Kłosek owsu zwyczajnego (*Avena sativa*).—*a* Oś.—*ge* Plewa zewnętrzna.—*gi* Plewa wewnętrzna.—*ff* Kwiat niższy płodny.—*a* Dwa kwiaty wyższe płonne.

530. Tenże sam po rozłożeniu okryw, dla pokazania części wewnętrznych.—*pe* Plewka zewnętrzna kwiatu płodnego opatrzona ością.—*pi* Plewka wewnętrzna.—*e* Pręciki.—*o* Słupek.— Inne głoski mają toż samo znaczenie.

530 bis. Zarys kłoska. — Znaczenie glosek jest jak na figurze poprzedzającej.—*z* Pleweczki.

531. Kwiat płodny po odjęciu plewy.—*e* Pręciki.—*p* Pleweczki. — *o* Zawiązek.—*s* Znamiona.

532. Przecięcie pionowe ziarnaczaka; część wyższa została odcięta. — *t* Powłoki zrośnięte ziarnaczaka i nasienia.—*p* Bielmo.— *e* Zarodek.— Inne głoski jak na figurze następnej.

533. Zarodek odosobniony.—*r* Kielek.—*c* Liścień.—*f* Szpara odpowiadająca pączuszkowi.—*a* Nabrzmiałość boczna czyli tarczka (*hypoblastus*).

to wielu uważa tę plewkę *dwunerwową* za powstałą ze zrośnięcia dwóch plewek.

Tym sposobem mielibyśmy trzy plewki, przed którymi osadzone są trzy pręciki; pleweczki zaś stanowiłyby okółek pośredni, w którym niedostaje wprawdzie jednej części, lecz ta płonieje tylko, można ją bowiem widzieć w bardzo młodym pęku. Jednakże chcąc przyjąć ten sposób widzenia, potrzeba by, ażeby plewka wewnętrzna powstawała na tej samej osi co zewnętrzna, nie zaś na osi powtórnej.

¶ Cóżkolwiek bądź pręciki składają się z nitki włoskowato zwęzłej i z pylnika o dwóch woreczkach, połączonych środkiem, u spodu którego przyczepia się nitka; oddalonych zaś od siebie na obu kończynach i przedstawiających tym sposobem głoskę *x* (fig. 531, *e*). Słupek składa się z zawiązka uwięzionego dwiema szyjkami (zrośniętymi niekiedy w jedną), podzielonemi w mniejszej lub większej części swjej długości na paseczki dłuższe lub krótsze, przez co powstają dwa znamiona *s* szczytkowate lub pierzaste. Wewnątrz zawiązka znajduje się jedna komora, którą wypełnia zalążek przyrośnięty wpodłuż do ściany wewnętrznej. Później nasienie dojrzewając zrasta się powłoczką swą z nasiennikiem (fig. 532 *t*) i tworzy tym sposobem ziarnczak (§ 516). Większa część nasienia składa się z bielma mączystego *p*; od zewnątrz tylko u dołu, daje się spostrzedz oddzielne małe ciało zagłębione w bielmo i zaledwie wystające; jestto zarodek (fig. 532 *e*, 533), który opiera się na bielmie częścią rozszerzoną w tarczka *a*. Ku dołowi téjże na zewnątrz wystaje ciało mniejsze, którego środek łączy się z ową tarczka, dwie zaś kończyny sterczą wolne: wyższa i niższa. Pomiędzy nimi widać maleńką szparę pączuszka *f*; wyższa zatém *c* jest liścieniem, niższa *r* kiełkiem, tarczka zaś (*hypoblastus* Richarda), jest tylko wyrostkiem obocznym łodyżki, podobnym do tego, jakiśmy już widzieli w niektórych wstężnicowatych. Opisalimy już wyżej wschodzenie jednego z nasion traw (§ 111 fig. 120). Wszystkie te części szczególniej kwiatowe, otrzymały od różnych pisarzy mnóstwo rozmaitych nazwisk, których przytoczyć nie dozwala nam tu miejsce. Powiemy tylko jeszcze, że nazwa plew zamiast być zastosowaną do każdego z przykwiatków dolnych i płonnych kłoska, używaną niekiedy bywa na oznaczenie ich ogółu, a wtędy pojedyncze przykwiatki są

łupinami plewy; dalej że nazwa plewki nadawaną jest także całemu ogółowi plewek, które wtedy są łupinkami plewki. Dodajmy jeszcze ażeby ułatwić zrozumienie piętn rodzajowych i opisów, że w przykwiatkach zewnętrznych plew i plewek nerw główny przedłuża się częstokroć w ość (*arista*) mniej więcej długą, ponad wierzchołkiem przykwiatków, albo też, oddziela się niżej lub wyżej popod takowym. Rodzaj kwiatostanu, liczba kwiatów w każdym kłosku, ich rozwinięcie zupełne lub płożność wielu z nich, która w niektórych razach stale się objawia: połączenie, lub oddzielenie się pręcików od słupków w jednym kwiecie, obecność lub nieobecność plew, ułkanie i kształt plewek; szyjki zrosnięte lub oddzielone, przyrodzenie znamion, liczba pręcików i pleweczek, oto są piętna, które się zmieniają w rodzinie i których połączenia użyte bywają do odróżniania plemion i rodzajów.

Ogromna ta rodzina, rozszerzona po całej kuli ziemskiej, służy do użytków równie licznych jak ważnych. Dla obfitości skrobi w owocach, uprawiamy wiele gatunków, które się zowią zbożami; sąto szczególnież takie, których ziarna są dosyć duże; tak: pszenica w klimacie umiarkowanym, a wraz z nią lub nieco więcej ku północy jęczmień, żyto i owies; bardziej ku południowi kukuruza, ryż i gryza (*Sorghum*); niektóre inne pod zwrotnikami, jak np. *Poa abyssinica*, różne gatunki prosa i siężyber (*Eleusine*). Mąka z bielma zmiełonego, stanowi pokarm podwójnie pożywny: raz dla skrobi jaką zawiera, drugi raz dla kłajstru (§ 23, 301) przymieszanego do niej. Otręby powstają ze szczątków nasiennika i winny swe własności cząsteczkom skrobi, które przy nich pozostają. Soki wielu traw zawierają w roztworze cukier; otrzymujemy go zaś szczególnież z trzciny cukrowej (*Saccharum officinale*), w której się w ogromnej ilości znajduje. Obecność cukru spowodowuje drożdżenie, w skutek którego wyrabiane zostają liczne płyny wyskokowe, używane za napój i na wiele innych użytków. Tym sposobem rum i taffa otrzymuje się z soku trzciny cukrowej, arak z ryżu, a piwo z jęczmienia. Sposób wzbudzania drożdżenia w zmieszonym ze znaczną ilością wody jęczmieniu, w którym się wywołało pierwsze powjasy wschodzenia, zawiśł od tego, że część skrobi młodej roślinki, zamienia się przy wschodzeniu w cukier. Obfitość różnych pożywnych pierwiastków, w różnych częściach traw jest po-

wodem, iż takowe używane być mogą korzystnie za pokarm dla zwierząt; znaczna też liczba gatunków stanowi podstawę pastwisk i paszy. Nakoniec widzieliśmy jeszcze (§§ 20, 315), że trawy mają szczególne powinowactwo do krzemionki, która wchodząc wraz z sokami i osadzając się na ścianach komórek najzewnętrznějších, oskorupia częstokroć naskórek i węzły; ztąd pochodzi tęgość i mała skłonność do psucia się niektórych gatunków słomy, których przemysł umie używać.

Nie wszystkie trawy pozbawione są zapachu: niektóre z nich owszem wydają w czasie kwitnienia woń przyjemną, lecz zarazem przenikliwą, która wtedy każdego przechodzącego uderza, szczególniej jeśli liczba roślin jest znaczna, jak np. na łące. Jedna z najbardziej pachnących pomiędzy naszymi trawami, jest tomka (*Anthoxanthum*). W krajach cieplejszych znajduje się wiele gatunków, posiadających własność tę w daleko wyższym stopniu; z gatunków tych otrzymują się olejki lotne. Wetywer, używany teraz pospolicie do upachniania sukien, jest korzeniem jednej z traw: palczatki (*Andropogon muricatum*).

§ 748. Jussiego jedno-podzawiazkowe składały się z rodzin poprzedzających; jedno-kołozawiazkowe zaś i jedno-nazawiazkowe z następujących; trudno jest jednakże w tym względzie oznaczyć ścisłą pomiędzy nimi granicę.

Podzieliłiśmy je zatem według innego piętna, które w ogóle wiąże się z piętnami osadzenia, a przedstawia korzyść, że może być łatwo sprawdzonem; jestto zrośnięcie, lub niezrośnięcie kielicha z zawiązkiem. Rośliny rodzin jednoliściennych, które nam jeszcze do rozbioru pozostają, posiadają okwiat o listeczkach prawie zawsze ułożonych okółkami po trzy; okółków tych bywa najczęściej dwa, i te albo są podobne do siebie, oba bowiem mają pozór kielicha lub korony, albo też różnią się od siebie, a wtedy zewnętrzny jest kielichowaty, wewnętrzny zaś płatkowaty.

#### ROŚLINY JEDNOLIŚCIENNE

opatrzone bielmem i okwiatem.


(T a b l i c a IV str. 614).

§ 749. **Palmy** (*Palmae*). Opisałiśmy poprzednio (§§ 93, 94) budowę łodygi palm i ich najpospolitszą postać (fig. 114, 1).

Chociaż najczęściej łądyga ta stanowi pień mniej więcej wyniosły i pojedynczy, jednakże nie jest to przypadkiem bezwyjątkowym. Tak np. w *Cucifera thebaica* widzimy, iż zaczynając od pewnej wysokości pień dzieli się kształtnie widelkowato, a w wielu innych przywiedzionym jest do cebuli lub korzeniaka. Pień wydłużając się, może być dość grubym albo też mniej więcej ciekim; międzywęzła jego są albo bardzo krótkie, albo też oddalone od siebie znacznymi odstępami; jego powierzchnia bywa niekiedy równa, a nawet połyskująca (jak w rodzaju *Calamus*), często zaś przeciwnie cała jest nasadami trwałemi liści, albo też nierówna, pomarszczona i bródkowata, mianowicie na częściach starszych, z których nasady te już opadły; nierzadko także zdarza się widzieć na niej ciernie proste mniej więcej długie. Korzenie przybyszowe, wychodzące ponad ziemię i skupione ku podstawie łądygi, tworzą częstokroć około niej siatkę i czynią ją grubszą i stożkowatą.

Liście, które tu dochodzą znacznych wymiarów, siedzą na ogonkach długich i mocnych, a przytém bardzo giętkich; blaszka zaś bardzo gruba, przytwierdzona jest do ogonka podług linii nie prostej, lecz łamanej w zygzag, tak, iż ztąd powstaje szereg zagięć, które się najlepiej porównać dadzą do wachlarza, i które otwierają się w taki sam sposób. W rzeczy samej zagięcia te, albo ułożone są zupełnie jak skrzydła prawdziwego wachlarza, przyczepiając się wszystkie razem do kończyny ogonka, albo też ułożone są nakszałt chorągiewki pióra, siedząc jedno ponad drugimi z obu stron ogonka, który wtedy przedstawia nerw, albo ogonek główny. Cała blaszka tak pozaginana, jest w pierwszej młodości jednociągłą, lecz później rozczepia się wzdłuż zagięć i dzieli się tym sposobem na mnóstwo pasków, które całości nadają pozór liścia dłoniasto-dzielnego lub pierzasto-dzielnego (fig. 114, 1). W kącie każdego z tych liści, które odnawiane będąc pączkiem końcowym, tworzą rodzaj czuba u szczytu łądygi, wyrastają kwiaty osadzone w buławkę bądź pojedynczą, bądź rozgałęzioną. Uszka okrywające zrazu buławki, a później trwające obok nich dłużej lub krócej, kiedy takowe otworzą je i przewyższą, składają się z tkanki grubej, twardej, niekiedy drzewnej, tak że tworzą jakby łądkę. Mogą one być pojedyncze lub liczne; zupełne lub niezupełne, niekiedy nawet niema ich wcale

Kwiaty bywają obupłciowe, wielozienne, oddzielno lub rozdzielno-płciowe (np. w daktylu). Okwiat (fig. 538 *c*, 540) składa się z dwóch okółków listeczków korowatych, z których



trzy wewnętrzne niezawsze są jednej postaci i długości z zewnętrznymi, i często zrastają się z sobą. Pręciki najzwyczajniej w liczbie 6 (fig. 535, 540), rzadko przywiedzione do 3 tylko, bywają niekiedy liczniejsze w kwiatach osobnopłciowych; nitki ich są wolne lub jednozwiązkowe. Słupek składa się z trzech

534. Kwiat żuwipalny (*Areca catechu*) przed otwarciem się. — *ce* Okwiat zewnętrzny. — *ci* Okwiat wewnętrzny.

535. Zarys tegoż kwiatu, w którym pręciki są rozwinięte, zawiązki zaś spleśniały. — *a* Położenie osi kwiatostanu względem kwiatu.

536. Inny kwiat po odłączeniu okwiatu; pręciki *e* spleśniały w części, zawiązek zaś *s* jest rozwinięty. — *s* Znamię.

537. Zarys kwiatu powyższego wraz z okwiatem.

538. Owoce tegoż *f*, otoczony u spodu okwiatem *c* trwałym.

539. Przecięcie pionowe owocowi. — *c* Okwiat. — *f* Nasiennik. — *p* Bielmo pomarszczone. — *e* Zarodek.

540. Kwiat karlatki (*Chamaerops humilis*) widziany z góry.

zawiązków oddzielnych (fig. 540), lub zrosniętych (fig. 536), równie jak ich szyjki. Każdy zawiązek zawiera jeden lub dwa załączki wzniesione; lecz często, szczególnie w przypadkach zrosnięcia zawiązków, dwie komory płonieją, a jedna tylko pozostaje. Owoc, który niekiedy dochodzi ogromnych wymiarów (np. w kokosie), zawiera pod grubą, mięsistą lub włóknistą okrywą, pestkę podobnie pojedynczą lub potrójną: w pierwszym przypadku prawie zawsze jednokomorową, o ścianach niekiedy cienkich, lecz często także nabywających twardości drzewa, a nawet kamienia. Nasienie, które wypełnia pestkę, zrastając i zlewając się często z takową, składa się po większej części z bielma grubego, w ogóle bardzo twardego, rogowatego, albo chrząstkowatego, nierzadko także pomarszczonego (fig. 539 p). U dołu lub na boku jego znajduje się mały dołek, w którym leży zarodek *e*, zwrócony przeto albo do znaczku, albo w inną weale stronę.

Odróżniono wiele plemion palm podług różnych odmian kwiatostanu i uszek, które mu zazwyczaj towarzyszą, tudzież według odmian owocu, różniącego się co do zbitości swego nasiennika, który się składa albo z wielu owoców oddzielnych, albo z jednego tylko, a w takim razie zawiera albo wiele komór i nasion, albo jedną tylko komorę i jedno nasiono. Podziałów może znowu dostarczyć dwoisty, a tak wyraźny kształt liści. Sposób podzielenia i kształt okwiatu, liczba i kształt pręcików wolnych lub zrosniętych, kształt pylników, stopień zrosnięcia się zawiązków i szyjek, tudzież ich płouność, kształt, wielkość, utkanie owocu i jego części, pestki, bielma, położenie zarodka, rozkład słupków na jednych lub na różnych kwiatach, należących albo do jednego drzewa, albo do drzew różnych. Różne te odmiany rozmaicie z sobą łączzone, służą do odróżniania rodzajów.

Liczne gatunki tej pięknej rodziny, oddają mieszkańcom krajów w których rosną, najrozmaitsze usługi. W rzeczy samej z jednej strony drzewo ich używanem bywa na budowlę chat, których pokrycia dostarczają bez wielkich trudów ich wielkie i twarde liście; a włókna tak giętkie i mocne, rozrzucone po wszystkich częściach rośliny, służą do wyrabiania powrozów, broni i różnych sprzętów domowych. Z drugiej strony, rozmaite gatunki dostarczają pokarmów, nie wymagając prawie przyrządzenia. Każdemu wiadomo, że całe narody żywią się

prawie wyłącznie daktylami; że owoc kokosu zawiera rodzaj kwaskowatego mleka, stanowiącego wyborny napój w krajach gorących; mleko to jest bielmem płynnym jeszcze, które później gęstnieje coraz bardziej, a w końcu zamienia się w ciało twarde jak kamień. Pączki końcowe innego, również szacownego gatunku: *Areca oleracea*, znane pospolicie pod imieniem kapusty palmowej, stanowią także poszukiwany pokarm. Prócz tego znajdujemy pomiędzy wytworami palm, niektóre z tych, które tak są użyteczne w trawach, jakoto: skrobia, obficie wypełniającą wewnętrzne komórki, prócz znacznej liczby gatunków, szczególniej *Sagus* i *Phoenix dactylifera*, a znaną pod imieniem sago; cukier zmieszany z oskołą, z której przeto wyrabiać się dają napoje wysokokowe, jak np. palmowe wino, otrzymywane w najlepszym gatunku z olejniku (*Elaeis guineensis*), arak robiony z soku palmy: *Areca catechu* poddanego drożdżeniu wraz z ryżem. Pod imieniem *Toddy* używany jest w Indyach napój otrzymywany przez nacięcie uszek kokosu i innych. Mleko kokosowe winno część swoich pożywnych własności pierwiastkowi oleistemu, jaki w sobie zawiera: podobny pierwiastek znajduje się w wielu innych palmach tego samego plemienia; otrzymuje się też z nich olej palmowy, szczególniej ze wspomnianego już gatunku olejowcu. Znany jest także wosk palmowy, który obficie wypływa i zbiera się na pniach wosko-palmy (*Ceroxylon andicola*, § 518).

§ 750. **Sitowate** (*Juncaceae*). Przytaczamy je tu tylko jako rodzinę zwykle znajdującą się pomiędzy roślinami naszych krajów, i pospolicie liczoną także do traw, podobnie jak wiele roślin błotnych mieszanych bywa z sobą pod imieniem sitowia. Budowa kwiatów łatwo je daje odróżnić tak z powodu obecności okwiatu sześciolisteczkowego, jak przez zawiazek trójkomorowy; utkanie jednakże łuskowate lub zielne pierwszego, stanowi poniekąd przejście od okryw kwiatowych oddziału palmowych, do okwiatów barwnych następujących rodzin.

§ 751. **Liljowate**. Okwiat przywdziewa w rodzinie tej najświetniejsze barwy, dlatego też rośliny do niej należące, ogrodowe czy polne, szczególniej są lubione. Aby o nich dać wyobrażenie, dosyć jest wymienić tulipan, hjacynt, lilję, koronę cesarską, złotogłów (*Asphodelus*). Nasze gatunki są zielne; łodygi ich są częstokroć krótkie i nabrzmiałe w cebule,

których różne odmiany opisaliśmy wyżej (§ 182); niekiedy bywają wydłużone i albo czołgające się, albo wzniesione, czasami nawet bardzo gałęziste. W krajach zaś cieplejszych znajdują się prócz tego niektóre drzewne (jak jukka, niektóre aloesy i t. d.), a nawet znajdują się pomiędzy nimi przykłady najgrubszych drzew jednoliściennych (smokowce, § 194). Liście ich są długie, zwykle zwężone, o nerwach równoodległych. Pochwy dochodzą w niektórych cebulach wielkiego rozwinięcia, a wchodząc po części w ich skład, znacznie je zgrubiają.

Kwiat (fig. 226, 541) przedstawia dokładny wzór kwiatów jednoliściennych: składa się bowiem z okwiatu o sześciu we dwa spółśrodkowe okręgi ułożonych listeczków, podobnych do siebie i albo oddzielnych, albo zrosniętych u dołu w rurkę; dalej z 6 pręcików siedzących naprzeciw listeczków okwiatu, ułożonych podobnie we dwa okółki, osadzonych na rurce jeśli takowa się znajduje, lub przy samej nasadzie listeczków, tak nisko, iż je w niektórych razach śmiało można uważać za podzawiazkowe; z trzech zawiązków naprzemianległych względem trzech wewnętrzniejszych pręcików i zrosniętych w jedno, równie jak szyjki, a niekiedy i znamiona, które jednak mogą także być podzielone na trzy łaty. Każda komora (fig. 543 v) zawiera wiele zalążków *g* przytwierdzonych do kąta wewnętrznego, lub osadzonych we dwa podłużne rzędy. Owoce jest zazwyczaj torebką komorowo pękającą. Dawniej oddzielano pod imieniem *szparagowatych* (*Asparagineae*) pewną liczbę rodzajów o owocu mięsistym, lecz później przyłączono je znowu. Nasienie (fig. 544) zawiera w mięsistym bielmie *p*, zarodek *c* najczęściej prosty, niekiedy krzywy, lecz zawsze zwrócony ku punktowi przymocowania ziarna. Skórka ta stanowi powłokę nasion, jest gębczasta w jednych (składających pierwiastkową rodzinę liljowatych), skorupowata zaś i połyskująca w innych (z których zrobiono rodzinę złotogłowowatych), w niektórych zaś rodzajach błoniasta (aloesowe).

Liljowate hodowane bywają nie tylko jako rośliny ozdobne, wiele bowiem z nich służy także do użycia kuchennego, a takie należą w ogóle do rodzaju *czosnek* (*Allium*) (np. cebula, pory, szalotka, rokambuły, i t. d.). Używane zaś bywają dla soków swych posiadających smak ostry i nieco pobudzających, a obficie znajdujących się we wszystkich częściach

szczególnej zaś w łodygach cebulowatych. Własności te mogą się znajdować w wyższym stopniu, a rośliny posiadające takie ostre soki znajdują zastosowanie w medycynie, jak np. oszloch (*Scilla*), aloesy i wiele innych, które za długo byłoby wymieniać.



W roślinach sąsiedniej rodziny czernikowatych (*Melanthaceae*) znajdujemy więcej jeszcze działalności (zimowit, ciemierzyc [ *Veratrum* ]), a nawet prawdziwe trucizny.

§ 752. **Amarylkowate** (*Amaryllideae*). Wystawmy sobie liljowate, których listeczki okwiatu byłyby u dołu zrosnięte z sobą i z zawiązkiem, a będziemy mieli tę nową rodzinę, która zresztą przedstawia też same piętna roślin i ten sam rozkład części kwiatowych. Nasiona jej okazują podobne odmiany pod względem budowy skórki, szczególnie jeśli przyłączymy tu małą sąsiednią rodzinę przyklękowatych (*Hypoxideae*) która się tém samém różni od amarylkowatych, czém plmie


541. Kwiat gatunku oszlochów (*Scilla autumnalis*) widziany z góry. — *ce* Okwiat zewnętrzny. — *ci* Okwiat wewnętrzny.

542. Zarys tegoż.

543. Przecięcie pionowe kwiatu. — *cc* Okwiat. — *e* Pręciki. — *o* Związek. — *s* Szyjka i znamiona. — *g* Zalążki.

544. Nasiono odosobnione i przecięte wzdłuż. — *t* Powłoki. — *p* Bielmo. — *e* Zarodek.

złotogłowowych od innych liljowatych, a cośmy dopiero widzieli. W niektórych rodzajach, z których utworzono osobne plemię *narcyżowych*, listeczki okwiatu są od wewnątrz podwojone, na punkcie w którym się od siebie oddzielają, a to za pomocą zagięcia, albo języczka barwnego, z kąd powstaje gatunek kołnierzyka ogólnego całobrzęgiego lub ząbkowanego. W niektórych amarylkowatych, daje się widzieć szczególna odmiana nasienia, którego powłoka, albo też bielmo tracąc zwykle swoje utkanie, zamienia się na tkankę wzdętą, wielką, soczystą i zielonawą, i dochodzi daleko większych wymiarów niż w stanie zwyczajnym. Nasiona takie zowią się cebulkowatemi, dla pozornego podobieństwa z cebuleczkami.



§ 753. **Kosaćcowate** (*Irideae*). Rośliny te dosyć podobne do poprzedzających, różnią się od nich pręcikami swemi

545. Zarys kwiatu kosaćcu pospolitego (*Iris germanica*). — *a* Położenie osi w kwiatostanie.

546. Przecięcie pionowe tegoż kwiatu. — *ce* Podziałki zewnętrzne okwiatu. — *ci* Podziałki wewnętrzne. — *t* Rurka okwiatu powyżej części jej zrosniętej z zawiązkiem. — *o* Zawiązek. — *g* Zalążki. — *e* Pręciki. — *s* Znamiona

547. Nasiono odosobnione i przecięte wpodłuż. — *t* Powłoki. — *p* Bielmo. — *e* Zarodek. — *m* Otworek.

w liczbie 3, umieszczonemi przed trzema zewnętrznemi podziałkami okwiatu; nadto pylniki ich pękają na zewnątrz (fig. 535). Nitki pręcików zrastają się niekiedy w rurkę. Trzy znamiona naprzeciwległe względem pylników rozszerzają się w wielu gatunkach płatkowato (fig. 546 s); one to zbierane bywają z szafranu, gdzie odznaczają się równie swoim znany smakiem, jak barwnikiem, który zawierają w wielkiej ilości. Bielmo nasion (fig. 547) składa się niekiedy ze zbitego mięsiwa, w innych jest rogowe. Utkanie to podobne jak w ziarnach kawy, było powodem iż starano się zastąpić tę ostatnią nasionami jednego z kosaćców (*Iris pseudo-acorus*). Nasiona te palone i przyrządzane jak kawa, mają mieć niejaki do niej podobieństwo.

§ 754. **Zapylcowate** (*Bromeliaceae*). Rodzina ta posiada wszystkie przejścia od zawiązka wolnego do zrosniętego; *opłatkowate* (*Tillandsiae*) bowiem, które z powodu przyjętego w tablicach naszych podziału musieliśmy umieścić w pewnej odległości, tworzą tylko jedno z plemion téj rodziny. Pomiędzy niemi znajdujemy rośliny pasożytnie żyjące na obcych drzewach. Nasiona odznaczają się niekiedy szewkiem, prawie tak grubym jak reszta ziarna i oddzielającym się w końcu częściowo od niego, tudzież zarodkiem jakby siedzącym na wierzchu bielma i wybiegającym po jednej stronie jego w dość długą kończatość.

Wiele zapylcowatych odznacza się pięknnością barwy swych kwiatów, lecz rośliny te mniej są upowszechnione, niż poprzedzające; pochodząc bowiem wszystkie z krajów zwrotnikowych, tylko w cieplarniach hodować się dadzą. Najznajomszą z nich jest ananas, dla owocu swego tak wielce ceniony.

§ 755. **Pochrzynowate** (*Dioscoreaceae*). Mała ta rodzina zasługuje na wspomnienie, dla niektórych ciekawych szczegółów swój ustrojność. Wraz z obrazkowatemi i kolcowojowatemi, stanowi ona wyjątek od innych jednoliściennych co do ułożenia nerwów, które są gałęziste i połączone w siatkę; blaszka także liściowa przypomina raczej kształt jaki widzimy w roślinach dwuliściennych. Szczególna ta różnica odbija się w samym już zarodku, którego liścień jest spłaszczony i rozszerzony w prawdziwą blaszkę (§ 566, fig. 461), a pączuszek prawie zupełnie nagi. Łodyga również jest godną uwagi, gdyż lubo wypuszcza co rok pnące się gałązki, jednakże te nie

wychodzą jak w innych roślinach, z kolejno po sobie następujących węzłów, lecz ze szczeplu podziemnego, który stanowi pierwsze międzywęźle ciągle wzrastające i dochodzące ogromnych wymiarów. Przytoczyliśmy już jedną taką łodygę z *Tamus elephantipes* (§ 100), ciekawą oprócz tego z powodu rozwijania się na jej powierzchni gatunku korku. Korzeniak gatunku *Dioscorea alata*, znanego pod imieniem *Yamu* (*Igname*), główkowaty i mięsisty, zawierający klój roślinny i cukier stanowi dla mieszkańców krajów podrównikowych jeden z najużywalniejszych pokarmów.

Podług tego jak rośliny rodziny tej posiadają owoc mięsisty lub suchy i skrzydlaty, odróżnić można dwa plemiona: *Tamneae* i *Dioscoreae*.

§ 756. **Bananowate** (*Musaceae*). Wzorem tej rodziny jest banan (*Musa*) roślina pospolita w całym pasie gorącym, gdzie owoc jej wspomniany już kilka razy (§ 502, 537), stanowi także jeden z najgłówniejszych pokarmów. Mówiliśmy już o wielkich liściach bananu (fig. 152), których długie pochwy okrywające się wzajemnie, tworzą pozorną łodygę, prawdziwa bowiem ukryta jest pod ziemią. Opisałiśmy jego cewki, odznaczające się grubością i mnogością nitok węzownicowych (§ 9, fig. 39). Nitkom tym przypisywano nieraz użytek, jakiego wcale nie pełnią, ponieważ są bardzo słabe. Nitki bowiem otrzymywane z roślin tej rodziny, a mianowicie z gatunku zwanego *Abaca* (*Musa textilis*), i używane do robienia powrozów i pięknych tkanin, pochodzą z włókien wydłużonych, prostych i podobnych do łyka. Kwiaty tej rodziny, odznaczające się w niektórych gatunkach dziwacznymi kształtami i świetnymi barwami (np. w rodzaju *Strelitzia*), mają po 6 pręcików, z których jeden zwykle płonieje, lecz ukazuje się w rodzaju *Ravenala*. Nasiona samotne lub mnogie, w każdej z trzech komór mięsistego lub pękającego owocu, posiadają zwykle osnówkę występującą i rozmaitej barwy.

§ 757. **Pacioriecznikowate** (*Cannaceae*). Zbliżają się do rodziny poprzedzającej, postacią liści poprzeczno-nerwowych, dwurzędowych, i osadzonych na długich pochwach, które siedzą jedna w drugiej, umacniają i przedłużają gałązki wychodzące z łodygi podziemnej. W łodydze tej gromadzi się często mnóstwo skrobi, niekiedy wyborowego gatunku (mianowicie w aksamitowcu [*Maranta arundinacea*]), znanej w handlu

pod imieniem *Arrow-root*. Kwiaty zasługują na całą uwagę botaników, którzy przez długi czas nie pojmowali ich dobrze, z powodu niekształtnego przeobrażenia się pręcika w płatkę; jeden tylko pręcik zachowuje ślad prawdziwego swego przyrodzenia, posiada bowiem jeden woreczek pylnika na jednym z swych brzegów. Szyjka a nawet samo znamię, bierze także udział w tém przeobrażeniu, a różne zrośnięcia tych części powiększają zagmatwanie, które jednak dziś jest już należycie objaśnioném. Opisaliśmy wyżej nasienie (§ 562) i sposób jego wschodzenia (fig. 490); niekiedy zamiast być prostém, składa się ono we dwoje na sobie samém.

§ 758. **Zdzieblcowe** (*Scitamineae*). Powierzchność ich jak w rodzinie poprzedzającej, lecz w kwiecie pręciki, chociaż przybierają po większej części postać innych narzędzi nie przekształcają się jednakże tak bardzo i nie zachowują takich samych stosunków. Jeden z nich zatrzymuje wyraźnie swój kształt i kończy się dużym dwu-woreczkowym pylnikiem; drugi umieszczony naprzeciwko, zmienia się w duży płatek; trzeci niezupełnie się wykształca i różni się co do postaci. Uważać także należy, że pręcik opatrzony pylnikiem, umieszczony jest ponad jedną z podziałek wewnętrznych okwiatu, musi więc należéć do wewnętrznych okółka pręcików; w paciorecznikowatych rzecz się miała przeciwnie.



548.

Nasienie przedstawia szczegół nadzwyczaj rzadki w całym państwie roślinném, lecz który łatwo się daje objaśnić teorią dzisiejszą zalążka (§ 560); jestto obecność dwóch bielm półśrodkowych odmiennego przyrodzenia (fig. 548 *pe*, *pi*). Zewnętrzne z nich odpowiada bielmowi paciorecznikowatych.


Korzeniaki obfitują równie jak w tamtych w skrobia, lecz ta nie jest w ogóle używaną, dla obecności przy niej oleju dość ostrego i posiadającego bardzo mocny zapach. Z drugiej strony olej ten, znajdujący się we wszystkich częściach roślin, używa im aromatu, dla którego jako korzenie wysoko są cenne. Prawie wszystkie zdzieblcowe posiadają tę własność;

548. Nasiono gatunku *Hedychium carneum*, przecięte pionowo.—*t* Powłoka.—*m* Otworek.—*c* Osadka.—*pe* Bielmo zewnętrzne.—*pi* Bielmo wewnętrzne.—*e* Zarodek.

dość jest wymienić z pomiędzy nich amom, zedoaryą i imbiér. Szacowny pierwiastek barwny kurkuma, otrzymuje się z jednej z tych roślin.

§ 759. **Storczykowate** (*Orchideae*). Kwiaty téj rodziny zwracają uwagę patrzącego powierzchownie dziwacnością swych kształtów, uwagę zaś botanika szczególną swą budową. Aby ją dobrze zrozumieć, starajmy się sprowadzić ją do znanego wzoru jednoliściennych. Okwiat zrosnięty z zawiązkiem bezszypułkowym, dzieli się nad nim na 6 listeczków: z tych trzy zewnętrzne dosyć są podobne do siebie, trzy zaś wewnętrzne różnią się od pierwszych i pomiędzy sobą. Zwykle trzy pierwsze i dwa z drugich wznoszą się w górę ku osi kwiatostanu, szósty zaś zwraca się w stronę przeciwną; tym sposobem okwiat staje się niejako dwuwargowym, wargę bowiem wyższą stanowi ogół owych pięciu podziałek, niższą zaś stanowi podziałka szósta, nosząca dlatego imię *warżki* (*Labelum*). W bardzo młodym kwiecie warżka leży od strony osi (fig. 550); lecz później zawiązek skręcając się przewraca położenie części i czyni je takiem, jakie widzimy w kwiecie otwartym (fig. 549). Warżka to właśnie postacią swą i barwą, częstokroć wcale różną od innych części, najwięcej się przykłada do nadania kwiatom szczególnej powierzchowności, która im niekiedy użycza dalekiego podobieństwa do różnych innych przedmiotów w przyrodzie, a mianowicie do niektórych gatunków owadów.

Dałej, powinniśmy znaleźć trzy pręciki, naprzeciw trzech zewnętrznych podziałek, i rzeczywiście znajdujemy je w obuwiu (*Cypripedium*), lecz jeden z nich (leżący w górze kwiatu) jest płonny, zamiast bowiem nosić na sobie pylnik, rozszerza się tylko w rodzaj tarczki. Przeciwnie w wielu innych storczykowatych sam tylko ten trzeci pręcik opatrzony jest pylnikiem (fig. 550 e), inne zaś dwa na pozór nie istnieją; lecz śledząc uważnie, znajdujemy je w postaci dwóch małych brodawek komórkowych, które się zowią *pręcicznikami* (*staminodia*) (fig. 550 s), a które niekiedy w kwiatach potwornych rozwijają się w prawdziwe pylniki. Różnienie tego okółka pręcików utrudnionem jest z powodu, że takowe zamiast być osadzone umiarkowo pomiędzy podziałkami wewnętrznemi okwiatu, wywyższone są na ciałku wznoszącem się od wierzchołka zawiązka ku środkowi kwiatu; ciałko to ma postać



549. Kwiat gatunku *Spiranthes autumnalis* po przekroczeniu się, widziany z boku. — *o* Zawiązek wraz z przyrośniętym okwiatem. — *ce* Podziałki okwiatu zewnętrznego. — *ci* Podziałki okwiatu wewnętrznego, z których niższa *l*, bardziej rozwijająca się, nosi imię warżki.

550. Zarys tegoż kwiatu przed przekroczeniem się. — *a* Oś kłosa. — *pe* Podziałki zewnętrzne okwiatu, — *pi* Podziałki wewnętrzne. — *l* Warżka. — Pylnik płodny. — *s* Pylniki płonne czyli pręciczki. — *o* Zawiązek.

551. Wierzchołek kwiatu przeciętego pionowo. — *o* Zawiązek przyrośnięty wraz z zalążkami ściennymi *g*. — *l* Warżka. — *s* Znamię. — *a* Pylnik.

552. Pylnik odosobniony, widziany od strony wewnętrznej dla obudwu woreczków.

553. Pylkowiny ziarnkowane wyjęte z pylnika.

554. Przecięcie poziome zawiązku wraz z łożyskami ściennymi.

555. Nasiono odosobnione wraz z powłoką zewnętrzną *t*.

556. Zarodek gatunku *Ophrys antropophora* pozbawiony powłok.

557. Pylkowiny storeczyka plamistego (*Orchis maculata*) o ziarnach połączonych w małe bryłki kątowe, z których dwie odrysowano na boku. — *c* Ogonczyk zakończony u dołu ucepkim.

osobnopłciowe.

I. NAGOZIARNOWE, czyli takie, których zalążki nagie siedzą na łuskach.

Zarodek o liścieniach w części zrosnięty z sobą; o kielku wolnym.....—Liście pierzaste.—Pień pojedynczy.....—SAGOWCOWATE (*Cycadeae*).  
 zupełnie oddzielnych, o kielku przyrosniętym do bielma.—Liście proste.....—Pień rozgałęziony.....—SZYSZKOWE (*Coniferae*).

II. OKRYTOZIARNOWE, czyli takie, których zalążki zamknięte są w zawiązkach.

Rośliny żyjące same przez się, opatrzone łodygą i liśćmi. Okwiat pojedynczy.....1.  
 pasyżne, bez liści zielonych, a niekiedy i bez łodygi. Okwiat pojedynczy.....2.  
 podwójny.....3.

1. Zawiązki pojedyncze	1-komorowe	niewielozienne. Zalążki	wzniesione, nasiona o bielmie podwójnym i zarodku wsteczległym	liczne w każdym owocu. Kwiaty	meżkie liczne, jednopęcikowe, około licznych żeńskich.....	WĄTLIKOSKOWATE ( <i>Saurureae</i> ).
				pojedyncze w każdym owocu. Kwiaty meżkie liczne, jednopęcikowe, około jednego żeńsk.		PIEPRZOWATE ( <i>Piperaceae</i> ).
			Zalążek pojedynczy lub 0	przyrosły. Zarodek wsteczległy o liścieniach podzielonych na łaty. Bielmo żadne. Kwiaty ułożone w kotki.....		ORZECHOWATE ( <i>Juglandae</i> ).
				wol., 1-zalążk. Zarodek wsteczległy. Bielmo i kielich 0. Kwiaty ułożone w kotki.....		WOSKOWNICOWATE ( <i>Myricaceae</i> ).
				wprostległy, prosty. Bielmo duże pomarszczone. Kielich. Kwiaty oddzielne; meżkie 1-wiązkowe.....		MUSZKATOWCOWATE ( <i>Myristiceae</i> ).
				wsteczległy, prosty. Bielmo mięsiste. Kielich. Soki wodniste kizyw. Bielmo żadne. Kielich. Soki wodniste		POKRZYWOWATE ( <i>Urticeae</i> ).
			zawieszony lub krzywy	samotne. Zawiązek przyrosły. Zarodek prosty, wprostległy, bardzo małe, leżący w dużym bielmie.....		WYSOKCZKOWATE ( <i>Gunneraceae</i> ).
				wolny. Zarodek krzywy wsteczległy. Bielmo żadne. Sok młeczny.....		CHLEBOWCOWATE ( <i>Artocarpeae</i> ).
				wokragległy. Bielmo mięsiste. Sok młeczowy.....		MORWOWATE ( <i>Moraceae</i> ).
				prosty, wsteczległy. Bielma żadne. Kielich wielowębny. małe w dużym bielmie. Kielich 0. Liście raprzeciwił. Bielmo i kielich 0. Liście naprzemian.		ROGATKOWATE ( <i>Ceratophylleae</i> ).
			prawie osadzone. Zawiązek	wolny. Zarodek prosty wsteczległy. Bielmo żadne. wprostległy, otoczony bielmem. Liście naprzemianległe.....		PRZEPOTKOWATE ( <i>Stilagineae</i> ).
				przyrosły. Zarodek prosty, wprostległy daleko mniejszy od bielma. Liście przeciwległe.....		KOTECZNIKOWATE ( <i>Garryaceae</i> ).
		wielozienne	przyrosłe łożyska ściennie. Owoc pękający u wierzchołka.....			KONOPNICOWATE ( <i>Datisceae</i> ).
			wolne. Nasiona nagie, przytwierdzone do powierzchni przegród lub łupin.....			ZASENNIKOWATE ( <i>Podostemoneae</i> ).
			opatrzone puchem, nasadowe, wstępujące, z dwóch ściennych łożysk. Kwiaty ułożone w kotki.....			WIERZBOWATE ( <i>Salicineae</i> ).
	wielokomorowe, wolne. Zalążki	1-2 zawieszony. Bielmo	ładne. Komór 2. Kwiaty ułożone w kotki.....			BRZOWATE ( <i>Betulineae</i> ).
			nie w kotkach, wielozienne.....			WIĄZOWATE ( <i>Ulmaceae</i> ).
			mięsiste. Komór 3, rzadko więcej lub mniej. Tyleż guzików.....			OSTROMŁĘCZOWATE ( <i>Euphorbiaceae</i> ). ( <i>Balsamiflucae</i> ).
			6-8 tarczowate. Bielmo cienkie. Komór 2. Kwiaty meżkie 1-pęcikowe ułożone w kwiatogłówki.....			DZBANECZNIKOWATE ( <i>Nepenthae</i> ).
			w liczbie nieoznaczonej, przytwierdzone do przegród. Bielmo mięsiste. Komór 4. Kwiaty meżkie wielopęcikowe, jednowiązkowe.....			MISECZKOWATE ( <i>Cupuliferae</i> ).
	przyrosłe. Nasiona	1-2 w każdej komorze. Bielmo	ładne. Owoc niepękający, opatrzone pokrywą. Kwiaty meżk. w kotkach.....			UKOŚNICOWATE ( <i>Begoniaceae</i> ).
			w liczbie nieoznaczonej. Bielmo cien. Owoc pękający, bez pokrywy, 3-komorowy, 3-skrzydlaty. Kwiaty w wierzchołkach. Kielich barwny.....			
			liczne w jednym wspólnym kielichu. W kwiatkach meżkich, liczne pęciki na kielichu osadzone. W żeńskich.*			
		* Zalążki samotne	zawieszony wzniesione	Zarodek prosty, wprostległy, w mięsistym bielmie	Pylniki pękające szparą podłużną.....	POLEŃCOWATE ( <i>Monimieae</i> ).
					Pylniki otwierające się za pomocą łupinek.....	OBOCZKOWATE ( <i>Atherospermeae</i> ).
2. Zawiązek wolny. Łożyska	osiowe. Komory liczne, w każdej po	1-m ziarnie wstępującym. Bielmo	mięsiste.....			BAGNÓWKOWATE ( <i>Empetraceae</i> ).
			1-2 ziarn zawieszonych. Bielmo mięsiste.....			OSTROMŁĘCZOWATE ( <i>Euphorbiaceae</i> ).
		ściennie. Nasiona w liczbie	nieoznaczonej, bezbielmowe. Pylniki proste.....			FIGOWCOWATE ( <i>Papayaceae</i> ).
	przyrosłe. Łożyska	ściennie. Nasiona w liczbie	nieoznaczone, rzadko w liczbie	oznaczonej, bezbielmowe. Pylniki pogięte.....		TYRKOWATE ( <i>Cucurbitaceae</i> ).
3. Zawiązek przyrosły. Komory	1-2 zawierające po jednym	zalążku zawieszonym. Kwiaty	meżkie 1-3-4 pęcikowe. Okwiat o tyluż	podziałkach. 1-2 szyjki wolne.		GAŁECZNIKOWATE ( <i>Balanophoreae</i> ).
			1-wielozawiazkowe, o łożyskach	ściennych lub wolnych. Okwiat o 5	podziałkach. Pylniki liczne otwierające się	dziurką u wierzchołka. Szyjki zrosnięte.....
					3-6 podziałkach. Pylniki w	równy lub dwa razy większej
					liczbie, pękające szparą. Szyjki	zrosnięte.....
						MORZYCZYSTKOWATE ( <i>Cytineae</i> ).

krótki  
płaska  
jest k  
widzi  
ze zna  
wielu  
czenia  
złożo  
raz ni  
drugi  
gość  
drugi  
ostatn  
w inn  
źnieni  
bowier  
lub dr  
powią  
nym ra  
stokro  
w kom  
kich t  
bnych  
lecz p  
bniej i  
otwie  
podzie  
na wie  
czy cz  
557),  
ku, o  
kowi  
tną w  
u doł  
czasa  
(ucze  
cula)  
kich s  
ny, us  
przyro

krótkiego, ukośnie uciętego pieńka, którego powierzchnia płaska lub nieco wklęsła, okryta obłoczką lepłą, zwrócona jest ku zewnątrz. Powierzchnia ta należy do znamienia, a ztąd widzimy, iż ciało środkowe powstało ze zrośnięcia pylników ze znamieniem, istniejąca zaś obok tego zrośnięcia płonność wielu części, przykłada się do ukrycia ich prawdziwego znaczenia. Nazywamy *szyjkonitką* (*gynostemium*) ciało owo złożone ze znamienia i pylnika, który osadzony jest na niem raz niżej, leżąc względem niego równolegle (fig. 551 a, s), drugi raz wyżej, a wtedy wystaje nad niem o całą swą długość (i zowie się wierchołkowym); raz wznosi się prosto, drugi raz zagina się ponad powierzchnią znamienia. W tym ostatnim przypadku, pylnik oddziela się częstokroć w końcu; w innych zaś razach pozostaje na miejscu, nawet po wypróżnieniu pyłku. Pyłek posiada budowę niezwykłą, ukazuje się bowiem w postaci wielu oddzielnych bryłek, zbitości wosku, lub drobniejszych jeszcze i liczniejszych klinowatych ciałek, powiązanych w jedno za pomocą istoty lepkiej (fig. 557); innym razem nosi zwykleszą postać proszku, o ziarnach częstokroć skupionych jeszcze po cztery, tak jak się utworzyły w komórkach macierzystych. Przekonano się, iż we wszystkich tych przypadkach składa się on z ziarn zupełnie podobnych do zwykłego pyłku, i dających się od siebie oddzielić, lecz połączonych z sobą mniej więcej wietko za pomocą osobnej istoty. Pylnik podzielony jest na dwa woreczki (fig. 552), otwierające się od strony znamienia, a częstokroć każdy z nich podzielony jest jeszcze, za pomocą przegród wewnętrznych na wiele woreczków cząstkowych. Każdy woreczek ogólny, czy cząstkowy zawiera *pyłkowinę* (*massa pollinis* fig. 553, 557), czyli ciało powstałe ze zlepionych z sobą ziarn pyłku, o czém mówiliśmy dopiero. Mamy więc zawsze dwie pyłkowiny w pylniku, albo téż liczbę ich większą, lecz wielokrotną względem dwóch. Pyłkowiny bywają niekiedy zwężone u dołu w rodzaj trzoneczka (*caudicula* fig. 557 c), który czasami znowu kończy się małym, gruczołowatym ciałkiem (*wczepkiem* [*retinaculum*]), leżącym w *kieszonce* (*bursicula*) popod pylnikiem. Nie mogliśmy tu pominąć tych wszystkich szczegółów, ponieważ wiele plemion tej obszernej rodziny, ustanowiono właśnie podług tych różnych odmian; podług przyrodzenia pyłku, ilości pyłkowin, kształtu każdej z nich,

obecności trzoneczka opatrzonego uczepkiem lub nie, podług ogólnego kierunku pylnika i t. d. Ktoby zaś nie pragnął wdać się w rozbiór pojedynczych plemion, dosyć mu będzie pamiętać tylko, że w nich ma w ogóle do czynienia z jednym pylnikiem o dwóch woreczkach, z których każdy zawiera jedną lub więcej pyłkowni.

Co się tyczy zawiązka, ten daleko jest jednostajniejszy w całej rodzinie, zawsze skręcony około swój własnej osi, jakieśmy już powiedzieli, i zawierający jedną tylko komorę, która spólniczy za pomocą przewodu dość szerokiego ze środkiem powierzchni znamienia. Od przewodu tego aż do spodu zawiązka, ciągną się na ścianie wewnętrznej trzy łożyska podłużne, naprzeciwległe względem wewnętrznych podziałek okwiatu i obsadzone tysięcznymi zalążkami (fig. 551 g). Zawiązek zamienia się w torebkę, pękającą w szczególności, powyżej (§ 528, fig. 425) opisany sposób, tak, iż trzy łożyska pozostają, przytwierdzone u dołu do szypułki, u góry do okwiatu, trzy zaś ścianki pośrednie wypadają. Owoc wanilli, niepękający i miazdżysty, stanowi wyjątek od tego prawidła.

Nasiona nadzwyczaj liczne i drobne, zowią się *trocinowatemi* (*scobiformia*), przypominają bowiem z wejrzenia trociny. Przypatrując im się bliżej, spostrzegamy, iż zazwyczaj posiadają powłokę zewnętrzną wielką, wrzecionowato wydłużoną (fig. 555 t), drugą zaś daleko zbitszą, kulistą, lub jajowatą; pod tą znajduje się małe ciało komórkowe, napozór niepodzielone, lecz w którym za pomocą szkieł rozeznąć można mały dołeczek (fig. 556), otoczony brzegiem z boku nieco podniesionym. Z tego dołeczka wychodzi w czasie wschodzenia oś rośliny, co nam pozwala uważać wzniesiony ów brzeg za liścień, a dno dołeczka za pączuszek. Mamy tu więc znowu przypadek nadzwyczajnego rozwinięcia się łądyżki. Całe ciało zarodkowe zdaje się być podobnikiem główki, jaką znajdujemy przy korzeniach wielu storczykowatych zupełnie wykształconych. Główka ta wydaje łądygę roczną, następnie więdnije, a obok tworzy się inna na rok przyszły.

Prawdziwe korzenie są wiązkowe (fig. 125); łądygi pojedyncze lub gałęziste; liście proste, całobrzegie, o nerwach podłużnych wydatnych, niekiedy przy nasadzie stawowate, a w wielu zamorskich gatunkach nabrzmałe pod stawami w bryłkę mięsistą. Nasze storczykowate żyją na ziemi, w kra-

jach zaś zwrotnikowych, wiele jest gatunków żyjących na drzewach (*Orchideae epiphytae*), nie są one jednakże pasywnymi, lecz tylko wciskają się w szpary, dziuple lub kąty, i znajdują bez wątplenia w ziemi, na tych miejscach nagromadzonej dostateczną żywność; korzenie ich przyciągają największą część wilgoci z powietrza, z którym są w zetknięciu i którego zdają się najbardziej potrzebować. Dlatego też zwykło się hodować je w koszyczkach z poprzedziurawionymi ścianami, otaczając samą tylko niższą ich część mchem wilgotnym, lub bryłkami ziemi, pomiędzy którymi powietrze może wolno przechodzić. Wyjawszy wanilię, której owoc nieco mięsisty, zawiera pierwiastek nadzwyczaj przyjemnej woni i dostarcza też tak bardzo poszukiwanej przyprawy, żadna część storczykowatych nie znajduje zastosowania, prócz główek niektórych gatunków, używanych do przysposabiania pokarmu bardzo posilającego, zwanego *salepem*: jestto skrobia, bardzo obficie w nich się znajdująca, wraz z powłokami ją okrywającemi i pierwiastkiem podobnym do gummy a nazwanym *bassoryną*, który się gromadzi w małe jądra rogowate, rozrzucone w miąższości główek. Pomimo tak małego zastosowania, rośliny tej rodziny są nadzwyczaj poszukiwane dla piękności, a zarazem i dziwaczności swych kwiatów; hodowanie ich, wymagające cieplarni stało się prawdziwą modą w niektórych krajach; w spisach roślin wielu teraźniejszych ogrodów, znajdujemy przeszło 1500 obcych gatunków, gdy tymczasem Linneusz jeszcze znał ich zaledwie kilkanaście.

## ROŚLINY DWULIŚCIENNE.

§ 760. Rośliny dwuliścienne, stanowiące większą część jawnopłciowych, najwięcej nas tu zajmowały i najwięcej dostarczyły nam przykładów. Ogólne zatem ich piętna i główne szczegóły ich ustrojności zostały już powyżej opisane, a wiele rozdziałów im wyłącznie było poświęconych. Tak daliśmy poznać ich łodygi (§ 50—90, 332—345), korzenie (§ 118), liście (§ 128—140, 151), umiarowość kwiatu, odmiany zarodka (§ 29, 567—574), nasion, sposób ich wschodzenia (§ 594). Przegląd rodzin uzupełni poznanie ich piętn, dając nam sposobność okazania, w jaki sposób takowe rozmażają się i łączą z sobą, tudzież opisanie tych, któreśmy pominąć

mogli w wykładzie ogólnym. Po większej części, przestaniemy na pojęciach wyrażonych w tablicach, i tylko niektóre rodziny rozbierzemy bardziej szczegółowo; dla wielkiej bowiem ich liczby nie stałoby nam tu miejsca, a różnice pomiędzy nimi niezawsze ściągają się do punktów, nad któremibyśmy się tu zatrzymywać potrzebowali.

Przypomnieć należy, iż zatrzymujemy tu pierwszy i główny podział podany przez Jussieu'go, zmieniając jednakże nieco jego porządek; uważamy bowiem z kolei rośliny osobnoplciowe, bezpłatkowe, wielopłatkowe i jednopłatkowe.

ROŚLINY DWULIŚCIENNE OSOBNOPLCIOWE.

(Tablica V, str. 618).

§ 761. Z pomiędzy rodzin należących do tego oddziału, dwie szczególniej zwracały na siebie oddawna uwagę botaników, tak osobliwością ogólną swęj postawy, jako też niektórych pojedynczych narzędzi, a miejsce, jakie im się w układzie należy, oznaczone zostało dokładniej dopiero w skutek nowszych postrzeżeń i teoryj. Takimi są rodziny szyszkowych i sagowcowatych. Mówiąc o załączku, powiedzieliśmy, iż takowy zamknięty zazwyczaj bywa w zawiązku i okazaliśmy, że nasiona nazywane przez dawnych pisarzy nagiami, nie są takimi rzeczywiście, i przybierają tylko tę postać czasami, w skutek zrośnięcia się powłok nasiennych z owocem. Opisałiśmy załączki jako składające się z ciała środkowego czyli jądra, okrytego jedną lub dwiema powłózkami zrośniętymi z niem na jednym końcu, a zostawiającemi na drugim mały otworek. Tymczasem rozbiierając ciała, uważane w szyszkowych i sagowcowatych za zawiązki opatrzone szyjkami i znamionami, a podług niektórych nawet za zrośnięte z kielichem, nie znajdujemy w nich tych rozmaitych części, owszem zdają się one posiadać prostą tylko budowę załączków: jądro otoczone podwójną okrywą, u wierzchołka otwartą; wierzchołek ten jednakże przedłuża się tu bardziej (fig. 562, o) kończysto, naśladując poniekąd szyjkę; obwód zaś okienka załamując się, otwiera się niekiedy na podobieństwo znamienia. Tym sposobem znaleziono tu załączki wzniesione lub zawieszono i osadzone na łuskach mniej więcej płaskich, które ich nie okrywają nakształt nasiennika. Załączki te zatem są nagie, a rośliny,

które je posiadają nazwać można *nagoziarnowemi* (pl. *gymnospermae*, od γυμνός, nagi, σπέρμα, nasienie), gdy tymczasem wszystkie inne o zawiązkach zamkniętych, będą *okrytoziarnowemi* (*angiospermae*), od ἀγγείον, naczynie); obadwa nazwiska podał Linneusz, lecz niestosownie ich używał.

Piętna te narzędzi odrodczych, połączone z piętnami narzędzi roślinia, są bez wątpienia dosyć ważne, abyśmy ze względu na nie, odłączyli małą gromadkę roślin dwuliściennych nagoziarnowych, od wszystkich innych okrytoziarnowych. Nie uczyniliśmy tu tego jednakże, aby nie zmieniać raz ustanowionego porządku; zresztą zastosowując podział ten do samych tylko osobnopłciowych, miejsce dwóch tych rodzin nie zmieniłoby się przez to bynajmniej.

§ 762. Najsamprzód wspomnieć wypada o podobieństwie sagowcowatych z palmami, o podobieństwie, które jednak znika przy głębszym rozbiórze, ponieważ takowy przekonywa nas o obecności wielu słojuw drzewnych spółśrodkowych, chociaż powstających bardzo powoli, gdyż jeden z nich może być utworem wielu lat i wprowadzić przeto w błąd postrzegacza. Prócz tego podziałki liści są płaskie, nie zaś pozaginane jak w palmach.

§ 763. **Szyszkowe** (*Coniferae*). Do rodziny téj nieobejmującej ani jednego zioła, należą drzewa, znane szczególniej pod imieniem iglastych. Opisaliśmy (§ 7, fig. 33, 34) szczególne przyrodzenie ich włókien, opatrzonych dużemi, prawidłowo ułożonemi kropkami. Wyjawszy małą liczbę cewek wężownicowych, leżących w cewie rdzeniowej, całe zresztą drewno szyszkowych składa się z tych włókien, i za pomocą nich daje się z łatwością odróżnić od wszelkiego prawie innego drewna. Mniej znamionującym jest kształt liści, przedstawiających w sosnach, jodłach, modrzewiu i t. d., wązłutkie paseczki lub igielki (fig. 133); znajdujemy je bowiem szerszemi w innych rodzajach (*Araucaria*, *Cunninghamia*), a nawet w kształcie zwyczajnych blaszek (*Dammara*, *Gincko*). W wielu rodzajach gałązki są tak skrócone, że liście iglaste skupione zostają w wiązki, których dwie lub więcej z jednego punktu wychodzą się zdaje.

Kwiaty są oddzielno- lub rozdzielno-płciowe. Samce składają się z małych kotków (fig. 558) obsadzonych rozrzuconemi pylnikami, albo częścięj łuskami, na których siedzą poje-

dyneze lub liczne pylniki (fig. 559). Kotki te ułożone częstokroć bywają w kwiatostan wspólny, będący rodzajem skupionego



559.



561.



562.



558.



560.



563.



564.

kłosa. Każdy pylnik lub łuska nosząca pylniki, stanowi kwiat oddzielny. Samice sąto owe nagie zalążki, o których mówiliśmy, a które różnią się nieco w swęj postaci, i siedzą po jednemu, po dwa lub po więcej na każdej łusce (fig. 561, 562). Łuski noszące zalążki, ułożone są około wspólnej osi w szyszkę mniej więcej wydłużoną (fig. 430), której niekiedy dajemy

558—564. Narzędzia owocowania sosny pospolitej (*Pinus sylvestris*).

558. Skupienie kotków męzkich *c*.—*f* Liście.—*b* Pączek wierzchołkowy.

559. Kwiat męski czyli łuska nosząca na sobie pylniki, widziana zosobna.

560. Trzy grupy kwiatów żeńskich czyli młode szyszki *c*, siedzące na końcu gałązki.

561. Łuska odłączona od jednej z szyszek i widziana od zewnątrz.—*b* Przykwiatek.—*e* Łuska.—*oo* Wierzchołek zalążków.

562. Taż sama widziana od wewnątrz.—*e* Łuska.—*i* Punkt w którym przytwierdzona jest do osi.—*oo* Dwa zalążki nagie przewrócone.—*m* Otwór ich wyższy (*micropyle*), brany za zamię przez tych, którzy zalążek ten uważają za zawiązek.

563. Taż sama z szyszki dojrzałej.—*e* i *i* mają toż samo znaczenie.—*g* Jedno z nasion wraz ze skrzydelkiem swoim. Drugie zostało odjęte.

564. Nasiono przecięte wpopłuż.—*a* Nasada skrzydelka.—*t* Powłoka.—*p* Bielmo.—*e* Zarodek. Przy zarodku widać dwa małe ciałka, będące spłoniętymi zarodkami.

nazwę *szyszkojagody* (*galbulus*), jeśli jest bardzo krótką i składa się z niewielkiej liczby łusek (fig. 431). Innym razem wiele łusek układa się dachówkowato, nie nosząc na sobie załączków, lecz tworząc tym sposobem rodzaj pokrywy wspólnej około jednego albo najwięcej dwóch załączków, okrytych prócz tego mniej więcej miseczką.

Podług tych różnych odmian owocu, podzielić można rodzinę szyszkowych na wiele plemion albo raczej na wiele rodzin, a przeto uważać ją samą w takim razie raczej za gromadę. W *jadłowatych* (*Abietineae*) liczne łuski składają szyszkę, a każda z nich zrosnięta jest przy nasadzie z załączkami przewróconymi. W *cyprysowatych* (*Cupressineae*) mała ilość łuski tworzy szyszkojagodę, a każda z nich nosi na sobie załączki wolne, wzniesione. W *cisowatych* (*Taxineae*) miseczka otacza lub okrywa załączek, pręciki zaś są nagie; *Gnetaceae* posiadają także podobną miseczkę, każdy zaś pręcik otoczony jest rodzajem okwiatu; nadto łodygi ich są stawowate.

Nasiona szyszkowych (fig. 564) godne są uwagi z wielu względów; najsamprzód dla obecności w każdym z nich wielu niewykształconych zarodków, ułożonych w okrąg około jednego, który się należy rozwinąć; ta jednak wielość zarodków wydatniejszą jeszcze jest w sagowcowatych. Zarodek wykształcony zajmuje oś grubego, mięsistego bielna; widzieliśmy, iż często bywa wieloliścienny (§ 571, fig. 467); inném zaś rzadszém jeszcze piętnem jest, iż kończyzna kielka zrasta się z otaczającym ją bielmem, czego niema w sagowcowatych.

Widzimy do jakiego stopnia prostości zachodzą w gromadce téj narzędzia odrodcze, przywiedzione do samych tylko pylników i załączków, a niekiedy nawet do jednostki tylko takowych. U jednoliściennych narzędzia te nie są już prostsze, ani tak proste nawet, i dlatego powiedzieliśmy, że dwie te gałęzie jawnopłciowych, pod tym względem uważane, idą raczej równolegle od siebie, niż w szeregu postępowym.

Drzewo szyszkowych używaném bywa z korzyścią do wyrobów i budowli wszelkiego rodzaju. Winno ono zalety swe obfitości żywicy wydzielanej w jego tkankach, która mu udziela większego lub mniejszego stopnia nieprzepuszczalności wody, a tém samém czyni je trwałem. Żywica ta płynna w roślinach żyjących, zgęszcza się po ich śmierci, w skutek wyparowania olejków, które ją w sobie rozpuszczały. Znajdujemy ją


zaś we wszystkich częściach, nadewszystko zaś w wielkich przerwach prawidłowo ułożonych w korze. Różni się ona podług gatunków roślin, albo też miesza się z różnemi pierwiastkami, a według tych różnych stanów, przybiera nazwisko smoły, balsamów, terpentyny. Ztąd także pochodzi storaks i sandaraka. Żywice wywierają na ustroj zwierzęcy wpływ pobudzający, albo nawet drażniący, i z tego powodu znajdują zastosowanie w medycynie, która używa rozmaitych części lub różnych wytworów wielu gatunków należących do tej rodziny. Szyszkojagody jałowcu, niewłaściwie nazywane jagodami, dlatego, że łuski ich mięsiste zrastają się w ciało napozór pojedyncze, służą do wyrabiania pewnego napoju, który im bez wątpienia winien główny swój smak i niektóre własności, lecz do którego wchodzi wiele jeszcze innych naszych owoców, bogatszych w pierwiastki słodkie. Jądro owocu nie zawiera pierwiastków żywicznych; bywa ono słodkie i oleiste i jest jadalnym z gatunków, w których dochodzi znacznej objętości, a mianowicie z sosny włoskiej (*Pinus pinea*).

Sagowcowate zawierają także sok rozlany po całej ich tkance i nagromadzony w przerwach; nie jest on jednakże żywiczny, ale klejowaty i bez smaku.

§ 764. Zpomiedzy rodzin osobnopłciowych, okrytoziarnowych, kilka tu szczegółowięj przytoczymy.

Wiele z nich obejmowano dawnięj pod imieniem **kotkowych** (*Amentaceae*); łączyło je wspólne piętno kwiatów męzkich ułożonych w kotki; piętno to posiadają między innymi i orzechowate (*Juglandeae*), odznaczające się jednakkę liśćmi złożonemi, gdy tymczasem wszystkie inne posiadają liście proste. Rodziny te wraz z szyszkowemi, obejmują w sobie wszystkie prawie wielkie drzewa nasze, a gatunki ich stanowią nasze lasy. Tak w **brzozowatych** (*Betulineae*) widzimy olszę i brzozę; w **miseczkowych** (*Cupuliferae*) dąb, kasztan, buk, leszczynę i grab; w **wierzbowatych** (*Salicineae*) topolę i wierzbę; w **jaworowatych** (*Plataneae*) jawór; w **wiązowatych** (*Ulmaceae*) wiaz i obrostnica (*Celtis*); w **orzechowatych** (*Juglandeae*) orzech. Z **woskownicowatych** (*Myricaceae*) mamy u nas nizkie tylko krzewy, lecz na archipelagach azyatyckich znajdują się gatunki przypominające postawą swą niektóre z szyszkowych; do takich należy rzewnia (*casuarina*), stanowiąca wzór maleńkiej, przez niektórych pisarzy oddzielanej

rodziny. Użytki, jakie człowiek otrzymuje z tych roślin, bądź dla ich drewna, bądź dla pierwiastku garbnikowego kory wielu



z nich, bądź nakoniec dla nasion niektórych, zanadto są znane, abyśmy potrzebowali zastanawiać się nad nimi. Namienimy tylko, że nasiona wielu, jak np. kasztanu, buku, leszczyny, orzechu, zawierają skrobią i olej w różnym stosunku, i dlatego jedne z nich służą wyłącznie za pokarm, inne do otrzymania oleju, albo też do jednego i do drugiego użytku zarazem.

§ 765. Dawniejsze **pokrzywowate** (*Urticeae*) obejmowały w sobie także wiele rodzin dzisiaj poddzielanych. Do takich

565—571. Narzędzie owocowania jednej z miseczkowych, leszczyny (*Corylus avellana*).

565. Łuska *e* nosząca na sobie pylniki czyli kwiat męski, widziany zosobna.—*a* Pręciki.

566. Kwiat żeński *ff* bardzo młody wraz z pokrywą *z*.

567. Tenże sam nieco starszy; przez rozcięcie pokrywy *z* odsłoniętym został zawiązek *o*, otoczony w znacznej części kielichem *c*.—*s* Szyjka.

568. Tenże sam przecięty wpodłuż, dla pokazania dwóch komór zawiązka, wraz z zalążkiem zawieszonym w każdej z takowych.

569. Tenże sam jeszcze starszy.

570. Owoc dojrzały *f*, otoczony pokrywą *z*.

571. Nasiono odosobnione po odjęciu połowy powłok *t*, dla pokazania zarodka *e*.—*r* Kieltek.

należy rodzina zachowująca i dzisiaj toż samo imię, a której wzorem jest rodzaj pokrzywa (fig. 572, 577), znany ze skutków zakłócia włosami poprzednio opisanemi (§ 247, fig. 213). Skutki te są bez porównania silniejsze przy zakłóciu włosami wielu gatunków zwrotnikowych, zależą bowiem na powstaniu



572.



573.




574.



575.



576.



577.

gwałtownych i długotrwałych, a niekiedy, jak mówią, śmiertelnych zapaleń. 2. **Konopiowate** (*Cannabineae*), obejmujące między innymi chmiel, używany do wyrabiania piwa, które-

572—577. Narzędzia owocowania pokrzywy żegawki (*Urtica urens*).

572. Pąk kwiatu męskiego, widziany z góry.

573. Pręcik wzięty z pąka, dla pokazania zakrzywienia i budowy jego ruchomej nitki, tudzież pylnika przed pęknięciem tegoż.

574. Kwiat męski otwarty. — c Kielich. — eeee Pręciki wyprostowane i rozłożone, podzawiazkowe. — pr Zaród słupka środkowego.

575. Kwiat żeński. — c Kielich o listeczkach nierównych; dwa zewnętrzniejsze są daleko mniejsze. — o Zawiązek. — s Znamię bezszyszkowe.

576. Słupek przecięty pionowo, dla pokazania kierunku załazka o. — p Ściana zawiązka. — s Znamię.

577. Nasiono przecięte pionowo, równolegle (1) i prostopadle (2) względem liścieni. — t Powłoka. — h Znaczek. — p Bielmo. — e Zarodek.

mu użycza przyjemnego gorzkawego smaku, zależącego od pierwiastku żywicznego, zawartego w małych, żółtawych gruczołkach, pokrywających powierzchnię rośliny, a szczególnie kielicha, i stanowiących *gorycz chmielową* (*Lupulinum*) (§ 246); tu także należą konopie, tak użyteczne dla mocy włókien łykowych; moc ta jednakże jest przymiotem wielu innych roślin tej i poprzedniej rodziny, a mianowicie pokrzyw. Nasiona konopi znane są pod imieniem konopnego siemienia. Liście zawierają pierwiastek narkotyczny, nadzwyczaj silny; dlatego też używane bywają z konopi indyjskich do przyciotowania odurzającego pokarmu, zwanego *haszysz*, tak poszukiwanego w Egipcie i Arabii, o którym tyle dziwnych krąży powiastek, i od którego między innymi wywodzą źródłosłów wyrazu „*assassin*,” ponieważ „Starzec z góry” (le vieux de la Montagne), ów herszt umiejący znaleźć siepaczy do każdego zabójstwa przezeń zamierzonego, otrzymywał ślepe poddanie się swych zwolenników, ukazując im w odurzeniu haszyszem przedsmak niebiańskiej rozkoszy, jaką im obiecywał w nagrodę ich zgubnego posłuszeństwa. 3. **Chlebowcowate** (*Artocarpae*), do których należą dwie sławne pokarmowe rośliny; jedna z nich daje chleb, druga mleko zupełnie gotowe; pierwsza *chlebowiec* (*Artocarpus incisa*) czyli drzewo chlebowe; druga *mlekwiec* (*Galactodendrum*) czyli *krowie drzewo*, rosnące na Kordyllerach w Wenezueli; mieszkańcy tamtejsi otrzymują przez nacięcie tego drzewa, wielką ilość płynu białawego i gęstego, który posiada smak i inne niektóre własności prawdziwego mleka. Składa się on przeszło pół napół z wody, z małej ilości cukru i białka, i zawiera prócz tego wiele istoty tłustej, od której zależą, jak się zdaje, główne jego własności. Obecność obfitego i młecznego soku, jest własnością wspólną wielu innym roślinom téjże rodziny; lecz jeśli w jednych sok ten jest zdrowy albo przynajmniej nieszkodliwy, w innych staje się ostrym, a nawet jadowitym; tak, iż obok krowiego drzewa, z zadziwieniem widzimy jawańską roślinę *Antiaris* dającą *upas*, jedną z najsilniejszych trucizn, będącą przedmiotem wielu okropnych podań. Wprawdzie większa część takowych może być niepewną, lecz niepodobna wątpić o głównej własności tego jadu, zależącej od strychniny, alkołoidy dobrze zbadanej i doświadczonej w chemii i medycynie. 4. **Morwowe** (*Moreae*), zasługujące na uwagę z powodu niektó-

rych drzew, jak morwa i figa. Ostatni ten rodzaj zawiera mnóstwo gatunków, które podobnie jak wiele innych roślin tej samej rodziny, posiada sok mleczny zwykle bardzo ostry. Sok ten, równie jak w rodzinie poprzedzającej, ważny jest z przyczyny obecności szczególnego pierwiastku, używanego w przemyśle, a zwanego *kauczukiem*, który jednak dość często znajduje się w sokach mlecznych, pochodzących nawet z roślin wcale odmiennych rodzin. 5. **Wyskoczkowate** (*Gunneraceae*) i kilka jeszcze rodzajów służących za wzór małym osobnym rodzinom, lub rozproszonych po innych.

§ 766. Oddawna już oddzielono od pokrzywowatych rodzaj pieprzu, który wprzód do nich liczono, a który stał się wzorem nowej rodziny **pieprzowatych** (*Piperaceae*), dobrze znanych z powodu domowego i codziennego użytku pieprzu czarnego, będącego jednym z gatunków téjże rodziny. Inne gatunki posiadają także te same własności rozlane po różnych



częściach, jak tego dowodzą liście pieprzu *betel*, które dla drażniącego ich działania mieszkańcy różnych krajów Azji

578—582. Narzędzia owocowania pieprzu czarnego (*Piper nigrum*).

578. Część kłosa kwitnącego. — *e* Łuski, z których każdą towarzyszy dwom pylnikom; lub kwiaty męskie wokół słupka *o* czyli kwiatu żeńskiego.

579. Łuska odosobniona, widziana od wewnątrz.

580. Słupek odosobniony. — *o* Zawiązek. — *s* Znamię.

581. Kłos owocujący.

582. Przecięcie pionowe owocu. — *h* Punkt przytwierdzenia owocu i na sienia, a zatem odpowiadający znaczkowi. — *f* Nasiennik. — *s* Znamię. — *pe* Bielmo zewnętrzne. — *pi* Bielmo wewnętrzne czyli mięsisty woreczek, zawierający zarodek *e*.

z upodobaniem nieustannie żują. Lecz rośliny te bardziej zasługują na naszą uwagę, z powodu wielu szczegółów swęj ustrojności, jakoto z powodu wiązek włókno-naczynnych rozrzuconych w rdzeniu, które młodym łodygom nadają pozór łodyg jednoliściennych, tudzież z powodu obecności dwóch bielm, z których wewnętrzne ogranicza się jak w grzybieniu na małym mięsistym i trwałym woreczku, do którego zarodek przytwierdzony jest za pomocą wieszadełka. Woreczek ten zajmuje wierzchołek nasienia (fig. 582, *pi*), wypełnionego zresztą bielmem zewnętrznem *pe*, odznaczającem się obfitością pierwiastków ostrych i aromatycznych, a stanowiącém głównie część używaną. Na osi noszącej kwiaty, obok każdego owocoka, który uważa się za kwiat żeński, osadzone są pręciki w liczbie dwóch lub więcej, a każdy z nich uważany jest za kwiat męzki.

§ 767. Muszkatowcowate (*Myristiceae*) dostarczają innej, prawie równie znanęj przyprawy korzennęj, a tą jest *gałka muszkatolowa*, której bielmo zawiera w tkance swęj znaczną ilość oleju aromatycznego. Kora jednakże i nasiennik muszkatowcu napełnione są sokiem ostrym i lepkiem.

§ 768. Wzorem rodziny **dzbanecznikowatych** (*Nepentheae*) jest rodzaj dzbanecznik (*Nepenthes*), którego nerw główny przedłuża się ponad blaszkę, i nosi na sobie nowe rozszerzenie liściowate, wydrażone w dzbanuszek; do otworu tegoż przystaje rodzaj nakrywki, przytwierdzonej jakby na zawiasce i mogącej się wznosić lub zniżać, tak, iż dzbanuszek raz bywa przykryty, drugi raz odkryty. Znajdujemy go często napełnionym płynem wodnistym, który, jak się zdaje, wydzielany zostaje w jego wnętrzu.

§ 769. Zakończymy niniejsze przytaczania wymienieniem kilku szczególnych rodzin, których gatunki żyjąc pasożytnie na korzeniach innych roślin, zaledwie wznoszą się ponad ziemię, i nie mają innych liści prócz łusk, a niekiedy pozbawione są wcale łodygi. Jedna z takich roślin morzyczystek (*Cytinus*), żyje na czystkach (*Cistus*) w południowej Europie. Najciekawszą jednakże z nich jest wieszczyniec (*Rafflesia*), którego kwiaty otwierają się na równi z ziemią. Kwiat gatunku najpierw odkrytego, a będącego prawdziwym olbrzymem państwa roślin, wprowadził na czas niejaki w kłopot postrzegaczów, którzy nie wiedzieli za co mają uważać przedmiot,

jaki się ich oczom przedstawił. Siedząc na krótkiej podziemnej łodydze, jakby wszczepionej w łodygę winobluszczu (*Cissus*), kwiat ten miał średnicy około metra; łatwo pojąć, że rozwinięcie części, powiększając nazbyt i uwydatniając najmniejsze ich szczegóły, czyniło je tém samém prawie niepodobnemi do poznania. Umiejętne badanie tego, a następnie i innych gatunków posiadających wymiary mniej niezwykle, dało poznać należyte te rośliny, odznaczające się nie samą tylko postacią, ale i innemi uderzającymi piętami, jakoto: sposobem pękania pylników, które otwierają się u wierzchołka małą dziurką, wspólną niekiedy licznym cząstkowym woreczkom, jakie się w każdym pylniku znajdują; dalej łożyskami noszącymi drobne nasionka, które przytwierdzone do ścian, odłączają się od nich i wiszą wolne w komorze, lub wznoszą się ze spodu jęj ku wierzchołkowi zarodkiem niepodzielonym, jaki zresztą napotkać można dość często w roślinach pasżytych nakorzeniowych, pozbawionych liści, co też nam łatwo tłumaczy nieobecność liści.

Rodziny te stanowią przejście do *kokornakowatych* (*Aristolochiaceae*); przywiedliśmy je tu więc dlatego tylko przed innemi osobnopłciowemi o podwójnym okwiecie, o których nam jeszcze mówić wypada, że te ostatnie umieszczamy tu raczej z powodu układczygo związku łączącego je na tablicach naszych z innemi, nie dla prawdziwego powinowactwa, któreby im bez wątpienia inne miejsce wskazało.

§ 770. Tak np. wielu pisarzy sądzi, że **ostromlęczowate** (*Euphorbiaceae*) powinny się mieścić pomiędzy wielopłatkowemi podzawiazkowemi, w bliskości ślazuwatyh i rutowatyh, co zresztą może być słuszném, jeśli brać będziemy pod uwagę same tylko rodzaje ich opatrzone wyraźnemi płatkami. Lecz widzimy na tablicy V, że do rodziny tój przyszlśmy także z drugiej strony, z powodu istnienia kwiatów o okwiecie pojedynczym lub nawet żadnym. Przyczyną tego jest, że w istocie rodzina ta przedstawia niezmierną rozmaiłość pod względem składu kwiatów, które w jednych rodzajach prawie zupełne (np. w obrzydciu, fig. 251), zstępują stopniowo w innych, aż na-ostatni szczebel (np. ostromlęcz, fig. 256, 583, 584, 585). Wprawdzie dość często zdarza się napotkać w jednej i tój samej rodzinie niektóre rodzaje zupełniejsze od drugich; są one zawsze dla pewnych istotnych pięt członka-

mi tej rodziny, ale członkami zubożaleni, poniżonemi i źle ją przedstawiającemi: w takich razach chcąc oznaczyć prawdziwy wzór rodziny, zmieniony w niektórych rodzajach z po-



wodu zmniejszenia liczby części kwiatowych, udawać się musimy do rodzajów innych, zupełniejszych. Lecz w ostromléczowatych wzór ten przechowuje się tylko w mniejszości rodzajów, większa zaś ich część, a szczególnież obszerny rodzaj ostromléczu, od którego rodzina bierze swoje nazwisko, przedstawia w kwiecie swym nadzwyczajną prostotę, tak, iż niekiedy cały kwiatostan podobnym jest do pojedynczego kwiatu (§ 385, fig. 583), co rośliny te zbliża do wielu kolkowych i pokrzywowatych. Jakiekolwiek bądź, miejsce ostatecznie naznaczmy ostromléczowatym, przypadającym niżej dla prostej budowy większej części rodzajów, wyżej zaś dla budowy kilku

583—589. Narzędzia owocowania ostromléczu błotnego (*Euphorbia palustris*).

583. Kwiatostan, którego pokrywa *i* rozcięta została i rozpostarta, dla pokazania położenia kwiatów nią objętych. — *gg* Łaty gruczołowate, leżące naprzemian z podziałkami. — *b* Blaszki błoniaste czyli przykwiatki. — *fm*, *fn* Kwiaty męskie złożone z pojedynczych pręcików. — *ff* Kwiat żeński środkowy.

584. Kwiat męski odosobniony. — *b* Przykwiatek. — *p* Szypułeczka. — *f* Nitka połączona stawem z szypułeczką. — *a* Pylnek.

585. Kwiat żeński. — *p* Wierzchołek szypułeczki, na której takowy siedzi. — *c* Kielich. — *o* Zawiązek. — *s* Znamiona.

586. Guzik *e* odosobniony, widziany od strony wewnętrznej. Przez otwór przepuszczający naczynia żywiące widać nasiono *g*.

587. Guzik odosobniony po pęknięciu i wyjściu nasiona.

588. Nasiono.

589. Toż samo przecięte pionowo. — *t* Powłoka. — *p* Bielmo. — *e* Zarodek.

z nich, których kwiat jest daleko złożęnszym, łatwo jednakże znaleźć będzie można nieznaczne przejście jednych do drugich, a prócz tego wszystkie połączone są kilką wspólnemi piętny, jakoto stałym odłączeniem pręcików i słupków w osobne kwiaty; podzawiazkowym osadzeniem pręcików, bądź oddzielnych, bądź zrosniętych; zawiązkiem wolnym o wielu komorach zawierających jeden albo najwięcej dwa zalążki zawieszony na wewnętrznym kącie każdej z nich; komorami zazwyczaj trzema, oddzielającemi się w dojrzałym owocu w tyleż guzików (fig. 586, 587); nakoniec obecnością bielma grubego, mięsistego, oleistego, otaczającego zarodek o kielku górnym i o liścieniach szerokich i spłaszczonych (fig. 589). Postawa ich jest nadzwyczaj rozmaita, poczynszy od drzew wyniosłych, aż do niziutkich ziółtek. Niektóre afrykańskie gatunki ostromléczu przypominają zupełnie kształt cierńców.

Wiele roślin téj rodziny, a osobliwie gatunki głównego jéj rodzaju, zawierają sok właściwy, mléczny i ostry. W nimto szczególniej zdaje się przebywać pierwiastek nadający ostromléczowatym jednakowe własności, które jednakże nie w jednakowym stopniu okazują się w różnych gatunkach, tak, że jedne z tych sprawują lekkie tylko drażnienie, inne zaś wywołują mocne zapalenie, a nawet działają jak gwałtowne trucizny. Różne zatem części, w których naczynia właściwe obficie się znajdują, jakoto: korzeń, liście, a szczególniej kora, wywierają silny wpływ na ustrój zwierzęcy; ale i nasiona znajdują się w tym samym przypadku. Względem tych ostatnich zrobiono ważną uwagę, że części ich niejednakowe posiadają własności, że w zarodku, a osobliwie w kielku, własności te daleko są silniejsze niż w bielmie. Nierówne to rozdzielenie pierwiastków najdziałalniejszych po różnych częściach jednéj i téj saméj rośliny, tłumaczy nam sprzeczność wypadków, do jakich często prowadziły doświadczenia, przy których nie zwracano uwagi, na jakich częściach były robione. Medycyna korzystała z tych własności ostromléczowatych, otrzymując z nich lekarstwa sprawujące wymioty (np. z korzeni gatunku *Euphorbia ipecacuanha*), a częściéj jeszcze czyszczące; lecz sok właściwy, zgęszczony, brany z niektórych mięsistych gatunków ostromléczu, zaniedbany został oddawna, jako niebezpieczny, a natomiast używa się teraz olejów otrzymanych z nasion; tak np. z nasion rącznika (*Ricinus*), jeśli chcemy

wywołać działanie łagodne; krocieniu zaś (*Croton tiglium*), jeśli takowe ma być nadzwyczaj silném. Dla podobnych własności gatunki obrzydłcu (*Jatropha*), otrzymały we Francyi nazwisko *médiciniers*.


Szczególniejszą jest, iż prócz lekarstw, a nawet silnych trucizn, znajdujemy obok roślin powyższych, sąsiedni im rodzaj *Jatropha*, który dostarcza wyborczego pokarmu, jakim jest mąka zwana *maniokiem* albo *kassawą*, używana od znacznej części ludności Ameryki południowej. Sprzeczność jednakże ta jest tylko pozorną; gruby i mięsisty korzeń, z którego otrzymuje się mąka, byłby bardzo szkodliwym, gdyby go używano na surowo, a mlecz w nim zawarty, zrządzziłby straszliwe skutki, i śmierć nawet gwałtowną. Lecz gotowanie niszczy pierwiastek jadowity, dlatego też chcąc użyć korzenia tego za pokarm, uciera się go, odcedza, przemywa i wystawia na działanie ognia na żelaznej blasze. Przy przemywaniu opada nadzwyczaj czysta skrobia, zwana *tapioką*.

Zpomędzy drzew tej rodziny, przytaczano częstokroć jabłusznik (*Hippomane mancinella*), jako gatunek posiadający najwyższy stopień jadowitych własności ostromlęczowatych, ponieważ sam jego cień miał być śmiertelnym dla niebacznych, którzy w nim spocząć chcieli. Fakt ten nie był nigdy należycie stwierdzonym, a doświadczenia czynione przez odważnych podróżników, nie wydały żadnego skutku; to jednak nie rozstrzyga wcale pytania, podobnie jak każdy wypadek czysto odjemny. Ponieważ pierwiastek, od którego własności te zależą, jest lotnym, jak tego między innymi dowodzić się zdaje zniszczenie go w manjoku przez gotowanie, jasną więc jest rzeczą, iż według różnych okoliczności meteorycznych, powietrze około jabłuszniaku, może nim być w różnym stopniu nasycone, jeśli go tylko rzeczywiście kiedykolwiek zawiera. Cóżkolwiekbydz mlecz tego drzewa posiada w sobie niezaprzeczenie rzezony pierwiastek.

Kauczuk, który jakeśmy widzieli, istnieje w soku fig, znajduje się także w niektórych ostromlęczowatych, a szczególnie w syfonii (*Siphonia elastica*), drzewie gujany, uważaném nawet za najobfitsze źródło tej istoty. Inne gatunki nieposiadające mleczu, zawierają pierwiastek barwny: lakmus, któryśmy już napotkali w innéj, całkiem różnej rodzinie porostów, zkad też szczególnie otrzymywanym bywa. Długi czas uży-

wano do tego małej roślinki, pospolitej na południu Francyi, nazwanej *Crozophora tinctoria*.

§ 771. **Tykwowate** (*Cucurbitaceae*) oddalają się bez wątplenia bardziej niż poprzedzające od wszystkich w tym oddziale wyliczonych rodzin, i powinnyby raczej mieścić się



pomiędzy wielopłatkowemi kołozwiązkowemi, obok męcznicowatych i oźwiowatych, chociaż kwiaty ich są osobnopłciowe i chociaż okwiat ich wewnętrzny, jeśli istnieje nie jest prawdziwą koroną i nie dzieli się na wyraźne płatki. Dosyć

590—595. Narzędzia owocowania ogórka (*Cucumis sativus*).

590. Kwiat męski którego okrywy zostały rozcięte wzdłuż i oddalone, dla pokazania wnętrza. — c Kielich. — p Kielich wewnętrzny, barwy czyli korona. — e Pręciki kołozwiązkowe.

591. Pręcik odosobniony. — f Nitka. — a Pylnek.

592. Kwiat żeński. — co Kielich zrosnięty z zawiązką. — p Korona. — s Znamiona.


593. Przecięcie poziome zawiązki, pokazujące trzy komory tegoż i osadzenie ścienne zalążków.

594. Nasiono przecięte pionowo. — t Powłoka nabrzmiała przy osadzie c. — e Zarodek.

595. Zarodek odosobniony. — r Kielek. — c Liścienie.

ROŚLINY DWULIŚCIENNE  
o kwiatach obojętnych bezpłatkowych.

Zarodek	prosty, zajmujący os nasienia w bielmie mięsistém lub bezbielmowy.....1.		
1.-Zawiązek	w okrągległy, na boku lub około bielma mączystego. Ułożyszcznienie środkowe.....2.		
1.-Zawiązek	zrośnięty	3-6 komór. Zalążki liczne na łożyskach kątnych. Zarodek bardzo krótki w końcu dużego mięsistego bielma. Pręciki w liczbie 6-12, nazawiazkowe.....	KOKORNAKOWATE ( <i>Aristolochiaceae</i> ).
		1 komora. Zalążki nieliczne	SANDAŁOWCOWATE ( <i>Santalaceae</i> ).
		u wierzchołka łożyska środkowego, wzniesionego. Nasiona opatrzone bielmem. liścienie krótkie i płaskie. Pręciki kołozawiazkowe; ilość ich równa ilości części kielicha.....	KOŃCZATKOWATE ( <i>Myrobalanaceae</i> v. <i>Terminaliaceae</i> ).
		zawieszzone u wierzchołka komory. Nasiona bezbielmowe; liścienie długie, liściowate, zwinięte. Pręciki kołozawiazkowe, dwa razy liczniejsze od części kielicha.....	BRZOWCOWATE ( <i>Samydaeae</i> ).
wolny. Zarodek	wsteczległy. Bielmo duże. Lupiny liczne, równie jak łożyska ściennie naprzeciw nich leżące, wielozarnowe. Pręciki jednowiazkowe, w podwójnej liczbie względem części kielicha. Niekiedy przysadki naprzemianległe względem pręcików.....		OREODRZEWOWATE ( <i>Aquilariaceae</i> ).
	Bielmo żadne, 2 lupiny i tyleż łożysk naprzeciwległych, ściennych. Pręciki w podwójnej lub jednokowej ilości z częściami kielicha. Przysadki naprzemianległe względem pręcików.....		KLEJOWNICOWATE ( <i>Peneaceae</i> ).
	wprostległy	4 komory 2 ziarnowe. Nasiona wstępujące. Kielich brzochny, 4-wrębny. Tyleż pręcików naprzemianległych.....	SREBRNIKOWATE ( <i>Proteaceae</i> ).
	1. Komora. Nasiona bezbielmowe	1-2 wzniesione. Kielek dolny. Kielich 4-dzielny; tyleż pręcików naprzeciwległych, osadzonych u góry podziałek.....	
		1. zawieszzone. Kielek górny. Kielich 4-6-dzielny. Pręciki w liczbie podwójnej lub potrójnej, otwierające się lupinkami.....	WAWRZYNOWATE ( <i>Laurineae</i> ).
		urkowaty. Pręciki w liczbie podwójnej równej lub dwa razy mniejszej otwierające się szparami.....	WAWRZYNKOWATE ( <i>Daphnoideae</i> <i>Thymeleae</i> ).
	opatrzone bielmem	1. zawieszzone. Kielek górny.....	PRZEWIERZBIOWATE ( <i>Eleagneae</i> ).
		1. wzniesione. Kielek dolny. Kielich okrywający zawiązek. Pręciki w liczbie równej częściom kielicha, otwierające się szparami.....	ALKERMESOWATE ( <i>Phytolacceae</i> ).
2. Komory.	Liczne, jednoziarnowe z tyłu oddzielnymi szyjkami, kielich zielny lub barwny, 4-5-dzielny. Pręcików tyleż, naprzeciwległych, lub więcej.....		RDESTOWATE ( <i>Polygoneae</i> ).
Jedna. Zarodek	boczny, nieco tyle skrzywiony, wsteczległy, o kielku górnym. Kielich zielny lub barwny, 3-4-5-6-dzielny. Pręcików tyleż lub więcej. Szyjek 2-4.....		CZERWCOWATE ( <i>Selerantheae</i> ).
	obrączkowany lub zwinięty w węzownię.	Pokrywa żadna. Kielich rurkowaty, stwardniały, 4-5 zębny. Pręciki kołozawiazkowe, w równej, mniejszej lub większej liczbie. Nasiono 1. Szyjek 1-2. 3-5 dzielny, zielny. Tyleż pręcików naprzeciwległych. Nasiono 1. Znamion oddzielnych 4-5. 3-5 dzielny suchy, opatrzone 2 przykwiateczkami. Pręcików albo tyleż naprzeciwległych, albo dwa razy tyle; z tych naprzeciwległe płonne. Nasiona pojedyncze lub liczne. Szyjka pojedyncza. Znamie pojedyncze lub latowe.....	EOBODOWATE ( <i>Atriplicineae</i> ).
		Pokrywa 1-wielokwiatowa. Kielich rurkowaty, oplatkowaty, którego spodnia część twardziej okrywa owoc. Kraj 4-10-dzielny. Pręciki podzawiazkowe w równej, mniejszej lub większej liczbie. Nasiono 1. Szyjka i znamie pojedyncze.....	SZARŁATOWATE ( <i>Amarantheae</i> ).
			NOCNIKOWATE ( <i>Nyctagineae</i> ).



jest p  
citr  
rus)  
rodzi  
ją sk  
czolg  
nerw  
nale  
cie.  
pięci  
okry  
ta no  
rozs  
(fig.  
tach  
592)  
nych  
tak,  
wzno  
znam  
nie o  
ogron  
ty, ja  
szcz  
bezb  
§  
dopie  
cego  
wiasi  
wody  
pienia  
  
§  
trzy  
wiąz

jest przytoczyć melon (*Cucumis melo*), arbuż (*Cucurbita citrullus*), dynię (*Cucurbita Pepo*), ogórek (*Cucumis sativus*), aby tém samém dać wyobrażenie i o pokarmach, jakich rodzina ta dostarcza człowiekowi, i ogólnej postawie roślin ją składających. Któż bowiem nie zna ich łodyg zielnych, czołgających się i pnących, opatrzonych liśćmi dłoniastonerwowemi, i ładowemi, tudzież ich wąsów, o których sądzić należy iż siedzą wyjątkowo obok ogonka nie zaś w jego kącie. W kwiecie, niekiedy bardzo wielkim, kielich zakończony pięciu zębami, podwojony jest czasami od wewnątrz drugą okrywą, która jak się zdaje, do niego także należy. Okrywa ta nosi na sobie w kwiatach męzkich pięć pręcików o nitkach rozszerzonych, opatrzonych pylnikami wężykowato pogiętym (fig. 591), skupionych częstokroć po trzy (fig. 590). W kwiatach żeńskich zawiązek zrasta się zupełnie z kielichem (fig. 592); zalążki jego osadzone są na trzech łożyskach ściennych, mięsistych i wystających wewnątrz komory (fig. 593), tak, iż ją prawie całkowicie wypełniają; ponad zawiązkiem wznosi się krótka szyjka, opatrzona grubém i axamitowatém znamieniem. Przytoczone przykłady pokazują nam przyrodzenie owocu, który czasami bardzo mały, innemi razy dochodzi ogromnych wymiarów i przybiera częstokroć dziwaczne kształty, jak np. w tykwach (*Cucurbita lagenä*). Liczne i splecione nasiona, zawierają pod skórką korowatą, zarodek bezbielmowy, zwrócony kielkiem ku znaczkowi (fig. 594, 595).

§ 772. Jadalnym także jest, lubo zazwyczaj po ugotowaniu dopiero, owoc mięsisty figowcu (*Carica papaya*), stanowiącego wzór maleńkiej sąsiedniej rodziny, która pochodzi pierwotnie z południowej Ameryki. Owoc ten zawiera oprócz wody i nieco oleju, znaczną ilość włókniaka, któremu bez wątpienia winien swe pożywne własności.

#### ROŚLINY DWULIŚCIENNE.


##### O kwiatach obupłciowych bezpłatkowych.

(Tablica VI, str. 632).

§ 773. Wiemy, iż Jussieu dzielił rośliny bezpłatkowe na trzy gromady, na: pręciko-nazawiązkowe, pręciko-kołoziawiązkowe i pręciko-podzawiązkowe. Z rodzin wyliczonych na

tablicy VI, pierwsza składa sama jedna pierwszą gromadę, dwie ostatnie odnosiły się do gromady trzeciej, wszystkie zaś inne do drugiej. W tablicy naszej nie poszliśmy za tym podziałem, ponieważ, lubo pręciki w większej części tych rodzin osadzone są wyraźnie koło zawiązka, osadzenie to jednakże staje się mniej widocznym w rdestowatych, a szczególnie w łobodowatych i alkiermesowatych, gdzie przechodzi niekiedy w podzawiązkowe, i zasługuje na to ostatnie imię równie jak w dwóch następnych rodzinach, które prócz tego z powyższymi związane są w grupę bardzo przyrodzoną i odznaczającą się szczególną budową nasienia. Uważać należy, że w częściach kwiatów rodzin bezpłatkowych, bardzo często znajdujemy liczbę inną jak 5: częstokroć liczbę 3, która właściwsza jest jednoliściennym.

§ 774. **Kokornakowate** (*Aristolochiaee*). Rośliny te odznaczają się wielu piętnami, a mianowicie osadzeniem pręcików wyraźnie niezawiązkowem (co jest przypadkiem dość rzadkim), tudzież trójkową liczbą części kwiatowych. Kielich zrosnięty z zawiązkiem (fig. 595) przedłuża się nad nim w rurkę, częstokroć wzdętą, zakończoną trzema podziałkami, bądź równymi, bądź nierównymi, o przedkwitnieniu łąpinowatém. Ten kraj kielicha posiada często dość żywe barwy i dochodzi niekiedy tak znacznych wymiarów, iż kwiat jednego z gatunków amerykańskich, dzieci kładą sobie na głowę nakształt czapki. Pręciki w liczbie 6—12, rzadko więcej, składają się z pylników prawie beznitkowych, i siedzą na krążku obręczkowanym nazawiązkowym, albo też zrosnięte są z nasadą szyjki, z którą przeto zdają się tworzyć jedno ciało (fig. 599). Szyjka krótka, pieńkowata, uwieńczona znamieniem podzielonem na 6, 4 lub 3 promienie, wznosi się nad zawiązkiem zawierającym tyleż komór; w każdej z tych znajduje się mnóstwo załączków wstępujących lub poziomych, przytwierdzonych jednym, lub dwoma rzędami w kącie wewnętrznym. Zawiązek przechodzi w owoc mięsisty, lub częścię torebkowatą (fig. 601) spłaszczony lub graniasty. U wierzchołka dużego, mięsistego, lub nieco rogowatego bielma, leży maleńki, prosty zarodek, którego kielek dłuższy od liścieni, zwrócony jest ku znaczkowi (fig. 603). Łodygi są zielne lub krzewiaste, a w tym ostatnim razie często pnące się i posiadające budowę wyjątkową, opisaną w § 84, która tak często daje się spostrze-



596—604. Narzędzia owocowania jednego z kokornaków (*Aristolochia clematidis*).

596. Kwiat cały. — *o* Część kielicha zrosnięta z zawiązkiem. — *t* Część wyższa jego rurki u dołu wydętej. — *l* Kraj przedłużony z boku w języczek.

597. Zarys tegoż kwiatu.

598. Część niższa kwiatu przecięta pionowo. — *o* Zawiązek. — *s* Znamię. — *a* Pylniki. — *c* Wydętość rurki kielicha.

599. Znamię *s* wraz z pylnikami *aa*, siedzącymi po parze na jego łatach. — *o* Wierzchołek zawiązka. — *c* Wydętość rurki kielicha.

600. Przekięcie poziome zawiązka.

601. Owoc dojrzały.

602. Nasiono.

603. Toż samo przecięte pionowo. — *t* Powłoka zgrubiała od strony osadki. — *p* Bielmo. — *e* Zarodek.

604. Zarodek odosobniony.

gać w łodygach tego rodzaju. Liście naprzemianległe, proste, czestokroć opatrzone dwoma dużemi przylistkami, zrastającymi się w jeden, po drugiej stronie łodygi. Korzenie są gorzkie i posiadają własności wzmacniające i pobudzające, dlatego wiele z nich używa się w medycynie; tu wymienimy tylko wężowiec (*Serpentaria*).

§ 775. Przytoczymy tu jeszcze kilka innych rodzin, jakoto: 1° **Sandałowate** (*Santalaceae*), pomiędzy któremi znajduje się tak wysoko cenione drzewo, zwane *sandałem*. Na szczególną uwagę zasługuje pewien wcale wyjątkowy punkt w rozwijaniu się ich załączka. Z głębi jedynéj komory wznosi się oś środkowa, u wierzchołka której zawieszono są mnogie załączki, złożone z samego tylko nagiego jądra. Z pomiędzy nich jeden tylko się rozwija; jądro jego rozdziera się w skutek wzrastania wreczka zarodkowego, który wydłuża się na zewnątrz i sam tylko dalej się wykształca, tworząc tym sposobem powłoczkę zewnętrzną nasienia.

§ 776. 2° **Srebrnikowate** (*Proteaceae*), których cztery podziałki kielichowe, mniej więcej głębokie, noszą na sobie zazwyczaj po jednym pręciku, osadzonym wyżej lub niżej na ich wewnętrznej powierzchni. Jestto dość rzadki rozkład pręcików kołożawiazkowych, które zwykle wyrastają z rurki, to jest popod linią, do której dochodzą wcięcia kraju.

§ 777. 3° **Wawrzynkowate** (*Daphnoideae* v. *Thymeleaceae*); w tych przysadki błoniaste, osadzone czestokroć u góry rurki kielicha, pomiędzy podziałkami tegoż, stanowią niejako ślad płatków. Kora ich odznacza się w dwojakim względzie: raz nadzwyczajną mocą włókien łyka, dla której niepodobna w wielu gatunkach oderwać gałęzi, i dla której też włókna używane bywają do wyrabiania powrozów; w *Daphne lagetto* warstwy łyka oddzielają się słojami spółśrodkowemi, cienkimi i przedstawiającemi kształtną siatkę, ztąd roślina ta nazwana została drzewem koronkowym; powtóre: nadzwyczajną ostrością swych soków, działających na skórę nakształt weżykatoryi; dla własności téj kora jednego z najpospolitszych gatunków, wilczego łyka (*Daphne mezereum*), używana jest w medycynie.

§ 778. 4° **Wawrzynowate** (*Laurineae*), których pylniki pękają łupinkami w sposób wyżej opisany (§ 440, fig. 316), i zawierają niekiedy 4 wreczki, po dwa nad sobą leżące (fig. 609); jestto przypadek nadzwyczaj rzadki. Kielich ma

4—6 podziałek (fig. 605), ułożonych naprzemian w dwóch okręgach; nosi on na sobie pręciki naprzeciwległe w liczbie dwa razy większej, a przeto osadzone w cztery okręgi. Pręciki okręgów wewnętrznych bywają częstokroć płonne; jeśli



zaś opatrzone są pylnikami, te są odwrócone i pękają na zewnątrz; przeciwnie zaś w okręgach zewnętrznych pręciki są obrócone i pękają na wewnątrz. Zawiązek zakończony szyjką i znamieniem pojedynczym zawierający jedną komorę, w której wisi jeden lub dwa zalążki (fig. 607 o). Owoc mięsisty; zarodek bezbielmowy, pomiędzy grubemi liścieniami którego

605—611. Narzędzia owocowania cynamonu (*Laurus cinnamomum*).

605. Kwiat cały.

606. Jego zarys.

607. Kwiat przecięty pionowo.—c Kielich.—ef Pręciki płodne.—es Pręciki płonne.—o Zawiązek wraz z komorą i zalążkiem zawieszonym.—s Szyjka i znamię.

608. Pręcik odosobniony.—f Nitka opatrzona przy nasadzie dwoma ciałkami gruczołowatemi gg.—a Pylnik.

609. Pylnik widziany z boku w chwili otworzenia się.


610. Owoc wraz z kielichem trwałym.

611. Tenże sam po odjęciu kielicha przecięty pionowo.—p Nasiennik.—t Powłoka nasienna.—e Zarodek.

ukryty jest krótki kielek górny (fig. 611), oto są inne piętna tej rodziny, złożonej z drzew, częstokroć bardzo wielkich: Najznajomszym z pomiędzy nich jest bez wątpienia wawrzyn właściwy (*Laurus nobilis*), tak dlatego, iż rośnie już na południu Europy, jak z powodu wieńców zwyciężkich, których od najdawniejszych czasów dostarczał; dzisiaj występuje on tylko w przenośnej mowie. Z innych wszelako ciągniemy użytki bardziej rzeczywiste, otrzymujemy bowiem z nich wyborną przyprawę korzenną, cynamon. Jestto kora różnych gatunków, mianowicie wawrzynu cynamonowego (*Laurus cinnamomum*), której własności zależą od olejku, znajdującego się także lubo nie tak obficie, w innych częściach i w innych roślinach tej samej rodziny. Obok tego znajdujemy w nich kamforę, której obecność w roślinach bogatych w olejki, jest faktem stwierdzonym i na innych rodzinach. Co do wawrzynowatych, najobficiej ją znajdujemy w wawrzynie kamforowym (*Laurus camphora*). Istnieje także w tkankach wawrzynowatych olej stały, niekiedy dosyć ostry, lecz który w jednym z najwyborniejszych owoców zwrotnikowych (*Laurus persea*) jest słodki i bardzo obfity.

§ 779. 5<sup>o</sup> **Rdestowate** (*Polygoneae*). Sąto po większej części rośliny zielne, o liściach naprzemianległych, odwiniętych na zewnątrz w przedkwitnieniu i których szczególne, w pochwę (*gałkę* [*ochrea*]) zrosnięte przylistki, opisaliśmy wyżej (§ 145, fig. 127). Liczba podziałek kielicha jest piętkowa (fig. 613) lub trójkowa; takowe osadzone są we dwa okręgi; pręciki siedzące ku ich nasadzie, są względem nich naprzeciwległe, co do liczby zaś albo równe, albo od nich liczniejsze; w ostatnim razie ułożone są we dwa okręgi, z których wewnętrzny jest niezupełny: nadto pylniki jego są, jak w wawrzynowatych odwrócone, w okręgu zaś zewnętrznym obrócone (fig. 613). Zawiązek uwieńczony 2, 3 lub 4 szyjkami, wolnemi lub zrosniętymi, niekiedy nadzwyczaj krótkiemi, i noszącymi na sobie znamiona pojedyncze lub pierzaste, posiada od zewnątrz tyleż krawędzi wydatnych. W jednej jego komorze znajdujemy jeden wzniesiony zalążek (fig. 612 o). Zawiązek przechodzi w ziarnczak lub niełupkę; a w nasieniu zarodek prosty lub łukowaty, odrzucony na bok bielma mączystego, obraca kielek w górę; to jest w stronę przeciwną znaczkwowi (fig. 614). Mąka tego bielma z tatarki (*Polygonum*

*fagopyrum*) i kilku innych gatunków, używana jest za pokarm dla ludzi i zwierząt. Jadalnemi są także liście i młode pędy



różnych gatunków szczawiu (*Rumex*) i rabarbaru (*Rheum*). Obfitość kwasu szczawiowego, używa im przyjemnego kwaśnego smaku. Korzenie jednakże, w których prócz tego znajdują się pierwiastki żywiczne, gumowe i ściągające, posiadają inne własności, którym bez wątplenia przypisać należy znajome czyszczące, a zarazem i wzmacniające ich skutki, szczególnież zaś w rabarbarze.


§ 780. 6° Nocnicowate (*Nyctagineae*). Opisałismy w § 530 (fig. 427) owoc i nasienie dziwaczku (*Mirabilis jalappa*), który jest wzorem tej rodziny; widzieliśmy, że spód kielicha stwardniałego, okrywa ów owoc i wchodzi poniekąd do jego składu (fig. 620). Wprzód zaś z części górnej zielonej i zwężonej tej nasady kielicha, wznosił się kraj wypłaszczonej i barwny (fig. 616 *t*), oddzielający się następnie na témże miejscu. Około zawiązka i pod nim, osadzone są pręciki, w liczbie oznaczonej, których nitki wolne przechodzą przez ową zwężoną część kraju (fig. 616) i pozornie tylko z nią są spojone. Pylniki są dwuworeczkowe. Zalążek jeden, wzniesiony (fig. 616 *o*), podobnie jak i nasienie, którego zarodek okręcony około bielma mączystego, zwraca kielek swój na dół ku znaczkowi (fig. 620 *e*). O własnościach czyszczących korzeni tej rodziny, wspomnimy tu tylko z powodu błędnego dawniej-

612. Kwiat gryki (*Polygonum fagopyrum*) przecięty pionowo. — *c* Kielich. — *ee* Pręciki zewnętrzne obrócone. — *ei* Pręciki wewnętrzne odwrócone. — *a* Przesadki gruczołowe. — *o* Zawiązek wraz z zalążkiem *g*. — *s* Szyjki i znamiona.

613. Zaręsy tegoż. — *a* Os.

614. Nasiono przecięte pionowo.

szego mniemania, podług którego początek i nazwisko gatunkowe jalapy, przyznawano roślinie powyżej przytoczonej.



615-620. Narzędzia owocowania dziwaczku (*Mirabilis jalapa*).

615. Zarys kwiatu.

616. Część niższa kwiatu, przecięta pionowo. — *i* Pokrywa. — *c* Nasada kielicha zielona i wydęta wokoło zawiązka. — *t* Część rurki tegoż barwna. — *e* Niższa część nitki. — *s* Część szyjki. — *o* Zawiązek wraz z zalążkiem wzniesionym.

617. Pręciki nabrzmiałe u spodu nitki swych i tworzące jakby sklepienie.  
618. Szyjka i znamię.

619. Owoc otoczony nasadą trwałą i stwardniałą kielicha.

620. Tenże przecięty pionowo. — *i* Pokrywa. — *c* Kielich. — *f* Nasiennik. — *p* Bielmo. — *e* Zarodek.

620 bis. Przecięcie pionowe tegoż. — *c* Kielich. — *t* Powłoka nasienia. — wraz z nasiennikiem. — *p* Bielmo. — *r* Kielek. — *co* Liścienie.

## ROŚLINY DWULIŚCIENNE WIELOPLĄTKOWE.

§ 781. Jussieu zastosowując do nich swój podział, zasadzony na trzech rodzajach przytwierdzenia, dzielił je na płatko-nazawiązkowe, płatko-podzawiązkowe i płatko-kołozawiązkowe. Podział ten przyjmujemy i my, z małemi tylko odmiannami: połączymy bowiem nazawiązkowe z kołozawiązkowemi dlatego, że w nader szczupłej liczbie rodzin składających pierwszą gromadę, osadzenie pręcików na obwodzie krążka, który przykrywa wprawdzie wierzchołek zawiązka, lecz z drugiej strony łączy się z kielichem, jest rzeczywiście wątpliwem. Następnie nie zważając na osadzenie pręcików, odzielimy małą gromadkę roślin, wiążących się z poprzedzającymi za pomocą szczególnego piętna, jakim jest budowa nasion posiadających bielmo mączyste, otoczone zarodkiem (fig. 625) i siedzących na środkowem łożysku (fig. 624, 2). Należałoby może nawet nie zwracać uwagi na to ostatnie piętno i przyłączyć do gromadki tej dwie inne rodziny o ułożyszcznieniu ściennem; w jednej z nich (w soczystkowych [*Ficoideae*]) łąkowaty zarodek tworzy pół pierścienia na boku mączystego bielma; druga (cierńcowate [*Cacteae*]) musiałaby iść za pierwszą, gdyż lubo nie posiada bielma, jednakże zarodek jej okazuje podobną dążność zakrzywienia się.


## RODZINY. Tablica VII. WIELOPLĄTKOWE

## o ułożyszcznieniu środkowem i o bielmie mączystem otoczonem przez zarodek.

Pręciki	{ kolozawiązkowe { podzawiązkowe	Liczba działek często zmniejszona do dwóch. Przylistki żadne. Rośliny zazwyczaj mięsiste . . . . .	{ KURZONOGOWATE ( <i>Portulacae</i> ). GWOZDZIENCOWATE ( <i>Paronychie</i> ). GOZDZIKOWATE ( <i>Caryophylleae</i> ).
		Liczba działek równa liczbie płatków. Przylistki suche. Rośliny niemięsiste . . . . .	
		Działek 4-5 i tyleż płatków. Rośliny niemięsiste . . . . .	

Osadzenie pręcików nie zdaje się być bardzo ważnem w tej grupie, równie jak obecność płatków; w pierwszej bowiem rodzinie znajdujemy kilka roślin podzawiązkowych; w ostatniej

kilka kołozawiazkowych; w obudwu zaś niektóre rodzaje są bezpłatkowe. Co się tyczy gwoździeńcowatych, można rzec, iż to są czerwcowate opatrzone koroną. Niekiedy w jednym



621. Zarys kwiatu mokrzycy (*Alsine media*).

622. Przecięcie kwiatu goździka (*Dianthus caryophyllus*).— *c* Kielich.— *p* Płatki zrośnięte u spodu z leżącymi naprzeciw nich przeciekami.— *e* Przeciki.— *g* Nadsadnik.— *o* Zawiązek.— *s* Szyjki noszące wzdłuż całej strony wewnętrznej znamię pokryte wzdymkami.

623. Przecięcie poziome bardzo młodego zawiązka, kiedy takowy podzielony jest jeszcze na dwie komory za pomocą przegród *c*, które później niszczą; poczem sama tylko środkowa część łożyska *p* nosi na sobie nasiona.

624. Torebka kąkolu (*Agrostemma githago*) w chwili pękania, w skutek którego nasiennik dzieli się u wierzchołka swego na wiele lupin 1) Cała.— 2) Przecięta pionowo, dla pokazania nasion *g* skupionych w środku na łożysku *p*.

625. Nasiono. 1) Całe.— 2) Przecięte pionowo.— *t* Powłoka.— *e* Zarodek.— *p* Bielmo.

rodzaju, a co większa w jednym nawet gatunku, to znajdują się płatki, to ich wcale niema. Jednakże stanowią one gromadkę tak przyrodzoną, iż wszyscy pisarze ją przyjmują. Nie znajdujemy w nich żadnej szczególnej własności, żadnej rośliny użytecznej, wyjąwszy chyba, że liście gotowane niektórych kurzonogowatych, a szczególnie kurzonogi (*Portulaca*), służącej za wzór rodziny, są jadalne.

**Goździkowate** (*Caryophylleae*). Do piętn ich ułożyszczenia, o którym mówiliśmy gdzieindziej (§ 492) i nasion, dodamy jeszcze następujące: płatki paznogciowe; pręciki w liczbie podwójnej; z tych naprzeciwległe względem płatków, zrastają się niekiedy z ich nasadą (fig. 622); zawiązek wywyższony częstokroć na osi pieńkowatej, noszącej prócz tego płatki i pręciki (§ 375 *bis*, fig. 233), uwieńczony 2-5 znamionami wydłużonemi na podobieństwo szyjek, które jednak obsadzone są wzdłuż całej powierzchni wewnętrznej wzdymkami (fig. 622 *s*); torebka o tyłuż łupinach (fig. 624), z których każda roszczenia się częstokroć znowu na dwie (fig. 418). Wszystkie gatunki są zielne, i rzadko tylko nabywają utkania cokolwiek drzewnego. Na węzłach nabrzmiałych siedzą naprzeciw siebie dwa liście proste i całobrzegie. Niektórzy pisarze przyłączają do goździeniecowatych kilka rodzajów, których liście opatrzone są przylistkami.

#### WIELOPLĄTKOWE, PODZAWIĄZKOWE.

§ 782. Podzielimy je tu według ułożyszczenia ściennego lub kątnego; w pierwszym oddziale umieścimy owoce złożone z owocków zrosniętych, bądź brzegami, bądź bokami zachylonemi w przegrody niezupełne; w drugim owoce, których boki zawrócone w każdym owocku, tworzą komorę zupełną, czyto odosobnioną od innych jako owocek oddzielny, czy też zrosniętą z niemi w zawiązek wielokomorowy. Wszystkie więc owoce oddzielnoowockowe podzawiazkowych, należące będą do drugiego oddziału, nawet w przypadkach w których załączki wzniesione lub zawieszzone w górze komory, albo nawet rozrzucone po jej ścianach, nie zdają się być przytwierdzonemi do kąta wewnętrznego. Podług tego podział nasz da się także wyrazić następnie: 1° zawiązek jednokomorowy o wielu łożyskach; 2° zawiązek wielokomorowy lub owocki oddzielne.

## WIELOPLĄTKOWE PODZAWIAZKOWE

## o ułożyszcznieniu ścienném.

§ 783. Łożyska albo obrzeżają łupiny owocu, a przeto przypadają względem nich naprzemian, albo też idą wzdłuż przez ich środek, i wtedy są względem nich naprzeciwległe. W niektórych razach, gdzie owoc jest niepekający, piętno to zastąpi nam inne piętna, wzięte z budowy nasienia.

(zob. Tab. VIII, str. 645).

§ 784. Zpomiedzy tych rodzin przytoczymy tu **fijolkowate** (*Violariæ*), których kwiaty posiadają pięć działek, tyleż płatków i pręcików; pylniki złożone z dwóch woreczków siedzących na szerokiej zwórcie, która się ponad niemi przedłuża w ostry koniec (fig. 317); czasami pylniki zrastają się z sobą w rurkę otaczającą zawiązek. Szyjka jest pojedyncza, krzywa, zakończona znamieniem nachyloném, grubém i w środku przedziurawioném (fig. 381); owoc jest torebką o trzech łupinach. Odróżniamy w rodzinie tej dwa plemiona, podług tego jak kwiaty są kształtne (w *Alsodineæ*) lub niekształtne (w *fijolkowych* [*Violææ*], które są liczniejsze). Przytoczyliśmy przykład niekształtności jaką przedstawiają naówczas dwa pręciki (fig. 317). Korzenie w rodzinie tej posiadają częstokroć własności emetyczne, dlatego też wiele gatunków południowo-amerykańskich jest znanych i używanych pod nazwiskiem *ipekakuany*.

§ 785. W **czystkowatych** (*Cistineæ*) kwiaty są kształtne wyjąwszy kielich, którego dwa zewnętrzne listeczki bywają częstokroć krótsze od innych; liczba pręcików nieoznaczona; łożyska 3—5 a nawet 10, wystają czasami wewnątrz komory, a przegrody niezupełne, na których brzegu siedzą, mogą nawet posunąć się dalej i spotkać mniej więcej wysoko i ku środkowi komory, którą tym sposobem dzielą na tyleż komór podrzędnych. Nie pojmowano dawniej, jakim sposobem okienko ich zalążków, siedząc na końcu przeciwnej względem znaczką, mogło przy upłodnieniu wejść w związek z łożyskiem, z którym zalążek połączony jest tylko za pomocą bardzo długiego sznureczka; badając podtenczas wewnątrz zawiązka, widzimy, iż łagiewki przybywszy przez tkankę, przewodczą do jego powierzchni, przedłużają się w wydrążenie komory, i tym


sposobem idą naprzeciw okienka, które nakoniec napotykają. Gatunki tej rodziny, zielne lub krzewiaste, częstokroć pokryte bywają obłóczką żywiczną, która w *Cistus creticus* i wielu innych, dostarcza istoty balsamicznej, zwaną *Ladanum*.

§ 786. O **orleanowatych** (*Bixineae*) wspomniemy tu tylko z powodu istoty barwnej, znajomej pod imieniem *orleanu*, a dostarczanej przez miążdżową okrywę nasienia z *Bixa orellana*; w przyrodzie jest ona czerwoną, przez działanie zaś alkaliów staje się złoto-żółtą; o **rezedowatych** (*Resedaceae*) podobnie z powodu *śótcieni rezedowej* (*gaude*) używanej powszechnie do barwienia na żółto, a otrzymywanej z pospolitego we Francyi gatunku *Reseda luteola*. Nie mogąc tu zatrzymać się nad kwiatem niekształtnym i zajmującym tej ostatniej rodziny, zwrócimy tylko uwagę na oddalenie się wierzchołków ścian zawiązka, przez co wydrażenie tegoż stoi otworem, tak, że się zdaje jakoby zrosnięcie się listeczków owocowych, zwykle zupełne, w tym razie zatrzymanem zostało. Kwiat **kaparowatych** (*Capparideae*) również ciekawy z powodu swej niekształtności, godzienby także był rozbioru, gdyby nam tego miejsce dozwalało; kaparki są pąkami rodzaju *Capparis*, służącego za wzór rodziny.

§ 787. **Krzyżowe** (*Cruciferae*): Cztery działki ułożone na krzyż, tyleż płatków naprzemianległych względem tychże (fig. 284), 6 pręcików czworosilnych osadzonych na stronie wewnętrznej, lub na wierzchu 4 gruczołów, które razem stanowią krążek podzawiązkowy (fig. 627); zawiązek o dwóch łożyskach ściennych; łuszczyzna (fig. 630, 631) i nasiona bezbielmowe, oto są piętna, któremi rodzina ta, tak przyrodzona i tak obfita w naszych krajach, łatwo i pewno od innych odróżnić się daje. W § 528 (fig. 426) opisaliśmy łuszczyne, której przegroda tak jest różna od innych, i wspomnieliśmy o jednoczesnej obecności dwóch piętn, zazwyczaj wyłączających się wzajemnie, to jest o ułożyszczeniu ściennem i wielości komór (fig. 629); widzieliśmy także różne sposoby zagięcia się kielka na liścieniach (fig. 472, 473, 469, 482). Należą tu rośliny bez wyjątku prawie zielne; liście ich są naprzemianległe i bezprzylistkowe; kwiaty białe lub żółte, rzadko czerwone. Tkanki ich odznaczają się obecnością znacznej ilości saletrorodu i olejku. Pierwszemu winny swe własności pożywne, czego najlepszym przykładem są liczne odmiany kapusty;



632.



633.

631. 630.

lecz także własność łatwego gnicia, tudzież nieznośną i jakby zwierzęcą woń jaką wydają tworząc amoniak. Olejkowi zaś winny własności drażniące, tak wygórowane w gorczycy, a których niższy stopień, złagodzony nadto istotą cukrową, stanowi zaletę niektórych korzeni, mianowicie rzodkwi i rzepy. Osłabienie to własności, jest skutkiem usunięcia części roślinnych spod wpływu światła; przez pobyt ich w ziemi; można je zaś wywołać sztucznie w częściach zewnętrznych, spowodowując płonność takowych, jak w kwiatostanie kalafiorów, lub pokrywając ziemią młode pędy

626-633. Narzędzia owocowania jednej z krzyżowych (*Erysimum nobile*).

626. Zarys kwiatu.

627. Kwiat pozbawiony swych okryw. — *c* Blizny pozostałe po opadnięciu listeczków kielicha. — *g* Gruczoły siedzące obok nasady pręcików. — *e'* Dwa pręciki krótsze. — *e''* Pręciki dłuższe. — *p* Słupek.

628. Przecięcie pionowe kwiatu. — *c* Kielich. — *p* Płatki. — *e* Pręciki. — *o* Zawiązek przecięty. — *s* Znamię.

629. Przecięcie poziome zawiązka. — *c* Przegroda. — *g* Zawiązki.

630. Łuszczyzna.

631. Taż sama po odjęciu jednej z łupin, dla pokazania nasion przytwierdzonych do oddzierki.

632. Przecięcie pionowe nasienia. — *f* Sznureczek. — *t* Powłoka narzmiła przy osadce *c*. — *r* Kielek. — *c* Liścienie.

633. Przecięcie poziome nasienia. — *t* Powłoka. — *r* Kielek. — *c* Liścienie nakielkowe.

jak w brzoskwi nadmorskiej (*Crambe maritima*); albo też wybierając same tylko wewnętrzne liście pączków jak w kapuście głowiastej. Medycyna używa własności pobudzających tej rodziny, dla zjedrnienia narządzi, w niektórych chorobach osłabiających, a szczególnie w szkorbutcie. W rzeczy samej krzyżowe są w wysokim stopniu przeciw-szkorbutycznymi, a to tak powszechnie, że w czasie jednej sławnej podróży, załoga okrętu dotknięta tą chorobą, uleczoną została za pomocą nowej i wcale jeszcze naówczas nieznannej rośliny; użyto jej zaś dlatego, iż botanik Forster, jeden z towarzyszków Cook'a, poznał, że należała do krzyżowych. Zaródki są oleiste, dlatego wiele gatunków uprawia się w celu otrzymywania oleju; tak np. rzepak (*Brassica napus*), kapusta polna (*Brassica campestris*), lennica (*Camelina sativa*) i t. d.

§ 788. **Makowate** (*Papaveraceae*). Znajdujemy tu w kwiecie części krzyżujące się z sobą naprzemiann; kielich o 2 (rzadko o 3) działkach nietrwałych; płatki w liczbie 4 lub wielokrotnej względem 4; pręciki w liczbie podwójnej, lub co częścię, także wielokrotnej, w którym to przypadku osadzone są wiązkami naprzeciw płatków. Szyjka bywa krótka lub żadna; znamion 2 lub więcej, a w takim razie widzieliśmy ułożenie ich tarczowate i promieniste (§ 500 fig. 397). Owoc posiada od wewnątrz tyleż łożysk wystających w postaci przegród niezupełnych; po dojrzeniu zaś rozszczepia się w tyleż łupin, zupełnie, albo tylko w wierzchołku, który uwieńczony tarczą znamienionością, przedstawia na obwodzie swym okrąg otworów, przez które wypadają nasiona. Liczba tychże jest nadzwyczaj wielka. Przy kończynie dużego mięsisto-oleistego bielma, leży małeńki zarodek. Łodygi są zazwyczaj zielne; liście naprzemianległe, a wszystkie części zawierają obficie sok właściwy, zazwyczaj mleczny; rzadko innej barwy. Sok ten posiada własności bardzo wydatne; raz bywa niezmiernie ostry, jak się o tem przekonać można na jaskółczem ziele (*Chelidonium majus*); z tego powodu korzenie wielu makowatych, używane bywają jako środki czyszczące lub emetyczne, drugi raz narkotyczne, szczególnie w maku (*Papaver*); zależy to od wielu alkaloidów w nim zawartych, jakoto: *mekoniny*, *kodeiny*, *narkotyny*, a osobliwie *morfiny*. Istoty te wraz z wielu innymi, składają *opium*, będące właśnie sokiem zgęszczonym, otrzymanym z torebek i szypulek, w których się obficie

niż gdzieindziej znajduje. Nasienie nie zawiera rzeczonych pierwiastków; służy zaś do otrzymywania oleju, który długi czas był podejrzany, z powodu swego pochodzenia, lecz nakoniec uznany za nieszkodliwy wszedł w handel i używanym bywa szczególnie do fałszowania oliwy; znany on jest we Francyi pod niewłaściwem imieniem: *huile d'oeillette*, które bez wątpienia jest zdrobniałem od *oilum*.

§ 789. Umieścimy tu pomiędzy wielopłatkowemi o łożyszcznieniu ściennem, a kątnem, małą pośrednią grupę, która oba te sposoby w sobie łączy, lecz która różni się od wszystkich innych, małym mięsistym woreczkiem, okrywającym zarodek, a utworzonym przez bielmo wewnętrzne; obok tego spostrzegamy zazwyczaj bielmo zewnętrzne, nabrzmiałe w ciało mączyste; rzadziej bielmo wewnętrzne jest samotnem.

#### RODZINY. Tablica IX.

Zarodek w osobnym woreczku	1-komorowy, wielozarnowy. Bielmo duże mączyste..... pogrążonych wkrażku mięsistym. 1-2 zalążki zawieszzone. Bielmo żadne, osadzone na dnie zaledwie nieco rozszerzonym. 2-3 zalążki przytwierdzone do kąta wewnetrz. Bielmo mięsiste.....	GRZYBIENIOWATE ( <i>Nymphaeaceae</i> ).
Owoce ....		BOGOROŚLOWATE ( <i>Nelumboneae</i> ).
		PEYWCOWATE ( <i>Cabombee</i> )

**Grzybieniwate** (*Nymphaeaceae*). Nie będziemy tu opisywali tej rodziny której wzór, grzybień biały (*Nymphaea alba*) zajmował nas już kilkakrotnie (§§ 356, 560, fig. 223, 452). Nasiona odznaczające się tak bardzo obecnością bielma wewnętrznego, tworzącego woreczek około zarodka, mogą być użyteczne z powodu zewnętrznego, mączystego bielma, do którego uciekano się niekiedy w czasie głodu. Mieszkańcy Ameryki południowej jedzą także pod nazwiskiem *kukuruzy wodnej* nasiona jednej z grzybieniwatych, najpiękniejszej z pomiędzy wszystkich tak powabnych kwiatów tej rodziny, i poświęconej dlatego dzisiejszej królowej angielskiej, pod nazwiskiem *Victoria regia*. Kwiaty i liście tych roślin pływają na wodach stojących, na dnie których ukryte są ich czółgające się łodygi, bogate w skrobią, mogącą także służyć za po-

karm, lecz po poprzedniem przemyciu, dla oddzielenia pierwiastków gorzkich jakie się przy niej znajdują.

**Pływcowate** (*Cabombeae*), żyją także w wodzie równie jak i bogorośl (*Nelumbo*), której kwiaty, liście i szczególniejszy owoc, o owocach jajowatych, rozrzuconych i do połowy pograżonych w szerokiem a mięsistém dnie, widziéć można na wszystkich prawie chińskich malowidłach. Korzeniaki jéj i owoce są jadalne; w nasionach zaś liścienie mączyste zastępują miejsce bielma.

#### WIELOPLĄTKOWE PODZAWIĄZKOWE

##### o ułożyszcznieniu kątném.


§ 790. Ponieważ rodziny przedstawiające te trzy piętna są nadzwyczaj liczne, podzielimy je przeto na kilka części; pierwszego zaś podziału dostarczy nam budowa nasienia. Zarodek ich albo leży nagi pod powłokami, albo otoczony jest bielmem prawie równéj z nim długości; albo nakoniec zarodek jest daleko krótszy od bielma i zagłębia się w jego kończywie. Jednakże uważać należy, iż jeśli to ostatnie piętno posiada istotną ważność, dwa inne nie posiadają jéj w tym samym stopniu. Kiedy objętość bielma nie przechodzi o bardzo wiele objętości zarodka, wtedy i piętna brane z niego tracą wiele ze swéj wagi w układnictwie; przechodzi ono bowiem przez stopnie coraz mniej znaczne, a nawet znika weale w roślinach widocznie sobie sąsiednich: dlatego w tablicach naszych przyjdziemy niekiedy dwiema drogami do jednéj rodziny, chociaż wprawdzie do różnych jéj plemion.

(Ob. tab. X, str. 650).

§ 791. **Jaskrowate** (*Ranunculaceae*). Dla tych, którzy chcą dobrze zrozumieć co to jest rodzina, jaskrowate stanowią wyborny przedmiot nauki, tém bardziej, iż one służyły niejako za podstawę wszystkich prac *A. L. de Jussieu*, któremu badanie ich poddało pierwsze pojęcie o układzie przyrodzonym roślin. Kielich złożony z pięciu listeczków; pięć płatków naprzemian z niemi leżących; pręciki w liczbie nieoznaczonej, wolne i osadzone na dnie płaskiém lub u spodu dna wypukłego (fig. 634 e); liczne zalążki wolne (fig. 634 pi)

niepekające, jednoziarnowe, albo też pekające i wleziarnowe; nasiona których małeńki zarodek wtłoczony jest od strony znaczka w kończynę dużego rogowego bielma (fig. 639), oto są ogólne piętna rodziny, oto wzór, którego lekkie odmiany śledzić można w pewnej liczbie rodzajów. W jednych bowiem

liczba piątkowa części przechodzi w trójkową, w innych płatki zmieniają swą postać, przeobrażając się w małeńkie blaszki lub trąbki, albo też całkowicie znikają. Tak np. znikają w *powojnikowatych* (*Clematideae*), których kielich przybiera barwę i pozór korony; przedkwitnienie jego jest lupinowate, a liście naprzeciwległe; w *zawilcowych* (*Anemoneae*), przedkwitnienie



kielicha jest dachówkowe, liście zaś są naprzeciwległe. *Jaskrowe* (*Ranunculeae*) przedstawiają wzór powyżej opisany z niełupkami zawierającymi nasiona pojedyncze wzniesione (fig. 638, 639), które w innych plemionach są zawieszzone. *Ciemsnikowe* (*Helleboreae*) posiadają mieszki wieloziarnowe i płatki wwinęte. We wszystkich tych roślinach pręciki

- 634-639. Narzędzia owocowania jednego z jaskrów (*Ranunculus acris*).  
 634. Kwiat przecięty pionowo. — c Kielich. — pe Płatki. — e Pręciki.  
 i Słupek złożony z wielu owoców osadzonych na wydłużonej osi.  
 635. Zarys kwiatu.  
 636. Pylnik widziany od zewnątrz, gdzie się otwiera.  
 637. Tenże od wewnątrz.  
 638. Przeciecie pionowe zawiązka o, w którym widać zalążek g. — s Znamię.  
 639. Przeciecie pionowe dojrzałego owoka. — f Nasiennik. — t Powłoka nasienia. — p Bielmo. — e Zarodek.

RODZINY. Tablica VIII.

WIELOPLĄTKOWE PODZAWIAZKOWE

o ułożyszcznieniu ściennem.

Łożyska naprzeciwległe względem łupin.....1.			
naprzeciwległe.....2.			
1. Zarodek	leżący w osi bielma, któremu prawie wyrównywa. Pręciki	w liczbie określonej.	Szyjka 2-3-wrębna. Przylistki 0. Kwiaty kształtne. Pylniki obrócone.....—POMORZLINOWATE ( <i>Frankeniaceae</i> ).
			Szyjka pojedyncza. Przylistki. Kwiaty kształtne. Pylniki odwrócone.....—WIELOPEONKOWATE ( <i>Sauvagesiacea</i> ).
			Szyjki liczne. Przylistki 0. Kwiaty kształtne. Pylniki odwrócone.....—ROSICZKOWATE ( <i>Droseraceae</i> ).
			Szyjki pojedyncze. Przylistki. Kwiaty zazwyczaj niekształtne. Pylniki
			obrócone.....} FIOLEKOWATE ( <i>Violariae</i> ).
			obrócone.....} —CZYSTKOWATE ( <i>Cistineae</i> ).
			—ORLEANOWATE ( <i>Bixaceae</i> ).
			—POSPORNICOWATE ( <i>Pittosporae</i> ).
			—TAMARYSZKOWATE ( <i>Tamariscineae</i> ).
	maleńki, leżący w kończyni dużego bielma. prosty 5, płatków i tyleż pręcików.....		
	bezbiałmowy, prosty, wsteczległy. Łupin 3. Nasiona opatrzone puchem. Pręciki w równej lub w podwójnej liczbie względem płatków.....		
2. Zarodek	bezbiałmowy, zgięty na sobie samym. Kwiaty	niekształtne. Pręciki w liczbie oznaczonej lub nieoznaczonej. Torebka u góry otwarta.....	—REZEDOWATE ( <i>Resedaceae</i> ).
		kształtne. Działki i płatków 4. Pręciki	—KAPAROWATE ( <i>Capparideae</i> ).
			—KRZYŻOWE ( <i>Cruciferae</i> ).
			—DYMNICOWATE ( <i>Fumariaceae</i> ).
			—MAKOWATE ( <i>Papaveraceae</i> ).
	maleńki, leżący w kończyni dużego bielma. Kwiaty	niekształtne. Działki, płatki i pręciki w liczbie oznaczonej. Łożyszczenie 2, lub wielokrotne wzglę-	
		dem 2. Ziola z sokiem wodnistym.....	
		kształtne. Działki, płatki 2 lub wielokrotne względem 2. Pręciki w liczbie nieoznaczonej. Ziola	
		z sokiem mlecznym, białym lub barwnym.....	

RODZINY. Tablica X.

WIELOPLĄTKOWE PODZAWIAZKOWE

o ułożyszcznieniu osłowym.

Zarodek maleńki, leżący w osi dużego bielma.....1.			
otoczony bielmem, któremu prawie wyrównywa.....2.			
bezbiałmowy.....3.			
1. Owociki	oddzielne. Liczba części kwiatowych	piątkowa. Bielmo	trójkowe.....Pręciki w liczbie nieoznaczonej.....Nasiona bez osnówki.....—JASKROWATE ( <i>Ranunculaceae</i> ).
		mięiste.....	Nasiona opatrzone osnówką.....—UKĘŚLOWATE ( <i>Dilleniaceae</i> ).
		trójkowa. Bielmo mięsiste	.....Nasiona bez osnówki.....—FLĄSZOWCOWATE ( <i>Anonaceae</i> ).
		mięsiste pomarszczone.....	
		równe.....Pręciki otwierające się	szparą w liczbie nieoznaczonej. Nasiona przy-
			twierdzone do kąta wewnętrznego, opa-
			trzone osnówką.....} BOBROWNIKOWATE ( <i>Magnoliaceae</i> ).
			} —KRĘPNOWATE ( <i>Lardizabaleae</i> ).
			} —KWAŚNICOWATE ( <i>Berberideae</i> ).
			} —WINOROŚLOWATE ( <i>Ampelideae</i> ).
			} —OPAWOWATE ( <i>Sarraceniaceae</i> ).
	zrosnięte w zawiązek wielokomorowy. Komory	zawierające 1-2 nasion wzniesionych. Pręciki w liczbie równej płatkom, naprzeciwległe względem tychże.	
		Krzewy pnące.....	
		wieloziarne.....Pręciki w liczbie nieoznaczonej.....	Rośliny wodne.....

(Dalszy ciąg tablicy X).

2 Kielich o przedkwitnieniu	dachówkowém. Pręciki.	w liczbie oznaczonej	naprzeciwplatkowe. Owociki oddzielne 1-zalążkowe. Nasiona nerkowe. Kwiaty osobnoplciowe w skutek plonności . . . . .	MIESIĄCZNIKOWATE ( <i>Menispermaceae</i> )
				osobnoplciowe w skutek plonności, . . . . .
3. Kielich o przedkwitnieniu	dachówkowém. Pręciki.	w liczbie oznaczonej	naprzeciwplatkowe. Owociki oddzielne 1-zalążkowe. Nasiona nerkowe. Kwiaty osobnoplciowe w skutek plonności, . . . . .	WONNOKRZEWOWATE ( <i>Diosmeae</i> ).
				WONNOKRZEWOWATE (australijskie)
				RUTOWATE ( <i>Rutaceae</i> ).
				PAROLISTNIKOWATE ( <i>Zygophylleae</i> ).
				LNOWATE ( <i>Linaceae</i> ).
				KRASNOSOKOWATE ( <i>Erythrozyleae</i> ).
				SZCZAWIKOWATE ( <i>Oxalideae</i> ).
				MIEDLINOWATE (Miodkowe) ( <i>Meliaceae</i> ).
				CEDRZEŃCOWATE ( <i>Cedrelaceae</i> ).
				KRZYŻOWNICOWATE ( <i>Polygalaceae</i> ).
3. Kielich o przedkwitnieniu	dachówkowém. Pręciki.	w liczbie nieoznaczonej	wolne, zrosnięte przy nasadzie płatków lub wielowiązkowe. Kielich pojedynczy . . . . .	CISTRONKOWATE ( <i>Ternstroemiaceae</i> ).
				TRÓJPIĘTKOWATE ( <i>Chlenaceae</i> ).
				MORZYLISTOWATE ( <i>Humiriaceae</i> ).
				WYTRZYMIKOWATE ( <i>Tremandreae</i> ).
				POSTRZĘPOWATE ( <i>Elaeocarpeae</i> ).
				LIPOWATE ( <i>Tiliaceae</i> ).
				ZATWAROWATE ( <i>Sterculiaceae</i> ).
				RÓŻNOLISTOWATE ( <i>Byttneriaceae</i> ).
				SÉRECNIKOWATE ( <i>Bombaceae</i> ).
				ŚLĄZOWATE ( <i>Malvaceae</i> ).
3. Kielich o przedkwitnieniu	dachówkowém. Pręciki.	w liczbie nieoznaczonej	wolne, zrosnięte przy nasadzie płatków lub wielowiązkowe. Kielich pojedynczy . . . . .	DWUSKRZYDEWATE ( <i>Dipterocarpeae</i> ).
				CISTRONKOWATE ( <i>Ternstroemiaceae</i> ).
				NAIGRAWNIKOWATE ( <i>Marcgraviaceae</i> ).
				ZŁOTOSOKOWATE ( <i>Guttiferae</i> ).
				GRUBOKŁOWATE ( <i>Rhizoboleae</i> ).
				DZIURAWCOWATE ( <i>Hypericineae</i> ).
				BALSAMINOWATE ( <i>Balsamineae</i> ).
				BODZISZKOWATE ( <i>Geraniaceae</i> ).
				POMARAŃCZOWATE ( <i>Aurantiaceae</i> ).
				MIEDLINOWATE (Trójnatkowe) ( <i>Meliaceae</i> ) ( <i>Trichiliaeae</i> ).
3. Kielich o przedkwitnieniu	dachówkowém. Pręciki.	w liczbie nieoznaczonej	wolne, zrosnięte przy nasadzie płatków lub wielowiązkowe. Kielich pojedynczy . . . . .	OJCZYSTKOWATE ( <i>Hippocrateaceae</i> ).
				NAGWIAZDKOWATE ( <i>Malpighiaceae</i> ).
				KŁONOWATE ( <i>Acerineae</i> ).
				ZAPIANOWATE ( <i>Sapindaceae</i> ).
				KASZTANOWCOWATE ( <i>Hippocastaneae</i> ).
				WONNOKRZEWOWATE ( <i>Diosmeae</i> ) [Cuspariaceae].
				NADWODNIKOWATE ( <i>Elatineae</i> ).
				NASTURCYOWATE ( <i>Tropaeoleae</i> ).
				WONNOKRZEWOWATE [Afrykańskie] ( <i>Diosmeae</i> ).
				BIEGUNECZNIKOWATE ( <i>Simarubaeae</i> ).
3. Kielich o przedkwitnieniu	dachówkowém. Pręciki.	w liczbie nieoznaczonej	wolne, zrosnięte przy nasadzie płatków lub wielowiązkowe. Kielich pojedynczy . . . . .	DWUDZIURCZYKOWATE ( <i>Ochnaceae</i> ).
				BALSAMOWCOWATE ( <i>Amyrideae</i> ).

kończą się  
w piórnym  
składa się  
wielozarodkowy  
rodziny  
sposób  
komorowaty  
jeszcze,  
wecale  
zują się  
nam pozostaje  
przynajmniej  
części kielicha  
Jaskr  
z nich są  
listkowe  
ściaki; w  
więcej g  
i gryzący  
się być b  
rzeniach  
w powie  
siadają  
w tojad  
tów, któ  
tudzież  
używano  
dla dział  
nazywają  
ciało sw  
chownych  
słynny w  
szczęści  
stku ost  
niekiedy  
żki poln  
tego od  
§ 792  
jeszcze  
w trójko

kończą się pylnikami przyrośniętymi i odwróconymi (fig. 634); w *piwonjowych* zaś (*Paeoniae*) pylniki są obrócone; a owoc składa się z wielu owoczków pękających lub niepękających, wieloziarnowych. Widzieliśmy na przykładzie wziętym z tej rodziny (§ 487), lecz stanowiącym w niej wyjątek; w jaki sposób liczne i wolne owoczek przechodzą w zawiązek wielokomorowy. Ze wszystkiego zaś co się tu powiedziało, widzimy jeszcze, jak niektóre piętna mogą ulegać odmianom, w grupie wcale zresztą przyrodzonej, tudzież które znowu z nich okazują się najbardziej stałymi. Nadto rozbiór tej rodziny daje nam poznać podrzędność piętn, pokazując ważność nasienia, i przyznając większą wartość stosunkom położenia lub zrośnięć części kwiatowych, niżli ich liczbie.

Jaskrowate są po większej części zielnemi; niektóre tylko z nich są krzewami, najczęściej pnąciami się. Liście bezprzyliskowe bywają niekiedy prostemi, a nawet przechodzą w liściaki; w ogóle jednakże blaszka ich podzielona jest mniej więcej głęboko na łaty. Sok wodnisty jest nadzwyczaj ostry i gryzący; pierwiastki od których własności te zależą, zdają się być bardzo lotnemi: dlatego też daleko są silniejsze w korzeniach niż w częściach zewnętrznych, z kąd łatwo uchodzą w powietrze lub w otaczającą wodę. Jednakże i te części posiadają je niekiedy w wysokim stopniu, jak to widzimy np. w tojadach (*Aconitum*), które stanowią silne trucizny, a z kwiatów, których pszczoły mają niekiedy zbierać miód jadowity; tudzież w różnych gatunkach jaskrów i zawilców, których liści używano dawniej w niektórych krajach zamiast wezykatoryi, dla działania jakie wywierają na skórę. Ztądto we Francyi nazywają powojniki *zieleni żebraków*, ponieważ ci nacierają ciało swe roślinami temi, dla wywołania wrzodów powierzchownych i przemijających. Ciemiernik (*Helleborus*), tak słynny w starożytności, działa jako środek gwałtownie czyszczący. Nasiona roślin tej rodziny, zawierają obok pierwiastku ostrego, pierwiastek aromatyczny, dlatego lud używa ich niekiedy jako przyprawy zamiast pieprzu, a mianowicie z ostróżki polnej (*Delphinium staphysagria*), zawierającej prócz tego oddzielną alkaloidę: *delfininę*.


§ 792. Liczba piątkowa części kwiatowych znajduje się jeszcze w *ukęśłowatych* (*Dilleniaceae*), przechodzi zaś w trójkową w *bobrownikowatych* (*Magnoliaceae*), o któ-

rych mówiliśmy już wyżej (§§ 358, 386, fig. 225), a w których prócz tego okółki płatków są także liczne; tudzież w **flaszowcowatych** (*Anonaceae*), których płatki we dwa tylko okółki są ułożone. We wszystkich tych rodzinach znajdujemy pylniki przyrośnięte, pękające zazwyczaj od zewnątrz lub na bokach; zarodek małeńki na kończyńie grubego bielma, różniący się jednakże od tegoż utkaniem lub kształtem. Dwie ostatnie posiadają podobne własności, i zawierają pierwiastek aromatyczny, używany do wyrabiania wódki zwanéj: *anisette de Bordeaux*, z owoców *badianu* (*Illicium anisatum*), znanego pospolicie pod imieniem *anyżu gwiazdzistego* (*Anisum stellatum*). Pierwiastek ten połączony najczęściej w pewnym stopniu ze związkami gorzkiemi, nadaje korze rodzaju zacierp (*Drymis*) i innych własności jędrniące, dające się w niektórych porównać z własnościami chinu. Dla aromatu owego, zawartego w kleju słodkawym, owoce niektórych flaszowców są jadalne i wiele cenione.

§ 793. Widzimy jeszcze liczbę trójkową wraz z owocem oddzielno-owocowym w **kwasnicowatych** (*Berberidae*), **krępieniowatych** (*Lardizabaleae*) i wielu **miesiącznikowatych** (*Menispermaceae*). Dwie ostatnie rodziny ściśle się z sobą łączą; obie posiadają kwiaty jednopłciowe w skutek płonności; pierwsza w każdym z owoców zawiera mnogie zalążki rozrzucone na ścianach; druga jeden tylko zalążek skrzywiony, przytwierdzony z boku. Miesiącznikowate jednakże różnią się od wszystkich poprzednio wymienionych rodzin znacznem rozwinięciem się zarodka w stosunku do bielma, któremu prawie wyrównywa. Pnące się ich łodygi odznaczają się sposobem tworzenia się drewna, którego słoje oddzielone tyłuż warstwami komórek, nie odpowiadają wcale następstwu lat; podobne są do łodygi opisanéj i przedstawionéj na fig. 110, z tą tylko różnicą, że małe wiązki łyka ukazują się w jednym tylko, najwewnętrzniejszym słoju. Korzenie wielu gatunków są gorzkie i jędrniące, mianowicie zaś korzeń znany pod imieniem kolumbo (*Colombo*), dlatego téż używane są w wielu obcych krajach przeciw zimnicom. Owoce bywają często narкотyczne, i dlatego z rybotruju indyjskiego (*Cocculus indicus*) używane są w owém zakazaném rybolóstwie, przy którym zbiera się tylko ryby otrętwiałe, pływające na powierzchni wód, do których wrzuciliśmy ten owoc. Odkryto w nich oso-

bną alkaloidę *pikrotoksynę*, od której zdaje się zależeć rzezczone własność.

§ 794. W kwaśnicowatych, krępieniowatych i miesiącznikowatych pręciki leżą naprzeciw płatków; lecz okazaliśmy już (§ 386), że to jest koniecznym następstwem ułożenia części kwiatowych w okółki trójkowe, a podwójne dla każdego rodzaju narzędzi. Inaczej się ma w **winoroślowych** (*Ampelideae* v. *Viniferae*) gdzie okółki są piątkowe lub czwórkowe, a gdzie pomimo tego płatki w liczbie 4 lub 5, leżą naprzeciw



pręcików (fig. 640). Tu naprzeciwległość jest skutkiem płonności całego jednego okręgu pręcików, jak tego dowodzą zarody ich mające postać pięciu łat w rodzaju *Leea*. Związek siedzący na środku grubego gruczołowatego krążka (fig. 642),

640-647. Narzędzia owocowania winorośli (*Vitis vinifera*).

640. Zarys kwiatu.

641. Kwiat w chwili rozkwitnienia, kiedy płatki *p* oddzielają się u spodu pozostając połączone u góry. — *c* Kielich. — *g* Gruczoły. — *e* Pręciki, których tylko nitki widać.

642. Kwiat po opadnięciu płatków. — *g* Gruczoły. — *e* Pręciki. — *p* Słupek.

643. Przecięcie pionowe kwiatu. — *c* Kielich. — *p* Płatki. — *e* Nitki. — *o* Związek z dwiema komorami i zalążkami wzniesionymi. — *s* Znamię.

644. Owoc (jagoda winna).

645. Nasiono (pospolicie: ziarnko).

646. Toż samo przecięte pionowo. — *t* Powłoka. — *p* Bielmo. — *e* Zarodek.

647. Toż samo przecięte poziomo przez środek. — *t* Powłoka. — *p* Bielmo.

którego brzeg obsadzony jest pręcikami, nosi na sobie szyjkę i znamię pojedyncze; zawiera zaś 2—6 komór, na spodzie których przytwierdzone są wzniesione zalążki, pojedynczo lub po dwa (fig. 643). Dojrzewając zamienia się on w jagodę; powszechnie zaś znajome są ziarnka czyli jąderka (fig. 645) jakie się w tejże znajdują. Pod drzewną prawie ich powłoką znajdujemy bielmo twarde, dwa razy dłuższe od zarodka osiowego, zwróconego ku znaczkowi (fig. 646). Rośliny te są krzewami najczęściej pnąciami się, o węzłach nabrzmiąłych i mogących stawowacić, o liściach naprzemianległych łatwych lub złożonych z wielu listków pierzastych lub dłoniastych. Widzieliśmy jak kwiatostany leżące naprzeciw tych liści mogą się zmieniać w wąsy (§ 185, fig. 172). Wspomnieliśmy o wielkości naczyń prowadzących oskolnicę, o sile i obfitości tej ostatniej (§§ 257, 259) w łodygach. Niektóre łodygi jak np. wielu winobluszczów (*Cissus*) podobne są ze słojuw naprzemian ułożonych drzewa i komórek do łodyg miesięcznikowatych; lecz nie znajdujemy w nich łyka, które w winorośli oddziela się co rok wraz z całym pokładem kory. Nie mamy potrzeby wymieniać użytków jakie człowiek ciągnie z winorośli. Obficie w miazdżu znajdujący się cukier obok kwasu roślinnego (winnego), nadaje owocom świeżym przyjemny smak, w suchych zgęszcza się, a udzielając sokom własności drożdżenia, pozwala zamieniać je w napój, najbardziej ze wszystkich wysokowych ceniony.


§ 795. **Parolistnikowate** (*Zygophylleae*), **rutowate** (*Rutaceae*), **wonnokrzewowate** (*Diosmeae*), **zębolicowate** (*Zanthoxyleae*) i **bieguniecznikowate** (*Simarubeae*) tworzą razem grupę bardzo przyrodzoną, i bywają nawet niekiedy łączone w jedną rodzinę, nazywaną wspólnem imieniem rutowatych, której przeto stanowią wtedy tylko plemiona. W naszych jednakże tablicach rozłączyliśmy je, ponieważ w jednych nie ma bielma, w innych zaś takowe się rozwija. Widzimy wprawdzie, że dwojaka ta budowa znajduje się w jednej i tej samej rodzinie, a mianowicie w wonnokrzewowatych; lecz znamionuje ona tam oddziały, tém wyraźniej różniące się od siebie, że rośliny składające je zamieszkują różne części świata: tak np. gatunki rosące w Nowej Holandyi opatrzone są bielmem; afrykańskie nie mają go wcale, równie jak część amerykańskich (*Cuspariae*), odznaczających się nadto liścieniami roz-

maicie pomietemi, poskładanemi na sobie samych i na kielku który okrywają. Bielmo parolistnikowatych jest rogowe, sąto zioła, lub częściej krzewy albo drzewa o liściach naprzeciwległych, z których jeden zwykle daleko mniej bywa rozwinięty od drugiego, tudzież o kwiatostanie skończonym. Drewno ich bywa niekiedy bardzo twarde, jak np. w gwajakach, w których téż posiada, równie jak kora, własności pobudzające, zależące bez wątpienia od osobnego pierwiastku: *gwajacyny*, porównywanéj z żywicą, chociaż się od takowéj niektórymi piętnami różni. W trzech następnych rodzinach, obejmujących w ogóle same tylko rośliny drzewne, znajdujemy prawie zawsze wielką ilość olejku, którego obecność wskazują nam kropki przezroczyste, jakie się widziéć dają na liściach, jeśli takowe naprzeciw światła trzymamy; kropki te odpowiadają maleńkim zawieralnikom olejku lotnego bezbarwnego. Z tego powodu wiele roślin téj rodziny posiada własności pobudzające, jako ogólny przymiot olejków lotnych, tudzież zapach aromatyczny nadzwyczaj mocny i zdaleka czuć się dający, jak się o tém przekonać można na rucie i dyptanie w ogrodach naszych, lub na wonnokrzewach naszych szklarni. Żeglarze zbliżający się do przylądka Dobréj Nadziei, uczuwają często na pełném jeszcze morzu powiew wonny, który pochodzi od licznych gatunków téj rodziny, pokrywających rzeczoną krainę. Owoce niektórych żółtodrzewowatych posiadają także te własności, a imię „pieprzników“ (*Poivriers*), jakie im nadano, dostatecznie tego dowodzi; w innych jednakże istnieje obok tego pierwiastek gorzki, udzielający korze własności przeciw-zimniczych, mianowicie téż sławnéj korze *angustury* (*Ticorea febrifuga* [?]). W bieguncznikowatych znajduje się sam tylko pierwiastek gorzki, z kąd téż i własności ich różnią się nieco od poprzednich, jak tego dowodzi użytek lekarski kory biegunczniku (*Simaruba*) i kwassyi (*Quassia amara*). W téj ostatniej znaleziono istotę żywicowatą: *kwassynę*.

§ 796. Opisaliśmy już szczególniejszy owoc **bodziszkowatych** (*Geraniaceae*) [§ 520, fig. 410]. Rośliny hodowane w ogrodach pod imieniem *geranjów*, a których odmiany nadzwyczaj się pomnożyły, należą wszystkie do rodzaju *Pelargonium* i pochodzą z południowéj Afryki.

§ 797. W słazowatych (*Malvaceae*) widzimy jeszcze przykład owych wielkich przyrodzonych skupień, które obejmują

w sobie mnogie rodziny: dlatego téż rodzina początkowo nosząca to imię, zawiera dziś: **zatwarowowate** (*Sterculiaceae*),



648-656. Narzędzia owocowania jednego ze ślazów (*Malva sylvestris*).  
648. Kwiat widziany z góry, wraz z szypułką opatrzoną dwoma przylistkami *s*.

649. Zarys tegoż.

650. Przecięcie pionowe kwiatu. — *z* Kielich zewnętrzny czyli pokrywa. — *c* Kielich. — *p* Płatki. — *e* Rurka pręcików jednowiązkowych, rozszerzona w rodzaj sklepienia ponad zawiązkiem *o* i zrosnięta przy nasadzie z płatkami, u wierzchołka zaś podzielona na mnóstwo nitek noszących pylniki *a*. — *s* Szyjki oddzielne u wierzchołka, niżej zrosnięte w jedną.

651. Pylnik odosobniony wraz z wierzchołkiem nitki.

652. Owoc otoczony kielichem trwałym. — *c* Guziki ułożone w okółek, połączone osią *a*.

653. Guzik odosobniony widziany z boku.

654. Nasiono.

655. Zarodek.

656. Przecięcie poprzeczne tegoż przez środek długości, dla pokazania położenia liścieni.

**różnolistowate** (*Bytneriaceae*), **serecznikowate** (*Bombacaceae*) i właściwe **ślazowate**. Te ostatnie u nas najwięcej znane, a o których śláz i topolówka (*Althaea*) może nam dać wyobrażenie, odznaczają się grubym kielichem o przedkwitnieniu lupinowatém (wspólném zresztą całej grupie), dosyć często otoczonym od zewnątrz pokrywą czyli kieliszkiem (fig. 273); płatki ich w ogóle duże, ukośne i przewrotno-sercowate, okręcone nawet bywają jeszcze po otwarciu się kwiatu; nitki pręcików połączone są w części swój długości w walec, który u dołu zrosnięty z nasadą płatków, u góry kończy się brzegiem pięciopłatkowym, od zewnątrz zaś dzieli się na większą lub mniejszą liczbę nitek, zakończonych pylnikami nerkowatemi, jednoworeczkowemi (fig. 311, 651), zawierającemi duże, kuliste i najeżone ziarna pyłku; owocki osadzone są okręgami około grubej środkowej osi mającej kształt słupa (fig. 408, 652), z wierzchołka tegoż wychodzą szyjki zrosnięte z sobą wyjąwszy na kończynach (fig. 389, 650 s); każdy z owocków zamyka jedno lub więcej nasion, w których zarodek bezbielmowy zakrzywia swój kielek pomiędzy pozaginane liście. Liście naprzemianległe, przylistkowe są po większej części mniej więcej głęboko na łaty podzielone, i wtedy zazwyczaj łatwo ulegają odmianom. Różne części tych roślin zawierają zwykle wiele istoty klejowatej, nadającej im własności miękczące, z których też są tak słynne. Do téjto rodziny należy bawełnica (*Gossypium*), której nasiona pokryte są siatką cienkich niteczek stanowiących *bawełnę*, przedmiot tak ważny w przemyśle.

**Serecznikowate**, których kilka gatunków posiada również nasiona powleczone rodzajem pilści, używanej także niekiedy, lubo nie tak powszechnie, stanowią rodzinę tuż obok ślazowatych przypadającą i różniącą się od tychże raczej postawą niż piętnami owocowania wcale zresztą wydatnemi, a pomiędzy których kształt odrębny pyłku jest może najstalszym. Wspominamy tu zresztą o nich tylko dlatego, iż pomiędzy nimi znajdują się największe rośliny na ziemi. Najznajomszym z nich jest światogłęd (*Adansonia*) zamieszkujący zachodnie brzegi podzwrotnikowej Afryki. Jednakże i inne jeszcze serecznikowate, mogą prawie iść w porównanie z tym olbrzymem roślinnym. Gałęzie ich rozciągające się daleko i skierowane ku wierzchołkowi, zbliżają się do ziemi, nachylając się pod wła-

snym ciężarem i pokrywają tak znaczną przestrzeń ziemi, że jedno drzewo widziane z pewnej odległości, zdaje się być całym gajem. Dzieje się to tém bardziej, że drzewa rzezone rosną bardziej w szerokość niż w wysokość, a łodyga ich zamiast wznosić się w słup, nabrzmiewa raczej w niekształtną kłodę. Przeglądając w kosztownych botanicznych dziełach widoki, na których starano się przedstawić roślinność zwrotnikową, postrzeżemy wiele drzew tej rodziny, odznaczających się bądź ogromem swych wymiarów, bądź dziwnością swych kształtów. Wymieniamy tu pod tym względem gatunek: *Chorisia ventricosa*, której pień rozszerzony w średniej części swjej wysokości, a zwężony zwolna u dołu i u góry, przedstawia kształt olbrzymiego wrzeciona.

Do **różnolistowatych** należy drzewo dostarczające *kakao* (*Theobroma*). Jegoto zarodek, mięsisty, oleisty, cisawej barwy i zbitości wosku, po przepaleniu służy do wyrabiania czekolady, w której gorycz dosyć znaczna owjej istoty, złagodzoną zostaje przez dodanie cukru. Olejowaty miążdż, wypełniający komorę, otacza nasiona, posiada w części ich smak, i używa się pod imieniem *masła kakaowego*.

§ 798. **Cistronkowate** (*Ternstroemiaceae*) dzielą się na wiele pokoleń, z których *kameliowe* (*Camelieae*) zastanowią nas tu chwilę, z powodu dwóch krzewów, jakie do nich należą: jednym z nich jest *kamelia*, która dla piękności swych kwiatów (zwanych pospolicie *różami japońskimi*) weszła w modę, i której uprawa wydała następnie tak liczne i piękne odmiany; drugi, którego kwiaty, lubo także piękne, rzadko jednakże komu są znajome, lecz którego liście stały się jednym z najważniejszych przedmiotów handlu, jest *herbata* (*Thea*). Wiadomo, że roślina ta pochodzi z Chin, które jej też dostarczają całemu światu, chociaż usiłowano zaprowadzić uprawę jej w niektórych innych krajach, a mianowicie w Brazylii. Zebrane młode liście prażą się lekko i wyciskają, dla pozbawienia ich soku obitego, ostrego i nieco gryzącego; następnie zostają skręcane i suszone prędkiej lub wolniej, podług tego jak idzie i przysposobienie herbaty zielonej lub czarnej, na którą prócz tego biorą się liście nieco starsze, a przeto bardziej zdrewniałe. Tym sposobem przyrządzone liście zawierają oprócz wielu istot wspólnych wszystkim innym częściom zielnym roślin, trzy jeszcze inne istoty, nadające im szczególne

własności: 1° olejek, udzielający herbacie zapachu; 2° *teinę*, związek poczwórny, bogaty w saletroród, bowiem złożony z 8 atomów węgla, 10 wodorodu, 2 saletrorodu i 2 kwasorodu; 3° z sérownika (*caseinum*), istoty także saletrorodnej, którą poznaliśmy już wyżej (§ 301). Sérownik nie roztwarza się w ciepłej wodzie, rozpuszczającą inne dwa pomienione związki, które przeto same tylko znajdują się w naciągu herbaty, używanym do picia. Napój ten nietylko więc jest pobudzającym, lecz i pożywnym także, ponieważ może zawierać około 6 części teiny, na 100 części użytej herbaty; zwykle jednak zawiera jej nieco mniejszą ilość, a to podług jakości herbaty i mniejszego lub większego stopnia roztworzenia jej pierwiastków. Ta własność herbaty, niegdyś tak podejrzanej, tłumaczy nam używanie jej tak powszechne w wielu krajach, tudzież moc jaką się zwykle nadawac jej naciągowi. Chińczycy zaś i inne ludy azyatyckie, nie przestają na tém, lecz jedzą jeszcze liście zagotowane. W rzeczy samej po oddzieleniu związków rozpuszczalnych, liście herbaty zawierają jeszcze sérownik, w takiej ilości, że pozostałość owa może go mieć do 23%, i dostarczac przeto pożywienia bogatszego jeszcze w saletroród, niż sam napój.

§ 799. **Zółtosokowate** (*Guttiferae*) winny nazwisko swe obecności soku gumo-żywicznego, zazwyczaj żółtego, ostrego i gorzkiego, znanego z wielu gatunków tej rodziny, pod imieniem *gumigutty*, która w malarstwie tak powszechnie jest używaną. Silne nadzwyczaj działanie gumigutty, która w pewnej dozie sprowadza prawdziwe otrucie, w skutek zapalenia, spowodowało zaniedbanie użycia jej wewnętrznego, chociaż niektóre, bardzo działalne, czyszczące lekarstwa, winny jej podobno część swojej mocy. Miazdż owoców nie zawiera w sobie tego soku, ponieważ wiele z nich jest jadowitych, jeden nawet: *mangostan*, uchodzi za najwyborniejszy owoc podzwrotnikowy.

§ 800. O **krasnosokowatych** (*Erythroxyloae*) wspomniemy tu tylko dla *koki* (*Erythroxyllum coca*), rośliny, której liście bardzo są używane w Peru; mieszkańcy tameczni, szczególnież téż robotnicy w kopalniach żują je, przymieszawszy nieco miłkięj krédy. Mówią, że przez to można się obejść długi czas bez wszelkiego pokarmu, nawet przy dość ciężkiej pracy; zdawałoby się więc, że liście te, zawierają podobnie

jak herbata, pierwiastek bardzo pożywny. Jednakże inni podróżnicy przypisują im wcale odmienne własności, mało zgodne z opowiadaniem pierwszych, a mianowicie własności narkotyczne, których moc przechodzić ma nawet opium. Zajmującym przeto byłby rozbiór chemiczny tej rośliny.

§ 801. **Nagwiadzkowate** (*Malpighiaceae*) posiadają załążek nazwany przez Grisebach'a *wędzidłowatym* (or. *lycotropum*; od *λύκος* wędzidło.) Przedstawia on rzeczywiście kształt wędzidla, albo raczej wędki, której połowę jednego ramienia tworzy sznureczek zwieszony, załążek zaś zgięty w kierunku przeciwnym, stanowi zakrzywienie jej i drugą połowę wstępującą; zarodek też układając się według zgięcia załążka w którym się tworzy, posiada liścienie zagięte na sobie samych. Wspomnieć należy, że w tej równie jak i w następnej rodzinie, i w wielu innych wielopłatkowych, jedna część gatunków posiada owoce mięsiste, druga zaś owoce suche, a szczególniej skrzydłaki: same nawet nagwiadzkowate mogą nam dostarczyć najrozmaitszych odmian tego rodzaju owoców. Przedstawiliśmy jeden z takowych na fig. 404. Wszystkie te rośliny są drzewami lub krzewami; wiele też pomiędzy nimi napotkać można pnączów odznaczających się wyjątkową swą budową (§ 86; fig. 106, 107). Opisaliśmy już także (§ 251; fig. 218) budowę gruczołów siedzących na liściach i ogonkach, a których obecność jest nadzwyczaj znamionującą dla listeczków kielicha; na grzbiecie bowiem tychże zrastają się owe gruczoły z sobą parami; opisaliśmy jeszcze włosy właściwe rodzajowi nagwiadki (§ 248, fig. 214), od którego też wzięły swe imię.

§ 802. **Zapianowate** (*Sapindaceae*) odznaczają się także budową swych pnączów (§ 88, fig. 109), równie jak częstym brakiem umiaru pomiędzy pręcikami (których liczba zmniejszoną bywa do 8), a okrywami kwiatowemi (których liczba jest płatkowa); każdy też płatek ich bywa częstokroć podwojony, jakoby drugim wewnętrznym płatkem. Mięsiste owoce wielu gatunków są jadalne, a owoce żyźnicy (*Euphoria*), znane pod imieniem *litchi* i *longan*, są najwięcej w Chinach cenione. Owoc gatunku zapianu: *Sapindus saponaria*, i kilka innych, odznacza się inną znowu własnością swego mięsiwa, które rozpuszcza się powoli nakształt mydła w wodzie, zabiela takową, tworzy na niej pianę i czyni ją zdatną do

prania. Za pomocą wysokoku otrzymać można z mięsiwa tego istotę białą, łatwo rozpuszczalną w wodzie, w której sprawia dopiero wspomniane zjawiska; obojętną, nietłną, złożoną z węgla, wodorodu i kwasorodu: istota ta zowie się *saponiną* i otrzymuje się podobnie z korzenia mydlniku (*Saponaria*) tudzież innych goździkowatych.

§ 803. W **miodkowatych** (*Meliaceae*) napotykamy uderzający przykład podwojenia pręcików, o którym mówiliśmy powyżej (§ 429). Nitka spojona jest w całości lub w części z paseczkiem dość szerokim i zwykle dwurębnym u wierzchołka, a umieszczonym ku zewnątrz. Paseczki te znowu zrastają się z sobą brzegami, i tworzą tym sposobem rurkę noszącą pręciki. Inna krótsza rurka otacza częstokroć zawiązek. Nasiona albo są opatrzone bielmem (w *miodkowych* [*Meliaceae*]) albo też takowego nie posiadają (w *trójnatkowatych* [*Trichiliaceae*]). Liście bywają najeźściej złożone raz, lub kilka razy. Gorzkie, ściągające i jędrniące własności tych roślin mogą dojść do tego stopnia, iż wzbudzają wymioty, przeczyszczenie, a nawet mogą być jadowitemi. Gorycz znajduje się także w oleju nasion mięsistych niektórych gatunków, a mianowicie w rodzaju *Carapa*; dlatego mieszkańcy Gujany pocierają olejem tym ciało, aby je ustrzedz od ukąszenia owadów.

§ 804. W **cedrzeńcowatych** (*Cedrelaceae*), rodzinie bardzo bliższej a nawet dawniej połączonej z poprzednią, znajdujemy też same pierwiastki, lecz inaczej powiązane, tak iż pobudzające znikają prawie, gorzkie zaś przeważają i nadają niektórym gatunkom własności przeciw-zimniczne; kora też takowych używana bywa z tego powodu w krajach w których rosną. Pierwiastki rzezczone pomagają bez wątpienia także do zachowania drewna od zniszczenia przez owady i przyczyniają się do długiej trwałości, równie jak cienkość i twardość słoju. W rzeczy samej drzewa téj rodziny, dostarczają najlepszych gatunków drewna używanego do kunsztowniejszych stolarskich robót; dosyć tu będzie przytoczyć mahoni (z *Swietenia mahagoni*), lubo wiele innych, mniej wprawdzie rozszerezonych przez handel, równie, a nawet bardziej jeszcze, w ojczyźnie swój jest cenionych.

§ 805. **Pomarańczowate** (*Aurantiaceae*) mają za wzór pomarańczę, której owoc nazwany od niektórych *pomarańczakiem*, *hesperidium*, zajmował nas już kilkakrotnie (§ 505,

512, 521). W większej części rodzajów owoc jest taki sam, wyjąwszy odmiany postaci, wielkości, barwy i smaku, których rozmaitość jest nadzwyczaj wielka, i stanowi uderzający przykład wpływu uprawy na rośliny hodowane. Wszystkie części opatrzone są małemi gruczołkami pęcherzowatemi, czyli wydrążeniami wypełnionemi olejkiem, którego przyrodzenie może się różnić według różności narzędzi. Gruczoły te są przyczyną, dla której trzymając liście naprzeciw światła, spostrzegamy na nich mnóstwo przezroczystych kropek. Liście te są proste lub złożone; w pomarańczy zdają się być prostemi, lecz obecność dwóch skrzydełek liściowatych na ogonku i staw jaki się przed niemi znajduje, pokazują jawnie, iż liść jest trójlistkowy. Drewno tych roślin jest twarde i zbite, i jako takie używa się w stolarstwie, jak np. z cytryny.

#### WIELOPLATKOWE KOŁOZAWIĄZKOWE.

§ 806. Kołozawiążkowe można podzielić podobnie jak podzawiążkowe, podług ułożyszcznienia kątnego lub ściennego. W jednych rodzinach nasiona opatrzone są bielmem, w innych takowego nie posiadają; dlatego ustanowić można dwa oddziały kołozawiążkowych o ułożyszcznieniu kątném, pomiędzy którymi umieścimy kołozawiążkowe, o ułożyszcznieniu ścienném, a tym sposobem otrzymamy szereg, lepiej wiążący się z częścią poprzedzającą i następną szeregu ogólnego.

(Tablica XI, str. 662.)

§ 807. Wiele rodzin, jak **rozpestlinowate** (*Spondiaceae*), **osoczynowate** (*Burseraceae*), **wislibobowate** (*Connaraceae*) **terpentynowcowate** (*Therebinthaceae*), łączono dawniej w jedną, noszącą ostatnie z wymienionych nazwisk. W rzeczy samej posiadają one niektóre wspólne piętna, lecz także i wiele odrębnych, mianowicie, co się tyczy owocu, który się składa z owoców oddzielnych o zarodku wprostległym w terpentynowcowatych, wsteczległym w bobniowatych; z owoców zrosniętych w pestczak o wielu pestkach w łzawcowatych; w pestczak zaś o jednej pestce wielo-komorowej w śliwcowatych. Płonności dosyć się często zdarzają w kwiatach wielu gatunków tych rodzin, tak iż niektóre zdają się przez wyjątek należeć do osłonopłciowych lub do bezpłatkowych. Jednakże

WIELOPLATKOWE KOŁOZAWIĄZKOWE.

1. Ułożyszcznienie osiowe. Nasiona bezbielmowe.

Kielich	wolny. Owocki	zrosnięte. Nasiona w liczbie oznaczonej. Kwiaty kształtne	Pestczak	2 3 komory. Szyjka 1. Liście płaskie. Pręciki w liczbie równej częściom innych okółków . . . . .	} PRZYROŚLOWATE ( <i>Chaillotiaceae</i> ).													
				o pestce 5-komor. Szyjek 5. Liścienie płaskie. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .		} ŚLIWCOWATE ( <i>Spondiaceae</i> ).												
				o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .			} OSOCZYNOWATE ( <i>Burseraceae</i> ).											
				o pestce 5-komor. Szyjek 5. Liścienie płaskie. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .				} BOBNIOWATE ( <i>Connaraceae</i> ).										
				o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .					} TERPENTYNOWCOWA. ( <i>Terebinthaceae</i> ).									
				o pestce 5-komor. Szyjek 5. Liścienie płaskie. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .						} STRĄKOWE ( <i>Leguminosae</i> ).								
				o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .							} STRĄKOWE ( <i>Leguminosae</i> ).							
				o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .								} RÓŻOWATE ( <i>Rosaceae</i> ).						
				o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .									} WONIAŁOWATE ( <i>Calycantheae</i> ).					
				o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .										} GRUBOSZOWATE ( <i>Crusulaceae</i> ).				
				o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .											} OTUŁKOWATE ( <i>Vochysiaceae</i> ).			
				o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .												} KRWAWNICOWATE ( <i>Lythariaceae</i> ).		
				o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .													} ZACZERNIOWATE ( <i>Melastomaceae</i> ).	
				o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .														} JABŁONIOWATE ( <i>Pomaceae</i> ).
				o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .														
o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .	} DZIEŻYCOWATE ( <i>Lecythideae</i> ).																	
o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .		} POJAWKOWATE ( <i>Barringtoniaceae</i> ).																
o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .			} MIRTOWATE ( <i>Myrtaceae</i> ).															
o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .				} MALICZKOWATE ( <i>Leptospermeae</i> ).														
o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .					} DZIWKOWATE ( <i>Rhizophoreae</i> ).													
o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .						} TRUDZICZKOWATE ( <i>Combretaceae</i> ).												
o 2-5 pestkach. Szyjka 1 lub żadna. Liścienie pomięte. Pręciki w liczbie dwa razy większej od części innych okółków . . . . .							} WIESIOŁKOWATE ( <i>Onagrarieae</i> ).											

\*\* Pylniki krzywe, otwierające się przy nasadzie. Komory liczne. Owoce mięsiste. Liścienie skręcone. Przylistki 0.

proste, otwierające się w całej długości. Zarodek o kielku

bardzo długim. Liścienie płaskie. Komora 1-więcej. Przylistki . . . . .  
bardzo krótkim. Liścienie skręcone lub pomarszczone. Komora 1 o wielu zalążkach zawieszonych u wierzchołka. Pylek jajowaty. Przylistki 0 . . . . .  
płaskie. Komory liczne. Pylek trójróżkowy. Przylistki 0 . . . . .

(Dalszy ciąg tablicy XI).

2. Ułożyszcznienie ścienne.

Zarodek leżący w osi mięsistego bielma.	Pręciki leżące naprzeciw płatków wiązkami, naprzemian względem łusk wielowrębnych. Szyjka 1. Ziola. Liście zwykle naprzeciw. — OŹWIOWATE ( <i>Loasaeae</i> ).
	lub pojedynczo, naprzemian względem gruczołów. Szyjki liczne. Drzewa. Liście naprzemianległe. .... UMIARKOWATE ( <i>Homalineae</i> ).
	naprzemian względem płatków, } zrośnięte w słup. środkowy. } wierzchołkowe. Osnówka. Zarodek o liścieniach liściowatych. Rośliny pnące. Przylistki. .... MĘCZENICOWATE ( <i>Passifloraeae</i> ).
	w równej liczbie z temiż... } Zawiązek wolny. Szyjki } boczne. Osnówka 0. Zarodek obły. Rośliny niepnące. Przylistki 0. .... ZAZIOEKOWATE ( <i>Malesherbiaceae</i> ).
	wolne. Zawiązek wolny. Torebka 3-lupinowa. Zarodek o liścieniach liściowatych. .... NIŻAWKOWATE ( <i>Turneraceae</i> ).
	Torebka 2-3-lupinowa. Zarodek obły. Pręciki często w liczbie podwójnej względem płatków. .... ŁOMIKAMIENIOWATE ( <i>Saxifrageae</i> ).
	przyrosły. Jagoda. Łożyszcznie 2. Zarodek maleńki w kończynie dużego bielma. .... PORZECZKOWATE ( <i>Grossulariaeae</i> ).
pozbawiony bielma. } Pręciki	{ w liczbie oznaczonej, podwójnej względem płatków; jednowiązkowe. Pylniki 1-woreczkowe. Zarodek wolny. Szyjka i znamię pojedyncze. Torebka 3-lupinowa. .... STRADAEKOWATE ( <i>Moringaeae</i> ).
	{ w liczbie nieoznaczonej, równie jak płatki. Pylniki 2-woreczkowe. Zawiązek przyrosły. Szyjka długa. Znamiona liczne. Jagoda. Rośliny mięsiste. .... CIERNĆOWATE ( <i>Cacteeae</i> ).
otaczający mięsiste bielmo. Pręciki i płatki w liczbie nieoznaczonej. Pylniki 2-woreczkowe. Zawiązek w pół przyrosły. Znamiona liczne bezszyjkowe. Torebka pękająca komorowo. Rośliny mięsiste. ....	SOCYZYTKOWATE ( <i>Fivideae</i> ).

3. Ułożyszcznienie osiowe. Nasiona opatrzone bielmem.

Nasiona w liczbie nieoznaczonej. Zawiązek wielokomorowy, wolny. Pręciki w liczbie podwójnej względem płatków, leżące naprzemian względem przysadków płonnych. Torebka 4-komorowa. ....	OZIĘBLOWATE ( <i>Francoaceae</i> ).
wolny lub przyrosły. Pręciki w równej lub podwójnej liczbie. Owocki oddzielne } u wierzchołka. Tyleż oddziel. szyj. — ŁOMIKAMIENIOWATE ( <i>Saxifrageae</i> ).	
bez przysad. naprzemianl. } dwójnej liczbie. } Owocki oddzielne } od samej nasady. Szyjka 1. .... — TWARDZICZKOWATE ( <i>Escallonieae</i> ).	
	albo wielokrotne. Torebka pękająca u wierzchołka, lub rozdzierająca się bocznie. Szyjki oddzielne lub zrośn. } JAŚMINOWATE ( <i>Philadelphaceae</i> ).
w liczbie nieoznaczonej. Pylniki otwierające się u wierzchołka Torebka 2-komórkowa. Szyjki oddzielne. ....	NIEMARZANKOWATE ( <i>Baneraceae</i> ).
w liczbie oznaczonej. Zawiązek przyrosły. Zalążki zawieszane. Zarodek w osi bielma, któremu prawie wyrównywa. * o liścieniach liściowatych. Zalążki 1-liczne. Owocki oddzielne u wierzchołka. Szyjek 2. Pręciki w lic. podw. względem płatk. Zalążek 1. Pestacek. Szyjka 1. Pręciki w liczbie równej lub wielokrotnej względem płatków. ....	ZAPOŹNIKOWATE ( <i>Hamamelideae</i> ).
	obły. .... Zalążek. Owocków 3-4 niepekających. Szyjki oddzielne. Pręc. w lic. równ. lub podw. wzgl. płatk. WĘGŁOSZOWATE ( <i>Halovageae</i> ).
	maleńki w kończynie dużego bielma. ** rogowy. Zalążek 1. Nielupka podwójna. Szyjek 2. Pręciki równe w liczbie płatków. Przedkwitnienie dachówkowe. .... BALDASZKOWE ( <i>Umbelliferae</i> ).
	mięsisty. Zalążek 1. Jagoda 2-wielokomorowa Szyjek tyleż. Pręciki równe w liczbie płatków. Przedkwitnienie łupinowe. .... BZOWICZKOWATE ( <i>Araliaceae</i> ).
	Szyjka 1. .... — BLUSZCZOWATE ( <i>Hederaceae</i> ).
	Pesteczek o pestce 3-komorowej. Szyjka 1. Pręciki w liczbie równe płatków. Przedkwitnienie łupinowe. .... DERENIOWATE ( <i>Cornaceae</i> ).
wolny } wstępujące. .... Zalążek 1-2. Owoc suchy 3-4-komor. Szyjki wolne lub zrośnięte. Pręciki w liczbie równe płatków. Przedkwitnienie dachówkowe. ....	POGOWICZKOWATE ( <i>Bruniaceae</i> ).
zarodek równy bielmu, } o liścieniach szerokich i liściowatych, o kielku bardzo krótkim. *** Zalążki 1-2, wstępujące. Owoc mięsisty, lub torebka pękająca przegrodowo. Pręciki w lic. rów. płatków, naprzeciw tychże leżące. Przedkwitn. kielicha łupinowate 1 lub więcej wstępując. Owoc mięsisty lub torebka pękająca komorowo. Pręciki w liczbie równej płatków, leżące naprzemian względem tychże. Przedkwitnienie kielicha dachówkowe. ....	SZAKEAKOWATE ( <i>Rhamneae</i> ).
	obły, o liścieniach bardzo krótkich. Zalążek 1 wzniesiony. Owocków 3-5 niepekających. Pręciki w liczbie równej płatków, naprzemian względem nich leżące. Paznokcie płatków zrośnięte. .... ZASTAŁKOWATE ( <i>Siackhousiaceae</i> ).

musimy je koniecznie przyłączyć do roślin liczniejszych i zupełnych, których wzór na sobie zachowały, pomimo niektórych zboczeń, o jakich mówiliśmy gdzieś indziej (§ 770).

**Osoczynowate** obejmują drzewa lub krzewy pełne soków żywicznych, z których wiele krąży w handlu pod imieniem balsamów i kadzideł. Przywieziemy tu tylko najznajomsze z nich, jakoto *balsam mekkański* dostarczany przez gatunek balsamodrzewu: *Balsamodendron opobalsamum*; *balsam gileadyjski*, z *B. gileadense*; *murrę* z *B. myrrha*; *elemi*, z *Icica heptaphylla*. *Boswellia serrata* wydaje prawdziwe indyjskie *kadzidło*, pod którego imieniem puszczanych bywa w obieg wiele innych istot żywicznych, bądź z pochodzących z roślin tej samej rodziny, bądź z roślin zupełnie różnych. W krajach zwrotnikowych, gdzie rosną te wszystkie drzewa, zwykle same ich gałęzie palone bywają w świątyniach. Jasną jest rzeczą, że wytwory te posiadają w różnym stopniu własności pobudzające, zależące w ogóle od żywic, i dlatego wiele z nich używa się w medycynie.

Te same istoty znajdujemy w **terpentynowcowatych**; lecz olejek rozpuszczający ich żywicę, posiada częstokroć nadzwyczaj ostre własności, a soki ich użyte przez skórę, lub co bardziej jeszcze, wewnątrznie (np. z wielu sumaków [*Rhus*]), sprowadzają przypadki mniej więcej gwałtowne; samym nawet wyzywom niektórych drzew tej rodziny przypisują podobne skutki. Lecz soki te oddają znaczne usługi sztukom; niektóre bowiem z nich dostarczają pięknych pokostów, oznaczanych niekiedy imieniem lak, które zrazu są białe, dopóki niezliczone cząsteczki istoty ustrojowej z jakich się one składają, są jeszcze rozdzielone i przez to odbijają światło w rozmaitych kierunkach; później kiedy rozłożone przy przystępie powietrza cząsteczki te połączą się w ciało jednorodne, przyjmują piękną czerwoną lub czarną barwę. Pierwsza z tych np. właściwa jest *lake japońskiej* (z *Stagmaria verniciflua*), druga *pokostowi japońskiemu* (*Rhus vernix*). Dwa gatunki pistacyj (*Pistacia lentiscus* i *atlantica*) dostarczają żywicy zwanéj *mastyksem* a *terpentynowicem* (*P. terebinthus*) żywicy zwanéj *terpentyną* z *Chio*; ztąd poszło imię nadane całej rodzinie, chociaż większa część gatunków terpentyny pochodzi, jakśmy to widzieli (§ 763) z innych rodzin. W niektórych owocach miążdz mięsowocni rozwija się tak dalece, iż

olejek istniejący obok niego, udziela mu tylko potrzebnego zapachu; nietylko więc że owoce takie nie są szkodliwe, ale nawet przyjemne, jak np. owoc mango ( *Mangifera indica* ). W jednym z takowych ( *Anacardium occidentale: noix d'Acajou* ) szypułka nabrzmiewa w ciało daleko większe od samego owocu. Nasienie bywa mięsiste i zazwyczaj oleiste, nie zawiera zaś żadnych innych pierwiastków pobudzających, jak tego znany przykład przedstawiają owoce pistacji ( *Pist. vera* ). Liście jednego z sumaków ( *Rhus coriaria* ), bogate w garbnik, używane są przez garbarzy.

§ 808. **Strąkowe** ( *Leguminosae* ). Owoc strąkowy (§ 517 fig. 406, 407) znamionuje wszystkie rośliny, noszące to nazwisko, a których grupa tak liczna, zdaje się być nie tak jedną, jak raczej skupieniem kilku rodzin. Z tych najliczniejszą jest rodzina *motyłkowych*, będąca zarazem najznajomszą, ponieważ sama tylko u nas się znajduje; wzięła ona swe imię od kwiatu, któryśmy wyżej opisali (§ 427, fig. 283, 658), odznacza się zaś prócz tego dziesięciu pręcikami, niekiedy wolnymi, częściej jedno- lub dwu-wiązkowymi, bądź że takowe zrosnięte są po pięć, bądź że jeden tylko z nich dziesięć, oddziela się od rurki utworzonej z dziewięciu innych (fig. 687, 658); nakoniec zarodkiem skrzywionym, którego kiełek zaagięty jest względem liścieni przykielkowych (fig. 471, 661). Kwiaty niekształtne jeszcze w *brezyłkowych* ( *Caesalpinieae* ) zachowują postać motylkową, lub zbliżają się do różowej; pręciki ich w liczbie 10, są najczęściej wolne, zarodek prosty. Liczba płatków zmniejsza się, w jednej nawet, bardzo zresztą szczupłej grupie ( *Swarzkieae* ) niema ich wcale, i tu właśnie liczba pręcików przechodzi niekiedy 10, a zarodek jest znowu skrzywiony. Ostatni i bardzo liczny oddział stanowią *czułkowe* ( *Mimoseae* ), których korona jest kształtna, równie jak i kielich; przedkwitnienie łupinowe, gdy tymczasem we wszystkich innych było dachówkowem, liczba pręcików równa się liczbie płatków, lub, co częściej, jest wielokrotną względem téjże, tak, iż staje się nawet nieoznaczoną; zarodek prosty. Uważać należy, iż osadzenie pręcików wyraźnie kołozwiązkowe w innych rodzinach, w dwóch ostatnich zbliża się coraz bardziej do dna kielicha i przechodzi w podzwiązkowe. Wspomnijmy także, iż niekiedy błona wewnętrzna nasienia bardzo grubieje i udaje prawie bielmo. Kilkakrotnie mieliśmy

sposobność mówienia o liściach, które u wielu strąkowych, są złożone raz lub wiele razy i częstokroć stawowate, a zawsze opatrzone przylistkami przy nasadzie ogonka. Zastanawiając się nad ogromną liczbą gatunków tej grupy, obejmu-



657.



658.



659.



660.



661.

657-661. Narządza owocowania jednej z motylkowych (*Lathyrus odoratus*).

657. Zarys kwiatu.

658. Przecięcie podłużne kwiatu. — *c* Kielich. — *e* Żągielek. — *a* Jedno ze skrzydełek. — *ca* Połowa łódki. — *t* Rurka przecikowa. — *o* Zawiązek odkryty wraz z zalążkami. — *s* Znamię.

659. Strąk złożony z dwóch łupin, dla pokazania osady nasion.

660. Nasiono odosobnione. — *f* Sznureczek. — *c* Osadka. — *m* Otworek.

661. Zarodek po rozłożeniu liściennic *cc*, dla pokazania pączuszka *g* ukrytego między niemi. — *r* Kielek.

jącej rośliny wszelkich wymiarów i najrozmaitszych postaci, począwszy od najwznioślejszych drzew, aż do najniższych ziół, należy spodziewać się, że znajdziemy zarazem pomiędzy niemi wielką różnorodność wytworów i własności. Za długo byłoby przeglądać je wszystkie z kolei, przestaniemy więc na wymienieniu znaczniejszych.

Wiele drzew téj rodziny używa się na budowlę w krajach swych ojczystych; tak np. we Francyi grochownik (*Robinia pseudo-acacia*) odznaczający się trwałością swą i opieraniem się wilgoci. Zbitość tkanki i ciemne barwy, jakie twardeziel wielu gatunków przybiera, zalecają je w stolarstwie, i czynią mniej więcej ważnym przedmiotem handlu. Przytoczymy tu drzewo *palisandrowe*, którego pochodzenie długi czas niewiadome, przyznane teraz zostało jednęj ze strąkowych (jednemu z gatunków dalbergii) drzewo *fernambukowe* (*Caesalpinia echinata*), *brezyljskie* (*C. bresiliensis*), *sappan* (*C. sappan*), drzewo *żelazne* (*Swartzia tomentosa*), *bafta* i tyle innych, pomiędzy któremi wspomniéby jeszcze można europejskie drzewo szczodrzenicy wielko-kwiatowéj (*Cytisus laburnum*). Znajdujemy téż pomiędzy strąkowemi wiele pnączów, odznaczających się jak tyle innych wyjątkową budową, której przykład przytoczyliśmy już wyżej (§ 85 fig. 105). Napotyamy w nich często zmatwanie słoju kory ze słojami drewna, tak, iż niekiedy znaleźć można naprzemian jedno po drugich leżące; innym zaś razem napotyamy rodzaj siatki utworzonéj z istoty korowéj w pośrodku drewna, żyłkowanego naówczas mniej lub bardziej wytwornie; widziéć to można dobrze w łądęgach słodiszku (*Glycine sinensis*), pnącza dość pospolicie teraz hodowanego dla pięknych kwiatów.

Liczne gatunki motylkowych zielnych, obfitują w pierwiastki pożywne i bywają uprawiane jako rośliny pastewne; z takichto składają się łąki sztuczne jak np. z koniczyny (*Trifolium*), lucerny (*Medicago*), sparcetty (*Onobrychis*) i t. d. W rzeczy saméj zawierają one wiele związków saletrorodnych, a widzieliśmy już (§ 288), że mogą brać pewną część saletrorodu z powietrza.

Te same własności znajdujemy częstokroć w liściowatym nasienniku; dlatego to łąpiny wielu młodych strączków są jadalne.

Co się tycze nasion, te bywają rozmaite: jedne o liścieniach cienkich i liściowatych, i te nie są pożywne; inne o liście-

niach grubych, które często służą za pokarm. Oneto dojrzewając, napełniają się mnóstwem skrobi, jak np. w fasoli, bobie, soczewicy, grochu, wyce i t. d., tudzież wielu innych mniej pospolitych lub obcych, których nasiona nie przywiodłyby nam na pamięć przedmiotów tak znajomych. Wspomnieć należy, iż skrobia pomieszana jest z bardzo obfitemi związkami saletrorodnemi, które pokarm ten czynią jeszcze pożywniejszym; wspomnieć należy i o tém, że skrobia tworzy się i gromadzi stopniowo w nasieniu, które w początku ograniczając się po większej części tylko na powłokach swych, posiada komórki wypełnione samemi rzeczonymi związkami, tudzież klejem słodkim, a przeto stanowi podówczas pożywienie różne od tego, jakie daje później. Groch np. mały i młody, tudzież stary i duży, sąto dwa pokarmy wcale odmienne, tak pod względem pożywności jak pod względem smaku. W innych znowu gatunkach liścienie są mięsisto-oleiste, jak np. w *Archis hypogaea* (pospolicie: *piścacya ziemna*), której nasiona mogą dostarczyć znacznej ilości oleju i która z tego względu stała się w ostatnich czasach przedmiotem spekulacyi. Innym razem lotne olejki udzielają nasieniu zapachu, i dlatego ziarna gatunku *Coumarouna odorata* (pospolicie *bób Tonko*) służy do zapachniania tabaki. Nasiona w liścieniach liściowatych posiadają częstokroć wcale przeciwne własności i sąją się środkami czyszczącemi: tak np. nasiona truszczeliny (*Colutea*), wielu janówców (*Genista*), szczodrzeńce i t. d. i t. d. Należy więc mieć się na ostrożności w próbach, jeśliby jakowe kto chciał przedsiębrać względem podobieństwa zewnętrznego owoców do naszych najpospolitszych jarzyn.

Własności czyszczące znajdują się i w innych częściach tych roślin, w liściach, tudzież w nasiennikach szczególnież téż liściowatych. Najznajomszym środkiem lekarskim jest pod tym względem *senes* (liście, a osobliwie owoce gatunków: *Cassia senna* i *acutifolia*, które przychodzą do nas ze Wschodu); otrzymujemy zeń właściwą istotę *katartynę*; która, jak się zdaje, jest tu pierwiastkiem działalnym; bez wątpienia zaś inny jeszcze pierwiastek zawiera miążdź wypełniająca wnętrze owocu kassyi pieszczalkowatej (*Catharthocarpus fistula*), tamarindy (*Tamarindus indica*) i chleba świętojańskiego (*Ceratonia siliqua*), działanie bowiem tegoż jest bez porównania łagodniejsze. Poprzednie własności znajdujemy szczególnież

w brezylkowych. W czułkowych zaś przeważają inne, jędrniące i ściągające, a których jeden tylko przywiedziemy przykład: w *catechu* z gatunku *Acacia catechu*; istota ta otrzymuje się przez wyciąganie, to jest przez gotowanie twardej tej rośliny, poczem odwar odparowuje się, zgęszcza i suszy. Obfitość garbniku tłumaczy nam te własności, i nadaje korze wielu innych roślin tej rodziny wielką wartość przy wyprawianiu skór.

Pomiędzy innemi wytworami niektórych strąkowych, znajdujemy różne żywice, jak np. żywica zwana *smoczą krwią* (*Sanguis draconis*) otrzymywana z *Pterocarpus draco*; tudzież kilka innych płynnych z powodu obecności olejku rozpuszczającego je w sobie; takimi są: balsam *kopaiva* (otrzymywany z licznych gatunków kopaiwniku [*Copaifera*, szczególnie *C. officinalis*]) inne połączone są z kwasem benzwinowym, i stanowią przeto prawdziwe balsamy, jak *b. peruański* (*Myrospermum peruiferum*), *toluański* (*M. toluiferum*).

Taż sama rodzina dostarcza nam gumm najbardziej cenniejszych, jak np. *arabska* (*gummi arabicum*), z różnych gatunków akacyj, szczególnie z *A. nilotica* (*g. dragant*), której pochodzenie przypisywano niewłaściwie podkrzewowi południowej Europy: *Astragalus tragacantha*, a który rzeczywiście otrzymuje się z gatunków wschodnich tegoż samego rodzaju, jakoto: z *A. gummifer*, *verus*, *creticus*). Nakoniec barwnictwo winno strąkowym wiele szacownych istot, jak: *drzewo kampszowe* (*Haematoxylum campechianum*), ci-sawo-czerwone, którego barwa z łatwością się udziela wodzie lub wyskokowi; a zależy od pierwiastku właściwego, zwanego *hematyną*; *indygo*, którego pierwiastek barwny *indygotynę*, opisaliśmy już w rodzinach od niniejszej bardzo dalekich, lecz która otrzymuje się szczególnie z wielu gatunków indygowcu (*Indigofera*). Rośliny te, dwuletnie, zbierają się zaraz w pierwszym roku, kładą się w wodę w której gniją, a która następnie zostaje ściągniętą i poruszaną przy przystępie powietrza, dopóki się nie zaniebieszczy, w skutek połączenia się kwasorodu z indygotyną, poczem ułatwia się strącenie istoty zawieszonęj, dodaniem wody wapiennej, a przez odparowanie, wypuszcza się otrzymamy osad.

§ 809. **Różowate** (*Rosaceae*). Jestto znówu rodzina, którą można uważać raczej za zbiór wielu rodzin, niedających się oddalić od siebie, gdybyśmy je nawet poddzielali. Badanie jej jest nauczającym, pokazuje nam bowiem, jak niektóre piętna mogą odmieniać się w jednej i tej samej przyrodzonej grupie; jak postępując za temi zmianami od jednej ostateczności do drugiej przez szereg kształtów pośrednich, nie możemy powątpiewać o związku, który je z sobą łączy; jak nakoniec widząc jedno piętno stałe obok innego, które się ciągle zmienia, uczymy się przyznawać mu daleko wyższą wartość



662.

663.



666.



664.

667.



668.

666.



669.

662-669. Narzędzia owocowania gatunku maliny (*Rubus strigosus*).

662. Zarys kwiatu.

663. Kwiat przecięty pionowo. — *c* Kielich. — *pe* Płatki. — *e* Preciki. — *d* Krażek wyścielejący dno kielicha i noszący na sobie preciki. — *pi* Słupek złożony z wielu owoców.

664. Pylnik odosobniony wraz z wierzchołkiem nitki, widziany od zewnątrz.

665. Zawiązek *o* przecięty pionowo, dla pokazania położenia zalążka *g*. — *s* Szyjka.

666. Owoc. — *f* Owociki mięsiste wraz z kielichem trwałym *c*, na którym widać jeszcze zwiędłe nitki.

667. Przeciecie pionowe jednego z owoców. — *s* Szyjka. — *m* Śródowocnia mięsista czyli mięsowocnia. — *e* Wococnia. — *g* Nasiono.

668. Przeciecie poziome nasienia. — *t* Powłoka. — *c* Liścienie.

669. Zarodek odosobniony.

względna. Słupek kwiatu jabłoni, składa się z zawiązka zrosłego z kielichem, i zawiera w grubym mięsiwie pięć małych komórek; słupek poziomki składa się znowu z mnóstwa małych oddzielnych owoców, siedzących na powierzchni zgrubiałej osi, wystającej ponad kielich wolny; w pierwszym razie mamy przykład owocu zrosło-owocowego, w drugim zaś najwidoczniej oddzielno-owocowego. Lecz weźmy kwiat tawuły (*Spiraea*), w którym pięć oddzielnych owoców osadzonych jest na dnie płaskim, w głębi kielicha jeszcze wolnego; weźmy następnie kwiat wiśni, w którym jeden tylko owocek otoczony jest kielichem podniesionym i wypłaszczającym się; następnie kwiat przywrotniku (*Alchemilla*), w którym kielich zawsze jeszcze wolny, zwęża swą rurkę ponad 4 owocami; nakoniec kwiat róży (fig. 369), gdzie owocki liczniejsze i rozrzucone, zdają się wyrastać z powierzchni wewnętrznej rurki, która nabrzmiała w równi z ich wierzchołkami, zamyka się ponad nimi, zostawiając tylko przejście szyjkom; pójdźmy jeszcze dalej i wystawmy sobie, że wszystkie te części w pomienionych przykładach oddzielone, łączą się w jedno ciało, a będziemy znowu mieli słupek jabłoni. A jednakże osadzenie pręcików nie zmieniło wcale, przypada bowiem zawsze na okręgu, ku wierzchołkowi rurki kielicha leżącym. Kołożawiazkowość więc pręcików stanowi piętno daleko stałsze i ważniejsze, niż stosunki kielicha lub owoców wolnych, albo zrosniętych z sobą.

Dodajmy do oznak poprzednich: że płatki ułożone w różyczkę osadzone są pod pręcikami na kielichu i przypadają naprzemian względem łat kielicha znajdujących się w równej liczbie (najczęściej w liczbie 5); że zarodek bezbielmowy prosty, o mięsistych liścieniach, zwraca krótki swój kielik ku punktowi przytwierdzenia ziarna, że liście bywają proste lub złożone, lecz zawsze opatrzone przylistkami, a będziemy mieli ogólne piętna różowatych. Zawiązek zrosły o dwóch zalążkach (rzadko mniej lub więcej) wstępujących w każdej komorze, a zamieniający się w owoc mięsisty, odróżnia nam wybornie *jabłoniowe* (*Pomaceae*). Liczne, oddzielne niełupki, otoczone kielichem mięsistym, osadzone w głębi niego, i zamykające pojedyncze zawieszzone nasiona, znamionują oddział różowych (*Roseae* albo właściwie *Rosaceae*). Dębikowe (*Dryadeae*) posiadają liczne niełupki na osadniku wystającym ze środka kwiatu; każda z nich zawiera nasiono zawieszzone lub wznie-

sione; *krwiściągowe* (*Sanguisorbeae*) odznaczają się niełupkami, których liczba zmniejszona jest do dwóch lub do jednego, a które pokryte są zwięzłą rurką stwardniałego kielicha, częstokroć bezpłatkowego; *tawułowe* (*Spireaceae*) pięciu owocami osadzonemi w okótek w głębi kielicha krótkorurkowego; każdy z nich zawiera najwięcej dwa zalążki, zawieszony lub wstępujące i otwierające się wzdłuż szwu wewnętrznego; *migdałowe* (*Amygdaleae*), jednym zawiązkiem wolnym o zalążkach zawieszonych obocznych, zamieniającym się później w pestczak; *złotomięsowe* (*Chrysobalaneeae*) podobnym zawiązkiem lecz o dwóch wzniesionych zalążkach. Jak prawie wszystkie leśne drzewa naszych umiarkowanych krain należą do kotkowych, tak znowu rodzina różowych obejmuje wszystkie rośliny tak zwane owocowe lub sadowe; ona bowiem dostarcza nam większej części owoców u nas jadalnych. Jabłka, gruszki, pigwy (*Cydonia*), niesplik, jarzębina, głóg, są owocami jabłkowych; wiśnie, śliwki, morele, brzoskwinie, migdały, owocami migdałowych; malin i poziomek dostarczają dębikowe. Uważać jednakże należy, że chociaż wszystkie te owoce pochodzą z jednej rodziny, nie we wszystkich jednakże jedna i ta sama część jest jadalna; w jabłkowych np. jemy kielich zgrubiały; w migdałowych mięsowocnią, wyjąwszy owoc migdału, którego nasiennik odrzucamy i spożywamy zarodek; w poziomkach jadalnym jest osadnik mięsisty noszący owocki; w malinach zaś owocki bez osadnika. Inną okolicznością godną uwagi jest obecność w migdałowych pierwiastku najjadowitszego ze wszystkich znanych, to jest kwasu pruskiego, który się znajduje w liściach i jądrach. Wchodzi on przeto, w nadzwyczaj jednakże małym stosunku do napojów wysokokowych otrzymywanych z owocu niektórych wisien, jak np. *maraskino* (z wiśni *marasca*); kirszwasser (z *trześni*).

§ 710. **Zaczerniowate** (*Malastomaceae*). Rodzina ta składa się prawie wyłącznie z roślin drzewnych. Naprzeciwgle ich liście odznaczają się ułożeniem swych nerwów, z których boczne (1-2-3 lub 4 z każdej strony) wystają równie jak główne, zmiernie jak on od podstawy ku wierzchołkowi liścia, zachowując wszędzie grubość prawie jednakową i łącząc się z sobą za pośrednictwem innych cieńszych i poprzecznych, tak, iż do pewnego stopnia przypominają liście niektórych jednoliściennych. Zawiązek zupełnie wolny w małej

liczbie gatunków, bywa w innych zwykle zrosnięty z kielichem, lecz niezupełnie i to w szczególny sposób, gdyż tylko na miejscach odpowiadających nerwom podłużnym, wystającym na powierzchni zawiązka; w przedziałach zaś pomiędzy temi nerwami zawiązek i kielich tworzą przerwy, w których pogrążone są młode pylniki, wychodzące później na wierzch wraz z nitkami. Pylniki te znowu godne są uwagi z powodu postaci podłużnej i łukowatej; dwa ich woreczki otwierają się u wierzchołka, przedłużonego częstokroć w dziobek, jedną lub dwiema dziurkami i połączone są zwórką, która nieraz wyrasta u dołu, w miejscu gdzie się łączy stawem z wierzchołkiem nitki i tworzy przysadki rozmaitego kształtu.

§ 811. **Mirtowate** (*Myrtaceae*). Rodzina ta dzieli się na kilka podrzędnych: 1° *Przeciężnikowe* (*Chamaelaucieae*), których zawiązek jednokomorowy zawiera jeden lub więcej zalążków wzniesionych, i zamienia się w owoc suchy jednoziarnowy, rozpadający się niekiedy na dwie łupiny; pręciki ich są w liczbie oznaczonej, podwójnej lub poczwórnej względem płatków: wiele z nich zazwyczaj płonnych, posiada nitki wolne albo, co rzadziej, połączone po trzy. 2° *Maliczkowe* (*Leptospermeae*) o zawiązku 2- lub wielo-komorowym, przechodzącym w owoc suchy, najczęściej torebkowy, zawierający liczne, rzadko zaś pojedyncze nasiona, o pręcikach nieoznaczonych co do liczby, wolnych lub połączonych w kupki naprzeciwległe względem płatków. 3° *Mirtowe* (*Myrtheae*) różniące się od poprzednich owocem mięsistym i pręcikami zawsze wolnymi. We wszystkich wymienionych roślinach liście posiadają mnóstwo kropek przezroczystych, będących znakiem zawieralników olejku, i nieznajdujących się w plemionach następujących: 4° *Pojawkowe* (*Barringtoniae*), których owoc jest jagodą o dwóch lub o kilku komorach nielechnoziarnych; pręciki liczne i najczęściej jednowiązkowe. 5° *Dzięźycowe* (*Lecythideae*), których nitki w liczbie nieoznaczonej zrastają się także w rurkę lecz zakrzywioną na podobieństwo kapturka; zawiązek o licznych wieloziarnowych komorach, przechodzi w owoc znacznej objętości, o nasienniku drzewnym niepekającym, lub otwierającym się poprzecznie tak, iż wierzchołek oddzielnym zostaje od reszty, nakształt nakrywy. Często się zdarza w dwóch ostatnich rodzinach, tudzież w niektórych rodzajach należących do innych powyższych, że różne części zarodka

zrastają się w ciałko jednorodne. Innym razem liście są liściowate i pomięte; w pierwszych są zwykle płaskie.

Olejek znajdujący się tak obficie w mirtowatych, nadaje im własności jędrniące i pobudzające, tudzież zapach aromatyczny. Każdemu znane są tak zwane *goździki*, będące pąkami jednej z tych roślin (*Caryophyllus aromaticus*). Tenże olejek udziela przyjemnej woni wielu jadalnym owocom, wspomniemy których wymienimy szczególnie *gujawę* (*Psidium*) i owoc *jabłuszniku*. Obok tego może się znajdować pierwiastek ściągający, który się wytwarza szczególnie w korze korzenia i w niedojrzałych owocach.

*Granowiec* (*Punica granatum*) przyłączanym bywa od wielu pisarzy do mirtowatych; inni zaś oddzielają go i stanowią z niego wzór, a dotychczas i jedyny gatunek rodziny *granatowcowatych* (*Granateae*). Odznacza się on nadewszystko szczególnym rozkładem swych komór, które zamiast tworzyć pojedynczy okółek, jak w większej liczbie zawiązków wielokomorowych, ułożone są we dwa okółki; z tych jeden jest niższy, drugi wyższy i odepchnięty na zewnątrz (§ 496). Z nierównego ich rozwinięcia wynika, iż wewnątrz dojrzalego owocu podzielone jest na wiele przegródek niekształtnych, a to za pomocą przegród ukośno-poprzecznych, z których wówczas trudno sobie jest zdać sprawę. Okrywa zewnętrzna nasienia rozrasta się w miążdź soczystą, i onato jest jadalną w granatach, z których odrzuca się cała część należąca do nasiennika, czyli skóra.

§ 812. **Wiesiołkowate** (*Onagrarieae v. Oenotheraeae*). Rodzina ta oprócz roślin dla których zachowaliśmy tu toż samo nazwisko, obejmowała jeszcze pierwiastkowo **trudniczkwate** (*Combretaceae*), z którymi łączą się ściśle **wyzycowate** (*Terminalieae v. Myrobalunaeae*), wyliczone w tablicach pomiędzy bezpłatkowemi, tudzież **węgłoszowate** (*Haloragaceae*). Niektóre rodzaje umieszczone w trzech rodzinach wielopłatkowych, nie posiadają wcale korony, a wyjątek ten dający się spostrzec w tylu innych roślinach, dowodzi potrzeby zbliżenia przynajmniej w szeregu roślin wielopłatkowych do bezpłatkowych, jeśli ich już nie chcemy całkowicie z sobą połączyć. Tablice nasze przedstawiają główne piętna, wzięte szczególnie z budowy nasienia, a według których wypadło podzielić rodzinę tę na kilka podrzędnych. Właściwe wiesioł-

kowate obejmują rośliny odznaczające się nie tak własnościami i użytkami swemi, jak raczej samą wytwornością swych kwiatów, dla której poszukiwane są do ogrodów. W częściach kwiatowych zwrócić należy uwagę na wielką rzadkość liczby piątkowej. Za to liczba czwórkowa ukazuje się tamże prawie zawsze, a widzieliśmy nawet okółki przywiedzione do dwóch tylko części w czarnokwiecie (*Circaea*, fig. 244); toż samo napotykamy w większej części węgłoszowatych. Inną rzeczą godną uwagi jest stała i nadzwyczaj odznaczająca się postać ziarn pyłku (§ 465, fig. 350, 351). Zdrożnym rodzajem tej rodziny jest kotewka (*Trapa*), roślina wodna, której owoce znane są pospolicie pod imieniem *kasztanów wodnych*, dla wydatności ciernistych nasiennika, tudzież dlatego, iż męczysty zarodek wielu jej gatunków, zamieszkujących stawy Europy i Azji jest jadalnym. Jeden z liścieni tworzy tu prawie całe ciało zarodka, drugiego zaś ślad tylko istnieje i to mniejszy od samego kielka, lubo także niebardzo rozwiniętego (§ 568).

§ 813. **Męczennicowate** (*Passifloreae*). Piękność ich kwiatu znanego powszechnie pod nazwiskiem *kwiatu męki*, połączona z pewną dziwacznnością wynikającą z obecności i sposobu ułożenia znacznej liczby przysadków, równie jak z rozkładu barw bardzo świetnych, rozmaitych i żywo odbijających, ścigały na nie oddawna uwagę. Tu zajmiemy się nimi tylko w celu objaśnienia, dlaczego umieszczone zostały pomiędzy kołożawiazkowemi, pomimo tego iż zdają się być na pozór podzawiazkowemi. W rzeczy samej pręciki i słupek siedzą tu zwykle na końcu trzonka wychodzącego ze środka kwiatu i przedłużającego oś rośliny. Lecz z drugiej strony płatki, których osada przypada zazwyczaj z osadą pręcików, wychodzą z wygięcia rurki kielicha; na powierzchni zaś jego nieco niżej osadzony jest jeden, lub dwa okręgi nitek barwnych, które tylko za spłoniąle pręciki uważać można. Gruczołowaty pokład dna, który wyściełając całą powierzchnię rurki, służy za podstawę rozmaitym owym częściom, przedłuża się także i na trzonek noszący pręciki, wiążąc tym sposobem widocznie osadę pręcików opatrzonych pylnikami z osadą płatków i nitek barwnych. Gruba i mięsista osnówka, otaczająca nasiona, jest jadalną w niektórych męczennicowatych. Miążdż zaś owoców dla obfitości i czystości soku, dla kwaskowatego i przyjemnego smaku, zaleca je szczególnie w krajach gorących, gdzie

tę rośliny te dziko rosną. Znaczna ich liczba hodowaną bywa w naszych szklarniach. Są to rośliny po większej części zielne i pnące się, opatrzone wąsami wychodzącymi z kątów liści i przedstawiającymi przeto przeobrażone gałązki.


§ 814. Powłoka także zewnętrzna nasienia, zamieniająca się w miążż i napełniona obfitymi a smakowitemi sokami, nadaje własności owocom **porzeczkwatych** (*Grossularieae*). Łatwo jest spostrzedz rozkład ten, otwierając uważnie owoc i oddalając z ostrożnością nasiona. Na pierwszy zaś rzut oka zdaje się, iż mięsiste okrywy samego owocu tworzą istotę miążżową, jednociągłą, pomiędzy ściśniętymi ziarnami, i ta to błędna myśl spowodowała niewłaściwe nazwanie nasion pogrążonych w miążżu (*semina nidulantia*).

§ 815. Przeciwnie w owocach **cierńcowatych** (*Cacteeae*), których pewne gatunki są jadalne w krajach południowych, mianowicie też owoc opuncyi (*Opuntia*) znany pospolicie pod imieniem *figi indyjskiej*, nasiennik zgrubiały tworzy miążż. Cierńcowate odznaczające się dziwacznosciami swych kształtów, dla której też poszukiwane są równie jak dla piękności kwiatów wielu gatunków, stanowią część tak nazwanych roślin mięsistych (*plantae grasses*), których tkanka komórkowa rozwijając się nadzwyczajnie, wzdyma rozmaicie łodygi i liście i nadaje im tym sposobem wymiary i postaci mniej więcej różne od tych, jakie przywykliśmy widzieć w większej części roślin. Rozwinięcie to tkanki, wiąże się zwykle z rzadkością szparek, czego następstwem jest bardzo słabe parowanie, nagromadzanie się soków wewnątrz rośliny i możność zachowania się ich przy życiu w klimatach nadzwyczaj suchych, w których niewytrzymałyby rośliny innej budowy. Wiązki drzewne rozrzucone są w daleko mniejszym stosunku po tej tkanke: słoje drzewne w niewielu tylko gatunkach widzieć się dają. Włókna lub naczynia, z których się składa drewno, posiadają w cierńcowatych szczególniejszą budowę, gdyż zamiast nitki skręconej w węzownicę, lub rozpadłej na pierścienie, napotykamy w nich blaszkę znacznej szerokości i grubości (§ 670, 671). Rodzina ta posiada niektóre rośliny o łodygach obłych, opatrzonych liśćmi, lub bezlistnych; lecz większa ich liczba przybiera kształt słupów w rozmaity sposób żłobkowanych, deszczulek spłaszczonych jak liście, albo też wreszcie owoców kulistych lub jajowatych, niekiedy nad-

zwyczaj wielkich i posiadających prawidłowo rozłożone, mniej

670.

671.



więcej wystające i ostre węgły. W tym ostatnim razie powstawanie pączków jest przytłumione, a tęp samém niema i rozgałęzienia. Po większej części zamiast pączków, napotykamy małe pęczki cierni ułożonych, rozumié się w kształtne rzędy, często w węzownicę. Z ponad cierni owych wychodzą kwiaty, w których barwne listeczki kielicha przechodzą powoli w płatki, i albo oddzielają się bezpośrednio od siebie nad zawiązkiem z którym są zrosnięte, albo téż pozostając zrosnięte, tworzą rurkę.

§ 816. **Grubiowate** (*Crassulaceae*). Sąto także rośliny mięsiste, których jednakże zwykle kształty zgrubiały tylko, lecz nie przeobraziły się wcale. Pokrewieństwo téj rodziny z następną, skłania do położenia jéj w tém miejscu, chociaż w tablicach naszych przypadła ona dosyć daleko, a to dlatego, iż nasiona jéj albo wcale nie posiadają bielma, albo téż cieniutką tylko jego blaszkę. Mieliśmy już kilkakrotnie sposobność przytoczenia kwiatów tych roślin, jako przedstawiających najdoskonalszy prawie wzór kwiatu dwuliściennych (§ 361, 375; fig. 225, 234, 235); wspomnieliśmy także o obecności małego zagięcia, albo szczególnego ciała, leżącego zawsze na zewnątrz owoców. Wiele rodzajów zdaje się należeć do jednopłatkowych, z powodu zrosnięcia się brzegów płatków w rurkę dłuższą lub krótszą z którą nawet spojone są nasady pręcików. Jednakże wszystkie inne piętna łączą tak silnie rodzaje owe z resztą rodziny, iż niepodobna myśleć o oddzieleniu ich od niéj. Soki gruboszowatych są zwykle ostre i wyżerające, dlatego téż pomiędzy ludem używane bywają z wielu gatunków, jak np. z rozchodniku jako środków gryzących (*caustica*).

§ 817. **Łomikamieniowate** (*Saxifrageae*). Dość znaczna ta grupka obejmuje w sobie wiele podrzędnych, oprócz *niemarankowatych* (*Baueraceae*) i *twardziczkowatych* (*Escalloniaceae*), któreśmy w tablicach wymienili; *radziłiskowe*


670-671. Dwie komórki wydłużone, wzięte z jednego z cierniów (*Echinocactus coptonogonus*) z nitką zupełnie węzownicowatą w jednéj, a z kawałkiem węzownicy i ulómkami jéj pierścieniowatemi w drugiéj.

(*Cunoniaceae*), drzewa lub krzewy o liściach naprzeciwległych, najczęściej złożonych, opatrzonych szerokimi międzyogonkowemi przylistkami; *hortensjowe* (*Hydrangeaceae*); drzewa lub krzewy o liściach naprzeciwległych prostych, bezprzylistkowych; z pomiędzy nich wymienimy tu *hortensję* hodowaną w naszych ogrodach. Co się tyczy *łomikamieniowych*, sąto zioła o liściach naprzemianległych i bezprzylistkowych. **Oczarowate** (*Hamamelideae*) i **jaśminowate** (*Philadelphaceae*), zdają się także zbliżać do powyższych rodzin, a może i wiele innych dzisiaj znacznie oddalonych, lecz odznaczających się także najczęściej dwoma wieloziarnowemi i u wierzchołka oddzielnemi owockami.

§ 818. **Baldaszkowe** (*Umbelliferae*). Grupa ta, tak przyrodzona i tak łatwa do poznania dla wielu wydatnych piętn, oddawna i powszechnie uznana została za rodzinę. Zachowano dla niej nazwisko, jakie z początku zaraz otrzymała od kwiatostanu, któryśmy wyżej opisali (§ 208, 230; fig. 187). Składa ona się z roślin najczęściej zielnych, doroczných, lub trwałych. Łodyga ich powietrzna, rozwijając się w ciągu jednego roku, a dochodząc częstokroć w tym przeciągu czasu znacznych wymiarów (czemu rozwijanie się drzewa nie może zbyt długo wydażyć), staje się czezą jak źdźbło traw, i podobnie przedstawia przegrody w miejscach odpowiadających węzłom. Liście ich naprzemianległe, o blaszce prawie zawsze głęboko podzielonej, obejmują węzły długimi i szerokimi pochwami, które się przedłużają mniej więcej wysoko, i które w wyższych liściach same prawie tylko istnieją. Kwiaty (fig. 674) składają się z kielicha przyrosłego, zakończonego 5 małemi ząbkami, niekiedy zaledwie widzialnemi, a względem których osadzone są naprzemian płatki, na obwodzie dużego gruczołowatego krążka, pokrywającego cały wierzch zawiązka, i noszącego także pięć naprzemianległych pręcików, o nitkach w paku zawsze, a częstokroć i później jeszcze zakrzywionych na wewnątrz. Ze środka krążka wychodzą dwie krótkie szyjki, zakończone znamionami całemi. Jedna z nich zwrócona jest do środka baldaszka, druga ku obwodowi, odpowiadając tym sposobem dwóm komorom, króre zawierają pojedyncze zawieszzone zalążki, i tworzą dwie niełupki oddzielające się później i połączone tylko za pomocą osi czyli wiązki naczyń żywiących, roszczeplonych na dwie niteczki, z których każda

nosi na sobie zawieszoną odpowiednią niełupkę (§ 253, fig. 413). Ziarno, którego powłoki są prawie zrosnięte z nasiennikiem, składa się prawie całkowicie z bielma, zazwyczaj rogowego; w wyższej kończyźnie tegoż, pogrążony jest mały, obły zarodek (fig. 676).

Chcąc jednakże dać poznać piętna, używane dzisiaj do odróżniania i szycowania rodzajów roślin baldaszkowych, musimy tu wejść jeszcze w niektóre szczegóły dotyczące się rozmaitych części. Piętna te brane są z płatków całobrzegich, wyszczerbionych, lub dwuwębnych, płaskich u wierzchołka, lub przedłużonych w koniec zagięty na wewnątrz (fig. 282, 673).



- 672-676. Narzędzia owocowania marchwi (*Daucus carotta*).  
 672. Zarys kwiatu.  
 673. Kwiat widziany z góry. — *ge* Krążek nazawiązkowy.  
 674. Przecięcie pionowe kwiatu. — *p* Płatki. — *e* Pręciki. — *o* Zawiązek zrosnięty z kielichem. — *s* Szyjki i znamiona. — *ge* Krążek gruczolowaty nazawiązkowy.  
 675. Przecięcie poziome owocu.  
 676. Przecięcie pionowe tegoż. — *f* Nasiennik. — *g* Nasiono. — *p* Bielmo. — *e* Zarodek.

Częstokroć korona nie bywa zupełnie kształtną, gdyż płatki położone na obwodzie baldaszka wyrastają daleko bardziej od innych. Lecz najważniejszą jest poznać piętna brane z owocu; zależą one zaś od nerwów wystających na powierzchni tegoż (fig. 672), wzdłuż której tworzą *żeberka (juga)* mniej więcej rozwinięte, bądź w postaci powierzchniowych linii, bądź w postaci grzebienia. Ponieważ zaś kielich przyrosły do zawiązka, składa się z pięciu listeczków, jak tego dowodzą ząbki wolne u wierzchołka, każdy zaś z listeczków posiada nerw główny, a przez zrośnięcie się ich brzegów powstaje tyleż kątów naprzemianległych względem nerwów głównych, przeto cały owoc posiada dziesięć żeberek, odpowiadających naprzemian to nerwom głównym (*żeberka główne*, czyli *grzbietowe*; *juga carinalia*) to brzegom zrośniętym (*żeberka podrzędne*, czyli *szcowe*, *juga suturalia*); każdy zaś z dwóch owoców posiada ich pięć: jedno środkowe, dwa pośrednie i dwa boczne, które się zrastają z odpowiednimi żeberkami drugiego owoka. Pomiędzy pięciu temi żeberkami, utworzonymi na powierzchni pojedynczych owoców, muszą się znajdować cztery kąty wklęsłe, czyli *międzyżebrza (valleculae)*. Czasami nerw poboczny, podwójny w każdym listeczku, dzieli każde międzyżebrze w podłuż i podwaja tym sposobem ich liczbę. Częstokroć także, w miąższości nasiennika i wzdłuż każdego międzyżebrza znajduje się jedna lub więcej przerw, napełnionych sokiem żywicznym, a rozszerzających się z góry na dół i kończących tamże ślepo; przerwy te tworzą od zewnątrz linie barwne czyli *smugi (vittae)*. Postać i ilość żeberek i międzyżebrz tudzież rozkład smug, dostarczają głównych teraz używanych piętn, a które należy umieć oznaczać. Powierzchnie wewnętrzne, któremi dwa owoki zrazu łączą się z sobą, a które później oddzielają się od siebie, bywają raz płaskie (*baldaszkowe płaskoziarnowe*; *orthospermae* [fig. 675, 676]), drugi raz wklęsłe, a to albo przez ugięcie brzegów czyli żeberek bocznych (*B. kłobkoziarnowe*; *campylospermae*), albo też, co rzadziej, przez zbliżenie obudwu kończyn niełupki (*B. zgiętoziarnowe*, *coelospermae*). Też same odmiany przedstawia bielmo, które stanowi większą część każdego owoka, i ściśle jest zrośnięte ze swemi powłokami. Sok nagromadzony w przerwach tworzących smugi, jest olejkiem aromatycznym, który udziela własności swych i woni

nasionom znajdującym z tego powodu zastosowanie jak anyż (*Pimpinella anisum*), kólęder (*Coriandrum sativum*), koper (*Anethum foeniculum*), kmin (*Carum carvi*) i t. d. i t. d. Olejek ten połączony bywa częstokroć z pierwiastkiem narkotycznym w innych częściach rośliny, osobliwie w korze i liściach gdzie się znajduje wiele soków właściwych, które według stosunku pierwiastku przeważającego, rozmaite posiadają własności. Raz stanowią gumo-żywice drażniące lub przeciwkurczowe, z korzyścią używane w medycynie, jak *asafetyda*, *opoponaks*, *sagapenum*, *galban*, *guma amoniacka*; drugi raz stają się truciznami mniej więcej gwałtownymi, jak w pietruszniku płamistym (*Conium maculatum*). szaleni jadowitym (*Cicuta virosa*), blekocie pospolitym (*Aethusa cynapium*), przewłóce, koprze wodnym (*Phellandrium aquaticum*) i t. d. wszystko to są rośliny, które pospolicie nazywane bywają cykuta, cykuta mniejszą, wodną i t. d. niewiadomo jednakże dokładnie, z którego gatunku przygotowywano sławną w starożytności truciznę; innym nakoniec razem soki te są złagodzone do tego stopnia, iż służą równie jak w nasionach, tylko do nadania aromatu częściom przy których się znajdują, a które są jadalne jak np. w liściach pietruszki (*Apium petroselinum*), trzebuli (*Chaerophyllum sativum*), w łodygach dzięglu (*Angelica*). Uważać jednakże należy, iż to ma miejsce szczególnież w częściach usniętych z pod wpływu światła, a mianowicie w korzeniach, jak np. w marchwi (*Daucus carotta*), pasternaku (*Pastinaca sativa*) i t. d. i t. d. których użytek jest tak pospolity; ogrodnicy sprowadzają sztucznie te odmiany, pokrywając ziemią pewne części mające służyć za pożywienie, jak np. liście selerów (*Apium graveolens*). Zauważano także, iż własności te wzmagają się lub słabiej podług cieplejszego lub zimniejszego nieba; że np. pietrusznik płamisty, który stanowi niebezpieczną truciznę w południowej Europie, w Rosyi może być bezpiecznie jadalnym. Mięiste korzenie które wymieniliśmy powyżej, i które każdemu są znajome, posiadają nadto dosyć znaczną ilość istoty cukrowej.

§ 819. **Szklakowate** (*Rhamneae*). Dawniej łączono pod tym nazwiskiem rośliny opatrzone pręcikami leżącymi naprzeciw płatków, a które i dziś noszą toż samo imię, tudzież **zimoszowate** (*Celastrineae*), w których pręciki osadzone są naprzemian, wedle ogólniejszych praw rozkładu części kwia-

towych. Jednakże dwie te rodziny posiadają niektóre wspólne własności, jakoto: pierwiastek barwny, zielony i żółty, dostarczany przez wiele gatunków; pierwiastek ostry i czyszczący, znajdujący się w wielu owocach, a szczególnie w szakłaku (*Rhamnus*); pierwiastek ściągający i drażniący, który napotykamy niekiedy w częściach zielnych, i dla którego napar liści pewnych gatunków używanym bywa zamiast herbaty. Arabowie zwykli żuć świeże liście czuwaliczki (*Catha edulis*), przez co wprawiają się w stan pobudzenia podobny jak po użyciu środków narkotycznych. Namienić tu wypada, że szakłakowate, obok rodzajów dających owoc jadowity, obejmują w sobie rośliny, których nasiennik nabrzmiewa klejem słodkim, nadającym mu własności łagodne, wcale tamtym przeciwnie, i czyniącym go zdatnym na pokarm. Zuane są owoce jujuby (*Zizyphus vulgaris*) i innej rośliny tego samego rodzaju (*Zizyphus lotus*), które stanowiły zwykły pokarm pewnych ludów, nazywanych zjad w starożytności *Lotophagi*. W szypulacie (*Hovenia dulcis*) nie owoc, lecz nadzwyczaj zgrubiała i soczysta szypułka jest jadalną; podobną odmianę dzieli się na dwa plemiona, albo nawet rodziny, wcale od siebie różne: *klókokszkowe* (*Staphyleae*), o liściach złożonych, nasionach bez osnówki i o bielmie przywiedzionem do cienkiej tylko blaszki, i trzmielinowe (*Evonymae*) o liściach prostych, o nasionach opatrzonych mięsistą osnówką (fig. 451) i grubem bielmem. Ostatnie mają za wzór montwę, czyli trzmielinę, której węgiel lekki i dziurkowaty, używa się, jak wiadomo, na krédki, lubo takowe wyrabiane są i z wielu innych drzew posiadających te same własności.

#### ROŚLINY DWULIŚCIENNE JEDNOPLĄTKOWE.

§ 820. Widzieliśmy (§ 642) iż Jussieu dzielił je na: korono-podzawiazkowe, korono-kołozawiazkowe i korono-nazawiazkowe; ostatnie zaś na dwie grómadę, według tego jak pylniki ich są oddzielne lub zrosnięte z sobą. Zachowując ten podział, połączymy jednakże jednopłatkowe kołozawiazkowe z nazawiazkowemi, a to z powodu trudności jaka się często-kroć przedstawia w odróżnieniu ich od siebie.

## JEDNOPLĄTKOWE PODZAWIĄZKOWE.

§ 821. Zaczniemy tu od pewnej liczby rodzin, które stanowią niejako przejście od wielopłatkowych do jednopłatkowych. W rzeczy samej niektóre przedstawiają nam w swych rodzajach oba te piętna, chociaż zresztą rodzaje te powiązane są pomiędzy sobą ściśłem pokrewieństwem. Takimi są storakowate, hebanowate i ostokrzewowate. W innych lubo płatki zrastają się do pewnej wysokości, często jednakże dzieje się to w nadzwyczaj małej przestrzeni, a obok tego nie spostrzegamy w nich wielu innych piętn, właściwych prawdziwym jednopłatkowym. W wymienionych rodzinach pręciki osadzone są na koronie, ich liczba równa się albo też nie dochodzi nawet liczby podziałek korony, nakoniec liczba owoców po większej części bywa także zmniejszoną do trzech, lub co zwykłej jeszcze, do dwóch. Następne zaś rodziny przedstawiają nam przeciwnie owocki w liczbie równej płątkom, pręciki w liczbie podwójnej lub wielokrotnej, częstokroć nawet wcale niezależne od korony. Wiele wprawdzie z nich posiada według zwykłego prawa pręciki osadzone na rurce korony, i to w liczbie równej jej łatom, jednakże zwykle wtedy pręciki przypadają naprzeciw tychże łatom, a częsta obecność innych ciałek a nawet nitek bezpylnikowych, leżących względem nich naprzemian, przeto zastępujących miejsce prawdziwych pręcików, wskazuje nam dosyć wyraźnie istnienie drugiego okółka pręcików, przemienionych tylko do pewnego punktu, z powodu większego lub mniejszego stopnia płonności. Różne te uwagi skłoniły nas do umieszczenia tych rodzin na oddzielnej tablicy, a lubo w niektórych rodzajach, a nawet w kilku całych rodzinach, tu umieszczonych, nie znajdujemy owych piętn wyjątkowych, jednakże miejsce ich przyrodzone wskazanem zostało przez ogół innych piętn, na które musieliśmy zwracać uwagę. Samo nawet osadzenie zdaje się tracić cokolwiek ze swjej uwagi, w grupie tym sposobem utworzonej, która przedstawia nam przykłady jakkolwiek nieliczne, osadzenia kołoziązkowego, jestto nowy węzeł łączący rośliny te z rodzinami wielopłatkowymi, na którycheśmy skończyli.

(Tablica XII, str. 683).

JEDNOPLATKOWE O KORONIE KSZTAŁTNÉJ,

o pręcikach zwykle podzwiązkowych, często niezależnych od korony; co do liczby wielokrotnych, podwójnych lub naprzeciwległych, bardzo rzadko równych naprzemianległych, albo też nieliczniejszych; o owocach równych częstokroć co do liczby podziałkom korony.

Pylniki	1-woreczkowe bez przysadków. Pręciki wolne, lub osadzone na koronie, najczęściej w równej liczbie z jęj podziałkami. Związek wolny. Owoce mięsisty lub torebkowy . . . . .	Pręciki wolne, lub osadzone na koronie, najczęściej w równej liczbie z jęj podziałkami. Związek wolny. Owoce mięsisty lub torebkowy . . . . .	u wierzchołka częstokroć przedłużone w rozki. Pręciki najczęściej niezależne od korony w liczbie dwa razy większej od podziałek . . . . .	— SZCZYTNICOWATE ( <i>Epacridae</i> ).
	2-woreczkowe, otwierające się lekko . . . . .	* Związek wolny. Nasiona skrzydlate. Torebka. Pylniki tepe rurkowane, otwierające się dziurkami u wierzchołka . . . . .	Torebka pękająca przegrodowo. Pylniki tepe . . . . .	— GRUSZYCZKOWATE ( <i>Pyrolaceae</i> ).
			Owoce mięsisty, zwykle torebka pękająca komorowo. Pylniki najczęściej opatrzone ościami . . . . .	— RÓŻANKOWATE ( <i>Rhodoraceae</i> ).
				— WRZOSOWATE ( <i>Ericineae</i> ).
				— BORÓWKOWATE ( <i>Vaccinieae</i> ).
			przyrosły. Jagoda. Pylniki opatrzone ościami . . . . .	— STYRAKSOWATE ( <i>Styraceae</i> ).
			w całej długości szparą, bez przedłużeń i przysadków . . . . .	— HEBANOWATE ( <i>Ebenaceae</i> ).
* Pręciki	w liczbie podwójnej lub wielokrotnej. Związek wolny, o 3 lub wielu komor. Zalążki 1-2 zawieszony. Owoce mięsisty. Bielmo mięsiste. Rośliny drzewne . . . . .	zawieszony. Bielmo grube. Przedkwitnienie lupinowate. Owoce mięsisty. Rośliny drzewne . . . . .	zawieszony. Bielmo grube. Przedkwitnienie lupinowate. Owoce mięsisty. Rośliny drzewne . . . . .	— DZIELZAMINOWATE ( <i>Jasmineae</i> ).
	w liczbie mniejszej (2) od podziałek korony. Związek wolny 2-komorowy. 1-2 zalążki . . . . .	wzniesione. Bielmo cienkie. Przedkwitnienie dachówkowe. Owoce mięsisty. Torebka lub skrzydłak. Rośliny drzewne . . . . .	zawieszony. Bielmo grube. Przedkwitnienie lupinowate. Owoce mięsisty. Rośliny drzewne . . . . .	— OLIWNIKOWATE ( <i>Oleineae</i> ).
	w liczbie równej naprzemianległe. Związek wolny, 2-3-wielokomor. 1 Zalążek zawieszony. Ułożyszcznienie kątnie. Pestczak. Zarodek małeńki w końcu . . . . .	naprzemianległe. Związek wolny, 2-3-wielokomor. 1 Zalążek zawieszony. Ułożyszcznienie kątnie. Pestczak. Zarodek małeńki w końcu . . . . .	naprzemianległe. Związek wolny, 2-3-wielokomor. 1 Zalążek zawieszony. Ułożyszcznienie kątnie. Pestczak. Zarodek małeńki w końcu . . . . .	— OSTOKRZEWOWATE ( <i>Ilicineae</i> ).
	naprzeciwległe. Ułożyszcznienie kątnie. Związek wolny, wielokomorowy. 1 zalążek wstępujący. Owoce mięsisty. Bielmo żadne lub mięsiste. Rośliny drzewne . . . . .	naprzeciwległe. Ułożyszcznienie kątnie. Związek wolny, wielokomorowy. 1 zalążek wstępujący. Owoce mięsisty. Bielmo żadne lub mięsiste. Rośliny drzewne . . . . .	naprzeciwległe. Ułożyszcznienie kątnie. Związek wolny, wielokomorowy. 1 zalążek wstępujący. Owoce mięsisty. Bielmo żadne lub mięsiste. Rośliny drzewne . . . . .	— PIGWICOWATE ( <i>Sapoteae</i> ).
	Ułożyszcznienie środkowe. Związek wolny 1-komorowy . . . . .	Zalążki liczne . . . . .	Bielmo żadne. Mieszek. Rośliny drzewne . . . . .	— KOZŁOROGOWATE ( <i>Aegicereae</i> ).
			Zarodek mimośrodkowy, w bielmie mięsistém lub rogowém. Pestczak. Rośliny drzewne . . . . .	— BOROWICOWATE ( <i>Myrsineae</i> ).
			Torebka lub kubczak. Rośliny zielne . . . . .	— PIERWIOSNKOWATE ( <i>Primulaceae</i> ).
			Zalążek 1. Zarodek w osi bielma mięsistego. Torebka. Rośliny zielne . . . . .	— OLIWNIKOWATE ( <i>Plumbagineae</i> ).
	naprzemianległe. Związek wolny 1-2-komorowy. Ułożyszcznienie kątnie. Nasiona o zarodku mimośrodkowym leżącym w mięsistém bielmie. Owoce suchy albo kubczak. . . . .			— BABKOWATE ( <i>Plantagineae</i> ).

§ 82:  
łączon  
cae); p  
z sobą  
dzielić  
jak w  
bywają  
surowe  
ich ow  
Wirgili  
dnakże  
wiara  
użycie  
stek te  
jak w  
bahuni  
znaczn  
w Azji  
bahuni  
pospoli  
czynią  
częścią  
szczeg  
galaso  
rój liś  
§ 83:  
czój n  
zaskł  
z nich  
raz b  
raksu,  
offic  
wątpli  
§ 84:  
ścią s  
wem z  
mum),  
które  
smak

§ 822. **Wrzosowate** (*Ericinae*). Pięć pierwszych rodzin łączono różnemi czasy w jedną, pod imieniem *wrzosów* (*Ericae*); przedstawiają one w rzeczy samej wiele najściślejszych z sobą związków, pomimo wskazanych różnic, które je każą dzielić na kilka grup osobnych. Owoce ich jeśli są mięsiste, jak w mącznicy (*Arbutus*) i borówce (*Vaccinium*), używane bywają w krajach gdzie dziko rosną na pokarm, a to bądź na surowo, bądź po ugotowaniu; najbardziej używanym w Europie ich owocem jest czernica (*Vaccinium myrtillus*), o którym już Wirgiliusz mówi: *Vaccinia nigra leguntur*. Zauważano jednakże, iż owoc mącznicy poziomkowej (*Arbutus unedo*) zawiera małą ilość pierwiastku narkotycznego, dla którego nadużycie rzeczonych jagód może się stać szkodliwem. Pierwiastek ten zresztą znajduje się także w wielu różankowatych, jak w rozańcach (*Rhododendron*), wdzięczylinie (*Kalmia*), bahuniu (*Azalea*) i t. d. Dowiedziono, iż miód który odurzył znaczną liczbę żołnierzy w czasie odwrotu 10000 Greków w Azji mniejszej, zbieranym był przez pszczoły z miodników bahuniu czarnomorskiego (*Azalea pontica*); liście zaś bagna pospolitego (*Ledum palustre*) używane przy wyrabianiu piwa, czynią takowe nadzwyczaj mocnem. Widzimy także w różnych częściach wielu wrzosowatych własności mocno ściągające, szczególnież zaś przekonano się o obecności garbniku i kwasu galasowego w mącznicy garbarskiej (*Arbutus uva ursi*) której liście używane bywają dlatego przy wyprawianiu skór.

§ 823. **Styraksowate** (*Styracineae*) które umieściłby raczej należało pomiędzy wielopłatkowemi kołozawiazkowemi, zasługują na wzmiankę dla znanego balsamu pochodzącego z nich, to jest *będźwini*, dostarczanego przez gatunek *Styrax benzoin*. Inny balsam, znany w handlu pod imieniem styraksa, przestał oddawna uchodzić za płód gatunku *Styrax officinale*, lecz prawdziwe pochodzenie jego jest jeszcze wątpliwem.

§ 824. **Hebanowate** (*Ebenaceae*) odznaczają się twardością swego drzewa, dla której wiele gatunków nazwano *drzewem żelaznem*. Najznajomszym jest *heban* (*Diospyros ebenum*), którego inne gatunki posiadają też same własności. Niektóre owoce po ułożeniu są jadalne; nadzwyczaj zaś przykry smak ich mięsiwa, świadczy dostatecznie o obecności pier-

wiastków ściągających, jak to bywa zwykle we wszystkich ulgających się owocach.

§ 825. Znajdujemy podobny pierwiastek w owocach i korze wielu **ostokrzewowatych** (*Ilicineae*). Namienie tu należy, iż własności te napotykać się po większej części we wszystkich roślinach zastępujących herbatę. Już przy rodzinach poprzednich mogliśmy wiele z nich wymienić, lecz tu szczególnie nie możemy przemilczeć o gatunku ostokrzewu: *Ilex paraguensis*, którego liście dają napar bardzo używany w Ameryce południowej pod imieniem *mate* czyli *herbaty paragwajskiej*, i których skład chemiczny wartoby porównać ze składem prawdziwej herbaty. Kora ostokrzewu zwyczajnego (*Ilex aquifolium*) zawiera szczególny pierwiastek zwany *glutyną*, a który używa się na lep.

§ 826. **Dzielżaminowate** (*Jasmineae*) znane są z obfitości olejku, który udziela wielu ich kwiatom rozkosznej woni. Kwiaty **oliwnikowatych** (*Oleaceae*) z pomiędzy których dosyć jest wymienić bez włoski (*Syringa*) i oliwnik pachnący (*Olea fragrans*), używany w Chinach do zapachniania herbaty, posiadają także po większej części woń przyjemną. Lecz ostatnia z tych rodzin użyteczną jest szczególnie z powodu obecności oliwy w nasienniku oliwników, których jeden gatunek tak powszechnie jest hodowany na pobrzeżach morza Śródziemnego (*Olea europaea*); niektóre inne gatunki pestczakowe, zawierają również oliwę, lecz w mniejszej ilości, i dlatego są zaniedbane. Do tej także rodziny należy jesion (*Fraxinus*), z którego wielu gatunków wycieka po nacięciu kory manna, istota słodka i nieco czyszcząca; własności jej zdają się zależeć od pierwiastku różniącego się od cukru: *mannitu*, który zresztą znajduje się w wielu roślinach wcale od siebie dalekich, a nawet podobno i w grzybach.

§ 827. Miazdżyste owoce wielu **pigwicowatych** (*Sapoteae*) lubione są w krajach podzwrotnikowych, w których rosną, mianowicie też owoc pigwicy (*Achras sapota*), od której rodzina wzięła swe nazwisko. Nasiona ich zawierają wiele oleju gęstego i zsiadającego się prawie w masło, szczególnie w masłoszu (*Bassia butyracea*). Znajomy jest inny jeszcze afrykański gatunek tegoż samego rodzaju pod imieniem *drzewa masłowego*, a wytwór z niego otrzymywany pod imieniem *masła galamskiego*. We względzie naukowym rodzina ta jest

bardzo zajmującą, gdyż ukazuje przejście od rodzin, których pręciki są wielokrotne względem podziałek korony, do tych, w których takowe są naprzeciwległe i równe im co do liczby; widzimy bowiem, że tu pręciki opatrzone pylnikami osadzone są naprzeciw płatków, nitki zaś płonne w przedziałach pomiędzy nimi.

§ 828. Pierwiosnkowate (*Primulaceae*). Pręciki naprzeciwległe względem łąt korony z (fig. 677, 668); ułożyszcznienie środkowe (fig. 678, 679, 680) tudzież położenie zarodka, który nie końcem, lecz bokiem ku znaczkowi jest zwrócony (fig 682) odróżniają rodzinę tę od wszystkich jednoplatkowych, z wyjątkiem jednakże szurzyncowatych. Te bowiem stanowią niejako pierwiosnkowate krain podzwrotnikowych, w któ-



677.

682.


681.



678.



680



679.

680.

677-682. Narzędzia owocowania pierwiosnku (*Primula elatior*).

677. Zarys kwiatu.

678. Przecięcie pionowe kwiatu. — c Kielich. — p Korona. — e Pręciki. — o Zawiązek. — s Szyjka i znamie

679. Zawiązek o przecięty pionowo dla pokazania łożyska środkowego obsadzonego zalążkami. — s Nasada szyjki.

680. Przecięcie pionowe owocu. — f Nasiennik. — p Łożysko środkowe obsadzone nasionami, których część została odjęta

681. Nasiono.

682. Toż samo przecięte pionowo. — t Powłoki. — h Znaczek. — p Bielmo. — e Zarodek.

683. Zarodek odosobniony.

rych się wyłącznie znajdują i to tylko jako drzewa lub krzewy; gdy tymczasem właściwe pierwiosnkowate zamieszkują pasy umiarkowane lub zimne, i wszystkie są zielne. Poszukiwane one są tylko dla piękności swych kwiatów, które w wielu gatunkach okazują się wtedy, kiedy nasze pola i ogrody prawie jeszcze nie zakwitają. Tęto okoliczności winien swe nazwisko główny rodzaj rodziny: pierwiosnek (*Primula*). Własności roślin ją składających są mało wydatne, zdają się jednakże posiadać pewien stopień dzielności, szczególnież w kurzyślepie (*Anagallis*). Wyciąg z kurzyślepu polnego (*An. arvensis*) jest trucizną, należącą do gromady trucizn ostrych (*acria*).

§ 829. Rodziny wyliczone na następnych tablicach i stanowiące większą część jednopłatkowych, posiadają stałe piętna, o których powiedzieliśmy, iż połączone są z tą odmianą korony, a mianowicie co do liczby, położenia i sposobu osadzania pręcików, równie jak co do liczby owoców zwykle mniejszej od liczby płatków, chociaż w niektórych rzadkich przypadkach liczba ta bywa przeciwnie wyższą. Wiele przeto gatunków z rodzin wymienionych na poprzedzającej tablicy, w których napotykamy też same piętna, powinnyby należeć do jednej z następnych, gdyby chodziło o samo tylko miejsce w układzie; tu jednak woleliśmy zostawić je na miejscu, jakie im wskazują przyrodzone ich stosunki. W żadnym razie niepodobna jest zamienić ich z roślinami wyszczególnionemi na tablicy XIII, których korona jest niekształtna; co się zaś tycze tablicy XIV, rozbiór innych piętn rozstrzygnie łatwo wątpliwość jakaby się w niektórych przypadkach nadarzyć mogła.

(Tablica XIII i XIV).

§ 830. Zanim rozbierzemy po szczególe niektóre z rodzin wymienionych na dwóch tych tablicach (XIII i XIV), wypada pierwiej zastanowić się w ogóle nad wielu punktami ich ustrojenności. Nasamprzód zajmiemy się temi, których nierówne płatki, połączone z sobą, tworzą koronę niekształtną. Zwykle jeden z tych płatków leży naprzeciw przykwiatka, tojest zwrócony jest na zewnątrz i zrasta się do mniejszej lub większej wysokości z dwoma przyległemi, gdy tymczasem inne dwa leżą ze strony przeciwnéj czyli na wewnątrz, tak, że kraj korony dzieli się na dwie części czyli wargi, z których wyższa

JEDNOPLATKOWE PODZAWIAZKOWE

o koronie niekształtnej, noszącej pręciki naprzemianległe, których liczba zmniejszoną została do 4 dwusilnych, lub do 2, w skutek płonności zupełnej lub cząstkowej innych.

Zawiązki	pojedyncze z szyjką wierzchołkową	1 komor. Ułożyszcznienie boczne. Nasiono 1 zawieszone. Bielmo grube. Pręcików 4	.....	—KULNIKOWATE ( <i>Globulariaceae</i> ).	
			środkowe. Nasiona liczne. Bielmo żadne. Pręciki 2	.....	—PEŁWACZOWATE ( <i>Utriculariaceae</i> ).
			ścienne wielorzędowe. Nasiona żadne. Pręciki dwusilne albo też 2	.....	—STRETLICZKOWATE ( <i>Cyrtandreae</i> ).
			siona liczne. Bielmo...grube. Rośliny liściaste. Zawiązek niekiedy wółprzyrosły, o dwóch łożyskach. Pręciki dwusilne lub 2	.....	—ŁĘKOTKOWATE ( <i>Gesneriaceae</i> ).
			Liście luskowate. Łożyska częstokroć 4. Pręciki dwusilne	.....	—ZARAZOWATE ( <i>Orobanchaeae</i> ).
2-komor. Ułożyszcz. kątno. Nasiona	w liczbie nieoznaczonej	w liczbie oznaczonej...	nieskrzydlate. Bielmo grube, mięsiste. Pręciki dwusilne lub 2	.....	—TRĘDOWNIKOWATE ( <i>Scrophulariaceae</i> ).
			skrzydlate. Bielmo żadne. Pręciki dwusilne	.....	—SURMIOWATE ( <i>Bignoniaceae</i> ).
			1-więcej opatrzone uwiązkami. Bielmo żadne. Pręciki dwusilne lub 2 tylko zupełnie wykształcone	.....	—ROZDZIEŃCOWATE ( <i>Acanthaceae</i> ).
			1 zawieszone. Bielmo mięsiste. Pręciki dwusilne. Pylniki. .... { 2 woreczkowe.....	.....	—MUCHRAWCOWATE ( <i>Myoporineae</i> ).
			1 wzniesione. Bielmo mięsiste. Pręcików 4-5	.....	—DZIERŻĘGOWATE ( <i>Selagineae</i> ).
2-4 komorowe. Nasiona w liczbie oznaczonej. Owoc ciernisty. Bielmo żadne. Pręciki dwusilne	2-4-8 komorowe. Nasiono 1 wzniesione. Owoc gładki. Bielmo żadne. Pręciki dwusilne	4 oddzielne, z szyjką osadnikową. Nasiono 1 wzniesione. Bielmo żadne. Pręciki dwusilne, rzadko 2 tylko	.....	—BEYSZCZKOWATE ( <i>Stilbineae</i> ).	
			.....	—KOSIERKOWATE ( <i>Pedalineae</i> ).	
			.....	—KOSZYSKOWATE ( <i>Verbenaceae</i> ).	
			.....	—WARGOWE ( <i>Labiatae</i> ).	

JEDNOPLATKOWE PODZAWIAZKOWE

o koronie kształtnej, noszącej pręciki naprzemianległe w równej liczbie.

Zawiązki	liczne oddzielne	z szyjką osadnikową,	4 niełupki nasiona zawieszona. Bielmo żadne. ....	—OGÓRECZNIKOWATE ( <i>Borragineae</i> ).
			Pestczaki 1-6-komórkowe. Nasiona pojedyncze, wzniesione. Zarodek wokragległy względem bielma mięsistego. ....	DZWONOTOWATE ( <i>Nolanaceae</i> ).
pojedyncze o jednej lub wielu szyjkach wierzchołkowych. Bielmo	żadne.	Nasiona:	1-2 wzniesione w każdej komorze. Kielek dolny. Liścienie pomięte. Owoc mięsisty lub torebkowy 2-3-4-komorowy. ....	—DWUROŻCOWATE ( <i>Dichondreae</i> ).
			1 zawieszona w każdej komorze. Kielek górny. Liścienie żadne. Kubczak dwukomorowy. ....	—KANIANKOWATE ( <i>Cuscutae</i> ).
			1 zawieszona w każdej komorze. Kielek górny. Liścienie płaskie. Pestczak o jednej pestce 4-8-komorowy. ....	—KRASNOŚLIWOWATE ( <i>Cordiaceae</i> ).
			3. Ułożyszcznienie kątnie. Zalążki w liczbie oznaczonej lub nieoznaczonej. Torebka pękająca komorowa. Nasiona. ....	—SKROMNOTKOWATE ( <i>Ehretiacae</i> ).
			1. Ułożyszcznienie ścienne. Zalążki w liczbie oznaczonej lub nieoznaczonej. Torebka pękająca komorowo. Kwiatostan. ....	—SEBOTOWATE ( <i>Cobaeaceae</i> ).
			2. Ułożyszcznienie kątnie. Zalążki w liczbie oznaczonej lub nieoznaczonej. Liście naprzemianległe. Szyjki 2 oddzielne. Torebka pękająca komorowo. Zarodek prosty. ....	—WIELOSIOŁOWATE ( <i>Polemoniaceae</i> ).
			1. Jagoda lub torebka pękająca przegrodowo. Zarodek łukowaty. ....	—DZIESIĘTKOWATE ( <i>Hydrophyllaeae</i> ).
			bezprzylistkowe. Przedkwitnienie korony skręcone. ....	—GORZYCZKOWATE ( <i>Gentianeae</i> ).
			opatrzone przylist. Przedkw. ....	—PRZYLEPNIOWATE ( <i>Hydroleaceae</i> ).
			lupinow. Torebka o dwóch guzikach. ....	—PSIAKOWATE ( <i>Solaneae</i> ).
			dachówkowe. Torebka. ....	—GORZYCZKOWATE ( <i>Gentianeae</i> ).
			Jagoda. ....	—PRZYKRZYCOWATE ( <i>Spigeliaceae</i> ).
skręcone. Jagoda lub Torebka. ....	—POŁATOWATE ( <i>Loganiaceae</i> ).			
2 oddzielne, z szyjkami wierzchołkowymi, połączonymi przez znamiona. Pylek w bryłkach zbitych w każdym woreczku pylnika i przytwierdzonych ogończykiem do znamienia. Bielmo cienkie. ....	—GORZYCZKOWATE ( <i>Gentianeae</i> ).			
proszkowaty. Bielmo mięsiste lub rogowe. ....	—TOINOWATE ( <i>Apocynaeae</i> ).			
ogóńczykiem do znamienia. Bielmo cienkie. ....	—TROJEŚCIOWATE ( <i>Asclepiadeae</i> ).			

jest dwułatowa, niższa trójłatowa, i że przecinając koronę według płaszczyzny równoległej względem osi, otrzymujemy dwie nierówne i niepodobne do siebie części, z których każda stanowi jedną wargę; przecinając ją zaś według płaszczyzny prostopadłej do pierwszej, a zarazem i do osi, otrzymujemy dwie połowy umiarowe. Kielich może być przytém kształtny, lub także zachować niekształtność; w ostatnim tym przypadku, będzie on także dwuwargowym. Z pięciu pręcików leżących naprzemian z płatkami, ten, który przypada w przedziale pomiędzy dwiema łatami wargi wyższej, rzadko się wykształca; najczęściej zaś płonieje, bądźto niezupełnie i wtedy zaród tylko nitki wskazuje jego obecność (jak w wielu trędownikowatych i surmiowatych), bądź też całkowicie. W ostatnim przypadku z czterech innych pręcików, dwa rozwijają się silniej od innych, sąto pręciki niższe, to jest te, które leżą naprzemian względem łat wargi niższej; dwa zaś boczne przypadające naprzemian względem obudwu łat, rozwijają się także, lecz pozostają mniejszemi (w którymto razie mamy pręciki dwusilne), albo też rozwijają tylko niezupełnie i ukazują się tylko w zarodzie (a wtedy mamy kwiat dwupręcikowy).

§ 831. Łatwo spostrzedz jak częstą jest w powyższych rodzinach o kwiatach tak kształtnych jak i niekształtnych, liczba dwójkowa owoców; uważny rozbiór pokazuje, iż takowa częstszą nawet jeszcze jest w rzeczy samej, niż to z tablic naszych widno. W istocie widzimy, że w niektórych rodzinach liczba komór zmniejsza się z 4 do 2, lecz że wtedy podwaja się ilość ziarn w każdej komorze; widzimy dalej, że w innych liczba owoców jest stale 4 (jak w wargowych i ogórecznikowatych), lecz że naówezas nawet jedyna szyjka jest dwuwrebną, lub zakończoną dwoma znamionami, a każde z tych znamion leży naprzeciw jednej pary owoców. Same miejsca osady 4 zalążków nie krzyżują się zazwyczaj z sobą kształtnie, lecz zbliżone są parami przypadającemi naprzeciw znamion. Niektóre potworności pokazują nam owocki rozłączone wprawdzie, lecz parami posiadającemi po jednej szyjce i jednem znamieniu, pewien nawet rodzaj dwurożniowatych posiada dwie wcale oddzielne szyjki, z których każda należy również do pary owoców. Możeby można ztąd wnieść, że każda taka para przedstawia jeden owocek dwułatowy lub dwuzalążkowy, czegoby dowodziła częsta obecność dwóch

zależków w każdej z komór zawiązka prawdziwie dwukomorowego, tudzież skłonność jaką okazują też komory do dzielenia się na dwie komory podrzędne w skutek zawrócenia się przegrody środkowej. Ta ostatnia okoliczność powiększa nawet w niektórych razach liczbę pozorną komór do 8; rzeczywiście zaś jest ich w takich razach 4, lecz każda z nich podzielona przegrodą na dwie. W takim przypadku (w niektórych koszykowatych) zamiast 8 niełupek jednokomorowych, znajdujemy 4 dwukomorowe.

Przeciwnie, położenie dwóch komór względem osi kwiatowej, jest stałe i wielkiej wagi. W trędownikowatych, psiankowatych, rozdzięciowatych i t. d. jedna komora jest wyższą, to jest zwróconą ku osi, druga niższą, to jest zwróconą ku przykwiatkowi. W goryczkowatych, toinowatych, trojęściowatych i t. d. obie komory są boczne, to jest jedna z nich leży po prawej, druga po lewej ręce względem osi.

§ 832. **Surmiowate** (*Bignoniaceae*). Rośliny tu należące są krzewami lub drzewami, odznaczającemi się pięknością swych kwiatów, niektóre też z nich hodowane bywają częstokroć w parkach i ogrodach, jak surmia zwyczajna (*Bignonia catalpa*), oddawna znajoma i jakby przyswojona. Wiele też pomiędzy krzewami tej rodziny znajdujemy pnączów przedstawiających po większej części szczególny, wyżej opisany rozkład drewna (§ 87 fig. 108). W rzeczy samej, drewno tworzy niejako słup o czterech głębokich rowkach, tak, że na przecięciu poprzecznym spostrzegamy kształt krzyża maltańskiego. Przystwory pomiędzy czterema łatami drzewnymi wypełnione są istotą korową, która zresztą okrywa kształtnie cały obwód, czyniąc łodygę prawie zupełnie obłą, tak, iż rozkład wewnętrzny nie objawia się bynajmniej na zewnątrz i dopiero na przecięciu widzieć się daje. Rzadziej liczba owych łat drzewnych bywa podwójną, a każda z nich rozszczepia się poźniej na dwie, przez co powstaje 16 rowków wokoło całego układu drzewnego, naprzemian głębszych i płytszych.

§ 833. **Rozdzięciowate** (*Acanthaceae*). Za odznaczające piętno tej rodziny położyliśmy nasiona opatrzone *uwiazkiem*: nazywamy zaś uwiazkiem (*retinaculum*) przedłużenie łożyska, które idzie pod każdym ziarnem podpierając takowe; ma ono kształt małego żłobka ostro zakończonego i częstokroć zagiętego w haczyk. Po opadnięciu owoców uwiazki pozostają

i sterczą na wewnętrznym brzegu przegród oddzielających się od siebie, a często także i od łupin względem których są naprzeciwległemi. W kilku rodzajach nie napotykamy uwiązka, lecz natomiast małą rogowatą miseczkę wokoło znaczką (*Thunbergiaee*), albo też brodaweczkę (*Nelsoniaee*).

§ 834. **Wargowe** (*Labiatae*). Korona wargowa (fig. 296, 685), przeciki dwusilne, rzadko 2 (np. w szalwii) w skutek



686.

685.



684.



687.



688.

684-688. Narzędzia owocowania jasnoty (*Lamium album*) — *c* Kielich. — *p* Korona — *t* Rurka korony. — *ls* Warga wyższa téjże. — *li* Warga niższa. — *e* Przeciki. — *s* Szyjki i znamiona.

684. Zarys kwiatu.

685. Kwiat cały widziany z boku.

686. Tenże przecięty pionowo.

687. Owoce przecięty pionowo, tak, iż dwa owocki zostały przez to odjęte. — *c* Kielich trwałe. — *g* Gruczoł. — *r* Dno noszące na sobie szyjkę *s*.


— *o* Dwa owocki.

688. Owocek przecięty pionowo. — *p* Nasiennik. — *t* Powłoka nasienia. — *e* Zarodek.

płonności prawie zupełnej dwóch innych, pośrednich; 4 zawiązki o jednej szyjce osadnikowej (fig. 372) dwuwęrbnej u wierzchołka (fig. 686 s) odróżniają łatwo rodzinę tę od wszystkich innych. Dodajmy do tego łodygę czworograniastą i liście naprzeciwległe; gdybyśmy nawet same tylko te narzędzia roślenia mieli przed sobą, moglibyśmy i tak oznaczyć te rośliny, a to z powodu obecności mnóstwa maleńkich zawierałników olejku, jakie się na ich liściach spozstrzegać dają. Olejkowi temu winny wargowe są woń aromatyczną, rozmaitą w rozmaitych gatunkach, a w wielu z nich tak przyjemną; jako przykłady dosyć będzie wymienić szalwję (*Salvia*), tymianek (*Thymus vulgaris*) i macierzankę (*Th. serpyllum*); rojownik (*Melissa*), lawendę (*Lavandula*), mięte (*Mentha*), rozmaryn (*Rosmarinus*), paczuli (gatunek pochwiatki [*Coleus*]) i t. d. i t. d. Otrzymuje się z nich albo sam olejek, używany jako pachnidło, albo też wody wyskokowe, znajdujące częste bardzo zastosowanie, albo też zapachnia się niemi rozmaite kosmetyki. Liście niektórych jak np. cząbrku (*Satureja*), majeranu (*Origanum majorana*), bazyliki (*Ocimum basilicum*) i t. d., używane są jako przyprawy. Napar nieco jędrniący wielu z wymienionych powyżej (szałwii, melissy) lub i innych jeszcze (pszczelniku melisowego [*Dracocephalum moldavicum*], bluszczyku [*Glechoma*] i t. d.), używanym bywa niekiedy zamiast herbaty. Do skutków jakie sprowadzać musi obecność olejków, które jak wiadomo są środkami pobudzającymi, dodać należy skutki, wywołane przez inny jeszcze w roślinach tych obecny, pierwiastek gumo-żywiczny, gorzkawy; od niego to zależą własności jędrniące. Dlatego niektóre napary używane bywają jako środki żołądkowe, a nawet jeśli drugi ów pierwiastek przeważa, jako przeciwzmnienne (ozanka [*Teucrium chamaedrys*; *T. scordium*]).

Namienić tu należy, iż kamfora, o której mówiliśmy już, przy rodzinie wcale różnej od niniejszej (wawrzynowatych), znajduje się także przy olejku wargowych, w niektórych nawet tak obficie (szałwja i lawenda) że z korzyścią możnaby ją z nich otrzymywać. Niektóre nakoniec gatunki posiadają główki korzeniowe, których skrobia mogłaby służyć za pokarm; jednym z takich jest rosnący u nas czysciec błotny (*Stachys palustris*).

§ 885. **Ogórecznikowate** (*Borragineae*) zbliżają się do wargowych przez 4 swe owocki oddzielne z jedną szyjką osadnikową; lecz liście naprzemianległe na łodydze obłej, tudzież korona prawie zawsze kształtna, a nawet, kiedy nie jest taką (w żmijowcu [*Echium*]), nosząca stale pięć pręcików opatrzonych pylnikami, odróżniają je na pierwszy rzut oka; odróżnienie to dałoby się zresztą uskutecznić choćbyśmy sam tylko liść mieli przed sobą, gdyż rozpoznaćby go można po miękkości, po powierzchni najeżonej nierównościami, które powstają z nabrzmiałych i stwardniałych nasad włosów pojedynczych; nakoniec po zupełnej nieobecności olejku w tkance. Same nawet słupki lub owoce pomimo podobieństwa swego posłużyćby mogły bez pomocy innych pięt do odróżnienia dwóch tych rodzin od siebie, ponieważ w ogórecznikowatych zalążki są zawieszane nie zaś wzniesione, a kielich, którego kierunek jest koniecznie wypływem położenia zalążka, jest dolnym w wargowych (fig. 688) a górnym w ogórecznikowatych (fig. 691). Własności też tych ostatnich, zależące od obfitości kleju roślinnego, a przeto prosto tylko miękczące, różne są od własności pierwszych. Korzeń wielu gatunków, a mianowicie czerwienicy (*Anchusa tinctoria*), którą zastąpić można gatunkami



689-691. Narzędzia owocowania czerwienicy (*Anchusa italica*).

689. Zarys kwiatu.

690. Przekięcie pionowe kwiatu. — c Kielich. — p Korona. — a Przysadki téjże. — e Pręciki. — o Zawiazki, z których dwa przecięte. — s Szyjka.


691. Owocek przecięty pionowo. — p Nasienniki. — t Powłoki nasienne. — e Zarodek

długoszu i nawrotu (*Onosma echinoides*; *Lithospermum tinctorium*), używany bywa w barwnictwie. Korzeń ten jest czerwony z zewnątrz, od zetknięcia się z powietrzem, wewnątrz zaś biały; zawiera on istotę nierozpuszczalną w wodzie, rozpuszczalną w wyskoku, eterze, olejach i w ogóle ciałach tłustych; z alkaljami tworzy związek niebieski, a za pomocą roztworów zawierających kruszce, daje się strącać z roztworu wyskokowego, tworząc rozmaite laki.

**Skromnotkowate** (*Ehretiaceae*) i **krasnośliwowe** (*Cordiaceae*) były pierwiastkowo zmieszane z ogórecznikowatemi, i dotychczas nawet niektórzy pisarze łączą je z nimi jako proste tylko plemiona. Widzimy z tablicy, iż różnią się od nich osadzeniem szyjki, z czém się częstokroć łączy zrośnięcie owoców w jeden związek, przechodzący nieraz w owoc mięsisty. Mięsiwo niektórych gatunków krasnośliwu (*Cordia sebestena* i *myxa*) zawiera wiele kleju roślinnego, i używa się dlatego w medycynie.

§ 836. **Psiankowe** (*Solaneae*). Rośliny tu należące zasługują na przytoczenie dla silnych a zarazem i rozlicznych swoich własności. Najogólniejszym w nich jest pierwiastek narkotyczny, który się znajduje w sokach korzeni, liści i owoców niektórych znanych gatunków, jakoto: pokrzyk wilcza jagoda (*Atropa belladonna*), mandragora (*Atr. mandragora*) tak niegdyś słynna, lulek (*Hyoscyamus niger*, i inne gatunki tegoż rodzaju), bielun dziedzierzawa (*Datura stramonium*); różne gatunki samej psianki (*Solanum*), np. psianka pospolita (*S. nigrum*), tak częsta po naszych polach. Chemia odkryła istoty właściwe, a razem i podobne do siebie w różnych tych roślinach, nadając im podług tego nazwiska (*atropiny*, *hyoscyjminy*, *daturyny*, *solaniny*); od tychto pierwiastków zależą pomienione własności. Garliczka sennica (*Physalis somnifera*) i wzdętka garliczkowata (*Nicandra physalodes*) wywierają podobne skutki, lubo w niższym stopniu. Liście tytoniu działają bardzo gwałtownie jeśli zostaną użyte wewnątrz, co jednak dzieje się tylko w celu lekarskim; przy zwykłym zaś użyciu tytoniu, takowy styka się jedynie z najzewnętrznieszemi częściami błony wyściełającej kanał pokarmowy, z nozdrzami jeśli się używa jako tabaka, z ustami jeśli go się żuje lub pali; w tym ostatnim razie działanie jego powinno być znacznie osłabionem, a jednakże bywa dość silnem, dla tego,

kto nie jest do palenia przyzwyczajonym. Tytuń przyszedł nam z Ameryki; mieszkańcy Kuby nazywali go *jaty*, a nazwa *tytuń* którą dawali *fajce*, użytą została przez Europejczyków dla samej rośliny. Walter Raleigh wprowadził go do Anglii w r. 1586, lecz w Portugalii uprawiano go już w 1560, z kąd też przywiezionym został do Francji przez posła Nicot, od którego nadano mu nazwisko botaniczne *Nicotiana*. Używanie tytoniu było zrazu surowo wzbronione przez wielu panujących, rozszeszyło się jednak mimo pogrózek i kar, a w końcu stał się on przedmiotem amatorstwa, nawet monopolioń, stanowiąc jak dziś, ważną gałąź dochodów publicznych. Jak samo używanie tytoniu rozszerzyło się po całej ziemi, tak też i uprawa jego jest pospolitą i w rzeczy samej dziwno jest znaleźć aż w Szkocyi i Szwecyi pielęgnowaną roślinę, która pochodzi



692-697. Narzędzia owocowania ziemniaku (*Solanum tuberosum*).

692. Zarys kwiatu.

693. Przecięcie pionowe kwiatu. — *e* Kielich. — *p* Część niższa korony.  
*e* Preciki. — *o* Zawiązek. — *s* Szyjka i znamię.

694. Owoc.

695. Tenże przecięty poziomo.

696. Nasiono.

697. Toż samo przecięte pionowo. — *t* Powłoka. — *p* Bielmo. — *e* Zarodek.



z krajów podzwrotnikowych; lecz łatwo sobie wytłumaczyć przyczynę tego upowszechnienia, zważywszy tylko, iż to jest roślina roczna, która niezbyt długiego wymaga lata, aby się zupełnie mogła wykształcić i która zresztą w odczynnie swojej nawet rośnie na górach, a przeto w klimacie umiarkowańszym. Wiele gatunków bywa uprawianych, jak np. tytuń młotański (*N. tabacum*), o kwiatach najpospoliej różowych; tytuń pospolity (*N. rustica*) o kwiatach żółtych, upowszechniony szczególnie w Afryce zachodniej i Egipcie, tudzież w południowej Europie, gdzie z niego robią tytuń salonicki, a jak się zdaje i *latakie*. Tytuń szyrakki otrzymuje się z gatunku *N. persica*, może nawet początkowo pochodzącego z tamtych krajów, co jednakże nie jest pewnym. Dostyc szczególną jest rzeczą, iż w rodzinie tej, obok płodów jadowitych znajdujemy inne, wcale różnego przyrodzenia. Owoce pieprzowcu (*Capsicum*) są nadzwyczaj szczypiące a nawet ostre, jednakże dają się jeść bezpiecznie; pomidory zaś (*Lycopersicum esculentum*), oberżynki (*Solanum melongena*) i niektóre inne są słodkie i jadalne. Nadewszystko jednakże ziemniaki (*Solanum tuberosum*) stanowią sprzeczność z wymienionymi powyżej płodami narkotycznymi. Prawda jednakże iż pokarm ten, tak powszechny, pochodzi z wcale innej części rośliny, i wcale inaczej ukształconej, albowiem z dolnych i podziemnych gałązek (§ 190, fig. 178), które nabrzmiwając, stają się obfitym składem skrobi. Użyteczna ta roślina przyszła do nas także z Ameryki, lecz nie wiadomo z pewnością z których okolic. Znalezione ją dziko rosnącą w górach Chili, około 33 stopnia szerokości południowej; w górach Peru, dokąd mogła być przeniesioną przez Inkasów; świeżo także na szczytach gór Meksyku, gdzie wszelako nie była znaną za czasów Montezumy; Raleigh zaś przywiózł ją do Anglii z Wirginii. Trudno jest w istocie dojść czy roślina tak łatwo się rozmnażająca, zawsze rosła dziko w jakim miejscu, lub czyli tamże pozostawioną była w jakim czasie przez człowieka. Cóżkolwiek bądź ziemniaki z większą trudnością upowszechniły się w Europie niż tytuń; a we Francji, można rzec, iż uprawa ich wprowadzoną została zaledwie w tém dopiero stuleciu. W południowej wprawdzie Francji była pospolitszą, lecz co się tycze północnej, upowszechnienie ziemniaków nastąpiło dopiero w skutek najstaranniejszych usiłowań światłego filantropu

pa Parmentier. Jestto fakt, który nas dzisiaj słusznie może zadziwić.

§ 837. **Trędownikowate** (*Scrophularineae*). Rośliny te stoją w ścisłym związku z psiankowatemi, od których różnią się samą tylko niekształtnością korony i precików; tych bowiem liczba zmniejszoną jest w nich do 4 dwusilnych, w skutek płonności piątego, lub nawet do 2 w skutek płonności trzech innych. Dlatego téż wiele rodzajów odnoszono naprzemian do jednej lub drugiej z tych rodzin, np. dziewannę (*Verbascum*), która umieszczona pierwiastkowo w psiankowatych, dla pięciu precików, dzisiaj liczy się do trędownikowatych dla tego, że preciki te są wprawdzie w liczbie 5, lecz obok tego nie są ani równe, ani jednostajne, podobnie jak łaty korony okazujące także skłonność do płonienia. Jussieu odróżniał trędownikowate, o pękaniu przegrodowém, od *gnidoszowatych* (*Pedicularineae*), czyli *szelązkowatych* (*Rhinanthaceae*), o pękaniu komorowém; dzisiaj obie te rodziny połączone w jedną, ponieważ pierwszy z tych rodzajów pękania znajduje się u roślin, które się od pierwszej oddzielić nie dadzą; tworzą one więc razem grupę dość znaczną i dzielącą się na wiele plemion. Pękanie szwowe daje się także niekiedy w nich postrzegać (*dehiscencia suturalis s. septifraga*). Są one podobnie jak psiankowate, ostre i gorzkie; czasami znajdujemy w nich także własności narkotyczne, a mianowicie w naparstnicy (*Digitalis*), która w dozach nieco większych stanowi prawdziwą truciznę, a której szczególniejsze działanie, postrzega się nadewszystko na krążeniu krwi; takowe bowiem przyspieszonym zostaje zrazu chwilowo, potem zaś znacznie zwolnioném. Dlategoto naparstnica używa się w słabościach, w których idzie o umiarkowanie obiegu krwi, w chorobnych bicjach serca i rozszerzeniach tętnic. W téjto rodzinie mieści się *Paulownia imperialis*, drzewo pochodzące z Japonii, i nadzwyczaj prędko u nas, od kilku lat rozmnożone; z wejrzenia podobne ono jest do snrmi zwyczajnej (*Bignonia catalpa*) i z tego powodu liczono je zrazu do surmiowatych.

§ 838. **Powojowate** (*Convolvulaceae*). — Kaniankowate (*Cuscutaeae*) i dwurożniowate (*Dichondraeae*), bywają z nimi zwykle łączone jako plemiona. Tablica XIV pokazuje nam wiele piętn znamionujących prawdziwe powojowate; dodajmy do tego, że listeczki kielicha (w liczbie 5) osadzone są na

nierównych wysokościach i ułożone w wyraźną cynkę; że korona posiada 5 zagięć, które są skręcone w paku (fig. 698, 699 *p*), że nakoniec torebka ich pęka komorowo. Gatunki tej rodziny są po większej części pnące się, a jeśli są zarazem



698-705. Narzędzia owocowania powoju (*Convolvulus sepium*).

698. Zarys kwiatu. — *b* Przykwiatki. — *c* Kielich. — *p* Korona.

699. Pak.

700. Przecięcie pionowe niższej części kwiatu. — *b* Przykwiatki. — *c* Kielich. — *p* Rurka korony, nosząca na sobie nitki pręcików *e*. — *o* Zawiązek. — *s* Szyjka.

701. Wierzchołek szyjki i znamiona.

702. Owoc *f* otoczony kielichem *c* i przykwiatkami *b*.


703. Nasiono. — *h* Znaczek.

drzewne, napotyamy w nich owo piętno, któreśmy widzieli w wielu pnączach, to jest zmatwanie układu korowego z drzewnym. Ten ostatni tworzy tu słup środkowy, około którego inne wiązki drzewne ułożone są w słoje spółośrodkowe, i według wieku rośliny znajdują się w większej lub mniejszej liczbie. Istota korowa weiska się pomiędzy słoje, a w każdym znowu słoju pomiędzy wiązki go składające. Na świeżem przecięciu istota ta odbija tém wyraźniej, że w ogóle rośliny tu należące zawierają w sobie mnóstwo naczyń właściwych, pełnych młéczu, który rozlewając się na przecięciu, uwyrażnia siatkę korową opasującą wszystkie owe wiązki drzewne. Młécz ten jest mocno czyszczący, co zależy od jego żywicznego przyrodzenia. Przekonano się zaś o tém na wielu gatunkach powoju (*Convolvulus*), z których niektóre szczególnie używane bywają w medycynie, jak: *C. jalapa*, *C. scammonium*, *C. turpethum* i inne. Pierwiastek rzeczony obfituje szczególnie w korzeniach i z nich téż się otrzymuje. Uwagi godną jest, że inne niektóre gatunki tegoż samego rodzaju, w skutek zupełnej prawie nieobecności owego pierwiastku, tudzież nadzwyczajnego wykształcenia się skrobi, stają się zdrowym i lubionym pokarmem. Takim jest między innymi *bata* (*Conv. batatas*). *Conv. dissectus* zawiera znaczną ilość kwasu pruskiego, i dlatego téż jest jedną z roślin, z których wyrabia się tak nazwana wódka pestkowa.

§ 839. **Goryczkowate** (*Gentianeae*). Widzieliśmy je na tablicy XIV pomiędzy rodzinami o ułożyszczeniu raz ścienném drugi raz kątném, a to dlatego, że brzegi dwóch ich ogonków obsadzone nasionami, albo łączą się z sobą prawie bezpośrednio, albo téż zrastają się, zwracając się mniej więcej ku wnętrzu komory i tworzą w niej tym sposobem dwie przegrody zupełne lub niezupełne. Z pomiędzy piętn ich, wymieniliśmy naprzeciwległość liści; w rzeczy samej takowa napotyka się u nich z wyjątkiem dwóch rodzajów dość pospolitych w wodach Franeyi; takimi zaś są: grzybieńczyk (*Vitarsia*) i bobrek (*Menyanthes*). Liście tego ostatniego nie tylko są naprzemianległe, ale dotego i złożone, we wszystkich zaś innych rodzajach są proste; z tego powodu odróżnili niektórzy małeńkie plemię *bobrkowatych* (*Menyantheae*). Wszystkie goryczkowate posiadają w różnych swych częściach

nadwyzczajną gorycz, która je czyni środkami jędrniącemi, żołądkowemi i przeciwzimmniczem.

§ 840. **Toinowate** (*Apocynae*) i **trojeściowate** (*Asclepiadeae*). Dwie te rodziny połączone pierwiastkowo w jedną, którą tylko plemiona składały, stoją w rzeczy samej w najściślejszych z sobą związkach i różnią się od siebie jedynie rozkładem pręcików; takowe bowiem są oddzielne w pierwszych, posiadających zarazem pyłek zwykłego proszkowatego składu; w drugich zaś pyłek skupiony jest w bryłki, albo ziarenkowate, albo też co częściej, posiadające zbitość wosku; bryłek takich jest zwykle 10, tojest po jednej w każdym z woreczków pięciu dwuworeczkowych, odwróconych pylników, siedzących wokoło dużego pięciokątnego znamienia. Wcześniej bardzo w rozwijającym się kwiecie, w brózdkach znamienia leżących naprzemian względem pylników, tworzy się po dwa ciała gruczołowate, zrastające się później z sobą; każde z nich przedłuża się jakby w ogonek galaretowaty, który w czasie pęknięcia pylników łączy się z kończyną odpowiadającej bryłki pyłkowej, i pociąga takową do siebie z woreczką tak, iż podówczas bryłka, gruczoł znamieniowy i jego przedłużenie zdają się stanowić jedno ciało. Ciało pyłkowe (fig. 709) składa się z tkanki komórkowej o komórkach ściśle z sobą połączonych, zamykających po jednym ziarnie pyłku, otoczonego pojedynczą błoną, a którego ścianę zewnętrzną stanowi poniekąd błona owych komórek. Cożkolwiek bądź, tworzy się następnie na jednym z boków bryłki szpara podłużna, a z komórek tym sposobem otwartych wychodzą ziarna *p*, które padają na dolną tylko część dużego znamienia (fig. 708 *pp*) przy nasadzie szyjki, w którą przeto wejść mogą łagiewki. Ustrojność ta pyłku daje się tylko porównać z tą, którąśmy poprzednio poznali w pewnej liczbie storczykowatych, i stanowi dostateczną zasadę do odosobnienia *trojeściowatych*. Dodajmy tu jeszcze jeden rys znamionujący wiele ich rodzajów, a mianowicie: obecność przysadków różnej postaci, osadzonych naprzeciw pręcików, i tworzących wewnątrz korony okółek równie jak ona rozwinięty, i opisywany pod imieniem *przykoronka* (*corona*, fig. 707, 708 *a*). Opisaliśmy już rozkład dwóch oddzielnych zawiązków, tudzież szyjek kończących takowe (fig. 708, *os*), a połączonych tylko za pośrednictwem dużego ciała znamieniowego, o którym mówiliśmy do



706-713. Narzędzia owocowania trójceści (*Asclepias nivea*). — *c* Kielich.  
— *p* Korona. — *a* Przysadki tworzące przytworek. — *g* Ciała gruczołowate, siedzące na znamionach i noszące na sobie pyłkowiny.

706. Zarys kwiatu.

707. Kwiat cały.

707 bis. Tenże widziany z góry.

708. Tenże przecięty pionowo. — *e* Pręciki. — *o* Zawiązki. — *s* Szyjki połączone u góry dużym ciałkiem znamieniowym, ku nasadzie którego wchodzi łagiewki około punktów *pp*.

709. Dwie pyłkowiny *m*, przyczepione za pomocą dwóch przedłużeń ogonkowatych *g* do innego ciała *g*, powstałego z połączenia dwóch gruczołów. — *p* Ziarna pyłku zaczynające oddzielać się od pyłkowin.

710. Jedno z tych ziarn odosobnione i mocniej powiększone.

711. Owoc w chwili pęknięcia. — *ff* Mieszki. — *p* Łóżysko oddzielające się. — *g* Nasiona opatrzone puchem.

712. Jedno z nasion odosobnione — *a* Puch.

713. Nasiono pozbawione puchu i przecięte pionowo. — *te* Powłoka zewnętrzna. — *ti* Powłoka wewnętrzna. — *p* Bielmo. — *e* Zarodek.

piéro. Zawiązki zmieniają się później w dwa mieszki wieloziarne (fig. 711) we wszystkich *trojęściowatych* i we wszystkich prawdziwych *toinowatych*; lecz w jedném z plemion téj ostatniej (w przewężnikowych [*Ophioxyleae*]) zawiązki przechodzą w dwa pestczaki, a w *szczegotowatych* (*Carisseae*) zrastają się od początku i najczęściej przechodzą w jagodę. W ostatnich dwóch plemionach zalążki bywają czasem nieliczne, a nawet pojedyncze.

Rośliny dwóch tych rodzin są często wijące, a drewno ich pnączów krzewowatych podzielone jest mniej więcej głęboko na liczne łąty, przez tyleż przerw wypełnionych istotą korową. Soki zazwyczaj mleczowe są ostre i gorzkie, a z pobudzenia jakie sprawiają, wynikają rozmaite skutki, według części ciała, na które działają, jakoto: wymioty lub przeczyszczenie, mocne wydzielanie się potu lub moczu. Tak np. liście obojniku *Cynanchum arguel* działają jak senes, lecz daleko niebezpieczniej; używane téż bywają do zafałszowania tego środka; sok *C. monspeliacum* znany pod imieniem *skamonii z Montpellier*, czyści gwałtownie; zaś korzeń *C. ipecacuanha*, jeden z wielu krających w handlu pod tém nazwiskiem, sprawia wymioty. Obojnik zwyczajny (*C. vincetoxicum*) wienien swą łąciuską nazwę wypróżnieniom jakie wywołuje, a które mogą być użyteczne w przypadkach otrucia. W ogóle jednak można powiedzieć, iż niebezpieczne te własności mniej są wydatne w trojęściowatych, niż w toinowatych, mlęcz nawet niektórych ma być wcale nieszkodliwy i używa się za pokarm. Mlęcz ten obfituje w kauczuk, który téż z niektórych gatunków bywa otrzymywanym. Powiedzieliśmy dopiéro, iż sok toinowatych posiada własności ostre w wyższym daleko stopniu. Zpomędzy wielu przykładów wymienimy tu tylko płochowiec zwyczajny (*Nerium oleander*), którego wyciąg jest środkiem narkotyczno-ostрым nadzwyczaj silnym i którego same wyziewy, szczególnie w krajach południowych, gdzie roślina ta dziko rośnie, mogą sprowadzić najgwałtowniejsze przypadki. Zastanowimy się nieco nad nasionami o grubém rogowém bielmie rodzaju: *kulczyba* (*Strychnos*), które zawierają jedną z najsilniejszych znanych trucizn, tojest alkaloidę *strychninę*. Wywołuje ona, bez wątpienia działając na szpik pacierzowy, tak silne kurcze mięsćców, że po jakimś czasie następuje sztywność i nieruchomość, a potem asfrya

RODZINY. Tablica XV.

JEDNOPEŁCIOWE KOŁOZAWIĄZKOWE

o zawiązku przyrośłym, o koronie kształtnej lub niekształtnej, noszącej zwykle pręciki naprzemianległe, w równej, a rzadko w mniejszej liczbie.

Pylniki	oddzielne. Liście	naprzeciwległe	o przylistkach międzyogonkowych, 2-więcej komór 1-wielozianrowych. Owoc mięsisty lub torebkowy. Bielmo mięsiste lub		MARZANOWATE ( <i>Rubiaceae</i> ).
			rogowe. Przedkwitnienie korony lupinowate lub skrócone . . . . .	Przedkwitnienie dachówkowe. PRZEWIERTNIOWATE ( <i>Caprifoliaceae</i> ).	
zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	naprzemianległe, bezprzylistkowe.	bezprzylistkowe. 2-więcej komór 1-wielozianrowych. Jagoda. Bielmo mięsiste lub rogowe. Przedkwitnienie lupinowate. Rośliny drzewne,		GAZEWNIKOWATE ( <i>Loranthaceae</i> ).
			1 komora jednoziarna. Pręciki	pasorzytne. Jagoda. Bielmo mięsiste . . . . .	KOZŁKOWATE ( <i>Valerianaceae</i> ).
zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	naprzemianległe, bezprzylistkowe.	w równej liczbie i naprzeciwległe. Przedkwitnienie dachówkowe. Rośliny zielne.		—DRAPACZOWATE ( <i>Dipsacaceae</i> ).
			nowa. Pręciki	w mniejszej liczbie i naprzemianległe. Przedkwitnienie dachówkowe. Rośliny zielne. Kwiaty ułożone w wierzchołek mięsiste.	—KLINICOWATE ( <i>Sphaenocleaceae</i> ).
zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	naprzemianległe, bezprzylistkowe.	Owoc niepekający. Bielmo . . . . .		—DZWONKOWATE ( <i>Campanulaceae</i> ).
			zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	—SZUPIĘTKOWATE ( <i>Stylidiaceae</i> ).
zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	naprzemianległe, bezprzylistkowe.	Kubeczek 2-komorowy. Nasiona w liczbie nieoznaczonej. Bielmo grube. Pręciki niezależne od korony.		—OKOCYSTOWATE ( <i>Scaevolaceae</i> ).
			zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	—NASŁĄTKOWATE ( <i>Goodeniaceae</i> ).
zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	naprzemianległe, bezprzylistkowe.	Torebka 2-8-komorowa. Nasiona w liczbie nieoznaczonej. Torebka 2-komorowa . . . . .		—STROICZKOWATE ( <i>Labeliaceae</i> ).
			zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	—DZWONKOWATE ( <i>Campanulaceae</i> ).
zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	naprzemianległe, bezprzylistkowe.	nagie. Przedkwitnienie lupinowate. Nasiona w liczbie nieoznaczonej. Kwiaty . . . . .		—ZŁOŻONE ( <i>Compositae</i> ).
			zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	—POKOLICZKOWATE ( <i>Calycereae</i> ).
zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	naprzemianległe, bezprzylistkowe.	połączonych w pokrywę wspólną w koszyczek czyli kwiat złożony.		
			zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	
zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	naprzemianległe, bezprzylistkowe.	Nielupka 1-ziarnowa. Nasiono . . . . .		
			zrosnięte	z szychką. Kwiaty oddzielne. Bielmo mięsiste	

w skut  
dy mo  
galkar  
chadz  
mica  
St. Ig  
które  
chodz  
mój k  
jadu,  
upas  
dnak  
nych  
gdzie  
przez  
wted  
kach  
szcze  
jest ja  
takien  
miasz  
edul

S  
z na  
daje  
wzg  
feau  
i ch  
Nast  
owe  
pes  
po  
(na  
bie  
sta

w skutek stłumienia ruchów oddechowych. Widzieć to niekiedy można (we Francji) na wałęsających się psach, zatrutych gałkami rzucanymi w tym celu na miejscach publicznych przechadzek, a robionemi z *wroniego oka* (*Strychnos nux-vomica*). Z tego i z drugiego jeszcze gatunku zwanego *bobem St. Ignacego* (*Str. ignatiana*), otrzymuje się strychnina, od której zależą własności kory *angustury niewłaściwej*, pochodzącej jak się zdaje, także z kulczyby, a może nawet z samej kulczyby wronie-oko, tudzież własności sławnego owego jadu, którym mieszkańcy Jawy zaprawiają swe strzały, to jest *upas* otrzymywanego z gatunku (*Str. tieute*). Medycyna jednakże umiała użyć tych strasznych własności do zbawienych zastosowań i przepisuje strychninę w tych przypadkach, gdzie sparaliżowana kurezliwość mięsów wymaga obudzenia przez silny bardzo środek; alkaloida ta jednakże używa się wtedy w bardzo małej ilości, bo w drobnych tylko ułamkach jednego grana. Mięisty nasiennik różnych gatunków *szczegotowych* nie posiada owych niebezpiecznych własności, jest jadalnym w krajach zamieszkiwanych przez też rodziny; takimi są owoce szczegoty: *Carissa edulis* i *C. carandas*, mięszlinu: *Melodinus monogynus*, pokarpu: *Willughbeia edulis*, i t. d., i t. d.


#### JEDNOPLATKOWE KOŁOZAWIĄZKOWE.

(Tablica XV).

§ 841. **Marzanowate** (*Rubiaceae*). Rodzina ta, jedna z największych i najprzyrodzeńszych w państwie roślinnym, daje się podzielić na wiele podrzędnych, według rozmaitych względów. A naprzód na dwa wielkie oddziały: *kawowe* (*Coffeaceae*), o komorach jedno lub rzadziej dwu-zalążkowych, i *chinowe* (*Cinchonaceae*) o komorach wielozalążkowych. Następnie dzieli się na plemiona, a to według przyrodzenia owocu, który albo jest mięsisty (jagoda lub pestczak o wielu pestkach), albo suchy, pękający lub niepękający z owockami po dojrzeniu zrosniętymi lub oddzielonemi (fig. 748), o dwóch (najczęściej), lub o wielu komorach; dalej według tkania bielma, które jest albo mięsiste albo rogowe, według kwiatostanu, którego części nieraz ściśnięte są w kwiatogłówkę,

a niekiedy nawet zlewają się z sobą i zrastają z zawiązkami; według przylistków mniej lub bardziej rozwiniętych, albo też zrosniętych z sobą w przedziale pomiędzy dwoma ogonkami, i tworzących tym sposobem rodzaj pochwy różnego kształtu. W europejskich marzanowatych, przylistki te rozwijają się w liście podobne prawdziwym i powiększają tym sposobem mniej więcej ich liczbę, podług różnych sposobów zrosnięcia lub rozdzielenia tych liści przydatkowych. Powstaje zład nawożczas okółek z liści zazwyczaj męskich i ułożonych w gwiazdkę, od czego też rośliny te nazwano *gwiazdkowatemi* (*Stellatae*); jednakże przy każdym węźle dwa tylko pączki naprzeciwległe się rozwijają. Przyrosły zawiązek uwieńczonym częstokroć bywa krążkiem mięsistym (fig. 716), przez który przechodzi szyjka pojedyncza wprawdzie, lecz nierzadko podzielona dosyć głęboko na tyle odnóg, ile jest komór w zawiązku.

W dość znacznej liczbie gatunków tej rodziny napotykamy godne uwagi własności, które nam tu wypada rozebrać. Kora wielu gatunków jest ściągająca i bardzo gorzka, a z tego po-



714. Zarys kwiatu przytulii (*Galium mollugo*).  
 715. Kwiat cały.  
 716. Tenże przecięty pionowo. — c Kielich zrosnięty z zawiązkiem o. — p Korona. — e Pręciki.  
 717. Owoc marzany (*Rubia tinctorum*).  
 718. Tenże po oddaleniu dwóch owoczków.  
 719. Przecięcie pionowe nasienia. — p Bielmo. — e Zarodek.

wodu posiada własności przeciwwzimmnicze, słynące szczególniej w chinie (*Cinchona*). Zależą one od alkaloidów, o których namieniliśmy już wyżej (§ 305) to jest *cynchoniny*, a osobliwie *chininy*. Niektóre kory zawierają obie te alkaloidy zarazem, inne zaś jedną tylko z nich; dlatego też i działanie ich medyczne nie jest zupełnie jednakowe. Dawniej używano albo samej kory, albo wyciągu takowej, rozpuszczając pierwiastki działalne bądź w wodzie, bądź w wysokoku, który daleko lepiej służy ku temu celowi. Dzisiaj gdy wiadomy jest sposób otrzymywania oddzielnie samych pierwiastków, używa się wprost takowych, a to z daleko większą pewnością tak co do skutku jaki sprowadzić chcemy, jak co do ilości jaką przepisać wypada. Łatwo więc pojąć jak bardzo różnić się musi środek złożony, jaki stanowiła kora, od środka prostego dostarczonego przez alkaloidę zawsze jednostajną, której się dziś używa. Są jeszcze inne marzanowate, jak np. *Portlandia hexandra*, w których korze dowiedziono obecności chininy i cynchoniny, lecz są i takie, które lubo używane jako środek przeciwwzimmniczy, nie zawierają ich wcale np. obwieńcz (*Exostemma*). Zatem własność ta zawisła od pierwiastków gorzkich, które mogą przedstawiać różne odmiany; nie jest ona wyłącznym przymiotem chininy, lecz ta posiada ją tylko w daleko wyższym stopniu, jest lepiej znana i na większe przeto zasługuje zaufanie. Nazwisko więc chinu nadawane pospolicie korze wielu roślin, należącej tak do tej jako też do innych wcale różnych rodzin, nie może wcale przemawiać za obecnością chininy lub cynchoniny, ale tylko za obecnością jakiegokolwiek pierwiastku gorzkiego, jędrniącego i ściągającego, którego skuteczność w leczeniu zimnie została stwierdzoną.

Korzenie innych marzanowatych słyną jako środki sprawujące wymioty, a z pomiędzy nich szczególniej korzeń skupiętki ipekakuany (*Cephaelis ipecacuanha*). Ostatnia nazwa nadawaną była również innym roślinom, bądź tej samej rodziny (*Psychotria emetica*, różne gatunki rodzaju *Richardsonia* i *Spermacoce*) bądź rodzin wcale różnych, jakieśmy o tém we właściwem miejscu namienili. Ze skupiętki otrzymano także pierwiastek działalny *emetynę*, która stanowi 16% korzenia ipekakuany i używa się zwykle teraz sama od 4-6 granów. Nie wiadomo czy znajduje się też we wszystkich innych korzeniach emetycznych, noszących imię ipekakuany.

Inne znowu korzenie poszukiwane są dla pierwiastku barwnego i z korzyścią używane w barwnictwie, szczególniej téż korzeń marzany (*Rubia tinctorum*), o której mówiliśmy już na inném miejscu (§ 629). Wiele gatunków tegoż samego rodzaju (*R. cordifolia* i *angustifolia*), pochodzących z innych krajów, posiada też same własności, które zdają się być wspólnemi i niektórym z naszych roślin należących do tegoż plemienia, tojest do marzanowatych gwiazdkowatych (jak w marzance *Asperula tinctoria*, i t. d.) lub do innych nawet plemion (jak np. wiele gatunków rodzaju *Morinda*, *Hydrophylax maritima*, *Oldenlandia umbellata*, której korzeń znany jest pospolicie pod imieniem *Chayavair*). Lecz ponieważ w tych wszystkich mniej jest barwniku niż w marzanie, przeto téż, jedno z nich są zaniedbane, drugie daleko mniej używane.

Kawa jest nasieniem gatunku *Coffea arabica*, a prawie całą jej miąższość tworzy bielmo rogowe, od którego zależą jęj własności, objawiające się jak wiadomo po *upaleniu*, ponieważ tym sposobem ulatnia się olej stały i wydaje woń tak przyjemną. Prócz tego, ziarna kawy zawierają inny jeszcze olej, topniejący w 25°, tudzież pierwiastek gorzki i drugi saletrorodny, nazwany *kofeiną*, a który rzecz dziwna, zdaje się być identycznym z teiną (§ 800), i dlatego jest do pewnego stopnia pożywnym dla ludów, które nie przestają na naparze, nie oddzielają od niego osadu (fusów). Roślina ta, której uprawa upowszechnioną teraz została prawie wszędzie pod zwrotnikami, pochodzi z wyższej Etyopii, żkąd pod koniec piętnastego wieku przeniesioną została do Mekki i tak się przyswoiła, iż długi czas sądzono, jakoby rzeczywiście krajina ta była jęj ojczyzną, a dotychczas jeszcze kawa mokkańska uważana jest za najlepszy gatunek. Sprowadzona przez Wenecyan kawa, poznana została we Francyi i Anglii w połowie wieku XVII; sama jednakże roślina wprowadzoną została do Europy później dopiero przez Hollendrów, którzy ją uprawiali w Batawii i na wyspie S. Maurycego. W ogrodzie botanicznym paryzkim zaczęto ją hodować od 1713, a ztamąd przeniesiono ją w 4 lata później do osad francuzkich na Antyllach. Nieraz już opisano, w jaki sposób plantacye tak obszerne później w Martynice, Kajennie i na wyspie Burbon, powstały wszystkie z jednego szczepu uchowanego przez czas

podróży morskiej staraniem kapitana Deelleux, który z nim dzielił nawet swoją własną porcję wody. Zdaje się iż nasiona innych marzanowatych, posiadające bielmo rogowe, powinnyby posiadać niejaki podobieństwo z kawą, a niektóre próby robione na nasionach przytulii (*Galium*), w czasie kiedy systemat kontynentalny przeszkadzał wprowadzaniu kawy z osad do Francji, potwierdzają to mniemanie. Lecz doświadczenia podobne nie były daleko posunięte, i z surrogatem kawy też samo się stało co z każdym innym; porzuceno gorsze, jak tylko nastąpiła łatwość dostania lepszego.

§ 842. **Przewiertniowate** (*Caprifoliaceae*). Rodzina ta dzieli się na dwa plemiona, z tych *bzowe* (*Sambuceae*) mają za wzór bez; korona ich jest kształtna, zawiązek uwieńczony trzema bezszyjkowemi znamionami; nasiona z szewkiem, leżącym jak zwykle na wewnętrznej stronie; drugie plemię *wiciokrzewowych* (*Lonicereae*), o koronie czasami niekształtnej, o szyjce nitkowatej i nasionach, na których szewek bieży po stronie zewnętrznej. Z tym oddzielnym rozkładem, właściwym wszystkim rodzajom, łączy się niekiedy inny jeszcze, o którym wspomnieć należy: a mianowicie, że w jednym i tym samym zawiązku jedna lub dwie komory (np. w śniegulicze [*Symphoricarpus*]) zawierają pojedyncze tylko nasiona, z któremi się razem wykształcają, gdy tymczasem inne zawierają wiele zalążków i płonieją wraz z niemi. Godną jest także uwagi, że owoce dwóch kwiatów zbliżonych zrastają się z sobą częstokroć, i tworzą na pozór jeden, np. w suchodrzewce (*Lonicera xylosteum*).

§ 843. **Gazewnikowate** (*Loranthaceae*). Miejsce rodziny tej w układzie jest wątpliwe; chociaż bowiem płatki kwiatów jej bywają często zrosnięte w rurkę noszącą na sobie pręciki, jednakże często także są zupełnie wolne, a nawet niema ich wcale w wielu rodzajach, które wtedy są zazwyczaj osobnopłciowe. Według tych rodzajów, których dokładniejszy posiadamy rozbiór, umieścićby należało całą rodzinę pomiędzy wielopłatkowemi, w bliskości bzowiczkowatych i dereniowatych, zaś pomiędzy bezpłatkowemi w bliskości sandałowcowatych, albo też srebrnikowatych. Szczególniejszém jest roślinie gatunków tu należących, a o których nasza jemiola (*Viscum album*) może dać pojęcie, wrastają one wehodząc w korę innych drzew, i czerpią swe pożywienie jużto za pomocą korze-

ni, które się wciskają pomiędzy korę i drewno, już też, co częściej, za pomocą nabrzmiałości, która się coraz bardziej zagłębia w obce drewno w miarę wzrastania łakowego przez przybywanie nowych słojów, i ułatwia wprostny związek pomiędzy tępem a drzewem pasożytu. Łodyga tych roślin przedstawia zwykle szereg stawów, a na każdym z nich rozgałęzia się widełkowato, zachowując przez cały rok swą zazwyczaj zieloną barwę. Pylniki jemióły posiadają wcale szczególną budowę: każdy z nich siedzi na powierzchni jednej z podziałek kielicha i jest przesiany nakształt gąbki mnóstwem dziurek, które są otworami tyluż przerw zawierających pyłek. Z zalążków jej jeden się tylko rozwija, albo też dwa lub trzy zrastają się w jedno, tak, iż wtedy nasiono zawiera tyleż zarodków, których kielki się rozbiegają, liścienie zaś zbiegają i zrastają się z sobą. Bielmo otaczające zarodki jest zielonawe, a nasiennik wzdęty istotą klęjką, posiadającą przyrodzenie lepu.

§ 844. **Kozłkowate** (*Valerianeae*). Umieściliśmy je pomiędzy rodzinami, których owoc jest jednokomorowy, związek jednakże posiada trzy komory, z których dwie stale płonieją, słabe tylko ślady pozostawiając po sobie w owocu dojrzałym. Pręciki rzadko są w liczbie równej podziałom korony; częściej daleko przywiedzione są do 3 lub nawet do 1 tylko (w biedrzyńku [*Centranthus*]). Korzenie niektórych kozłków (*Valeriana officinalis*, *phu*, *celtica*) są gorzkie i aromatyczne, wydające silny zapach, który u nas uważa się za nieprzyjemny, gdy tymczasem podobna woń uchodzi na wschodzie za słynne pachnidła.

§ 845. **Drąpaczowate** (*Dipsaceae*). Kwiaty ich odznaczają się obecnością szczególną dla każdego z nich pokrywy czyli kieliszka; z tego powodu kielich zdaje się być podwójnym (fig. 276, 277). Prawdziwy czyli wewnętrzny kielich niezupełnie zrośnięty jest z zawiązkiem i to tylko w wyższej części swój zwężonej rurki. Piętno to, tudzież 4 pręciki, niekiedy dwusilne, wiążą tę rodzinę z jednopłatkowemi, podzawiazkowemi, a mianowicie z kuleczkowatemi. Z drugiej strony rozkład kwiatów ściśnionych w główkę objętą długą pokrywą (fig. 188, 200), nadaje im wielkie podobieństwo do koszyczka złożonych, a częste przejście podziałek kielicha w puch, co

się także i w kozłkowatych napotyka, potwierdza to pokrewieństwo, które wszelako zanadto może być przesadzonem.

§ 846. **Dzwonkowate** (*Campanulaceae*). Rodzina ta stanowi pomiędzy jednopłatkowemi uderzający wyjątek, jaki widzieliśmy tylko u niektórych rodzin wyszczególnionych na tablicy XII; pręciki bowiem nie siedzą na koronie, lecz wprost



720.

721.

722.



723.

724.

726. 727. 725.

720-727. Narzędzia owocowania różnych gatunków dzwonek. — c Kielich. — p Korona.

720. Zarys kwiatu z *Campanula medium*.

721. Pąk z *Camp. rotundifolia*.

722. Przecięcie pionowe kwiatu. — s Znamiona. — o Zawiązek wraz z rurką przyrosłą kielicha. — e Pręciki.

723. Przecięcie poziome.

724. Owoc uwieńczony krajem kielicha.

725. Nasiono.

726. Toż samo przecięte pionowo. — p Bielmo. — e Zarodek.

727. Zarodek odosobniony.

na kielichu (fig. 712). Wprawdzie korona ta składa się z odrębnej tkanki, suchej i błoniastej (jak w wielu wrzosowatych), i zamiast opadać odrazu, jak się to dzieje w większej liczbie koron noszących na sobie pręciki, pozostaje na miejscu lub zeschnięta wieńczy owoc (fig. 416 e, 724). Owoc otwiera się u wierzchołka to kilku łupinami, które w reszcie swęj rozciągłości pozostają z sobą spojone, to dwiema dziurkami bocznymi (fig. 116 t), odpowiadającymi tyłuż komorom; liczba tych ostatnich, albo się równa liczbie innych części kwiatu, albo téż zmniejsza się do 3 lub 2. Postawa ogólna: przedkwitnienie szyjki najeżone włosami czepnemi, pylniki zrosnięte niekiedy w rurkę (w pawieńcu [*Jasione*]) zbliżają bardzo rodzinę dzwonkowatych do złożonych w ogóle, a szczególnie do podróżnikowych (*Cichoraceae*) dla mlęczu, jaki się w nich znajduje. Mlęcz ten jest nieco ostry, nie przeszkadza jednakże wcale użyciu młodych korzeni wielu gatunków (up. rapunku-ku) na pokarm.

§ 847. **Stroiczkowate** (*Lobeliaceae*) ściśle się łączą z poprzedzającemi i wiążą je témbardziej z powodu stałego zrosnięcia się pylników, ze złożonemi, których nawet półkwiateczki przypomina ich korona rozszczeplona częstokroć z jednej strony, a zwracająca pięć swych podziałek w drugą. Posiadają one także włosy zbieracze, ułożone pod znamieniem w okrąg, mogący się bez wątpienia uważać za podobnik zasłonki (*indusium*) rodzin pobliskich. Sok ich jest także mlęczowy, lecz nadzwyczaj ostry, nadający przeto wielu gatunkom własności silne, a nawet jadowite, a czyniący je wszyskie podejrzanemi.

§ 848. **Złożone** (*Compositae*). Ta grupa roślin, zawierająca około 9000 znanych gatunków, powinna być raczej uważana za gromadę niż za rodzinę. Widzieliśmy w rzeczy samęj, iż ona stanowi w metodzie Jussiego gromadę (korono-nazawiazkowych pylniko-zrosłych) i prawie wszyscy pisarze zgadzają się na przyjęcie jęj, jako takięj w różnych układach pod tém lub owém nazwiskiem (u Linneusza [§ 688], pod nazwiskiem zrosło-pylnikowych [*Syngenesia*]). Dla zrozumienia podziałów jakie w nięj porobiono, wypada tu dać najprzód wyobrażenie o budowie i sposobie połączenia kwiatów. Takowe skupione są na kończyźnie szypułki mniej więćj rozszerzonęj w kwiatogłówkę, albo raczej koszyczek (§ 200) otoczony

pokrywą o jednym lub wielu okręgach listeczków (§ 230). Z powodu takiego rozkładu, wszystkie kwiaty przybierają postać jednego kwiatu, którego kielich stanowi pokrywa; ztądto poszła używana dawniej nazwa *kielicha wspólnego*. Małeńkie właściwe kwiaty bywają dwojakie: jedne kształtne, których kraj dzieli się na pięć zębów lub łatek równych (fig. 730); drugie niekształtne, których kraj rozszczepiony w znacznej długości, odrzucony jest na zewnątrz w postaci języczka złożonego z pięciu części zrosniętych i kończącego się przeto pięciu małemi ząbkami (fig. 295, 728); pierwsze zowią się *kwiateczkami (flosculi)*, drugie *półkwiateczkami (semiflosculi, ligulae)*. Kwiaty te bywają albo obopłciowe, albo jedno płciowe, albo nakoniec nijakie (*flores neutri*). Otóż na różnych odmianach, jakie zachodzić mogą w jednej i tej samej kwiatogłówce, oparto podziały całej grupy. Linneusz ustanowił takowe podług rozkładu płci w kwiatach jednego i tegoż samego koszyczka; te bowiem są wszystkie obopłciowe (*wielożeńne równe [Polygamia aequalis]*), obopłciowe pomieszane z żeńskimi (*w. zbytne [Pol. superflua]*), lub z niejakiemi (*w. niedostateczne [P. necessaria]*); prócz tego dodał *wielożeńne odosobnione (P. segregata)*, których kwiatki opatrzone są właściwemi pokrywami. Tournefort, którego podział został powszechniej przyjęty, odróżniał: *półkwiateczkowe (semiflosculosae)*, to jest takie, których koszyczek składa się z samych półkwiateczków); *kwiateczkowe (flosculosae)*, których koszyczek zawiera same kwiateczki, i promieniste (*radiatae*), których koszyczek zawiera jedne i drugie. Ostatnie nazwisko poszło ztąd, że półkwiateczki ułożone są wtedy w okrąg (*radius*) na brzegu koszyczka i rozbiegają się promienisto na zewnątrz; kwiateczki zaś leżą w środku, a ogół ich stanowi krążek (*discus*). Później Vaillant, a po nim Jussieu zmienili nieco ten podział, zachowując półkwiateczkowe pod imieniem *podróżnikowych (Cichoraceae)*, a łącząc pod imieniem *baldaszkogronowych (Corymbiferae)* promieniste z częścią kwiateczkowych, których reszta stanowi *karczochowate (Cynarocephaleae)*, odznaczające się postawą i szybkami nabrzmiałemi popod znamieniem.

Ostatni ten podział zachował się do pewnego stopnia, liczba zaś podrzędnych podziałów pomnożyła się w ostatnich czasach wielorako. Dziś rodzina złożonych dzieli się: 1° na ję-

zyczkokwiatkowe (*Liguliflorae*, fig. 728), które odpowiadają półkwiateczkowemu czyli podróznikowemu; 2° wargokwiatkowe (*Labiatiflorae* fig. 729), których korony są niekształtne wprawdzie, lecz w inny sposób od poprzedzających: dzieli się bowiem na dwie wargi; z tych jedna zwrócona jest ku wewnątrz i złożona z jednej lub dwóch podziałek; druga zwrócona ku zewnątrz i złożona z czterech lub trzech podziałek pozostałych. Rośliny te wprzódy zaledwie były znane, i dlatego to opuszczano je w dawnych układach; 3° rurkokwiatkowe (*Tubuliflorae*, fig. 730), których kwiaty bądź wszystkie, bądź tylko środkowe, są kształtne i rurkowate; obejmują one przeto promieniste i kwiateczkowe, lecz jedno z ich plemion (*karczochowe*, *Cynareae*) odpowiada znowu dawniejszym *karczochowatym* (*Cynarocephalae*). Prócz tego wprowadzono cztery inne podziały i zasadzono je głównie na różnicy w budowie szyjek i znamion; piętna te posiadają rzeczywiście wielką wagę w złożonych, ponieważ pociągają za sobą wiele innych, których są niejako krótkim wyrażeniem. Szyjka bowiem bywa pojedynczą w kwiatkach męzkich, a dzieli się zawsze w kwia-

727-738. Narzędzia owocowania złożonych.

727. Zarys kwiatu jednego z starczyków. Kolo zewnętrzne kropkowane oznacza puch, czyli kraj kielicha.

728. Półkwiateczek z podrózniku (*Cichorium intybus*). — o Związek zrosnięty z kielichem. — e Rurka utworzona z pręcików, przez które przechodzi szyjka dwuwębna s.

729. Kwiat jednej z języczko-kwiatkowych (*Chaetanthera linearis*). — o Związek zrosnięty z kielichem. — t Rurka korony. — ls Warga korony wyższa. — li Warga niższa. — e Rurka pylnikowa. — o Wierzchołek szyjki.

730. Kwiateczek gwiazdoszu (*Aster rubricaulis*) przecięty wpołu dla pokazania zalążka o, wzniesionego w zawiązku zrosniętym z kielichem, tudzież rurki e pylnikowej, siedzącej na koronie p i mającej w środku szyjkę s. — a Puch.

731-736. Wierzcholki szyjek złożonych, należące do różnych plemion. Dwa pasy znamieniowe, idą po wewnętrznej stronie odnog kończących szyjki. Na wielu widać włosy zbieracze od zewnątrz, pod lub nad niemi.

731. Wierzchołek szyjki jednej z podróznikowych (*Cichorium intybus*).

732. — — — — — jednej z wargokwiatkowych (*Chaetanthera linearis*).

733. — — — — — jednej z karczochowych (*Thevenotia*).

734. — — — — — jednej z starczykowych (*Senecio doria*).

735. — — — — — jednej z gwiazdoszowych (*Aster aduterinus*).

736. — — — — — jednej z sadźcowych (*Stevia purpurea*).

738. — — — — — jednej z sileńcowych (*Vernonia angustifolia*).

738. Owoc dojrzały starczyku, przecięty pionowo.



738.



728.



729.




730.



737.



727.



731.

733.

732.

735.

724.

736.

tach żeńskich i obopiecznych na dwie odnogi, pokryte w części włosami zbieraczami i przedstawiające na brzegach swęj powierzchni wewnętrznej dwa małe paski gruczołowe, które uważamy za prawdziwe znamiona, chociaż imieniem tém oznacza się niekiedy małe owe odnogi. Widzieliśmy już, że w *karczochowych* (*Cynareae*, fig. 733) znajduje się bezpośrednio pod odnogami nabrzmienie czyli węzeł, który częstokroć najeżony jest włosami; paski znamienne idą wzdłuż całej odnogi i zbiegają się u jęj wierzchołka. W *starczykowych* (*Senecionideae*, fig. 734) szyjka jest zupełnie obła, odnogi jęj tępo zakończone i uwieńczone częstokroć kupką włosów, ponad którą odnogi przedłużają się niekiedy w stożek lub inny przydatek, paski jednakże znamienne zawsze tylko do tęj kupki dochodzą, nie łącząc się wcale z sobą. W *gwiazdoszowych* (*Asteroideae*, fig. 735) równowazkie odnogi wydłużone są bez zmiany aż po sam wierzchołek; od zewnątrz tylko bywają spłaszczone i pokryte drobnemi włoskami, do których sięgają paski znamienne. W *sadźcowych* (*Eupatoriaceae*, fig. 436) odnogi są długie, u wierzchołka nieco rozszerzone w maczugę, od zewnątrz pokryte wzdymkami; w *silenicowych* zaś (*Vernoniaeae*, fig. 737) odnogi są albo długie i widłowate, albo krótkie i tępe, najeżone długimi i równemi włoskami. W jednych i w drugich paski znamienne kończą się przed środkiem odnogi.

Wierzchołek szypułki, rozszerzony w talerzyk na którym siedzą kwiaty i który się zowie *osadnikiem* (*receptaculum*, *phoranthium*, *clinanthium*, [§ 209]), bywa płaski lub wklęśły, albo tęż przeciwnie wypukły, a nawet stożkowaty. Kwiaty mogą wychodzić bezpośrednio z równęj jego powierzchni, albo tęż osada ich sięga głębiej, przez co powstają dołki (*rec. areolatum*) lub nawet jamki (*rec. alveolatum*), których brzegi wznoszą się około nasady każdego zawiązka czyli niełupki, w blaszkach bądźto jednociągłych, bądź tęż rozciętych na języczki błoniaste niekształtne, bądź nakoniec w strzępki lub włosy (*rec. fimbrilliferum*). Cały ogół kwiatów otoczony jest pokrywą złożoną z listeczków czyli przykwiatków równęj postaci, częstokroć zamienionych w łuski i noszących to nazwisko, niekiedy zakończonych cierniami (jak w ostach [*Carduus*]), ułożonych w jeden lub dwa okręgi spółśrodkowe (§ 230), albo tęż częściej osadzonych dachówkowo w węzo-

wnieę. Czasami zrastają się one z sobą u dołu, lecz częścięj pozostają odosobnionemi. Przykwiatki wielorzędowe nie noszą w kątach swych kwiatu, z wyjątkiem jednak dość częstym najwewnętrzniejszych: lecz każdy pojedynczy kwiateczek może mieć swój przykwiatek, który razem z nim wychodzi z osadnika, a będąc ukrytym pomiędzy kwiatami i pozbawionym przez to światła, nabywa utkania i pozoru łuski białawej, lub błony (*bracteolae, paleae*). Kiedy przykwiatki pokrywają osadnik, takowy zowie się *plewiastym* (*rec. paleaceum*); kiedy ich wcale niema *nagim* (*r. nudum v. epaleaceum*). Pokrywa, albo obejmuje sama kwiaty obóplciowe (*koszyczki jednostajne C. homogama*), albo też dwa rodzaje kwiatów (*C. niejednostajne. C. heterogama*). W takim razie kwiaty nijakie lub żeńskie zajmują obwód, obóplciowe zaś lub same męzkie środek. Kiedy koszyczek obejmuje kwiaty męzkie i żeńskie, zowie się *oddzielnopłciowym* (*C. monoicum*). Kiedy jedne koszyczki złożone są z samych kwiatów męzkich, drugie z samych żeńskich, lecz siedzą na jednej roślinie, zowią się *dwoistemi* (*C. heterocephala*). Jeśli samce i samice znajdują się na różnych szczepach, koszyczki są *rozdzielnopłciowe* (*C. dioica*). Widzieliśmy już że koszyczki mogą zawierać same kwiateczki (*C. flosculosa v. discoidea*), lub same półkwiateczki (*C. semiflosculosa v. ligulata*), albo też jedne i drugie zarazem (*C. radiata*). Mogą one jeszcze być wargokwiatkowemi (*C. falso discoidea*), lub na obwodzie języczkokwiatowemi, a w środku wargo-kwiatowemi (*C. falso-radiata, v. radiatiformia*).

Niekiedy w koszyczkach kwiateczkowych lub niewłaściwie krążkowych (np. w bławatku [*Centaurea cyanus*] i wielu innych chabrach [*Centaurea*]), kwiaty zewnętrzne zachowując kształt środkowych, wyrastają jednakże daleko silniej (*Cent. coronata*).

Kielich zrosnięty jest z zawiązkiem i otacza takowy zupełnie, czasami kończy się zaraz z nim nie pozostawiając żadnych śladów kraju; innym razem przedłuża się nieco ponad-tymże w rodzaju wieńca, albo też, co częściej, w plewki lub łuski, a najczęściej w puch; zaczynający się od samego wierzchołka zawiązku (*puch beztrzonkowy, pappus sessilis*) lub podwyższony na przedłużeniu rurki kielicha, mającém kształt niteczki (*puch trzonkowy, p. stipitatus*). Rozbieraliśmy już na inném miejscu (§ 147) przyrodzenie i różne odmiany puchu.

Do głównych postaci korony, któreśmy wymienili, dodać należy opis pewnych piętn uderzających, jakie takowa przedstawiać może: jednemu z nich jest ułożenie nerwów. Wiemy iż w ogóle w kwiatach innych roślin, przeważa nerw główny, a przeto w rurce korony jednopłatkowej, pięć nerwów głównych odpowiada pięciu łatom, w osi których każdy z nich się kończy. Inaczej rzecz się ma w kwiatach złożonych. Pięć nerwów przypada tu naprzemian względem łat, każdy z nich doszedłszy do łąty dzieli się na dwa idące dalej po odpowiadających brzegach, tak że każda podziałka kraju obrzeżona jest dwoma nerwami wystającymi i zbiegającymi się u wierzchołka (fig. 728, 730). Zatem nerwy boczne wykształcają się tu bardziej, i zlewają po dwa w rurce, a oddzielają w kraju. Co się tyczy głównych, środkowych, te ukazują się także niekiedy; najczęściej zaś niema ich wcale. Radzono nazwać rodzinę złożonych od tego tak uderzającego piętna *nerwoobrzeżnemi* (*Nervamphipetalae*). Z tym rozkładem łączy się przedkwitnienie łupinowe. Korony miewają różną barwę i albo wszystkie kwiaty jednego koszyczka są jednobarwne (*C. monochroma*) albo nie (*C. heterochroma*), a wtedy środkowe są zawsze żółte; obwodowe zaś posiadają albo białą, albo inną barwę z rzędu niebieskich.

Nitki pręcików osadzonych na rurce korony, albo są wolne, albo z sobą zrosnięte, pylniki zaś zawsze są połączone brzegami, i tworzą tym sposobem rurkę (fig. 728, 730, e), nie różniąc się od siebie prócz tylko na wierzchołkach, które zwykle wybiegają w przysadki dłuższe lub krótsze, tudzież przy nasadach, które albo przedłużają się w ogonki (*antherae caudatae*), albo też nie (*anth. ecaudatae*). Szyjka o której mówiliśmy już powyżej, przechodzi przez rurkę utworzoną z pylników, a przedłużając się zmiata zawarty w nich pyłek za pomocą włosów czepnych, zachodzących w szpary worczków.

Zawiązek zamyka w pojedynczej swój komorze jeden tylko zalążek wzniesiony (fig. 730 e). Jednakże sądząc po podwójnej liczbie znamion i po obecności dwóch sznurków, które niekiedy wychodzą od nasady szyjki i zbiegają w przeciwnym kierunku z góry na dół po wewnętrznej ścianie komory, aż po samą nasadę zalążka, czyliżby nie można przypuścić iż rzeczywiście zawiązek powstał ze zrosnięcia dwóch owoców? Przechodzi on w niełupkę, która według obecności lub nieo-

becności, albo też według różnego przyrodzenia puchu, wygodnych dostarcza piętń. Nasienie wzrastając zlewa się niekiedy z nasiennikiem za pośrednictwem okryw, złożonych z podwójnej błony. Krótki kiełek zarodka zwrócony jest na dół, ku znaczkowi (fig. 738).

*Podróznikowe* czyli języczkokwiatowe, posiadają sok młeczny podobnie jak w dzwonkowatych. Jest on gorzki, nieco ściągający, a nawet narkotyczny. Własności te znajdujemy we wszystkich prawie dzikich gatunkach, a to w wyższym lub niższym stopniu; szczególnież zaś widzimy je połączone w sałacie leśnej (*Lactuca sylvestris*); jadowitej (*L. virosa*), której wyciąg używa się nakształt opium, lubo nie sprowadza tych samych przypadłości. W innych gatunkach własności te słabieją, mianowicie też w tych, które bywają uprawiane; której korzenie są jadalne jak np. w salsefli (gatunek wężymordu: *Scorzonera*), albo młode pędy i liście, jak sałata (*Lactuca*), cykorya (*Cichorium endivia*), brodawnik (*Leontodon taraxacum*; kozibród *Tragopogon*) i t. d. i t. d. Wspomnieć jeszcze należy, iż używają się także części wysilone, bądźto same przez się, jeśli rosną pod ziemią, bądź sztucznie, albo też częścię bardzo młode, których soki właściwie nie mogły się jeszcze zupełnie wyrobić i niezbyt są gorzkie i ściągające, tak, iż podwyższają tylko smak pokarmów.

Toż samo możnaby powiedzieć o różnych jadalnych gatunkach *karczochowych*, jakoto: o liściach kardów (*Cynara cardunculus*), które się zwykło sztucznie bielić czyli wysilać, o osadnikach karczochów (*Cynara scolymus*); innych które się zbierają przed otwarciem się kwiatu, i nawet na surowo mogą być jedzone, jeśli są jeszcze bardzo młode. Każdemu znana jest nadzwyczajna gorycz innych części karczochu: jestto własność wspólna wszystkim roślinom tego plemienia, dla której wielu z nich używamy jako środków żołądkowych.

Gorycz tę znajdujemy jeszcze w roślinach objętych dawniej pod imieniem baldaszokronowych, lecz tu odmienia ją nieco pierwiastek żywiczny od którego zależą wydatne bardzo własności. Jeśli pierwiastek ten zamiast być stałym, bierze postać olejku, roślina będzie zarazem jędrniącą aromatyczną i przeciwkurczową, jak np. rumianek (*Chamomilla*), bylica (*Artemisia*), krwawnik (*Achillea*), wrotycz (*Tanacetum*) i t. d. Radzono nawet używać naparu wielu z nich, zamiast herbaty.

Przewaga pierwlastku gorzkiego nadaje niektórym własności przeciwzmniczne, jak np. wielu gatunkom liczonym pospolicie do rumianku i t. d. Przewaga żywicy podwyższa własności drażniące, wywołuje poty, ślinienie, obfite wydzielanie się moczu; dla téjto bez wątpienia przyczyny, wiele gatunków zamorskich słynie za środki przeciw ukąszeniu węzów: jak np. gatunek sadzcu: *Eupatorium ayapana*, lub *Mikania guaco*.— W kilku baldaszkogronowych znajdujemy nagromadzoną skrobią, która się używa na pokarm dla ludzi lub zwierząt; bulwy (*Helianthus tuberosus*) można pod tym względem porównać do ziemniaków; w nich bowiem także gałązki dolne i podziemne przeobrażają się w główki, opatrzone oczkami i napełnione skrobią. W omanie (*Inula helenium*), odkryto także pierwiastek gorzki nazwany *inuliną*; bardzo podobny do skrobi, z którą jednakowo prawie ma skład (co do wagi 43,72 węgla, 6,20 wodorodu, 50,8 kwasorodu) i własności, prócz tylko że się nieco rozpuszcza w wodzie cieplej (około  $\frac{1}{4}$ ) i zimnej ( $\frac{1}{50}$ ), tudzież że jod barwi go na żółto a nie na niebiesko. Inulina znajduje się w bardzo wielu innych roślinach, w których zastępuje skrobią. Nasiona większej części złożonych zawierają olej, jak się o tém łatwo można przekonać na słoneczniku (*Helianthus annuus*). Wiele nawet gatunków uprawiamy w celu otrzymania oleju, jak np. mazićka (*Madia sativa*), *Guizotia oleifera* i t. d.

## GEOGRAFIA BOTANICZNA.

§ 849. Wiadomo że żadna roślina nie rozpościera się jednostajnie po całej kuli ziemskiej, lecz każda zajmuje pewne tylko miejsca na jej powierzchni. Granice przeznaczone dla każdej zawiąły od wielu przyczyn. Warunki bytu rozmaitych roślin zależą od szczególnych odmian ich ustrojności, i tam tylko rośliny żyć i rozmnażać się mogą, gdzie znajdują wszystkie okoliczności stosowne dla siebie. Nadto postrzeżenia przekonują, że rośliny nie wyszły z jednego wspólnego środka, z któregoby się następnie nakształt promieni rozpościerały, lecz że istniało odrazu wiele takich pierwiastkowych środków, z których każdy posiadał swoją własną roślinność, chociaż z drugiej strony wiele zdaje się być gatunków wspólnych owym środkom. Jeśli warunki różnią się od siebie na dwóch jakich miejscach, roślinność tychże różnić się także musi; lecz podobieństwo jednych nie pociąga za sobą koniecznie podobieństwa drugich, szczególnie przy znacznych odległościach, ponieważ rośliny nie mogą w ogóle przechodzić z jednego takiego punktu na drugi, w którymby się również udawać mogły. Tak więc rozkład roślin na ziemi wywołany jest przez powikłane z sobą przyczyny, jedne z tych są fizyczne, zależące od przyrodzenia tak samych roślin, jako też działaczy je otaczających, drugie zasłonięte są przed naszymi oczyma i pogrążone w tajemnicach początku jestestw.

§ 850. Geografia botaniczna jest częścią nauki, zajmującą się tym rozkładem roślin. Środek fizyczny, w którym roślina żyje, a który przedstawia pewną sumę warunków, zowie się jej *stanowiskiem* (*statio*); ten zaś lub ów kraj, w którym się znajduje, stanowi jej *mieszkania* (*habitatio*). Mówiąc że roślina żyje na bagnach, płaskach nadmorskich, skałach, górach lub na brzegach lodów, oznaczamy tym sposobem jej stanowisko. Mówiąc znowu że rośnie w Europie, Francyi, Owernii, około Paryża, oznaczamy jej mieszkanie w granicach coraz ściślejszych. Wiadomości te dadzą się zastosować do jednostek wyższego rzędu niż gatunki; można poszukiwać rozkładu

całych rodzajów a nawet plemion lub rodzin, a częstokroć mniejsze lub większe takowe stowarzyszenie gatunków pomiedzy którymi domyślać się wtedy można bardzo jednostajnej ustrojności, przekonywa także o wielkiej jednostajności mieszkania lub stanowiska, albo obudwu zarazem.

§ 851. Zajmijmy się jednakże wprzód przyczynami niż skutkami, a zanim wejdziemy w drobniejsze szczegóły i zanim objaśnimy przykładami to, co się powiedziało, wypadła nam zastanowić się poprzednio w ogóle nad sposobem w jaki rozdzielone są na powierzchni ziemi owe zewnętrzne działacze, mające, jakżeśmy widzieli, tak wielkie znaczenie w rośnięciu, jakoto: ciepło, światło, powietrze i woda, które w każdym miejscu łącząc się w pewnym stosunku stanowią klimat.

Ciepło zmniejsza się od równika ku biegunom i to dość prawidłowo, jeśli uważać będziemy każdy z osobna południk. Lecz porównyując zmniejszanie się to na wielu razem południkach, uderzy nas różnica, jaka się pod tym względem objawia. Każde miejsce w ciągu roku posiada pewien stopień ciepła; porównawszy zaś stopnie te przez ciąg wielu lat, otrzymamy ztąd średnią temperaturę owego miejsca. Linia poprowadzona przez szereg miejsc mających jednakową temperaturę średnią zowie się *równocieplą* („*isotherme*”; od *ισος*, równy *θερμοσ*, ciepło). Z pierwszego wejrzenia możnaby sądzić, iż linie równociepłe są tylko wyrażeniem mniejszego lub większego oddalenia od wielkiego źródła ciepła tojest od słońca, że przeto każda z nich przecina południki w jednakowej odległości od równika, czyli innymi słowy, że każda z nich odpowiada pewnemu stopniowi szerokości; jednakże doświadczenie dowodzi, iż rzecz ma się inaczej. Porównyując z sobą linie równociepłe otrzymane na drodze wprostnych postrzeżeń, widzimy iż takowe tworzą na kuli ziemskiej nie koła równoległe od równika, albo przynajmniej kształtne, lecz linie krzywe, niejednakowo od niego w równych punktach oddalone. Linia najwyższej temperatury nie przypada zupełnie na równiku, lecz oddala się od niego w jednym miejscu ku południowi, w innym ku północy. Najwyższy stopień zimna zdaje się także nie przypadać na samych biegunach, lecz na naszej półkuli zatrzymuje się około 12 lub 15 stopnia, panując głównie na północy dwóch wielkich stałych lądów i tworząc tym sposobem niejako dwa bieguny zimne. Linie równociepłe przedstawiają w zagię-

ciach swoich około tych biegunów pewne podobieństwo do siebie, dalekie jednakże są od dokładnej równoległości. Śledząc linie równociepłe od zachodu ku wschodowi na półkuli północnej, na niej bowiem tylko postrzeżenia mogły być dotąd czynione i powtarzane w liczbie miejsc o tyle dostatecznej, że jesteśmy w stanie zakreślić linie te w sposób nieco dokładniejszy, — spostrzegamy, iż takowe zniżają się ku południowi w środku dwóch wielkich lądów a szczególnie w Ameryce, podnoszą się zaś ku północy na dwóch wielkich morzach między temiż leżących, a szczególnie na oceanie Atlantyckim. Temperatura więc starego świata jest w ogóle wyższa niż nowego, wewnątrz zaś lądów niższa niżli na brzegach morza; daleko także jest wyższa na brzegach zachodnich niż na wschodnich. Różnice te przy równych szerokościach, mogą być dosyć znaczne i to tém bardziej, im się więcej oddalamy od równika, tak, iż idąc ku północy dosięgają 20 prawie stopni. Tym sposobem północna część Stanów Zjednoczonych około 44 stopnia szerokości północnej i Drontheim na zachodnim brzegu Norwegii około 63<sup>50</sup> stopnia, znajdują się na jednej równociepłej, której średnia temperatura równa się 5<sup>0</sup> Cels.

§ 852. Ztąd jednakże, iż wiele miejsc leży na tej samej równociepłej i odbiera w przeciągu roku tęż samą ilość ciepła, nie wypada jeszcze, aby klimat tych miejsc był jednakowy. W rzeczy samej, ilość ta może być różnie rozdzieloną pomiędzy różne miesiące, lub całe pory roku, i tak, w rozdzieleniu tém może zachodzić albo pewna równość, tak, iż zima i lato będą wcale umiarkowane, albo też przeciwnie wielka nierówność; tak, iż lato będzie nadzwyczaj gorące a zima nadzwyczaj ostra. Te najwyższe różnice temperatury mają daleko więcej wpływu na roślinność niż temperatura średnia. *Równozimową* (isochimène; od χειμὼν zima) nazywamy linią przechodzącą przez wszystkie miejsca, u których zima, w średnim roku, zniża się do jednego punktu; *Równoletnią* zaś (isothère od θέρος lato) linią przechodzącą przez miejsca, w których lato podnosi się do tegoż samego stopnia ciepła. Nowe te linie oddalając się od równociepłych, nie przechodzą przez te same miejsca.

§ 853. Wielka ilość wód stalszą posiada temperaturę niż ziemia, tak, iż na morzu o danym czasie różnica dwóch punktów różnej szerokości jest mniejsza, a w pewnym danym miej-

scu różnica zimy od lata jest podobnież mniejsza niż na lądzie. Łądy przyległe biorą także udział w tej jednostajności, i ztądto powstał podział klimatów na morskie i lądowe: pierwsze na brzegach i wyspach są umiarkowańsze, a to tém bardziej im wyspy są mniejsze i na pełniejszym leżą morzu; w drugich różnica ciepła letniego od temperatury zimy tém bardziej uderza, im bliżej staniemy linii środkowej lądu. Tak np. na wyspach Feroe, około 62° szerokości, ciepło nie dosięga 12° w lecie, lecz za to nie opada niżej 4° w zimie, dając 7° różnicy między obiema porami; w Syberyi zaś przeciwnie, około tegoż samego stopnia np. w Jakucku termometr opada w zimie przeszło na 37° niżej zera, a podnosi się w lecie do 17° powyżej tegoż, a zatem przechodzi odległość 54°.

§ 854. Nie wzięliśmy tu jeszcze pod uwagę innéj przyczyny silnie wpływającej na rozdzielenie ciepła po powierzchni ziemi; mówiliśmy bowiem o tej ostatniej tak, jak gdyby ona przedstawiała wszędzie tę samą równią, to jest równią morza. Każdemu jednakże wiadomo, iż rzecz się ma inaczej, że powierzchnia ta w znacznej przestrzeni wcale nie jest równą, że owszem podnosi się do różnych wysokości, najeża górami, tworzącemi łańcuchy dłuższe lub krótsze, ponad któremi wznoszą się znowu w pewnych odległościach szczyty daleko jeszcze wyższe. Im się zaś wyżej wznosimy, tém niższą znajdujemy temperaturę, tak, iż w przeciągu kilku godzin wstępowania na góry, przejść można wszystkie stopnie zniżającego się ciepła. Wysoka zatem góra leżąca pod jedną równocięplą i okryta u wierzchołka wieczystym śniegiem, jak np. Chimborazo w Wielkich Kordylierach, przedstawia w niewielkiej przestrzeni wszystkie zmiany, jakiebyśmy napotkali w powolniejszym tylko następstwie, idąc od równika ku biegunowi. Z tegoż powodu niektórzy pisarze porównali obie półkule naszej ziemi do dwóch ogromnych gór połączonych z sobą podstawami: dowcipne to porównanie nie jest jednakże dokładnym z wielu względów; rozdzielenie bowiem wód, które tak wielką przestrzeń na obudwu półkulach zajmują, a które, jak widzieliśmy, tak ważnie wpływają na klimat, rozdzielenie powietrza, którego stopień gęstości nie zmniejsza się od równika ku biegunom tak, jak się zmniejsza od dołu do góry w atmosferze, nakoniec rozdzielenie światła, tak różne pod biegunami i na wierzchołkach gór podrównikowych, stanowią różnice bardzo wyraźne.

Jak prawo, według którego ciepło zmniejsza się od równika ku biegunom, jest różne na różnych południkach, tak też prawo, według którego ciepło zmniejsza się w miarę wznoszenia się w górę, zdaje się zmieniać stosownie do różnych okoliczności, jakoto: stosownie do pory roku, godziny dnia, nachylenia i położenia pochyłości. Zmniejszenie się jest mniej znaczne w zimie, w nocy i na niewielkiej pochyłości lub na wyniosłych płaszczyznach. Różnica mniej więcej 200 metrów pod dopięro wymienionemi okolicznościami daje w przecięciu 1° różnicy w temperaturze, czyli prawie tyle, ile daje odległość, 2° szerokości. Na pewnej wysokości zimno jest tak wielkie, iż ciepło dni letnich nie wystarcza na stopienie lodów tworzących się przez resztę roku; tamto zaczyna się granica wieczystych śniegów, która tém musi być bliższą, im zimniejszy jest klimat u spodu góry, czyli innemi słowy, im góra leży bliżej biegunów.— Granica ta, zniżając się coraz bardziej, zstępuje nakoniec ku 75°, aż po równią samego morza. Tym sposobem przypada ona na Kordylierach między zwrotnikami w wysokości blisko 5,000 metrów; na naszych Alpach w wysokości 2,700; w Islandyi zaś niżej 1,000. Cyple lodowate są przedłużeniami, które zstępują niżej od tej granicy stosownie do położenia gruntu, i oznaczają drogę przeznaczoną do ścieku śniegów i wód z nich powstających.

§ 855. Wilgoć powietrza wywiera wielki wpływ na roślinność, bądźto że woda zamieniwszy się w lekką, częstokroć niewidzialną parę lub mgłę mniej więcej grubą, dotyka części rośliny wystawionych na powietrze; bądź że zgęściwszy się, opada w deszczu i opłukawszy też same części wsiąka w ziemię. Powietrze musi być rozumie się tém suchsze, im powierzchnia pod niem leżąca zawiera mniej wody, którejby mu ustąpić mogła i im bardziej oddalona jest od wszelkiego zawieralnika mogącego takowej dostarczyć; — dalej, im cieplejsze jest samo powietrze, wtedy bowiem rozrzedza nagle parę, którą się w niem tworzy lub w nie wchodzi. Temperatura więc tak niska, iż zmniejsza parowanie i zgęszcza parę w mgłę lub deszcz, lecz nie zmienia jej jeszcze w stan stały, sprzyja wilgoci; takowa przeto musi być zwykleszą w jednej szerokości lub wysokości niż w drugiej. Lecz i zbyt wysoka temperatura sprzyja także znacznie wilgoci, a to z jednej strony wtedy kiedy może działać na znaczną ilość wody, której część zamienia w parę,

z drugiej, kiedy pary raz powstałe, napotykają okoliczności mogące je utrzymać w tym samym stopniu zgęszczenia, lub przeprowadzić je do jeszcze większego. Zjawisko pochodzą owe wielkie deszcze, które w pewnych porach spadają codziennie w krajach międzyzwrotnikowych; ztąd także stała i ciepła wilgoć wielkich lasów, w cieniu których utrzymuje się i odnawia. O wpływie znacznej liczby drzew skupionych na stan atmosfery, której suchości przeciwi się wtedy niedostatek parowania, przekonać się łatwo można na małą stopę w naszym własnym klimacie; widziano wszakże, iż rozległe nawet okolice zmieniły się pod tym względem zupełnie w skutek wytopienia lasów. Przyległość morza połączona z panującym kierunkiem wiatrów, od którego zależy kierunek pary powstającej na powierzchni wody, stanowi mniejsze lub większe źródło wilgoci, stałszy z tego powodu na wyspach. Wilgoć zatem jest jedną z przyczyn towarzyszących częstokroć wpływowi, od których zależy jednostajność temperatury. Obecność mniejszych zawieralników wody, jakoto: jezior, bagien, strumieni mniejszych i większych, działa podobnie, lecz w odpowiednio mniejszym stosunku. Przyrodzenie i wysokość gór wpływają także wielce na zmianę wilgoci powietrza. Jeśli wierzchołki ich są znacznie wzniesione, pochyłości zaś tak mało spadziste, że na nich wieczyste śniegi i cyple lodowate leżeć mogą, wtedy góry te podsycają ciągle małe strugi wody, która zbiegając w różnym kierunku po pochyłościach, zbiera się niżej, tworzy większe potoki i staje się najobfitszym źródłem strumieni i rzek płynących u spodu po dolinach i płaszczynach. Z takich zaś wierzchołków, które albo są za niskie, albo za strome, aby się na nich śniegi utrzymać mogły, zbiegają przemijające tylko potoki. Suchość panująca na nich rozciąga się częstokroć do znacznej odległości wokoło, i to tém więcej im są bardziej z drzew ogołocone. Pasma gór wpływają jeszcze na stan powietrza dla niższej swej temperatury, będącej skutkiem ich wzniesienia, zgęszczają bowiem pary pędzone w wielkiej ilości przez niektóre wiatry, — pary te znajdując zapórę spadają przechodząc w części w stan płynny; — tym sposobem jedna ściana góry może być ciągle bardzo wilgotną, druga zaś przeciwna, może być wcale suchą.

§ 856. Widzieliśmy już, że światło gra ważną rolę w wielkiej części zjawisk chemicznych, których skutkiem jest two-

rzenie się tkanek roślinnych, i że dojrzewanie, barwienie się i ruchy odbywają się najwięcej pod jego wpływem, połączonym z wpływem ciepła. Łatwo pojąć bez długich nawet objaśnień jak nierówno i jak rozmaicie rozdzielone jest światło na różnych punktach kuli ziemskiej; jestto koniecznym następstwem rozmaitego położenia ich względem słońca. Miejsca leżące w bliskości równika, wystawione są na kolejne działanie nocy równych dniom, podczas których promienie słońca padają na ziemię prawie pionowo. W miarę, jak się oddalamy od równika, czuć się daje wpływ pór roku i pociąga za sobą nierówność dni i nocy; z tego powodu, przez jedną część roku ziemia pozabawiona jest dłuższy czas promieni słońca, przez drugą znówu dłużej jest na nie wystawiona. Nadto, promienie te stają się w tym samym stosunku coraz ukośniejszemi a przeto i słabszemi aż do okolic podbiegunowych, w których pochyłość ich dochodzi do najwyższego stopnia, a z nią razem i nierówność dni i nocy, tak, iż okolice te przez połowę roku pogrążone są w ciemności, przez drugą zaś połowę wprawdzie ciągle są oświetlone, lecz promieniami nadzwyczajnie osłabionemi. Podobieństwo zatem, jakie upatrzyliśmy między szerokościami miejsc, w miarę oddalenia się od równika, a wysokościami w miarę wznoszenia się nad poziom morza, znika zupełnie pod względem rozdzielenia światła; góry bowiem w najwyższych swoich częściach są dłużej oświetlone i mają dłuższe dni, a z drugiej strony przejmując promienie słoneczne, opóźniają w miejscach niższych dzień, a przyspieszają noc. Pomimo to, rośliny okolic podbiegunowych zostają w pewnym względzie w jednakowym stosunku co do ilości światła, z roślinami wyniosłych gór, ponieważ jedne i drugie pokryte będąc śniegiem przez większą część roku, oglądają dzień przez ciąg niewielu tylko tygodni lata.

Dodajmy tu jeszcze, iż sąsiedztwo znacznych przestrzeni wód, zmniejsza stosunkowo natężenie światła, w skutek wznoszenia się par, które stawają pomiędzy ziemią a słońcem. Przyczyna więc ta, tak silnie wpływająca na zrównanie temperatury, a w ogóle i na podniesienie temperatury średniej, wywiera odwrotny wcale skutek na światło, osłabia je bowiem.

§ 857. Wszystkie powyższe wiadomości należą do meteorologii. Nauka ta zajmuje się badaniem przyczyn, które przez

połączenie różnych warunków spowodowują różne klimata. Tłumaczy ona, w jaki sposób wszystkie te przyczyny wypływają ze wspólnego źródła, to jest z działania słońca, które w skutek prawidłowego obrotu naszej kuli, w skutek różnego upostacenia miejsc i ich stosunków z wodami, tudzież w skutek nierówności powierzchni ziemskiej, objawia się najprzód bezpośrednio z pewną siłą na każdym punkcie, a oprócz tego pośrednio, przez rządzenie kierunkiem ciągów powietrza i pędów morza, z których jedne są stałe, inne niestałe, wywołane zbiegiem przyczyn podrzędnych wprawdzie, lecz podobnych. Tłumaczy dalej, jak źródło to rozlewa się i dzieli nierówno po powierzchni kuli ziemskiej. Wszystkie podobne uwagi nie należą właściwie do przedmiotu który nas zajmuje; same tylko ogólne wypadki są nam tu potrzebne, jednakże geografia botaniczna tak bardzo wiąże się z meteorologią, klimat tak przeważnie wpływa na roślinność, iż niepodobna nam było o nich przemilczeć.

§ 858. Rozbierzmy teraz ogólne odmiany, jakim ulega roślinność w stosunku do opisanych powyżej odmian klimatu.

Nie potrzeba na to zbyt głębokiego badania roślin, aby spostrzedz, jak niejednostajnie rozdzielone są ich rozmaite gatunki. Jedne z nich umieszczone są obok siebie w przestrzeni bardzo ograniczonej; inne przeciwnie, rozrzucone na bardzo wielu punktach zarazem. Różnica ta, którą nam wycieczki nasze botaniczne na małą pokazują stopę, objawia się także przy porównaniu wypadków otrzymanych z poznania roślinności licznych i rozległych krajów; niektóre rośliny są właściwe pewnym krajom, inne są wspólne wielu takowym. Granice, któremi zakreślone jest mieszkanie pojedynczych gatunków, stanowią *obręb* tychże gatunków (*area*). Te przeto gatunki, których obręb jest bardzo szczupły, można uważać za znamionujące roślinność tej lub owej przestrzeni, poza którą nie przechodzą wcale. Rozumié się jednak, iż tu nie możemy się zajmować podobnemi szczegółami, idzie nam bowiem tylko o poznanie punktów najogólniejszych. Te znowu gatunki, których obręb jest zbyt rozległy, bądźto wszérz, bądź wzwyż, nie mogą tém samém znamionować szczególnych okolic, i również musimy je tu pominąć, zatrzymując się nad takimi tylko, które lubo dosyć obficie i na wielu odległych od siebie punktach się znajdują, jednakże nie wychodzą za pewien pas szerszy

lub węższy, i stanowią t $\acute{e}$ m sam $\acute{e}$ m jedno z pi $\acute{e}$ tn odr $\acute{o}$ żniających takowy od innych. Im wi $\acute{e}$ kszą b $\acute{e}$ dzie liczba takich znamionujących ro $\acute{s$ lin, t $\acute{e}$ m dok $\acute{a}$ dniej okre $\acute{s$ lić si $\acute{e}$  dadzą pojedyncze pasy. Lecz taka mnogo $\acute{s}$ ć szczeg $\acute{o$ łów mie $\acute{s}$ cić si $\acute{e}$  mo $\acute{z}$ e jedynie w obszernym wykładzie, w rysie za $\acute{s}$  skróconym ograniczyć si $\acute{e}$  przychodzi na ma $\acute{l}$ ej tylko liczbie ro $\acute{s$ lin, wybranych z pomi $\acute{e$ dy tych, które kształtem, uderzającą postawą lub użytkami z nich otrzymywanymi, pr $\acute{e}$ dcz $\acute{e}$ j na siebie zwracają uwag $\acute{e}$  i które t $\acute{e}$ ż z tego powodu nie uszły baczności podr $\acute{o}$ żników niezajmujących si $\acute{e}$  nawet botanik $\acute{a}$ . Drzewa przedstawiają w og $\acute{o$ le pod tym wzgl $\acute{e}$ dem wi $\acute{e}$ kszą łatwo $\acute{s}$ ć, t $\acute{e}$ m bardziej,  $\acute{z}$ e b $\acute{e}$ dąc wystawione przez ca $\acute{l}$ y rok na zmiany klimatu, w ściślejszym zostają z nim zwi $\acute{a}$ zku ni $\acute{z}$  ro $\acute{s$ liny zielne, które przez cz $\acute{e}$ ść roku usuwają si $\acute{e}$  poniekąd zpod jego w $\acute{p$ ływu, a osobliwie, ni $\acute{z}$  ro $\acute{s$ liny doroczne, które przez kr $\acute{o$ tki tylko czas żyją. Niektóre okolice odznaczają si $\acute{e}$  ca $\acute{l$ ymi grupami wi $\acute{z$ szego rz $\acute{e}$ du, jako $\acute{o}$  rodzajami, rodzinami, albo przynajmniej pokoleniami, skoro tylko obr $\acute{e}$ b ich jest w ten spos $\acute{o$ b ograniczony; łatwo za $\acute{s}$  pojąć ile zyskuje na t $\acute{e}$ m opis zawierający tak znaczną liczbę szczeg $\acute{o$ łowych rys $\acute{o}$ w. Zreszt $\acute{a}$ , niekoniecznie ca $\acute{l}$ y og $\acute{o$ ł gatunk $\acute{o}$ w jakiej grupy musi si $\acute{e}$  wyl $\acute{a}$ cznie znajdować w okolicy, którą opisać chcemy; dosyć jest, je $\acute{s$ li tylko wi $\acute{e}$ ksza ich cz $\acute{e}$ ść tam $\acute{z$ e ro $\acute{s$ nie. Bez ukł $\acute{a}$ du przyrodzonego geografa botaniczna musia $\acute{l}$ aby upa $\acute{s}$ ć pod ci $\acute{e}$ żarem szczeg $\acute{o$ łów bez ko $\acute{n$ ca, i rzec mo $\acute{z$ na, i $\acute{z}$  ona w $\acute{l$ asnie powstała w skutek ustanowienia rodzin, a wykształcenie si $\acute{e}$  j $\acute{e}$ y zale $\acute{z}$ ć b $\acute{e}$ dzie od udoskonalenia si $\acute{e}$  tych $\acute{z$ e.

§ 759. Przejrzyjmy teraz g $\acute{l$ ówne kralny odznaczające si $\acute{e}$ , czy $\acute{o}$  ro $\acute{s$ linami w $\acute{l$ asnymi sobie i na szczeg $\acute{o$ lniejszą zasługującymi uwag $\acute{e}$ , czy t $\acute{e}$ ż wyl $\acute{a}$ cznym znajdowaniem si $\acute{e}$  w nich pewnych rodzin, albo przynajmniej wielkiej ich cz $\acute{e}$ ści. Przegl $\acute{a}$ d ten odb $\acute{e}$ dziemy id $\acute{a}$ c od r $\acute{o$ wnika ku biegunom, z ka $\acute{z$ dym za $\acute{s}$  z tych kolejnych pas $\acute{o}$ w, le $\acute{z$ ących pod coraz wi $\acute{z$ szą szeroko $\acute{s}$ ci $\acute{a}$ , por $\acute{o$ wnamy pasy szeroko $\acute{s}$ ci ni $\acute{z$ szych wprawdzie, lecz odpowiadające pierwszym z powodu g $\acute{o$ rnego swego po $\acute{l$ o $\acute{z}$ enia, posiadające przeto podobną temperatur $\acute{e}$ .

§ 860. Pas ziemi ograniczony zwrotnikami i od najdawniejszych czas $\acute{o}$ w zwany gor $\acute{a}$ cym, przedstawia ro $\acute{s$ linno $\acute{s}$ ć zupełnie r $\acute{o$ żną od t $\acute{e}$ j, która nas otacza, tak pod wzgl $\acute{e}$ dem si $\acute{l$ y, jako t $\acute{e}$ ż pod wzgl $\acute{e}$ dem rozmaito $\acute{s}$ ci kształt $\acute{o}$ w i szczeg $\acute{o$ lnych pi $\acute{e$ tn,

wielkiéj ilości gatunków ją składających. Stosunek roślin drzewnych jest tamże dość znaczny, a ponieważ wilgoć i żyzność ziemi łączą się z wysokim stopniem ciepła, przeto téż napotykamy w pasie tym drzewa skupione w lasy, które samą już powierzchownością różnią się od naszych. Zamiast bowiem jednostajnego powtarzania się szczupłej liczby gatunków, napotykamy tam nieskończoną rozmaitość, porównyując czyto drzewa jednego jakiegokolwiek miejsca, czy téż dwóch miejsc oddalonych od siebie. Nadto gatunki te należą po większej części do innych rodzajów lub do innych nawet rodzin, niż drzewa pasów umiarkowanych. W rozległych, mało zamieszkałych okolicach *pierwotne* te lasy (*sylvae primaevae*), których człowiek nie obrócił jeszcze na swój użytek, które nie mają innych granic, nad te, jakie im naznaczyło samo przyrodzenie — najwspaniałej się rozrosły. Nietylko jednakże w samych pniach tak ogromnej grubości i wyniosłości objawia tam roślinność swą siłę, ale owszem w innych, aczkolwiek niższych roślinach częścią drzewnych, częścią zielnych, które pod cieniem owych wysokich koron rozmnażają się w ciepłej i wilgotnej tamtejszej atmosferze; w pasożytach otaczających i pokrywających w części owe pnie, a szczególnież téż w pnączach, które przeskakują z jednych drzew na drugie, wstępują na ich wierzchołki, spadają z nich i znowu się wznoszą, obejmują je okręcając się wokół i wiążą z sobą, jak liny masztów okrętu. Jeden z rysów właściwych roślinności międzyzwrotnikowej zależy od tego, iż w krainach tych wpływy fizyczne prawie się nie zmieniają przez ciąg całego roku. W klimatach umiarkowańszych, przedstawiających wydatne pory roku, jedna z nich sprowadza prawidłowe kwitnienie; inna dojrzewanie, tak, iż większa część drzew prawie zupełnie nagich w czasie spoczynku, okrywa się jednocześnie liśćmi, kwiatami a następnie owocami. Pod równikiem wszystkie te powoją łączą się z sobą, a kiedy z jednéj strony nadzwyczajna owa działalność spowodowuje ciągłe rozwijanie się liści nieopadających corocznie, z drugiey uderza nas daleko mniejsza ilość kwiatów, a tém samém i owoców w pewnym danym czasie, chociaż je znowu o każdéj porze znaleźć można.

§ 861. Jeśli jednakże ziemia, lubo dosyć żyzna, aby mogła wydawać gatunki drzewne, nie posiada stale dostatecznej wilgoci, tak z przyczyny samego przyrodzenia swego, jako téż

z powodu rozdzielenia wód na powierzchni i w miąższości swojej; jeśli wilgoć jej co pewien tylko przeciąg czasu odnawia się przez deszcze, które także zależą od pewnych prawidłowych odmian stanu powietrza, — w takim przypadku spostrzegamy i w roślinności samej powojny podobny do tych, jakie są właściwe naszym okolicom, lecz w sposób odwrotny. Susza spowodowana tam zatrzymanie się rośliny i obnaża drzewa, które rozzieleniają się znowu i rozkwitają po spadnięciu wielkich peryodycznych deszczów. Widzieć to można porównyując lasy pierwotne z lasami rzadszemi, niższemi i których rośliny odbywa się w przestankach, a które noszą w Brazylii nazwę *Catinga*.

§ 862. Nakoniec, ziemia piaszczysta i także nieprawidłowo zraszana, może wydawać same tylko gatunki krzewiaste i zielne, których rośliny przerwane przez ciąg suszy, ożywiają się w czasie deszczów, a tym sposobem naga i napozór niepłodna w czasie reszty roku ziemia, pokrywa się na krótki czas bogatym kobiercem liści i kwiatów. Widzieć to można na rozległych przestrzeniach krajów międzyzwrotnikowych, płaskich lub pagórkowatych, pozbawionych przyrodzonego i ciągłego zwilżania, które zależy od sąsiedztwa gór wielkich. Jedne z takowych przestrzeni pokryte są mnogimi i rozmaitemi gatunkami, inne zaś przeciwnie posiadają roślinność jednostajną; według tych różnic nadano im w rozmaitych krajach rozmaite nazwiska, jakoto: *Campos* w Brazylii, *Pampas* w Paragwaj, *Llanos* ponad Grenoko. Przemienność spoczynku i działalności rośliny, spowodowana tam podobny skutek jak u nas pory roku, to jest zupełną nieobecność kwiatów przez czas niejaki, przez resztę zaś roku ich mnogość i różnorodność.

§ 863. *Palmy* i inne *jednoliścienne drzewiaste* (*pochutnikowate* [*Pandaneae*], *smokwiowe* [*Dracaena*] it. d.), tudzież *paprocie drzewiaste* przykładają się niepomału do nadania roślinności zwrotnikowej, rysów jej tylko właściwych. Inne, równie znamionującego rysu, dostarczają rośliny znane pod ogólnym imieniem *ździeblcowatych* (*Scitamineae*) a które obejmują nie tylko właściwą rodzinę tegoż imienia, ale nadto rodzinę *bananowatych* i *kwiatotrzciniowatych* (*Musaceae*, *Cannaceae*). Banan, który w szklarniach europejskich dochodzi zupełnego rozwinięcia, może dać o nich wyobrażenie. Dodajmy tu wyszczególnienie rodzin mogących się uważać za

zwrotnkowe, gdyż albo nie przechodzą zupełnie poza zwrotniki, albo przynajmniej największa ich część rośnie pomiędzy nimi. Takimi są: *sapylcowate* (*Bromeliaceae*), *obrazkowate*, *pochrzynowate* (*Dioscoreaceae*), *pieprzowate*, *wawrzynowate*, *muszkatowcowate*, *flaszowcowate*, *serecznikowate* (*Bombaceae*), *zatwarowate* (*Sterculiaceae*), *różnolistowate* (*Byttneriaceae*), *cistrunkowate* (*Ternstroemiaceae*), *żółtosokowate* (*Guttiferae*), *naigrawnikowate* (*Marcgraviaceae*), *miedlinowate*, *dwudziurczykowate* (*Ochnaceae*), *bobniowate* (*Connaraceae*), *nerkowcowate* (*Anacardiaceae*), *przyroślowate* (*Chailletiaceae*), *otulkowate* (*Vochysiaceae*), *zaczerniowate* (*Melastomaceae*), *mirtowate*, *niżarkowate* (*Turneraceae*), *cierńcowate* (*Cacteae*), *borowicowate*, *pigwicowate* (*Sapotaeae*), *hebanowate* (*Ebenaceae*), *dzielaminowate*, *koszyskowate*, *skrętliczkowate* (*Cyrtandreae*), *rozdzięncowate* (*Acanthaceae*), *ostrojowate* (*Gessneriaceae*). Niektóre wielkie rodziny, posiadające dość nawet znaczną ilość gatunków w naszych klimatach, przedstawione są pomiędzy zwrotnikami przez inne, daleko jeszcze liczniejsze gatunki, (do takich należą: *ostromleczoowate*, *powojowate* i t. d. i t. d.); lecz z tych, jedne się różnią postacią jak np. *bambusy* lub inne *trawy drzewiaste*, *storczyki pasożytne*; inne odznaczają się piętnami tak właściwymi, iż mogłyby posłużyć do utworzenia osobnych plemion (np. *czulkowe* i *brezylkowe* w strąkowych, *krasnośliwowe* [*Cordiaceae*] w ogórecznikowatych; właściwe *marzannowate* i t. d.). Nakoniec przytoczyć należy niektóre rodziny odznaczające się z tego powodu, iż pomiędzy nimi znajdują się albo pasożyty, których sposób roślenia jest dziwaczny (*gąszewnikowate*, *wieszczyńcowate* (*Rafflesiaceae*), *gałecznicowate* [*Balanophoreae*]), albo też wiele pnączów, o których wspomnieliśmy już nieraz (*nagwiązdkowate*, *mydleńcowate*, *rybotrujowate*, *surmiowate*, *toinowate*, *trojęściowate*).

§ 864. Mówiliśmy dotąd o pasie międzyzwrotnikowym, jako o posiadającym w całej swój rozciągłości jednakowy zupełnie klimat; łatwo jednakże pojąć, iż to nie może mieć w zupełności miejsca. Obrót ziemi około słońca, który u nas sprowadza dwie ostateczności: lato i zimę, sprowadza przeciwnie pod równikiem warunki zupełnie jednostajne, i wszelka różnica znika coraz bardziej w przejściu słońca od jednego zwrotnika

do drugiego. Niema tam więc różnicy pór; temperatura średnia, jest zarazem temperaturą całego roku; podobnie ma się z temperaturą ziemi aż do pewnej jej głębokości, w której się odbywają czynności żywotne części podziemnych rośliny. Równa długość dni i nocy dopełnia jeszcze jednostajności warunków, pod jakimi rośliny się znajdują. Wprawdzie kilka stopni szerokości nie sprowadza wielkiej zmiany w tych warunkach, jednakże w miarę oddalania się od równika, różnica pór musi się coraz bardziej objawiać. Różnica ta, na pierwszy rzut oka, tudzież z wyjątkiem punktów na których wpływy miejscowe spowodowują znaczniejsze zmiany, jest zawsze dosyć słabą, a linie równociepłe, lubo spuszcza ją się o kilka stopni ciepła, mało jednakże oddalają się od linii równoległych i równoleżnic, i zachowują wszędzie pewną równoległość względem równika; wewnątrz też ziemi zachowuje do pewnej głębokości temperaturę stałą, która jest zarazem temperaturą średnią tych krain. Cóżkolwiek bądź, wynikają ztąd dość widoczne różnice w roślinności, tak, iż wielki ten pas ziemi podzielić można pod tym względem na: *równikowy*, zawierający około 15 stopni po obu stronach równika, i *zwrotnikowy* od 15 — 24°. Przechodząc na kilku tylko głównych rysach wybranych części tych, któreśmy wyżej przytoczyli, powiemy tylko, iż pierwszy odznacza się wyłącznym prawie znajdowaniem się *palm* i *szkiełkowatych*, drugi *paprociami drzewiastymi*, *saczerniowatymi* i *pieprzowatymi*. Pierwszy rozciąga się od poziomu morza, aż do 600 metrów wysokości; wyżej zaś na górach tamecznych aż po 1200 metrów, znajdujemy pas odpowiadający drugiemu. Łatwo pojąć, że pomiędzy jednym i drugim niema ścisłej granicy, ani pod względem temperatury, ani pod względem samych roślin, i te różnice czuć się dają należyte dopiero na punktach znacznie oddalonych bądź co do szerokości, bądź co do wysokości.

§ 865. Wielkie pasy, zwane pospolicie umiarkowaniami, i rozciągające się od zwrotników, aż po koła biegunowe, muszą rozumieć się przedstawiać znaczne i wydatniejsze różnice klimatu i roślinności. Podzielimy je przeto w tym miejscu na wiele pasów podrzędnych, zakreślonych nie tak stopniami szerokości, jak raczej liniami równocieplimi, które, jakżeśmy już powiedzieli, stają się w stronach tych coraz inniej zależnemi od pierwszych.

§ 866. Pierwszy pas sięga od zwrotników aż do  $34^{\circ}$  lub  $36^{\circ}$ , a lepiej jeszcze da się oznaczyć linią równociepłą przez środek jego przechodzącą i wynoszącą  $20^{\circ}$ ; pas ten można by nazwać *poza-zwrotnikowym*. Pokazuje on nam przejście od roślinności zwrotnikowej do roślinności krain właściwie umiarkowanych. Napotykamy w nim wiele jeszcze roślin i kształtów poprzednio wyliczonych, lecz daleko już rzadziej i to obok wielu także gatunków naszych. Rosną tam jeszcze *palmy*, olbrzymie *jednoliścienne* i *paprocie drzewiaste*; — *zaczerniowate* posiadają znaczną ilość gatunków; — *mirtowate*, *wawrzynowate*, *wonnokrzewowate* (*Diosmeae*), *srebrnikowate* i *bobrownikowate* znajdują się tamże najliczniej. Obok tego widzimy gatunki należące do rodzin, które wymienimy w pasie następnym, i to rozumie się w stosunku rosnącym w miarę zbliżania się do tegoż, widzimy tam rodzaje, a nawet pewną ilość gatunków europejskich. Mieszanina taka najrozmaitszych płodów, tudzież możność przyswajania sobie z różnych klimatów roślin mogących sprawić przyjemność lub przynieść pożytek człowiekowi, stawiają pas ten pod najprzyjazniejszymi warunkami; obejmuje on też kraje najpierw przez rodzaj ludzki zamieszkałe i wyspy zwane przez dawnych szczęśliwemi.

§ 867. Część pasu umiarkowanego, leżąca zewnątrz poprzedniej, może znowu w ogóle być podzieloną na każdej półkuli na trzy pasy podrzędne: przez pierwszy z nich, czyli *umiarkowany ciepły*, przechodzą równociepłe od  $15^{\circ}$  do  $10^{\circ}$ , przez środkowy czyli *umiarkowany zimny* od  $10^{\circ}$  do  $5^{\circ}$ , przez trzeci od  $5^{\circ}$ — $0^{\circ}$ . Ostatni nie zasługuje na imię umiarkowanego i może być nazwany *podarktycznym* dlatego, iż się zbliża do koła biegunowego, a nawet w niektórych miejscach poza takowe przechodzi; takimi miejscami są brzegi zachodnie Europy i Ameryki, na innych zaś lądach pas ten nie dochodzi do koła biegunowego. Paryż, gdzie temperatura średnia wynosi  $10^{\circ},8$ ; Londyn, gdzie takowa jest  $10^{\circ},4$ , i Wiedeń, gdzie jest  $10^{\circ},1$ , leżą prawie na granicy oddzielającej dwa pierwsze pasy.

§ 868. Przegląd tych trzech podrzędnych, a nawet i następnych pasów nie przedstawia już trudności, jakieśmy napotkali przy pasach poprzednich, gdzie musieliśmy przestać na wyliczeniu roślin, których imię budzi w nas same niedokładne wyobrażenia; rośliny te bowiem znamy w ogóle tylko albo

w cieplarniach, gdzie skarłowaciały, albo z zielników, gdzie same ich ułamki znajdować się mogą, pojęcia zaś ogólnej ich postaci nabywamy najczęściej z opisów tylko lub rycin. Lecz przybywszy do klimatów prawdziwie umiarkowanych, znajdujemy się w stronach już znajomych i w badaniu naszym możemy się udać do samej przyrody, co daleko więcej warto, niż wszystkie książki. Niema nawet potrzeby podróżować w tym celu aż do samych biegunów i wychodzić poza granice Francyi, ponieważ jéj część południowa należy do pasu ciepłego, góry zaś jéj przedstawiają wszystkie inne pasy, aż do śniegów wieczystych, gdzie ustaje wszelka roślinność. Ktoby przebiegł Pireneje, poczynawszy od płaszczyzn Russylionu, lub z Prowancyi wdarł się na szczyty Alp, które tam blizkie są brzegów morza, ujrzałby w téj krótkiej wycieczce wszystkie zmiany, jakieby mu się przedstawiały w podróży z południa Europy, aż do ostatnich krańców Laponii. Tą przeto szczególniej drogą udamy się i w niniejszym rozbiorze, przyczém wymieniać wprawdzie będziemy całe rodziny, stanowiące główne rysy każdej roślinności, lecz oprócz tego użyjemy jeszcze ku pomocy niektórych bardziej odznaczających się i po większój części czytelnikom naszym znajomych roślin, które nam niejako za skazówki służyć będą. Następnie rzucimy okiem na inne części kuli ziemskiej, leżące w tym samym pasie, a których roślinność łatwiej się da skreślić porównaniem odmian jéj z roślinnością dobrze już nam znajomą.

§ 869. Namieniliśmy o Prowancyi i Russylionie. — Wszystkie kraje oblane morzem Śródziemném bardzo zbliżają się do nich roślinnością swoją, aż do pewnej odległości od brzegów, i tworzą razem jedną, prawie jednostajną botaniczną krainę. Niektóre z rodzin zwrotnikowych rozciągają się aż dotąd, lecz gatunki ich są bardzo nieliczne; tak np. z palm napotykamy tu *daktyl* i *kartatkę* (*Chamaerops*), gatunki *pistacji*: *P. lentiscus* i *vera*; z mirtowatych: *mirt* i *granatowiec*; z wawrzynowatych: *wawrzyn zwyczajny*; z tolnowatych drzewiastych: *płochowiec zwyczajny* (*Nerium oleander*). Z drugiej strony, inne, w poprzednich pasach mało liczne rodziny, posiadają tu więcej gatunków, jak np. *goździkowate*, *czystkowate*, *wargowe*, które pokrywając wszystkie grunta suche i opuszczone, napełniają powietrze swemi aromatycznemi wyziewami. Zaczynają także ukazywać się krzyżowe. Z szyszko-

wych znajdujemy tu: *cyprys*, *sosnę włoską* (*Pinus pinea*), *syryjską* (*P. halepensis*), *modrzewiową* (*P. laricio*) i t. d., z kotkowych: *dęby zawsze zielone*, *dąb korkowy*, *jawory* i t. d. *Olivnik* (*Olea*) znamionuje szczególniej tę krainę, prawie bowiem w całej się znajduje; poza granicami jej rzadko tylko napotkać go można.

§ 870. Roślinność okolic Paryża może nam dać wyobrażenie ogólne o roślinności znacznej części pasu umiarkowanego zimnego. Wymienione dopiéro rodziny ukazują się tu także dość licznie, stosunek jednakże wargowych i goździkowatych pomniejsza się, stosunek zaś baldaszkowych i krzyżowych wzrasta. Rodziny drzew są też same, lecz przedstawiają się w innych gatunkach: szyszkowe w *sosnie pospolitej*, *jodle*, *modrzewiu* i t. d.; kotkowe w *dębach*, *leszczynie*, *buku*, *brzoście*, *olszy*, *wierzbach*; wszystkie one tracą liście w czasie zimy, od czego zależy odrębna i zmieniająca się podług pory roku powierzchowność krajobrazów. Rośliny te różnią się jeszcze na różnych punktach tego pasu, bądź co do stosunkowej liczby, bądź co do samych gatunków.

§ 871. Przenieśmy się teraz do podnóża Alp i stańmy naprzeciw jednej z owych ogromnych brył uwieńczonych wieczystymi śniegami. Patrząc na górę, spostrzeżemy łatwo, iż roślinność która nas bezpośrednio otacza, i która znamionuje środek i północ Francyi, znika na pewnej wysokości, a natomiast ukazuje się inna, ulegająca nowym z kolei zmianom. Spostrzeżemy dalej, iż w pewnej odległości całe obszary zajęte są przez wielkie rośliny, pomiędzy którymi ukrywają się inne mniejsze; miejsca takie wydają się oku nakształt wstęg leżących jedne nad drugimi: — nasamprzód idą drzewa o liściach spadających, odznaczające się żywszą zielonością; następnie drzewa szyszkowe, ciemno lub prawie czarno-zielone; nakoniec wstęga, której zieloność mniej wydatna, poprzerywana jest tu i owdzie plamami innej barwy i która zwężając się dochodzi aż do krętej linii, będącej granicą śniegu. Pochodzi to ztąd, że drzewa, których korony mniej więcej zbliżone, zlewały się z sobą i nadawały przeto obszarom przez nie zajętem jednolitą barwę, tam nie dochodzą już, a natomiast ukazują się krzewy i zioła skarłowaciałe i coraz bliższe ziemi.

Wchodząc na górę z miejsca, na którym przedmioty wydawały się tak skupione, napotkamy nasamprzód rośliny pół

naszych; potem, na pierwszych pochyłościach ujrzymy inne, mniej więcej odmienne, nazwane *podalpejskimi* (pl. *Alpe-stres*) jak: *tojady* (*Aconitum*), *jarzmianki* (*Astrantia*), niektóre gatunki *bylicy* (*Artemisia*), *starczyku* (*Senecio*), *przenęty* (*Prenanthes*), *krwawniki* (*Achillea*); *łomikamienie* (*Saxifraga*), *pięćpersty* (*Potentilla*) it. d. it. d. Pominąwszy *orzechy* (*Juglans*), przebywszy lasy kasztanowe (*Castanea*), ujrzymy, iż drzewa te ustają, a natomiast lasy składają się z *dębów*, *buków* i *brzozy*. Dęby znów nikną najpierw (około 800 metrów), buki nieco później (około 1000 metrów), w końcu widzimy lasy samych prawie drzew iglastych (*jodła*, *modrzew*, *sosna zwyczajna*), które także zatrzymują się z kolei na pewnych wysokościach (około 1800 metr.). *Brzoza* dochodzi nieco jeszcze wyżej (aż ku 2000 metr.), jedna z szyszkowych (*sosna syberyjska* (*Pinus cembra*)) daje się jeszcze widzieć niekiedy do stu metrów wyżej. Za tą granicą drzewa są niższe i tworzą drobne tylko zarośla, np. *olsza zielona* (*Alnus viridis*). Na tymto prawie punkcie napotykamy krzew znamionujący wybornie Alpy i zwany też ich różą, to jest: *różaniec* (*Rhododendron*), po którym następują inne, jeszcze niższe rośliny, zaledwie że wznoszące się nad ziemią i zwane *alpejskimi* (pl. *Alpinae*). Do takich należą gatunki niektórych rodzin znajdujących się i u podnóża gór, jakoto: *krzyżowych*, *goździkowatych*, *jaskrowatych*, *różowatych*, *strąkowych*, *złożonych*, *turzycowatych*, *traw* i t. d.; lecz gatunki te są wcale różne. Obok nich znajdujemy liczne i nowe gatunki innych rodzin, rzadko tylko ukazujących się na płaszczynach, jak *łomikamienie*, *goryczki* i t. d. Nie znajdziemy tam prawie wcale roślin rocznych, czego zresztą łatwo się było domyśleć, ponieważ wszystkie musiałyby wyginać, gdyby jedno tylko nieprzyjazne lato przeszkodziło dostatecznemu dojrzaniu ich nasion; w klimacie zaś tak ostrym, przypadek ten może się zdarzyć dość często. Przeciwnie, rośliny trwałe czyli drzewne, zachowują się pod ziemią, której temperatura nie tak jest niska, a unikając tym sposobem zabójczego wpływu atmosfery, rozwijają się znowu, skoro tylko takowa złagodnieje i ociepli się dostatecznie. Ta jednakże pora trwa bardzo krótko, a w niektórych miejscach ledwie raz na wiele lat. Ztąd pochodzi, iż łądygi są w ogóle niskie, że krzewy dotykają zazwyczaj ziemi, i albo się czołgają, albo też są krótkie, tęgie, zgnatwane

i tworzą w pewnych odległościach gęste kępy, tak jak krzew, którybyśmy corocznie tuż ponad ziemią przycinali. Pozór właściwy każdej rodzinie, zacięra się do pewnego stopnia, a natomiast ukazuje się pozór wspólny wszystkim roślinom alpejskim, dający się spostrzedz nawet na gatunkach rodzajów zazwyczaj drzewiastych, jak np. na wierzbach, które tu czołgają się po ziemi. Na brzegach wód, w miejscach, gdzie grzbiet góry tworzy pochyłość niezbyt spadzistą lub wypłaszcza się jakby wschody, na których może utrzymać się jaka warstwa próchnicy, rośliny skupiają się w rozległe kobierce. Lecz kobierce te porozdzierane najczęściej bywają, z powodu właściwości gruntu, a zieloność ukazuje się tylko płatami w odstępach, szparach, lub załomach skał. Im bardziej się wznosimy, tém bardziej rozproszoną i uboższą znajdujemy roślinność, aż wreszcie napotyamy na skałach same tylko porosty, których skorupy urozmaicają cokolwiek jednolitą ich barwę. Przybywamy nakoniec do wieczystych śniegów, gdzie jestestwa ustrojowe nie mogą się już utrzymać i czasowo tylko się ukazują.

§ 872. Porównajmy teraz to, co się napotyka idąc ze środka Francji ku biegunowi, z tém cośmy widzieli wstępując na Alpy. Tu, jak tam, zmniejsza się tak liczba bezwzględna roślin, jako też liczba względna gatunków pewnych rodzin (*wargowych, baldaszkowych, marzanowatych* i t. d.); inne rodziny nikną wcale (*ślazowate, czystkowate, ostrómlęczowate* i t. d.). Biorąc za punkt porównania niektóre odznaczające się rośliny np. owe drzewa, które się napotyka na pochyłościach Alp, widzimy, iż w ogóle dosyć podobnie są rozdzielone, przy więcej zaś szczegółowym i ściślejszym rozbiórce znajdujemy niejaką różnicę. Tak np. na zachodnich brzegach Skandynawii *buk* zatrzymuje się na 60°, to jest nieco prędkiej od *dębu*, który dochodzi do 61°; jestto właśnie granica północna pasa umiarkowanego-zimnego. Wchodząc w pas podarktyczny, napotyamy lasy szpilkowe, w których *jodla* dochodzi do 68°, *sosna* do 70°, lecz w których niema wcale modrzewin. *Brzoza* zwykle zajna posuwa się jeszcze nieco dalej. Sąto więc te same rośliny, których ogół znamionował nam też same pasy na różnej wysokości gór, lecz tu, porządek w jakim jedna sięga dalej od drugich, jest inny a nawet niekiedy odwrotny. Dalej nakoniec znajdujemy niskie tylko krzewy, a ku krańcom Laponii wchodzimy w krainę polarną. Ta jednakże daje się sama podzielić

na dwie podrzędne: z tych jedna, arktyczna, podobna do tego pasu alpejskiego, który jest ogołocony z drzew, lecz posiada jeszcze niskie krzewy. W krainie tej *brzoza karłowata* (*Betula nana*), aż do 71° zastępuje olszę zieloną gór, *róźaniec* zaś przedstawia się nam w jednym szczególnym gatunku (*Rhod. laponicum*). Nakoniec, na Spitzbergu jesteśmy w krainie roślin alpejskich, czyli w drugim pasie, mogącym się nazwać *właściwie biegunowym*, gdzie roślinność budząc się na kilka tylko tygodni, martwieje pod śniegami przez resztę roku i wydaje same tylko rośliny trwałe, podkrzewiaste, wątle i rzadkie; sąto powiększej części też same gatunki, któreśmy widzieli ku granicy wieczystych lodów. Uważać wszakże należy, iż w powyższem porównaniu rozmaitych pasów roślinności, według wysokości i szerokości, wybraliśmy, co do ostatnich, część ziemi stosunkowo najprzyjaźniej uposażoną, gdzie linie równociepłe podnoszą się najwyżej ku biegunowi, słowem zachodni brzeg Europy. Na innych południkach ujrzelibyśmy, że pasy kolejne zatrzymują się w szerokości daleko niższej, a to tém bardziej, im bardziej zbliżalibyśmy się ku południkom przechodzącym przez środek wielkich lądów, lub przypadającym ku brzegom tychże wschodnim.

§ 873. Przypomnijmy tu także to, o czém wspomnieliśmy w § 793, że temperatura średnia mniejszy wywiera wpływ na roślinność, niż ostateczna temperatura zimy, a bardziej jeszcze lata, tudzież długość tych pór roku. Wiele bowiem roślin, unikając pod ziemią lub pod śniegiem je pokrywającym wpływu atmosfery, może się opierać najostrzejszym zimom i wynurzać się ze swego schronienia w lecie, a nawet przedstawiać wszystkie pojawy kwitnienia i owocowania, jeśli pora ta jest dostatecznie długą i ciepłą. Warunki te pozwalają nawet utrzymać się pewnej liczbie roślin rocznych. Dlatego znaczne mogą zachodzić różnice w roślinności dwóch punktów, leżących na tej samej równociepłej: mianowicie takiego, w którym temperatura zimowa mało się różni od letniej, i takiego, gdzie różnica między jedną a drugą jest wielka, jak np. na Zachodzie i wewnątrz lądów; każdy z tych punktów posiada pewną liczbę roślin nieznajdujących się w drugim. Widzimy ztąd, że linie równociepłe, podobnie jak linie szerokości i wysokości, nie mogą ściśle określić krainy roślinnej; że linie równozimowe i równoletnie nie więcej nam w tym względzie są pomocne.

Roślinność kraju mniej lub bardziej ograniczonego, jest wypadkową nie tylko tych, ale i wielu jeszcze innych wpływów; wypadkową, daleko bardziej złożoną niż klimat, któremu w ogólnym tylko względzie ulega. Niepodobna więc chcieć określić tak liczne odmiany roślinności, pewnymi jednociągłymi liniami lub podciągnąć je pod pewną, szczupłą ilość praw. Pokazuje się ztąd, jak niedokładnym i niezpełnym jest rys tu skreślony, który musieliśmy zamknąć w kilku kartkach, unikając przytém mnogości szczegółów, tak jednakże w tym przedmiocie potrzebnych. Dlatego też uciekaliśmy się więcej do przykładów, niż do ogólników. Mówiliśmy o Europie, a szczególnie o Francyi, aby tym sposobem czytelnik miał w miejsce całego porównania jeden przynajmniej jego wyraz. Obaczmy teraz niektóre jeszcze inne jego punkta.

§ 874. Udamy się tu drogą przeciwną pierwszej, to jest zstępować będziemy z wierzchołków gór ku ich podstawie, od bieguna ku równikowi.

Zastanawiając się nad roślinnością gór, leżących pod różną szerokością i w różnych częściach naszej kuli, spostrzegamy, iż pas najwyższy, przytykający do granicy wieczystych śniegów i nazwany przez nas biegunowym, przedstawia wszędzie rysy jednakowe, których obraz, jakkolwiek niedokładny, usiłowaliśmy skreślić mówiąc o roślinach alpejskich (§ 870). Opisy podróży botanicznych przekonywają nas, że na grzbiecie Kaukazu, Altaju, Himalaj, Andów meksykańskich, peruańskich i chilijskich, roślinność posiada jeden i ten sam pozór, wszędzie bowiem zatrzymuje się w niewielkiej odległości od ziemi, wszędzie składa się z pędów zielnych roślin trwałych, które się przez krótki czas lata rozwijają; z tęgich gałązek gatunków drzewnych, których kierunek zbliża się więcej do poziomu niż do pionu, i które splecione są w tak gęste kępy, iż niekiedy z pomocą tylko siekiery przebyć je można. Gatunki wymienione powyżej przy opisie głównych gór Europy, Alp, znajdują się po większej części i na innych górach: w Skandynawii, Hiszpanii, Turcyi, na Apeninach, Karpatach i Pireneach. Rozumié się, iż w każdym z tych krajów, mieszają się one z pewną liczbą gatunków właściwych, lecz główne tło zostaje zawsze toż samo. W Azji: Altaj, Kaukaz, Himalaja przedstawiają również wielkie podobieństwo: znajdujemy tam zawsze też same rodziny, też same rodzaje; gatunki tylko są odmienne, a to tém bardziej,

im się bardziej oddalamy od punktu porównania, jakiemu tu sobie wybrali. Rośliny gór amerykańskich, nazywane także w obszerniejszem znaczeniu alpejskimi, lecz które właściwie zwaćby się raczej powinny andyjskimi, należą również do tych samych rodzin, niektóre nawet do tych samych rodzajów, jednakże po większej części stanowią one inne już rodzaje, mianowicie zaś gatunki *szłożonych* i *baldaszkowych*. Znaleźć tam prócz tego można gatunki innych rodzin, jak np. *szczałiki* (*Oxalis*), *ziębkokrasy* (*Calandrinia* z rodziny *Portulacaceae*); niektóre nawet *ślazowate* zbliżają się do tej granicy.

§ 875. Mniejszą jeszcze różnicę widzimy w roślinności ziem biegunowych północnych starego i nowego ładu. Porównajmy pod tym względem dwa dobrze znane punkta: Laponią, opisaną przez Wahlenberga i wyspę Melville, opisaną przez R. Browna. Ostatnia jest szczególnie zajmującą z powodu, że leżąc pod jednym z biegunów zimna (§ 792), może być uważaną za ostatni kres roślinności w równi z poziomem morza; temperatura średnia dochodzi na niej 18° niżej zera; w zimie termometr opada do 33°, w lecie zaś nie wznosi się nawet do 3°. Znaleziono na niej ogółem 116 roślin (49 skryto, a 67 jawnooplciowych); nie od rzeczy będzie wymienić tu rozkład ich rodzinowy: *grzyby* (obejmują 2 gatunki), *porosty* (15), *wątrobnice* (2), *mchy* (30), *turzycowate* (4), *trawy* (14), *sitowate* (2), *kolokowe* (1), *rdestowate* (2), *goździkowate* (5), *krzyżowe* (9), *makowate* (1), *jaskrowate* (5), *różowate* (4), *strąkowe* (2), *łomikamieniowate* (10), *wrzosowate* (1), *trędownikowate* (1), *dwururkowate* (1), *podróznikowate* (1), *baldaszkogronowe* (4). Z gatunków tych 70 (26 dwuliściennych, 8 jednoliśc., 36 bezliśc.) jest pospolitych w północnej Europie, 45 zaś (20 dwuliśc., 12 jednoliśc., 13 bezliśc.) jest właściwych Ameryce północnej. Z drugiej strony Ramond znalazł na jednym z wierzchołków Pireneów na 133 roślin, 35 tych samych gatunków, które rosną na wyspie Melville. Co się tycze nowo-odkrytych krajin południowobiegunowych, te tak dobrze jakby nie istniały dla botaniki. Żeglarze nie mogli tu nawet dostrzedz ziemi pod grubą warstwą lodu, który ją pokrywa i prawie wszędzie zdaleka jeszcze bronni do niej przystępu.

§ 876. Na tej samej półkuli pas nazwany arktycznym, zalany będąc w całości przez Ocean, zajmuje botanika jedynie

z powodu swych *morszczyn*. Co do półkuli północnej, której pas odpowiedni w małej tylko części zalany jest wodą, możemy przestać na tém, cośmy powiedzieli o Laponii; roślinność bowiem arktyczna ściśle się tam wiąże z biegunową. Widzimy tam wiele tych samych roślin, jednakże obok nich występują inne jeszcze, nieco liczniejsze i wyższe, chociaż i te nie dochodzą jeszcze wielkości drzew. Za to, porównywając dwa te pasy na Alpach i Andach, spostrzegamy daleko wydatniejszą różnicę. Na Chimbarazo np. pomiędzy 3,000 i 4,500 metrów, obok poziomych roślin znamionujących wyłącznie krainę wznioślejszą, napotykamy w dość znacznej liczbie krzewy wyższe, a niżej cokolwiek nawet nieco drzew. Niektóre *szłozone* przybierają tam tę niezwykłą u nas dla siebie postać. Dwa gatunki tej rodziny (*Espeletia* i *Chuquiraga*) tak obficie rosną w całym tym pasie, iż mogą posłużyć do odznaczenia go od innych; niektóre znowu należą do plemienia wargo-kwiatowych. Inne rodziny (*Escalloniaceae*, *Araliaceae*, *Ebenaceae*) przedstawiają się tam również w kilku gatunkach, a *urzosowate* w odrębnych rodzajach a nawet w odrębnych plemionach. Jednym z takich rodzajów jest: *Befaria*, który tam zastępuje rolę alpejską.

§ 877. Uważaliśmy powyżej pas umiarkowany w samej tylko Europie, obaczmy go teraz w innych częściach świata: najprzód na półkuli północnej, potem południowej. W Azji pas ten zawiera rozległą przestrzeń która od północy ograniczona jest częścią Syberyi, dotyka północnej strony Ałtaju, zajmuje ku południowi krainy zwane pospolicie „Wschodem” i kończy się na południowych pochyłościach Himalai. Największa część rzeczonyj przestrzeni zamknięta jest pomiędzy dwoma wymiennionemi pasmami gór; ponieważ zaś przedział ten dotychczas bardzo niedokładnie jest zbadany, nie możemy przeto dostatecznie znać jego roślinności, a tém samém kreślić ogólnych jej rysów. Zaledwie na samych tylko granicach znamy ją lepiej, jakoto: na „Wschodzie”, którego roślinność ku północy miesza się z roślinnością krain europejskich, pod tą samą szerokością leżących, ku południowi przechodzi w roślinność okolic zwrotnikowych; w długim pasie Syberyi, gdzie znacznie niższa temperatura zamienia w krainę podarktyczną wiele miejsc leżących pod daleko nawet niższą szerokością, a gdzie jednakże ukazuje się wiele nowych gatunków należących do rodzin

europskich, gatunków, których znaczna część rozwija się bez wątpienia pod wpływem lata, stosunkowo bardzo ciepłego. Roślinność zwrotnikowa obumiera na pochyłościach Himalaj, a natomiast powstaje tam inna, należąca do różnych umiarkowanych klimatów, według różnej wysokości. Wreszcie pas umiarkowany azjatycki kończy się od wschodu północną częścią Chin i Japonii, gdzie znanie roślinności europejskiej nie zatarło się jeszcze, jak tego dowodzi wiele roślin należących do tych samych rodzin, a nawet i rodzajów, lecz odmienia się przez przybycie innych rodzin (*Magnoliaceae*, *Menispermaceae*, *Bytneriaceae*, *Ternstroemiaceae*, *Hippocastaneae*, *Sapindaceae*, *Zanthoxyleae*, *Calycantheae*, *Bignoniaceae*, *Comelinaeae*, *Dioscoreaceae*) obcych Europie, a wspólnych Ameryce. Dwie godne uwagi rośliny: *herbata* w Chinach i *kamelia* w Japonii, znamionują pas ciepły tych krain.

§ 878. W Ameryce północnej, sam prawie rozległy obręb Stanów-Zjednoczonych tworzy pas umiarkowany. Część jego ciepła, leżąca mniej więcej pomiędzy 30°—36°, odznacza się drzewami należącymi do niektórych z dopiero wymienionych rodzin, a osobliwie do *bobrownikowatych* (*Magnoliaceae*). Część zimna, odpowiadająca podobnej części w Europie, różni się od niej rzadkością *krzyżowych*, *baldaszkowych*, *podróźnikowych* i *karczochowych*. Za to inne *złożone* [*gwiazdosz* (*Aster*) i *nałoc* (*Solidago*)] obficie się tam znajdują, również jak drzewa z rodziny szyszkowych i kotkowych. Sąto w ogóle gatunki należące do rodzajów europejskich, lecz inne i daleko rozmaitsze, jakoto: gatunki *sosny*, *jodły*, *modrzewiu*, *żywnotniku* (*Thuja*), *jałowcu*, *cisu*, *grabu*, *brzozy*, *olszy*, *orzechu*, *jesionu*, *wierzby*, szczególnież zaś *klonu* i *dębu*.

§ 879. Przechodząc teraz do innej półkuli, zwrócimy nasamprzód uwagę na stosunkowo małą rozległość ziemi tworzącej tamże pas umiarkowany. Jeden rzut oka na mapę przekonuje nas o tém, pokazując nam, jak różne lądy doszedłszy największej rozległości pod zwrotnikami, zwiężają się stopniowo wprawdzie, lecz dosyc nagle, ku biegunowi południowemu i kończą w znacznój jeszcze od niego odległości. Tak większa część Ameryki południowej i Afryki, tudzież połowa prawie Nowej-Holandyi, należy do krainy zwrotnikowej. Afryka, kończy się pod 35°, Nowa Hołandya zaś pod 42°, obiedwie przeto

nie posiadają punktu, któryby przechodził poza pas umiarkowany ciepły, a pierwsza należy do niego w samym tylko południowym swym końcu. Sama tylko Ameryka, rozciągając się aż do 55°, wchodzi w pas umiarkowany zimny.

Ziemie Magiellańskie, będące ostatnimi granicami tego pasu, przedstawiają w roślinności swę uderzające podobieństwo z odpowiednim pasem drugiej półkuli; odznaczają się one również obecnością niektórych drzew (*wierzb* i *buków*), dochodzących dość znacznych wymiarów. Jednakże tło amerykańskie przebija się w *zacierpie* (*Drymis*), drzewie należącym do bobrownikowatych, w *twardziczce* (*Escallonia*), *ulan-ce* (*Fuchsia*) i t. d. i t. d. Dochodząc z jednej strony ujścia Rio-de la Plata, z drugiej północnych granic Chili, dotykających krainy pozazwrotnikowej, przejdziemy kolejno wszystkie odmiany pasa umiarkowanego. Rośliny chilijskie, na sto prawie rodzin posiadają około piętnastu takich, które się nie znajdują w Europie; niektóre nawet z nich są prawie właściwe samej tylko téj krainie, jak np. *wargokwiatowe* (ze złożonych), *ożwiowate* (*Loaseae*), *ubogłowate* (*Gillesiaceae*), *oziębłowate* (*Francoaceae*), *zaziótkowate* (*Malesherbiaceae*), *łęgokowate* (*Nolanaceae*) i t. d. Zpomędzy drzew częstym jest na północy obok *cierńcu peruańskiego* (*Cactus peruvianus*) i innych, gatunek akaeci *Acacia caven*, przypominająca rośliny zwrotnikowe. Ku środkowi napotyamy osobliwsze gatunki *szakłakowatych* o gałązkach kolących (*Colletia*), jedną z *umiarkowatych* (*Homaliæae*) (*Aristotelia maqui*), osobne rodzaje *różowatych* (*Quillaja* i *Kageneckia*), jeden gatunek *wawrzynu*, *twardziczki* (*Escallonia*) rosnące aż ku brzegom morza; na południu, obok *buków* i *zacierpu* (*Drymis*) różne gatunki *mirtu*, dwa rodzaje *po-leńcowatych* (*Monimieae*), *radziliżkowate* (*Cunoniaceae*), *orleanowate* (*Bixinae*) (*Azara*), i *srebrnikowate*, które niewiele tam wprawdzie liczą rodzajów (*Lomatia*, *Embothrium*, *Quadraria*) i gatunków, lecz których nieprzeliczone osobniki zarastają prawie wszystkie lesiste miejsca. Pomędzy temi drzewami znajdziemy pnące gatunki *winobłuszczu* i *krępnia* (*Lardizabala*), stanowiące tamtejsze pnące.

§ 880. Szukając pod samym równikiem na Andach pasu, odpowiadającego ze względu na swą wysokość dopiero co opisanęj krainie umiarkowanej, znajdziemy go pomiędzy 1,000

i 3.000 metrów; na wyższej jego granicy napotykamy *zacierp* (*Drymis*) i *twardziczkę* (*Escallonia*), rodzaje, któreśmy widzieli w ziemiach Magiellańskich, głównie zaś znamionują całą jego rozległość rozliczne gatunki *chiny* (*Cinchona*), rosnące w różnych wysokościach, a niekiedy nawet zstępujące niżej, aż po granicę *paproci drzewiastych*. Ztémwszystkiem rośliny zwrotnikowe sięgają wyżej w tym pasie umiarkowanym gór, niż w pasie odpowiednim, zakreślonym stopniami szerokości, tak, że *palmy*, *storczykowate pasożytne*, *czułki*, *zaczerniowate* (*Melastomaceae*) i t. d. rosną obficie, w wyższej nawet części krainy *china* (*Cinchona*).

§ 881. Ziemie południowe, których główną część stanowi Nowa-Holandya, posiadają roślinność wcale odrębną. Przeszło 9/10 części ich roślin na nich tylko wyłącznie się znajduje; wiele z tych roślin stanowią rodziny zupełnie odrębne, reszta zaś, stanowiąca zarazem większą część całego ogółu, należy do rodzin, zaledwie pojawiających się w innych częściach świata. Nawet gatunki należące do rodzin powszechnie rozszerzonych i znanych, ukrywają się pod kształtami niezwykle, które z początku utrudniały należyte ich oznaczenie i spowodowały jednego z botaników do wyrzeczenia, na widok zielnika złożonego z tych roślin: „Jesteśmy tu na maskaradzie.” Dziś jednakże, dzięki uczonym pracom, zajmującym się tą ciekawą roślinnością, maski owe już są poznane. Szczególniej zaś poznano pod tym względem krainy leżące pomiędzy 32° a krańcem południowym. Teto właśnie krainy należą do pasu umiarkowanego, a zarazem noszą piętno zupełnie odrębne, gdy tymczasem bliżej równika znajdujemy już rysy wspólne całej roślinności zwrotnikowej, a szczególniejsz. wschodnio-indyjskiej. Gatunki *przewierzbi* (*Eucalyptus* z rodziny mirtowatych) i *akacyi* (ze strąkowych) o liściach przeobrażonych w liściaki, są tu najpospolitsze, i równie pod względem liczby, jak pod względem wymiarów swoich, stanowią prawie połowę tamtejszej roślinności. Mówiliśmy już o sposobie osadzenia liści na drzewach Nowej-Holandyi (str. 108 nota [1]), który lasom nadaje osobliwsze wejście. *Strąkowe*, *ostromleczowate*, *złożone*, *storczykowate*, *turzycowate* i *paprocie*, najwięcej jeszcze pomiędzy ogółem tych roślin postrzegać się dają, jednakże mniej daleko, niż w innych krajach. Przeciwnie znowu cztery następne rodziny: *mirtowatych*, *srebrniko-*

watych, rześciowatych (*Restiaceae*) i szczytnicowatych (*Epacrideae*) więcej liczą gatunków w krainach południowych, niż gdziekolwiek indziej. Podobnie ma się z większą częścią nastłatkowatych (*Goodeniaceae*), słupiętkowatych (*Myoporineae*), pospornicowatych (*Pittosporae*), ukęśłowatych (*Dilleniaceae*) i węgłoszowatych (*Haloragiae*); jedno plemię wonnokrzewowatych t. j. tarniwoniowate (*Borboniaceae*), tudzież małe rodziny wytrzymnikowatych (*Tremandreae*) i zastatkowatych (*Stackhousiaceae*) tam się tylko znajdują.

§ 882. Wyspy Nowej-Zelandyi odpowiadają prawie co do szerokości pasowi dopiero co opisanemu, i są to właśnie ziemie najbliżej niego leżące. Obudzają one tém większe zajęcie, iż w bliskości nich, nieco bardziej ku południowi, leży punkt przeciwnożny względem Paryża, a przeto wyspy te powinnyby poniekąd przedstawiać po drugiej stronie kuli ziemskiej, krainę naszą śródziemną, czyli krainę oliwników. Tymczasem roślinność ich nosi wcale inne piętno i posiada niektóre rysy wspólne roślinności Nowej-Holandyi, a więcej jeszcze daleko reszty Polinezyi, a przeto i zwrotników. Widzimy tam *palmy* (*Corypha australis*), *paprocie* i *smokowce drzewiaste*, całe lasy jednej z szyszkowych opatrzonej szerokimi liśćmi (*Dammara*), i zupełnie różnej od naszych, tudzież lasy *mirtowatych* (*Metrosideros*). Wspomnieć tu nie zawadzi, że lasów tych ciągle ubywa, i że z drugiej strony rośliny warzywne europejskie, wprowadzone przez żeglarzy, rozmnożyły się tamże z tak wielką łatwością, iż dziś wiele już od nich zależy ogólne wejście znacznie rozległych okolic.

§ 883. Nakoniec przyładek Dobrzej-Nadziei przedstawia nam roślinność wcale oddzielną, w niektórych tylko punktach podobną do roślinności Nowej-Holandyi, a mianowicie dla *srebrnikowatych*, *wonnokrzewowatych*, *rześciowatych*, tudzież dla *wrzosów* (*Erica*), które zastępują poniekąd *szczytnicowate*. Za to jednakże niema tu *ukęśłowatych* (*Dilleniaceae*), *akacyj* opatrzonych liśćmiakami i *przewierzbi* (*Eucalyptus*), a natomiast inne rośliny rzadkie lub wcale nieznajdujące się w Nowej-Holandyi obficie tu rosną i nadają roślinności właściwe piętno. Takiemi są *kosacówate*, *soczystkowate* (*Ficoideae*), *pelargonie*, *aloesy*, *brudnota* (*Stapelia*, rodzaj trojęściowatych), *połtowiczowate* (*Bruniaceae*), *dzierżęgo-*

wate (*Selagineae*), i t. d. Niektóre *słożone*, a mianowicie te, które pospolicie zwą się nieśmiertelnikami, *kocanki* (*Gnaphalium*), *radostka* (*Elichrysum*), są także bardzo liczne. Miejsce palm, które dopiero wyżej ku północy się ukazują, zastępuje tam wiele ciekawych gatunków *sagowcowatych* (*Cycadeae*). Jak w Nowej-Holandyi, tak i na Przylądku Dobrzej-Nadziei niema żadnych wyniosłych gór, na których śledzić-by można stopniowe zmniejszanie się roślinności dwóch tych punktów kuli ziemskiej. W Nowej-Zelandyi zaś znajdują się góry pokryte u szczytu śniegami, lecz dotychczas nie zostały jeszcze przez botaników zwiedzone.

§ 884. Przybywszy tu stanęliśmy przy pasie między i pozazwrotnikowym, od których zaczęliśmy ogólny ten rozbiór. Zastanawialiśmy się po największej części nad łądami stałemi, przytaczając tylko małą liczbę wysp. Wypada więc teraz dodać kilka słów o różnicy, jaką przedstawiać mogą wyspy w porównaniu z łądami stałemi. Każda rozleglejsza wyspa może być uważaną pod tym względem za mały stały łąd, zawsze jednak posiadać musi, stosunkowo daleko więcej ziemi, mającej klimat wilgotniejszy i umiarkowańszy, któryśmy nazwali morskim (§ 794). Rozumić się, iż różnica ta wpływa na ich roślinność, nadając jej pewne właściwe piętna prócz tych, które są wspólne z częściami łądów przyległych, i pod tą samą szerokością leżących. Jednym z takich piętn jest stosunkowo większa obfitość roślin bezliściennych komórkowych, a szczególnie *paproci*, którym podobny klimat tém więcej sprzyja, im jest cieplejszy. Im mniejszą zatem jest wyspa, a tém samém im bardziej podlega takim warunkom temperatury, tém większa jest ilość rzeczonych roślin w stosunku do innych. Tak np. na Jamaice stosunek paproci do innych roślin, jest 1: 10. Na wyspie Francuzkiej i Burbońskiej (île de France, île de Bourbon) 1: 8; w Nowej-Zelandyi 1: 6, na Otaiti 1: 4, na wyspie Norfolk 1: 3, na wyspie zaś Tristan d'Acunha 1: 2. Inném piętnem roślinności wysp jest, iż ogólna liczba gatunków mniejsza jest w pewnej danej rozległości, niż na łądzie stałym, a to tém bardziej, im wyspa jest mniejsza i dalej leży na Oceanie. Wynika to z trudności, jaką stawia morze w przenoszeniu się gatunków pierwiastkowo obcych tamtejszej ziemi, a które przeciwnie łatwiej się mogą dostać na równą tamtęj przestrzeń łądową, i łatwiej tamże zagnieździć, ponieważ zbliżają się do

niej powoli, ze wszystkich stron otaczających. Na wielu punktach, szczególnie odleglejszych od zwrotników, klimat morski zdaje się szkodzić drzewom, zapewne z powodu gwałtownych i częstych wiatrów. Widzieć to można nawet na wielu naszych wybrzeżach. Irlandya, archipelagi Shetland i Feroë, albo wcale nie posiadają drzew, albo też małe tylko i skarłowaciałe ich kępki, rosnące na kilku miejscach zasłoniętych, gdy tymczasem widzieliśmy, iż te same drzewa posuwają się dalej nawet jeszcze na brzegach Norwegii, dochodzą tam znacznych wymiarów i tworzą całe lasy. Widzieliśmy także, iż na półkuli południowej ogromne drzewa rosną aż po samą ziemię ognistą, wyspy zaś Malwińskie, chociaż leżą o kilka stopni bliżej równika, posiadają zaledwie nizkie tylko krzewy, przy podobnej zresztą florze.

§ 885. Szczegóły któremi zajmowaliśmy się dotąd, najwyraźniej dowodzą prawdy wyrzeczonej na początku tego rozdziału, że bardzo wiele punktów ziemi przedstawia w roślinności swęj różnice niezależące wcale od warunków otaczających, tak, iż zdaje się jakoby kaźden z tych punktów zosobna był stworzonym. Dwa miejsca odległe od siebie, posiadające klimat podobny, lub nawet zupełnie jednakowy, i znajdujące się w okolicznościach, których ogół powinienby wpływać na tożsamość płodów przyrodzonych, mogą jednakże wydawać rośliny zupełnie różne. Powodem tego więc być musi, iż kaźde z nich otrzymało od początku swoje własne gatunki; chociaź i inne mogłyby się tamże utrzymać. Dowodzą nam tego pewne rośliny, które przeniesione z jednego miejsca na drugie, udają się tam tak dobrze, jak w swęj pierwiastkowej ojczyźnie. Jeden z takich przykłałów przytoczyliśmy mówiąc o Nowęj-Zelandyi (§ 880), a wiele innych widzimy u siebie jak: *przymiotnik kanadyjski* (*Erigeron canadense*), który raz przywieziony do Europy, stał się najpospolitszym chwastem, i jak tyle innych roślin rocznych, które zasiane przypadkowo ze zbożami pochodzącemi z obcych krajów, tak się u nas przyswoiły, iż dzisiaj trudno jest odróżnić gatunki rzeczywiście pierwotne od późnieję przybyłych. Przytoczmy jeszcze dwie rośliny, *agawę* (zwaną pospolicie a niewłaściwie aloesem) i *opuncyę* (*Cactus opuntia*), które tak obficie rosną w Algierze, Sycylii, na po-brzeżach Hiszpanii, Włoch i Grecyi, iż podróżnicy uderzeni szczególną powierzchownością, jaką rośliny te nadają okolicom,

uważają je za wzory roślinności afrykańskiej, a jednakże obiedwie pochodzą z Ameryki, i przed jej odkryciem nie istniały wcale na dawnym lądzie. Nasz *oset mleczny* (*Carduus marianus*), i *kard* zarastają pola Rio de la Plata; *mokrzyca*, *bodziszek śmierdzący*, *szalen jadowity*, *pokrzywa zwyczajna* i *krzeczina pospolita* (*Marrubium vulgare*) krzewią się dzisiaj w okolicach wielu miast Brazylii i wdzierają się aż w ich ulice. Prawie w każdym kraju możnaby znaleźć rośliny, które się tamże wraz z ludźmi przeniosły. Jeśli przeto wprzódy tam nie istniały, to nie dla braku okoliczności potrzebnych im do życia, ale dlatego, iż ręka wszechwładna, która zasiała ziemię, złożyła ich zarody nie tam lecz gdzieindziej.

Łatwo pojąć, że roślina wychodząc tym sposobem z jednego jakiegokolwiek punktu, rozszerza się dokoła o ile tylko znajduje warunki niezbędne do życia jej potrzebne. Różna szerokość geograficzna, łańcuchy gór, pustynie, a szczególnie morza stanowią przyrodzone tamy, które nie pozwalają jej rozszerzać się bez końca i owszem zamykają ją w obrębie szczuplejszym, zakreślonym przez warunki odpowiadające właściwej jej ustrojności, a z których nie jesteśmy w stanie zdać sobie sprawy.

Te różnice żywotności, jednym gatunkom pozwalające, innym niedozwalające rosnać w pewnych miejscach, są przyczyną, iż jedne rośliny rozszerzają się w znacznej przestrzeni, inne zaś kupią się w miejscach mniej więcej ograniczonych; wszelako są i takie, które się znajdują w punktach bardzo odległych, oddzielonych od siebie przeszkodami przyrodzonymi, o jakich wspomnieliśmy dopiero, i których rośliny te nie mogły same przebyć. W takich razach przeniesionemi one zostały z jednego miejsca na drugie, albo przez ludzi, jakieśmy tego kilka przykładów przytoczyli, albo też przez jeden z działaczy ułatwiających rozsiewanie (§ 586). Lecz są przypadki, których ani objaśnić przez podobne działanie, ani w nich nawet takowego przypuścić nie można; musimy zatem przyjąć to mniemanie, iż wiele roślin mogło należeć do wielu zarazem środków pierwiastkowej roślinności, i że każdy z tych środków składał się w większej części z gatunków właściwych jemu samemu, w mniejszej zaś, z gatunków wspólnych wielu innym. Rośliny rozszerzone na znacznych przestrzeniach i po wielu różnych krajach, nazwano *wielosiedzibnemi* (pl. *sporadicae*,

od *εποραδικός*, włóczyący się), *krajowemi* zaś (*pl. endemicae*, *ἐνδημος*, zostający w swym kraju), nazwano te, które się w jednym tylko kraju znajdują. Zpomędzy pierwszych, jedne ukazują się na bardzo rozmaitych punktach tegoż samego pasu, nie przechodząc jednakże poza niego (jak np. *Sauvagesia erecta*), którą znaleziono na Antyllach, w Gujanie, Brazylii, w Madagaskarze i na Jawie; inne w wielu pasach zarazem np. *Scirpus maritimus*, który rośnie w Europie, Ameryce północnej, Indiach Zachodnich, w Senegalu, na przylądku Dobrej Nadziei, i w Nowej-Holandyi; *Samolus Valerandi*, prawie równie rozszerzony. Przymiotniki te stosować się mogą równie dobrze do rodzajów i rodzin jak do gatunków, lecz rozumie się w granicach daleko obszerniejszych. Przykłady rodziny i rodzaju krajowego widzimy na *cierńcowatych* (*Cacteeae*), które skupione są w Ameryce międzyzwootnikowej i nieco tylko ku północy za nią wybiegają, tudzież na gatunkach *chiny* (*Cinchona*), ograniczających się na jednym pasie Andów.

§ 886. Chociaż nawet dwa punkta znacznie od siebie odległe lecz umieszczone pod wpływami podobnemi, nie posiadają tej samej roślinności, to jednak pomiędzy gatunkami ich znaleźć można pewien niezaprzeczony związek. Z jednej strony, rośliny ich różnią się od siebie, ponieważ należą do dwóch oddzielnych środków, z drugiej zbliżają się do siebie, ponieważ żyć muszą pod jednakowemi warunkami; i tak mogą to być albo też same rodzaje, przedstawione tylko przez inne gatunki, albo też same rodziny przedstawione przez inne rodzaje, albo wreszcie pokrewne tylko z sobą rodziny. Możliwy tu przywieźć mnóstwo przykładów; przestaniemy jednak na kilku tylko, po większej części już wspomnianych, i tak: *kotkowe* i *szyszkowe* Europy umiarkowanej, przedstawiają się w innych gatunkach tych samych rodzajów w odpowiednim pasie Ameryki północnej, w tym samym zaś pasie Ameryki południowej, widzimy inne rodzaje szyszkowych (*Araucaria*, *Podocarpus*), *buk zwyczajny* rośnie na naszej półkuli ku północnej granicy pasu umiarkowanego; *buk antarktyczny* ku południowej granicy tegoż pasu na drugiej półkuli; dwa gatunki *kartatki* (*Chamaerops*) zakreślają granicę północną palm: *Ch. humilis* w Europie, *Ch. palmetto* w Ameryce; *różaniec* (*Rhododendron*) alpejski, zastąpiony jest w Laponii przez inny gatunek, na Andach zaś przez inny rodzaj (*Befaria*); *wonnokrzewowate*

(*Diosmeae*) znajdują się w Australii, na przykładu Dobrzej Nadziei i w południowej Europie; lecz każdy z tych punktów posiada rodzaje tak różne, iż one stanowią oddzielne plemiona: *wrsosowate* Przyładka Dobrzej Nadziei zastąpione są w Australii przez pobliską rodzinę *szczytnicowatych* (*Epacrides*), *dzierzęgowate* (*Selagineae*) przez *muchrawcowate* (*Myoporineae*) i t. d. i t. d. Można by zatem używając porównania wziętego z chemii, powiedzieć, że w połączeniach rodzin, rodzajów i gatunków stanowiących roślinność jakiego kraju, istnieją ekwiwalenty; że mogą mieć miejsce podstawienia, za pomocą których jedna roślinność odpowiada roślinności kraju innego wprawdzie lecz podobnego.

§ 887. Takie porównawcze badanie wszystkich roślinności, którego wypływem będzie nauka geografii botanicznej, wymaga poznania i opisanie wszystkich roślin każdego kraju. Książki pisane w tym celu, otrzymały od czasów Linneusza nazwisko *Flor.* nazwisko, którego używa się także w tym znaczeniu. w jakim dotąd braliśmy wyraz *roślinność*. *Flora francuska* („*Flore française*”) De Candolla, jest dziełem, w którym badacz ten opisał rośliny we Francji rosnące. Flora francuska w ogóle znaczy zbiór wszystkich tych roślin. Na nieszczęście botanicy muszą zazwyczaj zamykać się w granicach geograficznych kraju, który opisują, w granicach, zakreślonych przez politykę, a nie przez przyrodzenie, a tym samym zmiennych. Chcąc przeto dojść do wypadków ogólniejszych, musimy wiązać z sobą flory rozmaitych pisarzy, układane najczęściej w różnym duchu i według różnych planów, niezawierające świadectw jednakowej wartości i jednego rzędu i pozostawiające nieraz wątpliwość, bądź co do tożsamości, bądź co do różnicy niektórych gatunków, wątpliwość, jaką pociągać za sobą musi niejednostajność słownictwa. Zbývá tu na owęj jedności, do jakiejby dojść można, gdyby każda flora obejmowała krainę zupełnie przyrodzoną.

§ 888. Ale jakim sposobem oznaczyć należy takie botaniczne krainy? Wprawdzie, niektóre z nich sama przyroda określiła dokładnie, otaczając je zapórami nieprzebytej, jak niektóre wyspy daleko na Oceanie leżące, np. wyspa św. Heleny, wyspy Sandwich, Madagaskar, i t. d. i t. d. Przeciwnie trudno jest podzielić lądy stałe, wraz z archipelagami albo przyległymi wyspami. Wprawdzie niektóre ich części otoczone

są szrankami, wstrzymującami promieniste rozszerzanie się roślinności z tego jej środka, jakoto: morzami, pustyniami, wysokimi pasmami gór. Ale też rzadko krainy te tak są ze wszystkich stron zamknięte, aby nigdzie nie było żadnej przerwy, żadnych punktów spójnienia, przez które rośliny mogłyby wychodzić, rozszerzać się po krainach przyległych i zlewać się z ich roślinnością. De Candolle podał pewną liczbę takowych krain botanicznych, które słusznie mogły być przyjęte za jego czasów, kiedy poszukiwania w tym względzie nie były jeszcze tak liczne, jak się właśnie stały później. W ogóle podróżnicy zbierali rośliny tylko około niektórych punktów wypoczynku, zazwyczaj dość od siebie odległych, tak, iż każdy z nich mógł posiadać swoje właściwe rysy i wcale odrębną roślinność. Botanik zbierający kolejno rośliny z okolic Rio - Janeiro, Buenos - Ayres, i ziemi Magellańskiej, znalazł w nich rozumie się trzy wcale różne środki roślinności. Lecz odbywając wycieczki swoje łądem przez wszystkie punkta pośrednie, poczynając od Rio - Janeiro, z jednej strony ku północy, aż do morza Antylskiego, z drugiej strony ku południowi, aż do przylądka Horn, ujrzały, iż flora patagońska przechodzi nieznacznie we florę rzeczypospolitej argentyńskiej, a ta we florę południowych prowincyj Brazylii, ta we florę prowincyj jej środkowych, a ta znowu z kolei we florę północnych prowincyj, i we florę Gujany, tak, iż niepodobna oznaczyć każdej z tych krain stałemi granicami. Toż samo byłoby idąc ze Wschodu na Zachód, od któregokolwiek punktu na brzegach oceanu Antlantyckiego, aż do wielkich Kordylierów. Południowy koniec Afryki, ta kraina tak wydatnie się odznaczająca, jeśli się niezbyt od przylądka Dobrej-Nadziei oddalamy, przestała być taką w miarę jak zaczęto czynić poszukiwania coraz dalej od tego punktu ku równikowi. Widzimy przeto, iż wszystkie te krainy tylko w skutek niedokładnej znajomości wydały się tak niewyraźnie określone. Do jakiego stopnia to jest prawdą, dowodzi ta okoliczność, iż w 1820 r. naznaczono tylko 20 krain, a w 15 lat później, młodszy De Candolle, przyjmując krainy podane przez swego sławnego ojca, był zmuszonym powiększyć ich liczbę do czterdziestu pięciu.

Schouw (Skau), jeden z pisarzy, którzy się najwięcej geografą roślin zajmowali, i którzy najwięcej się przyczynili do jej postępu, usiłował podać stalsze prawidła do oznaczenia

pojedynczych krain. Według niego krainą botaniczną nazwać się może taka tylko, która z ogółu swych roślin sama wyłącznie posiada przynajmniej połowę gatunków, czwartą część rodzajów, tudzież kilka rodzin. Jeśli gdzieindziej znajduje się kilka gatunków tych znamionujących ją rodzajów i rodzin, takowe nie są liczne i zrzadka tylko się ukazują, w większej zaś części i daleko liczniej rosną w samej tylko krainie, do której przyjęcia skłania nas właśnie ich obecność. Stosownie do téj zasady ustanowił on nasamprzód 18, a później 25 krain, i jedną ich część nazwał, równie jak De Candolle, od położenia geograficznego, drugą daleko liczniejszą od roślin stanowiących rysy ich odznaczające, bądź dla znacznego stosunku liczbowego, bądź dla uderzającej powierzchowności. Niektóre z tych krain dadzą się podzielić na prowincye, których piętno stanowić ma przynajmniej czwartą część ogółu gatunków i kilka rodzajów im tylko właściwych. Tak np. *kraina wargowych i goździkowych*, odpowiadająca przestrzeni nazwanej przez nas krainą oliwników, dzieli się na kilka prowincyj, jakoto: prowincją *czystków* (półwysep hiszpański), *drjakwi i szatwii* (południowa Francya, Włochy i Sycylia), wargowych krzewiastych (Wschód) i t. d.

§ 889. Przebiegliśmy więc różne okolice ziemi, wymieniając, aczkolwiek treściwie tylko i powierzchownie, główne zmiany jakim w każdej z nich ulega roślinność. Zamiast jednakże tego sposobu postępowania, można przy uczeniu się geografii roślinnej użyć innego jeszcze, poniekąd odwrotnego, w którym botanika przewodniczy niejako geografii, to jest można brać z kolei pojedyncze rodziny i uważać w jaki sposób gatunki ich rozdzielone są na ziemi. Za pomocą właśnie takiego ogólnego porównania dochodzimy niektórych wyżej wymienionych prawd, dotyczących kupienia się lub rozproszenia pewnych gatunków, rodzajów i rodzin, tudzież oznaczamy ich względny stosunek, bądź na całej ziemi, bądź na większych jej podziałach czyli częściach, bądź wreszcie na każdym w szczególności dobrze znajomym punkcie. Oznaczanie tych stosunków stanowi tak nazwaną *arytmetykę botaniczną* Humboldta, który pomimo niektórych przed nim w tym względzie czynionych usiłowań, zasługuje na imię ustanowiciela geografii roślinnej. Objasnił on takową niepomału, przez prace swoje tak meteorologiczne jak i botaniczne, przez znakomite wypadki swych dalekich

i uczonych podróży, tudzież przez powagę swą i przykład, który wiele wyższych umysłów wprowadził na drogę przez niego otwartą. Pod tym względem we florze, którą zasadniczo poznać chcemy, i która się da poniekąd uważać za zupełną, możemy porównać liczbę daną gatunków każdej rodziny w szczególności, bądźto z liczbą gatunków innej rodziny, bądź z ogółem gatunków wszystkich rodzin. Wykonawszy takie obliczenie na pewnej liczbie flor stosownie wybranych, spostrzegamy pewną niezmiennosc tych stosunków pomiędzy florami leżącymi na jednej linii równociepłej, tak iż znając liczbę roślin jednej tylko rodziny, możnaby poniekąd mieć wyobrażenie o reszcie roślinności jakiegokolwiek miejsca, jeśli tylko jego równociepła jest wiadomą, i odwrotnie, mając całkowitą liczbę roślin, możnaby otrzymać równociepłą tegoż miejsca. Wprawdzie wiadomości nasze dalekie są jeszcze od tego, abyśmy ułożyć mogli takie botaniczne i meteorologiczne tablice różnych punktów ziemi, z którychby nam jedna drugą objaśnić mogła. Obiedwie te umiejętności długo jeszcze będą musiały pomnażać liczbę swych wypadków i nadawać takowym piętno ściślej dokładności; jednakże już i dzisiejsze ich wypadki rzucają nieco przynajmniej światła, na pytania których zupełnie rozwiązać nie są jeszcze w stanie. Tu przestaniemy na wymienieniu kilku ogólnych liczbowych stosunków, dotyczących się rozdzielenia roślin na powierzchni ziemi.

§ 890. Jestto prawdą powszechnie przyjętą, że liczba bezwzględna gatunków powiększa się stopniowo od biegunów ku równikowi, gdzie ich jest najwięcej. Nie trzeba jednakże sądzić, iż ten najwyższy stosunek jest wpływem samej tylko niższej szerokości geograficznej. Porównując dosyć ubogą florę rozległych krain leżących pomiędzy zwrotnikami, z bogatemi florami krajów umiarkowanych, jak np. florę arabską z florą Francji lub przyładka Dobrej-Nadziei, albo florę północnej części Nowej-Holandyi, z florą części południowych, przekonaliśmy się o błędności podobnego twierdzenia. Lecz oczywista jest rzeczą, że jeśli okolica jaka zwrotnikowa przetrzęta jest dolinami i górami, tém samém odpowiadać musi większej liczbie pasów, poczynając od tego, który tworzy podstawę owych gór, tudzież że rozlicznosc roślin stoi w stosunku z rozlicznoscia warunków życia, jakie się tamże znajdować muszą. Flora Indyj Wschodnich powiększyła się nadzwyczajnie

w ostatnich czasach, w skutek poszukiwań czynionych nie tylko w górach Gates i Nelgheryi, ale bardziej jeszcze na pochyłościach Himalai, a jeśli Amerykę międzyzwrotnikową nazwano ziemią obiecaną botaników, dla zadziwiającego i prawie niewyczerpanego mnóstwa płodów, jakie przedstawia, przypisać to należy bez wątpienia rozlicznym właściwościom jej gruntu. Gdy bowiem wielkie pasma gór azyatyckich, idąc ze Wschodu na Zachód, leżą w większej części swęj rozległości pod tą samą szerokością geograficzną, w Ameryce Kordyliery zwrócone od północy ku południowi, przedstawiają nie tylko także samo następstwo pasów roślinnych, ale nadto w każdym punkcie inną szerokość, a tém samém nowe szczegóły w roślinności. Pasma podrzędne wychodzące z Kordylierów, tudzież inne krzyżujące się z niemi w rozmaitych kierunkach, liczne strumienie z nich wybiegające, rozległe doliny przetrzniete największymi rzekami w świecie, stanowią przeważne przyczyny płodności i różnaitości. Dlatego nie powinno nas wcale zdumiewać, że Meksyk, Kolumbia a szczególnie Brazylija, posiadają na równęj przestrzeni daleko liczniejsze i daleko rozmaitsze gatunki, niż większa część innych punktów ziemi.

§ 891. Liczniejsze gatunki krain międzyzwrotnikowych muszą rozumie się odpowiadać większej liczbie rodzin i rodzajów, a zmniejszają się stopniowo ku biegunowi. Lecz ponieważ we florach krajów zimniejszych, każdy rodzaj przedstawiony jest przez mniejszą ilość gatunków, przeto liczba rodzajów musi się tamże powiększać w stosunku do liczby gatunków. Tak np. flora francuzka liczy dziś przeszło 7,000 gatunków, należących do więcej jak 1,100 rodzajów; flora szwedzka nieco więcej nad 2,300 gatunków na 566 rodzajów; lapońska zaś około 1,100 gatunków na 297 rodzajów; a przeto średnia ilość gatunków w jednym rodzaju jest we Francyi = 6, w Szwecyi = 4,1, w Laponii = 3,6.

§ 892. Liczba bezwzględna gatunków drzewnych tudzież stosunek ich do gatunków zielnych powiększają się także w miarę jak się zbliżamy do równika. Liczba zatem gatunków dorocznych lub dwuletnich wzrasta w kierunku odwrotnym, jednakże nie do samych biegunów. Same tylko krainy umiarkowane zdają się najbardziej sprzyjać ich wątłemu przyrodzeniu, jak to widzimy na naszych ogrodach. Tam to więc tylko rośliny te dochodzą swego maximum, dalej zaś stosunek ich cofa się

znovu. Widzieliśmy bowiem, iż znikają prawie w pasach ziemniejszych, bądźto z powodu szerokości, bądź z powodu wysokości, a natomiast ukazują się rośliny trwałe albo podkrzewiaste.

§ 893. Z tego co się powiedziało, wynika, iż wzrost roślin jest w ogóle coraz silniejszy idąc od biegunów ku równikowi. Jednakże prawidło to zdaje się ulegać wyjątkowi dla pewnego rzędu roślin a mianowicie dla *morszczyzn* (*Fucus*), które w morzach zwrotnikowych są dosyć małe, w morzach zaś arktycznych czyli biegunowych dochodzą ogromnych wymiarów. Około przylądka Horn znaleziono jedną z morszczyzn wynoszącą około 100 metrów.

§ 894. Zastanówmy się teraz nad stosunkiem względnym gatunków należących do trzech wielkich gałęzi państwa roślinnego, pod różnemi szerokościami. Odwołując się do liczb podawanych we florach, musielibyśmy przyjąć to prawo, iż ilość skrytopłciowych czyli bezliściennych powiększa się w stosunku do jawno-płciowych czyli liściennych, w miarę jak się oddalamy od równika. Według tablic podanych przez Humboldta dla środkowych części trzech wielkich pasów ziemi, gatunki skrytopłciowe wyrównywiają jawno-płciowym w pasie lodowatym (od 67° do 70°); dochodzą połowy ich w pasie umiarkowanym (od 45° do 52°); w pasie zaś równikowym (od 0° do 10°) jest ich prawie 8 razy mniej niż tamtych: na płaszczynach stosunek ich jest  $\frac{1}{15}$ , na górach zaś  $\frac{1}{5}$ . Ostatni ten stosunek potwierdza poniekąd pierwsze. Lecz zważyć potrzeba, że we florach liczba skrytopłciowych nie jest wcale tak ustaloną jak jawno-płciowych; że pierwsza powiększa się ciągle w skutek nowych poszukiwań, mało tylko dodających do drugiej (np. we florze Paryżkiej): że różne kraje Europy badane były pod tym względem przez botaników miejscowych, ze starannością jakiej nie byli w stanie użyć przy zwiedzaniu krajin obcych podróżnicy, których oka ujęć łatwo mogło wiele roślin mniej uderzających, i mało widocznych jakimi są po większej części bezliścienne; że rośliny skrytopłciowe poszukiwane są z tém większą usilnością, im prędzej rośliny jawno-płciowe jakiego kraju zostaną poznane, a przeto ich kraj tém więcej zbliżony jest do biegunów, że w znalezionych stosunkach musiała się dać uczuć ta nierówność poszukiwań, które gdyby w krajinach zwrotnikowych z równą były czynione sta-

raunością, dałyby nieco inne wypadki, co do stosunku tych roślin bądźto na całej ziemi, bądź w każdym pasie, a szczególnie w pasach ciepłych. Zresztą, wszystko eo się powiedziało dotyczy szczególnie roślin bezliściennych komórkowych. Obaczymy niżej, że rozkład roślin naczynnych podlega innym, znajomym i daleko stałszym prawom.

§ 895. Porównując z sobą dwie wielkie gromady roślin liściennych, widzimy, iż stosunek względny jednoliściennych roślin w miarę oddalania się od równika. Aż do  $10^{\circ}$  ilość wynosi na nowym lądzie około  $\frac{1}{6}$  wszystkich roślin, na starym zaś około  $\frac{1}{5}$ . Wzrastając stopniowo dochodzi ona  $\frac{1}{4}$  ku środkowi pasa umiarkowanego, a  $\frac{1}{3}$  ku jego krańcom. W krainach jednakże lodowatych zmniejsza się znowu nieco, jak np. w Grenlandyi. Jasną jest rzeczą, iż stosunek dwuliściennych jest odwrotnym, i że wyraża się przez dopełnienia ułamków poprzednich. Wypadki te wynikają z powiększenia się niektórych rodzin, a zmniejszenia innych, jak to okaże następująca tablica, którą wzięliśmy z Humboldta, a która wykazuje dla środków trzech wielkich pasów stosunek kilku rodzin najogólniej rozszerzonych, i najważniejszych z powodu swjej liczby, do całego ogółu roślin jawnopłciowych. Jasną jest rzeczą, że ilość gatunków tych rodzin zmieniając się podług pasów, musi najbardziej wpływać na zmiany ważnych owych stosunków.

GRUPY lub RODZINY	Stosunki do całego ogólni jawnoplitowych			
	Pas równikowy szerok. 0°—10°	Pas umiarkowany szerok. 45°—52°	Pas lodowat. szer. 67°—70°	
<i>Stowarde</i> .....	1/400	1/30	1/25	Stosunek powiększa się od równika ku biegunowi
<i>Turzygowe</i> .....	1/22 na starym lądzie, na nowym lądzie.	1/20	1/19	
<i>Trawy</i> .....	1/50	1/42	1/10	Stosunek powiększa się od równika ku biegunowi
<i>Kobowe</i> .....	1/14	1/43	1/20	
<i>Wyzosowate</i> .....	1/800	1/25	1/25	Stosunek powiększa się od równika ku biegunowi
<i>Ostronieczowate</i> .....	1/130	1/100	1/25	
<i>Marczanowate</i> .....	1/32	1/35	1/500	Stosunek powiększa się od równika ku biegunowi
<i>Stępkowe</i> .....	1/14	1/80	1/80	
<i>Sizowate</i> .....	1/25	1/60	1/80	Stosunek powiększa się od równika ku biegunowi
<i>Krzyżowe</i> .....	1/10	1/18	1/35	
<i>Baldaszkowe</i> .....	1/35	1/200	0	Stosunek zmniejsza się od pasu umiarkowane- go ku biegunowi i ku równikowi.
<i>Wargowe</i> .....	1/800	1/18	1/24	
<i>Złożone</i> .....	1/500	1/60	1/80	Stosunek zmniejsza się od pasu umiarkowane- go ku biegunowi i ku równikowi.
<i>Paprocie</i> .....	1/40	1/40	1/70	
	na dawnym lądzie, na nowym lądzie.	1/25	1/13	
	w krajach mało górzysl. bardzo górzysl.	1/18 1/18 1/20 1/70	1/13	
	1/3 do 1/8	1/70	1/25	

§ 896. Rośliny te należące do rozmaitych rodzin, których gatunki zmieniają się także podług okolic, przedstawiają w rozmaitych swych połączeniach rysy właściwe krainie każdej z nich. Rysy te jednak zależą zarazem od innej jeszcze przyczyny, o której nie mówiliśmy dotąd, mianowicie od liczby osobników jednego gatunku w danej przestrzeni. Ktokolwiek uważnie zastanowi się nad roślinnością jakiego kraju, i nieprzystając na przelotnym rzucie oka na ogół, zechce rozbić rozmaite jej szczegóły, spostrzeże zaraz, iż pomiędzy roślin, które je składają, jedne powtarzają się nieskończenie, i zarastają gęsto znaczne przestrzenie, inne zaś rzadko się tylko ukazują. Uczucie różnorodności lub jednostajności, jaką oko przesyła umysłowi, zależy od mnogości różnych gatunków skupionych na jednem miejscu, albo od wielości osobników jednego gatunku, który wyłącza wiele innych. Nazwano *gromadnemi* (pl. *sociales*), rośliny żyjące razem, tak jak niektóre zwierzęta trzymające się gromadnie; przez rzadki tylko wyjątek znaleźć można szczepy takowych roślin zdaleka od podobnych im odosobnione. Obecność ich jest zawsze oznaką podobnego przyrodzenia ziemi, na której rosną, linja zaś na której się zatrzymują, oznacza zmianę w przyrodzeniu ziemi. Łatwo się o tём przekonać na brzegach wód bieżących. Brzegi kanału, z jednakową prawie równią, i nadbrzeża rzek zazwyczaj nierówne, przedstawiają zupełnie różne warunki co do stopnia wilgoci, a często także co do przyrodzenia ziemi, która je tworzy. Dlatego widzimy, że pewne rośliny, jak niektóre gatunki *sitów* (*Juncus*), turzycowatych, traw, rosną jedne ponad drugimi w kształtnych i równoległych wązkich pasach, z których każdy utworzony jest przez jeden gatunek i które odznaczają różne warstwy tej ściany roślinnej. Takie prawidłowe ułożenie widzieć można na daleko większą stopę wzdłuż znaczniejszych rzek, jak np. w Ameryce pod równikami gdzie żeglarz przez całe dni spostrzega jednostajny widok nieprzerwanych smug, utworzonych przez wielkie drzewa, których każdy gatunek zajmuje stale inne piętro. Niektóre *sity*, niektóre *turzyce* pokrywają całe bagna, a przy brzegach naszych stawów widzimy gęste zarośle z trzciny pospolitej (*Arundo phragmites*) i *sitowia wodnego* (*Scirpus lacustris*), tworzących pas, poza którym dno albo jest za głębokie, albo za suche i dlatego nie dozwala im się krzewić, *ślotochrósty* (*Ulex europaeus*)

pokrywające stepy, *wrzośy* od których poszło nazwisko owych tak rozległych i tak licznych w północnej Europie jałowych ugorów, bądźto po płaszczynach bądź po wzgórzach pokrytych nieskończonemi czerwonymi kobiercami jednego gatunku (*Erica vulgaris*) lub niskimi zaroślami innego nie tak pospolitego gatunku (*Erica scoparia*), stanowią przykłady bez wątpienia większej części czytelników naszych znajome, Taka, z jednego tylko gatunku składająca się roślinność dowodzi oczywiście, iż gatunek ten posiada wielką łatwość, wielką siłę życia i odradzania się, tudzież że grunt takich miejsc jest bardzo jałowym, to jest nie posiada warunków potrzebnych do wyżywienia wielu rozmaitych roślin. Jeśli jakie inne gatunki ukażą się tamże, roślina gromadnie przestrzeń ową zarastająca, zagłusza je i sama na ich miejscu krzewi się, lub rzadko tylko tu i owdzie rozwinąć się im dozwala. Wymieniliśmy kilka takich roślin pospolitszych we Francyi, lecz prawie każdy kraj posiada swoje właściwe gatunki, zarastające znaczne przestrzenie, których nazwy różnią się podług okolicy i podług samych roślin; częstokroć ukazuje się ich wiele zarazem, a są i takie, które lubo stanowią zawsze główne łoś roślinności, cierpią jednakże wpośród siebie wiele innych gatunków, znajdujących pożywienie w mniej wyłącznym gruncie.

§ 897. Zastanówmy się teraz z początku nad wpływem gruntu, o którym nie mogliśmy mówić wprzód, ponieważ dotąd uwagę naszą zajmowały wielkie krainy kuli ziemskiej, pod względem ogółu swój roślinności, i ponieważ zmiany téjże wynikające z różności gruntu, są daleko bardziej miejscowe, daleko bardziej rozdrobnione, a mnogość jest znaczną w każdej z tych krain, częstokroć nawet na dość szczupłych przestrzeniach. Pod gruntem w ogóle rozumiemy tu wszelki środek w którym roślina może rosnać, wody przeto należą tu także.

§ 898. Zaczniemy od morza, w którym jak widzieliśmy (§ 732) żyje część wodorostów, znanych pospolicie pod imieniem *morszczyzn* (*Fuci*). Rośliny te przyczępione lecz niewkorzone na dnie lub skałach, ciągną swe pożywienie z otaczającej je słonej wody. Niektóre nawet z nich pływają wolno: takim jest np. szczególny jeden gatunek zwany *winogronem szrotnikowém*, dla samych nabrzmiałości ułożonych w grona; ukazuje się on żeglarzom nakształt raków morskich znacznej rozległości, pomiędzy 22° i 36° szerokości północnej, a 25°

i 45<sup>o</sup> długości. Zpomiedzy jawnopłciowych same tylko *wstę-  
żnicowate* (*Zosteraceae* Tabl. II) są roślinami morskimi.

§ 898 bis. W wodach słodkich napotykamy drugą część wodorostów (§ 732), z których jedne pływają wolno, inne, a tych liczba jest daleko większą, wkorzenione są na dnie. Tu należą *ramienicowate* (*Characeae*), *korzenioziarne* (*Rhizocarpeae*), niektóre *mchy* i *wątrobnice*; z jawnopłciowych prawie wszystkie gatunki jednoliściowe, bezbielmore, bezkwiatowe, lub opatrzone okwiatem zielnym (Tab. II), tudzież niektóre opatrzone bielmem, jak *grzęznicowate* (*Pistiaceae*) i część *ożyptałkowatych* (*Typhineae*); z dwuliściennych *rogatkowate*, *grzybieniwate*, *bogoroślowate*, (*Nehumboneae*) *plyncowate* (*Cabombeae*), większa część *węgłoszowatych* (*Hälorageae*), *plywaczowatych* (*Utricularieae*) i t. d. i t. d.

§ 899. Po większej części wierzchołki tych roślin wystają ponad wodą, nosząc na sobie kwiaty i owoce, i stanowią tym sposobem nieznaczny nawet przechód do roślin błotnych lub nadbrzeżnych, których niższa tylko część stoi pod wodą, kwiatostan zaś, a nieraz i część liści w powietrzu; do takich należą: *błotnicowate* (*Juncagineae*), *żabienicowate* (*Alismaceae*), *łączniowate* (*Butomeae*). Liczne także przykłady napotykamy w *trawach sitowatych*, *ciborowatych*. Oprócz tego wymienić należy *smocznicowate* (*Orontiaceae*), *rozplawowate* (*Pontederaceae*), niektóre *widłakowate*, *kosaccowate*, *storczykowate*, *rdestowate*, *goździkowate*, *krzyżowe*, *jaskrowate*, *krwawnikowate*, *różowate*, *wiesiołkowate*, *baldaszkowe*, *babkowate*, *trędownikowate*, *wargowe* i *złożone*. Jedne z nich zamieszkują wody stojące, a to albo rozlane w stawy mniej więcej rozległe, albo ścięśnione w brody lub rowy, inne lubią wody bieżące; niektóre zaś wody zimne, powstające przy topnieniu wieczystych śniegów; takimi są piękne gatunki łomikamienia i innych roślin alpejskich, okrywające brzegi strumyków w owych górzystych krainach.

Woda słona, zabójcza dla większej liczby roślin, jest przeciwnie koniecznym warunkiem życia wielu gatunków zamieszkujących piaski brzegów morskich, niektóre nawet z tych gatunków posuwają się nieco dalej i zanurzają szczepy swe w morzu do pewnej głębokości. Takimi są np. *rościeża* (*Avicennia*) i *srożypląt* (*Rhizophora mangle*), owe gromadne drzewa, pospolite na brzegach wszystkich mórz zwrotnikowych, i które

nadają im szczególną powierzchowność, grube bowiem ich korzenie wznoszą się ponad wodę i tworzą jakby arkady ze środka których wychodzi łądoga.

Nazywamy torfowiskami pewne bagna szczególnego przyrodzenia, pokryte roślinami gromadnemi, których korzenie gęsto z sobą splecione tworzą w końcu rodzaj gruntu gębczastego i ruchomego, zarośniętego częstokroć gatunkami jednego z mchów, *rokietu* (*Sphagnum*) i sprzyjającego niektórym roślinom jak *rosiczka* (*Drosera*), *żórawina* (*Oxycoccus*), niektóre *wierzby* i t. d., niektóre paprocie, jak *długosz* (*Osmunda regalis*). Co rok nowe rośliny rozwijając się podnoszą dno, a rośliny lat poprzednich zagłębiając się i zapadając coraz bardziej, przestają żyć; lecz usunięte zpod wpływu powietrza, nie rozkładają się zupełnie i tworzą w końcu wraz z mułem który trzyma rozmaite ich części w pierwiastkowym położeniu, ciało zbite, używane na opał, pod imieniem torfu.

Niektóre rośliny napotykamy zarówno prawie tak na gruncie suchym jako też na miejscach zalanych wodą; do takich należą wiele gatunków błotnych, nazwanych *ziemnowodnemi* (*Pl. amphibiae*). Niektóre z nich oznaczane osobnym imieniem *roślin zatopionych* (*Pl. inundatae*), żyją na gruntach naprzemian zalewanych wodą i osychających. Liście tychże zmieniają się co do kształtu podług tego, jak się rozwijają w wodzie lub w powietrzu: uderzający tego przykład przedstawiają liście *jaskru wodnego* (*Ranunculus aquatilis*).

§ 900. Mówiliśmy już na inném miejscu (§§ 311—316) o znaczeniu jakie ma w roślinności rozmaite przyrodzenie ziemi; lecz tam zajmowaliśmy się jedynie wpływem tężce na żywienie roślin, tu zaś wypada nam zastanowić się nad wpływem jęj na rozkład gatunków i rodzin. Ziemię odmiennego chemicznego składu przedstawiają wprawdzie w płodach swoich niejakie różnice, lecz te niezawsze są dość wydatne w całości flory. Tak, grunta wapienne, krzemionkowate lub gliniaste, muszą bez wątpienia posiadać pewne, każdemu z nich właściwe rośliny, lecz to nie tak stale, ani w takiej liczbie, aby roślinność jednego z nich, w ogólnych swych rysach, wyraźnie się od roślinności wszystkich innych różniła. Inaczej rzecz się ma z gruntami słonemi; na nich spostrzegamy pewne tylko rośliny, z których wiele odznacza się swym krótkim i gęstym liściem; takimi są np. *sodnik* (*Salsola*), *soliród* (*Salicornia*), kilka

innych *lobodowatych*, niektóre *krzyżowe* (*Crambe* i *Cakile*), *pięciopalcowate* (*Samolus* i *Glauca*), niektóre *zawciagi* (*Statice*), obfitują także na brzegach morskich, a wyżej już mówiliśmy (§ 315), że też same lub podobne rośliny ukazują się także wewnątrz łądów, gdzie tylko skład ziemi jest solny.

W ogóle jednak skład chemiczny gruntu wpływa nadewszystko na zmianę własności jego fizycznych, czyni go bowiem lżejszym lub cięższym, więcej lub mniej przepuszczającym powietrza i wodę, łatwiej zatrzymującym lub pozbywającym się tej ostatniej; ztąd pochodzi, że jedna i ta sama ziemia może sprzyjać lub szkodzić roślinie w dwóch zupełnie różnych klimatach, i odwrotnie, jedna i ta sama roślina, może wymagać innej ziemi w jednym, a innej w drugim z tych klimatów. Tak np. Kirwan okazał, że pszenica w klimacie suchym lepiej się udaje na gruntach gliniastych, ponieważ takowe są więcej higroskopijne; w klimacie zaś wilgotnym, na gruntach krzemionkowych, jako mniej higroskopijnych.

§ 901. Toż samo prawie rzecz można o wpływie stosunków geologicznych ziemi na roślinność. Ponieważ ta przygotowuje się i wyrabia niejako w samej tylko powierzchniowej i dosyć płytkiej warstwie ziemi, przeto geologia, objaśniając nas o początku i przyrodzeniu tej warstwy, tudzież o przyrodzeniu warstwy niższej na której tamta spoczywa, może nam bez wątpienia w wielu przypadkach dostarczyć szacownych wskazówek; jednakże nauka ta nie może i nie powinna nawet w ogóle wchodzić w szczegóły czysto miejscowe, które często wpływają na zmianę okoliczności fizycznych. Tak np. wiele wzniosłych płaszczyzn okolic Paryża pokrytych warstwą łupku, oznaczonych bywa na kartach geologicznych jedną barwą. Jednakże porównajmy tylko wzniosłości Montmorency pokryte zbożami, ze wzniosłościami Sarnois pokrytymi krótką i płonną darninią, lub okolicami Meudon, pokrytymi drzewami, a szczególnie kasztanami, wpośród których mnoży się śmiałek pogięty (*Aira flexuosa*), pszeniec zięjący (*Melampyrum sylvaticum*) i *ortyka* (*Pteris aquilina*), a uderzy nas ogromna różnica, która pochodzi ztąd, że w jednem miejscu łupek ma przy sobie glinę, w innem cieniuchna jego warstwa spoczywa bezpośrednio na piasku, a często nawet wcale takowego nie pokrywa. Pomimo tego nie ulega wątpliwości, że wyborne karty geologiczne, jakie rzeczywiście posiada wiele krajów Europy, a między

innemi i Francya, mogą być bardzo użyteczne przy herboryzacyach; dopomogą kiedyś do gruntownego poznania stosunków, które dziś wcale jeszcze niewyraźnie spostrzegamy.

§ 902. Ilość wody zawartej w ziemi jest najważniejszą dla roślinności, która nie istnieje wcale, jeśli ziemia zupełnie jest suchą. Tak np. wewnątrz Afryki zajmują wielkie, zawsze nagie pustynie, zbywa tam bowiem na wodach bieżących, a pary powietrza pod tą szerokością rozrzedzając się nagle przy zetknięciu z rozpalonym piaskiem, wcale się w deszcze nie zgęszczają. W niewielu tylko punktach, gdzie jakie źródła zwilżają ziemię, takowa pokrywa się roślinami i tworzy oazę, jakby wyspę wśród morza piasku. W klimatach bardziej od równika oddalonych, lub złagodzonych nieco z powodu bliskości wielkich łańcuchów gór, deszcz może się tworzyć i dostarczać wody rozległym płaszczynom, które jej w inny sposób otrzymać nie mogą, dlatego też płaszczyny owe przedstawiają w czasie suszy pustynie, a potem przyodziewają się roślinnością nagle rozwiniętą i złożoną w ogóle z roślin zielnych i gromadnych.

Wspomnieliśmy już wyżej (§ 862) o *pampas* i *llanos* znajdujących się w środku Ameryki południowej. Sawany czyli łąki Ameryki północnej, jako też stepy Syberyi i Tartaryi dadzą się z nimi porównać, z różnicą jednakże, jaka wynika z położenia ich w pasie umiarkowanym, który je wystawia na zmienność pór roku, jako też z różnicą zależącą od pierwiastkowej roślinności tych, tak odległych od siebie punktów. Pomiedzy temi pustyniami środkowej Azji znajdują się rozległe przestrzenie przejęte solą, i wydające rośliny podobne do gatunków rosnących na brzegach morza, które też bez wątpienia pokrywało je niegdyś. Nasze stepy i wrzosowiska przedstawiają nam, szczęściem na daleko mniejszą stopę, te suche i płonne przestrzenie. Na niektórych niskich brzegach, wiatr który najczęściej dmie od morza, pędzi ku lądowi piasek; piasek ten zbija się w małe wzgórki, których równoległe pasma posuwają się zwolna i corocznie zajmują więcej ziemi roślinnej, zasypując takową; tym sposobem powstają zaspasy (duny). Lecz płonność tychże nie jest konieczną, a to z powodu świeżości wnętrza gruntu, utrzymywanej wiatrami morskimi. Niektóre drzewa, jak *sosna morska* (*P. maritima*) mogą się tamże utrzymać, i oddają podwójną przysługę, raz, stawiając zaporę

dalszemu posuwaniu się zasp, drugi raz upładniając ich ziemię. Dla wstrzymania zasp używa się także (np. w Holandyi) traw które jak *trzcina piaskowa* (*Arundo arenaria*) prędko się na nich i dobrze krzewią, skoro zaś raz zasy przestaną być ruchomiemi, mogą wydawać wiele roślin, nawet takich które człowiek uprawia.

§ 903. Wiemy iż z kruszcowemi pierwiastkami ziemi i wodą przenikającą takowe, łączą się także szczątki jestestw ustrojnych i stanowią tym sposobem prawdziwą ziemię roślinną, której obfitość najbardziej wpływa na bogactwo roślinności. Obecność zaś roślin na jakim miejscu, zapewnia w miarę ilości szczątków z nich pozostających, następstwo i rozmnożenie się innych gatunków, do czego przyczynia się jeszcze obecność zwierząt, które tamże nadzieja schronienia lub pożywienia przywabia. Lecz wprzód zanim powstała ta mniej więcej gruba warstwa ziemi roślinnej, potrzeba było, aby na gruncie pierwiastkowym, stanowiącym dno, przyjęła się jakkolwiek roślina, aby się tamże rozwinęła i złożyła pierwszy pokład mierzwy, a tym sposobem przygotowała ziemię do przyjęcia innych, któreby z kolei zubożyły pierwszy ów zapas, zwiększany następnie przez dalsze pokolenie tych samych roślin, lub przez inne rośliny; rozmaitość zaś tych ostatnich roślinie w tym samym stosunku. Na jakimkolwiek punkcie postęp ten się zatrzyma, zawsze jednak ustalenie się pierwszej owiej osady roślinnej, a tém samém i ogólne przyrodzenie całej późniejszej roślinności zależy od jakości gruntu pierwiastkowego.

§ 904. Stanowiska roślinne zależą w znacznej części od przyrodzenia ziemi. Widzieliśmy iż rośliny żyją w wodzie morskiej, na brzegach nasyconych solą morską, lub na gruntach oddalonych wprawdzie od morza, lecz słonej z inną przyczyny; dalej w wodach słodkich, stojących w małych lub wielkich przestrzeniach, albo też bieżących w strumieniach lub rzekach, na brzegach tychże, na bagnach, torfowiskach, skałach, na piaskach różnego chemicznego składu, zazwyczaj jednak krzemionkowych, w miejscach jałowych z inną przyczyny (np. dlatego że grunt zbyt tęgi twardnieje od gorąca i nie dozwala weisnąć się korzeniom), na ziemiach w których przemaga glina, wapno, gips, lub inny jaki pierwiastek, na ziemiach powstałych bądź w miejscu, bądź przez napływ, naniesienie mułu, wyrzuty wulkaniczne, lub innym jakim sposobem. Czasami za

skazówkę stanowiska służy nam stowarzyszenie się jednej rośliny z innymi, już także w pewien sposób z sobą połączonymi tak np. odróżniamy rośliny żyjące w lasach, na łąkach, na polach uprawnych i często poruszanych *rośliny rolne* (*Pl. arvenses*) i t. d. Widzimy tu wpływ człowieka na rozkład roślin, ponieważ on właśnie spowoduje sztucznie te ostatnie ich związki. Prócz tego jednak wywiera on inne jeszcze wpływy bez woli a nawet i wiadomości swojej. Pewne bowiem rośliny dzikie, pewne chwasty, któreby człowiek prędzej rad wykorzenić niż rozkrzewić, towarzyszą mu wszędzie i mnożą się około jego mieszkania. Takimi są pokrzywy, różne gatunki *mączycy*, *szczawiu*, *ślazów*, *mokrzycy* i t. d. i t. d. Obecność ich wpośród opuszczonych pól, wpośród pustyni zachodzących wysoko w góry, wskazuje że ludzie przechodzili tamtędy i że przynajmniej chatka pasterza stała tam czas niejaki. Niektóre rośliny wieńczą wierzchołki murów; inne (jak *pomurnik* [*Parietaria*]) wciskają się w szczeliny tychże i krzewią na najmniejszych wydatnościach ich ścian; inne znowu otaczają ich spód i krzewią się na gruzach: *rośl.*, *gruzowe*, (*Pl. ruderales*).

§ 905. Człowiek cywilizowany, któremu nie wystarczają już płody, jakich mu sama ziemia dobrowolnie dostarcza, i który stara się rozmnażać wokoło siebie zwierzęta i rośliny mogące mu przynieść użytek lub sprawić przyjemność, a wytepia te, które mu się nie podobają lub mu szkodzą, musi też rozumieć się dążyć ciągle do zmienienia rozkładu tych jestestw i powierzchni pierwotnej przyrody. W większej części Europy przyroda przedstawia się nam w zmienionych tym sposobem rysach; tu bowiem, albo wcale tylko nieprzystępne, albo bezwzględnie jałowe miejsca zostawione są samym sobie. W stanie przyrody, lasy usiłują opanować ziemię, jak to dziś jeszcze można widzieć na południu Chili, gdzie gaiki, raz się zakorzeniwszy na brzegach lub wpośrodku łąk, zyskują co rok więcej miejsca, posuwając się całym swym brzegiem, jakby w ściśniętej kolumnie i nakoniec łączą się jedne z drugimi, a ściśniętą coraz bardziej obręb traw, zastępują je w końcu zupełnie. Przeciwnie dzieje się w miejscach uprawianych. Lasy pokrywające pierwotkowo większą przestrzeń takowych, przeredziły się i zniknęły powoli pod ciosami człowieka; a te które dotąd jeszcze zachowano i w których po większej części

prawidłowe tylko wyřeby mają miejsce, nie posiadają ani takiej powierzchowności, ani nie wywierają takiego wpływu na otaczającą przyrodę. Własności klimatu zostały w ten sposób zmienione: własności ziemi zmieniają się nieustannie przez uprawę, która nadto rozporządza niewielu roślinami, mającemi pokrywać też ziemię. Przez to wiele gatunków tworzących niegdyś florę dziką zostało wyniszczonych, przynajmniej miejscami, niektóre znowu inne zostały wprowadzone, a takimi są w ogóle rośliny doroczne, których nasiona znajdowały się obok zbóż, pochodzących z krajów mniej więcej odległych. Jakikolwiek jednakże są te zmiany, nie mogą one nigdy być tak znaczne, aby przyroda nie zachowała praw swoich; kieruje ona człowiekiem, nawet wtedy, kiedy mu ustępuje: rośliny dzikie, które obficie wydaje, równie jak uprawiane, którym rosnać dozwala, są podwójną skazówką przez którą się ona poznać daje. Ostatnie nawet dostarczają wybornych znaków dla geografii botanicznej: wszelako używając ich należy pamiętać, że przemysł ludzki zdoła posunąć wszelką korzystną uprawę mniej więcej poza granicę, na którychby się zatrzymało roślenie tych samych gatunków, gdybyśmy takowe pozostawili samym sobie. Jednakże i tak nawet rozszerzone granice, zachowują właściwy dla rozmaitych roślin stosunek. Pamiętać także należy, jeśli w miejscu danem roślina jaka nie jest uprawianą, nie idzie za tém, aby tamże wcale uprawianą być nie mogła, lecz to dowodzi tylko, iż dane pierwszeństwo innéj, większe w témże miejscu korzyści przynoszącéj. Wszelka roślina w rodzinném swém miejscu z najlepszym skutkiem uprawiać się daje i zazwyczaj tam najprzód uprawianą bywa. Następnie najprzejazniejszemi dla niéj są klimata podobne; w miarę zaś im się bardziej od tego pasu oddalamy, uprawa jéj staje się coraz trudniejszą, a plon z niéj coraz mniejszy. Bacząc na powyższe uwagi, geografia botaniczna i rolnicza wzajemnie się będą mogły objaśniać. Ta bowiem dostarczy pierwszej pewnych, należycie uzasadnionych punktów oparcia, a z drugiéj strony, wiedząc że pewne dzikie rośliny towarzyszą stale téj lub owéj uprawie, wniesiemy znalazłszy je w inném jakim miejscu, iż tamże i uprawa owa udaćby się mogła.

§ 906. Pozostaje nam teraz uczynić krótki przegląd rozkładu roślin uprawianych; ograniczymy się w tém na niewielkiéj ich liczbie, a mianowicie na tych tylko, które najpowszechnie

służą za podstawę żywności człowieka, i które tém samym najwięcej na ziemi są rozszerzone. Wiele następujących szczegółów wzięliśmy z wybornej pracy Schouwa (Skaua).

Uprawa *zboż* (§ 747) posunięta jest na północ Skandynawii aż ku 70°, to jest prawie ku linii na której przestają rosnać drzewa. Jestto jedyny punkt, na którym przechodzi koło biegunowe, na całej bowiem zresztą ziemi, zatrzymuje się z tej strony tegoż koła; na zachodzie Syberyi około 60°, dalej na wschód około 55°; w bliskości zaś wschodniego brzegu nie dosięga Kameczatki, to jest 51° w Ameryce, na stronie zachodniej może dochodzić do 57°, jak tego dowodzą doświadczenia czynione w posiadłościach rosyjskich; na stronie zaś wschodniej, dosięga ledwie 50° a najwięcej 52°. Linia przeto zakreślająca ją na północy obudwu lądów, zagina się wraz z liniami równociepłymi.

Sam tylko jednakże *jęczmień* dojrzewa aż po tę granicę, *owies* zaś zbliża się wprawdzie także do niej, lecz zbiór jego nie jest tam już tak pewnym, i ledwie raz na kilka lat się udaje. Ziarno tych zbóż służy za pokarm mieszkańcom Szkocyi, Norwegii, Szwecyi i Syberyi.

Bardziej ku południowi widzimy obok tego uprawę *żyta*, które zresztą dochodzi w Skandynawii równie daleko jak owies. Uprawa tego ziarna przemaga w całej tej części pasu umiarkowano-zimnego, którą tworzy południowa Szwecya i Norwegia, Dania, prawie wszystkie nadbrzeżne kraje Bałtyku, północne Niemcy i część Syberyi. Zaczynamy tu już także napotykać *pszenicę*, owies zaś uprawianym bywa tylko dla koni, a *jęczmień* tylko w celu wyrabiania piwa.

Dalej zaczyna się wielki pas, w którym *pszenica* uprawia się prawie z wyłączeniem żyta, a który zajmuje południe Szkocyi, Anglią, środek Francyi, część Niemiec, Węgry, Krym i Kaukaz, tudzież te części środkowej Azji w których napotykamy nieco rolnictwa. Ponieważ winorośl utrzymuje się w części tego pasu, przeto wino zastępuje tam miejsce piwa, a tém samym *jęczmień* mniej jest poszukiwanym.

Pszenica rozciąga się znacznie dalej na południe; lecz obok niej pospolitą tam jest uprawa ryżu i kukuruzy: widzimy to na półwyspie hiszpańskim, w części południowej Francyi, a mianowicie ponad morzem Śródziemnym, we Włoszech, Grecyi, Azji mniejszej i Syryi, w Persyi; na północy Indyj, w Arabii,

Egipcie, Nubii, Barbary i wyspach Kanaryjskich. Szczególniej na południu ostatnich krajów kukuryza i ryż najwięcej są uprawiane, a w niektórych także gryża (*Sorghum*) gatunek *wikliny* (*Poa abyssinica*). W obudwu tych pasach pszennych uprawa *żyta* ogranicza się tylko na dosyć wysokich wzniosłościach gór, równie jak uprawa *owsu*, która nakoniec zupełnie ustaje; mieszkańcy bowiem chętniej używają jęczmienia na pokarm dla koni i mułów. Na wschodnim krańcu starego lądu, w Chinach i Japonii zboża nasze prawie zupełnie są zaniedbane, z przyczyn, które jak się zdaje, wypływają ze zwyczajów krajowych; natomiast uprawa ryżu jest prawie wyłączną. Przemaga ona także w południowych prowincjach Stanów-Zjednoczonych; wreszcie zaś tej części Ameryki, uprawa kukuryzy jest daleko pospolitszą niż na starym lądzie.

Co się tycze pasu gorącego, w Ameryce panuje kukuryza, w Azji zaś ryż; zależy to bez wątpienia od pierwiastkowego pochodzenia tych traw. W Afryce obiedwie zarówno są uprawiane.

Na półkuli południowej, w której umiarkowanych krainach większa część tych zbóż udawaćby się mogła, uprawa ich jest rzadszą z powodu niższej cywilizacji i mniejszego zaludnienia; w części zaś zależy od zwyczajów wprowadzonych przez osady. Na południu Brazylii, w Buenos-Ayres, Chili, na przykładu Dobrzej-Nadziei, na południu Nowej-Walii i w Nowej-Hollandyi, panującą jest uprawa pszenicy; *jęczmień* zaś i *żyto* ukazują się bardziej ku południowi, równie jak na wyspie Van-Diemen.

Śledząc teraz rozkładu zbóż w pasach różnej wysokości, znajdujemy iż takowy podobnym jest do rozkładu ich, któryśmy widzieli w pasach spowodowanych przez różną szerokość. Za przykład, który nam zastąpi wszystkie inne, weźmy Andy Ameryki podrównikowej. Kukuryza panuje na nich od 1,000 do 2,000 metrów, sięga jednakże jeszcze około 400 metrów wyżej. Pomiędzy 2,000 i 3,000 panują z kolei zboża europejskie: żyto i jęczmień wyżej, pszenica zaś niżej.

Jasną jest rzeczą, iż zważać tu należy na samą tylko ostateczną granicę bądź pod względem wysokości, bądź pod względem szerokości. Druga granica nie nam nie dowodzi, chyba tylko, że uprawa zboża pośledniejszego zarzuconą bywa, skoro znajdują się warunki sprzyjające uprawie ziarna lepszego.

Wszelako według niektórych doświadczeń pp. Edwards i Collin, zdawałoby się, iż oprócz granicy zakreślonej rozmaitym naszym gatunkom przez minimum ciepła, którego potrzebują aby mogły wydać owoce, istnieje inna odwrotna, zakreślona przez maximum ciepła, poza którą roślinie ich doznaje przeszkody. Podług tych pisarzy granicę taką stanowi dla jednych gatunków temperatura średnia 18°, dla innych nieco wyższa i aż do 22°; postrzeżenia czynione względem temperatury, w której pod zwrotnikami zatrzymuje się uprawa różnych gatunków, potwierdzają ten wniosek. Kilka wyjątków, jakie się zdarzają, zależy zapewne od tego, że w klimatach, w których zboża udają się pomimo temperatury wyższej nad owo maximum, uprawa ich odbywa się w porze, której temperatura średnia zstępuje niżej. Cóżkolwiek bądź, biorąc pod uwagę same tylko północne granice i postępując za nimi przez cały szereg miejsc na których są należycie oznaczone, ujrzymy, iż są w ogóle równoległe od siebie dla różnych zbóż, i zginają się prawie wraz z liniami równoleżniemi, tojest zakreślonymi przez punkta na których średnia temperatura lata jest jednakowa. W istocie też dojrzewanie owoców wszystkich tych rocznych roślin, musi się stosować do długości i natężenia lata.

§ 907. *Ziemniaki* (§ 836) rozszerzyły się od niezbyt dawnego czasu po wszystkich prawie oświeconych krajach, i stanęły obok pokarmów mącznych, jakich dostarczają nasiona zbóż; w niektórych nawet okolicach zastąpiły je prawie zupełnie. Uprawa ich sięga granic zbóż, a nawet przechodzi nieco takowe, jeśli się wybierze odmiany rychłe, mogące się zupełnie wykształcić przez czas krótkiego bardzo lata. Tym sposobem uprawiają się teraz w Irlandyi, tudzież na znacznych wyniosłościach gór europejskich, gdzie zboża już się nie udają. Przeciwnie w krajach ciepłych ziemniaki wyradzają się łatwo, i dlatego uprawa ich jest zaniechaną, wyjąwszy na znacznych wyniosłościach, na których warunki temperatury są im przyjazne. Na Andach podrównikowych uprawa ich jest podług świadectwa Humboldta pospolitą pomiędzy 3,000 i 4,000 metrów.

§ 908. W wyższem-Peru, przed przybyciem Europejczyków uprawiano powszechnie *quinoa*, gatunek mączyciu, z rodziny szarłatowatych, dla mączystych jego nasion; dziś uprawa tej rośliny jest daleko radszą.

§ 909. Liczne gatunki rodzaju *rdestu* (*Polygonum*), który stanowi wzór sąsiedniej rodziny rdestowatych (§ 779), a którego nasiona są także mączyste, służą zwykle z tego powodu za pokarm ludom zamieszkującym północne góry i górzyste płaszczyzny Azji, z kąd właśnie gatunki te pochodzą. Jeden z nich *gryka* (*P. fagopyrum*), jest pospolitym w północnej Europie, a szczególnie w Bretanii, gdzie stanowi główny pokarm wieśniaków.

§ 910. Mieszkańcy niektórych górzystych powiatów w Apenninach we Włoszech, we Francji zaś w Cewennach i Limousin, żyją przez część roku kasztanami. *Kasztan* (§ 764) rośnie dziko we wszystkich górzystych okolicach południowej Europy, w Azji-mniejszej i na Kaukazie; daje się zaś uprawiać dosyć nawet daleko od swych przyrodzonych granic. Owoc jednakże jego wymaga pewnego stopnia ciepła, dosyć długo trwającego. Poza Londynem i na północ Belgii, około 51° nie dojrzewa już wcale i hodowanym bywa tylko dla drzewa lub dla ozdoby. Ponieważ jako drzewo musi być wystawionym na wpływ zimy, przeto zdaje się, że północna jego granica zakreślona jest przez linią równożimową. Jednakże i gorąco szkodzi mu także; już we Włoszech rośnie tylko na samych pochyłościach gór, na Atlasie zaś niema go wcale.

§ 911. Pomiędzy zwrotnikami, mieszkańcy wszystkich okolic niebardzo nad poziom morza wyniesionych, żywią się innemi płodami roślinnemi, gdyż w ogóle ilość istoty pożywniej przez nie dostarczanej, daleko jest większą na daniej przestrzeni; nadto owoce otrzymują się tam prawie bez uprawy, co powiększa jeszcze wstręt do ciężkiej pracy w klimacie tak nadzwyczajnie gorącym. Przytoczyliśmy już powyżej 1<sup>mo</sup> *Banan* (§ 756) hodowany dla owoców swych aż do Syrii, około 34°, a który w Andach, na wysokości 2,000 metrów, gdzie średnie ciepło spada do 18—19°, zaledwie już owocuje; 2° *Palnę daktylową* (§ 749) pochodzącą z Afryki północnej, gdzie niektóre ludy żywią się jej owocem, dojrzewającym tylko po lilią idącą od Hiszpanii aż do Syrii, od 39° do 30°, chociaż samo drzewo może się utrzymywać o kilka jeszcze stopni dalej ku północy; 3° *Kokos* (§ 749), pochodzący pierwotnie z Azji południowej, teraz zaś rozrzerzony, równie jak banan po całym pasie międzyzwrotnikowym, lecz lubiący same tylko wybrzeża morskie, zdala bowiem od morza nie udaje się wcale. Wymaga

on temperatury średniej, wynoszącej przeszło 22°, a przeto zatrzymuje się prawie tam, gdzie się zaczynają zboża, i dostarcza mieszkańcom niektórych krain, jak np. półwyspu indyjskiego i wyspy Cejlan, wybornego pożywienia i ważnego przedmiotu handlu; 4° *Chlebowiec* (§ 765), żywiący większą część mieszkańców wysp południowych, z których pochodzi; dziś przeniesiono go na Antylle, do Brazylii, Gujany, i na Ile-de-France; jednakże tak dalece nie znosi zimna, iż nie może przejść za 22° lub 23° szerokości.

§ 912. Mówiliśmy nadto o kilku innych roślinach dostarczających pokarmu, i uprawianych dla mączystych korzeni; takimi są: *Yam* (§ 755) pochodzący z archipelagu indyjskiego; uprawa jego nie rozciąga się dalej jak do 10° z każdej strony równika na dawnym lądzie; *patat* (§ 838), pochodzący z Indyj, lecz który udaje się nawet w naszych umiarkowanych klimatach, chociaż w wielkiej ilości uprawianym bywa, w samym tylko pasie ciepłym to jest do 41° lub 42°; *Maniok* (§ 770), rozszerzony od Brazylii aż do zachodniego brzegu Afryki, uprawiany w Ameryce aż do 30° po obudwu stronach równika, a na górach nie wyżej jak do 1,000 metrów.

§ 913. Mówiąc o różnych rodzinach, widzieliśmy jak bardzo człowiek ubiega się za napojami wysokokowemi, otrzymywanymi w skutek drożdżenia, i jak sobie takowe, w każdym prawie kraju przysposabia z roślin jakie tamże ma pod ręką. Weźmy tu najważniejszą z tych roślin: *winorośl* (§ 749) i obaczymy w jakich granicach takowa uprawiana jest w celu otrzymania wina. Zdaje się, że granice te sięgały dawniej wyżej ku północy, niżli teraz, albowiem Bretania i Normandya miały swoje wina, których teraz nie mają. To jednak bez wątplenia nietylę pochodzi z pogorszenia się klimatu jak niektóre utrzymują, ile raczej ztąd, że cywilizacya ułatwiając wymianę i przewożenie, skłoniła do zaprowadzenia uprawy korzystniejszej, a zaniedbania płodu miernego i niepewnego, który łatwiej, pewniej i w lepszym gatunku daje się zkądinąd sprowadzić. Cóżkolwiek bądź, linia na której dziś zatrzymuje się uprawa wina w większej ilości, zaczyna się na stronie zachodniej Francyi około Nantes (47°—20'); ztąd wznosi się aż ku Paryżowi (49°) i nieco jeszcze wyżej aż do Champagne, tudzież nad Mozela i Renem aż do 57°; dalej po kilku zakrętach przechodzi prawie do tegoż samego stopnia w Szlązku,

a nakonle  
zkąd zu  
nocy br  
południow  
dalej idzie  
wu ukazu  
w Persyi,  
nie dojrze  
nia mogła  
państwie

Na drug  
zwyczajó  
kilku rozr  
ogólnie, a  
czne i od  
pierwsz  
gatunków  
dzi na bra  
zaś połudr  
Na półkuli  
Buenos-A  
wnym z w  
jednak ni

Co się t  
na 300 m  
dniovej s  
Apeninac  
choć m

Ze wsz  
że winor  
zależy od  
musi być  
aby dojrze  
i w tój jes  
dzi teraz  
leż tyl  
zdają się  
wnych w  
z wysp Z  
brzegów

a nakoniec zniża się ku południowi do 48°—49° w Węgrzech, z kądem znowu idzie w tej samej szerokości aż do Krymu i na północny brzeg morza Kaspijskiego, gdzie się kończy. Granica południowa przypada na wyspach Kanaryjskich około 27°48', dalej idzie przez wybrzeże Barbaryi, przerywa się tamże i znowu ukazuje na małym punkcie Egiptu, tudzież obficie daleko w Persyi, aż do 29° a nawet do 27°. W Japonii owoc winorośli nie dojrzewa, a w Chinach wcale jej nie uprawiają; bez wątpienia mogłaby się tam utrzymać, lecz w całym tém rozległym państwie herbata jest napojem panującym.

Na drugiej półkuli i w Ameryce, osadnicy usiłowali, według zwyczajów i pojęć swoich zaprowadzić uprawę winorośli na kilku rozrzuconych punktach, i nie bez skutku, jednakże nie tak ogólnie, aby granice jej rzeczywiste uważać można za konieczne i od przyrody naznaczone. W Ameryce północnej, gdzie pierwsi żeglarze znaleźli wiele rozmaitych dziko rosnących gatunków tej rośliny, granica północna jej uprawy, nie przechodzi na brzegach Ohio 37°, a w Nowej Kalifornii 38°; granica zaś południowa w Nowej-Biskai 26°, a w Nowym-Mexyku 32°. Na półkuli południowej znajdujemy winorośl w Chili i części Buenos-Ayres; w Nowej-Holandyi około 34°, tudzież na sławnym z win swoich przyładku Dobrzej-Nadziej; nigdzie ona tu jednak nie dochodzi do 40°.

Co się tycze gór Europy, znajdujemy ją w Węgrzech przeszło na 300 metrów, w północnej Szwajcaryi sięga 550, na południowej stronie Alp nie dochodzi 650; w południowych zaś Apeninach i w Sycylii zbliża się do wysokości 960 metrów, chociaż na Teneryfie nie rośnie wyżej nad 800.

Ze wszystkiego, co się dotąd powiedziało, wniesć można, że winorośl lubi w ogóle klimat umiarkowany, lecz że mniej zależy od temperatury średniej niż od temperatury lata, które musi być i dosyć silne, aby owoce dojrzały, i dosyć długie, aby dojrzewanie to dochodzące kresu swego dopiero w jesieni i w tej jeszcze porze znalazło znaczny stopień ciepła. Zachodzi teraz pytanie, czy nigdzie pod zwrotnikami nie można znaleźć tych sprzyjających okoliczności. Świeże postrzeżenia zdają się mówić za możnością tego, ponieważ oprócz pewnych wyżej wspomnianych punktów, jakimi są np. jedna z wysp Zielonego-Przyładka, wyspa Śgo Tomasza w bliskości brzegów Gwinei, tudzież Abissynia, dziś na zachodnim brzegu

Ameryki południowej, około 18° i 14°, a nawet aż do 6° otrzymują wina chwalone przez podróżników. Zdawałoby się, że wysokość na jakiej uprawa ta ma miejsce, wynagradza zbyt małą szerokość, jednakże i to niewszędzie jest prawdą, ponieważ w niektórych miejscach, winnice zstępują aż po sam brzeg morski. Potrzeba tylko, aby klimat był nadzwyczaj suchym i zdaje się, że gdzieindziej wilgoć przeszkadza udawaniu się wina.

Winorośl hoduje się w rozmaity sposób: Albo pozostawia się szczepy czyli latorośle samym sobie, albo pozwala się im pięć na kije lub altanki, zazwyczaj dość niskie, lub też na drzewa nieco wyższe i w koszyk obcięte, jak w północnych Włoszech, albo znów na dosyć wyniosłe i wcale zresztą nie-  
tknięte drzewa, jak w państwie Neapolitańskim, którego szczepy winne pną się po wysokich topolach, przeskakując z jednej na drugą licznymi ponad sobą zawieszonymi wieńcami. Ostatni sposób przedstawia podwójną korzyść, raz, że tym sposobem zyskuje się na przestrzeni, drugi raz, że winogrona, zabezpieczone pomiędzy liściem od zbytowego gorąca, któreby mogło działać zaprędko lub niejednostajnie, zwolna dojrzewają. Jednakże, tuż obok tego, a nawet i bardziej jeszcze na południe jak np. w Sycylii, napotykamy znów wina na tykach; przeciwnie w Delinacie szczepy pną się po drzewach. Wprawdzie być może, iż dobroć soku wcale na tym nie zyskuje; widzimy przynajmniej, że w okolicach Paryża, szczepy zaniedbane i pnące się po drzewach, rzadko dojrzale noszą grona. Zresztą zdaje się, że winorośl może żyć w każdym gruncie, lecz że własności, dla których bywa poszukiwaną w celu otrzymania wina, nabywa szczególnie na gruntach suchych i kamienistych. Wiadomo zresztą, że winnice sąsiednie sobie i umieszczone w okolicznościach klimatu i gruntu na pozór zupełnie jednakowych, dają wina zupełnie od siebie różne; a nakoniec wpływ, jaki na ostateczne wypadki wywiera więcej lub mniej doskonały sposób przyrządzania i zafakszowania wina, nie dozwala należycie ocenić, co rzeczywiście należy samej przyrodzie. W ogóle jednak, w winogronach zbliżających się do granicy północnej, przemaga stosunek kwasów; w winogronach zaś południowych, stosunek pierwiastków cukrowych, a tym samym i wyskoku.

Chcąc, aby rys geograficznego rozkładu jakiej rośliny mógł zupełnie zaspokoić umysł, należałoby zwrócić uwagę na jej gatunki i odmiany, które się udają, lub, które są panującemi pod różnemi szerokościami; lecz odmiany winorośli, tak się rozmnożyły i pomieszały, że oznaczenie ich stało się jednem z najzawikłańszych zadań botaniki rolniczej.

§ 914. Znadto już przekroczyliśmy granice dzieła temu naznaczone, abyśmy mogli zastanowić się jeszcze nad rozkładem wielu innych roślin uprawianych dla użytku, jaki przynoszą w gospodarstwie lub przemyśle. Musimy więc odesłać czytelnika do krótkich wiadomości, któreśmy o każdej z nich przy właściwej rodzinie zamieścili. Do takich roślin należy *oliwnik* (§ 826), *trzcina cukrowa* (§ 747), *kawa* (§ 841), *kakao* (§ 797), *herbata* (§ 798), tudzież różne gatunki służące do wyrobienia nici, powrozów lub tkanin, albo też używanych w barwnictwie.

Kończąc o tym przedmiocie, zwrócimy jeszcze uwagę czytelnika na ścisły związek różnych gałęzi nauki pomiędzy sobą, tudzież na związek wiadomości teoretycznych z praktyką. Układnictwo, objaśnione badaniem ustrojności, objaśnia z kolei badania własności, wprowadza porządek w zamęt niezliczonych gatunków roślinnych, dozwala oznaczać należycie gatunki właściwe każdemu punktowi ziemi, wnosi z przyrodzonych stowarzyszeń roślin, tworzących flory każdej okolicy i każdego gatunku o stowarzyszeniach, których sztuka może próbować a tym sposobem staje się jedną z najużyteczniejszych pomocniczek rolnictwa.

§ 915. ROŚLINY KOPALNE. Dotąd usiłowaliśmy dać rys ogólny teraźniejszego rozkładu roślin na powierzchni ziemi. Ale byłże ten rozkład zawsze takim samym? Tego właśnie należałoby dojsć, lecz całą pomoc w podniesieniu zasłony pokrywającej zmiany, jakim uledez mógł w epokach poprzednich, znajdujemy jedynie w badaniu jestestw kopalnych, to jest szczątków zagrzebanych w głębi warstw stanowiących z kolei tę powierzchnią. Oczywiście zatem jest rzeczą, że niepodobniestwem jest, aby wypadki, jakich się tu spodziewać można, nosiły na sobie piętno takiej pewności i ogólności, jakiej nam dostarczyło badanie roślinności teraźniejszej. Nasamprzód bowiem, wiele roślin mogło kiedyś istnieć i nie pozostawić po sobie żadnego śladu; z drugiej strony, kopanie ziemi, które

nam te szczątki odsłania, na niewielu tylko punktach ma miejsce i prawie wyłącznie w samej Europie; padto po większej części ma cel czysto tylko przemysłowy, zbywa więc przytém i na staraniach i na ostrożnościach, jakich wymaga szukanie i zachowanie w całości tych szczątków świata ustrojnego. Nakoniec, rośliny kopalne ukazują się tylko w ułomkach, podług których trudno jest oznaczyć z pewnością gatunek, rodzaj, albo nawet i rodzinę, do której roślina owa należała. Piętna kwiatowe i owocowe, służące do oznaczenia roślin żyjących, nie znajdują się prawie nigdy przy kopalnych; wypada więc domyśleć się ich niejako, w skutek tém głębszego badania piętn roślenia. Wszelako poszukiwania nowoczesne, szczególnie Adolfa Brogniarta przemogły wiele tych trudności i dały poznać znaczną liczbę roślin kopalnych z taką dokładnością, iż zdołano uszykować je w gromady, rodzaje i gatunki. Nie możemy ich tu wszystkich wymienić, jakkolwiek liczba ich nie jest zbyt wielka, i musimy przestać na opisanu samych tylko stosunków ogólnych, tak jak przy skreśleniu arytmetyki botanicznej (§ 887). Znajomość tych roślin należy pod innym względem do wykładu geologii, w którym téż wspomniano o nich mówiąc o różnych rodzajach ziemi, dołączając krótki opis i rysunki znaczniejszych gatunków. Do tego opisu i figur odsyłać będziemy w następujących paragrafach.

§ 916. Pierwsze i nieliczne jeszcze ślady owéj zaginionéj roślinności znajdujemy w pokładach przechodowych, następnie liczba ich powiększa się w pokładzie węgla kamiennego, ku którego ostatnim warstwom najwięcej ich się znajduje (Geol. § 111). Zdaje się, że przez ciąg całego tego długiego okresu, roślinność musiała uleść znacznym zmianom pod względem gatunków; w całości swéj jednakże zatrzymała też same główne piętna. Do takich piętn należy przewaga liczbowa i wysoki stopień rozwinięcia się roślin skrytopłciowych naczynnych, pomiędzy którymi napotykamy bardzo tylko szczupłą ilość morszczyń, sięgających epoki najdawniejszój; pomiędzy późniejszymi szczątkami znajdujemy z jawnopłciowych niektóre jednoliścienne; z dwuliściennych zaś same tylko gatunki należące do gromady nagoziarnowych (§ 761) to jest do sagowcowatych i szyszkowych, albo przynajmniej do rodzin, które z tamtymi musiały mieć podobieństwo. Do pierwszych zbliżają się gatunki rodzaju *Sigillaria* (Geol. fig. 191) i *Stigmaria* (Geol.

fig. 182), do drugich gatunki rodzaju *Walchia* (Geol. fig. 193) mające nieco spólnego z terażniejszymi igławami (*Araucario*). Wiele szczątków objętych pod imieniem *Calamites*, zdaje się także należeć do tej gromady; inne należą widocznie do skrzypowatych, a z tych niektóre były podówczas drzewami (Geol. fig. 187, 188) dosyć wzniosłemi, gdy tymczasem dziś rodzina tą przedstawia same tylko zioła o łodygach niskich i wątych. Toż samo można powiedzieć o widłakowatych i odkryto bowiem całe pnie rodzaju *Lepidodendron* (Geol. fig. 189 i 190), których długość wynosi około 20 metrów. Najwięcej jednakże znajdujemy w tej dawniejszej florze *paproci*, albowiem takowe stanowią same prawie połowę jęj gatunków. I pomiędzy niemi także wiele było drzew, chociaż szczątki ich znajdujemy po większej części w pasie umiarkowanym, a przeto poza obrębem, w którym rosną dziś paprocie drzewiaste. Zresztą, wszystkie ich gatunki podobne są do tych, które dziś żyją pod zwrotnikami, a nie w tym samym pasie; ztąd wnieść można, iż pas ten posiadał podówczas daleko wyższą temperaturę. Tak znaczna ilość skrytopłciowych naczynnych w stosunku do innych roślin, zdaje się mówić za tęp, iż obok dopiero wspomnianych warunków ciepła, i klimat był daleko wilgotniejszy i jednostajniejszy, a tęp samęp, że lasy musiały pokrywać nie suche i rozległe lądy, ale raczej przestrzenie poprzecinane zewsząd odnogami morskimi i mało nad poziom tychże wzniesione. Ani wątpić, że węgiel ziemny powstał z tych roślin, nagromadzonych i zamienionych podobnie, jakby się zmienić musiały warstwy naszego torfu, gdyby zostały pokryte ogromnemi pokładami istot kruszcowych, przygniecione ich ciężarem i wystawione zarazem na działanie znacznie wysokiej temperatury: zdaje się przeto, iż rzeczywiście pokłady węgla ziemnego powstały w podobny sposób jak nasze torfowiska.

§ 917. Silna ta, lubo jednostajna roślinność, znika w pokładach pokrywających węgiel ziemny, a chociaż w ziemiach powtórnych, które z kolei następują, znajdujemy rośliny kopalne, to jednak w daleko mniejszej ilości, co się chyba w ten sposób da wytłumaczyć, iż większa część tych pokładów osadzała się w morzu, a przeto rośliny jakie się na nich znajdować mogły, jeśli nawet nie niszczały zupełnie, musiały być przeniesione gdzieindziej i rozproszone w dalekie strony. Pomimo tego, niektóre punkta gdzie z wodą przybyły i gdzie się

nagromadziły owe szczątki roślinne, posiadają florę w porównaniu dość bogatą. I tak po pokładzie peneński (Geol. § 113), w którym znaleziono kilka zaledwie roślin morskich, pokład keupru (Geol. § 115) odznacza się obecnością roślin ziemnych, należących do rodzin powyżej wymienionych; pokład piaskowcu pstrego posiada prawie równą ilość skrytopłciowych naczynnych i jawnopłciowych, z pomiędzy których wspomnieć należy o licznych gatunkach jednej z szyszkowych (*Voltzia*; Geol. fig. 209); sagowcowatych nie napotykamy wcale w tym pokładzie; gdy tymczasem widzimy je znowu w wapieniu muszlowym, a więcej jeszcze w marglu tęczowatym, gdzie wynoszą około połowy całej flory (Geol. fig. 209); jestto znaczny bardzo stosunek dla rodziny, której zaledwie 30 tylko żyjących gatunków dzisiaj znamy. Stosunek ten mało się zniża w bogatszej florie układu oolitycznego pokładów jura (Geol. § 117), gdzie sagowcowate występują znowu obok szyszkowych, a paprocie wynoszą prawie połowę ogółu i gdzie się także znajduje olbrzymi jeden skrzyp (Geol. fig. 238). Ziemie powtórne kończą się pokładem kredy (Geol. § 119), w którego niższej części napotykamy jeszcze różne gatunki sagowcowatych (Geol. fig. 267), szyszkowych, skrzypowatych i paproci, lecz który oprócz tego posiada same tylko rośliny morskie i to w bardzo małej ilości. Widzimy zatem, że w całym okresie który nastąpił po formacji węgla ziemnego, a poprzedził formacją ziem trzecich, niezbyt liczne zabytki roślinności ziemnej pokazują nam przewagę skrytopłciowych naczynnych i jawnopłciowych nagoziarnowych; wzrastający ciągle stosunek tych ostatnich, a szczególnie też sagowcowatych; nieobecność wszelkiej innej rośliny jawnopłciowej dwuliścienniej i niezbyt wielką ilość jednuliściennych.


§ 918. Ogólne rysy roślinności zmieniają się zupełnie w trzecim okresie, w czasie którego osadziły się pokłady tworzące dziś grunt głównych stolic Europy, Paryża, Londynu, Wiednia. Odtąd warunki zewnętrzne zdają się dążyć do równowagi, w jakiej je dziś widzimy: stosunek albowiem wielkich gromad roślinnych do siebie, zbliża się coraz bardziej do tego, któryśmy podali w stanie teraźniejszym. I tak: dwuliścienne nagoziarnowe stanowią zaledwie już tylko  $\frac{1}{10}$  część całego ogółu roślin znanych z tego okresu, gdy tymczasem inne dwuliścienne, które dotąd nie ukazywały się wcale, wynoszą przeszło  $\frac{7}{10}$ .


jednoliścienne przeszło  $\frac{1}{6}$ , skrytopłciowe zaś naczynne zaledwie  $\frac{1}{20}$ . Powierzchnia Europy pokrytą była w tym okresie podobnie jak dziś, sosnami, jodłami, żywotnikami, brzożami, grabami, topolami, orzechami, klonami i innymi prawie takimi samymi drzewami, jakie i dziś jeszcze rosną pod naszym niebem. Musiało więc być klimat, odpowiadający pasowi umiarkowanemu z temperaturą jednak nieco wyższą, jak tego dowodzi obecność w północnej nawet Francji niektórych palm, wcale różnych od tych, które teraz utrzymują się na brzegach morza Śródziemnego, tudzież niektórych innych roślin, żyjących dziś w cieplejszych tylko krajach. Jedną jeszcze okoliczność zasługuje tu na uwagę, a tą jest, że te gatunki kopalne zdają się mieć więcej podobieństwa do dzisiejszych drzew północno-amerykańskich niżli do europejskich.

§ 919. Niniejszy rzut oka na zmiany roślinności, objawione nam przez szczątki kopalne, daje nam spostrzedz ten zajmujący wypadek, że postęp ów od prostego do bardziej złożonego, który układ przyrodzony przechodząc od roślin bezliściennych do opatrzonych liśćmi, od dwuliściennych nagoziarnowych do okrytoziarnowych, wyprowadzić usiłował, — że postęp ów, urzeczywistnia się w ogóle w kolejnym ukazywaniu się roślin na kuli ziemskiej.

The first part of the book is devoted to a general history of the  
 world, from the beginning of time to the present day. The author  
 begins with the creation of the world, and proceeds to describe the  
 progress of human civilization, from the earliest ages to the  
 present. He discusses the various empires and nations that have  
 risen and fallen, and the changes that have taken place in the  
 world. The second part of the book is devoted to a history of the  
 British Empire, from its origin to the present day. The author  
 describes the growth of the empire, and the various wars and  
 events that have shaped its history. The third part of the book is  
 devoted to a history of the world, from the beginning of time to  
 the present day. The author discusses the various empires and  
 nations that have risen and fallen, and the changes that have  
 taken place in the world. The fourth part of the book is devoted  
 to a history of the British Empire, from its origin to the present  
 day. The author describes the growth of the empire, and the  
 various wars and events that have shaped its history.

The fifth part of the book is devoted to a history of the world,  
 from the beginning of time to the present day. The author  
 discusses the various empires and nations that have risen and  
 fallen, and the changes that have taken place in the world. The  
 sixth part of the book is devoted to a history of the British  
 Empire, from its origin to the present day. The author describes  
 the growth of the empire, and the various wars and events that  
 have shaped its history. The seventh part of the book is devoted  
 to a history of the world, from the beginning of time to the  
 present day. The author discusses the various empires and nations  
 that have risen and fallen, and the changes that have taken  
 place in the world. The eighth part of the book is devoted to a  
 history of the British Empire, from its origin to the present day.  
 The author describes the growth of the empire, and the various  
 wars and events that have shaped its history.






Biblioteka Jagiellońska



std:0031252





A.D.W.



A. de Jussieu

**BOTANIK A**

