



1002712976

SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI SĄDOWO-LEKARSKICH

WYKONANYCH W CIĄGU ROKU 1863.

przez

Dra Stanisława JANIKOWSKIEGO.

43854
J

Odsyłając czytelnika pod względem ogólnych uwag o czynnościach sądowo-lekarskich w m. st. Warszawie do pierwszego mego artykułu, ogłoszonego w r. 1864. w Pamiętniku Towarzystwa lekarskiego Warszawskiego (1), przystępuję wprost do szczegółów tego drugiego z kolei sprawozdania.

Ogólna liczba dochodzeń sądowo-lekarskich

wykonanych przezemnie w ciągu r. 1863. była następująca:

I	Dochodzenia na osobach żyjących	17
II.	— na zwłokach osób dorosłych . . .	47
III.	— na zwłok. płodów i noworodków	10
	Razem	74

I. DOCHODZENIA NA OSOBACH ŻYJĄCYCH.

a)	Dochodzenia stanu zdrowia	2
b)	Dochożenia uszkodzeń ciała	14
c)	Dochożenia wieku	1
	Razem	17

a) W dwóch dochodzeniach stanu zdrowia szło o oznaczenie, czy choroba gorączkowa (raz zapalenie płuc, drugi raz gorączka tyfoidalna) nie zależała od uszkodzeń ciała; w obu razach związek taki nie dał się wykryć.

(1) Sprawozdanie z czynności sądowo-lekarskich wykonanych od dnia 19. listopada 1861. r. do dnia 31. grudnia 1862. r. (Pam. Tow. lek. Warsz. t. LI, str. 321; t. LII, str. 60 i 183).

b) Uszkodzenia ciała, a mianowicie:

aa) *Potłuczenia* trzy przypadki, które nie przedstawiały nic godnego szczególniej wzmianki.

bb) *Ran ciętych* było 6 przypadków, których jeden dla przykładu przytoczę.

Mateusz Janaszek, lat 54 liczący, miał po lewej stronie szyi, w kącie między mięśniami kapturowym a obojczykiem ranę o brzegach nierównych, kształtu podłużnego, 2" długości, 1/2" szerokości mającą, wnikającą w mięśnie tej okolicy, wypełnioną dobrymi brodawkami. Skarżył się na drętwienie i ból w okolicy łokcia lewego. Zresztą stan ogólny zadawałający.

Zdanie było, iż rana na szyi zadana była prawdopodobnie ostrym narzędziem i wymaga jeszcze parę tygodni czasu do zupełnego wygojenia, po którym jednak może być, iż pozostaną w następstwie bole w ramieniu, lub łokciu lewym. (Protok. nr. 49).

cc) *Ran zadanych bagnetem* były dwa przypadki, z których jeden szczegółowo opiszę. (Protok. nr. 35).

Przedmiotem dochodzenia był Onufry M., rymarz z Wiązowny, lat 42 liczący, u którego przy bliższem śledzeniu znalazłem, co następuje:

1) Na piersiach na prawo od mostka blisko przyczepienia chrząstki 6go żebra w skórze otwór ukośnie idący, przeszło 1 cal długości mający, o brzegach gładkich, postać niskiego trójkąta przedstawiających. Od rany tej ciągnie się ukośnie ku lewej stronie na mostku smuga skóry zaczerwieniona, nabrzmiała, w dotknięciu bolesna, pod którą głębiej czuć chębotanie płynu i takowy, to jest ropa, za naciskiem wypływa po lewej stronie mostka z otworu blisko cal długości mającego, o brzegach gładkich, któryto otwór, według słów obecnego na wizycie lekarza oddziału, dnia poprzedniego on sam (lekarz) uskutecznił w celu ułatwienia odpływu ropy.

2) Po lewej stronie, w okolicy przedniego końca 9go i 10go żebra znajduje się w skórze otwór blisko 1 cal długości mający, o brzegach gładkich, kształtu niskiego trójkąta, w okolicy którego znać nabrzmienie, zaczerwienienie i ból w dotknięciu na przestrzeni 1 1/2 cala.

Tętno 84. Chory uskarża się na kłócie w obu bokach i na suchy kaszel. Przysłuch okazuje w prawej klatce piersiowej w dolnej części oddech pęcherzykowy słaby.

Zdanie było: M. O. uległ przed kilkunastą dniami dwukrotnemu zranieniu klatki piersiowej narzędziem ostrem, z kształtu rany wnosząc, najprawdopodobniej bagnetem, i do zupełnego wyleczenia potrzeba przynajmniej kilku tygodni.

dd) Uszkodzenia powstałe z przejechania były dwa razy przedmiotem śledzenia na osobie żyjącej.

ee) Wreszcie raz jeden *wstrząśnienie rdzenia kręgowego* wskutek upadku z wysokości.

II. DOCHODZENIA NA ZWŁOKACH OSÓB DOROSŁYCH.

a. Samobójstwo przez powieszenie	1
b. Samobójstwo przez poderżnięcie gardła	1
c. Zaczadzenie	1
d. Zasypanie piaskiem	1
e. Spadnięcie z wysokości	7
f. Przejechanie wozem	5
g. Chłosta	1
h. Uszkodzenie samej czaszki	3
i. Uszkodzenie klatki piersiowej	2
k. Upust krwi nieumiejętny	1
l. Różne inne uszkodzenia	4
m. Śmierć z rozmaitych chorób wewnętrznych	20
Razem	47

Ponieważ dochodzenia z powodu samobójstwa nie są u nas częste, więc oba przypadki szczegółowo przytoczę.

a) *Samobójstwo przez powieszenie.* Przedmiotem dochodzenia były zwłoki woziwody lat około 35 wieku liczącego, który, jak żona jego zeznała, już od roku niechętnie się brał do pracy, próżnował, dziwaczył i stronił od ludzi.

I. DOCHODZENIE ZEWNĘTRZNE.

1. Zwłoki denata, które znaleźliśmy w komórce wiszące w ten sposób, że stopy o 9 cali od ziemi były oddalone, są zwłokami mężczyzny wzrostu dobrego, około 35 lat wieku mieć mogącego, dobrze odżywianego. Tuż obok stała drabina.

2. Stężenie trupie jeszcze istnieje.
3. Powierzchnia skóry blada z wyjątkiem kończyn dolnych, które przedstawiają jednostajną barwę siną, za nacięciem okazującą się jako pośmiertne plamy.
4. Wyraz twarzy spokojny, usta zamknięte.
5. Na szyi znajduje się powróż około $\frac{3}{4}$ " średnicy mający, mocno zaciśnięty, w postaci pętli pojedynczej, której uszko po prawej stronie szyi się znajduje. Powróż przechodzi tuż nad krtanią, całkiem poziomo naokoło szyi, tworząc naokoło téjże ze wszystkich stron wgłębienie części miękkich około 1 cala głębokie, odbijające w zupełności kształt powroza; skóra w tém kolistém wgłębieniu jest blada i zresztą niczem się od pozostałej nie odróżnia.
6. Żołądź praćca zwilżona płynem lepkiem, podobnie jak i odpowiednia przednia część koszuli.
7. Zresztą powierzchnia ciała nie przedstawiała nic uderzającego, ani żadnych śladów obrażeń zewnętrznych.

II. DOCHODZENIE WEWNĘTRZNE.

A. JAMA CZASZKOWA.

8. Kości i powłoki miękkie nigdzie nie uszkodzone, w krew' miernie obfite.
9. Naczynia żyłne opon mózgowych tak zewnętrznych, jak wewnętrznych, przepełnione krwią ciemną płynną, podobnież zatoki mózgowie, zwłaszcza u podstawy mózgu, i splety naczyniowe. Opony wewnętrzne zamglone, w przestworach podpajęcznych nagromadzona mierna ilość płynu przezroczystego.
10. Miąższ mózgowy mierną ilość krwi zawierający, jedrny.

B. SZYJA.

11. W tkance podskórnej i w mięśniach szyi pod wgłębieniem powyżej pod nr. 5 opisaném znajdują się tylko wgniecenia, ale bez żadnych wylań krwi.
12. Również kręgi szyjowe nigdzie nie uszkodzone.
13. Kość gnykowa i chrząstki krtani nie uszkodzone.

W jamie krtani i tchawicy błona śluzowa blada, małą ilością śluzu pokryta.

C. JAMA PIERSIOWA.

14. Płuco prawe tkanką łączną do żeber lekko przyrosłe, oba płuca na przecięciu trzeszczą i wydają małą ilość krwi ciemnej płynnej.

15. Serce w prawej połowie, równie jak wielkie naczynia, zawierają znaczną ilość krwi ciemnej płynnej.

D. JAMA BRZUSZNA.

16. Trzewa tej jamy, mierną ilość krwi ciemnej płynnej zawierające, nie przedstawiały zresztą nic szczególnej wzmianki godnego.

ZDANIE.

Na zasadzie powyższego oglądu jestem zdania:

1) że przyczyną śmierci denata było przerwane oddychanie wskutek powieszenia i wynikającego ztąd zaciśnienia szyi; 2) że wyniki dochodzenia pośmiertnego nie przedstawiają nic takiego, coby przemawiało przeciw samobójstwu; 3) że to, co wdowa denata w protokóle zeznała o zachowaniu się tegoż w ostatnich miesiącach jego życia, wnioskować każe, iż tenże cierpiał na obłąkanie umysłu, a mianowicie melancholią, (z czém się zgadzają zamglenia opon wewnętrznych mózgowych i wysięk surowicy w przestworach podpajęcznych); 4) że przeto denat według wszelkiego prawdopodobieństwa sam sobie życie odebrał pod wpływem obłąkania umysłu.

c) Przypadek *sanobójstwa przez poderznięcie gardła* również szczegółowo przytaczam. (Protok. nr. 73 a.).

Nowakowski Józef, lokaj, lat 50 wieku liczący, od czasu wyjścia z Domu Badań, to jest od 5ciu kwartałów, nie mógł znaleźć służby (akta k. 10); przez ten czas zawsze był ponury, z nikim nie przestawał (15. 26 odwr.) i nałogowo oddawał się pijaństwu (k. 3. 10. 15. 17. 19. 22 odwr. 24 odw. 25. 26 odwr.), wskutek czego często bywał nieprzytomny (k. 17.), albo według wyrażenia świadków „cierpiał na pomieszanie zmysłów chwilowe“ (k. 3 odwr.), częstokroć dostawał nieja-

kiego pomieszania zmysłów (k. 22 odwr.), a jeden z nich się wyraził, że „J. N. z żoną swoją najgorzej się obchodził i bił ją często“ (k. 15. 17. 19. 24 odwr. 25).

Dnia 12. listopada r. 1863. po południu, będąc pijany, przewrócił żonę na łóżku, począł ją dusić, tak, że jej wargę na wewnętrznej powierzchni skrwawił (k. 10. 4.), Raczkowskiego zaś, jej krewnego, do którego Nowakowska się schroniła, ranił narzędziem ostrym, gdy tenże R. usiłował go za drzwi wyrzucić (k. 4. 6. 23. 24). Nowakowski był wówczas czerwony, wyraz twarzy jego miał coś dzikiego, obłąkanego, a uderzając Raczkowskiego, wydał okrzyk przeraźliwy: „kiedy tak, to tak“ (k. 11. 23 odwr. 24).

Wtedy Nowakowski pobiegł do swego mieszkania, które potem przywołana policya znalazła zamknięte na klamkę w ten sposób, że rączka klamki na zewnątrz wyjęta leżała w stancyi na stole i klucz w zamku (nie zamkniętym) znajdował się ze strony mieszkania (k. 13. 20. 21 odw.), a według jednego świadka drzwi wewnątrz na haczyk były zamknięte (k. 18). Za otwarciem drzwi wybiegł kot ze stancyi (k. 14. 16. 20 odw. 22). Na ziemi leżały wyciągnięte zwłoki Nowakowskiego, *koszula na nim około szyi była mocno skrwawiona, ale nie podarta*, na około na podłodze znaczna ilość krwi przykrzepłej. Na stole przy łóżku leżała *brzytwa otworzona, równie jak futerał i pasek krwią zaschniętą mocno powalane*. O parę kroków dalej stała komoda i na niej lusterko; papier obiciowy pokrywający tę komodę i podłoga przed nią były również krwią zeschniętą poplamione (k. 7).

Przy dochodzeniu sądowo-lek. dokonaniem przeze mnie dnia 16. listopada znalazłem zwłoki mężczyzny silnie zbudowanego, około 50 lat liczącego (N. 1), okazujące już dość znacznie posunięty stopień zgnilizny, a mianowicie skóra na całej powierzchni ciała przedstawia tak na tylnej, jak na przedniej powierzchni ciała rozległe plamy sine, które za nacięciem okazują się pośmiertnymi, równie jak plamy ciemniejsze przebiegiem swoim odpowiadające przebiegowi żył zaskórnych. Na brzuchu, który jest wzdęty, widać rozległe plamy zielone, od zgnilizny pochodzące.

W okolicy brwi lewej znajduje się zasinienie skóry i zeschnięcie téjże pargaminowe brunatne, wielkości 5-groszowki, pod którym w tkance skóry i podskórnej znajduje się wylanie krwi płynnej, czego w odpowiedniej okolicy strony przeciwnej nie znaleziono.

W okolicy ucha prawego brak jest całkiem muszli usznej i w jej miejscu tuż przy głowie znajduje się rana gładka bez znacznego wylania krwi.

Na lewej połowie szyi rana ukośna przebiegająca od tyłu, to jest od przedniego brzegu mięśnia sutko-mostkowego, *ku dołowi i ku przodowi* aż do punktu tuż nad górnym wcięciem chrząstki tarczowej położonego. Rana ta ma przeszło 5 cali długości i około $\frac{3}{4}$ cala szerokości. Brzegi jej są gładkie, krwią skrzeplą obficie powalane. Przedni i tylny koniec téjże są równe sobie. W głębi przy bliższem preparowaniu znaleziono tętnicę i żyły szyjowe téj strony przecięte, a z przecięć żył występowała krew na wpół skrzeplą.

Dwa małe tarcia skóry pargaminowo zeschniętej na obu kolanach.

Powłoki miękkie i opony mózgowe przedstawiały przesiąknięcie pośmiertne płynem czerwono-brunatnym (N. 9. 10), prócz tego opony wewnętrzne były zamglone w skutek zgrubień (N. 10). Płuca na rozkroju wydawały obfity płyn brudny pienisty (N. 11). Serce było wielkie, wiotkie, tłuszczem obficie pokryte (N. 12). Wątroba częściowo stłuszczona (N. 13).

Zdanie w tym przypadku wydałem następujące:

Z uwagi na okoliczności, które śmierć denata poprzedziły;

z uwagi na to, że był nałogowym pijakiem (zeznania świadków i zmiany opon mózgowych, serca, wątroby) i cierpiał prawdopodobnie na obłąd opilczy (akta);

z uwagi wreszcie na wyniki dochodzenia pośmiertnego, a w szczególności na kształt i kierunek rany, jestem zdania:

1) że J. N. zmarł wskutek krwotoku z przeciętych głównych naczyń krwionośnych na szyi;

2) że sam sobie życie odebrał przez poderznięcie szyi brzytwą, prawdopodobnie w stanie obłądu opilczego;

3) co się tyczy braku ucha, ten mógł być skutkiem odgryzienia tegoż po śmierci przez kota;

4) starcia skóry na brwi lewej i na obu kolanach powstały zapewne przy upadnięciu samobójcy na ziemię.

c) Pomiędzy 7 uszkodzeniami śmiertelnymi powstałymi wskutek spadnięcia z wysokości (najczęściej z rusztowań przy budowie domów) były 4 przypadki pęknięcia czaszki, 1 przypadek pęknięcia serca, 1 złamania żeber i goleni, wreszcie jeden pęknięcia wątroby i śledziony. Niektóre z tych przypadków szczegółowo opiszę.

aa) *Spadnięcie z wysokości, śmierć z pęknięcia czaszki.* (Protok. nr. 25).

Przedmiotem dochodzenia były zwłoki kobiety około 40 lat liczącej, silnie zbudowanej, dobrze odżywionej; włosy były pyłem zavalane.

Z ucha prawego, obficie krwią zwalanego, wyciekła krew ciemna płynna. Około otworów nosowych skóra była krwią zakrzepłą zwalana. W obu przegubach łokciowych rany od świeżego upustu krwi. Na zewnętrznej i tylnej powierzchni prawego uda rozległe siniaki, pod którymi tkanka skóry i podskórna przedstawiały wylania krwi półpłynnej. Skóra na tej powierzchni miała smugowate zdrapania.

Czaszka Po oddzieleniu powłok miękkich z czaszki przekonano się, że cała okolica tyłogłowa zajęta była 3ma rozległymi wylaniami krwi na wpół skrzepłej w skórze i mięśniach, z którychto wylań średnie miało 1" długości, 2" szerokości, boczne zaś majace po 3" dług., a po 2" szerok., zachodziły każde w okolice skroniową odnośnej strony. Odpiłowane kości sklepienia czaszki mają do 3" grubości i nigdzie nie są uszkodzone. Po odjęciu opony twardej znaleziono na powierzchni opon wewnętrznych na obu półkulach cienką warstwę krwi ciemnej na wpół skrzepłej, szczególnie w miejscach odpowiadających brózdom. Na lewej stronie podstawy czaszki opona twarda jamy przedniej, a szczególniej średniej, pokryte są na parę linii grubości krwią ciemną skrzepłą. Część koro-wa odpowiednich dwóch płatów mózgu jest pognieciona, rozmiękczona, miąższ nakrapiany wylaniami krwi wielkości łep-

ków szpilki. Z resztą miąższ mózgowy jest twardości i barwy zwykłej; w jamach mózgowych nic uderzającego. Po oddaleniu opony twardej kości podstawy czaszki przedstawiają po obu stronach rozstąpienie się szwu obrębkowego, które się przedłuża w pęknięcie o brzegach nieco krętych kości skroniowych obu stron, idące poprzecznie symetrycznie po obu stronach wzdłuż brzegu przedniego zewnętrznego części skalistej i łączące się w środku pęknięciem poziomym o brzegach gładkich, równych, stoku Blumenbacha w odległości 1 cala od siódła tureckiego. Od pęknięcia kości skroniowej prawej rozchodzi się poboczne jeszcze pęknięcie ściany górnej oczodołu.

Klatka piersiowa. Oba płuca mało krwi zawierają, na przecięciu wydają płyn białawy pianisty. Serce próżne, zresztą prawidłowe.

Narzędzia jamy brzusznej nie przedstawiały nic szczególniej wzmianki godnego.

Zdanie było, że denatka zmarła wskutek pęknięcia kości podstawy czaszki i wylania krwi w tej jamie, przyczyną zaś tych uszkodzeń mogło być spadnięcie z wysokości.

bb) Pęknięcie serca wskutek wstrząśnienia. (Protok. nr. 78).

Młynarz, około 35 lat liczący, przy dźwiganiu kamienia młyńskiego z pomocą innych ludzi, padł był tyłem w dół wysokości mężczyzny dorosłego i nagle zmarł. Przy dochodzeniu pośmiertnym okazały się: zwłoki mężczyzny wzrostu miernego, silnie zbudowanego, mięsistego. Powierzchnia skóry biała, na grzbiecie plamy sine blade, które za nacięciem okazały się pośmiertnymi. Twarz biała, usta blade. W okolicy grzebienia prawej łopatki znajduje się siniak około 1 cala długości mający, pod którym za nacięciem okazuje się w skórze i tkance podskórnej wylanie krwi skrzepłej. Zresztą powierzchnia ciała nie przedstawiała żadnych zmian uderzających ani też śladów obrażeń zewnętrznych.

Powłoki miękkie i kości czaszkowe w krew' obfite, nigdzie nie uszkodzone. Opony mózgowie w drobnych swych naczyniach krwią nastrykane, zresztą prawidłowe. Miąższ

mózgu na rozkroju wydaje obfite kropki krwawe, które po spłókanu napowrót występują.

Za otwarciem klatki piersiowej uderzył w oczy *wypuklająca się worek osierdzia*, w którym czuć było chełbotanie; za otwarciem osierdzia znaleziono w niem znaczną ilość krwi płynnej wiśniowej, w której pływały wątki skrzepy krwawe. Przy bliższem obejrzeniu serca spostrzeżono na przedniej powierzchni lewej komórki *pęknięcie* tegoż przebiegające równoległe z brzegiem zewnętrznym komórki prawej i mające na tej przedniej powierzchni 1 cal długości. Pęknięcie to w tym samym kierunku i tej samej długości przedłużało się na tylnej powierzchni komórki lewej, miało *brzeży nieregularne, podarte, krwią płynną nasiąkłe* i w całej swój długości aż do jamy komórki drążące. Za otwarciem lewego serca błona wyściełająca je okazała się niejednostajnie zamglona, *jakby nalotem błękitnawym powleczone*, zresztą gładka. Nalot ów najwyraźniejszy było w dolnej części komórki lewej. W prawej połowie serca, którego błona wewnętrzna nie przedstawiała nic szczególnego, znajduje się krew' płynna.

Płuca, w dotknięciu sprężyste, na rozkroju wydają obfitą ilość płynu pianistego.

Trzewa jamy brzusznej nie przedstawiały żadnych zmian chorobnych.

Zdanie było téj treści: że denat zmarł śmiercią nagłą wskutek pęknięcia serca, którego przyczyną było prawdopodobnie wstrząśnienie przy upadnięciu z pewnej wysokości; a usposobienie do tego nosił denat w sobie wskutek przebytej choroby, to jest zapalenia wsierdzia (*endocarditis*).

d) Pomiedzy 5 przypadkami śmierci gwałtownej w skutek przejechania wozem i t. p. dwa razy było zgniecenie klatki piersiowej z połamaniem żeber i rozdarciem opłucnej żebrowej i płuc ostremi odłamkami żeber, pochodzącém ztąd wylaniem krwi w jamach opłucnych i t. d.; raz zgruchotanie stosu kręgowego w okolicy 8. i 9. kręgu grzbietowego (w skutek przejechania omnibusem); raz złamania kończyn dolnych, które pociągnęły za sobą odjęcie kończyny, zgorzel rany amputacyjnej, ogólne wycieńczenie i śmierć; wreszcie raz

przejechanie wagonem drogi żelaznej. (Protok. nr. 65). W tym ostatnim przypadku zwłoki wychudłe mężczyzny około 40 lat liczącego miały skórę całkiem bladą, jakby woskową; plamy pośmiertne na grzbiecie bardzo nieznaczne. Kończyna dolna prawa pozbawiona była całkiem goleni. Przednia i zewnętrzna powierzchnia uda prawego w dolnej części pozbawiona była skóry na powierzchni odgraniczonej ku górze linią niemal całkiem prostą, idąca od punktu 4" poniżej krętarza wielkiego (*trochant. maj.*) do punktu 7" poniżej spojenia łonowego położonego. U dołu w bliskości odsłoniętego całkiem końca stawowego kości udowej części miękkie nieregularnie poszarpane. Skóra powyżej owiej linii przedstawiała barwę siną i była w znacznej części oddarta od części miękkich pod nią położonych. Na tylnej i po części na zewnętrznej powierzchni uda prawego skóra była nieregularnie poszarpana i pooddzierana od części miękkich pod nią położonych, które tak była zmiażdżone, że zaledwie niektóre mięśnie rozpoznać się dały. — Z d a n i e było: że denat zmarł w skutek krwotoku i wstrząśnienia układu nerwowego, będących następstwem nader silnego gwałtu mechanicznego, który sprawił oderwanie goleni i zmiażdżenie części miękkich uda; tym zaś gwałtem mogło być przejechanie wagonu. (Ze śledztwa sądowego okazało się, że było stróż stacyi głównej Drogi żel. W. W., który, wskakując na stopień wagonu podczas kiedy jeszcze pociąg był w ruchu, przez obsuniecie się nogi wpadł pod koła).

e) Śmierć z chłosty raz się zdarzyła; przypadek ten, jako w naszych czasach do osobliwości należący, szczegółowo przytaczam. (Protok. nr. 86).

Przedmiotem dochodzenia były zwłoki mężczyzny wzrostu średniego, 40 kilka lat wieku mieć mogącego, (z imienia i nazwiska nieznanego). Stężenie trupie z kończyn górnych już ustąpiło. Usta sine nabrzmiałe. Na brzuchu po lewej stronie tuż poniżej ostatnich żeber znajduje się pionowo przebiegająca pręga, pargaminowo zeschnięta, parę linii szeroka, 2 cale długa, pod którą lekkie wylanie krwi w skórze. Cały grzbiet i pośladki przedstawiają jednostajną siność, która za nacięciem skóry okazuje się pośmiertną; na tém zaś tle *skóra*

grzbietu zasiana jest mnóstwem małych pręg, w różnych kierunkach przebiegających, mających po $\frac{1}{2}$ cala i mniej długości, przedstawiających pozór zdrapań skóry z powierzchownemi skrzepami krwi wynaczynionój i pargaminowemi brunatnemi zeschnięciami skóry; w miejscach tych i za nacięciem w mięszu skóry znajdują się małe wynaczynienia krwi skrzepłej. Zresztą powierzchnia ciała nie przedstawia zmian godnych uwagi.

Powłoki miękkie i kości czaszkowe w krew' obfite, nigdzie nie uszkodzone. Opony mózgowe twarde i wewnętrzne w naczyniach swych żylnych przepełnione krwią ciemną. Opony wewnętrzne zamglone; w przestworach podpajęcznych płyn surowiczy mętnawy. Mięsz mózgu jędrny, na rozkroju obfite kropki krwi ciemnej.

Oba płuca w dotknięciu puchowate, na rozkroju wydają znaczną ilość płynu pianistego czerwono zabarwionego. Serce wielkie, zwłaszcza lewa połowa w rozmiarach powiększona i ściany zgrubiałe. Prawa połowa przepełniona krwią ciemną na wpół skrzepłą.

Wątroba wielka, zraz prawy na rozkroju ma pozór muszkatołowaty, lewy zaś tak na powierzchni, jak na rozkroju, ma barwę jednostajną blado żółtą i na ostrzu noża pozostawia nalot tłusty. Śledziona mała, powłoka jęj pomarszczona, mięsz rozptywający się. Żołądek zawiera małą ilość papki pokarmowój szarawej; błona śluzowa ciemna, zgrubiała, grubym pokładem śluzu pokryta, po splókaniu którego okazuje się wyraźne nastrzykanie i rozwinięcie naczyń drobniejszych. Kiszki tak grube, jak cienkie, zawierają kał żółty, płynny. Błona śluzowa szarawa, zgrubiała. Nerki obficie krew' zawierają.

Mięśnie grzbietowe przy ich oddzielaniu nie przedstawiały zmian uderzających. Po otworzeniu stosu kręgowego, okazało się, że spłoty żyłne tegoż stosu znacznie były przepełnione krwią ciemną. Opona twarda rdzenia kręgowego nie okazywała nic szczególnego. Opony wewnętrzne rdzenia przedstawiały wyraźne nastrzykanie drobnych naczyń, szczególnie w części grzbietowój. Mięsz rdzenia nie przedstawiał zmian uderzających.

Zdanie było: 1) że denat uległ pobiciu grzbietu, prawdopodobnie chłości; 2) że przyczyną śmierci były przekrwienia mózgu i jego opon, stosu kręgowego i opon wewnętrznych rdzenia, wręście płuc, któreto przekrwienia, zwłaszcza przy rozroście serca, na który denat cierpiał, łatwo z rzezonój chłósty wyniknąć mogły.

/) Z pomiędzy uszkodzeń głowy zasługuje na uwagę następujący przypadek. (Protok. nr. 69).

W dniu 25. października 1863. r. wszczęła się przy gotowaniu objadu kłótnia między Bogumiłą Patasiak lat 38, a Maryanną Dębińską lat 40 liczącą, wyrobnicami razem mieszkającymi, podówczas pijanemi. W kłótni téj najprzód Dębińska Patasiakową tłukła pięściami po twarzy (akta k. 9), potem zaś Patasiakowa, porwawszy garnek drutowany, uderzyła nim Dębińską (9 v., 10., 11 v., 12.), poczem krew' mocno bryzgała z głowy Dębińskiej. (k. 10).

Dnia tegoż Dębińska odwieziona została do szpitalu Dziec. Jezus, do którego téż przybyła Bogumiła Patasiak; ta ostatnia w tydzień potem, uleczona, wypisała się ze szpitalu (k. 15).

Dębińska w dniu przybycia do szpitalu miała silne stłuczenie okolicy oka prawego ze znaczną nabrzękłością obu powiek, dwie rany dość głębokie policzka prawego i dwie rany powierzchowne na głowie. (k. 1. 4).

Przy obdukcji sporządzonej w tydzień potem (dnia 2. listopada) znalazłem całą górną powiekę oka prawego owrzodzoną, również całą niemal powierzchnią nosa. Na prawym policzku widać było dwie rany po 1 calu długości mające, pod kątem prostym spotykające się, o brzegach nierównych, po części już z sobą zlepionych istotą skrzepłą. W prawej okolicy ciemieniowej skóra przedstawiała ranę około 1 cala długości mającą, strupem wązkim pokrytą i w lewej okolicy ciemieniowej podobną ranę nieco krótszą. Cała twarz była nabrzmiąta, czerwona, w stanie zapalenia różowatego skóry. Tętno 120 na minutę, drobne, nieregularne. Żrenice zwężone. Chora była w stanie zupełnej bezprzytomności. (k. 14).

W trzy dni potem Dębińska zmarła (k. 16).

Przy dochodzeniu sądowo-lekarskiem pośmiertném dokonaniem przeze mnie w dniu 7. listopada (k. 18. 19) znalazłem skórę w ogóle żółtą (N. 2). Powierzchnie za życia owrzodzone pokryte były strupami (N. 7. 8). Skóra na twarzy była pomarszczona, miejscami wata przyschniętą pokryta (N. 6). Oprócz ran głowy i twarzy przy obdukcji opisanych (N. 4. 5. 12.), okazały się jeszcze drobniejsze rany cięte na nosie (N. 9.), skroni (N. 10), przed uchem (N. 11) i na wardze (N. 13), tudzież siniak na ramieniu (N. 14), któreto obrzmienia przy obdukcji z powodu nader niebezpiecznego stanu chorób nie mogły być dokładnie zbadane (N. 15).

Przy dochodzeniu wewn. okazało się jeszcze na wierzchołku głowy wylanie krwi w powłokach skórnych czaszki na powierzchni wielkości 5-złotówki (N. 16); miąższ mózgu i opony mózgowe, zwłaszcza wewnętrzne, przekrwione, w drobnych naczyniach krwią jasną natrzykane (N. 17. 18.), w przestworach podpajęcznych obfita ilość surowicy (N. 17), oba płuca w tylnych częściach nie syczały przy przecinaniu i wydawały tylko płyn brunatnawy prawie wcale nie pienisty (N. 19). W trzewach brzusznych nie było nic szczególnój wzmianki godnego.

Zdanie było następujące: „Przyczyną śmierci najbliższą Dębińskiej było zapalenie różowate skóry twarzy (*erysipelas faciei*), które pociągnęło za sobą przekrwienie mózgu i opon mózgowych i wysięk surowicy w tych ostatnich, tudzież zastoinę w płucach (*hypostasis pulmonum*). Zapalenia różowego powodem w tym przypadku były uszkodzenia części miękkich twarzy i głowy, zadane prawdopodobnie ciałem na w pół ostrém, jakim są np. skorupy garnka. Wreszcie czuję się w obowiązku nadmienić, że Dębińska mogła być usposobioną do takiego zapalenia różowego twarzy stanem opojenia i uniesienia się gniewem, w którym się znajdowała w chwili zadania jej wspomnianych uszkodzeń.“

g) Rana klatki piersiowej nożem siodlarskim zadana, śmierć z krwotoku. (Protok. nr. 41 i 61).

Dnia 27. czerwca 1863. r. między godziną 12. a 1. z południa Karól M. terminator rymarski, lat 16 liczący, będąc z powodu nieusłuchania uderzony w głowę przez czeladnika

Pawła K., lat 19 liczącego, z popędliwości i gniewu pchnął tego ostatniego w piersi nożem ostrym rymarskim, który właśnie trzymał w ręku dla obcinania szpagatu (k. 16. 18. 19.) Paweł K. powieziony do szpitalu Dziec. Jezus zakończył życie o godzinie 4tėj po południu tegoż dnia. (k. 12).

Dochodzenie zwłok sądowo-lekarskie dokonane przeze mnie dnia 29. czerwca (k. 13. 14. 15) wykryło bladeść powierzchni ciała (N. 3), w lewėj okolicy podobojczykowej ranę o brzegach gładkich, 2½ cala długości mającą, przenikającą chrząstki żebra 1. i 2go, tudzież wielkie naczynia podobojczykowe, zwłaszcza żyłę tėj strony (N. 4. 7. 8.); w jamie lewėj opłucnej kilka funtów krwi ciemnej płynnej (N. 9); serce w obu połowach próżne (N. 11); wreszcie inne trzewa jam blade i niedokrwiste (N. 10. 12).

Na zasadzie tego wyraziłem zdanie, że Paweł K. zmarł z krwotoku wewnętrznego z naczyń podobojczykowych lewych, którego przyczyną była rana w tę okolicę piersi narzędziem ostrém zadana.

h) Śmierć w skutek rany sztyletowej drążącėj do serca i wątroby. (Protok. nr. 12). Przypadek ten dla swėj ważności zasługuje na szczególne przytoczenie.

Przedmiotem dochodzenia były zwłoki N. J., którego w dniu 24. marca 1863. r. znaleziono między godziną 11. a 12. z rana zamordowanym nad Wisłą. Tegoż dnia o godzinie 4tėj dokonano na miejscu obejrzenia zewnętrznego (trup leżał na wznak, z rękami rozkrzyżowanemi, obok leżał sztylet o ostrzu około 1½ cala szerokości mającém, prostėj roboty, krwią zboczony); sekcyą zaś wykonano dnia następnego o godzinie 11stėj z rana w grabarni szpitalu Dziec. Jezus, przyczém okazało się, co następuje:

I. DOCHODZENIE ZEWNĘTRZNE.

1. Na stole sekcyjnym złożone zwłoki mężczyzny wzrostu średniego, około 30 lat wieku mieć mogącego, odziane były w szalik biały wełniany w lewėj swėj połowie zupełnie krwią zboczony, w surdud futrem podszyty, koszulę, spodnie, gacie i buty. W surducie i koszuli na lewėj połowie klatki piersio-

wój znajduje się otwór przecięty przeszło $1\frac{1}{2}$ cala długości mający, idący ukośnie od góry i zewnątrz na dół i na wewnątrz, odpowiadający zupełnie wielkością i kierunkiem ranie klatki piersiowej poniżej opisać się mającej. Koszula cała była krwią już zeschniętą zwalana, jakby we krwi zmoczona; podobnie na futrze surduta znać rozległe ślady zbroczenia krwią.

2. Tuż nad prawym uchem znajduje się rana o brzegach gładkich, małą ilością krwi skrzepłej pokrytych, pozioma, mająca $1\frac{1}{2}$ cala długości, przenikająca wszystkie części miękkie, bez naruszenia kości; włosy na głowie na około krwią skrzepłą sklezione.

3. Nos zakłębnięty, mały, bezkształtny, lecz w skutek dawniejszej wady, czy też choroby.

4. Na prawym policzku mała ranka, $\frac{1}{4}$ cala długości mająca, nie przenikająca w zupełności skóry, o brzegach gładkich.

5. Na przedniej powierzchni lewej połowy klatki piersiowej w 5ym przestworze międzyżebrowym trochę na prawo od spojenia chrząstki żebrowej z kością znajduje się otwór w klatce piersiowej, o brzegach całkiem gładkich ukośnie z góry i strony zewnętrznej na dół i ku linii środkowej idący, przeszło $1\frac{1}{2}$ cala długości mający, drążący w głąb, na dół i na prawo. Z otworu tego przy przewracaniu ciała wypływa obficie krew płynna, ciemna.

6. Na prawym przedramieniu tuż nad stawem ręki na powierzchni przodkowej znajduje się rana pozioma, o brzegach gładkich, 2 cale długości mająca, przenikająca tylko skórę i powięź.

7. Na grzbiecie palca wskazującego prawej ręki znajduje się rana o brzegach gładkich, krwią skrzepłą pokrytych, drążąca do jamy stawu między 1szym a 2gim członkiem palca.

8. Na drugim członku średniego palca tejże ręki rana podobna, pozioma, przenikająca tylko do kości, a na palcu obrączkowym tejże ręki podobna rana, tylko jeszcze powierzchowniejsza; wszystkie mają brzegi małą ilością krwi skrzepłej pokryte.

9. Prawe jądro prawie w dwojnásób powiększone, wdotknięciu chrząstkowato twarde.

10. Zresztą powierzchnia ciała blada, nie przedstawia nic wzmiarki godnego.

II. DOCHODZENIE WEWNĘTRZNE.

A. JAMA PIERSIOWA I BRZUSZNA.

11. Po odpreparowaniu części miękkich z lewej połowy klatki piersiowej przekonano się, że rana powyżej pod n. 5 opisana przenikała mięśnie międzyżebra 5go, a w dalszym ciągu ku wewnątrz przedłużała się w prostym kierunku w zupełne rozcięcie gładkie chrząstki 6go żebra i lekkie, parę linii długości mające nadcięcie chrząstki 7go żebra téjże strony.

12. Przy dalszém śledzeniu znaleziono, że powyższa rana, wnikając w osierdzie, przechodziła dalej na spodnią, z przeponą połączoną część tegoż; otwor w części ścięgnistój przepony, drążący do jamy brzusznej, miał przeszło dwa cale długości i postać bardziej nieregularną, nakształt litery T.

13. W lewej jamie opłucnej znajdowało się około 4 funtów krwi ciemnej, płynnej.

14. Płuco lewe na powierzchni puchowate, na rozkroju blade, bezkrwiste, suche.

15. Płuco prawe w krew' obfitsze, w jamie jego opłucnej nie było żadnego płynu.

16. Serce na powierzchni tłuszczem obroste; skurczone, szczególnie w lewej połowie. Na tylnej powierzchni prawej komórki, w odległości 1 cala od wierzchołka serca zaczyna się w ścianie komórki otwór o brzegach gładkich, do jamy komórki drążący, 1½ cala długości mający, idący ukośnie od brzegu serca ku jego linii środkowej i ku górze. Jamy serca próżne; zastawki prawidłowe.

17. W dalszym ciągu otworu w przeponie, powyżej pod nr. 12. opisanego, wieszadło wątroby (*ligamentum suspensorium*) jest nieregularnie pocięte. Wątroba o miąższu bladym, nieco żółtawym, przedstawia na swój górnej powierzchni w bliskości przyczepienia wieszadła trzy rany o brzegach gładkich, z których jedna niemal pozioma, 3 cale długości

mająca, była głębsza, sięgała w miąższ na 4 przeszło cale i tamże w głębi jeszcze miała poboczną w górę idącą ciętą odnogę; dwie zaś drugie, znacznie płytsze i krótsze, do pierwszej prostopadłe, po 2 cale długości mające, o $\frac{1}{2}$ cala od siebie odległe, wnikały jedna w miąższ prawego, druga w miąższ lewego płata wątroby.

18. W jamie otrzewnej znajdowała się mała ilość krwi płynnej.

19. Inne trzewa brzuszne nie przedstawiały nic szczególnej wzmianki dla nas godnego.

B. JAMA CZASZKOWA.

20. Kości czaszkowe nigdzie nie uszkodzone.

21. Opony mózgowe wewnętrzne nieco wodnisto przesiąkłe.

22. Miąższ mózgowy blady, zresztą prawidłowy.

Zdanie było następujące:

1) Że przyczyną śmierci N. J. była utrata krwi w skutek koniecznie śmiertelnej rany wątroby i serca.

2) Rana ta była zadana narzędziem ostrym długiém, obosiecznym, prawdopodobnie około $1\frac{1}{2}$ cala szerokości mającém.

3) Pierwotne pchnięcie, które silnie musiało być zadane, przeszło przez 5ty przestwór międzyżebrowy i chrząstkę 6go żebra lewej strony, przez osierdzie z pominięciem serca i przez przeponę do wątroby; następnie narzędzie, z rany nie ze wszystkiém wyciągnięte, było jeszcze dwukrotnie w innym kierunku w wątrobie zagłębione; wreszcie w skutek pochylenia rękojeści ku dołowi, pchnięciem końca w górę skierowaném przecięta została tylna ściana prawej komórki serca.

4) Rany cięte na grzbiecie trzech palców prawej ręki mogły być zadane po wyciągnięciu narzędzia z głównej rany, gdy N. J. naturalnym bardzo ruchem chwycił się prawą ręką za pierś ugodzoną ciosem.

5) Rany te na palcach, równie jak rana na głowie powyższej prawego ucha, powstały jeszcze za życia denata.

i) Śmierć z potłuczenia czaszki i klatki piersiowej, tudzież zgniecenia téj ostatniej; wrzucenie do dołu kloacznego. (Protok. nr. 13 i 17).

Dnia 23. marca 1863. o godzinie 9. wieczorem ludzie niezajomi przybyli niepostrzeżeni do posesyi Nr. . . . w Warszawie. Jeden z nich, zbudziwszy stróża, zaprowadził go do kloaki w podwórzu, gdzie tenże ujrzał dwóch innych mężczyzn stojących, a trzeciego leżącego, już nieżywego, czytóż jeszcze dychającego. Ludzie ci kazali stróżowi odchylić otwór dołu kloacznego, a pogroziwszy stróżowi i uderzywszy leżącego człowieka nożem, czytóż inném narzędziem, lub tylko pięścią, w piersi, wrzucili go do dołu kloacznego i szybko się oddalili. (Akta k. 2. 3. 7 odwr. 15. 25 odwr.). Wpół godziny potem Jan, parobek w tym samym domu mieszkający, wszedłszy do kloaki, spostrzegł tam dosyć krwi na podłodze i na sedesie (k. 9. 10. 16 odwr.), którą stróż dnia następnego zmiotł (k. 25 odwr.), równie jak krew, którą dostrzegł na bruku w bramie. Dnia 25. z rana wydobyto z dołu kloacznego rzeczzone zwłoki, które się okazały zwłokami Franciszka K. lokaja (k. 2. 13).

Przy obdukcji i sekcji sądowej zwłok wykonanej przeze mnie w dniu następnym, to jest dn. 26. marca z rana (k. 11. 12) okazały się na powierzchni ślady zmian od pobytu w płynie kloacznym pochodzących, jakoto nabrzmienie i barwa bladzielonkawa całej powierzchni ciała. (Protok. sekc. Nr. 1), na twarzy zaś stalowa z nasięknieniem tkanek podskórnych posoką (N. 6). Z uszkodzeń zewnętrznych znaleziono: uszko ucha prawego od reszty ucha na wpół odcięte (N. 2); za uchem prawém ranę o brzegach gładkich, posokę brunatną zawierających, 1" długości mającą, tylko części miękkie przenikającą (3) -; w okolicy ciemieniowej prawej takąż ranę z dwóch cięć po 1" długości mających, pod kątem prostym spotykających się (Nr. 4); wreszcie na wierzchołku głowy takąż ranę w kształcie litery T, której ramiona miały po ½ cala długości (N. 5), a w okolicy krętarza wielkiego prawego starcie skóry 2 cale długości mające, bez podbiegnięcia krwią (N. 7).

Przy dochodzeniu wewnętrzném znaleziono A) w *czaszce*: wylania krwi w skórze i w tkance pod nią położonej w okolicy prawej czołowej na powierzchni wielkości $\frac{1}{2}$ rubla (N. 9), a odpowiednio temu w oponach mózgowych wewnętrznych wylanie krwi ciemnej płynnej na powierzchni zewnętrznej górnej prawego płata mózgu wielkiego, wielkości mniej więcej rubla (N. 16, a.); nadto w okolicy lewej czołowej w skórze i w tkance pod nią wylanie krwi płynnej $2\frac{1}{2}$ " długie, 1" wysokie (N. 10), i cały lewy mięsień skroniowy w swęj tkance krwią ciemną wylaną przesiąkły (N. 11), a odpowiednio temu na powierzchni zewnętrznej lewego płata górnego mózgu mniej więcej na $\frac{1}{4}$ części téj powierzchni w oponach mózgowych wewnątrz. podobneż wylanie (N. 16, b.). Zrestą opony mózgowe wewn. nigdzie nie uszkodzone, podobnie jak opona twarda (N. 15) i kości czaszkowe (N. 14). B) W *klatce piersiowej* znaleziono z prawej strony złamanie 6. i 7. żebra, po lewej zaś stronie złamanie 4. 5. 6. i 7. z wylaniami krwi w mięśniach i w opłucnej (N. 18. 20), płuco lewe mocno przekrwione (N. 21), serce w jamach swych próżne. (N. 22). C) Żołądek rozszerzony, napełniony był płynem zielonkawym, cuchnącym, w którym pływały kawałeczki stałe. (N. 23). Inne trzewa brzuszne nie przedstawiały nic szczególnego.

Zdanie wydałem następujące:

1. Że przyczyną śmierci Franciszka K. przedewszystkiém były wylania krwi w oponach mózgowych wewnętrznych, złamania żeber i przekrwienie płuca lewego; tych zaś zmian odleglejszym powodem były prawdopodobnie silne uderzenia narzędziem tępém w głowę i klatkę piersiową, a co do téj ostatniej w szczególności prawdopodobnie silne zgniecenie.

2. Że, wnosząc z obecności w żołądku płynu podobnego do kloakowego, możliwém się wydaje, iż w chwili wrzucenia denata do kloaki tliła w nim jeszcze iskierka życia.

3. Że rany w powłokach miękkich czaszki mogły być zadane równocześnie z uderzeniami na głowę wymierzonymi, ale same przez się nie były przyczyną śmierci.

k) Śmierć z nieumiejętnego upustu krwi.
(Protok. nr. 17).

I. DOCHODZENIE ZEWNĘTRZNE.

1. Zwłoki kobiety około 50 lat licząc, w wysokim stopniu wychudłej i wynędziałej.

2. Stężenie trupie górnych członków jeszcze nie ustąpiło.

3. Skóra blada, widoczne błony śluzowe również blade.

4. W prawym przegubie łokciowym znajduje się otwór w skórze, 1 cal długości mający, a około $\frac{1}{4}$ cala szerokości, idący ukośnie od góry i zewnątrz ku dołowi i ku wewnątrz, z którego wydobywa się posoka i drobne brudne skrzepy.

5. Przedramię prawie jest wodnisto obrzmiałe, podobnie i ramię w części sąsiadującej z przegubem łokciowym

6. W górnej $\frac{1}{3}$ części ramienia prawego znajduje się podłużna rana w skórze w rówku wewnętrznym mięśnia dwugłowego, 2 cale długości mająca, a z niej wystaje podwójny koniec nitki jedwabnej, którą przewiązana jest tętnica ramieniowa. Części otaczające tę ranę nie przedstawiają śladów zapalenia.

7. Zgłębnik, zapuszczony w otwór powyżej pod nr. 4 opisany, wnika w głąb' na $\frac{1}{2}$ cala; na wszystkie też strony, zwłaszcza na dół, czuć się dają za pomocą zgłębnika skóra tkanka podskórna podkopane.

8. Po dokładnem odpreparowaniu skóry i głębszych części tak w przegubie łokciowym, jakoteż na ramieniu i przedramieniu, pokazało się, że tkanka łączna podskórna i między-mięśniowa w przegubie łokciowym i na połowie ramienia i przedramienia przyległych była przesiąknięta częścią krwią, częścią płynem posocznym. Szczególnie w samym przegubie łokciowym obfite były masy posoczne i skrzepy brudne, po których oddaleniu przekonano się, że tętnica ramieniowa (*art. brachialis*) wcale nie była uszkodzona, zaś towarzysząca jej po stronie zewnętrznej żyła ramieniowa (*vena brachialis*) przedstawiała w swój przedniej ścianie otwór ukośny, z góry i zewnątrz na dół i na wewnątrz idący, z którego wychodził nie wielki skrzep ciemny. Ściany żyły w tém miejscu, tudzież na długości cala powyżej i poniżej przedstawiają na swój wewnętrznej powierzchni barwę ciemnobrunatną, ciemniejszą niż reszta żyły.

II. DOCHODZENIE WEWNĘTRZNE.

10. Powłoki miękkie i kości czaszkowe blade. 11. Opyny mózgowe tak zewnętrzne, jak wewnętrzne, blade, nader mało krwi zawierające. 12. W jamach mózgowych obfita ilość surowicy.

13. Po odpreparowaniu skóry klatki piersiowej okazało się w prawym 4tym przestworze międzybrowym wylanie krwi w tkance łącznej podskórnej i w mięśniach na przestrzeni 2 cale długości i 1 cal szerokości mającej. Żebra i opłucna w tém miejscu nie uszkodzone. 14. Płuca puchowato wzdęte, blade, suche, bezkrwiste na przecięciu. 15. Serce w lewej swój połowie znacznie rozrosłe, ściany zgrubiałe. W prawém sercu bardzo mała ilość skrzepu wątego.

16. Wątroba mała, miąższ jój blady, na rozkroju przedstawia kęпки żółtawe i szarawe. 17. Śledziona mała. 18. Nerki małe, blade, istota korowa zanikła. 19. Inne trzewa brzuszne procz znacznej w ogóle bladłości nie przedstawiały nic uderzającego.

Zdanie wydałem następujące:

1. Że przy puszczeniu krwi z prawej ręki nacięta była żyła ramieniowa (*v. brachialis*).

2. Że przyczyną śmierci była niedokrwistość w skutek kilkakrotnych zapewne krwotoków z téj żyły, a po części i zapalenie żyły i tkanki łącznej przyległej.

3. Że wylanie krwi w częściach miękkich odstępu międzybrowowego prawego 4go powstało prawdopodobnie w skutek uderzenia ciałem tępem mniej więcej na dzień przed śmiercią, ale do śmierci się nie przyczyniło.

1) Śmierć nagła z rozmaitych chorób, bez przyczynienia się osób trzecich, czyli t. zw. śmierć naturalna. Przyczyna śmierci w pojedynczych przypadkach była następująca:

w 1 przypadku zalew krwisty mózgu;

w 1 przyp. przekrwienie mózgu i płuc;

w 1 przyp. przekrwienie płuc;

w 3 przyp. zapalenie płuc;

w 1 przyp. gruźlica;

- w 1 przyp. przerost serca i jego skutki;
- w 1 przyp. wrzód przedziurawiający w żołądku;
- w 1 przyp. zapalenie nerek;
- w 1 przyp. krwotok macicy po położu;
- w 4 przyp. skutki przeciągłego pijaństwa;
- w 5 przyp. odstąpiono od wykonania sekcji z powodu zbyt posuniętej zgnilizny.

IV. DOCHODZENIA NA ZWŁOKACH PŁODÓW I NOWORODKÓW.

Według stopnia rozwoju przedmiotem dochodzenia były:

Zaśniad (<i>mola</i>)	1 raz
Płody 6-miesięczne	2 razy
„ 7 „	2 —
„ donoszone	5 —

Razem 10

Z pomiędzy pojedynczych przypadków zaledwo dwa następujące zasługują na szczegółową wzmiankę.

a) *Płód donoszony; śmierć z obcisnięcia pepowiny około szyi w łonie matki.* (Protok. nr. 71).

I. DOCHODZENIE ZEWNĘTRZNE.

1. Zwłoki dziecięcia płci żeńskiej, 21" długości mające.
2. Członki ciała okrągłe. Skóra w ogóle blada, tylko na tylnej powierzchni ciała plamy sine, które za nacięciem okazały się pośmiertnymi.
3. Na głowie włosy na 1 cal długości.
4. Chrząstki ucha i nosa rozwinięte.
5. Na przedniej i bocznych powierzchniach szyi widać dwa równoległe, poziome, o $\frac{1}{4}$ cala oddalone od siebie rowki, z których każdy ma około $\frac{1}{4}$ cala szerokości. Skóra i mięśnie pod temi rowkami przedstawiają wgniecenia, ale bez wylania krwi.
6. W okolicy lewej ciemieniowej znajduje się obrzmiałość (przedgłowie), która za nacięciem okazuje się galaretowato-wodnistą, tylko w tkance podskórnej położoną.

7. Przy pępku znajduje się sznurek pępkowy mający 2 cale długości, galaretowaty, podwiązany.

8. W przyrostku dolnym kości udowej znajduje się jądro kostne mające 2 linie średnicy.

9. Zresztą powierzchnia ciała nie przedstawia nic uderzającego, ani żadnych śladów obrażeń zewnętrznych.

II. DOCHODZENIE WEWNĘTRZNE.

A. JAMA CZASZKOWA.

10. Powłoki miękkie i kości czaszkowe w krew' miernie obfite, nigdzie nie uszkodzone.

11. Opony mózgowe, zwłaszcza wewnętrzne, mocno nastrożone.

12. Podobnież i miąższ mózgu przedstawia na rozkroju obfite kropki krwi.

B. JAMA PIERSIOWA.

13. Za otwarciem klatki piersiowej oba płuca takową niedokładnie wypełniają. Na powierzchni są barwy sino-brunatnawej, jednostajnej, tylko w kilku drobnych punktach wielkości ziarenek prosa są jaśniejsze, różowe i tamże pod lupą widać bulki powietrzne.

14. Płuca oba tak wespół z sercem, jak pojedynczo i na kawałki pokrajane, toną zupełnie w wodzie, a na rozkroju nie trzeszczą i nie wydają piany (z wyjątkiem wzmiankowanych kilku drobnych punktów).

15. W sercu znajdują się drogi płodowe krążenia.

C. JAMA BRZUSZNA.

16. Wątroba wielka, w krew' obfita.

17. Żołądek próżny, ma kierunek pionowy.

18. W kiszkiach grubych znajduje się smołka dziecięca.

19. Inne trzewa brzuszne nie przedstawiają nic szczególnej wzmianki godnego.

Zdanie. Na zasadzie tego, co poprzedza, jestem zdania:

1. Że przedmiotem dochodzenia było dziecię dojrzałe, donoszone.

2. Że po przyjsciu na świat nie oddychało, lecz tylko były zapewne robione usiłowania wdmuchywania powietrza do płuc.

3. Że przyczyną śmierci przed przyjsciem na świat było prawdopodobnie silne obcisnięcie sznurka pępkowego około szyi.

b) *Plód donoszony, ciężki poród twarzowy.* (Protok. nr. 20).

I. DOCHODZENIE ZEWNĘTRZNE.

1. Zwłoki dziecięcia płci męskiej, długości 22 cale mające; członki okrągłe, dobrze wykształcone.

2. Skóra na grzbiecie przedstawia plamy sine pośmiertne.

3. Główka pokryta włosami na $\frac{1}{2}$ cala długości. Chrząstki ucha i nosa dobrze wykształcone.

4. Cała lewa połowa twarzy przedstawia nabrzmienie i barwę fioletową, a za nacięciem wylanie krwi w tkankach podskórnych.

5. Przy pępku znajduje się sznurek pępkowy galaretowaty, długości 3 cali, podwiązany.

6. W przyrostku dolnym kości udowej znajduje się jądro kostne mające 3 cale średnicy.

7. Zresztą powierzchnia ciała nie przedstawia nic uderzającego, ani żadnych śladów zewnętrznych obrażeń.

II. DOCHODZENIE WEWNĘTRZNE.

A. JAMA CZASZKOWA.

8. Kości czaszkowe i powłoki miękkie nigdzie nie uszkodzone.

9. Opony mózgowe w krew' dosyć obfitujące, miąższ mózgowy galaretowaty, różowy, w krew' również dosyć za-
możny.

B. JAMA PIERSIOWA I SZYJA.

10. W gardzielu i krtani nie znaleziono żadnych ciał obcych, ani zmian uderzających.

11. Płuco lewe objętości większej od prawego, na powierzchni barwy brunatno-fioletowej z przeważającemi znacznie kępkami barwy różowej, któreto kępki na powierzchni zewnętrznej obu płatów za pomocą szkła powiększającego obejrzone okazują drobniotkie i regularne bulki powietrza. Płuco to, rzucone na wodę, pływa do połowy, na rozkroju wydaje mierną ilość płynu pianistego i krwi, i cicho syczy.

12. W płucu prawém wszystkie trzy płaty mają na powierzchni barwę brunatno-fioletową, a tylko brzeg dolnego płatu przedstawia barwę jaśniejszą i pod lupą rzeczono bulki powietrza. Odpowiednio całe płuco tonie w wodzie i tylko ów jaśniejszy kawałek wydaje na rozkroju nieco piany.

13. W sercu znajdują się płodowe drogi krążenia.

C. JAMA BRZUSZNA.

14. Wątroba wielka, w krew' zamożna.

15. Żołądek próżny, ma kierunek ukośny.

16. W kiszkach grubych znajduje się obficie t. zw. smołka dziecięca.

17. Inne trzewa brzuszne nie przedstawiały nic wzmianki godnego.

Z d a n i e było téj treści:

1, że dziecicę przedmiotem dochodzenia będące było donoszone;

2, że po przyjściu na świat oddychało czas jakiś, ale słabo;

3, że przyczyną śmierci był ciężki poród twarzowy.

