

Rośliny

międzyrzeczna Zbruczu i Seretu

podał

A. J. Słędziński.



Odbitka z tomu XII Spraw. Kom. fizyogr. akad.

KRAKÓW,

W DRUKARNI UNIwersytetu Jagiellońskiego
pod zarządem Ignacego Stelcła.

1878.

48793
1

Biblioteka Jagiellońska



1002929514

Wycieczka moja w roku 1877 na Podole pomiędzy Zbruczem a Seretem jest dalszym ciągiem wycieczki w roku poprzednim przeze mnie odbytej pomiędzy temiż rzekami. Południową granicę badania zakreśliłem północną granicą zwiedzzonego obszaru w r. 1876, bo i w tym roku odbywałem w tych samych letnich miesiącach. Tylko dla kilku punktów nad Zbruczem, Dniestrem i Cyganką pominiętych lub zwiedzonych w początkach Listopada 1876 zrobiłem wyjątek zwiędzając je obecnie najsamprzód.

Porządek, w jakim postępowałem, jest następujący. Dnia 16 Lipca przybyłem z Czerniowiec do Uścia Biskupiego, dnia tegoż i następnego zwidziłem okolicę Uścia Biskupiego i Chudykowiec. D. 18 udałem się do Niwry, zkąd d. 19 zwidziłem Zalesie, Paniowce Zielone, Dźwiniaczkę i Michałówkę, d. 20 Wołkowie, Słobódkę Muszkatowiecką, Turyleze, Sapahów, Krzyweze; d. 21 Mielnicę, Chudykowiec i Kołodróbkę. Dnia 22 udałem się z Niwry do Skąły. Ztąd zwidziłem wieś po drodze aż do Husiatyna i brzeg Zbruczu od Husiatyna do Siekierzyniec, następnie lasy i jeziorka w Cyganach i Łanowcach, brzeg Niczławy (od Łanowiec po Zielińce), Łosiacz i Gusztyn. Dnia 1 Sierpnia gościńcem na Kołędziany przybyłem do Czortkowa i tu założyłem stację główną aż do końca wycieczek (do 8 Listopada). W Sierpniu przeszedłem obszar pomiędzy Niczławą od Kozaczyzny po Kopyczyńce, a Seretem od Szerszeniowiec po Tudorów, nie pomijając żadnej wsi. We Wrześniu zwidziłem Kopyczyńce, Uwiśle, Chłopówkę, Chorostków, Sorokę i Kluwińce. W Miodoborach (od 10 do 13 i w dniach 29 i 30 Września) zwidziłem Touste i wzgórze „Wołowa“ rozciągające się ponad Krasnem i Sadržawkami, las pomiędzy Sadržawkami, Nowosiółką, Wolicią i Kręciłowem w dwóch krzyżujących się liniach (jednej z Sadržawek na „Toustecką budę“ [leśniczówkę] i Pustelnię do Kręciłowa, a drugiej z Nowosiółki do Wolicy), Wolice, Kozinę, Biłkę, Kałaharówkę, brzeg Zbrucza między Kałaharówką a Kręciłowem, brzegowiska Gniléj od Nowosiółki aż po ujście do Zbrucza i wszystkie wieś nad tą rzeką położone. W innych dniach tegoż miesiąca zwidziłem jeszcze Samoluskowce, Wasylkowce, Czabarówkę, Husiatyn, Olchowczyk, Tlusteńkie, Probużnę, Zabińce, Kociubińce i Krogulec.

Uważając niniejsze badanie flory tej okolicy za nieskończone, a mając zamiar w następnych latach dalej takowe prowadzić, poprzestaję tymczasowo na podaniu wykazu roślin zebranych w ciągu niniejszej wycieczki. Wykaz ten, obejmujący 690 gatunków, zawiera 684 przeze mnie samego zebranych w roku 1877, i 6 gatunków zebranych

przez JP. LENTZA, a nie znalezionych przeze mnie. Kilkanaście dat JPP. LENTZA i BUSCHAKA, członków Kom. fizyogr. krak. na podstawie otrzymanych od nich okazów podałem z przytoczeniem ich nazwisk. Kilkanaście dat w przeszłoroczném Sprawozdaniu opuszczonych oraz kilka sprostowań zamieściłem w tymże wykazie.

Oprócz wielu gatunków i odmian nowych dla okolicy, przybył jeden tylko nowy dla Galicyi gatunek, mianowicie *Trinia Kitaibelii* MB.

I. Acrobrya protophyta.

Equisetaceae.

Equisetum arvense L. Po polach posp.; Cygany, Łosiacz, Łanowce, Kozaczyzna, Jezierzany, Kołędziany, Rosochacz, Czortków, Miłowce, Białe, Tudorów, Kotówka, Uwiśla, Olchowczyk, Biłka i t. d.

E. limosum L. Stawki w Czortkowie, na moczarze.

E. palustre L. Po miejscach mokrych; nad Zbruczem w Skale, Uwiśla, Grabowiec.

E. ramosissimum Desf. Po miejscach piaszczystych i urwiskach nad Dniestrem w Uściu biskupiém, Chudykowcach i Babińcach.

E. hiemale L. Na ścianie lesistej nad Gniłą w Trybuchowcach.

Polypodiaceae.

Pteris aquilina L. Po lasach dębowych; Ułaszkwce, Sasolówka, Rosochacz, Uhryń, Szmańkowce, Sadržawki.

Asplenium Trichomanes Huds. Po skałach ocienionych; Szyłowce, Miodobory (Sadržawki, Kręciłów, Pustelnia).

A. Ruta muraria L. Po skałach; Skała, Dawidkowce, Zwiąhel, Czortków, Miodobory (Wołowa, Sadržawki).

Aspidium cristatum Sw. W lesie dębowym na granicy Uhrynia i Szmańkowce w niewielkiej ilości.

A. spinulosum Sw. Po lasach; Miodobory między Nowosiółką a Kałaharówką.

A. Filix mas Sw. Po lasach; Cygany, Łosiacz, Rosochacz, Uhryń, Szmańkowce, Skorodyńce, Tudorów, Oryszkwce, Jabłonów, Miodobory (Nowosiółka, Wolica, Kałaharówka, Kręciłów, Rasztoewce).

A. Filix femina Sw. Po lasach; Skała, Uhryń, Szmańkowce, Białe, w Miodoborach m. Nowosiółką, Kałaharówką a Kręciłowem.

A. Thelypteris Sw. Nad Stawem w Żabińcach.

Cystopteris fragilis Döll. Po skałach i urwiskach ocienionych; Dawidkowce, Zwiąhel, w Miodoborach koło Kręciłowa, Rasztoewce, Nowosiółki i Kałaharówki.

II. Amphibrya.

Gramineae.

Alopecurus geniculatus L. var. *caesi*us Neilr. Po miejscach mokrych, nad potokami, rowami i rzekami; Cygany, Zielńce, Husiatyn, Skała.

Phleum pratense L. Po łąkach, zrębach, brzegach lasów; wszędzie posp.

Milium effusum L. Las grabowy w Cyganach.

Panicum glabrum Gaud. Po polach posp.; Głębocek, Zabłotówka, Białe, Oryszkowce, Soroka, Kałaharówka.

P. Crus galli L. Po miejscach jałowych i uprawnych, wszędzie posp.

P. capillare L. W prosię zwyczajném zmieszane w wielkiej ilości; Sieniakowa przy Czortkowie, Zalesie (pow. Czortk.), Sz wajkowce, Postołówka, Soroka.

Setaria verticillata PB. Jezierzany, w ogródku między kurudzą.

S. viridis PB. Po polach suchych, skalistych zboczach jarów posp.; Kozaczyzna, Zielńce, Zabłotówka, Zalesie (pow. Czortk.), Czortków, Białe, Kopyczyńce, Uhryń, Postołówka, Kałaharówka, Touste, Sadzawki.

S. glauca L. Po ścierniach i zaroślach wilgotnych, koło dróg i t. d. wszędzie posp.

Stipa capillata L. Nad Dniestrem w Kołodróbce.

Agrostis vulgaris With. Po łąkach i brzegach lasów; Paniowce Zielone, Zabłotówka, Białe, Tudorów, Oryszkowce, Szydłowce, Sidorów.

A. stolonifera L. Po miejscach podobnych; Chudykowce, Cygany, Głębocek, Burdiakowce, Sasolówka, Sz wajkowce, Szmańkowce, Skorodyńce.

A. canina L. Czortków ku Oryszkowcom, na łące.

A. Spica venti L. Na zrębie w Tudorowie.

Calamagrostis Epigejos Roth. Po zrębach, łąkach mokrych, suchych pagórkach i zboczach jarów, brzegach rzek, posp.; Chudykowce, Kołodróbka, Głębocek, Sasolówka, Rosochacz, Zabłotówka, Zalesie (pow. Czortk.), Czortków, Łosiacz, Kociubińczyki, Skorodyńce, Kluwince, Borki, Kręciłów, Wasylkowe.

C. silvatica DC. Las „Halilea“ w Sasolówce.

Phragmites communis Trin. Po moczarach, brzegach rzek i stawów, wszędzie posp.

Avena caespitosa Griessel. Miodobory: m. Nowosiółką a Kałaharówką, w lesie.

A. fatua L. Na ścianie lesistej nad Zbruczem w Suchodole, po polach w Jezierzanych i Czortkowie.

Arrhenatherum avenaceum PB. Pod płotem w Szmańkowczykach.

Poa annua L. Koło dróg, po łąkach, murawach, wszędzie posp.
P. nemoralis L. Po lasach cienistych i zrębach w rozmaitych formach i odmianach; Uhryń, Rosochacz, Białe, Szydłowiec, Suchodół, Olehowczyk, Trybuchowiec, Kręciłów.

P. compressa L. Po miejscach suchych, pagórkach i zboczach jarów; Chudykowiec, Zwiąhel, Dawidkowiec, Milowiec, Rosochacz, Czortków, Oryszkowiec, Touste, Sadržawki.

P. Langeana Rehb. Łosiacz.

Glyceria spectabilis MK. Po brzegach stawów, jeziorok i rzek wszędzie posp.

G. fluitans R. Br. Po miejscach mokrych; Cygany, Grabowiec, Tudorów, Kluwińce, Nowosiółka (w Miodoborach).

Briza media L. Po łąkach; Zalesie (pow. Borszczowski), Łosiacz, Zielińce, Jezierzany, Rosochacz, Czortków.

Melica ciliata L. Po ściankach lesistych, w zaroślach; „Hłody“ w Kołodróbce, Paniowiec Zielone, Lisowiec.

M. nutans L. Po lasach i zaroślach; Paniowiec Zielone, Rosochacz, Burdiakowiec, Białe, Szmańkowiec, Uhryń.

M. uniflora Retz. Po lasach; „Tulin“ w Łanowcach, Cygany.

Molinia coerulea Mönch. Po sianozęciach na zrębach dębowych; „Halilea“ w Zablotówce, Czortków ku Hadyńkowiec.

Dactylis glomerata L. Po łąkach, lasach, koło dróg i t. d. wszędzie posp.

Cynosurus cristatus L. Po łąkach; Czortków, Tudorów.

Festuca ovina L. Po skalistych zboczach; nad Dniestrem w Uściu Biskupim i Mielnicy, nad Zbruczem w Husiatynie, nad Seretem w Czortkowie.

F. gigantea Vill. Po lasach, zaroślach i zrębach posp.; Cygany, Grabowiec, Łosiacz, Burdiakowiec, Suchodół, Rosochacz, Tudorów, Kopyczyńce, Kołędziany, Nowosiółka (w Miodoborach), Sadržawki, Touste, Kalaharówka, Wolica, Horodnica.

F. elatior L. Po suchych łąkach, trawiastych miejscach, koło dróg, posp.; Kozaczyzna, Zielińce, Milowiec, Czortków, Białe, Majdan, Kotówka, Husiatyn, Olehowczyk, Biłka i t. d.

Bromus asper Murr. Po lasach; Cygany, Łosiacz, Burdiakowiec.

B. inermis Leyss. Po miedzach, brzegach lasów, koło dróg, posp.; Cygany, Głębozec, Szwałkowiec, Szmańkowiec, Zalesie (pow. Czortkowski), Uście Biskupie.

B. secalinus L. Koło pól; Skala, Cygany, Uhryń, Czortków, Tudorów, Oryszkowiec, Skorodyńce, Sadržawki.

B. mollis L. Po brzegach lasów, pól, koło dróg; Milowiec, Łanowiec.

B. arvensis L. Po polach, pagórkach, brzegach lasów, koło dróg, posp.; Uście Biskupie, Skala, Cygany, Łanowiec, Milowiec, Rosochacz.

B. racemosus L. Na polu w Białem.

B. tectorum L. Po suchych zboczach nad Zbruczem w Husiatynie.

Brachypodium pinnatum PB. Na ścianie lesistej w Paniowcach Zielonych.

B. silvaticum R. et Sch. Po lasach, zaroślach i zrębach, posp.; Cygany, Łosiacz, Rosochacz, Uhryń, Białe, Kopyczyńce, Jabłonów, Wasylkowce.

Lolium perenne L. Wszędzie posp.

L. temulentum L. Koło dróg w Skale i Grabowcu, na zrębie w Zabłotówce.

Triticum repens L.

b) *obtusiflorum* Neilr. Po suchych i skalistych zboczach; nad Niczławą w Dawidkowcach, Szmańkowcach i Szwajkowcach, nad Seretem w Rosochaczu i Czortkowie.

c) *aristatum* Neilr. Po łąkach, lasach i zaroślach; Sasólówka, Szmańkowiezyki, Skorodyńce.

Elymus europaeus L. Po lasach grabowych; Cygany, Łosiacz.

Andropogon Ischaemum L. Trawa ta, jak to podałem w zeszłoroczném Sprawozdaniu, jedna z najpospolitszych nad dolnym Zbruczem, Niczławą i Seretem i zarastająca gromadnie dość znaczne obszary, ku północy coraz się przersedza. Zanotowałem jeszcze następujące miejscowości: nad Niczławą w Kozaczyźnie i Zielincach, nad Seretem w Lisowcach, Kapuścińcach, Rosochaczu, Uhryniu i Czortkowie.

Cyperaceae.

Carex vulpina L. Po mokrych łąkach; Dźwiniaczka, Cygany.

C. muricata L. Po łąkach, zaroślach, zrębach, lasach, koło dróg; Zabłotówka, Cygany, Kołędziany, Uwiśla, Sadržawki.

C. teretiuscula Good. Czortków ku Oryszkowcom, na łące.

C. remota L. Lasek „Leszczyna“ w Burdiakowcach.

C. tomentosa L. Na łące w Paniowcach Zielonych.

C. pilosa Scop. Po lasach grabowych często; Łosiacz, Kołędziany, Białe, Jabłonów. W Miodoborach między Nowosiółką, Kałaharówką a Kręciłowem w kilku miejscach.

C. ampullacea Good. Na łące mokrej w Kluwińcach.

C. Pseudo-cyperus L. Po moczarach i brzegach stawów; Stawki przy Czortkowie, Żabińce.

Scirpus palustris L. Po brzegach jeziorzek w Cyganach, nad Seretem w Rosochaczu.

S. acicularis L. Nad Seretem w Rosochaczu, i koło jeziorzek na Konstancyi.

S. lacustris L. Po brzegach rzek i strumieni, stawach i jeziorkach, posp.; Dźwiniaczka, Cygany, Kozaczyzna (nad Niczławą), Konstancya, Łosiacz, Kopyczyńce, Kotówka, Szwajkowce, Szmańkowce, Żabińce.

S. silvaticus L. Po moczarach i brzegach rzek; Chudykowce, Paniowce Zielone, Szmańkowce, Szwajkowce, Kotówka.

S. compressus Pers. Na łące w Szmańkowczykach.

Cyperus fuscus L. Nad Zbruczem w Skale, Husiatynie i między Kręciłowem a Kałaharówką, nad Seretem w Lisowcach, Rosochaczu i Tudorowie, oraz koło jeziorok na Konstancyi.

Alismaceae.

Triglochin palustre L. Nad Seretem na namule w Rosochaczu i Czortkowie, na łąkach w Grabowcu i Szmańkowczykach.

Alisma Plantago L. Po moczarach, brzegach rzek, stawów i jeziorok posp.; Dźwiniaczka, Skala, Łanowce, Grabowiec, Łosiacz, Rosochacz, Białe, Kotówka, Kopyczyńce, Chorostków, Husiatyn, Kluwińce, Szwajkowce, Zabłotówka, Teklówka, Hadyńkowce, Nowosiółka (nad Gniłą), Borki.

Sagittaria sagittaeifolia L. Nad Zbruczem m. Kręciłowem a Kałaharówką, nad Seretem w Rosochaczu, nad Gniłą w Nowosiółce i Borkach.

Butomeae.

Butomus umbellatus L. Po brzegach rzek i potoków; Dźwiniaczka, Suchodół, Husiatyn, Hadyńkowce, Kotówka, Kopyczyńce, Szypowce, Milowce, Rosochacz, Czortków, Tudorów.

Juncaceae.

Luzula pallescens Besser. Na zrębie w Uhryniu 26/8 (owocująca).

Juncus communis E. Mey. Po mokrych łąkach, zrębach, zarosłach, brzegach rzek i potoków posp.; Paniowce Zielone, Cygany, Kołędziany, Czortków, Tudorów, Jabłonów, Samołuśkowce, Wasylkowce.

J. glaucus Ehrh. Po miejscach podobnych; Paniowce Zielone, Cygany, Płustenkie, Kluwińce.

J. lampocarpus Ehrh. Po miejscach podobnych; Paniowce Zielone, Łanowce, Zielńce, Szmańkowczyki, Rosochacz, Czortków, Kotówka, Kluwińce.

J. atratus Krock. Po łąkach mokrych; Czortków ku Hadyńkowcom, między Samołuśkowcami a Wasylkowcami.

J. compressus Jacq. Po miejscach mokrych posp.; Skala, Zielńce, Kołędziany, Czortków, Szwajkowce, Hadyńkowce, Teklówka, Kotówka, Biłka.

J. bufonius L. Po moczarkach, brzegach rzek, potoków i jeziorok posp.; Paniowce Zielone, Skala, Cygany, Łanowce, Lisowce, Zabłotówka, Rosochacz, Tudorów, Suchodół, Kręciłów, Kałaharówka, Sądzawki, Samołuśkowce, Wasylkowce.

Melanthaceae.

Veratrum nigrum L. Po zrębach dębowych obficie; Kociubiń-

czyki, Tlusteńkie, Rosochacz, Sasolówka, Ułaszkwce, Głębozec, Jezierzany.

Liliaceae.

Lilium Martagon L. Po lasach, zaroślach i zrąbach; Jezierzany, Sasolówka, Rosochacz, Łosiacz, Kociubińczyki.

Muscari comosum Mill. Po ściankach nad Dniestrem w Dźwinogrodzie, Babińcach i Kołodróbce. (Miejscowości Niwra i Wierzbówka, mylnie pod *Hyacinthus pallens* MB. podane w tomie XI Spraw. Kom. fizyogr. odnoszą się do tejże rośliny).

Allium acutangulum Schrad. var. *petraeum* DC. Po skalistych zboczach w Miodoborach (Wołowa, Touste).

A. rotundum L. Na ściance leśnej w Paniowcach zielonych.

A. sphaerocephalum L. Po urwistych zboczach nad Dniestrem w Babińcach.

A. oleraceum L. Po skalach, zaroślach i zrąbach często; Paniowce zielone, Cygany, Jezierzany, Zabłotówka, Rosochacz, Uhryń, Czortków, Łosiacz, Kociubińczyki.

Anthericum ramosum L. Po suchych zarostach pagórkach, ściankach, łąkach wśródleśnych i zrąbach posp.; Paniowce zielone, Kulakowce, Duninów, Kozaczyzna, Zieliniec, Głębozec, Zabłotówka, Sasolówka, Rosochacz, Czortków, Kociubińczyki, Husiatyn, Touste.

Asparagus tenuifolius Lam. Na ściance „Młody“ w Kołodróbce.

Smilacaceae.

Paris quadrifolia L. Po lasach cienistych; Cygany, Miłowce, Łosiacz.

Convallaria Polygonatum L. Po lasach; Kociubińczyki, Białe.

C. multiflora L. Po lasach posp.; Łosiacz, Rosochacz, Uhryń, Szmańkowce, Kręciłów i t. d.

C. latifolia Jacq. Razem z poprz. gatunkami; Skala, Burdiakowce, Łosiacz, Lisowce, Rosochacz, Uhryń, Szmańkowce, Kopyczyńce.

C. majalis L. Po lasach razem z poprz. gat. posp.; Lisowce, Rosochacz, Jezierzany, Uhryń, Szmańkowce, Białe, Kociubińczyki, Tlusteńkie i t. d.

Majanthemum bifolium DC. Po lasach posp.; Słobódka Muszkatowiecka, Cygany, Łosiacz, Rosochacz, Szmańkowce, Białe, Skorodźnice, Jabłonów, Oryszkwce, Szydłowce. W Miodoborach koło Toustego, Kalaharówki, Wolicy i Kręciłowa.

Hydrocharideae.

Hydrocharis Morsus ranae L. Na stawach w Kopyczyńcach, Hadyńkowcach i Żabińcach.

Irideae.

Iris bohemica Schm. Po ściankach trawiastych; nad Dniestrem w Babińcach (LENTZ) i Kołodróbce, nad Seretem w Holihradach i Czortkowie (ścianka „Dąbrowa“), oraz na sianożęci w Winiatyńcach.

I. Pseudacorus L. Po moczarach w Cyganach.

I. graminea L. Po ściankach; nad Dniestrem Kołodróbce, nad Seretem w Czortkowie.

Orchideae.

Orchis coriophora L. Czortków ku Oryszkowcom na łące.

Platanthera bifolia Rehb. Po lasach; Cygany, Zablotówka.

Neottia vulgaris Kolb. Po lasach; Słobódka Muszkatowiecka, Łosiacz, Czortków, Oryszkowce, Kręciłów.

Epipactis latifolia All. var. *minor* Neilr. Po lasach często; Cygany, Łosiacz, Zablotówka, Sasolówka, Skorodyńce, Tudorów, Jabłonów, Kopyczyńce, Oryszkowce, Szańkowce, Uhryń, koło Kręciłowa.

Potameae.

Zanichella palustris L. Na „Garbach“ (w jeziorkach) w Cyganach.

Potamogeton natans L. Po stawach i jeziorkach; Cygany, Żabińce, Tłusteńkie.

P. lucens L. Na stawie w Kopyczyńcach.

P. crispus, L. Po brzegach Niczławy koło Tekłówki i w Hadyńkowcach, po brzegach Seretu w Rosochaczu i Czortkowie, w jeziorkach w Cyganach.

P. pusillus L. W odlewiskach Seretu w Rosochaczu.

P. pectinatus L. Po brzegach Niczławy w Zielńcach, po brzegach Seretu w Lisowcach, Milowcach i Rosochaczu.

Lemna trisulca L. Na stawie w Żabińcach.

L. gibba L. Na wodzie stojącej w Grabowcu.

L. minor L. Po stawach, jeziorkach i moczarkach, wszędzie posp.

L. polyrrhiza L. Na stawie w Cyganach, po jeziorkach w Łanowcach.

Aroideae.

Acorus Calamus L. Po stawach i brzegach rzek; nad Zbruczem w Suchodole, nad Niczławą w Kozaczyźnie, Merlawie, Zielńcach, Szańkowcach, Sz wajkowcach, Hadyńkowcach i Kopyczyńcach, nad Gniłą w Horodnicy, Postołówce, Borkach i Nowosiółce, nad Tajną w Uwiśli.

Typhaceae.

Typha latifolia L. Po stawach, jeziorkach i moczarach; Dźwiniaczka, Cygany, Hadyńkowce, Kotówka, Kopyczyńce, Żabińce, Nowosiółka (nad Gniłą).

T. angustifolia L. Po stawach w Dźwiniaczce, Hadyńkowcach i Kopyczyńcach.

Sparganium simplex Huds. Na podmokłym brzegu Seretu w Rosochaczu razem z nast. gat.

S. ramosum Huds. Po moczarach, stawach, jeziorkach, brzegach rzek i potoków posp.; Dźwiniaczka, Skala, Cygany, Konstancyja, Rosochacz, Czortków, Tudorów, Kopyczyńce, Kotówka, Suchodół, Thustenkie, Wasylkowce, Samoluskowce.

III. Acramphibrya.

Gymnospermae.

Coniferae.

Pinus silvestris L. Zasiana w Cyganach, Głębozczku, Zabłotówce, Sasolówce, Rosochaczu, Wasylkowcach. W Miodoborach koło Sadzawek i Nowosiółki w lesie stare drzewa.

Abies excelsa Poir. Zasiana w Cyganach.

Larix europaea DC. Zasiany w Cyganach, Zielińcach i Głębozczku.

Apetalae.

Ceratophylleae.

Ceratophyllum demersum L. Po stawach, jeziorkach i brzegach rzek; Nowosiółka (nad Gniłą), Kopyczyńce, Hadyńkowce, koło Tełkówki.

C. submersum L. W jeziorkach na „Garbach“ w Cyganach.

Callitriche verna L. Po kałużach i moczarkach; w Miodoborach m. Nowosiółką a Kałaharówką.

Betulaceae.

Betula alba L. Po lasach gromadnie i po brzegach lasów sadzona; Siekierzyńce, Burdiakowce, Cygany, Jezierzany, Ułaszkwce, Rosochacz, Skorodyńce, Oryszkwce, Chorostków, Dubkowce, Postołówka.

Alnus glutinosa Gärtn. Po brzegach stawów, nad rzekami i potokami posp. prawie wszędzie. Do znaczniejszych olszniaków należą

ponad Dźwiniaczką m. Babięcami a Dźwiniaczką i na granicy Kotówki i Kopyczyniec wpoprzek gościńca.

Cupuliferae.

Carpinus Betulus L. Tworzy czyste drzewostany i główną masę lasów mieszanych, stanowiąc przeważną część lasów tej okolicy.

Corylus Avellana L. Stanowi podszycie wszystkich lasów i zarośli.

Quercus pedunculata Ehrh. Po lasach mieszanych występuje gromadnie lub rozrzucony prawie wszędzie. W gminach Głębocezek, Jezierzany, Zablotówka, Ułaszkwce, Sasolówka i Rosochacz tworzy nieprzerwany las „Halileą” zwany, dalej od tego lasu dębiny ciągną się na północ w Uhryniu, Szmańkowiecach i Szmańkowiezykach. W Czortkowie ku granicom Białej i Oryszkowiec ustępuje mieszaninie. Z mniejszych dębini istnieją w Kociubińczykach, Tlustenkiem, Sorocz („Sołomir“).

Fagus sylvatica L. W lesie Cygańskim kilka drzewek, na brzegu dębiny „Sołomir” w Sorocz widziałem dość znaczną partycję dorosłej buczyny.

Ulmaceae.

Ulmus campestris L. Po lasach rozrzucony; Cygany, Husiatyn, Olchowezyk.

Moraceae.

Morus alba L. Uprawiana w Szmańkowiezykach.

Urticaceae.

Urtica urens L. i

U. dioica L. Wszędzie posp.

Cannabineae.

Humulus Lupulus L. Po zaroślach koło rzek i potoków często; Kozaczyzna, Merława, Rosochacz, Kopyczyńce, Suchodół, Olchowezyk, Trybuchowce, Horodnica, Kręciłów, Bilka, Duminów, Kulakowce.

Salicineae.

Salix triandra L. Nad Zbruczem m. Kręciłowem a Kalaharówką, nad Seretem m. Szypowcami a Lisowcami.

S. alba L. i

S. fragilis L. Po brzegach rzek, potoków i około wsi prawie wszędzie.

S. purpurea L. Ponad rzekami, potokami i koło stawów; Dzwiniaczka, Skala, Suchodół, Thustenkie, Uwiśla, Olchowezyk.

S. viminalis L. Po miejscach podobnych; Dzwiniaczka, Skala, Kociubińce, Husiatyn, koło Kręciłowa i Kalaharówki.

S. Caprea L. i

S. cinerea L. Po brzegach lasów prawie wszędzie.

S. aurita L. Na moczarze w Kluwińcach.

S. repens L. Na łące moczarowatęj m. Samoluskowcami a Wasylkowcami.

Populus tremula L. Po zaroślach i lasach mieszanych rozrzucana, często.

Salsolaceae.

Atriplex nitens Schk. Po wsiach koło plotów posp.; Skala, Czabarówka, Krogulec, Olchowezyk, Liezkowce, Postolówka, Rasztowce, Kręciłów, Bilka, Borki, Kociubińce, Chorostków, Chłopówka, Kopyczyńce, Kotówka, Kołędziany, Sieniakowa, Tarnawka, Merława, Kozaczyzna, Jezierzany, Szypowce, Lisowce i w. in. m.

A. patula L. Po polach, ogrodach, koło dróg często; Kozaczyzna, Jezierzany, Milowce, Sasolówka, Białe, Majdan, Kopyczyńce, Kociubińce, Husiatyn, Chorostków, Postolówka, Kręciłów, Kalaharówka i w. i. m.

A. rosea L. Po wsiach i miasteczkach koło dróg i ulic; Jezierzany, Kapuścińce, Uhryń, Zalesie, Piłatkowce, Czortków, Białe, Oryszkowce, Dawidkowce, Strósówka, Kopyczyńce, Chłopówka, Chorostków, Uwiśla, Rasztowce, Kalaharówka, Rokówką, Liezkowce, Olchowezyk, Thustenkie, Kociubińce.

Kochia scoparia Schrad. Nad dolnym Zbruczem, Niezlawą i Seretem jeden z pospolitych chwastów ku północy mniej częsty. Zanotowałem nast. miejscowości powyżej Skąły, Borszezowa i Szerszeniowiec: Jezierzany, Szypowce, Kapuścińce, Zabłotówka, Skorodyńce, Kopyczyńce, Tekłówka, Thustenkie, Wasylków, Liezkowce, Borki, Sądawki.

Chenopodium Bonus Henricus L. Koło dróg, miejscami; Cygany, Zielińce, Losiacz, Kopyczyńce, Kociubińce, Chorostków, Soroka, Horodnica, Rasztowce, Sądawki.

Ch. urbeicum L.,

Ch. hybridum L. i

Ch. album L. Około dróg we wsiach i miasteczkach wszędzie posp.

Ch. glaucum L. Po miejscach podobnych posp.; Skala, Jezierzany, Kapuścińce, Milowce, Czortków, Kopyczyńce, Thustenkie, Kociubińce, Soroka, Kręciłów, Kalaharówka.

Ch. Vulvaria L. Pod płotami koło dróg we wsiach i miasteczkach; Uhryń, Chorostków, Wychwatyniec.

Ch. polyspermum L. Po polach, ogrodach, zrębach, koło dróg,

w ogóle po miejscach żyzniejszych; Głębocek, Jezierzany, Zabłotówka, Rosochacz, Zalesie, Białe, Tudorów, Kopyczyńce, Soroka.

Ch. Botrys L. Nad rowem leśnym koło dworku na Łankach w Milowcach.

Amarantaceae.

Polycnemum arvense L. Na polu koło jezierek w Zabłotówce.

Amarantus retroflexus L. Po polach, ogrodach, pustkowiach, koło dróg wszędzie posp.

A. paniculatus L. Po ogródkach i pod płotami zdziczała; Soroka, Chłopówka.

Polygoneae.

Polygonum amphibium L.

a) *natans* Mönch. Po jeziorkach i stawach; Cygany, Tlusteńkie.

b) *terrestre* Leers. Na brzegu stawu w Kopyczyńcach, nad potokiem w Grabowcu.

P. Lapathifolium L. Po polach, ogrodach, koło dróg, wszędzie posp.

P. Persicaria L. Po miejscach podobnych; Cygany, Białe.

P. Hydropiper L. Po miejscach trawnych wilgotnych wszędzie posp.

P. aviculare L. Po miejscach uprawnych i pustkowiach wszędzie posp.

P. Convolvulus L. Po polach, ogrodach i zrębach często; Łanowce, Łosiacz, Uhryń, Rasztowce, Sadržawki.

P. dumetorum L. Po zaroślach, zrębach posp.; Lisowce, Rosochacz, Sadržawki i t. d.

Rumex maritimus L. Nad Zbruczem w Skale, Olchowczyku i m. Kręciłowem a Kałaharówką, nad Seretem w Rosochaczu, Czortkowie i Tudorowie, nad stawem w Kociubińcach, koło jezierek w Zabłotówce.

R. obtusifolius L. Po miejscach upraw. i pustkowiach, po łąkach, lasach, zaroślach i koło dróg posp.; Skala, Cygany, Burdiakowce, Bednarówka, Suchodół, Oryszkowce. W Miodoborach koło Nowosiółki, Kręciłowa i Kałaharówki.

R. conglomeratus Murr. Po brzegach rzek, potoków, nad rowami; Grabowiec, Milowce, Kluwińce, Biłka i t. d.

R. nemorosus Schrad. Białe.

R. crispus L. Po łąkach, rowach, ponad rzekami i potokami, koło dróg wszędzie posp.

R. Hydrolapathum Huds. Po brzegach stawu w Kopyczyńcach, Żabińcach i Tlusteńkiem.

R. confertus Willd. Po łąkach nad Niezławą w Kotówce, Szwajkowcach, Szymańkowcach i Kołędzianach, bardzo obficie.

R. Acetosa L. Po łąkach wszędzie posp.

R. Acetosella L. var. *hastatus* Neilr. Po zrębach, pagórkach, koło pól i lasów często; Cygany, Zielńce, Grabowiec, Burdiakowce, Milowce, Uhryń, Zalesie, Czortków, Skorodyńce, Kołędziany. W Miodoborach k. Toustego.

Santalaceae.

Thesium Linophyllum L. Po suchych przyleśnych łąkach i ściankach; Zielńce, Łosiacz, Łanki w Milowcach, ścianka „Dąbrowa“ w Czortkowie.

Daphnoideae.

Daphne Mezereum L. Po lasach; Cygany, Łanki w Milowcach, Rosochacz, Uhryń, Szmańkowce, Jabłonów, Kręciłów.

Aristolochieae.

Asarum europaeum L. Po lasach wszędzie posp.

Gamopetalcae.

Plantagineae.

Plantago major L.,

P. media L. i

P. lanceolata L. Po łąkach, koło dróg, nad rzekami i t. d., wszędzie posp.

Valerianeae.

Valerianella Morisonii Koch. Na polu w Łosiaczu.

Valeriana officinalis L. Po zaroślach śródleśnych wilgotnych; Paniowce zielone, Kołodróbka, Cygany, Skąła, Zabłotówka, Ułaszkwowce, Sasolówka, Rosochacz, Uhryń, Czortków (Stawki), Szmańkowczyki.

Dipsaceae.

Dipsacus silvestris Huds. i

D. laciniatus L. Koło dróg, po brzegach lasów i pól często.

D. pilosus L. Po zaroślach wilgotnych i koło pól; Trojanówka, Suchodół, Kordolówka, Krogulec, Olehowczyk, Trybuchowce, Horodnica.

Knautia arvensis Coult. Po suchych łąkach i pagórkach, koło lasów, pól i dróg wszędzie posp.

Scabiosa Succisa L. Po łąkach przyleśnych i śródleśnych i zrębach, miejscami; Jezierzany, las „Halilea“ w Ułaskowcach, Czortków ku Hadyńkowcom, Jabłonów, Kluwińce.

S. ochroleuca L. Po suchych, skalistych i trawiastych zboczach, pagórkach, koło pól i lasów, wszędzie posp.

Compositae.

Eupatorium cannabinum L. Po mokrych łąkach, zaroślach, zrębach, nad potokami i rzekami.

a) *partitum* Neilr. Sasolówka, Kozaczyzna, Merława, Kołędziany, Czortków, Białe, Kotówka, Kopyczyńce, Biłka.

b) *indivisum* Neilr. Na ścianie w Sasolówce.

Tussilago farfara L. Na glebie gliniastej po miejscach wilgotnych wszędzie posp.

Aster Amellus L. Po ściankach, sianożęciach i suchych trawiastych pagórkach miejscami; Jezierzany, Lisowce, Ułaskowce, Rosochacz, Uhryń, Czortków (na ścianie „Dąbrowa“ i sianożęciach w dębinach ku Hadyńkowcom), Olehowczyk. W Miodoborach koło Toustego i na „Wołowej“.

Erigeron canadensis L. Po odlogach, pustkowiach a szczególnie zrębach, wszędzie bardzo posp.

E. acris L. Po suchych pagórkach, brzegach lasów i skalistych zboczach często; Łanowce, Konstancyja, Uhryń, Czortków, Skorodyńce, Tudorów, Majdan, Szmańkowce, Kopyczyńce, Soroka, Borki, Nowosiółka, Sądzawki.

Solidago Virga aurea L. Po lasach wszędzie posp.

Linosyris vulgaris Cass. in Less. Na skalistej ścianie Seretowej „Dąbrowie“ przy Czortkowie bardzo obficie.

Inula Helenium L. Po zaroślach i brzegach lasów szczególnie na miejscach wilgotnych, często; Cygany, Kozaczyzna, Kołędziany, Rosochacz, Uhryń, Dawidkowce, Jabłonów, Suchodół, Olehowczyk, Dubkowce, m. Kręciłowem a Kałaharówką, Biłka.

I. germanica L. Po zarosłych ściankach bardzo obficie w Paniowcach zielonych i na „Hłodach“ w Kołodróbce.

I. ensifolia L. Po skalistych i trawiastych ściankach; Paniowce zielone, „Hłody“ w Kołodróbce, ścianka „Dąbrowa“ przy Czortkowie. Wszędzie bardzo obficie.

I. germanico-ensifolia Neilr. Na ścianie „Hłody“ w Kołodróbce bardzo obficie pomiędzy obu popr. gatunkami.

I. salicina L. Po brzegach lasów, ściankach i sianożęciach śródleśnych, dość często; „Hłody“ w Kołodróbce, Paniowce zielone, Lisowce, „Lanki“ w Miłowcach, las „Halilea“ w Zabłotówce i Ułaskowcach, Sasolówka, Rosochacz, Zalesie (pow. Czortk.), Czortków ku Hadyńkowcom, Kociubińczyki, Wasylkowce, Kluwińce.

I. hirta L. Na sianożęci śródleśnej w lesie „Halilea“ w Ułaskowcach i na brzegu lasu koło „Grobelck“ w Łanowcach.

I. Britanica L. Po brzegach rzek i potoków, rowach, koło dróg, po pagórkach i brzegach lasów, wszędzie posp.

Pulicaria vulgaris Gaertn. Po miejscach trawnych wilgotnych koło stawów i jeziorzek, nad rzekami i potokami posp.; Skąła, Konstancyja, Kozaczyzna, Merława, Zablotówka, Czortków, Tudorów, Kołędziany, Hadyńkowiec, Tekłówka, Kotówka, Kociubińce, Tlusteńkie, Kopyczyńce, Uwiśła, Soroka, Nowosiółka (nad Gnłą), m. Kręciłowem a Kałaharówką.

Xanthium strumarium L. i

X. spinosum L. Koło dróg i po pustkowiach wszędzie posp.

Bidens tripartita L. Po miejscach mokrych z formą o liściach niepodzielonych prawie wszędzie posp.

B. cernua Huds. var. *radiata* Wim. et Grab. Podobnie.

Anthemis tinctoria L. Po suchych pagórkach, skałach, urwiskach, miedzach i brzegach lasów, często; Uście Biskupie, Sapahów, Łanowiec, Kozaczyzna, Merława, Zieliniec, Lisowiec, Sasolówka, Czortków, Szańkowiec, Kołędziany, Kociubińczyki, Suchodół, Husiatyn, Olchowczyk, Trybuchowiec, Liezkowiec i w. i. m.

A. arvensis L. Na polu w Sieniakowej.

A. Cotula L. Około wsi i dróg wszędzie posp.

Achillea Millefolium L. Około pól, ogrodów i dróg, po łąkach, pagórkach i brzegach lasów wszędzie posp.

Tripleurospermum inodorum Schultz. Po polach, ogrodach, pod płotami, koło dróg, wszędzie posp.

Tanacetum vulgare Schultz. Po brzegach pól, lasów, zaroślach i zrębach wszędzie posp.

T. Leucanthemum Schultz. Po łąkach, brzegach lasów i zrębach wszędzie posp.

T. Parthenium Schultz. Koło ogrodów miejscami; Cygany, Kopyczyńce, Uwiśła, Liezkowiec, Kręciłów.

T. corymbosum Schultz. Po brzegach lasów, zaroślach i w lasach wszędzie dość posp.

Artemisia inodora MB. Po skałach i pagórkach nad Dniestrem w Uściu Biskupim i Babińcach, nad Seretem w Rosochaczu i Czortkowie.

A. scoparia WK. Koło dróg w Uściu Biskupim.

A. procera Willd. Po płotach w Nivrze, Sieniakowej, Szydłowcach, Chłopówce, Sorocze i pod figurą w Kręciłowie.

A. austriaca Jacq. Po skalistych i jałowych zboczach i pagórkach, po gościńcach i pustkowiach, jeden z najpospolitszych gatunków nad dolnym Zbruczem, Niezławą i Seretem, sięga na północ tylko: nad Zbruczem po Zbriz, nad Niezławą po Kołędziany, nad Seretem po Czortków.

A. vulgaris L. Po zaroślach, koło dróg, płotów i t. d. wszędzie posp.

A. Absinthium L. Koło dróg, pól i po pustkowiach wszędzie posp.

Gnaphalium silvaticum L. var. *montanum* Neilr. Po lasach, zrębach i zaroślach wszędzie posp.

G. uliginosum L. Po miejscach wilgotnych i suchych, nad rzekami, potokami i po ścierniach wszędzie posp.

G. arenarium L. Po skalistych zboczach i urwiskach na ścianie „Dąbrowie“ i Kaliczówce w Czortkowie, na pagórkach nad Seretem m. Skorodyńcami a Tudorowem.

Filago arvensis L. Po suchych pagórkach i ścierniach prawie wszędzie.

Senecio vulgaris L. Koło dróg w Czortkowie.

S. vernalis WK. Po polach i zrębach często; Łosiacz, Rosochacz, Uhryń, Białe, Tudorów, Tłustenkie, Liczkowce.

S. Jacobaea L. Po suchych pagórkach, koło lasów, pól i dróg wszędzie posp.

S. nemorensis L.

a) *angustifolius* Neilr. Na „Urwanój“ ścianie w Rosochaczu, na ścianie nad Niezławą m. Kozaczyzną a Zielińcami, w lasku koło Wasylkowiec.

b) *octoglossus* Neilr. W dębinie w Kociubińczykach.

S. saracenicus L. Po brzegach rzek; nad Zbruczem m. Kręciłowem a Kałaharówką i w Biłce, nad Niezławą m. Kozaczyzną a Zielińcami, nad Seretem m. Szypowcami a Lisowcami.

S. Doria L. Po ściankach nad Seretem w Lisowcach i Milowcach.

Calendula officinalis L. Koło ogrodów dziczale; Hadyńkowce, Samoluskowce.

Echinops sphaerocephalus L. Po skalistych zboczach jarów, brzegach lasów, zaroślach, ponad rzekami i potokami, koło dróg, często; Paniowce zielone, Husiatyn, Olchowczyk, m. Kręciłowem a Kałaharówką, Biłka, Kozaczyzna, Merława, Dawidkowce, Kotówka, Szypowce, Lisowce, Sasolówka, Rosochacz, Uhryń, Czortków, Białe, Skorodyńce, Tudorów, Horodnica, Postołówka, Dubkowce, Sadržawki.

E. commutatus Juratzka. Po ściankach zarosłych rzadko; nad Zbruczem m. Olchowczykiem a Trybuchowcami i w Biłce, nad Seretem w Sasolówce i na „Urwanój“ ścianie w Rosochaczu.

Carlina vulgaris L. Na ścianie Seretowej „Bednarówce“ w Rosochaczu i na zrębie dębowym lasu „Halilea“ w Zabłotówce.

C. grandiflora Mönch. var. *caulescens* Neilr. W lesie dębowym (szczególnie na zrębach) „Halilea“ w Głębozku, Jezierzanach, Zabłotówce, Ułaskowcach i Sasolówce.

Centaurea Jacea L. Po łąkach, brzegach lasów, koło dróg, wszędzie posp.

C. phrygia L. Po zrębach, zaroślach i brzegach lasów mieszanych i dębowych; Skala, Łosiacz, Lanki w Milowcach, las „Halilea“ w Głębozku, Jezierzanach, Zabłotówce, Ułaskowcach, Sasolówce i Rosochaczu, Zalesie (pow. Czortk.), Czortków ku Hadyńkowcom, Uhryń,

Szmańkowce m. Kopyczyńcami a Uwiślą (koło karczmy Michałki), Kluwinie, Wasylkowce.

C. montana L. var. *incana* Neilr. Na zrębie dębowym w „Halilei“ Głębockiej dość obficie.

C. Cyanus L. Po polach i ugorach wszędzie posp.

C. orientalis L. Na ścianie Dniestrowej w Babińcach.

C. Scabiosa L. Po suchych pagórkach, ściankach, brzegach lasów, zaroślach, miedzach i koło dróg, wszędzie posp.

C. paniculata Jacq. Po skalistych zboczach i urwiskach, suchych pagórkach, miedzach, koło dróg; Sidorów, Husiatyn, Kotówka, Lisowce, Milowce, Czortków, Touste, Wolica i w. in. m.

Onopordon Acanthium L. Około wsi i po podworcach wszędzie często.

Carduus nutans L. Po urwiskach ścianki Dniestrowej w Babińcach.

C. acanthoides L. Około pól, ogrodów, po zrębach, skalistych zboczach jarów, pustkowiach, koło dróg, wszędzie bardzo posp.

C. crispus L. Po zapuszczonych ogrodach, mokrych łąkach, zaroślach, zrębach i brzegach lasów; Szypowce, Lisowce, Rosochacz, Uhryń, Oryszkowce, Szmańkowce, Szwajkowce, Suchodół, Liezkowce m. Kręciłowem a Kałaharówką, Biłka.

Cirsium lanceolatum Scop. Po pustkowiach, zrębach i zaroślach wszędzie posp.

C. pannonicum Gaud. W lesie „Halilea“ w Ułazkowcach.

C. rivulare Link. W dębinach; „Halilea“ w Ułazkowcach, Uhryń, Szmańkowce.

C. oleraceum Scop. Po mokrych łąkach, zaroślach i zrębach; Kolędziany, Szmańkowczyki, Szmańkowce, Szwajkowce.

C. arvense Scop. Po polach, koło dróg, po brzegach lasów, zboczach jarów i pustkowiach, wszędzie posp.

Lappa communis Coss. et Germ. Około wsi, lasów i dróg, wszędzie posp.

Serratula tinctoria L. Po łąkach zarosłych, lasach i zrębach, przeważnie w dębinach; Kociubińczyki, Burdiakowce, Łosiacz, Jezierzany, Głębocek, Lisowce, „Łanki“ w Milowcach, Ułazkowce, Sasólówka, Rosochacz, Uhryń, Czortków ku Hadyńkowcom.

Jurinea mollis Rehb. Po ściankach; nad Dniestrem w Uściu Biskupiém i w Babińcach (LENTZ), nad Zbruczem w Paniowcach zielonych, nad Seretem na „Bednarówce“ w Rosochaczu.

Lapsana communis L. Po lasach, zrębach, koło wsi; Głębocek, Cygany, Kotówka, Kopyczyńce, Czortków, Skorodyńce, Liezkowce.

Cichorium Intibus L. Po polach, łąkach, koło dróg, wszędzie posp.

Hypochoeris radicata L. Na zrębie w Tudorowie.

H. maculata L. Po łąkach przyleśnych, lasach i zrębach; Paniowce zielone, Lanowce, las „Halilea“ w Zabłotówce i Ułazkowcach, Kluwinie.

Leontodon autumnalis L. Po łąkach, pastwiskach, pagórkach i brzegach lasów; Łanowiec, Konstancz, Rosochacz, Uhryń, Tudorów, Oryszkowce, Łosiacz, Kociubińce.

L. hastilis Koch. var. *hispidus* Neir. Po pagórkach, lasach, łąkach, koło dróg, wszędzie posp.

Tragopogon major Jacq. Po pagórkach i ściankach nad Dniestrem w Uściu Biskupim i Kołodrobce.

T. orientalis L. Po łąkach, brzegach lasów i miedzach; Paniowiec zielony, Ułazkowce, Rosochacz, Uhryń, Oryszkowce, Kluwińce.

Picris hieracioides L. Po łąkach, brzegach lasów, zaroślach, koło dróg, wszędzie posp.

Sonchus arvensis L. i

S. oleraceus L. Po miejscach uprawnych i pustkowiach wszędzie często.

S. asper Vill. Po miejscach podobnych; Uhryń, Miłowiec.

S. palustris L. Nad potoczkami w zaroślach; Rosochacz, Kołdziany.

Lactuca muralis Gärtn. Po lasach; Cygany, Głębozec, Burdiakowce, Białe, Skorodyńce, Kopyczyńce, Sadzawki, Nowosiółka, (w Miodoborach) Wolica, Kałaharówka.

L. quercina L. var. *pinnatifida* Bisch. Tylko na ściance lesistej w Paniowiecach zielonych.

L. Scariola L. Po zrębach, zaroślach, ogrodach i pustkowiach wszędzie dość posp.

L. saligna L. Po skalach nad Dniestrem w Chudykowiecach.

Taraxacum officinale Wigg. Koło dróg; Łosiacz, Husiatyn, Olchowczyk, Horodnica, Chorostków i t. d.

Crepis tectorum L. Po polach, koło dróg, po suchych pagórkach i pustkowiach; Uhryń, Tudorów, Touste, Sadzawki, Wolica.

C. sibirica L. Po ściankach lesistych nad Seretem w Sasolówce i Rosochaczu, na brzegu lasu koło Wasylkowiec.

Hieracium Pilosella L. Po pagórkach trawiastych, brzegach lasów, koło dróg; Miłowiec, Sasolówka, Czortków, Tudorów, Husiatyn, Soroka, Kałaharówka.

H. Auricula L. Po miejscach podobnych; Oryszkowce, Jabłonów, Soroka, Trybuchowce, Borki, Sadzawki.

H. praealtum Vill. Po łąkach przyleśnych, wszędzie posp.

H. cymosum L. Po zrębach; Uhryń ku Sieniakowej, Liezkowce.

H. virosum Pall. Na ściance lesistej nad Zbruczem w Paniowiecach zielonych i na ściance „Dąbrowie“ w Czortkowie. W obu miejscach obficie.

H. umbellatum L. Po brzegach lasów, łąkach przyleśnych i śródleśnych i pagórkach trawiastych posp.; Winiatyńce, Głębozec, Jezierzany, Zabłotówka, Łosiacz, Czortków, Białe, Olchowczyk, Wasylkowiec, Soroka i w. i. m.

Campanulaceae.

Phyteuma canescens WK. Po ściankach; nad Niczlawą m. Szmańkowcami a Szwajkoweami, nad Seretem w Lisowcach, Sasolówce, Rosochaczu, Czortkowie (ścianka „Dąbrowa“). W Miodoborach na „Wolowój“ nad Sádzawkami.

Campanula bononiensis L. Po brzegach lasów, ściankach, pagórkach, miedzach, koło dróg, często; Paniowce zielone, Lanowce, Kozaczyzna, Lisowce, Milowce, Zabłotówka, Rosochacz, Czortków, Szmańkowce, Strósówka, Szwajkowce, Kociubińczyki, Husiatyn, Rasztowece: Kluwińce, Sádzawki, Bilka.

C. Trachelium L. Po lasach często; Cygany, Lisowce, Rosochacz, Uhryń, Losiacz, Burdiakowce Kopyczyńce, Jabłonów, Suchodół, Husiatyn, Horodnica, Kręciłów, Nowosiółka (w Miodoborach), Sádzawki, Bilka i w. i. m.

C. latifolia L. W lesie grabowym w Cyganach.

C. rapunculoides L. Po brzegach lasów, zaroślach, zrębach i karczunkach; Losiacz, Kołędziany, Białe.

C. patula L. Po łąkach i brzegach lasów, wszędzie posp.

C. persicifolia L. Po brzegach lasów, zaroślach i zrębach, wszędzie posp.

C. Cervicaria L. Po zrębach, zaroślach i brzegach lasów; las „Halilea“ (Jezierzany, Ułaszkwce, Sasolówka), Kociubińczyki.

C. glomerata L. Po łąkach, brzegach lasów i zaroślach, wszędzie posp.

C. sibirica L. Po skalistych zboczach jarów i suchych pagórkach; nad Zbruczem w Husiatynie i Olchowezyku, nad Niczlawą w Szmańkowcach, nad Seretem w Sasolówce. W Miodoborach na Wolowój, w Toustem, Rasztowach i Wolicy. Nad dolnym Zbruczem, Niczlawą i Seretem wszędzie posp.

Adenophora lilifolia Bess. Po zrębach dębowych; las „Halilea“ (w Głębozku, Jezierzanych i Zabłotówce), ścianka „Bednarówka“ nad Seretem w Rosochaczu, Czortków ku Szmańkowcom.

Rubiaceae.

Galium Cruciata Scop. W lesie mieszanym w Kopyczyńcach.

G. verum Scop. Po lasach, zaroślach, łąkach, wszędzie posp.

G. Aparine L. Po płotach, krzakach, polach i zrębach; Szydłowce, Trojanówka, Suchodół, Husiatyn, Lanowce, Uhryń, Białe, Tudorów, Chłopówka, Sádzawki i w. i. m.

G. palustre L. Po moczarach, brzegach stawów i jeziorok; Cygany, Stawki w Czortkowie.

G. silvaticum L. Po lasach często; Skala, Cygany, Losiacz, Burdiakowce, Kołędziany, Rosochacz, Uhryń, Białe i w. i. m.

G. verum L. Po łąkach, miedzach, pagórkach i skałach wszędzie posp.

G. Mollugo L. Podobnież.

Asperula cynanchica L. Po skałach, łąkach suchych, pagórkach trawiastych, wszędzie posp.

A. odorata L. Po lasach wszędzie dośe posp.

A. Aparine MB. Po moczarach zarosłych; Kołędziany, Stawki w Czortkowie.

A. galioides MB. Na ściance „Bednarówce“ nad Seretem w Rosohaczu i na ściance „Dąbrowie“ w Czortkowie.

Lonicereae.

Lonicera Xylosteum L. Po lasach i zaroślach; Zablotówka (las „Halilea“), Czortków, Białe, Szydłowie, Kręciłów.

Viburnum Lantana L. Po lasach i zaroślach razem z leszczyną stanowi podszycie; wszędzie.

V. Opulus L. Po lasach i zaroślach rozrzuciona; Cygany, Łosiacz, Kociubińczyki, Sasolówka, Czortków ku Kopyczyńcom, Kopyczyńce, Jabłonów, Trybuchowce, Kręciłów, Sadržawki.

Sambucus Ebulus L. Po lasach i pustkowiach, koło dróg i lasów, wszędzie posp.

S. nigra L. Po lasach i zaroślach; Oryszkowce, Suchodół, Trybuchowce, Bilka.

Oleaceae.

Fraxinus excelsior L. Po lasach i ściankach; Lisowce, Cygany, Burdiakowce, Kopyczyńce, Oryszkowce, Skorodyńce, Tudorów, koło Wasylkowice, Sadržawki i w. i. m. W wielu miejscach uprawiany.

Asclepiadeae.

Vincetoxicum officinale Mönch. Po suchych trawiastych pagórkach i ściankach, brzegach lasów, łąkach przyleśnych i śródleśnych, często; Lisowce, Milowce, Zablotówka, Jezierzany, Sasolówka, Czortków, Kociubińczyki.

Gentianeae.

Gentiana cruciata L. Po suchych trawiastych pagórkach, ściankach, łąkach przyleśnych i śródleśnych; Głębozec, Lisowce, Zablotówka, Zielńce, Uhryń, Kociubińczyki, koło Wasylkowice, Rasztowce, Sadržawki. Wszędzie bardzo obficie.

G. Pneumonanthe L. Po sianozęciach na zrębach dębowych w Ułaszkwcach („Halilea“) i Czortkowie (ku Hadyńkowcom) oraz na łące m. Samołuskowcami a Wasylkowcami.

Erythraea Centaurium Pers. Po pagórkach trawiastych, koło lasów, pól i dróg, wszędzie często. Odmianę o kwiatach zupełnie białych znalazłem w dwóch okazach w Paniowcach zielonych.

E pulchella Fries. Po łupkach na zboczach w Chudykowcach, na żwirze nad Seretem w Lisowcach i Milowcach, koło źródła pod skałą w Zwiąhlu.

Menyanthes trifoliata L. Po moczarach; Konstancyja, Stawki w Czortkowie, Kluwińce.

Labiatae.

Mentha silvestris L. Po zaroślach wilgotnych, nad potokami, rzekami, rowami i t. d. wszędzie posp.

M. arvensis L. var. *genuina* Neilr. Po polach, łąkach mokrych, zaroślach, lasach, około wód wszędzie posp.

Lycopus europaeus L. Po rowach, zaroślach, moczarach, brzegach rzek, stawów i na zrębach, wszędzie dość posp.

L. exaltatus L. fil. Po moczarach; na „Garbach“ w Cyganach, na sianożęciu m. Samołoskowcami a Wasylkowcami.

Salvia glutinosa L. Po zaroślach przyleśnych i śródleśnych, brzegach lasów, wszędzie często.

S. pratensis L. Po miedzach, koło dróg, po suchych łąkach, pagórkach i ściankach, często; Kołodróbka, Wołkowce pod (Borszczowem), Cygany, Łosiacz, Zablotówka, Rosochacz, Uhryń, Kołędziany, Szmańkowce, Szwajkowce, Husiatyn i w. i. m.

S. dumetorum Andrż. Jak poprz. gat.; Słobódka Muszkatowiecka, Łanowce, Szmańkowce, Szwajkowce, Olehowczyk, Borki.

S. silvestris L. Po pagórkach trawiastych, ściankach, brzegach lasów, około pól i dróg wszędzie posp. od Dniestru na północ (m. Niczlawą a Seretem) aż po Białe, Oryszkowce i Kopyczyńce, nad Zbruczem aż po Kałaharówkę, nad Gniłą w Nowosiółce i Borkach.

S. verticillata L. Około pól i dróg wszędzie częsta.

Origanum vulgare L. Po brzegach lasów, zaroślach i łąkach przyleśnych, wszędzie posp.

Thymus Serpyllum L. Po pagórkach, około pól i dróg wszędzie posp.

Calamintha Acinos Clairv. Po suchych trawiastych pagórkach, skalistych zboczach jarów i urwiskach, wszędzie posp.

C. Clinopodium Benth. Po lasach i zaroślach wszędzie często.

Prunella vulgaris L. Po łąkach, brzegach lasów, lasach, pagórkach, wszędzie posp.

P. grandiflora Jacq. Po suchych pagórkach, łąkach, przyleśnych i śródleśnych zrębach; Łosiacz, Zielińce, Łanowce, Zablotówka, Ułaszkwce, Czortków (ku Hadyńkowcom), Kociubińczyki.

Scutellaria galericulata L. Koło jeziorok w Cyganach.

S. altissima L. Po ściankach lesistych; nad Dniestrem w Uściu

Biskupiem (LENTZ) i Kołodróbce, nad Zbruczem w Suchodole i kolo Kręciłowa, nad Seretem w Sasolówce, Rosochaczu i Uhryniu.

Nepeta Cataria L. Po zaroślach, zrębach, pustkowiach i pod płotami prawie wszędzie.

N. nuda L. Po brzegach lasów, zaroślach około dróg; Kościelniki, Zazulińce, Cygany, Kozaczyzna, Merława, Głęboczek, Milowce, Lisowce, Rosochacz, Uhryń, Łosiacz, Kociubińczyki, Tłusteńkie, Husiatyn i w. i. m.

Melittis Melissophyllum L. Po zaroślach przyleśnych; Łosiacz, Łanki w Milowcach, Ułaskowce („Halilea“).

Lamium amplexicaule L. Po polach; Łosiacz, Czortków, Orszkowiec.

L. purpureum L. Po polach i ogrodach; Orszkowiec.

L. maculatum L. Po miejscach wilgotnych cienistych; Cygany, Rosochacz, Uhryń, Suchodół, Wasylkowce, Trybuchowce, Bilka.

L. album L. Koło płotów; Trojanówka, Suchodół, Trybuchowce, Liezkowce.

Leonurus Cardiaca L. Około wsi wszędzie posp.

Chaeturus leonuroides Willd. Pod płotami często; Sapahów, Słobódka Muszkatowiecka, Konstancyja, Kozaczyzna, Dawidkowce, Szmańkowiezyki, Szmańkowce, Czortków, Białe, Skorodyńce, Tudorów, Kopyczyńce, Kociubińce, Burdiakowce, Gusztyn, Szydłowce, Bednarówka, Suchodół, Liezkowce, Dubkowce, Rasztowce, Touste, Chłopówka.

Galeopsis Ladanum L. Po polach i ugorach wszędzie posp.

G. Tetrahit L. Około pól i ogrodów, po zaroślach i zrębach posp; Cygany, Łanowce, Łosiacz, Sidorów i t. d.

G. pubescens Bess. Po miejscach jak poprz. gat., często; Skala, Łosiacz, Zabłotówka, Białe, Majdan, Orszkowiec, Kopyczyńce, Sidorów, Olehowczyk, Liezkowce, Uwiśla, Chłopówka, Nowosiółka (w Miodoborach), Sadržawki, Wolica, Kręciłów.

G. speciosa Mill. Jak poprz. gat. często; Skala, Cygany, Łosiacz, Rosochacz, Uhryń, Czortków, Białe, Skorodyńce, Tudorów, Wasylkowce, Olehowczyk, Trybuchowce, Kręciłów, Bilka, Sadržawki, Nowosiółka (w Miodoborach).

Stachys germanica L. Po skałach suchych, pagórkach, brzegach lasów, około dróg, wszędzie często.

S. silvatica L. Po wilgotnych zaroślach i zrębach; Kołodróbka, Wolkowce (pod Borszczowem), Łanowce, Cygany, Łosiacz, Rosochacz, Czortków, Białe, Skorodyńce, Orszkowiec, Kopyczyńce, Burdiakowce, Suchodół, Trybuchowce, Kręciłów, Bilka, Sadržawki, Nowosiółka (w Miodoborach).

S. palustris L. Po polach wilgotnych, zrębach, rowach, około rzek i potoków, często; Cygany, Kozaczyzna, Zielińce, Łanowce, Jezierzany, Łosiacz, Szmańkowce, Szwajkowce, Białe, Majdan, Kotówka, Dębówka, Bosyry, Suchodół, Samońskowce, Wasylkowce, Nowosiółka (w Miodoborach).

S. annua L. Po polach i ugorach, wszędzie posp.

S. recta L. Po skałach, suchych pagórkach, brzegach lasów, około pól i dróg, miejscami; Głębozec, Milowce, Rosochacz, Czortków, Husiatyn, Olchowczyk, Trybuchowce, Soroka, Kluwińce, Nowosiółka (nad Gniłą).

Betonica officinalis L. Po łąkach, zaroślach, zrębach i brzegach lasów, wszędzie posp.

Marrubium vulgare L. Po ulicach wsi i miasteczek, po pustkowiach, wszędzie posp.

Ballota nigra L. Po zaroślach, zrębach, pod płotami i. t. d. wszędzie posp.

Phlomis tuberosa L. Na ścianie „Hłody“ w Kołodróbce i na śc. „Urwanéj“ w Rosochaczu.

Teucrium Chamaedrys L. Po skałach i suchych pagórkach trawiastych, prawie wszędzie często.

Ajuga reptans L. Po brzegach lasów i zrębach, często; Uhryń, Białe, Jabłonów, Trybuchowce, Liczkowce, m. Nowosiółka a Kałaharówką.

A. genevensis L. Po lasach i miedzach; Głębozec, Łanowce.

A. Chamaepitys Schreb. Po skałach nad Dniestrem w Babińcach.

A. Laxmanni Benth. Po skalistych ściankach; nad Dniestrem w Babińcach (LENTZ) i Kołodróbce, nad Seretem w Sasolówce, nad Zbruczem w Husiatynie, nad Gniłą w Postolówce.

Verbenaceae.

Verbena officinalis L. Około wsi, dróg i pól, wszędzie posp.

Asperifoliae.

Cerinth minor L. Po skalistych zboczach, suchych pagórkach, około pól i dróg, miejscami; Suchodół, Husiatyn, Kozaczyzna, Merława, Szańkowce, Sz wajkowce, Hadyńkowce, Teklówka, Lisowce, Milowce, Sasolówka, Rosochacz, Uhryń.

Echium vulgare L. Po skalistych zboczach, pagórkach, około dróg, wszędzie posp.

E. rubrum Jacq. Po ściankach nad Dniestrem w Babińcach i nad Seretem w Czortkowie (śc. „Dąbrowa“).

Pulmonaria officinalis L. Po lasach; Kopyczyńce, Miodobory (m. Nowosiółka a Kałaharówką) i w. i. m.

Nonnea pulla DC. Po polach, ugorach i koło dróg, miejscami; m. Głębozkiem a Wysuzką, Kociubińczyki, Wasylków, Husiatyn, Kozaczyzna, Zielińce, Merława, Kołędziany, Lisowce, Milowce, Sasolówka, Rosochacz, Uhryń, Czortków.

Anchusa officinalis L. Około pól i dróg, miejscami; Uście Biskupie, Gusztyn, Milowce, Rosochacz, Uhryń, Czortków, Skorodyńce, Tudorów, Sz wajkowce, Hadyńkowce, Teklówka, Krzyweńkie.

A. Barrelieri Vitm. Po ściankach; nad Dniestrem w Babińcach (LENTZ) i Kołodróbce, nad Zbruczem w Paniowcach zielonych.

A. arvensis MB. Po polach i koło dróg, miejscami; Łosiaz, Czortków, Białe, Oryszkowce, Kotówka, Kopyczyńce, Tudorów, Soroka.

Myosotis palustris Roth. Po moczarach; Dzwiniaczka, Stawki w Czortkowie.

M. intermedia Link. Po pagórkach, polach, ugorach; Łanowce, Łosiaz, Bednarówka, Suchodół, Tłusteńkie, Borki, Rasztowce.

M. sparsiflora Mikan. Na zrębie w Paniowcach zielonych.

Symphytum officinale L. Po mokrych łąkach, prawie wszędzie.

S. tuberosum L. Na zrębie w Uhryniu (ku Sieniakowy).

Cynoglossum officinale L. Po skalistych zboczach, pustkowiach i około dróg, wszędzie posp.

Echinosperrnum Lappula Lehm. Po skalistych zboczach, pagórkach, pustkowiach i około dróg, wszędzie posp.

Convolvulaceae.

Convolvulus arvensis L. Po polach i ugorach; Miłowce, Kołędziany.

C. sepium L. Po zaroślach nad wodami; nad Dniestrem w Kołodróbce, nad Niezławą m. Kozaczyzną a Merławą i w Kołędzianach, nad Seretem w Szypowcach, Lisowcach, Rosochaczu i Uhryniu, nad Zbruczem w Olchowczyku, Trybuchowcach m. Kręciłowem a Kałaharówką i w Biłce, nad Gniłą w Liezkowcach.

Cuscuta europaea L. Po ziołach i krzewach; Szańkowczyki, Szańkowce, Kołędziany.

C. Epithymum L. Po łąkach na zrębach dębowych w Czortkowie (ku Hadyńkowcom).

Solaneae.

Datura Stramonium L. Około wsi i miasteczek prawie wszędzie.

Hyoscyamus niger L. Podobnie.

Physalis Alkekengi L. Po lesistych ściankach; nad Dniestrem w Babińcach (LENTZ), nad Zbruczem w Paniowcach zielonych.

Solanum nigrum L. Po pustkowiach, polach i ogrodach warzywnych, wszędzie posp.

S. Dulcamara L. Po zaroślach wilgotnych nad wodami; Cygany, Skorodyńce, Kopyczyńce, Kociubińce, Żabińce, Tłusteńkie, Uwiśla.

Lycium barbarum L. Po wszystkich wsiach używane na żywe płoty.

Scrofularineae.

Verbascum phlomoides L. Po pustkowiach, około dróg, po pagórkach, prawie wszędzie posp.

V. Lychnitis L. Po skalistych zboczach jarów i pagórkach, często; nad Dniestrem w Kołodróbec, Uściu Biskupiem i Chudykowcach, nad Zbruczem w Suchodole, Husiatynie, Olchowczyku i Kałaharówee, nad Gniłą (w Miodoborach) w Horodnicy, Sadszawkach i Toustem, nad Niezławą w Kozaczyźnie, Kołędzianach, Szmańkowcach i Szwałkowcach, nad Seretem w Lisowcach, Kapuścińcach, Sasolówce, Rosochaczu i Czortkowie.

V. nigrum L. Około dróg, pól i lasów prawie wszędzie często.

Scrofularia nodosa L. Po lasach, zaroślach, zrębach, około wsi, często prawie wszędzie.

S. aquatica L. Po podmokłych brzegach rzek, potokach i rowach; Chudykowie, Skala, Cygany, Kozaczyzna, Merława, Kołędziany, Szmańkowczyki, Kotówka, Rosochacz, Nowosiółka (w Miodoborach), Sadszawki, Tlusteńkie.

Linaria minor Desf. Po skalistych zboczach i zarinkach nad Zbruczem aż po Olchowczyk i nad Seretem aż po Tudorów, posp.

L. genistifolia Mill. Nad Dniestrem w Kołodróbec i Babińcach.

L. vulgaris Mill. Po łąkach, pagórkach, skałach, około dróg, wszędzie posp.

Digitalis ambigua Murr. Po brzegach lasów, zaroślach i zrębach; Głębozec, Jezierzany, Zabłotówka, Ułaskowce, Sasolówka, Rosochacz, Czortków, Szmańkowie, Łosiacz, Burdiakowie, Kociubińczyki, Kluwińce, Sadszawki, Bilka.

Limosella aquatica L. Na namulistym brzegu Zbrucza w Husiatynie i na namuliskach jeziorok w Zabłotówce.

Veronica scutellata L. Po łąkach moczarowatych; Sapahów (LENTZ), Cygany m. Samoluskowcami a Wasylkowcami.

V. Anagallis L. Ponad rzekami, potokami i w rowach, posp.; Skala, Jezierzany, Lanowce, Cygany, Grabowiec, Lisowce, Rosochacz, Kopyczyńce, Bosyry.

V. Beccabunga L. Po miejscach, jak poprz. gat.; Grabowiec, Konstancyja, Rosochacz, Tlusteńkie.

V. Chamaedrys L. Po łąkach, brzegach lasów, zrębach; Uhryń, Tlusteńkie, Liczkowce, Jabłonów.

V. officinalis L. Po zrębach w Miodoborach (Liczkowce, Nowosiółka, Wolica).

V. latifolia L. Po ściankach i zrębach zwłaszcza dębowych; Głębozec (las „Halilea“), Miłowce („Łanki“), Rosochacz, Czortków ku Szmańkowcom, Skorodyńce.

V. dentata Schm. Po ściankach nad Dniestrem w Uściu Biskupiem i nad Seretem w Czortkowie (śc. „Dąbrowa“), po pagórkach koło lasu ponad Słobódką Muszkatowiecką.

V. austriaca L. Po ściankach i pagórkach; Niwra (LENTZ), Paniowce zielone, Sasolówka.

V. prostrata L. Na ścianie „Dąbrowie“ w Czortkowie.

V. longifolia L. Na ścianie „Hłody“ w Kołodróbec i na sianożęciach w dębinach Czortkowskich.

V. spicata L. Po suchych pagórkach, łąkach, brzegach lasów i zaroślach, wszędzie dość posp.

V. incana L. Na ścianie „Dąbrowie“ w Czortkowie i po wzgórzach w Miodoborach (Touste, Wołowa).

V. serpyllifolia L. Po brzegach lasów; Niwra (LENTZ), Łanowce, Skorodyńce.

V. arvensis L. Po polach w Niwrze (LENTZ).

V. Buchbaumii Ten. Po polach i ugorach, wszędzie posp.

Euphrasia officinalis L. Po łąkach, pagórkach i ściankach, wszędzie posp.

E. Odontites L. Po łąkach w Tlusteńkiem.

Rhinanthus Crista galli L. Po łąkach; Łosiacz, Czortków, Zielńce.

Melampyrum cristatum L. Po łąkach śródleśnych i zrębach; las „Halilea“ w Rosochaczu i Zabłotówce, Czortków, Kociubińczyki.

M. arvense L. Na ścianie „Hłody“ w Kołodróbce.

M. nemorosum L. Po lasach, zaroślach i zrębach, wszędzie posp.

Primulaceae.

Lysimachia vulgaris L. Po miejscach mokrych zarosłych; Paniuco Zielone, Skąta, Cygany, Ułaszkwce (las „Halilea“), Czortków (Stawki), Kopyczyńce, Kołędziany, nad Zbruczem m. Kręciłowem a Kałaharówką.

L. nummularia L. Po miejscach wilgotnych i cienistych, często; Skąta, Cygany, Kozaczyzna, Merława, Uhryń, Białe, Skorodyńce, Kótówka, Kopyczyńce, Tlusteńkie, Suchodół, Trybuchowce, Liczkowce, Soroka, Nowosiółka (w Miodoborach), Wolica, Biłka.

Anagallis arvensis L. var. *phoenicea* Neilr. Po polach, ogrodach i około dróg, wszędzie dość posp.

Ericaceae.

Pirola rotundifolia L.,

P. minor L.,

P. secunda L. i

P. umbellata L. Wszystkie te gatunki zebrane przez P. LENTZA po raz pierwszy w r. 1877 w lesie Niwrzańskim „Glinka“.

Umbelliferae.

Sanicula europaea L. Po lasach wszędzie częsta.

Astrantia major L. Po brzegach lasów i zaroślach, często; Cygany, Łosiacz, Ułaszkwce, Rosochacz, Szańkowce, Biłka i w. i. m.

Eryngium campestre L. Po pagórkach, skałach, około pól i dróg, wszędzie posp.

E. planum L. Po łąkach, miedzach, brzegach lasów, zaroślach i koło dróg, wszędzie częsty.

Cicuta virosa L. Po brzegach stawów w Kopyczyńcach, Żabińcach i Tłusteniem.

* *Trinia Kitaibelii* MB. Na ścianie „Hłody“ w Kołodróbce, bardzo obficie.

Falcaria Rivini Host. Około pól wszędzie często.

Aegopodium Podagraria L. Po lasach; Cygany, Łosiacz, Burdiakowce, Skorodyńce, Tudorów, Szydłowce, Suchodół i t. d.

Pimpinella saxifraga L. var. *pubescens* Neilr. Po łąkach, pagórkach, około pól i dróg, wszędzie posp.

P. magna L. Po brzegach lasów i zaroślach; Sasolówka, Rosochacz, Uhryń, Szymańkowce, Kociubińczyki.

Sium angustifolium L. Po moczarach; Paniowce zielone, Szymańkowczyki, Szwałkowce, Tłustenkie.

Bupleurum falcatum L. Po skalach, pagórkach i ściankach, wszędzie dość posp.

B. rotundifolium L. Pod płotem w Strósówce.

Oenanthe Phellandrium Lam. Po brzegach rzek, stawów i jeziorok; Dzwiniaczka, Cygany, Kozaczyzna, Konstancyja.

Aethusa Cynapium L. Po zaroślach wilgotnych, około pól i ogrodów, posp.; Lisowce, Milowce, Jezierzany, Łosiacz, Dawidkowce, Szymańkowczyki, Strósówka, Kociubińce, Olehowczyk, Rasztowce, Kręciłów i t. d.

Seseli annuum L. Po pagórkach, ściankach, łąkach przyleśnych i śródleśnych, zaroślach i zrębach, wszędzie posp.

Selinum Carvifolia L. Po łąkach, brzegach lasów, zaroślach; Skala, Łosiacz, Jabłonów, Uhryń, Szymańkowce, Nowosiółka (w Miodoborach).

Angelica silvestris L. Po łąkach, lasach i zaroślach; Stawki w Czortkowie, Rosochacz.

Ferulago silvatica Bess. Po zrębach przeważnie dębowych bardzo obficie; Łosiacz, Zielińce, Czortków ku Hadyńkowcom i Szymańkowcom, Ułaszkwce, Sasolówka, Rosochacz.

Peucedanum Chabraei Gaud. podana przeze mnie w t. XI Spraw. Kom. fiz. z pytajnikiem dla braku owoców, po przysłaniu mi owocujących okazów przez P. LENTZA z tegoż miejsca, potwierdza się.

P. Cervaria Cuss. in Lapeyr. Po zrębach dębowych na sianożęciach; Jezierzany, Zabłotówka, Ułaszkwce, Rosochacz, Czortków ku Hadyńkowcom, Kluwińce.

P. Oreoselinum Münch. Jak poprz. gat.; Łosiacz, Zielińce, Jezierzany, Głębozec, Ułaszkwce, Czortków ku Szymańkowcom, Hadyńkowcom i Oryszkowcom, Soroka, Kluwińce.

P. alsaticum L. Po brzegach lasów, ściankach i zrębach; Lisowce, Sasolówka, Rosochacz (śc. „Urwana“), Czortków (śc. „Dąbrowa“), Wasylkowce, Husiatyn, Liczkowce, Kluwińce.

Pastinaca sativa L. Po zaroślach, brzegach lasów, łąkach, pa-

górkach i skałach często; Szypowce, Lisowce, Milowce, Sasolówka, Rosochacz, Czortków, Skorodyńce, Hadyńkowce, Kotówka, Suchodół, Olchowczyk, Liezkowce, Kręciłów, Kałaharówka, Biłka.

Heracleum Sphondylium L. var. *sibiricum* (*H. flavescens* Bess.). Po łąkach, zaroślach i brzegach lasów, często; Skała, Łosiacz, Zielńce, Kozaczyzna, Zabłotówka, Sasolówka, Szmańkowczyki, Szmańkowce, Kołędziany, Szwajkowce, Suchodół. I podania moje w t. XI Spraw. Kom. fiz. do tej odmiany odnoszą się.

Laserpitium latifolium L. Po ściankach i zrębach dębowych posp.; Łosiacz, Jezierzany, Głębozec, Zabłotówka, Ułazkowce, Sasolówka, Rosochacz, Czortków, Kociubińczyki, Kluwińce, Kręciłów.

L. prutenicum L. Po brzegach lasów, zrębach i zaroślach; las „Halilea“ w Jezierzanach, Zabłotówce i Ułazkowcach, Czortków ku Szmańkowcom.

Daucus Carota L. Po łąkach, brzegach lasów, zaroślach, około pól i dróg, wszędzie posp.

Torilis Anthriscus Gmel. Po lasach i zaroślach prawie wszędzie posp.

Anthriscus silvestris Hoffm. Koło ogrodów i w zaroślach; Cygany, Suchodół, Ułazkowce.

Chaerophyllum temulum L. Po lasach; Kudryńce, Słobódka Muszkatowiecka, Cygany, Tudorów, Sidorów, Suchodół.

Ch. bulbosum L. Po zaroślach wilgotnych; Paniowce zielone, Zabłotówka, Rosochacz, Kołędziany, Kotówka, Suchodół.

Ch. aromaticum L. Po brzegach lasów, zaroślach i około ogrodów posp.; Kołodróbka, Borszczów, Skała, Łosiacz, Jezierzany, Sasolówka, Rosochacz, Białe, Tudorów, Oryszkowce, Kopyczyńce, Suchodół, Trybuchowce, Liezkowce, Nowosiółka (w Miodoborach), Kręciłów, Kałaharówka.

Conium maculatum L. Koło pól miejscami; Łanowce, Gusztyń, Łosiacz, Krzyweńkie, Sidorów, Husiatyn, Rosochacz, Czortków, Szwajkowce, Uwiśla, Chłopówka, Chorostków, Horodnica, Dubkowce.

Bifora radians MB. Na ścianie Dniestrowej w Babińcach (LENTZ).

Araliaceae.

Hedera Helix L. Po lasach; Germakówka, Miodobory (m. Nowosiółką a Kręciłowem).

Corneae.

Cornus sanguinea L. Po brzegach lasów, i w lasach jako podszycie, wszędzie posp.

C. mas L. Po ściankach nad Seretem w Sasolówce, Rosochaczu i Czortkowie, nad Zbruczem w Biłce.

Crassulaceae.

Sedum Telephium L. var. *ochroleucum* Neilr. Po brzegach lasów, pagórkach i skałach wszędzie częsty.

S. acre L. Po skałach i suchych pagórkach, wszędzie posp.

S. sexangulare L. Po skałach na ścianie „Dąbrowie“ w Czortkowie.

Ranunculaceae.

Clematis recta L. Po brzegach lasów, zaroślach i zrębach prawie wszędzie częsty.

Thalictrum aquilegifolium L. Po zrębach; las „Halilea“ w Jezierzanach i Zabłotówce.

Th. minus L. Po pagórkach, skałach, zaroślach i brzegach lasów często; Paniowce zielone, Rosochacz, Czortków, Szmańkowce, Szwajkowce.

Th. simplex L. Po zrębach w Zielińcach.

Th. angustifolium L. Po wilgotnych łąkach, zaroślach i zrębach; Paniowce zielone, Cygany, Łanowce, Ułaszkwowce, Czortków, Suchodół, Nowosiółka (w Miodoborach).

Anemone hepatica L. Po lasach wszędzie posp.

Adonis aestivalis L. Po polach; Chudykowce.

A. vernalis L. Po skalistych zboczach jarów i ściankach; Chudykowce, Kołodróbka, Lisowce, Milowce, Zabłotówka, Sasolówka, Rosochacz, Czortków, Kozaczyzna, Szmańkowce, Szwajkowce, Husiatyn.

Ranunculus aquatilis L. var. *homophyllus* Wallr. W potoczku na granicy Kotówki i Kopyczyniec.

R. Lingua L. Na moczarze zarosłym na Stawkach w Czortkowie.

R. auricomus L. Na zrębie w Uhryniu.

R. Steveni Andrż. Po łąkach i zrębach; Nivra (LENTZ), Iwanów, Stawki w Czortkowie, Białe, Tudorów, m. Kręciłowem a Wychwatyńcami (w dolinie Zbruczu).

R. lanuginosus L. W lesie w Cyganach.

R. polyanthemos L. Na zrębie w Uhryniu.

R. repens L. Po miejscach mokrych; Husiatyn, Uwiśla.

R. sardous Cr. Około dróg i pól posp.; Łanowce, Cygany, Grabowiec, Uhryń, Czortków, Tudorów, Kociubińce, Husiatyn i t. d.

R. sceleratus L. Ponad wodami, często; Horoszowa, Uście Biskupie, Paniowce zielone, Dzwiniaczka, Łanowce, Cygany, Grabowiec, Lisowce, Rosochacz, Czortków, Tudorów, Suchodół, Husiatyn.

Caltha palustris L. Po łąkach mokrych; Łanowce, Grabowiec, Szmańkowczyki, Szmańkowce, Szwajkowce, Kotówka, Kociubińce, Tlusteńskie, Kluwińce.

Helleborus purpurascens WK. Liście znalazłem na ścianie „Urwanj“ nad Seretem w Rosochaczu. Ze ścianki „Dąbrowy“ w Czortkowie mam okazy z kwiatem od P. BUSCHAKA.

Nigella arvensis L. Po skalistych zboczach nad Seretem w Kapuścińcach, Zabłotówce, Uhryniu, Czortkowie i nad Niczławą w Kołędzianach.

Delphinium Consolida L. Po polach i ugorach; Burdiakowce, Bosyry, Husiatyn, Kapuścińce, Rosochacz i t. d.

Aconitum Anthora L. *flore ochroleuco*. Na stoku „Wołowej“ nad Sazawkami w Miodoborach. *Var. fl. violaceo*. Nad „Brydną“ w Czortkowie (BUSCHAK).

A. Lycoctonum L. *var. ochroleucum* Neilr. Na ściankach nad Seretem w Sasolówce i Rosochaczu.

Cimicifuga foetida L. Po brzegach lasów, zaroślach i zrębach; Jezierzany, m. Kozaczyzną a Merławą (na śc. nad Niczławą), Zabłotówka, Ułaskowce, Sasolówka, Rosochacz, Szmańkowce, Kociubińczyki, Tłusteńkie, Sazawki.

Papaveraceae.

Cheledonium majus L. Koło płotów i zarośli; Skala, Suchodół, Horodnica, Tudorów.

Papaver Rhoeas L. Po polach, ogrodach, skałach i pustkowiach; Rosochacz, Skorodyńce, Tudorów, Bednarówka, Chłopówka, Postolówka, Touste i w. in. m.

Glaucium corniculatum Curt. Koło pól i po skalistych zboczach; Chudykowce, Lisowce, Milowcê, Postolówka.

Fumaria officinalis L. Po polach; Czortków, Oryszkowce, Wasylkowce.

F. rostellata Knaf. Na polu w Białem.

F. parviflora Bert. Na gościńcu w Krzywczu.

Cruciferae.

Arabis hirsuta Scop. Na ścianie „Urwaněj“ w Rosochaczu.

Dentaria bulbifera L. W lesie grabowym w Cyganach.

Sisymbrium officinale Scop. Około wsi i dróg, po pustkowiach, wszędzie posp.

S. Loeselii L. Po skalistych zboczach, pustkowiach, około pól i dróg; m. Nowosiółką a Zalesiem nad Zbruczem (LENTZ).

S. Sinapistrum Cr. Koło cukrowni w Uściu Biskupiém.

S. Sophia L. Około dróg; Skala, Trojanówka, Dawidkowce, Kopyczyńce, Uhryń, Tudorów, Chorostków, Soroka.

S. strictissimum L. Nad Zbruczem w Husiatynie, nad Seretem w Rosochaczu i Czortkowie.

Alliaria officinalis Andrz. Na ścianie lesistej w Paniowcach zielonych.

Erysimum cheiranthoides L. Około wsi, po pustkowiach, koło dróg wszędzie posp.

E. pannonicum Cr. Po skałach nad Dniestrem w Chudykowcach.
E. canescens Roth. Nad Dniestrem w Babińcach, nad Seretem w Sasolówce i Milowcach.

Sinapis arvensis L. Po polach w zbożu wszędzie posp.

S. nigra L. Po zaroślach wilgotnych, rowach, około pól i dróg, miejscami; Paniowce Zielone, Skala, Lisowce, Kapuścińce, Ułaszkwce, Rosochacz, Uhryń, Czortków Suchodół.

Alyssum calycinum L. Po skalistych zboczach; Uście Biskupie, Chudykowce, Skala, Husiatyn, Milowce, Zabłotówka, Sasolówka, Uhryń, Czortków, Białe.

A. incanum L. Po skałach, pagórkach około pól i dróg, wszędzie posp.

Draba nemorosa L. Po łąkach, brzegach lasów, pagórkach; Czortków (BUSCHAK), Łosiacz, „Wołowa“ w Miodoborach.

Roripa austriaca Bess. W dolinie Dniestru w Uściu Biskupiém.

R. palustris Bess. Po brzegach rzek, stawów i moczarach; Gródek, Rosochacz, Kopyczyńce, Kociubińce.

R. silvestris Bess. Po moczarach, brzegach rzek i stawów, rowach, często; Skala, Jezierzany, Milowce, Zabłotówka, Kozaczyzna, Zielińce, Tudorów, Kotówka, Bilka i t. d.

Camelina sativa Cr. Uprawiana w Bednarówce.

Neslia paniculata Desv. Po polach i zrębach; Głębocek, Szerzeniowce, Uhryń, Szydłowce, Olchowczyk, Trybuchowce.

Bunias orientalis L. Około pól i dróg; Krzywece, Skala, Burdiakowce, Kołędziany.

Thlaspi campestre L. Około dróg; Kołodróbka, Chudykowce, Rosochacz.

Th. arvense L. Po polach posp.; Łosiacz, Czortków, Trybuchowce, Sadržawki.

Lepidium ruderaie L. Po skałach, pagórkach, ogrodzeniach, pustkowiach, wszędzie posp.

Capsella Bursa pastoris Mönch. Około dróg posp.

Isatis tinctoria L. Nad Dniestrem w Chudykowcach, Babińcach i Kołodróbce.

Senebiera Coronopus Poir. Po drogach, dziedzińcach i koło pól; Skala, Łosiacz, Jezierzany, Konstancyja, Kapuścińce, Rosochacz, Kopyczyńce, Kociubińce, Husiatyn, Liezkowce, Trybuchowce, Rasztowce, Soroka, Uwiśła, Chłopówka, Chorostków, Kąt (przy Toustem).

Raphanus Raphanistrum L. Po polach.

Resedaceae.

Reseda alba L. W ogródku aptęcznym w Jezierzanych początkowo zasiana, rozpleniła się szeroko. W Kociubińcach pod płotem widziałem kilka okazów.

Nymphaeaceae.

Nymphaea alba L. Na stawach w Cyganach i Tlusteńkiem.

Nuphar luteum Sm. Na stawach w Cyganach, Hadyńkowcach i Kopyczyńcach.

Cistineae.

Helianthemum vulgare Gärtn. var. *hirtum* Neilr. Po sianozęciach na zrębach dębowych; Czortków ku Hadyńkowcom i Szmańkowcom, „Halilea“ las w Ułaszówcach i Głębocku.

Violarieae.

Viola hirta L. W t. XI Spraw. Kom. fiz. str. 188, pod tą nazwą wydrukowano błędnie, zamiast „Hłody“ w Kołodróbce: „Hłody“ w Korolówce.

V. silvestris Kit. Po lasach i zrębach, często; Cygany, Łosiacz, Rosochacz, Uhryń, Białe, Tudorów, Miodobory (m. Kręciłowem a Nowosiółką).

V. mirabilis L. Po lasach cienistych, zrębach i zaroślach; Lisowce, Uhryń ku Sieniakowej, Łosiacz, Jabłonów, Biłka.

V. tricolor L. Po polach, ugorach, ogrodach, łąkach, lasach i zrębach, wszędzie posp.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L. Pod płotami; Słobódka Muszkatowiecka, Skala, Cygany, Łosiacz, Kozaczyzna, Zieliniec, Kapuścińce, Czortków, Koleździany, Kociubińce, Kopyczyńce, Uwiśla, Chłopówka, Postołówka, Rasztowce.

Sicyos angulata L. Pod płotami; Łosiacz, Kozaczyzna, Czortków, Hadyńkowce, Husiatyn.

Portulaceae.

Portulaca oleracea L. Pod murem w Uściu Biskupim i w ogródku na plebanii w Skale.

Caryophylleae.

Herniaria glabra L. Po polach, pagórkach i skalach; Cygany, Zieliniec, Zabłotówka, Grabowiec, Czortków, Tudorów.

Spergularia rubra Pers. Około pól i dróg; Uście Biskupie, Zabłotówka, Uhryń, Kociubińce, Bednarówka.

Spergula arvensis L. Po polach; Łanowce, Kozaczyzna, Merława, Grabowiec, Białe.

Scleranthus annuus L. Po polach, ugorach, pustkowiach, wszędzie posp.

Sagina procumbens L. Po miejscach trawiastych wilgotnych; Uście Biskupie, Konstancyja, Zabłotówka, Białe.

Arenaria serpyllifolia L. Po suchych łąkach, pagórkach i skałach, wszędzie posp.

Moehringia trinervia Clairv. Po zaroślach i zrębach; Białe, Skorodyńce.

Stellaria media Vill. Koło ogrodów, pól i dróg; Kapuścińce, Dawidkowiec, Szydłowiec, Husiatyn, Chorostków, Liezkowiec i zapewne wszędzie.

S. Holostea L. (ozn. z liści). Po lasach i zrębach; Cygany, Łosiacz, Białe, Sidorów, Szydłowiec.

S. graminea L. Po łąkach, miedzach, zaroślach i zrębach; Lanowce, Zabłotówka, Czortków (ku Hadyńkowcom), Bednarówka, Liezkowiec.

Cerastium triviale Link. Po wygonach, łąkach, około pól i dróg wszędzie posp.

Malachium aquaticum Fries. Po miejscach mokrych, wszędzie często.

Gypsophila muralis L. Po polach i ugorach wszędzie posp.

Dianthus Armeria L. Po brzegach lasów, zaroślach, zrębach i karczunkach, często; Paniowiec zielony, Cygany, Grabowiec, Dawidkowiec, Skorodyńce, Jabłonów, Kopyczyńce, Burdiakowiec, Husiatyn, Postolówka, Bilka.

D. capitatus DC. Po suchych łąkach, trawnych pagórkach i ściankach nad Zbruczem aż po Olehowczyk, nad Nieczławą po Koza-czyznie, nad Sereciem aż po Białe posp. W Miodoborach na „Wołowój“.

D. deltoides L. Po brzegach lasów; Cygany, Łosiacz, Zabłotówka, Skorodyńce.

Saponaria Vaccaria L. Po polach w zbożu; Chudykowiec, Uście Biskupie, Zabłotówka.

S. officinalis L. Po zaroślach wilgotnych nad rzekami i pod płotami; Uście Biskupie, Szypowiec, Lisowiec, Miłowiec, Kołędziany, Szmańkowiec, Hadyńkowiec, Olehowczyk, Liezkowiec, Kręciłów.

Cucubalus baccifer L. Po płotach i krzakach; Paniowiec zielony, Zabłotówka, Rosochacz, Sieniakowa, Horodnica, Bilka.

Silene Behen Wib. Po łąkach, pagórkach, skałach i polach wszędzie często.

S. dichotoma Ehrh. Po ściankach zarosłych i lesistych w Kołodźbce i Paniowcach zielonych, pod murem cukrowni w Uściu Biskupim.

S. chlorantha Ehrh. Na ścianie „Dąbrowie“ w Czortkowie.

S. Otites Sm. var. *densiflora* Oth. Po ściankach nad Dniestrem w Chudykowiecach, nad Zbruczem w Paniowcach zielonych, nad Sereciem na śc. „Bednarówce“ w Rosochaczu i „Dąbrowie“ w Czortkowie.

Melandrium noctiflorum Fr. Po polach, zaroślach i zrębach;

Paniowce zielone, Suchodół, Tłustenkie, m. Wasylkowcami a Samołuskowcami, m. Klekotowem a Aleksandrowką i w. i. m.

M. album Garcke. Około wsi, pól i dróg, wszędzie często.

Lychnis Flos cuculi L. Po łąkach; Paniowce zielone, Cygany, Sz wajkowce, Tudorów i t. d.

Agrostemma Githago L. W zbożu posp.

Malvaceae.

Lavatera thuringiaca L. Po brzegach lasów, zaroślach i zrębach, około pól, dróg i pól, wszędzie posp.

Althaea officinalis L. Ponad Niezłąwą w Lanowcach, Kozaczynie i Merlawie.

Malva silvestris L. Około dróg, po ogrodach i pustkowiach, wszędzie posp.

M. rotundifolia L. Podobnie.

M. borealis Wallm. Po miejscach, jak oba poprz. gat.; Kapuścińce, Dawidkowce, Kociubińce, Chorostków, Soroka i w. i. m.

M. crispa L. Koło ogrodów, rzadko; Czortków, Kociubińce.

Tiliaceae.

Tilia parvifolia Ehrh. Po lasach mieszanych, często; Cygany, Burdiakowce, Szydłowce, Kopyczyńce, Jabłonów, Oryszkowce, Białe, Czortków (ku Szmańkowcom), Rosochacz, Sadržawki.

T. grandifolia Ehrh. Jak poprz. gat.; Łosiacz.

Hypericineae.

Hypericum perforatum L. Po brzegach lasów, zaroślach, zrębach, około pól i dróg, wszędzie posp.

b) *latifolium* Koch. Na zrębie koło Nowosiółki w Miodoborach, obficie.

H. montanum L. Na zrębie w Budzanowie (BUSCHAR), na ścianie nad Zbruczem w Bitce.

H. hirsutum L. Po zaroślach przyleśnych i śródleśnych wszędzie dość częsty.

Elatineae.

Elatine Alsinastrum L. Na namuliskach jezior w Zabłotówce, bardzo obficie.

Acerineae.

Acer Pseudoplatanus L. Po lasach i zaroślach; Germakówka, Cygany, Uhryń, Rosochacz, Tudorów, Kopyczyńce, Touste, Sadržawki, Biłka.

A. platanoides L. Po lasach mieszanych; Rosochacz, Białe, Skorodyńce, Tudorów, Kopyczyńce, Jabłonów, Oryszkowce, Łosiacz, Burdiakowce, Olchowczyk, Trybuchowce, Touste, Sadržawki, Biłka.

A. campestre L. Po lasach mieszanych jako podszycie i po zaroślach, wszędzie.

A. tataricum L. Po ściankach nad Seretem w Lisowcach i Rosochaczu.

Polygaleae.

Polygala vulgaris L. var. *comosa* Döll. Po łąkach przyleśnych i ściankach; Zabłotówka, Paniowce zielone, Szwajkowce, Szmańkowce, Kopyczyńce i t. d.

Celastrineae.

Evonymus europaeus L. i

E. verrucosus Scop. Po lasach mieszanych i zaroślach wszędzie posp.

Rhamnaceae.

Rhamnus cathartica L. Po ściankach nad Zbruczem w Biłce, nad Gniłą w Liczkowcach, nad Seretem w Lisowcach, Sasolówce, Rosochaczu i Czortkowie. Na stoku „Wołowój“ w Miodoborach.

R. Frangula L. Po brzegach lasów i zaroślach; Szmańkowce, Sasolówka, Rosochacz, Czortków, Szydłowce, Husiatyn, Olchowczyk, Trybuchowce, Biłka.

Euphorbiaceae.

Euphorbia helioscopia L. Około wsi i miasteczek po polach, ogrodach i koło dróg; prawie wszędzie często.

E. platyphyllos L. Jak. popr. gat.; Łanowce, Kozaczyzna, Zielińce, Tudorów, Sidorów, Uwiśla, Katakharówka, Kręciłów i w. i. m.

E. angulata Jacq. Na ściance „Hłody“ w Kołodrobce, po zrębach w Łanowcach (las „Tulin“), Rosochaczu („Bednarówka“ ścianka), Zabłotówce (las „Halilca“) i Uhryniu.

E. pilosa L. Po ściankach i sianozęciach przyleśnych i śródleśnych; Babińce (nad Dniestrem) (LENTZ), Sasolówka, Rosochacz, Czortków ku Hadyńkowcom.

E. Gerardiana Jacq. Tylko po pagórkach i skalistych zboczach nad Niczławą w Łanowcach, Kozaczyźnie i Zielińcach, i nad Gniłą w Borkach.

E. amygdaloides L. Po lasach; Germakówka, Słobódka Muszkatowiecka, Cygany, Łanowce, Łosiacz, Czortków, Białe, Skorodyńce.

E. Cyparissias L. Po suchych pagórkach, pustkowiach, około pól i dróg prawie wszędzie.

Mercurialis perennis L. Po lasach; Słobódka Muszkatowiecka, Cygany, Łosiacz, Rosochacz, Jabłonów, Oryszkowce, Miodobory (m. Nowosiółką a Kręciłowem i nad Kręciłowem).

Diosmeae.

Dictamnus albus L. Po ściankach nad Dniestrem w Uściu Biskupiem (LENTZ) i Kołodróbce (śc. „Hłody“), nad Seretem w Czortkowie (śc. „Dąbrowa“). W Miodoborach na Wołowój nad Sadzawkami.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium L' Herit. Po polach, pustkowiach, koło dróg; Zabłotówka, Szmańkowce, Uhryń, Czortków, Kopyczyńce, Samoluskowce, Wasylkowce, Soroka i zapewne wszędzie.

Geranium pratense L. Po łąkach, brzegach lasów, zaroślach i zrębach wszędzie dość często.

G. palustre L. Jak poprz. gatunek, lecz rzadziej; Skala, Czortków (Stawki), Kluwińce, Miodobory (k. Nowosiółki).

G. pusillum L. Pod płotami w Horodnicy.

G. robertianum L. Po miejscach cienistych, skałach, w lasach i zaroślach; Cygany, Skorodyńce, Tudorów, Kręciłów, Sadzawki i t. d.

Lineae.

Linum flavum L. Na ściance „Bednarówce“ nad Seretem w Rosochacz.

L. austriacum L. Na okopie lasku „Leszczyna“ w Burdiakowcach.

L. catharticum L. Po łąkach i pagórkach trawiastych; Głębocek, Zabłotówka, Łosiacz, Ziclińce, Czortków, Kluwińce, Rasztowce, Sadzawki.

Oxalideae.

Oxalis Acetosella L. Po lasach; Rosochacz, Tudorów.

Balsamineae.

Impatiens noli tangere L. W lesie w Miodoborach m. Nowosiółką a Kałaharówką.

Oenotheraeae.

Epilobium angustifolium L. Po zrębach, posp.; Skala, Cygany,

Łosiacz, Zabłotówka, Uhryń; Białe, Skorodyńce, Tudorów, Oryszkowce, Szymańkowczyki, Liczkowce, Kręciłów i w. i. m.

E. hirsutum L. Po zaroślach nad rzekami, potokami, stawami, po rowach, wszędzie posp.

E. parviflorum Schreb. Po rowach; Uwiśla.

E. montanum L. Po brzegach lasów, zaroślach i zrębach; Paniowce zielone, Uhryń, Białe, Miodobory (m. Kręciłowem a Nowosiółką).

E. palustre L. Po miejscach mokrych nad wodami; Zwiahel, Milowce, Tudorów, Szwałkowce, Szymańkowce, Uwiśla.

Circaea lutetiana L. W lasach Miodoborskich m. Nowosiółką a Kałaharówką i w Bilce.

Haloragaceae.

Myriophyllum spicatum L. W odlewiskach Seretu w Rosochaczu.

Lythrarieae.

Peplis Portula L. Na namuliskach jeziorok w Zabłotówce.

Lythrum Salicaria L. Po moczarach wszędzie posp.

Pomaceae.

Pirus communis L. Po lasach, polach, koło dróg, rzadka; Kołodróbka, Łanki, Sasolówka.

P. Malus L. Jak poprz. gat.; Rosochacz, Uhryń, Szymańkowce, Oryszkowce, Szydłowce.

Sorbis aucuparia L. Na brzegu lasu „Glinka“ w Nivrze (LENTZ), na ścianie w Rosochaczu, w zaroślach w Tudorowie — pojedyncze tylko okazy.

Crataegus Oxyacantha L. Obie odmiany. Po brzegach lasów, zaroślach i pagórkach, wszędzie dość posp.

Rosaceae.

Rosa pimpinellifolia Lam. Po skalistych urwiskach w Babińcach nad Dniestrem.

Rubus caesius L. i

R. fruticosus L. Po zaroślach, brzegach lasów, zrębach wszędzie często.

Fragaria vesca L. Po suchych pagórkach, zrębach, zaroślach i lasach, wszędzie posp.

Potentilla alba L. Po łąkach przyleśnych i śródleśnych, ściankach i pagórkach zarosłych; „Łanki“ w Milowcach, las „Halilea“ w Zabłotówce, Jezierzanach i Sasolówce, Łosiacz, Tłusteńkie.

P. anserina L. Po wilgotnych trawnikach, około dróg i po pastwiskach, wszędzie posp.

P. reptans L. Po pagórkach i skałach; Wygnanka, Białe.

P. Tormentilla Scop. Po sianożęciach; Oryszkowce, Kluwińce, m. Wasylkowcami a Samołuśkowcami.

P. verna L. var. *cinerea* Neilr. Po ściankach i pagórkach posp.; Czortków, Kociubińce, Horodnica, Postołówka i t. d.

P. argentea L. Po brzegach lasów, pagórkach, około pól i dróg, wszędzie posp.

P. recta L. Po łąkach, brzegach lasów, zrębach i ściankach; Zielińce, Rosochacz, Kociubińce, Sadržawki.

P. supina L. Koło jeziorok w Cyganach.

Agrimonia Eupatoria L. Po brzegach lasów, zrębach, pagórkach i około dróg wszędzie posp.

A. odorata Mill. W lesie w Miodoborach koło Nowosiółki.

A. pilosa Led. W lesie „Halilea“ w Zabłotówce, na zrębie.

Sanguisorba officinalis L. Po łąkach przyleśnych i śródleśnych, zaroślach i zrębach; Jezierzany, Głęboczek, Zabłotówka, Czortków ku Hadyńkowcom, Tłusteńkie, m. Wasylkowcami a Samołuśkowcami, Kluwińce.

Geum urbanum L. Po lasach, zaroślach, około pól, wszędzie posp.

G. Aleppicum Jacq. Razem z poprz. gat.; Dźwiniaczka, Słobódka Muszkatowiecka, Ułaszowce, Czortków (Stawki), Białe, Jabłonów, Wolica, Sadržawki, m. Nowosiółką a Kręciłowem.

Spiraea Ulmaria L. Po mokrych łąkach, zaroślach i zrębach; Paniowce zielone, Skała, Cygany, Szymańkowczyki, Czortków (Stawki), Jabłonów, Kotówka, Kopyczyńce, Nowosiółka (w Miodoborach).

S. Filipendula L. Po łąkach, suchych pagórkach, brzegach lasów, wszędzie dość często.

Amygdaleae.

Prunus spinosa L. Po brzegach lasów, zaroślach i zrębach, wszędzie posp.

Papilionaceae.

Ononis hircina Jacq. Po łąkach, około lasów, pól i dróg, wszędzie często.

Sarothamnus vulgaris Wimm. Rozsiewany po brzegach i liniach lasów dla zajęcy; Skała, Burdiakowce, Cygany.

Genista tinctoria L. Po brzegach lasów i łąkach przyleśnych i śródleśnych; Paniowce zielone, Łanowce, Zielińce, Jezierzany, Zabłotówka, Ułaszowce, Sasolówka, Rosochacz, Uhryń, Czortków, Szymańkowczyki, Dawidkowce, Kociubińczyki, Jabłonów.

Cytisus nigricans L. Po skalistych zboczach, ściankach, pagórkach i brzegach lasów; Chudykowce, Kołodróbka, Zabłotówka, Ułaszowce, Sasolówka, Rosochacz, Czortków i w. i. m.

C. austriacus L. var. *albus* Neilr. Po brzegach lasów, zaroślach i zrębach, często; Łosiacz, Łanowce, Lisowce, Łanki, Zabłotówka, Ułaszkwce, Rosochacz, Czortków, Burdiakowce, Tłusteńkie i w. i. m.

Anthyllis Vulneraria L. Po ściankach i zrębach dębowych; Kołodróbka, Ułaszkwce, Sasolówka, Rosochacz, Szymańkowce, Szwaikowce.

Medicago sativa L. Zdżiczala w wiklach nad Seretem w Miłowcach.

M. falcata L. i

M. lupulina L. Około dróg, pól i lasów, po skałach, łąkach i pagórkach wszędzie posp.

Melilotus macrorrhiza Pers. Po łąkach w Kołędzianach.

M. officinalis Desr. Około dróg, pól i lasów po pagórkach i skałach, prawie wszędzie.

Trifolium pratense L. Po łąkach, pastwiskach i brzegach lasów, wszędzie posp.

T. medium L. Po suchych łąkach przyleśnych i śródleśnych; Łosiacz, Burdiakowce, Czortków ku Oryszkowcom i Szymańkowcom.

T. alpestre L. Jak poprz. gat.; Łosiacz.

T. pannonicum Jacq. Po sianożęciach na zrębach dębowych w Czortkowie (ku Oryszkowcom i Hadyńkowcom).

T. arvense L. Po polach i ugorach, wszędzie posp.

T. fragiferum L. Po polach, trawnikach wilgotnych, nad potokami i rzekami; Uście Biskupie, Skała, Łanowce, Kozaczyzna, Merława, Grabowiec, Miłowce, Rosochacz, Czortków, Klekotów, Biłka, i w. in. m.

T. montanum L. Po łąkach przyleśnych i śródleśnych; Łosiacz, Cygany, Zabłotówka, Rosochacz, Czortków.

T. repens L. Po łąkach i trawnikach wilgotnych, wszędzie posp.

T. hybridum L. Po łąkach, miedzach i zrębach; Cygany, Grabowiec, Uhryń.

T. agrarium L. Po suchych łąkach i pagórkach około lasów, prawie wszędzie często.

T. procumbens L. Po brzegach lasów; Paniowce zielone, Załuże, Wierzbówka.

Lotus corniculatus L. Po łąkach, pagórkach, około lasów, pól i dróg, wszędzie posp.

Robinia Pseudo-acacia L. Przy drodze leśnej na Konstancyi sadzona.

Oxytropis pilosa DC. Nad Dniestrem po skałach w Babińcach (LENTZ).

Astragalus Onobrychis L. Po skałach, pagórkach, około pól i dróg; Uście Biskupie, Chudykowce, Kołodróbka, Miłowce, Husiatyn.

A. Cicer L. Po łąkach, brzegach lasów, zaroślach, polach, pagórkach; Uście Biskupie, Kołodróbka, Paniowce zielone, Zielińce, Rosochacz, Kołędziany, Kotówka.

A. glycyphyllos L. Po brzegach lasów, zaroślach i zrębach; Łisowce, Zabłotówka, Milowce, Sasolówka, Zielńce, Skorodyńce, Łosiacz, Burdiakowce, Touste, Wolica i w. in. m.

Vicia hirsuta Koch. Po zaroślach w Łanowcach.

V. pisiformis L. W zaroślach; las „Glinka“ w Niwrze (Lentz), „Urwana“ ścianka w Rosochaczu, Paniowce zielone.

V. silvatica L. Po brzegach lasów w zaroślach; Cygany, Łosiacz, Uhryń, Rosochacz.

V. dumetorum L. Po zaroślach i zrębach; Cygany, Łosiacz, Burdiakowce, Uhryń, Rosochacz, Skorodyńce, Suchodół, Biłka, Sądżawki.

V. Cracca L. Po zaroślach i łąkach przyleśnych, w zbożu; Głębozeczek, Zielńce, Cygany, Burdiakowce, Bosyry, Sasolówka.

V. villosa Roth. Po łąkach i zaroślach, koło dróg; Krzywce, Cygany, Burdiakowce, Uhryń, Szmańkowczyki, Kołędziany, Wygnanka, Nowosiółka (w Miodoborach).

V. sepium L. Po zaroślach; Łosiacz, Zabłotówka, Bednarówka.

V. sativa L. Zdziaczała po miedzach na Wygnance górnej przy Czortkowie.

Lathyrus tuberosus L. Na polu w Kołodróbce.

L. pratensis L. Po łąkach, zaroślach i zrębach posp.

L. silvestris L. Po zaroślach przyleśnych i zrębach; Wołkowce (pod Borszcz.) Zabłotówka, Łosiacz.

Orobis vernus L. Po lasach; Burdiakowce, Kręcilów.

O. niger L. Po lasach i zaroślach; Jezierzany, Cygany, Łosiacz, Burdiakowce, Kołędziany, Rosochacz, Uhryń, Szmańkowce.

Coronilla varia L. Po łąkach i pagórkach trawiastych, wszędzie posp.

Onobrychis sativa Lam. Po suchych trawiastych pagórkach i ściankach wszędzie posp.

